

**THOMAE
SYDENHAM
MEDICI ...
LONDINENSIS ...
OPERA MEDICA**

Thomas Sydenham





G U I L H E L M I
M U S G R A V E
M E D I C I D O C T O R I S,

Incltyti Medicorum Londinensium Collegii, & Regiæ Societatis Socii,

DISSERTATIONES DUÆ.

I. DE ARTHRITIDE SYMPTOMATICA.

Ἀγαθοῖσι δὲ ἱητροῖσιν αἰ πλάναις ἢ ἀπορίαις. Ἱπποκρ.

II. DE ARTHRITIDE ANOMALA, sive INTERNA.

Καὶ ὅπου ὁμοιώματα εἶδέναι χρὴ, εἴτε Λύσις ἢ Νῦσος, εἴτε Μεσσηπίπτει εἰς ἐτέρω Νῦσον. Ἱπποκρ.

EDITIO NOVA ACCURATIOR.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O from the H_2O_2 -sensitive hydrogel. The amount of the released H_2O was measured by the weight difference of the hydrogel before and after the swelling in the H_2O_2 solution. The concentration of the H_2O_2 solution was 0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, and 10 wt. %.

T H O M Æ
S Y D E N H A M
MEDICINÆ DOCTORIS.

AC PRACTICI LONDINENSIS CELEBERRIMI

OPERA MEDICA

EDITIO NOVISSIMA

VARIIS VARIORUM PRÆSTANTISSIMORUM MEDICORUM OBSERVATIONIBUS

Et plurium Constitutionum Epidemicarum recentiorum descriptione quam maxime illustrata: Imo & Mechanica tum Morborum, tum Medicamentorum

a JOANNE-BAPTISTA MAZINO; necnon ANTONII
GOEDESTINI COCCHII, & BARTHOLOMÆI
BOSCHETTI Et aliorum Tractatibus
Medicis rursus aucta.

CUM ELENCHIS RERUM ET INDICIBUS NECESSARIIS.

TOMUS SECUNDUS.



N E A P O L I.

Typis VINCENTII MANFREDII.

EXPENSIS STEPHANI MANFREDII.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

MDCCCLXVII.

RB 1251/2



E L E N C H U S

PRIMÆ DISSERTATIONIS

DE ARTHRITIDE SYMPTOMATICA.

CAP. I. **D**E Arthritide Symptomatica generatim. pag. 1

II. De Arthritide *Rheumatismo* supervenienti, Symptomatica falso appellata. 5

III. De Arthritide ex *Chlorosi*, & ex *Mensium suppressione*. 8

IV. De Arthritide *Hydropi* superveniente. 12

V. De Arthritide *Melancholica*, *Hypochondriaca*, & *Hysterica*. 17

VI. De Arthritide fixa *Scorbutica*. 22

VII. De Arthritide *Lui Venerea* succedenti. 30

VIII. De Arthritide *Asthmatica*. 36

IX. De Arthritide *Febri* succedanea. 40

X. De Arthritide ex *Colica*. 44

XI. De Arthritide *Morbis* quibusdam *Cuticularibus* subiecta. 50

XII. *Corollaria & Spicilegia* quaedam habet, cum *Epilogo*. 54

ELEN:

EL ENCHUS

SECUNDÆ DISSERTATIONIS

DE ARTHRITIDE ANOMALA SIVE INTERNA :

| | |
|---|--|
| CAP. I. D E Arthritide Anomala
generatim. pag. 62 | XI. De Catarrho, Tussi, & Peri-
pneumonia Arthritica. 124 |
| II. De Ventriculi Affectibus Ar-
thriticis. 67 | XII. De Phthisi Arthritica. 130 |
| III. De Colica Arthritica. 82 | XIII. De Angina Arthritica. 135 |
| IV. De Diarrhœa Arthritica. 94 | XIV. De Capitis Dolori, & Ver-
tigine Arthritica. 142 |
| V. De Dysenteria Arthritica. 99 | XV. De Apoplexia Arthritica. 151 |
| VI. De Abscessu Intestinatorum Ar-
thritico. 103 | XVI. De Paralyfi Arthritica. 159 |
| VII. De Melancholia Arthriti-
ca. 107 | XVII. De Doloribus in Corpore
vagis, fixis; de Ophthal-
mia; de Erysipelate; &
Achoribus Arthriticis. 168 |
| VIII. De Syncope Arthritica. 111 | XVIII. De Epiphora, & Dolori
Dentium Arthritico. 170 |
| IX. De Calculo Renum Arthriti-
co. 113 | XIX. Corollaria continet, cum Epi-
logo. 171 |
| X. De Asthmate Arthritico. 117 | |

PRÆ-

P R Æ F A T I O .



Uotcumque inspexi de *Arthritide* scribentes; in eo sunt ad unum omnes, & quidem elaborant, ut tantummodo morbi istius, quæ *Exquisti*, *Genuini*, *Legitimi*, suoque ordine *Primarii*, Doctrinam excolant, & disciplinam edant: ea videlicet illius notitia, quæ ex ipsa manat, vel elicitur, contenti, de *Larvata*, sive *Symptomatica Arthritide*, num quæ sit, aut qualis, aut quanta, aut quota, aut quam a se diversa, aut *Arthritida Primigeniam* quam mimice & quantum imitetur, (etiamsi hæc ad illam illustrandam exponendamque apte conferunt) parum, vel minime solliciti.

Quid ab his hominibus studeatur, & in isto genere quousque proficiatur, non est hujus instituti, exquirere. Impræsentiarum nos, experientia duce & præside, proponimus, in iis affectionibus, quæ *Podagræ* & *Arthritidos* regularis appellatione passim insigniuntur, explicandis sanandisque, (ut, a Medico quod suscipitur negotii, luculenter id tractetur; & ad ægrotorum commodum & sanitatem, quod amplissimum fieri possit, id demum agatur) primum, in *Arthritida Primigeniam* & *Symptomaticam* earum divisionem; tum *Symptomatica* in suas partes distributionem, constantissime ante omnia religiosissimeque conservari.

Quanto ille, & quam digne, risu exciperetur; qui, dum artem exercere professus sit gemmariam, omnes illos, quocumque circumferuntur (ita vulgo nominati) *Adamantes*, tanquam *legitimos* & *veros* æstimaret; atque adeo acciperet? Annon *Artificem* potius deceret, quid *Adamanti legitimo* proprium sit, investigare; eoque posito, tanquam regula & norma, de *Pseudo Adamantibus*, & eorum a *Vero* dissimilitudine & discrepantia judicare? Noane etiam delectaret *Falsorum* varietatem, magnam utique & multiplicem, ut a *legitimo* alii quam longissime removentur, cementiti, factitii; ut ad eum alii propius accedunt; alii *Colore* translucido æquiparant; alii *Duritie* tantum vincuntur, a *Vero Adamante* non nisi ab *Artifice* peritissimo distinguendi, diligenter expiscari?

Non minus fixum aut immobile fundamentum in experimentis habet *Arthritidos* illa in *Primigeniam* & *Symptomaticam*, & *Symptomatica* in suas *Species*; quam habet *Adamantis* hæc in *Legitimum* & *Falsum*, & *Falsi* in *Partes* suas, divisio distributioque.

Quanti vero intersit hæc notari, & hisce perquirendis quam egregie locetur res & salus *Arthriticorum*: ex eo constat, quod, iis prætermisissis neglectisque, jure merito verendum, ne dum uni eidemque tantum morbo, nempe *Arthritidi*, videamur; revera nos, quodque est certissimum, multis, iisque longe inter se diversis, & diversa ratione impugnandis, obistere contingat, id est, accipiti prorsus eventu, prælium, ne in tenebris committamus.

Eum recte curaturum credunt, qui *Rationalem Medicinam* proficitur, quem *prima Origo causæ* non fefellerit: neque curari id, quod ægrium est, posse, ob eo, qui

qui quid sit, ignoret. Sed cuius rei non est certa notitia, quod ejus opinio certum reperire remedium non potest. Celsus, Praef. L. I.

Hujus quidem modi distinctionem a clarissimo Mortono, in *Physiologia*, fuisse jampridem docteque lucubratam esse video; &, istius opera, morbum omnino difficillimum explicari, gravissimum curari. Sed, in chronicis plerisque aliis ab *Autoribus* celeberrimis, aut penitus omissam, aut aride nimis & jejune proditam: quam tamen, & in aliis perutilem, & quidem necessariam fore, ideoque multum desiderari, diu sum arbitratus: in *Arthritide*, quo diutius illa cæteris affectionibus, quo crudelius humanum genus acerbiusque infestavit; &, in illo, quo frequentius *Symptomatica* reperitur.

Qui quod insignissimus Baglivius, magnum *Italiæ* decus & ornamentum, hac in parte *Opusculi*, graviter errare Medicos existimat, qui putant nonnullos morbos esse *Primarios*; ab iisdem causis productos: eandemque etiam medendi methodum exposcentes; cum, per repetitas gravissimorum Medicorum observationes, certo constiterit, eos esse *Secundarios*: a diversis causis pendere; *Specie* differre: propria habere symptomata, propriosque methodos exposcere. Et inter præcipua artis desiderata illud merito reponit, Ut scilicet singuli quique morbi in tot species subdistinguntur, quot sunt morbi primarii a quibus fiunt, aut causa vehementes constantesque quibus producuntur. *Præcos Medicæ Lib. 2. Cap. IX.*

Posita ergo hac *Arthritidos* divisione, & in præsentî misso, tanquam *Postulato*, divisorum membro priori, scilicet *Arthritide Primigenia*; posterius aggredior, nempe *Symptomaticam*, hoc consilio & spe frerus, si prius copiae debellantur hæ *Auxiliares*, hostem postea facilius depelli & evinci posse *Principalem*.

Dicam itaque *Arthritidem Symptomaticam*, & in ea *Species*, quotquot usquam mihi innotuere, comprehensas: ut illius *Ratio generalis*, & harum *Descriptiones* & *Distinctiones*; ut, a morbis suis *Primariis*, earum *Ortus* & *Emersiones*; ut, in *Arthritidem Primigeniam*, earum *Migrations* & *Itinera*: in statu maxime degeneri & peregrino; ut earum *Facies* & *Proprietates*, (variae, Jupiter, & dissimiles) ut *Opusculi Arthritice* usquequaque aperiuntur: *Curationes*, & medendi *Intentiones* earum singulis accommodatae, (quoad poterò,) congruentes, ut eliciantur: postremo, totum id quod dicimus, ut *Historiis*, optima fide traditis, tanquam tot *Testibus*, stabiliatur, confirmetur. Hoc *Libelli* hujus *Opus* & *Argumentum* est.

Lectorem autem illud admoneri decet; quoniam ea, quæ a *Nobis*, nullius *Sectæ* affectis, imo *Sectam* omnem fugientibus, & *Historicam* (ea quidem una exercenda, vindicanda) *Medicinam* colentibus, sistuntur & in medium proferruntur; aut eventa habent, aut ex iis ultro nata, vel facillime ducta; ista vero eventa colligenti maximam partem præbuit *Damnanium* hocce *Oriente*; quod idcirco *Medicina* hæc (ea vero ejus pars præcipue, quæ de *Scorbutica* est *Arthritide*) quodammodo *Provincialis*, & hujus *Populi* *Propria* esse videatur. Utinam sane tanto & tam nobili populo par inveniat.

DISSERTATIO PRIMA.

D E

ARTHRITIDE SYMPTOMATICA GENERATIM.

CAPUT PRIMUM.

Art. I.



T morbi recte dignoscantur, videndæ sunt, (quod docet (1) Hippocrates, ὅτι οἱ νόσοι εἰσὶν αἰσθηταὶ διαδοχαινοσμήτων. h. e. Quæcunque sunt

Morborum vicissitudines, & ex quibus in quos succedant. Vertente clarissimo Medicomatrigo, pariterque textum in hunc modum interpretante. Morborum Successiones, vicissitudines, & exceptiones, esse inspiciendas; ut facilius de toto eorum exitu existimes. Et, Hec oportere omnia ad eam, Morborum Transmutationem transferri, quæ solutionem quandam præ se fert, & Naturæ Benignitate alio Morbum ablegat. Quibus præfatis, ex divini senis oraculis, ad gratiam, & fidem, operi nostro conciliandam, (quod, ad ea se conformari, frustra quidem, & ambitiose nimis, exoptavit,) ipsam rem aggredior, ex illoque sancto quasi fonte, nostra omnis manabit oratio.

II. Præter istam Arthritida, quæ causam habet continentem propriam, & peculiarem, quæ suis viribus pollet, & est ex se sufficiens; ideoque Exquisita audit; nec, Sydenham Opera Med. Tom. II.

ab affectu quovis alio, perfecto, mutuatur, sive ducit, originem; unde Primigenia: (quæ quidem in præsentia, postulati loco ponenda:) alia est Arthritis, quæ a morbo aliquo antecedente profluit: quæ alteri morbo debet ipsum id, quod nascitur, & quod existit: & (a Primario illo) Derivata, Secundaria, Symptomatica uti, (præ Arthritide Exquisita, (Mendax, Simulata, Falsa, jure merito nominetur.

III. Fusius dicam: Arthritidis Symptomatica cum Primigenia, si primas earum facies conferamus, & illa quæ sunt exteriora spectemus, in plerisque convenit: (par etenim ratio paroxysmorum: iidem utrinque typi, similes causæ, & principia, nec non effectus, seu reliquæ, sive fructuosæ, sive contrariæ:) proinde generali nomine Podagræ, & Arthritidos, utrisque communi, comprehensæ, magnam partem adiacentibus sub eo delituere; morbus idem esse, judicatæ. At, a vero quantum id abhorret, iis facile innotescet, qui earum ἀνὸς & ἰσὸς penitus scrutabuntur. Arthritidis Primigeniæ, morbus exquisitus, ἀνὸς sui ordinis princeps, peculiarem & sui generis conjunctam habet causam; proprio utique Marte agentem; per se, vel procatartecarum stimulo, paroxysmos facientem; a nullo vero affectu alio, aut primitus acceptam,

A

aut

(1) Ἐπιδημιῶν, τμηματρίστον.

aut in operibus dependentem. E diverso, *Symptomatica* morbo alteri succrescens, vel materiam, (id est, causam continentem,) vel minimum materiæ in huiusce generis *Arthritis* *μετιωρισμένη*, illi *Primaria*, quo (directe vel oblique) ortus ejus promovetur, refert acceptum : itaque tum morbi, unde fluxit, *primarii*; tum *Arthritidos*, quam æmulatur, exquisitas, de natura, tanquam hybrida, participat.

IV. *Symptomaticæ*, quas hoc terrarum tractu vigere comperimus, sunt ex rheumatismo *Arthritis*, ex chlorosi, & mensibus suppressis, ex hydrope, melancholia; scorbuto, lue venerea, asthmate, febre, dolore colico, affectibus cutaneis : per plures sane, dignæque omnes quæ in *Luciani* Drama prodeant *Τριποδυαλική* : quarum tamen catalogum haud dubie augebit industria posterorum.

His affecti, eos qui in *Arthritide* sunt *Exquisita*, numero videntur, (si recte calculum ponas,) exæquare; imo quidem, (mea sic est ratio,) vincere : ut *Damodio* nostro *Arthritidos* pars dimidia, sine ulla dubitatione, sit hodie *Falsa*.

V. *Symptomaticarum* ratio generalis in eo locari reperitur, quod, cum morbi sunt ab *Arthritide* *Primigenia* diversi, & intervallo quodam distantes, stationes suas *Primarias* linguunt, & erga *Arthritidem* moventes, ei sensim appropinquant : simili fere modo, ac in hypothesi *Copernicana* planetæ apogæum (sive punctum illud ellipseos, quod est a sole remotissimum) deferentes, versus solem inclinant; donec hypogæum (sive punctum ejus quam proxime solem) per tingerint.

De appropinquandi modo ut rite cogitemus, non solum ex *arthritidos* *Primigenia* symptomatibus aut pluribus acceptis, aut diutius servatis, is existimandus : ne hoc, utrumque, judicium fallax, & incertum; imo potius a *primario* plus minusve exuto, (ut in sequentibus patebit) addiscendus. Vero enim vero *Primarii* exuviæ simul cum usurpato *Arthritidis* *Primigenia* vultu, *Symptomaticas* omnium certissime commonstrant.

Specialis harum est conditio, quod a stationibus *Primariis* quo celerius, & quo longinquius, ejusdem classis *Symptomaticæ* deflectunt, eo rarius ad eas revertuntur : hoc est, quo plura morbi *Primarii* symptomata deposuerunt, eo insolentius resumunt; eo celerius *Arthritidis* puræ sym-

ptomata usurpant; eo constantius retinent.

VI. Secum dissentiunt *Symptomaticæ*, si earum externa respicimus; quod aliæ, *Acutæ*; aliæ partu difficili, eduntur; aliæ, a *Primigenia* ægrius; aliæ libentius, decedunt; aliæ ad parentem cito regrediuntur; aliæ vix unquam, aut ne vix quidem; aliæ sæpius; aliæ rarius, *Παροξυσµοί*.

Harum autem *Paroxysmos* si attenderimus, sunt illi profecto longi, breves, acerbis, mites, abnormes, idonei, continui vel intercisi, eadem plane varietate inconstantiæque, qua sunt *Arthritidos* exquisitæ paroxysmi; & reliquias sive fructus habent (sicut illi) suæ cujusque ferocitati & magnitudini, plerunque respondentes.

Partus istant diversitatem facit diversa *Primariorum* indoles, & in *Arthritidem* propensio : nam, quo cujusque *Primarii* materia virus *Arthriticum* magis refert, & materiæ *Arthritidem* facienti, quo plus favetur, eo certe vividum magis *Arthritidos* simulacrum, eo magis solidum emergit *Εκµαλίσθη*. Et e contrario.

VII. Sed, (quæ cum primis ad exponendas hasce *Symptomaticas*, conducit differentia;) Alia *improprie*, & ex vulgi tantum opinione, sic appellatur : quippe quoniam paroxysmos, ad normam *Arthriticam* formatos, & compositos, habet omnino nullos : nec materiam, ei quæ est *Arthritica*, (quantum ex utriusque signis judicare licet) ulla ex parte comparem. Hujusmodi una est, quæ rheumatismo superat, quæque *Symptomaticarum* nomine, quoties de iis verba fecerimus, a nobis ea re excluditur. Alia *magis proprie* dicta; quæ morbo alicui *Primario* manifeste & palam *επιληνυσμένη*, *Primigenia* ritu, per se vel aliunde stimolata, & adjuncta, paroxysmo, celebrat.

VIII. Illa etiam duplex est. Altera generatione, quæ dicitur *Æquivoca*, procreatur. Gravi quodam morbo laborat æger; eoque partim, vel penitus subacto, natura, sui demum juris & vegetior facta, miasma *Arthriticum* in sanguine occultum, sanguinem & quicquid intus virium est depascens : (maxime vero si pharmacis ea proritetur) ad τὰ ἑξωδία appellat; itaque (præter spem & expectationem omnem sæpe) gignit *Arthritidem*. Huc pertinet *Arthritis* ex chlorosi, & ex hydrope; quæ quidem, accurate si dixerimus, *Secundariæ* potius, quam *Symptomaticæ*, censeantur : ut infra ostendetur.

Alter

Altera, quæ *Symptomatica*, eandem cum *Primario* (contra quam modo dicta,) sed mutuam, & ab eo derivatam habet materiam, vel ipsam, vel aliqua ex parte alteratam, vel integram, vel cum alio quodam mistam; sed in aliam corporis regionem, quæ transvehitur; aliaque ratione (id est *Arthritica*,) quæ operatur. Nam, ei quod ineptum est eliminando, per morbos hunc vel illum, pro inepti ratione & corporis constitutione, varios, dum incumbit natura; (unde horum morborum *quævis* ab Hippocrate dicuntur *iatra*,) sæpe quidem fit, vel propter eos nimis remissos, & instituto impares, vel ob materiam parum tractabilem, & *διόρυστον*, quod illius pars in corpore, necdum istis molitionibus exturbata, resset. Hanc natura, prælium redintegrans, secundo aggreditur; & quoniam ausis prioribus exciderat, alia jam methodo conficere, alio morbo, scil. *Articulari* proscribere, contendit. Atque hunc in modum oritur *Arthritis Symptomatica*; cuius species sunt *Arthritis* melancholica, scorbutica, quæ lvi venereæ, quæ asthmatis, quæ febri, quæ dolori colico, quæ morbis cuticularibus, succedit.

IX. Hoc autem minime celandum, quod raro illa, quæ maxime propria *Symptomatica* est, *Primarium* sequitur nisi multorum dierum, veterem, & ab ætate quasi venerabilem, chronicum: & quod illa, serius quam *Primigenia*, nec nisi grandiores, invadit; eos scilicet, qui, cum affectu *Primario* diu conflictati, cum eodem simul inveterascunt. Id quod de altera ista *magis propria* parte, confirmari vetant experimenta; quippe quæ, robustioribus, quæ junioribus, congruere hanc, evincunt.

X. Verum, ut ultra distinguam *Symptomaticas*, earum quæ sunt *διόρυστοι* morbi primarii, (a quibus derivata sui generis materia; quæ in *Arthritica* modum agere conatur, hæ singulæ potiuntur,) cum valide inter se discordant, *Symptomaticas* item hæc, utcumque prima facie confusiles habeantur, specie tamen, pro ipsorum materia, pro illa primariorum diversitate, inter se differre, non est improbabile, peculiarem habent sigillatim omnes naturam; proprium *ἴδιον*; & curationes exigunt proprietatibus suis accommodatas. Nam,

XI. In exercenda medicina, quoties oc-

currit *Arthritis Symptomatica*, morbi *Primarii* ratio, & modus omnino investigandus; therapia probatissima diligenter explicanda; & ex iis, una cum *Arthritidis Primigenie* doctrina, studiose considerateque penitatis, eliciatur, & in quadrum redigatur, optima medendi perfectissimaque indicatio.

(1) Neque enim credant, (qui *Rationalem Medicinam* profitentur,) posse eum scire, quando Morbos curare conveniat, qui, unde hi sint, ignoret: Neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si a lue Venereæ; alia, si a melancholia; alia, si a scorbutico; alia, si ab hydropse; alia, si a chlorosi, (& sic de cæteris affectibus, toto, quod dicitur, cælo distantibus, & secundum illam differentiam diversè medicandis) *Arthritis* oriatur.

XII. Etsi vero *Symptomatica* ratio composita, ab utroque parente (tam eo qui genuit, quam eo qui adoptavit,) ætiologiam, therapiam, ex parte accipit; tamen non id indiscriminatim, & æquali factum est mensura; sed modo, & proportionem, prorsus singulari. Nam in paroxysmo ab *Arthritide*, therapia maximopere; extra vero paroxysmum, in ejus vacatione, prophylactica quæ colatur, a morbo præcipue *Primario*, haurienda.

XIII. Quæ quidem prophylaxis, & in ea quæ est medicina vel late sumpta, cum, ad morbos, veteribus chronicis, iisque gravioribus, secundarios, & malum *ὑποκείμενον* (*Arthritidem*) æmulantes, evertendos, excolatur; diutius quidem, & contentius, ad menses aliquot ducenda: sæpe etiam per annos, statim temporibus, repetenda est: ut nempe morbis ita pertinacibus, inveteratis, sanatu difficillimis, curatio par & æqualis adhibeatur. Ista vero prophylaxeos diurnitas alias longior, alias brevior, ordinanda, pro singula curationum singularum difficultate: quod in sequentibus speciatim, & prescius, exponetur.

XIV. *Arthritidis Symptomatica* a *Primigenia* diversitas, inque membra partitio, ab artis professoribus non satis observata, id effecit, ut ætiologia *Arthritica* hodieque trunca, debilis, imperfecta, perturbata, minime constet; nec cum ægrorum symptomatibus concordet. Neque enim aliter fieri potest, cum, quæ una, & simplex, assi-

mata fuit affectio, varia prorsus esseprehenditur, & multifariam composita.

XV. At, quod magis dolendum, & inhumani generis incommodum (ut nequid gravius dicam) cessit immane quantum; id etiam fecit hoc Περὶ ἀρθρίτιδος; ut, quæ non uno eodemque modo construi, quin potius variari, & pro morborum differentiis, discrepantia, diversitate, aliis aliisque indicationibus passim muniri, debuerat therapia, angusta nimium manca, & delumbis, esse reperiat, utpote *Arthritidis* unius *Primigenia* basi, & fundamento, (nimis arcto) superposita; cum Medici, tum agroti, spem, & vota, decipiens. Infelices *Arthriticos*! & eo quoque nomine miserandos, quod, dum adversus morbos convulsivos; adversus phthisin; adversus febres intermitcentes; aliasque quam plurimas; dum, adversus graves & Herculeos affectus, medendi intentiones aptas, solertes, commodas, excogitavit ætas, in *Arthritide* sananda, pellendaque tam parum profecit.

XVI. Prædictas *Symptomaticas* hac methodo discutiam; Primum nempe remotissimam, & ab *Arthritide Primigenia*, quam longissime disjunctam: deinde reliquas, eo ordine, quo sunt, in sua cujusque ellipsi, minus remotæ dum ad illam denique pervenero, quæ ab *Arthritide Primigenia*, vel abest quam proxime, vel ipsa est: per totum hunc decursum, & universum percurrendo *Systema Symptomaticum*, habito respectu, quoad ejus fieri potest ad accessum, & proximitatem: quæ quidem hoc tempore potissimum advertenda. En! opusculi partitionem;

| Arthritis | |
|---|---|
| Symptomatica | |
| <i>Magis proprie dicta, quæ</i>
<i>Minus proprie dicta, quæ</i>
<i>Falsa sic appellata, quæ</i>
<i>Primigenia.</i> | <i>Morbis quibusdam Cuticularibus,</i>
<i>Colicæ,</i>
<i>Febri,</i>
<i>Asthmati,</i>
<i>Lui Venereæ,</i>
<i>Scorbuto.</i>
<i>Melancholiz,</i>
<i>Hydropi,</i>
<i>Chlorosi,</i>
<i>Rheumatismo,</i> |
| Supervenit. | |

In ipsis partibus tradendis, primum, morbi cujusque *Primarii* stationem dicam: tum, ejus in *Arthritidem* progressum: deinde *Secundarii*, jam facti, & in aditu maxime propinquo sistentis, diagnosis qualem-cunque: post, a cognatis *Secundarii*, & *Arthritide* exquisita, illius differentiationem: tum, morbi, ejusque symptomatum, in primis urgentium, curationem: deinde, isthæc illustrandi ergo, historias: hæc autem, non eadem ubique *Arthritide*, quanta tamen opus est, scriptura persequar.

CAPUT II.

De Arthritis Rheumatismo Supervenienti, Symptomata falsa appellata.

Art. I. **P**riusquam ad *Veras* aggrediamur *Symptomata*, omnino necessarium est, *Arthritis* ex *Rheumatismo* ortam, ita *falso* nominatam, propter ejus cum *Veris* similitudinem, & ne istam in illarum numero ponentibus, operi nostro deesse, videar, expediri; eaque re, de ipso *Rheumatismo*, mendosæ hujus *Symptomata* affectu *Primario*, paucula quædam præmitti.

De *Arthritis Vaga*, quatenus *Rheumatismum* referat, & illius appellatione se occultet, alius loci est differere: de *Rheumatismo*, quam ille *Arthritis* imitetur, ac quasi vices rependat, hujus & temporis, & loci est.

II. *Rheumatismus* ille, cui quidem uni quantum Ego rescivi, succrescit hæc *Symptomata*, (nam a *Scorbutico* minime unquam, nedum alio quovis *Rheumatismo*, propagatam memini) semper incipit a frigore, causa hujus affectionis evidenti fidelissima: ex qua celerrime sanguini, præcipue vero ab exercitationibus incalcenti, *Lentor* inducitur; qui, in musculis & membranis, infarcens capillaria, circuituri fluminis meatus obstruit; dolores, & interdum tumores asfert. Quæ inest sanguini, pituitæ, sive feri crassioris massa, horæ paucarum aliquando *Sexagesimarum* spatio, momento temporis, fere tota *lentescit*, & (uti cera per syringem injecta,) ductus implens exiguos, impedimenta, moras, oppilationes creat, pro ipsius crassitie plus minusve pertinaces.

III. Qui fiat tanta, tamque subita *Γαργαλις*, (haud explicatu facile problema) professores Medicos, optima quidem ingenia fatigavit. Sunt, qui lac acescens, si admoveatur igni coagulum cito contrahere perpendentes, & lac immisum venis statim coagulari confirmantes, binis hisce positis,

sibi videntur rei summam explicasse, dubique vim in totum diluisse: at quo jure, qua *ἐπίστασις*, (præfato virorum de Republica bene meritorum honore,) paucis expendam.

Primum, experimentis *Boyllianis* manifestum constat, acidi præter salis marini, vel ejus æmuli, quantitatem perexiguam, atque huic coagulationi producendæ minime sufficientem, nihil natura sanguini inesse; neque de horum experimentorum fide, per *Vicusseniana*, dicam? an *Chiracciana*? quicquam (1) derogatur.

De altero argumenti membro, etsi, apud magni nominis (2) anatomicum, tanquam experientia proditum, lac immisum venis illico densari, perscribatur; tamen, quod vacillet hac in parte, non tam auctoris, quam (ex ea, qua versamur, rerum caligine) eventui fides & testimonium, ideoque dubium æstimeretur, habeo dicendum. Cum enim, varias olim, *Oxonii*, injectiones, & quidem hanc ipsam lactis vaccini, quantitate satis locupleti, exercendo, sanguinem inde ne vel minimum coagulari, sive concrefcere, tamen hac illac agitatum, accurateque spectatum, deprehenderim; virum clarissimum, professorem eximium, aut animali minus sano, aut acescenti lacte, fuisse usum, haud injuria suspicatus sum.

IV. Deinde, non solum ab acido fieri in fero animali coagula, testatur id (3) *Boylli*, per *Oleum Tarr. per Deliquium* illi adjunctum, perque *Spiritum vini* probe rectificatum, coagulari serum asserentis. Quinetiam, ut symbolum meum conferam, *Rheumatismo* laborantis serum, per calorem, & exinde quam citissimum frigus, (utrumque scilicet impensum,) in gelatinam admodum lentam, viscidam, firmam conciliari & cogi nobis experimento patuit. Hoc enim brevi evenit, quando hujusce rei tentandæ gratia, istiusmodi serum, cochleari contentum, & subjecta lucerna calefactum, aqua frigidissima ad cochlearis marginem immergeretur.

Ab acri vero sale alcalico, quam ab acido, *Lentorem* fieri, longe probabilius: sagacissimi enim (4) *Baynardi*, Collegæ Nobilissimi, experimento liquet, *Rheumaticorum* uri-

(1) Hac de re, qui plura voluerit, adeat clarissimi *Piscarii* Dissertationem Med. ultimam: ut & almi Coll. *Romanorum* *Archiatorum* ad Cl. *Vaussenium* Responsum.

(2) Vid. Cl. *Lowerum* de Corde, Cap. 2.

(3) vide *Humani Sanguinis Historiam*, Partem 3.

(4) *Acta Phil. Lond.* N. 215.

urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, partem quasi trigesimam, nec quidem supra, destillando elici. Unde conicitur, salem istum acrem, pungentem, asperum, acutum, in sanguine retentum, pituita (foran adjuvante oleo, veluti in sapæ compositione,) irretiri involvique & ad viscidum in *Rheumatismo* faciendum, ad dolores, & tumores inferendos, opere quidem maximo contribuere.

At, quod rem absolvere videatur, *Rheumatici* cujusdam ægri vena pertusa, sero *Syrupum Violaceum* instillavi; unde mixturæ, brevi temporis spatio, *Color viridis*: Et ejusmodi sero, *Sublimati solutione*, parce quidem & tantillula quantitate addita, quam citissime ad fundum se demisit concretum *Albissimum*.

Ipsi porro pelliculæ, sanguini *Rheumatico* innatanti (ut videlicet, in ea salis quid dominetur, inquirerem) *Solutionis* dictæ guttis aliquot affusus, ejus superficiem ex hinc *Albere*, cum plerisque aliis astantibus hujus experimenti testibus, notabam.

Siqua igitur hisce probationibus fides, vel a calore frigoreque vehementibus & continuis, vel a sale alcalico intus retento, vel utroque lentore hunc oriri, verisimile est.

V. Quoties e viscido redemptus, prisca gaudet *Aspiræ* & more naturali circumagitur sanguis, evanescit tumor, quiescit dolor, convalescit æger: contra vero, affectu male tractato, id est perseverante, viscido, nondum visco correctoque, nonnunquam oritur *Arthritis* ista, quam dico, *Symptomatica*. Nempe, cum abundat τὸ Πύκνον, qua visciditate, qua acredine, vehementiores, pariter ut *Arthritis* ipsa, profere distensiones, dolores, tumores, aliosque non paucos effectus utrique huic vitio communes.

Frigidam vero *Arthritidem* æmulari gestit hic affectus, illiusque partes sustentare: Nam, neque dolor aque acerbus; nec inflammatio perinde contumax; neque declinatio similiter propera, ac in illa *Arthritide*, quam appellamus *Calidam*. Nihilominus fatendum est, quod, si *Rheumatismo Scorbutico*, aut *Venereo*, *Arthritis* ista superveniat, (posse vero supervenire, nullam recipit controversiam) ob asperum aliquid, ac stimulant, interfusus, & dolorem magis acutum, & inflammationem magis intensam esse.

VI. Autumno maxime intenduntur hi dolores; eo videlicet tempore, quod fluxioni-

bus faver, (quanquam & alias anni tempestates iis prius immunes esse, nequaquam affirmandum,) & diu, nonnunquam ad totum hyemale spatium, ubi morbus inveteravit, excurrunt; sæpe quidem intercisi, at a levissimo frigore recidivi; quod diuturno familiare *Rheumatismo*. Turgent articuli. Fractura extante, & in tumorem albidum, & tanquam Οἱ γυναικῶν, cutim elevante. Unde digitorum motus semper impeditus, interdum abolitus: Huc illuc digiti torquentur: manus nonnunquam retroagitur; sicque cubitus, ut parsejus interior jam emineat.

Cum *Arthritidis* personam qualemcunque capessivit *Rheumatismus*, raro quidem exiit; ad vitæ usque terminum plerumque perseverans. Si modo sanum id, quod intus, & incolume totum est, extremam aliquando senectutem, sed digitis, sed artubus multatus, æger adipiscitur; *Podagram* interea, tanquam humani generis pestem & perniciem, tanquam malum, vel ipso teste experto, acerbissimum, (qua tamen genuina fortasse nunquam est affectus) increpans acerrime.

VII. Quamvis enim nonnulla *Frigide Arthritidos* Symptomata gloriatur hic affectus: tamen, si rem attentius perspexerimus, cum ea parum convenit. Cutis sanguini (sic, ut in *Rheumatismo* solet esse) densa, & quam in *Arthritide* multo densior, post quietem supernatans, hoc abunde arguit: confirmat id, quod gelatina, quamdiucunque commissuris immorata est, nunquam in tofos indurefcit, quodque commissuris minime contenta, cum internodiis eas pari fere proportionem premit; tum vero omnium maxime, quod nullo cardiacorum, utut *Actu* vel *Potentia* calidorum, abusu, vel quavis alia de causa (contra quam *Arthritis* omnis, sive *Primigenia*, sive *Symptomatica*, sive *Calida*; sive *Frigida*) in paroxysmum, qualis est *Arthritidis*, vel levissimum, evehatur unquam *Species* hæc *Adulterina*.

VIII. Ad hæc *Rheumatismi* reliquias, duras equidem & pertinaces, prævertendas valet ea, quæ morbi istius curarionem habet, quæ sanguinem attenuat, medicina, ab auctoribus, illam ex instituto tradentibus, haurienda. Cui tamen unum, ut mea memoria est, ab iis prætermisum, adjiciam; nempe, quod, ad dolores *Rheumatismi* minuendos, ad sanguinem alterandum, & τὸ Γλισχρότητα devincendam, conducit,

ducit, supra quam quis expectaret, vomitio; sed vehemens, sed iterata. Quod unde efficitur, sanguinem exagitando, concretiones inhibendo, motumque illi novum expeditioremque tum intestinum, tum periodicum, imprimendo; an quovis alio modo fiat, in medio relinquam.

Hoc autem gratis dictum, ne quis existimet, fidenter affirmare possum, sola *Infusione Croci Metallorum* ad quatuor vices, quantitate bene magna, tot diebus continuis, ab athletico quodam & multarum virium ægro, contra *Rheumatismum* hausta, unde cum *ῥέμπη* toties evomit; *Rheumatismum* gravem, & permolestum, me novisse penitus & radicitus extirpari. Cujus quidem historię mentionem non ideo feci, quod tristem & severam, ne dicam periculosa, hanc curationem, vix centesimo cuique tolerabilem, in communem indistincte usum, inducere conarer, aut in animo haberem; (quæ enim hæc temeritas!) sed tantum, ut emeticum ab hoc affectu per se considerato, non ex omni parte respui, seu vetari, submonerem, imo quādamtenus indicari; & quoties vires, & quæ sunt ægri cætera consentiunt, posse ministrari.

IX. Ad easdem reliquias præsentis extirpandas, requirit indicatio, quæ quidem unice attendenda, ut tollatur iste lentor, ut crassa, pertinax, & viscida materia, quæ juncturas obstruit, & in tumores cum earum effert, causa videlicet conjuncta, corrigatur emendeturque, cujus gratia, e Regno Vegetabili depromantur *Anziscorbutica* quæ dicuntur, sale volatili referta, qualia sunt *Radices Armoracæ*, *Cerpæ*, *Ari*, *Allii* &c. *Folia Cochleariæ*, *Nasturtii Hortensis* *Indicique* &c. *Semina Sinapios*, *Cochleariæ* &c. Quæ quidem omnia, recte & artificiose comparata, debitoque more data, viscidum incidant, redundent resolvant, perque renes demum expellant illius quicquid alienum est, & inidoneum.

Huc, eodem fere nomine, respiciunt *Spiritus C. C. Urinæ Fuliginis*, *Salis Armoniaci*, & id genus alii Volatiles, sive simplices, sive oleosi.

Quid per *Oleum Terebinthinæ*, medicamentum mire penetrans, & deobstruens, pulmonis illud solvit pituitam, in catarrhis pertinacibus fæsturam ejus allevat: in tingendo marmore, colorum illud optimum, laudatissimumque vehiculum est: Quid, inquam, in lentore *Rheumaticorum* reducen-

do per illud præstetur, quando hoc hortatur analogia, fiat periculum. Profit autem tum interne sumptum, tum externe applicatum, e. g.

℥. Ol. Tereb. gutt. iv. ad vi. vel si Febris Suspicio nulla vetuerit, pluries. Conf. Anthus 3j. Syr. de Rubo Ideo q. s. f. Bolus, hora somni deglutendus, cum Julapii Haustu.

℥. Aq. sol. Ari, Angelicæ, Ulmaria aa 3v. sp. Croci 3ij. Sambuci q. s. cum Marg. pti. & sacch. f. Julapium.

Balsamo Sulf. Terebinthinato. artus motu privati, cum frictione, bis die, superillinantur; vel etiam Vernice Terebinthinata.

Camphoræ sapor acris & pungens, odor aromaticus penetrantissimus, ignis comprehendi facilitas eximia, sed præ cæteris quibuscunque in auras abitio celerrima, partes ejus subtilissimas tenuissimasque ostendunt. Ideoque nunquid ægrotantibus hisce nostris, ad incidendum & tenuandum in eorum capillariis lentum illud viscidumque, & quantum ab illius auxilio sperari possit adjumenti, merito exquiratur. Dari possunt ejus Grana v. vel vii. Oleo Amygd. dulc. soluta, cum Conf. flor. Borag. 3j. Syr. Cort. Citreor. q. s. (ut f. Bolus) cum Jul. Haustu, hora somni, quod quidem tempus exhibendi præfero, quoniam per noctem insequentem (noctu vero, quam interdiu, in his ægrotis, ad superficiem corporis sanguinem magis offerri verisimile est) una cum sanguine ad το γαστήρ appulsum majori cum impetu, favente flumine rapidiori, in id arietet. Quinetiam Epithemata Camphorata possunt externe partibus affectis admove-ri.

X. Sin hæc e Regno Vegetabili frustra esse reperiantur, & operi imparia, e Regno Minerali conducatur optime Mercurius; illo nempe pacto sanguini commistus, & obstructionibus advectus, ut incidendo dividendoque viscidum illud attenuet, solvat, colliquet. Quare ptyalismum hoc in casu leve institui, diuque proferri, (modo per ægri vires, & alias res licuerit) e re futurum arbitror. Nec non ad eum finem Mercurium partibus iidem lesis, per unguenta, per emplastra, posse cum fructu superponi.

At si ista non sentiat, quæ juncturis inest, gelatina, Subu frequenti validissimoque, per fistulam ad eam rem fabricatam & orificio prius facto immissam, evocetur. Hoc in Arthritide vera laborantibus fieri, vulgare jam & pervagatum est: multo vero tutius

tutius in rheumaticis posse credibile est. Hæc autem operatio non nisi recens affectis, & dum liquida est materia, promittit sanitatem. Articulus gelatina per suctionem inanimatus, *Vino Ustilato* sapius fovere, & *Emplastro* quodam (*Stomachico* puta *Magistrali*) a gangræna defendere tutarique oportebit.

Istam medendi legem, secundum morbi indolem & genium delineatam, ut in ejus initio probabilem, adduco; sed nullo quidem experimento (fatebor enim) confirmatam. De morbi historia plus satis constat; & etiam nunc in vivis sunt, qui hujus veritati fidem faciunt, & assipulantur; de medicinæ vero hujus usu, & victoria, nihil habeo, quod dicam. In affectu inveterato, cum viscidum id induruit, quod tenuetur, minus verisimile est.

Omittendū vero non est, quod, ὁ Γλισχροτήτα rheumaticorum sanguini accedentem putrefactione sola tenuari dissolvique posse opinatus, Medicus perillustis, clarissimus (1) *Floyerus*, (cujus hoc est argumentum, quod ovorum albumina, quæ quidem gelatinam hanc nostram cumprimis referunt, putrefactione liquehunt) ad eam, his in corporibus non minus quam in tussi laborantibus, promovendam, emollientia, maturantia, colliquantia,) qualia sunt e *Rad. Glycyrrhizæ*, *Sarsæ*, *Ireos*, &c. ex *Hordeo*, *Passulis*, & ejusmodi aliis comparata) non sine multa probabilitate præcepit. Utrum hæc, quæ in liquando solvendoque pulmonis phlegmate, tot ab annis, tantarum virium & impensis esse merito prædicantur, in artuum illo rheumaticorum valeant, operæ pretium esset experiri.

De *Symptomatica* falso, & ex vulgi tantum more, sic appellata, quæ habebam, effunduntur: Itaque iis, quæ ad *Veras Symptomaticas* aditum præcludere viderentur, de via dimotis expeditisque *veras* jam attento.

C A P U T III.

De Arthritide ex Chlorosi, Alba, & ex Mensium Suppressione.

ART. I. **E**X *Symptomaticis* ita *acutius* appellatis, illæ primum expromendæ veniunt, quæ ortu, quod dicitur, *Æquivoco* generantur: quarum e numero principarum postulat *Arthritis* a *Chlorosi* nata. Quod autem uspiam ita nascatur, quod adolescentulæ, virgineo dudum morbo languentes, necdum illo prorsus liberatæ restitutæque doleant *Arthritide*, a nonnullis idem habeatur, ac si *Lucam Bovem* (ut in proverbio est) *Locusta* pariat; id est, Ἀδωάτωρ εἶ. Sic a morbo, hisce puellulis parum congruenti, immunes eas reddere, incolumes præstare, videatur, tum ætas præmatura, tum affectio dissimilis. Ita vero sentientibus, ut ne calculum adjiciam, indubitatæ fidei cogit experientia; nec istam ætatem, nec hanc affectionem, illas ab *Arthritide* penitus tueri comprobans.

II. Ut autem dicam, qui fieri potest, quod, ex morbo sic dispari, morbus sic dispar oriatur, advertendum est: quod *Arthritis* eas tantum modo pallidas (quantum mihi observare licuit) aggreditur, quæ miasmate hæreditario supra modum vitiatæ & imbutæ, ad istud mali naturæ inclinatione pervicaci, momento maximo, pronæ sunt, & diriguntur.

De cujus rei veritate, satis, ut opinor, ex eo liquet, tum quod illa, quæ ad *Arthritidem* inducendam more agunt usitate procacitæ, (qualia sunt crapula, satietas, Venus immoderata, lues venerea &c.) virginibus hisce imputari minime posse cogitandum est: tum etiam, quod *Arthritice* hujus classis stirpe sunt cum primis *Arthritica*.

III. Exinde patet, quod *Arthritides* ex *Chlorosi* procreatio, non eo sensu capienda, quasi hanc quæ fecit, illam etiam faceret, eadem Numero, vel Specie, materia; sed nova ratione, agens, nova perpetrans *causam*; (quod tamen in plerisque *Symptomaticis* usu venire palam est); *Nostra* quidem alia res est. *Chlorosi*, sive sanguis-

(1) Vide *Humorum Animalium statum præter Naturam*. Cap. xi.

guinis Μελαυσι, abituræ supervenit, & simul cum vultu colorato, cum robore, cum mensibus, ne multa, cum sanguinis Μετωρισμῳ horum societati se immiscens, ex accidenti profilit *Arthritis*, peculiarem habens materiam, causam propriam continentem, a *Chlorosis* illa, multum abluentem.

IV. *Symptomatica* hæc *Arthritidis* interdum *Vaga* est; Artus hinc inde subsultando peragrans; dolore pungentj, & rodente gravans; aliquando *Rheumatismi* nomine delitescit: alias, articulis inhæret, & *afixa* est.

Vaga *Diagnosis* incerta, & tenebricosa; uti *Arthritidis Vagæ primigeniæ*. Lucem tamen afferat, de parentum morbis, numnam illi pedibus dolere: & an agra *Rheumatismi* causis evidentibus, præsertim frigore, paulo ante subiecta fuit, quæstio. *Fixa* vero, tenebritudine machinarum, dolore, rubore, primum nulli, deinde successu temporis laudatenti, & rosæeo, se ostendit.

V. Hæc cum morbi ratio sit, in eo ponenda indicatio, singularis, & præcipua videntur; ut, a peccante materia; jam nunc *Arthritidem* moliente, per muliebria, primo quoque tempore, sanguis, expurgetur; & sic *Chlorosi*, sic *Arthritidi*, simul semelque occurratur. Omnium maxime conducet, (dummo dores annuerit familiaris, & inire nuptias permiserit) *ἐν γαστρὶ ἔχειν*. Quum, partu naturali, quo in uterum, tanquam in sentinam, universi corporis inquinamenta secluduntur ad inanienda, & vacuanda foeminarum corpora, nihil efficacius valentiusve, certe hippiatri illud notissimum, & multiplici comprobatum usu: nec, cur hominibus denegetur hoc consilii, video. Procul dubio laborantes isti medicinarum generi minime refragabuntur; quin medico, naturæ tam ministro, facile obtemperabunt. Medicinæ vires, & mirificos effectus confirmabunt, suarum gratia, matronæ.

VI. Sin nulla fuerit nuptiarum opportunitas, ad menses (qui hac in parte secundas vendicant) omnia auxilio, omni ope, & industria promovendos adnitendum est; ea spe, & fiducia fretis, *Arthritidos* materiam, & causam continentem, per eos facile commodeque posse proturbari. Atque hunc in finem *Martiatæ*, sed, (ut illorum vires, & potestates, ad uterum recta collineentur,) aptissime cum *Emmenagogis* copulata, vel artificiose interposita, fru-

Sydenhami Opera Med. Tom. II.

ctum ingentem, messem amplissimam, pollicentur.

Si menses omnino nulli sunt, ex iis concreta, & composita, ad tempus, diuturna & continens, cum exercitatione & purgatione debitis, adhibeantur. Si fluunt, sed diminute, illi, interlunii tempore, bis die, *Martem* usurpari proderit; sed illo, quamprimum menses insisterint, neglecto, ea dari, quæ hos ciendo naturæ rem (quæ nihil efficacius, conducibiliusve) suo ipsius more, promovebunt. *Marti* nullum aptius vehiculum, quam *Aqua Martiatæ*, per urinam exeuntes; nec uno tantum nomine, *Pallidis* his *Arthriticis* conveniunt, coctionem integrant; sanguinem exaltant; astuque exundanti, virus *Arthriticum* abluunt abripiuntque; tum *Arthritidi* tum *Chlorosi*, simul adversante.

Horum autem usui, & præmitti catharsin expediet, & septimo quoque die circiter interponi, ne ab aqua in corpore alicubi restante, aut ab alvi tarditate, aut a sanguine roborato, nimis evecto, exaltatoque (quod sæpiissime solet accidere) sit periculum. Cujus quidem modi catharticos intercalationem, ab antiquis summo consilio præceptam, & diligenter institutam, non sine agrorum incommodo, & discrimine, dudum ab aliquibus omitti video.

Quæ vero reliqua generalem morbi hujus curationem respiciunt, & materiam *κατὰ τὰς*, per renes expellentia, sive ortum ejus & incrementum inhibentia complectuntur, ex *Arthritidis Primigeniæ* prophylaxi non inutiliter ducantur. Atque hæc de *Arthritide*, quam, quod *Albarum* esse reperiatur, appellamus *albam*.

VII. Alia est *Arthritis Symptomatica*, priori propter affinitatem adjungenda, quæ adultas, (ut jam dicta juniores,) quæ steriles affligit, & catameniis, aut omnino nullis, aut aliquanto parcioribus, donatas. Hac affectæ crassiori plerumque habitu sunt, viragines, sedentariæ, voce gravi, neque semper imberbes; Morbus, *Arthritidi Frigidæ* appropinquans, negligenter, & languide Παθησέτω; Juncturas denique recrementis explet, motu privat.

Occlusa nempe, quam charam, quam utilem, quam amicam habuit naturam, per catamenia sanguinem expurgandi, via, materiæ vis in eo constructa & coacervata est: quæ, graves & periculosos inferendo morbos, œconomix crebromiscet, turbat, evertit omnia. Sin materiam natura vincit,

B

porta

porta hac vel illa , eam expellit , nec raro in articulos trudit , Dardala rerum conservatrix .

VIII. Ista vero , non nisi corporibus *Arthritidi* perferendæ (malitia vel acquisita , vel hæreditaria ,) præparatis , obtingunt ; & illa potissimum ætate , quæ provecior , & ingravescent , per methodos succedaneas naturæ defectus ambit quodammodo refarcire .

Et quoties a laudabili desideratissimoque *κατὰ φύσιν* desciscens , natura *Arthritidem* molita est , raro utique gressus retro agit raro catamenia renovat ; quin *Arthritidi* imposterum insistent , illius beneficio vitam quam potest longissime , quamque beatissime producit .

IX. Cum mali hujus partu allevandi spes omnis frustrata , & a catameniiis obscura est , & tenuis ; eam medendi legem optime posse fructuosissimeque servari judico ; quæ , per *Cathartica* materiam peccantem , in sanguine congestam , & res novas affectantem ; expellit . Ut autem illa ægrarum conditioni quadantenus accommodentur ; primum eligantur ea , quæ sanguinem fundendo , & a sese illius partes separando , mensium movendorum expectatione Medicum accedant ; (hoc autem modica dosi , potius quam magna , fieri certissimum est .) Tum , ad eundem finem , *Emmenagogis* implicentur , & fiant *Purgationes* , quæ dicuntur *Hysterice* . Postremo , omni tantummodo mense alterno , (nec quidem amplius , ne purgatione nimis libera & frequenti , materia alio ablegata , mensium spes interrumpatur) eaque lunæ quadrante , qua præcipue sanguis *ζυμιοῦται* , & se attollere cœpit , vere & autumno , iterum sæpiusque repetantur : nec , quæ earum vires infringendo rerundant , aut motum sanguinis intestinum sufflamment , admittantur , hora somni , post purgationem , paregorica , e.g.

℞. Calom. quinquies sub. gr. xv. specier. Conf. de Hiac. Conf. Ros. rubr. aa. ʒi. Syr. de symph. q̄s. f. Bolus , sera nocte deglutiendus .

℞. Pil. de succino ʒi. , Alas Rosar. ʒʒ. Asse satid. Pul. Castor. scammon. aa. gr. v. Bals. Per. q̄s. f. Pil.

Si isto ritu purgatio , in hujusmodi *Arthriticis* celebretur , de catameniiis postliminio restituendis spes affulgebit aliqua , (modo ætas , & naturæ ordo consentiat) aut , si votis & expectationi non respondeant ista , capiri tamen , & partibus internis , per

cartharsin certissime cavebitur , ne a pleuritide lædantur ; quod quidem minime spernendum , atque adeo studiose laborandum .

X. Si mensium spes fefellit omnis , neque restat ulla illius anchoræ fiducia : majori quantitate catharticum (*Aloeticum* autem esto ; vel *Decoctum amarum purgans*) illoque mensis tempore , quod solebat esse eruptionis , *Διαίτης* adhibendum : Tum , ano materiam quod emittat , itaque mensium vices suppleat ; tum etiam *Arthritidis* (quæ hominibus hisce auro contra , & cum vita æque , pretiosa ,) spei quod indulgeat . Quæ quidem regula , tam illis commoda , tantique (si apposite observetur ,) est momenti , ut nihil supra .

Hisce porro ex usu erit fonticulum aperire ; aut , ne vetus exsiccet , inspicere : Er , si quod per fluorem album , vel aliud quodvis , *παρὰ λόγον* , erat excrementum ; ut permaneat , perduretque vel etiam in ægrarum commodum augeatur , eniti .

XI. Corollarii vice , memoria tenendum , in isto pari *Symptomaticarum* impugnando (*Dii Dexque !*) quantum intersit , alteræ purgationem non nisi levem , & raram eligit ; altera , tum fortiolem , tum frequentiolem ; altera eam , non nisi alterantibus , (id est , principali auxilio) viam præparantem ; altera , tanquam ipsum principale ; altera *Chalybem* desiderat , & in eo sere spem ponit omnem ; altera eundem metuit , fugit , ut fatalem abhorret . Brevi dicam , altera sanguinem augeri *καὶ μεταρξισθαι* ; altera minui , & deduci , postulat . Adeo nempe contraria *Symptomaticis* hisce therapia ; imo , ut fieri potest , in eodem corpore .

Historia Arthritidis Vagæ, Fixæ, ex Cholorosi, fugatæ.

VETERIS *Arthritici* Filia , duodeviginti annorum , ventriculi dolore quasi colico , cum fastidio , nausea , vultu pallido , respiratione molesta , mensium defectu . aliisque symptomatibus *Cholorosi* ostendentibus , afflicta est . Post annum , materia quadam artuum commissuras , earum autem intervalla magis , occupavit ; diu , misereque cruciavit . Teneritudinem , torporem inibi , doloremque peperit , acerbum ; aliud ex alio . Cessavit interea ventriculi dolor : perduravit *Αρσενική, Δυσουρία* .

Dum ita se res habet , primo emeticum , tum

rum catharticum, meo consilio, datum est; & deinceps iteratum. Ob atroces, & fere continuos artuum dolores, sanguis detrahitur. Post quas evacuationes, ad appetitum acuendum, ad sanguinem evehendum, & menses ciendos, (quem mihi scopum hac in re palmarium proposui,) Martis Nutriti, Ἀῖς. cum vehiculo convenienti, bis die deglutiit. Et omisi mane aquarum ferratarum, *Totonesii* in suburbiiis, ℥ij. exhaustis; cum sp. vol. Oleos: (ad Διύπνισιν, & calorem augendum,) guttis circiter triginta. Hac methodo menses per plurimos, interposito subinde lenienti, observata; dolor iste rheumaticus, (sic habebatur,) & teneritudo primum mitigantur; demum in totum fere devincuntur. Viget appetitus & digestio. Aliqua sunt catamenia. Facies colorata fit & vivida. Scintillant oculi. Salus ex omni parte perfectior & integrior; nisi quod tumoribus albis, mollibus, teneris: & (ab iis) Δυσκινησία juncturae artuum infestentur. Quae quidem accidentia tempestate pluvia plus solito saevire.

A Rheumatismi (sic perperam dicti) exitu, triennio vix elapso, tumores indurescunt, & nodi fiunt tofacei, tum numero plures, tum magnitudine conspicua; sed & diversa, & longe dissimili: alii namque granum triticeum; alii pisum; alii nucem æquant; avellanam, digitorum articulos, eorumque regiones tumefaciunt; in articulis, permanentes; sed in eorum interstitiis, evanidi, inconstantes. Erat dextri summitatis cubiti ceteris major; nuci juglandi par; initio mollis; sensim exinde lapidescens. Juxta cubitum sinistrum, tumor albus eo tempore digito cedens, in tofum abiturus. Adhuc pruriunt artus, & quidem molestissime; & emittunt pustulas. Per biennium ista Podagre tulit symptomata, sed lenis, sed benignæ; neque toto hoc tempore, vel semel unquam, in paroxysmum evecta. Ab ejus ortu, ventriculo, & iis quæ sunt intus, bene; ob illam artus agredientem, procul dubio melius. Menses, per universum hoc biennium, mediocres.

Anno incipiente 1700. præter ista, quæ memoravi, Arthritidos symptomata, de ventriculi (præsertim a pastu) dolore, inflatione; aliisque Δυσπεψίας indicibus, porro quiritatur. Ut therapiam, tum ad ista præsentem, tum prophylacticam, instituere, Auctor eram (ἀντὶ καὶ τοῦ sæpius præmissa catharsi, & primis viis uri par erat exone-

ratis,) ut, per quatuor menses, omni mane, sextam inter & octavam, aquarum ferrat. ℥ij. (quarum ℥℥. solis Thæ alteranda) ebibat. Decima sequenti haustum infusi.

℥. Summit. Trifol. palustris. p. ii. Aq. Pluvie bullientis ℥℥. Infunde ad Amari- tatem sufficientem: Colatura Coch. v. adde sp. Junip. ℥i. Tinct. Aurant. gutt. x. f. Haustus.

Quarta pomerid. Bolus & Conf. Trifol. palustr. Flavesc. Aurant. aa. ℥i. Millep. pp. ℥℥. Chal. Nutriti gr. v. Syr. Caryop. q̄s. cum leni Cathartico subinde repetendo.

Interdicta, per potum hunc Decursum, Cavevisia; Potui dabatur Ordinatio Decoctum. ℥. Rad. China, Sarsæ aa ℥i. coq. in Aq. font. Ferratæ ℥iv. ad ij. Colatura adde Spiritus Juniperi, cum sacchari Crystallini, q̄s. f. Decoctum.

Vescebatur Διήτοις, & ὕδατι, & Sanguinem temperantibus, summitatibus scil. Bedcabunge, Nasturtii Aquatici, & Hortensis. Urtice, Rapa, Batata, Piso, Pastinaca una cum Agnina, Pullina, Vitulina, & istiusmodi aliis.

Harum rerum observantia diligenti, sedulaque corpus ægre πωροῖσται. Nodorum partim minuuntur, partim evanescent. Pruritus cessat: tolluntur pustulæ: augetur appetitus: coctio perficitur: sanguis, expulso per renes utrumque inimico, fermentationem, & Πυκνότησιν acquirit naturalem; quam monstravit Ὀξεία, & Σαπρά. Quod auspiciatissimum judicavi, recte postea fluxere catamenia; & quo rectius, eo certius fugatur, cum satellitio suo, Arthritidis. Ut, neque pustulæ, neque pruritus; neque Tumor; neque dolor; jam, per annos per plures, ex eo tempore, reverterentur. Quod quidem indubitandum, optimæque fidei Argumentum; Per Emmenagoga &c. posse hujusmodi Arthritidem, etiam si Nodosam, & Hereditariam, auferri depellique.

CAPUT IV.

De Arthritide Hydropi superveniente.

ART. I. **A**D alteram illam e *Symptomaticis minus propriis*, ex recensione principio dicta properamus; nempe ad *Hydropis iniquitatem*: eoque libentius, quia crebro hoc occurrit, & uti spero, in hujusce populi commodum & tutelam explicetur.

Quod *Arthritidi* succrescat *Hydrops*, est facile perceptu, & ordini, quem in hominibus e medio tollendis, servare solet natura, maxime consentaneum est: At, e contrario, quod *Hydropi Arthritis*, etiam si aliquando accidit, tamen, naturæ methodo quasi inversa factum, inter ejus *Δυσκρίσια* non inique censeatur.

II. Ut de re tam utili, tam jucunda, tam explicatu digna, pro ejus dignitate, quantum potero, dicam luculenter; advertere oportebit, quod ab hepate, aut viscerum aliquo nobiliori, sive scirro, sive alia quavis indomita labe, vitiato, quicumque sit *Hydropicus*, raros, *Ποδάγρις*, & quo nobiliori, eo rarius. Hoc enim in casu, sic in pejus ire solent omnia; sic corrui; ut, si qua olim emicuit *Arthritis*, a morbo graviore, & magis imperioso, (totas ægri vires totum hominem exercente & fatigante, (ei plerunque officatur, tanquam majoris morbi auctoritate victæ, & paroxysmum raro unquam recte facere contingat: Verum in corpore taliter affecto corruptoque rarissime omnium exoritur, & nascitur *Arthritis*.

Sin ea fuerit *Hydropis* ratio, quod, salvis visceribus, aut parum læsis, ab una partium sanguinis *ἀσθησις*, & malo ejus habitu, (ad viscera contaminanda, quantumvis apto, & proclivi) ducat originem; ex eo, præsertim medicato, exoriri posse *Arthritidem*, iterum & sæpius observavi.

III. In eo sanando, sive *Anafæsa*, sive *Ascites* sit, cum aquæ quod abundat jam prius emissum est, amaris & chalybeat, tum ad corrigendum sanguinem eumque roborandum, tum mehercule in primis ad eximendam *Ἀσθησιὰν* *Hydropi* familiarem, ex usu medico, insistimus. Quæ quidem medicamenta in exaltando sanguine tanti sunt momenti, tantarum virium; ut, si

æger nec ætate neque morbis fuerit debilitatus, idemque seminium habeat in sanguine *Arthriticum*, exulante eo & in articula-menta misso, ex *Hydrope* in *Arthritidem* per sæpe recta progrediatur.

Imo quidem ita fieri potest, & aliquoties evenisse novi, ut, ubi consistent vires, & *Arthriticum* miasma in sanguine copiosum, efficax, & jam ad *αὐχλὸν* evectum, insit, absolutis quæ ad *Hydropa* exsiccandum opus erant, evacuationibus, & salvis naturæ viribus, sine dictorum, vel istiusmodi alterantium usurpatione, *Ποδάγρα* quidam afficiantur.

IV. Utcunque fuerit, natura (sive per se, sive medicamentis adjuncta,) novos init operandi modos, novam ambitionem. Spiritus, qui in œconomia animali tuenda sustinendaque indefinenter occupati, omnem absolunt operam, totum opus perficiunt, mala vitæ ratione dudum oppressi, & sero fere submersi. *Calybis*, cæteraque *Alterantium* vi suo tempore (hoc est, remotis impedimentis) exhibita, tandem incitati emergunt, denique *Αἰμάτωσις* promovent genuinam; appetitum, & coctionem emendant; materiam e sanguine pellunt alienam; itaque eam instaurant, depurgant, & longe reddunt vegetiorem.

V. Dum in his versantur, si seminium intus latuerit *Arthriticum*, (diu vero, & silentio latuisse, sæpenumero comperimus, nec in paroxysmum evehi,) ad illud amolendum, expellendumque iisdem hi urgentur medicamentis. Hinc in sanguine primum discordia; tum, ea paulatim glisciente, (ut in veneno, si quod demissum fuerit, eliminando,) orgasmus, supra naturæ modum, (qui lenis usque & placidus esse solet) supra tenorem ordinarium, vehemens, & cum impetu. Ad exturbandum inimicum, summis undique viribus & copiis, omni industria, contenditur. Hic labor, hoc opus. Post aliquot dierum luctam (est ubi citius) iste fugatus, & loco cedens, qua data porta viam capeffit. Articuum aliquem externum petit: dolorem, aliaque profert, *Arthritici* quæ sunt paroxysmi signa *Παθογενεῖς*.

VI. Bono quidem omine, in conspectum venit hujusmodi *Arthritis*. Est, quod ovans exclames, *Arthritice!*

Χαίρεις, Μακάρων πολυπραγμάτων.

Morbum enim vix ausim appellare. Descendens cælo, te salutat, *Divæ Arthritis*: (Feret hæc *Latinitas*!) Tum Annos elargitur, tum valetudinem, si non integram, & omnibus numeris beatam, certe desiderabilem: & medentium, & dolentium encomiis celebratam: divinam hospitem, fac, grate accipias; fac, colas.

Ita natura, priori sanguis δυσκράσια ferme obruta, *Hydropis* edit symptomata; at brachia secundo agitans; & sese colligens, aliam rerum faciem, aliam inducit symptomatum catervam, atque adeo *Arthritidem*.

VII. Ex prædictis sequitur, quam nulla hic loci necessaria, quæ adversus hanc *Arthritidem* (speciose, scilicet!) cudatur, therapia. Quorsum enim ad tollendum morbum medicina, cum ipse morbus sanat; utrique pharmacie armamentario præferendus; *Chimicorum*, & *Galenicorum*, copiis, universæ gentis medicinae consilio major, viribus potentior.

Si recte rem putemus, in eo potius sudandum est, ut *Arthritis* ista non tam obtundi possit, quam ordinari & augeri; utque æger, morbo primario feliciter & prospere commutato, nutriat *Arthritidem*, foveat, tueatur, servet.

VIII. In hunc finem e Regno Vegetabili seligantur *Amara*, & *Antiscorbutica* acriora, *Radices* scil. *Gentiane*, *Zedoaria*, *Serpentario* *Virg.* *Contrayerva*, *Ari*, *Armoracia* &c. *Summitates* *Agrimoniae*, *Centaurei* min. *Trifolii fibrini*, *Cardui* ben. *Absynthii* utriusque *Salviae tenuifol.* *Verbena*, *Chamedryos*, *Scordii*, *Marrubii albi*, *Matricariae*, *Cochleariae* &c. *Flores* *Salviae*, *Chamamelis*, &c. *Semina* *Cochleariae*, *Cardui*, *Sinapios* &c. E Regno Minerali, (quod instar omnium erit,) *Ferri Præparata*; præcipue *Mars cum Sulphure præp.* *Martis*, *Alcohol.* sive *Pulvis subtilissimus*, ejusque *Tinctura*. Quæ quidem *Singularia*, cum eorum similibus, sunt in hisce auxiliis; & forma convenienti composita, & quantitate & methodo rectis exhibita, summo erunt præsidio, tutelæ optimæ. En! brevem curationis Scenographiam.

IX. Sumat Æger, (Hydropis, Medicina propria, & peculiari, prius sublato,) omni mane, *Canarini Simplicis*, vel *Rhenano*, si usus fuerit, diluti, *Rad. Gentiane* summit. *Agrimoniae*, *Centaurei* min. *Cort. ext.*

Aurant. alterati, *coch.* vi. cum *Tinct.* *Martis* gutt. xx. & (si videbitur) sp. vol. oleos. gutt. xx. *Quarta pot.* *Bolum*, & *Pul. Rad. Ari C.* *Conf. Fol. Abs.* ℥i. (vel *Flor. Salviae*) ana ℥i. *Alcohol. Martis* ℥ss. cum *Syr. Carioph.* q̄s. *Hora Decumbendi*, *Pulv. serp. V.* & *Zedoaria*, (vel *Contrayerva*) aa ℥ss. cum *Syr. Abs. Simp.* q̄s. ut f. *Pilule Bolo*, & *Pilulis*, superbibat *Julapii Coch.* quatuor, vel quinque.

℥i. *Aq. Cardui*, *Gent. Comp.* *Cin. bordeat.* aa ℥v. *Abs. Comp.* ℥i. *Marg. pp.* ℥ss. *facch.* q̄s. f. *Julapium*.

Quibus insistat, menses binos, vel etiam ternos; cum *Purgatione*, *Septimo*, vel *Decimo*, quoque die intercalanda. Eaque prout opus fuerit, exinde repetat.

Ad nauseas & ægritudines subitas, quibus ventriculi vitii, istiusmodi homines, præcipue poculis si indulgent, non minus quam a conceptione mulieres, affliguntur; quoties pernecessum erit, *Canarini Zedoaria* medicati momentum: quod nempe viribus suis reficiat ventriculum, & socillet: quantitate vero nimia non exurat.

Cerevisia Rad. Armoraciae Summit. *Trifolii fibrini*, *Marrubii albi*, vel *Salviae tenuifol.* *seccat.* *Seminibus Cochleariae*, vel *Sinapios*, *Infusis*, alterata, in potum ordinarium, ministretur.

X. Quinetiam, licet abdominis lacus, tibiæ tumor extiterit omnino nullus; ad *Hydropa*, quasi furca, propellendum, artis erit, in corporibus ei recipiendo pronis, vere & autumnis præcipue, bis terve, alvo, debitis ex intervallis, aquam detrahare; itaque ne recrudescat *Hydrops*, efficere.

Porro, ad eundem scopum oculum manumque dirigens, in eligendis, tum ad arthritida invocandam, tum ad intercalarium, hydropa propulsandum, medicamentis, cum, *Arthritidem* inferri, spes & consilium est; e re futurum arbitror, drasticum & stimulant (quo in paroxysmum sanguis citetur) leniori cuivis & mitiori, utut iterato, longe præponere. Quo circa *Tincture Sacre* ℥. ad ℥iii. aut *Pil. e Duobus* ℥i. ad ℥i℥ss. aut *Alces rosat.* ℥i℥ss. *Ref. jal.* gr. v. ad hoc *Negotii* præferre soleo.

Sed & de liquidis ægrum quam maxime sollicitum esse conducat; abdicataque si quam antea complexus est, inutili libertate, neque plus, nec aliud bibat, quam coctioni, & nutritioni, quod sufficiat. Quantitatem potus diminutam compendet generositate.

XI. Ad-

XI. Adhuc, in ruinis farciendis quoniam occupati sumus, nec ad propositum faciens vel minutulum quodvis, ex prudentia medica, præteriri decet, e lecto mane, pro anni tempestate, quam primo urgeat æger; ut motu, ut aprici fructus, & utilitates, decerpant; & in prandium magis esuriant. Vespere mature cubet; ut spiritibus somno alendis reparandisque sit tempus opportunum.

Quinimo, dicta medicamenta quo profint magis tum etiam alias ob causas, apprime confert, ut æger, bis die, sub Jove, corpus exerceat, ad calorem usque vel certe, quam enixe vires ferent. Unde motus sanguinis tum intestinus, tum periodicus, intendatur; humores effœti, & emeriti amendantur; spiritus animales recreentur; appetitus ad vigorem pristinum & latratum naturalem reducatur; & œconomiae ratio usquequaque renovetur.

Quæ quidem res a nobis eo lubentius in præceptis ponitur; quod ab *Hydrope*, seu potius ipsa morte, beneficio *Podagræ*, quos ego novi redemptos, horum pars major, laboriosis illud exercitationibus aliquatenus acceptum retulere.

XII. Ab *Hydrope Arthriticorum* quotquot dictam methodum meo hortatu ire, recteque percurrere commemini, nemo unquam misere, nemo, (quantum intelligere possum,) calamitose doluit. Deinde, quamvis alius liquidis, neque paucis, neque probatis indulgeret: alius ad *Hydropem* maxime proclivis cerneretur; nemo tamen horum, eo, jam per annos complures urgetur recidivo: Non paucè integre fatis, & alacriter egere: Aliqui vero sic, *Arthritica* si demas, ut raro unquam melius. Quod quidem, notatu dignissimum, *Arthritidi* potissima ex parte deberi, agnoscendum est.

Has ob causas, nullis certe elogiis hanc *Arthritidem*, ejusque in accessu, opportunitatem, in paroxysmis, clementiam, in *Hydropicis* sublevandis, perpetuitatem, in defendendis, constantiam, optima promerentem encomia, digne me, & uti par est, prosequi posse existimavero: multiplici usu, variisque doctus experimentis, eam *Hydropicis*, præsertim senioribus, esse summam, & securissimam spem, columnam, & tutelam.

Quanta vero adversus *Hydropem Arthritidis* est potentia; tantæ profecto medicinæ, quæ *Arthritidem* primo novam introducit; quæ postea tardam accessit; quæ de-

nique segnem & languentem excitat (pace vestra liceat dixisse) vires & utilitates.

Si *Arthritidos* hujus symptomata, perpetuo graviora, medicinam postulaverint, *Præmigenia* doctrina depromi potest.

Hist. 1. De *Arthritide*, *Hydropi* probe curato, feliciter accedente.

Nobilis quidam apud *Dammonios*, a nativitate obesus, nondum annos affecutus viginti quinque primum quiesci plus solito indulgit (quod a corpulentia fuisse credebatur.) Deinde sensim, levi quavis de causa, frigus contraxit: tussi creberrime gravatus est; catarrhis subinde pene obruitur. Sub idem tempus somnolentia tristi & periculosa, paulatim obrepente, tenebatur; ut mensæ accumbens, vel cibi capiendi, vel ludi, gratia; aut rebus quoquomodo arduis implicatus brevi temporis spatio, nec absque casus periculo, nutaret. Hisce circiter diebus, pedes late accepti, & deinde venter, retento intus sero, gradatim extumebat. Pedes impressionem digiti facillime accipere. Venter (quod ipse non sine quadam admiratione sum expertus) pugnum sere dimidiatum. Hypogastrium occupavit externum aliena quædam materia, partes cuticulares tumore duro & inæquali, variato, plus minus purpureo, & postea nigricante sic obducens, ut gangrenam præ se ferre judicaretur. Porro sitis, & respirandi difficultas (ob ventris *dynor*, & diaphragma in thoracem elatum,) impensissime urgebat. Urina interius exigua, subrubra, turbida, vultus ægri demissus, pallidus; vox humilis, tremula, languens. Ægre tulerunt familiares, virum, ortu præclarum, gentilitii nominis principem, patriæ decus, & ornamentum, ipso ætatis flore, morte tam inexpugnabili, tam immatura, furripi: Quod tamen in satis esse putabatur, & percrebuit.

Cum pectore laboravit, & difficili spiritu, *Tinct. Sulf. gutt. xii. ex Syr. Bals. Coch. i. deglutiit, simul Julapii cum Perlatis Haustu.* Quo præsentissimo remedio; spirandi spatium & anacatharsis multum & æqualiter augebantur. Contra vitium abdominis, atrox certe, terribile, *Decocto sequenti* lanea, per expertissimum Dominum *Jac. Jenken*son, Chirurgum hujus civitatis ordinarium, immerguntur: & liquore expresso, calidissime creberrimeque imponuntur.

24. Summis. Abs. Rom. Menthe, Cardui ben.

ben. Abrotani ana Mii Bacc. Lauri vulg. sem. Fœnic. dul. Carui ana ℥i. Coque in Cerevisiæ fort. ℥vi. ad ℥iii. adde postea sp. vini vulg. ℔i. Fotu isto tempestive adhibito, venter restituitur.

Ad *Hydropa* tum me, aliquanto post, accingo. Hinc ut occurratur, quam primum tuto fieri potuit, *Pil. Rudii* ℥ss. *Res. jal. gr. v. cum Balf. Per. qs. mane deglutiit*; & ex voto quoniam pilulæ operabantur, ad vices octo vel decem, a bidui vel tridui intervallo illas repetiit; eo nempe usque dum feri, quod erat nimium, omne deturbatum est. Eundem etiam in finem *Tinct. Diureticæ gutt. xxx.* cum *Vini albi* haustum, bis die, purgatione liber, assumpsit.

℥i. *Millep. ficcata. & pul. ℥ii. Coccinellæ Pul. & N. M. ana ℥i. sp. Juniperi, & vol. Oleosi ana ℥i. Misce, & Vitro arctissime clauso, igne Arentæ, per noctem, digere; Mane per Emporeticam filtram Tincturam Diureticam.*

Cerevisiam dedimus libere medicatam.

℥i. *Summit. Cochlear. Mff. Ras. Radiculae, sem. Sinapios ana ℥ii. Coccin. N. M. ana ℥i. misce & infunde in Alla mediocris ℔ii. pro potu ordinario, usus tempore colande, & cum simplici Alla temperande.*

Absoluta hoc modo *Hydropis* curatione, ad ejus prophylaxin animum applicui, ea præcipiendo quæ sequuntur.

℥i. *Conf. Flor. Salviæ, Flavæd. Aurant. ana ℥vi. Pulv. Rad. Ari Comp. ℥ss. Salis Martis Riveriani ℥ii. Syr. Garyoph. qs. f. Elest. ℥i. bis die, cum Haustu Julapii. Nonnunquam, ejus Vice, Tinct. Martis gutt. xx. cum eodem vehiculo. Singulis autem diebus quartis quintisque, ad sex vel octo vices, ne absundet serum, & Syrupu sequenti Cathartici iterata est.*

℥i. *Diagrid. ℥vi. Pul. Cinnam. ℥ii. Sp. Vini ℔ii. Ustulando coque ad dimidium; Colature adde Sacchari Crystallini ℔ss. f. Syrupus. Dosis ℥j.*

Hiscæ diligenter usurpatis, non ita diu post dolores primum convexi pedis, tum vicini calcis, postremo, digiti majori articulum majorem mordente, afficitur. De contusione, & ad limen nescio quod illusione, qui istiusmodi affectorum mos est (initio questus, de *Podagra* tandem minime dubitavit. Partim evacuantibus, partim cardiacis, ad paroxysmum effertur miasma *Arthriticum*, quod ad eum usque diem in obscuro positum, ne hilum quidem micuit.

Paucos aliquot dies duravit paroxysmus; ideo forsan pauciores, quod humorum tanta vis ejiceretur; omni hyeme, & autumno, jam per quadriennium elapsam, ad unam circiter hebdomadam, constantissime redux. Ad tollendam *Αγρυπνίαν*, & dolorem minuendum, *Friktione* utitur, manu molli, tenerrime peracta, qua sola quies, & somnus illi conciliatur.

Ab ista medicina, vix concipi potest, quantum ægro est emolumenti: Primum: a *Catarrho* plano liberatur; tum a *Gangrena* (medius fidius) imminente; tum ab *Hydrope*, & dira ejus symptomatum Cohorte; tum a *Somnolentia* petinaci gravissimæque; tum denique ad ea profliganda omnino omnia, inducitur *Arthriticis*; felici quidem omnie, auspicio saluberrimo, nam a prima ejus accessione, *Catarrhus*, & *Somnolentia*, prorsus evanescere; *Hydrops* effugit.

Vere & autumno, in majorem cautelam, septimo quoque die, ad tres vel quatuor vices, *Mannæ ℥iii. Aq. Alfordensis (summit. Abs. Rom. parum alterata) ℔ii. solutas, hæc per dies, ingerit. Medicinæ vero præterea nihil.*

Corpus hodie præcrassum expedite movet: equo identidem exercet. Ab hoc affectu, uxorem iterum tertioque gravidam fecit *Arthriticus*, & quidem nunc primum, etiam jam pridem maritus. Una *Arthritide*, sed nec ea gravi, affectus, vitæ spem probet tum multæ, tum incolumis: *Damonium* vovet.

Hist. 2. De Arthritide, Asciti, ejusque Remediis auspicato agnata.

VIr quidam ætate constanti, cum, ex mala vitæ ratione, ventriculus læderetur, coctio depravaretur, siti permolesta inexplibilique urina pauca, & lixiviosa, corripitur. Quibus supervenit tumor primum pedis infimi, & cruris; deinde femoris, & demum abdominis; serosus, & digito cedens; *Ascites* scilicet. exquisitus, omnibus numeris perfectus.

Ad affectum ancipitem, & ubi primum me arcessivit, inverteascentem, quin & jam diu rationalem medicinam eludentem, extirpandum; cum in primis necessarium erat, ut humores, in lacum confluentes, vel catharsi, vel diuresi, amandarentur; tum, ut appetitum quæ exacuunt, coctionem instaurent, sanguinem corroborent, ea

exhi.

exhibendo, Tumores arcerentur; per Vini scillit. ʒiʒ. Per extracti Eustach. ʒʒ. Ref. jul. gr. v. (Calom. gr. xvi. ad xx. alternis vicibus adjectis) cum Syr. Domestici q̄s. ut f. Pil. utriusque generis facta est Purgatio; & vespere, post utriusque vices singulas paregorici beneficio, Quies. Postea, quoniam vires ex Ἀρροῖς consensere. Pil. vice, Bolus ex Elaterii gr. iii. Diacrid. ʒʒ. Conf. Viol. ʒʒ. Syrup. Ros. solut. q̄s. deglutit. Diuretica Chartulis seponuntur, & allæ mediocris, in potum ordinarium modica quantitate detrahendæ, totidem ampullis infunduntur.

ʒ. Baccar. Junip. Milleped. siccæ, & Pulv. Sem. Dauci Pul. N. M. ana ʒʒ. summit. Abs. R. ʒi. misce.

Catharsi crebro, & donec aqua omnis educta est, diebus primum alternis, deinde tertiis, quartisve, repetita, ad alteram indicationem, ea quæ sequuntur, adhibeo.

ʒ. Tinct. Myrrhæ (Liquore Nitri fixi prius solutæ; tum spiritu Vini rectificato extractæ,) ʒii. Pul. Gent. ʒii. Macera per noctem; mane s. expressio Tinct. Stomachicæ. Dosis gutt. xx. cum Tinct. Martis totidem, & Vini Haustu, horis duabus medicinalibus Catharsi interpositis. Post Catharsin ut Digestivis sedulo insistamus, mane Tinct. Martis. Hora ante prandium, Canarini, & Rhenani, paribus mensuris, Gentiana alterat: Haustus. Quarta pom. Bolus Chalybeatus, cum Jul. Haustu.

Quibus continenter ad menses aliquot usurpatis, & ex intermissione quadam sæpius repetitis, Eccoprotico nonnunquam intercalato; quinimo crebrius sub Jove exercitationibus, liquidorum item imminuta quantitate, debitoque Sex non naturalium usu, æger appetitu, & coctione recta de novo potitur. Vires redintegrantur, cum bono corporis habitu, cum Ἀρροῖς & τρυφῇ.

Post Hydropa fugatum, en brevi Arthritidem, dolore, tumore, pedum articulos occupante, conspicuam. Ægrum illa jam primum adoritur: Posthæc sæpissime. Ructus sub accessum acidus, fidum usque symptoma, præcurrit, & de receptione monet.

Profecto minime dubitandum, quin Arthriticum in hujus ægri sanguine seminum, ante paroxysmum, ad tempus aliquod, detulisset; forsitan etiam Hydropi, licet occulte, symbolum contulisset: Neque veri minus simile, quod a dictis alterantibus Ar-

thriticis exciter: quodque ex ea recte se habente, anni posthæc ægro quam plurimi, per eisdem sanitas obveniat.

Huc etiam addam, (rei tam lætæ infaustum absit omen) quod ex frigido viri hujus temperamento, & in serum abituro, sequitur; cum demum eum vires deficient, & ingruet senectus (ἡ γὰρ ἰσχυρὰς μὲν) quamvis Hydropæ jam per annos plures sit immunis, ne denique succumbat illi, cavendum est. Sed, ut quam potest diutissim se defendat, Hydragogum sæpius sumat, vitam agat temperatam, coctionem, ipsam utique salutis summam, tueatur religiose, moneo & exhortor.

Demonstrat Historia (cum præcedenti) posse Arthritidem Hydropi supervenire, posse istius remediis fuscitari.

Hist. 3. Podagra Asciti, per Naturæ Vires, Suborta.

Dominus D. vivido & alacri vir ingenio, summæ spirituum, ὀρεῖς neque Venerem, neque Bacchum nimio plus abhorrens, ætate media, siti immodica, urinæ exiguo, crurum & abdominis tumore, signis Asciten ostendentibus, afficitur. Ut affectu tam ancipiti se liberet quam celerime, Cathartica & Diuretica præscribunt, donec humor nimius pertinaci illorum usu, exulat: itaque fauste primis diebus ægroto succurritur.

Natura onere sublevata, suique iterum arbitrii facta, aëre aprico, equitatione crebra pernicipique adjuncta, rebus suis serio incumbit, & quidem bonis avibus. Brevi enim Arthritis tum primum eluxit: Quæ semel bis statim anni temporibus recurrens, sanguine quod alienum erat expellens, eundem purum & inquinamento liberum præstabat.

Huic ego (naturæ ut succurram, & opituler) commendavi Chalybis & Amaro-rum Compositiones. Utraque Xerano mistam, menses quotannis plurimos, sed interpolatos, & secundum varias anni τροπῆς idoneos, usurpavit. Hinc avidius appetiit; perfectius coxit; rectius & commodius doluit.

Multos ille annos, gaudio & dolore variatos, ad usque senium, ætatem prolongavit; optimo sane cum eventu Arthriticus; Hydropæ per Arthritidem, adeo posthæc iminu-

immunis, ut tamen si liquidis tenuioribus plus æquo indulgerat, nihil hinc tumoris, nihil *Hydropici*, suboriretur.

Convincit historia, (sublatis impedimentis,) vel ipsius naturæ viribus, *Arthritidum Hydropi* posse superaddi.

Hist. 4. De Hydropi, & per Diuresin & Abstinentiam victo: cum Arthritide, per Amara, & Chalybeata famulante.

Quidam, e regione Sancti M. poculis & otio nimium indulgendo, vitiata coctione, congesto *Κακοχολίας* gurgite degenerumque succorum plenitudine, cum vix ætatis medium excefferat, *Hydropi* corripitur. Facies illi pallida, spiritus difficilis, sitis importuna. Urina parca & lixivia, venter intentus. Ut malo occurrat medicus (certe ingeniosissimus) & laborantem sublevet; primum, ab inutili libertate (ne quid gravius dicam) abstinere suadet, utpote morbi fontem quod exsiccet, neque potionem ultra vult, quam ut vitæ satisfaciat, neque aliam quam diureticam. *Cinereum ideo Genistæ dedit, Potui cum Abs. Rom. summit. admiscendum.* Obtemperavit æger, neque plus libra, nec quidem interdum plus selibra, nycthemeri spatio, sorbillavit, per omnem abstinentiam, quam cum congiugium quotidie exhaust, nihilo magis sitienter. Urinam hinc ubertim excrevit, aliquanto forsitan uberius quod indies equitavit; quod quidem exercitandi genus haud parum ad *Διύρησιν* conferre, pervulgatum est. Serio facta supervacui expulsionem, digestivorum ope cepit de novo esurire, concoquere, nutrir. Cibus, ita modica portione solutus, *ἔμμενον & μεταπερισμὸν* acquirit longe perfectionem, quam immodica cum immergeretur. Brevi post dolore pedis afficitur, & genuino more *πὸ δαγρῆς*, deindeque sæpissime. Natura, (quæ semper *τὰ δύντατοι*) *Hydropi* liberata, & suarum rerum potita, *Arthriticum* miasma, clam in sanguine derentum, amolitur; idque quoties se contumacius extollere, aut istam illud erigere conatur.

Quando mecum, de salutis statu servando, sermonem habuit, temperantiam, ejus laudavi, morborum victricem, expultricem optimam, sanitatis obsidem fidelissimam, & illius usum, laudando, commendavi. Quo ventriculi servem *ἁπαρίας*, necnon, in senium vergente ægro, labascentem su-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

stineam; Auctor sum, a prandio *Camarini* Haustum, omniumque mane Infusi amari alterantis *Coch. sex* cum *Tinct. M. gutt. xx. bibat.* Hac & ejusmodi methodo, multos ille annos vitam protrahit, *Ascitico* omni tumore vacuum. Qui pedum erat exinde tumor, brevi, semper *Arthriticus*, evanuit. Uni ille *Arthritidi* & abstinentiæ debuit, quod senuerat; & præter spem humanam, quod valuerat.

CAPUT V.

De Arthritide Melancholica.

ART. I. **E**xpeditis *Æquivoci* Ortus Symptomaticis ad eas species, quæ sunt *Univoca*, quæque materiam, cum affectu primario eandem, sed alio ritu operantem, alia *παρὸντα* edentem, præ se ferunt, id est, ipsam operis partem potissimam, accedo.

Harum e numero, primas obtinet *Melancholica*; quippe quæ, tametsi *puram Arthritidem* eo usque æmuletur, quo ad *Symptomatica*, (*Κυριακός* sic dictæ,) rationem & partes sustinendas opus sit; tamen ei dissimillima est, & in ellipsi sua distat *Univocarum* omnium longissime.

Ut vero rem occipiam, præter istam animi depressionem, quæ, genuinæ *Arthritides* symptomata, paroxysmos ejus pene omnes & quo majores eo major, antecedit (alibi explicanda;) alia est, *Melancholia* nomine insignita, quæ ad menses, ad annos, sæpe perducta, arthritidem, insultus recte & creberrime facientem, introducit.

II. *Melancholia*, quæ *Arthritidem* progignit, de latius sumpta dicere, in præsentem *ἀποσδιόριστον* duobus pendet. Quorum prius spirituum animalium a natura debilitas & teneritudo. Revera, constitutio illorum delicata, ut perceptione homines & acumine, ut ingenio & consilio præclaros reddit; sic ærumnis, sic etiam morbis subjicit. Ex eoque factum est, quod alias levi de causa in *ἀταξίας* illi gravissimas adigantur; quod alias humilitates, & depressiones patiantur afflictissimas; quod diutius inordinati *Melancholiam* ostendant non raro immedicabilem.

Ista vero illorum a natura debilitas, sæpe studiis impensioribus, otioso vitæ genere, & nimis sedentario, nonnunquam mor-

C

bis,

bis, inedia, vigilia, & aliis ejusmodi sexcentis, augetur & intenditur. Atque hæc spirituum debilitas, *Melancholia* non inepte *προθυμία* audit.

Posterior, quicquid spiritus per se infimos (sive extra, sive iis intermissum (afficiendo, *Melancholiam* parit *προκαταρτικῶς*.

Hujus autem ordinis sunt humores pravi & vitiosi; vermes, aliæque res permultæ, primis vitis utero, hac vel illa corporis cavitare, collectæ, animi perturbationes, & in *sex non Naturalibus* errata quam plurima.

III. Hisce natus originibus, affectus iste (sive *Melancholia* dicatur, sive *Morbus Hypochondriacus*) sive *Hystericus* aliquando *Arthritidem* imitari, & ejus ritu pedibus, manibus, agrum privare nititur. Hoc est, inimicum id, ac alienum, quod ante, (in fistula plerumque alimentaria spiritus urgendo) *Melancholiam* peperit; natura, novas agendi methodos, nova ineunte consilia, in articulos truditur, & *Arthritida* producit *Symptomaticam*.

Esse vero hanc *Arthritida* puram puta *Symptomaticam*, ipsa *Melancholia* causa continente & proxima, generatam, satis (ut opinor,) eo constat, quod illa quoties exoritur, & ad gradum elevatur quantumcunque rata hæc & perpetua proportionem deducitur. Qua quidem re, ad exponendam istius *Arthritidis* naturam, eamque in *Symptomaticarum* numero collocandam, nihil poterit persuadere magis, vel evincere luculentius.

IV. Interea vero temporis, non est reticendum, quod hæc *Arthritis*, præ aliis suis tribus *Symptomaticis*, fere clementer se gerit, & junctam habet cum severitate flentatem. Quod *Melancholicorum* sanguini, supra quam aliorum *δυσμεταβλήτω*; an eorum spiritibus segniter, & in materia separanda dimittendaque otiose se gerentibus; cuiusque demum causæ debeat; de re sic in operto acta, tenebris sic obscurata, nullus ausim disceptare.

Si *Melancholicos* indulgere Baccho aut Veneri (quorum alterum usitatissimum, alterum minime novum) autem etiam ad *Arthritidem* hæreditario propendere, contigerit: itaque habitos ea multum infestari, crudelius extorqueri. Nihil inde propositio- ni nostræ derogabitur, neque ex eo vacillabit illius veritas. Cum ista morbi acrimonia causis peregrinis adventitiisque oria- tur, nec sit hujus qua *Melancholica*.

V. Ex miti hujus *Symptomaticæ*, (& uti solet esse) nimis leni ingenio, factum esse censeo, quod ea qui tenentur, in antiquum statum redeunt, *Melancholia*, cum cito recidiva, rum magnopere sævienti, creberrime conflantur. In ea videlicet delenda perimendaque, non multum facit *Arthritis* tam ignava, tam languens, tam socors vix sublevando affectui primario, nedum auferendo, par.

Ut *Symptomaticæ* hujus diagnosi apertius intellecta planius exponatur, de conditione pristina, de morbis ægri veteribus exquirendum. Quæ per se difficulter, ex hac indagine palam & facillime dignoscatur: e. gr. si æger diu *melancholia*, demum *arthritide*, laboraverit; & hac quo magis, eo remissius illa, maxime, si hoc iterum sæpiusque comparuerit; quin *Arthritis* ista sit *Melancholia*, nihil (ut existimo) dubitandum.

VI. *Melancholia Essentialis*, sive delirii cum tristitia, metu, &c. in *Arthritidem*, migrantis, therapia, nondum usu confirmata, unicuique enim morbi istius exemplum adhuc notavi, (idque imperfectum, & omne genus medicinam respiciens) nobis hoc tempore prætermittenda est. *Arthritide*, *Morbi Hypochondriaci* sive *Hysteric*, sobole, cum affectorum vis abundat, ejus curatio paucis explicanda.

In hujus *Symptomaticæ* prophylaxi (nam in paroxysmo ejus, ultra quam veræ & genuinæ sanando, nihil habeo quod dicam) maxime juvabit alienum id ac inimicum, quod, in primis viis, (antequam sanguinem ingreditur,) morbi causa extat *Hypochondriaci*, sed e sanguine expulsum, & articulis suffusum, paroxysmum facit *Arthriticum* amandare, dimovere, amoliri; tum, ejus incremento, & regerminationi obstaré; posteaque, depressos spiritus, medicamentis ex proposito datis, directe allevare, languentes suscitare, & erigere: itaque morbo huic universo, qua primario, qua secundo) simul semelque occurrere.

Atque hunc in finem impedimenta, si qua fuerint in coctionis *Εργασίῳ* (nulla vero non esse maxime probabile est,) primo quoque tempore, per catharum, (alteram, vel utranque) tollere, ad *εἰς τὴν* depurganda, aliud *Stomachicum* (*Pil. puta Stomach. cum G. Dec. Amarum purgans, vel Aquas Purgantes*) seligere; ad inimicum, in sanguine contentum, foras elimi-
nan-

nandum, aquas haurire diureticas; cum iis, *Alcohol Martis*, semel bis die; deglutire; omni hebdomada, ventrem movere; menses binos, his insistere; ad annos aliquot, repetere; cavendo alvi tarditatem, ex *Marte*; febrem, & *Arthritidis* paroxysmum.

VII. Ut horum nonnulla fusius edisseram; profecto tanti est, in hoc affectu; ventrem (ut dixi) crebro movere: & ab *Arthritide* reliquiis immune præstare; ut, vel eo solo *Aquis præcipue purgantibus*, *Tartaro Laxanti*, & *Maana* peracto (*Arthriticum* ex *Melancholia* non unum, egregie saluti prospexisse, noverim. Tempori proturbatur id, quod illico spiritus, ventriculi & intestinorum fibras incolentes,) adoriendo, mærorem affert *Hypochondriacum*; vel, in articulos effusum, *Podagræ* paroxysmum.

Cum primis autem prodest hujusmodi affectis antedicta *Solutio*, quod blande alvum, quod leniter, quodque certissimo subducatur; iis, qua *Melancholicis*, qua *Arthriticis* (neutro enim nomine, fortiora; *ὑπερβολικώτερη* convenient) aptissime.

Sed nec *Aquarum Diureticorum* vim (quales sunt *Barbantienses*, *Astropenses*, *Bamptonenses*, aliaque permultæ) adversus hunc affectum, satis prædicare valeo; vel, ut decet, laudem illis deferre. Cognitionem illarum conciliant, digestionem: illarum confirmant: illarum sanguinem expurgant: illarum spiritus permulcent: illarum *Melancholicis*, & *Hysteriis*, solatio: illarum *Arthriticis* inco-lumitati.

Quibus nulla suppetit *Diureticarum* copia, usui sit *Infusum Theæ*, aqua pluvia comparatum, a hys. ad j. bis die; potum. Nam per renes sanguinem, modo diu satis usurperetur, eluit; & ad *Vapores* (qui dicuntur) relevandos, ad *Hypochondriacos* flatu sopiendos, confert mirifice.

Quæ per tot sæcula *Melancholicorum* medicina fuit, e *chalybe præparata*, ea quidem, ex *Melancholia* sive *Hypochondriaca* sive *Hysterica ποδαγρία*; potiori jure convenit: modo præmissa catharsi, artificiose selecta, & dosi & methodo rectis, adhibeatur. Spiritus enim animales incitat, exaltatque; in radios vibrat acutissimos *ποδαγρίωσι* tum etiam, miasma *Arthriticum*, (modo exigua dosi fuerit exhibitum) blande ad *τὴν ἔξωθεν* emittit: & in partes internas neu relabatur; spiritus animales neu obscuret; tenebrasque iis offendat, efficacissime operatur.

Quibus autem nec *Aque*, nec in forma sicca *Ferrum*, mederi poterit. Eos interdum adjuvat *decoctum Corticis*, simplex, vel (pro re nata) *Chalybeatum* roborat ventriculum *ὑπερβολικῶς* infert; & ad spiritus stabiliendos (quod *Hypochondriacis*, & *Hysteriis*, lucrum pergrande,) summarum virium & momenti est. Multum valet, hæc in parte, simplex; propter id, quod habet cardiaci & nervis propitii; multo vero magis armatum; medicamentum, si quod unquam, *Πλούγριον*.

Sed nec omittendum, quod aliquando cæcæ revisa, utut defæcata, tantas ventriculo parit cruditates, in *Arthritidis* materiam postmodum abeuntes; ut, una hac objecta, & *Aqua fontana* cum vini pauxillo; vel, & *Sarsa*, *China*, &c. *Decoctio*; vel *infuso Theæ*, cum lacte vaccino, in ejus locum suscepto, ægris exinde melius successerit.

Hist. I. De *Arthritide*, *Melancholiæ* diuturnæ succrescenti.

Clarissimus T. erectiori vir ingenio, in Medicis ævi celeberrimis, (antecessorem, hac in urbe, compotem, & sanum, utinam æquis passibus sequi daretur;) *Melancholia* sensim obrepente, ætatis flore, exiit de potestate. In hujus morbi genium, & morem, ut diligenter inquirerem, & de eo curiæ renunciarem, prænobilis *Everhamii* magni *Angliæ* Cancellarii (cui apud nos, hujusmodi affectorum, a Rege cura est commissa) per literas mandato, Dec. 18. 1697. laborantem visitavi.

Fuit ille (liceat tanti vlti memoriæ, tamque literati infortunio, paulisper immorari,) tum temporis septuagenarius: vultu constanti, & augusto: capite orbiculato, neque, si corpus spectamus, aut ingenium, magno: voce suavi, & canora: gestu corporis decoro.

Veterum doctrinam, ut erat *καλαϊόφιλος* excusserat; ad medicinam conversus, eam de proprio ditaverat. Primus enim *Respirationis usum primarium* detexit; detectum, contra præclarum impugnantem, pertinacissime defendit; acutissime vindicavit. Nemo unquam Medicus illustrior, neuqui artipius tribuerat.

Nonnullorum vitia, me audiente, leviter & quidem argute perstrinxit; at viros sapientia, nobilitate, virtute præcellentes digne

digne profectus est. Clarissimi *Bigodi* sagacitatem, & in diagnosticis peritiam; *Davei* lenem, at solers ingenium; *Dikei* literas, & acumen admirabile; singularem *Entii*, nuper adversarii, semper amici, humanitatem & doctrinam, elegantem, variam, paratam; nobilissimi *Courtenai* [quanti vero, & quam magnifici viri!] cellum & sublimem animum, stemmati suo, quod est regale, parem, multis laudibus efferebat. Sed omnium maxime *Canabrigiam*, almam matrem, *Athenas* hujus reperi alteras, pie grateque, *Δόξης ὀψέως*, prædicavit. Quin & agnovit filium, mater.

Hæc cum, a quoquam proferri, aliquis audiverit; Annon, eum, animi summa rectitudine, judicio acri & perfecto, aliisque plurimis virtutibus, plane invidendis, insignitum existimaverit. Ita profecto fuit; jam alia res est. Quæ protulimus, ea præbuerunt *Lucida* [sic appellantur] intervalle; tum rara, tum brevia, densissimis nubibus, & interdum animi concitationibus [tanquam fulgore, & tonitru] discreta, Audivimus *Ἀρχαίμωνα*, summo dignissima Philosopho, quæ sunt iis maxime contraria, simul & semel coram dicentem. Piguit, doluit eruditionis optimæ reconditissimæque fragmenta, [tanquam *Sybilæ* folia, vento agitata,] cum astriclis, numero soluta; cum latinis; Græca; cum physicis, Ethica; cum veteribus nova; cum profanis, sacra, misceri, perturbari, confundi. Nullibi gentium tot tantarumque disciplinarum chaos. Dii vestram fidem! Quam pusilla res homo, vel literatus. Dudum ille noster temporis volumina præsentis præteritique, & in eo quæ sunt omnia, dudum ille terram, cælum, sydera, vasta universi systemata, spatia pene infinita, animo est complexus; hodie, ne sui quidem compos.

In causis hujus affectionis, primum ponenda est, tanquam *προνυμνον*, ad eam a natura diathesis, quam utique perspiceret physiognomon, & animus commoveri aptus. His adiacere oportebit calibarum, sive nimiam castitatem. Tum, in procatasticis, casu e plaustro, cranium, annis olim puerilibus, læsum: [nudato capite cicatricem aperuit.] Deinde, studia nimium flagrantia. Post, *Decodum Coffee*, plus satis potum. Ad extremum, animi perturbationem, spei frustrationem.

Causæ tantarum virium evidentes, ante-

cedentem a natura ceptam, malisque moribus adauctam irritantes, morbum pepercere, per se magnum, sed tempore qui roboratus, medicinam respuere, curationis spem excludere, cerneretur.

Quod vero ad rem nostram maxime pertinet, digitorum articulos ostentavit, tumefactos, inflammatos; *Chiragra*, multos annos, per intervalla, sed languenti, neque salis importuna, tactos. Procul omni dubio, si plus *Articulis*, capite minus agrotasset. Fuit tamen, gravi & diuturnæ *Melancholice*, *Arthritidem* suboriri posse, quod abunde comprobaret.

Hist. 2. De Morione, Melancholia
Hypochondriaca, & Arthritide interempto.

Sunt qui morbum *Hypochondriacum*, uti etiam *Arthritida*, sapientiz solum professores, ingenii dotibus præcellentes, infestare, iisque, tanquam ad tanti muneris temperamentum, sortito dari confirmarunt. Eorum opinionem, *ἔτι τὸ πολὺ* probabilem, a perpetua veritate longe abhorre, constat. Habet *Damnonia*, quod perpetuitatem perimit. Novi egomet haud ita pridem [attendite Philosophi!] *Morionem*, multos annos statu, *βασανισμῶς*, aliisque *Melancholice* sexcentis *Hypochondriacæ* symptomatibus, demum etiam [ætate propemodum affecta,] *Arthritide* confictatum, adeoque graviter [ne de acrimonia questio sit,] ut ætate constanti diem obiret supremum, his affectionibus interemptus.

Hist. 3. De Arthritide Hypochondriaca,
Purgantibus præoccupata.

Veteri quidam amicitia mihi conjunctissimus, post homines natos maxime *Melancholicus*; mali accessiones alias ab animi pathematis; alias a cibo crassiori, & *δυσωρίῃ*, vel potu immoderato; hæcæ carnis astu notabili, illas algore; hæcæ pulsuum majori tum crebriori; illas raro & humili: utrasque spirituum mira dejectione *Μίχρο-Λυγία* non vulgari, ejus latu miserabili signatas, habuit. Sub ingressum senectutis, *Arthritide* tenebatur: ea, quæ

Melancholiam perturbationibus procreata, ne semel quidem unquam excepit; alteram autem [id est, intemperantiæ sobolem] frequenter. Raro cuivis unquam mortalium fortunatius cessit dolore. Nubes illa supercilii dissipatur; spiritus se expandunt; ut materiam, in primis viis congestam, [*Hypochondriaci* causam mali continentem,] in artus ejici liqueret. Ad eam initio præcidendam, & utrumque morbum anteverendum, *Aquis purgantibus*, *Sale Cathartico*, & *Tartaro Laxanti* additis, iteranca purgavit. Usus purgationis creberrimum suadebat utilitas.

Cum, *Arthritidos* cippo forte detentum, ad diem statum iter conficere, voluit professio, partibus tumefactis, & dolentibus. Hirundines admoventi, sicque causam mali conjunctam evocari, jubeo. In re arctissima, summæque necessitatis, hoc artificii valuisse, certo certius est compertum.

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco, cum Arthritide agnata, Aquis Astropersibus subactio.

Nobilis quidam apud *Dobunos*, affectione *Hypochondriaca*, ventriculi inflatione permolesta, cogitatione inquieta, spirituum tremore, confusione crebra, & ex illa sudore, cum repentino, tum vero abundanti & profuso, diu afflictatus, ætate provecior, *Arthritide* correptus est, quam in *Melancholicis* observari solet, sæviori, longæque immaniori; quippe paroxysmos puræ & genuinæ κατὰ λόγον, quæ profuderit.

Cum eos secuta erat singulos, primis statim diebus, animi protenus sudum & serenum, *Hypochondriaci* affectus intervallum; materiam ejus productricem, & primis viis inherere solitam extrorsum pelli, omnino cogitandum erat.

Contra par malorum δύσφορος καὶ δύσκολον, ut duos simul liniam parietes, nihil antiquius judicavi, quam dyspepsiam, quæ utriusque fundamentum erat, pro mea parte, corrigere; tum simul, alienum & factiosum id, quod *Arthritidis* causa est conjuncta, foras eliminare. Quocirca alvo, *Pil. de succino Crat. Si. Tart. Qu. ʒi. Ref. scam. gr. iv. & Aq. Astrop. ʒii. hora post ingestis*,] prius subducta, iterumque septimo quoque die soluta, aquas haurit *Astropenses*, diebus otiosis, ad ʒiv. ad dies sexaginta.

Ut Πλάσι emendetur; dum *Martiatiali* quid præcipio, [quod ægri res volebat, non nolebant aquæ parum *Ferratæ*] spe decipior. Tanta ægro sive ἰδιοσυμπαρίῃ, sive spirituum teneritudo, atque minerale istud digerendum nescio quæ impotentia; ut ex eo, tametsi modica quantitate sumpto, statim inciderit in diarrhæam, animi depressione, spirituum dejectione mira stipatam.

Aquas autem *Astropenses*, blandas, præcellentes, benignas, tum *Hypochondriacis*, tum *Arthriticis*, & tenerrimis plerisque omnibus convenientes, omni ætate [magnum ad beatam vitam præsidium nactus,] per annos quam plurimos repetit; earumque beneficio & tutela, senectutem [uti audio] lætam, & desiderabilem, adipiscitur.

Hist. 5. De Gonagra miti, Histerica, Chalybe &c. concitata.

Placet, *Arthritidem* minutulam, & [uti videtur] artificiosam, memoriæ committere. Mulier lectissima, cum primis delicata, fragili constitutione, patre orta *Arthritico*, nondum ætate media, ἐν τοῖς γυναικείοις bene habens, ἀνορεξία καὶ δύσπνοια gravi diutinaque *Melancholia*, spirituum insolita depressione affligitur. Horum omnium causa esse videbatur materia quædam mali moris, ventriculum aggravans, & per œsophagum linguam omni mane feriens. His ut occurratur, purgato primum hac illac corpore, *Amara Chalybeata* cum levi subinde eccoprotico per menses aliquot usurpavit. Ex horum usu symptomata profluunt ad unum omnia. Esurire, cibare, lætari, missis tristitia & metu in mare *Creticum*. Genutantummodo alterum, debilitate, & dolore acri pungente, sed tolerabili, continenter impeditum: ut e sella assurgendo, gradus scalares, vel acclive quodvis, ascendendo, vix fit. Erecta firmo stetit talo. Mitissimus hic affectus erat, neque rubore, neque tumore insignitus, qui tamen ἄδὲς *Arthriticum* præ se tulit: laneis partem affectam involvi jubeo: calide vestiri: & *Melancholia* si recruderit, cum *Amaris* iterari *Chalybeata*. Morbi istius hæc reliquias percepit; hæc fructus, quod [*Arthriticorum* more] ex paroxysmo vegetior, quod alacrior, evasit, & diuperseveravit.

Hist.



Hist. 6. De Arthritide Hysterica.

Nobilis Matrona, molli & præter cæteras delicato habitu, *Hysterica*, blande nimium misericors [ut omnia fere omnium infortunia deplorans, & alieno mœrore mærens,] decies enixa, annis procedens, sine causa ulla evidenti, cœpit macrescere, & languere, potius quam agrotare. Hoc a familiaribus in malis positum, in lethalis alicujus chronici prognosticis: At in bonum, omni spe votoque majus, aliquanto post mutatur. Dolet, tumet, rubet pedis articulus ex *Podagra*. Corpus ortu persanum, ab omni labe hæreditaria, quantum inaudiverim, immune, tot partibus, aliasque τοῖς Γυναικῶν expurgatum, taliter occupari, profecto demiratus sum. Mali vero causa tanto sufflamine major. *Arthritidem* boni esse ominis, & in agræ commodum cessuram, existimavi. Hospitem grate, & benigne, [suo more] accipiat, hortor: calefaciat, vestiatur, &c. ut in *Arthritide Primigenia*.

Paroxysmi re absoluta, ad ea, quæ tum morbum *Hystericum*, tum *Arthritida* prævertant, speciatim ad *Digestiva*, propero: *Prenisso* [e *Pil. Stomach.* cum *G. 3℞. Scam. pul. gr. viii. Ol. Cin. ch. gutt. i. El. propr. q. s.*] *Lenienti*; cui vespere, loco *Narcoticis*, agra admodum inimici [quippe spiritus deprimere, & nimio plus pessundare, solebat,] *Bolus*, e *Pul. Cantonian. 3℞. Conf. Anthus ʒi. Syr. Melissoph. q. s. sufficitur cum Jul. Haustu Hysterici deglutendus*. Tum ad roborandos alendosque spiritus, *Decocti Corticis Martiati* haustum, horis duabus medicinalibus, in mensem usurpandum, & *Theæ infusum* [quod, ad eos permulcendos, & vapores sopiendos, ex usu diuturno, commodissimum experta est; quodque sanguinem per renes expurgare aptum,] in dies singulos, præcepi, partim medicamentis, partim *Arthritide*, blanda & perbeata, fideliter recurrente factum est; quod, per hosce dies sexagenaria, ὕχραος, & ὀσάραος conspiciatur; ex *Arthritide*, jam verusta, melior. Unos enim pedum tumores [an arthriticos, an hydropicos? hodie moleste fert, cætera bene habens.

Hist. 7. De Arthritide Melancholica, cum ventriculi, &c. Affectione, per Arthritidem levata.

Quidam mediæ ætatis, ad *Iscæ* ostium, *Melancholicus*, ventriculi distentione, Βασανισμῶς, aggravatus, flatu emisso sublevatus, appetitum pro nuper intercidi, ventriculum manemoveri, & biliosum ejicere, respirationem impediri, carnem absumi, conqueritur. Hisce postea supervenit dextri coxendicis dolor, qui ad genu brevi se transfert, ibique tumori locum facit, pallido, frigido, seroso. Ab hoc tempore ventriculo, & iis quæ intus sunt, melius, imò μίσητο-λύχια, quam miserabilem, & degenerem, æger subjerat, ab *Arthritidis* conspectu, minuitur. Eatenus *Melancholia* sanatio *Arthritidis*; eoque magis, quod supra quam in *Arthritide* frigida, supra quam in *Melancholicis*, solet fieri, extumescit.

Ego, naturæ famulari contentus, & rerum ejus promovendarum satagens, in *Arthritide* firmanda, medicos adhibeo conatus, quantos possum maximos. Primas ergo vias leniente subtraho; vesperi, post purgationem [quo humor extra propellatur] *Bolum*, e *pul. Cant. Ther. Androm. & Syr. Pap. Errat. cum Haustu parum Diacodiatum*, sumi præcipio. Dein, eodem, *Pul. Rad. Ari C. 3℞. Alcohol Martis ʒ℞. cum Jul. Haustus*, bis die per mensem, cavendo alvum obduratam. Panno *Wallico*, *Aqua Reg. Hung. & sp. Lavendule* consperso, vestiatur pars affecta. Cane pejus & angue, vitentur repellentia. Horum ope remedium, æger auspicato Πόδαγρᾶ; animo nempe alacri, sanis visceribus, & ob *Podagram* tutioribus.

CAPUT VI.

De Arthritide Fixa Scorbatica.

ART. I. *M*elancholica proxima est *Arthritidis* ea, quæ *Scorbutum* excipit, sed longo proxima intervallo; quippe *Primigeniæ* similitudinem quæ multo plenius apertiusque referat, ad eamque multo propius accedat: morbus certe, apud nos, ingenio & natura valde peculiari; quique evolvatur, & diligenter explicetur, aptissimus. Ut de illo dicam enucleate, & dilucide,

eide, de ipso *Scorbuto*, ex quo emanat, prius dicendum est.

De *Scorbuto* ea, quæ ab *Eugaleno*, aliis ejus fere affectis, dedita opera produntur literis, vel omnino prætermittam, vel leviter tangam: & illa potius [ex scripti hujus instituto] quæ nostræ ditionis sunt, & in hac regione mali istius in *Arthritida* metamorphosin patefaciunt, studiose persequar.

II. Anni sunt haud ita multi, cum apud *Dammonios* [quod, a senioribus indigenis, iisque fide dignissimis, & in medicina diu multumque exercitatis, accepi,] *Scorbutus* sic grassabatur, ut per illos artem qui *Exome* [nobiles sane] Medici faciliarunt, in hujus unius morbi curatione, quod præscriptis passim agitatis testatum fecerunt, non parum occuparentur; & grandiores hodie nihil æque ac *Scorbutum* crepent. At diebus hisce nostris rarius observatur hic affectus, & tantummodo ἀποράδω. Cujus quidem mutationis ratio, suo statim loco, declarabitur.

Sed nec qui nunc dierum est *Scorbutus*, illi qui vicinos *Belgas* [populares meos] imbuunt, id est, genuino, & vulgari, per omnia consimilis invenitur. Cum agri *Somersetensis*, uliginosi magnam partem, & depressi, (aërem crassum & humidum trahentes incolæ maculis subnigris, ulceribus malignis, crurum dolore, respiratione difficili, lassitudine spontanea, nervorum debilitate, hydrope, gangræna, & istiusmodi aliis) *Scorbuti* exquisiti signis, creberrime divexantur: Quæ apud *Dammonium*, tractum inæqualem, siccum, optime ventilatum, aëre subtiliori puriorique gaudentem, neque stagnis inquinatum, raro videntur.

III. Qui vero *Dammoniorum* est *Scorbutus*, in imo ventre Βράδυπνιξον habet, præcordiorum inflationes, ructus, oris vitia quamplurima, gingivarum scilicet tumores spongiosos, sanguinem vel levi suctione, vel alia quavis facili de causa emittentes, interdum etiam Επύλιδας; dentes sæpenu-mero laxos; vacillantes, cariosos; & primores, ipsa nonnunquam adolescentia seu deceduos, seu exesos; salivam acrem, falsam, pariterque copiosam; anhelitus fœtorem, (putredinis indicium) ut rectissima morbus iste Στομακίακη audiat: In cute maculas, sæpe rubicundas, interdum flammatas; parvas identidem, & rotundas, aliquando majores; papulas item densas, sca-

bras, asperas, irritabiles, cum margine purpureo, catervatim, in cubito præsertim orientes; quæ ad eminentiam & constrictum quandoque notabilem elatae, & demum exsiccatae, squammulas emittunt, tenues, subalbicantes, surfuraceas; quibus deciditibus locus apparet ruber & inflammatus. His adde pruritus, isti fidum eruptioni comitem, & partium affectarum æstum, ab unguum vulnusculis impensissime urgentem: volas porro aridas, æstuentes, duras, sæpe etiam callosas, contra diaphoen occlusas, nec ullo eam labore admittentes. Quibus adjici oportebit crurum tumorem admodum insignem, maxima ex parte calidum, & acri sero exsudante prurientem.

Ita præcipue notæ sunt indicia *Scorbuti* per hosce tractus hodie serpentis, & *Arthritidi* alludentis: Neque *Scorbuticum*, nisi tali fere modo affectum, pedibus unquam hic loci dolere recolo: Ut calido unice *Scorbuto* (cujus ista signa sunt Δηλωτικὰ) hac in regione suppullulet *Arthritis*.

IV. Utrum hujus *Scorbuti*, scilicet *Calidi*, sit ubique sui generis materia, sive innata, sive adventitia, quæ causæ continentis obeat negotium, & dicta pariat symptomata; sic, ut ex ea sola pendeat morbi hujus ratio Αἰτιολογία: An interdum modo hoc fiat, & in hac affectione præcipue malo alicui contagioso secundaria: sed alias ea vitiosæ sanguinis ζύμωσι [quod doctissimis quibusdam placere constat] ascribenda: Tametsi præsto sunt, momenti ponderisque haud exigui, quæ prius suadent argumenta; cum in utranque partem disputari possit, nec id agatur hoc tempore; in medio relinquam.

Audacter autem, ut opinor, affirmare possum, non ab cœli solique sive siccitate, sive humiditate, sive alia qualicunque facultate, nec ab ullo in *Sex non naturalibus* errore, suos ignes, suas flammæ, *Scorbutum* hunc nostrum, proxime, & omnino omnes recipere: Verum ab alia potius causa, in obscuro posita, paucis observata, & ab alio fonte, derivare.

V. Hoc ut innotescat, advertendum est, quod, ante centenos hosce annos, [ex esu piscium, uti verisimile, nimio insullarum,] *Dammonio* lepra quam atrocissime grassaretur, & in populum sæviret, forsitan non minus, quam in *Judea* olim, endemia.

Utrum ob eam templum illud extrueretur, quod e veterum monumentis, optima fide

fide auctor, nobilissimus *Careus*, in *Cornubia perlustrata*, tradidit, Anno Mundi 3172. a *Cunedago* ibi fuisse positum, & Apollini [medicinæ inventori & præfidi] sacrum; etsi ita esse non improbabile videatur; res est antiquitate nimio plus obscurata, quam de qua decernam, aut disceptem absolute.

Certe vero certius est, quod ante sæculum Nosocomia, quibus ab integris secluderentur corrupti, tam hac nostra *Enoxia*, quam alibi per universam usquequaque *Damnoniam*, incolarum pietate condita, extiterant quamplurima; Quæ quidem eorum frequentis tum morbi crebritatem, tum item acrimoniam, abunde monstrat.

VI. *Lepra* ista, quæ, ut class. denunciat *Careus*, circa sæculi novissime lapsi initia populum miserrime laceffivit; dum ætas labitur, & dies diem docet; partim ex salis communis usu, partim etiam tabacci [quorum ille optimum, modica quantitate, receptissimumque condimentum, sanguinem tuetur, putredinem arcet: Hoc autem, vulgi delictum, sive ore masticatum, sive tubo haustum, salivam movet, putres evocat humores,] cicurata, pertinax illud τὸ Ἀγριον adeo deposuit; ut sæculo superiori circiter medio, in *Scorbutum* degenerasse, comperiretur, antecessoribus nostris facessentem negotium.

Verum, ex quo *Damnonii* remediis prædictis *Pomaceum* addiderunt, & usitate potarunt; morbi istius vis & ferocia tam magnopere subigitur, ut hodie, quam olim, multo rarior, sicut etiam multo mitior, observatur: ita nempe contra *Scorbutum* mali moris, contra inveteratum *ferinum*, & in plerisque hæreditarium, id est, crudelem, magnum, & difficilem, egregie valuit pomorum succus.

Atque hujus sere generis & prosapiz est, qui his temporibus in *Damnonio* *Scorbutus* se exercet. Hinc illæ frequentes papulæ; cutis ille pruritus intolerabilis; color ille flammeus; fervor importunus; exanthemata; lichenes; squammulæ; veteris scilicet lepræ reliquæ; ignis nondum penitus extincti scintillæ.

VII. Prius vero, quam de *Scorbuti* hujus in *Arthritis* migratione & excursionem verba facere occepero; de ipsa *Arthritide* pauca proponere, & a se ut discedat illa, notare, necessum habeo: prius, illa *Arthridos* in vagam & fixam distinctio recolenda, & morbo præfenti accommodanda.

Arthritis vaga scorbutica, *Isosphalorum* & *Guedrorum* morbus endemius, qui tum adolescentum, tum adultorum lumbos, dorsum, artus; vicissim occupare & multum intestare solita est; uti locum hoc intractu talis, qualis passim ab auctoribus depingitur, quod unquam sciam, nullum acquisivit; ita nec hoc in scripto requirit ullum.

Et quamvis aliquando *Scorbutus* iste noster, *Vagam* eam *Arthritidem*, quæ nobis observetur, æmulari videatur; tamen frequentius, & quidem præcipue, *Fixam Arthritidem* imitari gessit; & quoties corpus [vel a natura, vel malis moribus, & vitæ ratione perperam ordinata] appositum, ad tempus aliquod affixit, nono vel decimo plerumque lustro, pedum [maxime] articulos invadit, dolorem intert; tumorem, cum ardore, aliisque *Podagræ* calidioris symptomatibus. Ex intervallis paroxysmos iterat, genuinæ instar; sique una demas *Scorbuti* indicia, *Genuina* existimeretur.

VIII. Nec cui mirum illud existimandum, quando in utroque patet affectu [tam nempe *Scorbuto*, quam *Arthritide*,] partes, primum easdem obtinere causas remotiores, [victum, utputa, falsum, & crassum,] tum etiam *Δυσαιμία*; dein acre aliquid, aut saltem alienum in sanguine, eumque valde inquinans, & corrumpens, tum habere *Scorbutum*, tum *Arthritis*, postremo, naturam utrobique grave aliquid eliminare & expellere conari; hic, per glandulas extremitatum articulares; unde paroxysmus *Arthriticus*; illic, per salivarios, & cutis *Miliares*, unde prædicta, & cutis, & oris symptomata.

Scorbutum autem adeo [sive causas, sive materiam, sive ipsam morbi rationem, & symptomata maxime fida & constantia, spectemus,] *Arthritis* persimilem, eam etiam ἐν τῷ Περὶ Περὶν æmulari & referre, ut observatu facile, sic neque intellectu difficile.

IX. Mitiores autem paroxysmos habet hæc *Arthritis*, [ut illius aliquam diagnosis expromam] quam vel exquisita & calida, vel lui secundaria, neque dolore tam acerbo conjunctos: lenitatem explet diuturnitas.

Ut vero pressius dicam, hujus *Arthridis* omnium maxime proprium est, quod affectus primogenii non pauca symptomata constanter retineat; ita, ut ex *Scorbuto* *Arthriticus*, scabie, maculis, gingivarum vitis, renitente licet medicina, & exeunte paro-

paroxysmo, adhuc infici, [tametsi minus forte, quam ante natam *Arthritis*] aspicimus.

Hoc autem in iis potissimum teneri arbitror, qui ex *Scorbuto* ceteri, confirmatoque *Ποδάρτη*; nam, a recenti & evidenti causa suscitato, & ad dicta usque symptomata eveſto, qui laborant, [uti post posthac exemplo pateſiet] iis nonnunquam aliter obtingat; & durante *Arthritis* paroxysmo *Scorbuti* lateant istius symptomata.

X. Quomodo vero *Calidum* unice *Scorbutum* [quod sumpta comprehensum est] *Arthritis* gignendæ sufficere videatur; nec a frigido vel semel ortam memoria tenuerim; huic responderet, quod ea, calido quæ suboritur, *Arthritis* semper reperitur *Calida*, τὴ Πύρεος ὡς Πυρίαν.

Sed nec omittendum est, quod, uti *Scorbutum*, hinc *Arthritis* primarius, in eo potissime versatur, ut inepti aliquid per glandulas exterminet cuticulares; & *Arthritis* ei secundaria, per articulares; ita, tam huic, quam illi, obsunt repellentia: quippe quoniam humoris ad τὴ ἰξόδου amandationem relegationemque a natura designatam, utilem profecto, curam, & vitæ cum primis necessariam, derepente interrumpunt & internarum partium mala gravissima, sæpe ipsam mortem inducunt.

XI. in paroxysmo, [quæ medendi optima *Intentio*] materia articulis impacta, blande foras elicienda; quem in finem extrinsecus imponatur tumori lene quoddam attrahens; quare videlicet *Ceratum illud viride* ex quo fiunt petasothecæ; vel *Brassica Folium*, fibris crassioribus purgatum, & ad mollitionem contusum. Tumori post noctem, [modo calide, quod juvat, artus involvantur laqueis] adherere solet vapor, per invisibilia foramina emissus, & in rorem condensatus. Ab ejus usu dies aliquot producto, doloris sedatio tum fida, tum etiam tuta, subsequitur. Quæ quidem artificiosa *Διουρησις*, ea forsitan de causa magis liberalis, quod materia per habitum corporis sua natura pronior, & aptior sit, quæ expellatur.

Quinimo, per totum paroxysmum magnopere caveant ægroti, ne materia, protenus eliminanda, retro agatur; quod ob eorum sanguinem [quod verisimile,] vitiosum, & contagio *Scorbutico* corruptum, raro [uti liquet] his humoribus, *Arthritis* detentis, impunis error; sæpe etiam lethalis.

Sydenham Opera Medica Tom. II.

Sin pravo externorum usu, aliave quavis de causa, materia jam fugentem, quasi clausis foribus repelli, vel sisti obrigerit: ad fores quam primum aperiendas, eam & extra evocandam, aut in balneum pedes calidissimum immergantur, aut foris imbuantur, aut articulo dudum affecto, vel proxime illum, applicetur epispasticum, vel cucurbitula: Et, interea temporis, ut ab interioribus extrudatur humor *Arthriticus*, cardiacum aliquid e *Pul. Cantian. Lapide Goana, theriaca Androm. Elect. ex Ovo, vel Sp. C. C. Succinat. gutt. aliquot cum idoneo vehiculo*, ægro stragulis cooperto, detur & prout opus fuerit, repetatur.

XII. extra paroxysmum, evacuantibus materia peccans e corpore κατ' Ἐπιχρᾶσιν amandetur; alterantibus corrigatur; digestivis illius augmentum, & regerminatio, inhibeatur. Hæc e diversis classibus selecta, in ordines, sive series, ut artis est, pro ægri constitutione, malique more, formari, pro annique tempestate variari, oportebit.

Ad domandam morbi hujus malitiam, maximopere valet *Mercurius*; cujus præparata mitiora, (id est, *Calomelas*, & *Mercurius præcipitatus albus*) causam ejus continentem impetendo aggrediuntur, & per aliud aliudve excerniculum, pro ipsius quantitate, & ægri corpore vel ad purgationem, vel ptyalismum, ad *Διήρπιν* vel *Διαφύρπιν* proclivi, eliminant exterminantque. Et tametsi hujus ea materiæ ferocia, quæ vel ptyalismo laudabili diutinoque non ex toto ubique cedat, & se se submittat; [nam post diutinum, & ex omni parte laudabilem, nonnunquam recrudescere hunc affectum in propatulo est] ex hoc remedio, alienum illud acre, morbi materiam continentem, quam maxime obtundi; sanguinem eximie purgari, morbum quam plurimum mitigari, constat. Quare si ætas, vires, ceteraque quæ sunt ægri, annuerint, nihilque repugnaverit, ptyalismum lenem, sed prolixum [ut tempore lenitudo expleatur] fieri suaderem.

Ubi ptyalismo, vel ægri moribus vel animo, vel τοῖς ἐκ ἐπ' ἡμῶν, nihil loci superfuert, sequentem methodum ingredior. Vere & autumnno, [facta prius in plethoricis venæ sectione] proderit, *Per Calomel. sera nocte. Pil. Eustach. & Res. Jal. mane seq. quinto, vel sexto quoque die ad tres vel quatuor vices, vel per Salem Catharticum, Manna, & Tartarum lax. Aq. bordeat. solutum,*

lutum, diebus alternis tertiisque, ad sex vel octo vices, purgare: Neque Medicinam interturbet Articularis, si oriatur, Dolor; quin pertinaci potius Purgatione sepiusque iterata vincatur.

Deinde *Antiscorbutica*, quæ dicuntur, cum *Antiarthriticis* maritata, usuerunt eximii: Sumat æger, omni mane, post dictam purgationem, *Infusi* seq. haustum.

2^a. *Summit. Trifol. fibrini sicc. pug. ii. Anthus p. i. funde in Aqua font. fervens ætæ q. s. ad Alterationem modicam, Colatura 3iii. addde Salis Martis gr. iii. Tinct. Aurant. gutt. xx. Sp. Mentha Haustus.*

Quarta pomerid. Pulverem, vel *Pilulas* deglutiat.

2^a. *Pul. Fol. Thea sicc. 3℞. Salis M. gr. iij. Pul. N. M. gr. v. Sacch. albiss. gr. xv. f. Pul. vel cum Syr. Melissoph. Bolus, vel*

2^a. *Conf. Flor. Salvia, Æthiopis Min. ana 3i. Syr. Caryoph. q. s. f. Bolus.*

2^a. *Cerussæ Antim. 3i. cum Extr. Gent. f. Pil. vel*

2^a. *Pul. Zedoar. 3℞. Alcohol. Martis gr. viii. vel x. cum Extr. Gent. f. Pil.*

Hiscæ singulis Vehiculum sit Julapii, vel *Infusi*, Haustus.

2^a. *Aq. Ulmaria, Fol. Ari, e Succis ana 3v. Sp. Juniperi 3ii. Marg. pp. 3℞. Sacch. q. s. f. Jul. vel ex Summit. Salvia tenuifol. & aq. font. comparatur Infusum, Sacch. Dulcandum.*

Quibus Alterantia prædicta minus attrident, placeat prosiitque Succos Herbarum Martiaros, semel bis quotidie potare. Quod sequitur magnarum virium est, & sæpe a nobis usu probatarum.

2^a. *Succi Cochlearia partem unam, duos vel tres [pro Ægri Constitutione plus minus Calida.] Succi Limon. p. i. Misce, per digestionem Clarifica: Dosis Coch. i. cum Salis Ms gr. iij. Sacch. q. s. ex idoneo Vehiculo, per Mensem, post debitam Evacuationem.*

Horum Usui interponatur, seorsim quoque die, vel Solutio Cathartica, vel *Pil. Tart. Bontii, vel Stom. cum G. 3i. ad 3℞. cum Scam. gr. aliquot &*

Erit autem perutile, si initio æstatis, locum habeant aq. Ferrate Diuretica; quibus, ad 3℞. omni mane, inter sextam & oct. haussis, circa decimam Vinum aliquod Stomachicum, amaris [si placet] alteratum, supponatur: persistatque æger ad hebdomadas sex, octo, vel x.

Vel, ad urinam domi movendam, itaque sanguinem a spurcitie vindicandum, valet *Infusum Theæ* ad 3℞. omni mane, potum; unde leniter, idoneo liquore, per renes, id quod alienum abluatur.

Pomaceum his hominibus sanguinem contemperat; sed periculum est, ne ab eo *Arthritidis* augeatur. Si secus fuerit, [tuto enim nonnullos eo poculenti genere gaudere certissimum est] in potum ordinarium, præsertim æstare, ministretur. Hyeme *Cerevisia* si extrudi respuerit, *Rad. Oxylap. Milleped. Summit. Hed. ter. medicata* esto.

XIII. Ut ad *Symptomata* transeam, obiter hic notandum, quod *Crepitus Ossium* qui [ut alibi dicitur] *Arthritidis* hac in regione symptomata pervulgatum est, neque *Scorbuto*, [forsitan ob originem & genium ejus peculiarem] neque *Arthritidi* regionis hujus *Scorbutica*, quoad observavi, unquam accessit.

Quæ ad oris vitia, cæteraque *Scorbuti*, quo tempore *Arthritidem* mentitur, accidentia spectant, cum non huc proprie referantur, ex Auctoribus de *Scorbuto* passim in unum depromantur.

De uno *Pedum Tumore*, eo scil. qui *Symptomaticæ* huic *Arthritidi* quodammodo proprius esse videatur, verbum superaddam.

Cum *Pedum Tumor*, tum *Scorbuto*, tum *Arthritidi* familiaris sit; quod *Arthritidis Scorbutica* succedat, minime mirandum. Certe senioribus, crassis & obesis, *Scorbuto* veteri in falsam *Arthritidem* mutato laborantibus, sæpe licet notare pedes & crura, non solum tumesceri; verum etiam cutis rubore, pruritu serino, post digitorum vulnera quantumvis levia colore plane flammeo, nunc item fluxu dierum aliquot ichoroso, immane quantum affici, a scalpendo manus si ad tempus aliquot æger abstinuerit, [abstinere vero perdifficile est] cuticula suboritur paulo albidior, ardens tenuis, in ulcuscula rursus ex unguium sulcis confestim abitura. Qui hoc modo affliguntur, etsi paroxysmos graves, dueros, immites *Arthriticos* olim perpassi sunt, articulis his diebus & minus & rarius dolent; materia scil. *Arthritica* partim in cruribus deposita, & satis stagno diluta, partim per glandulas cutis miliares abduas exsudante. Eo sæpe usque ingravescit hoc symptoma, ut aliquando rationem etiam ita gerens sustineat; ut dolorem, pruritum, *Αγρυπνία* creando, turbas ægris & negotium quam mole-

molestissimum facebat ; ideoque medicum enixe postulet auxilium.

XIV. Requiritur indicatio , ut intolerabilis illa humorum acrimonia citissime tutissimeque mitigetur . Hoc autem optime fit evacuationibus per anum & renes factis, tam etiam per humorum alterationem ; externe vero balneo , fori , illorum ferociam temperanti . Quorum omnium , ut & reliquorum huc pertinentium , una connexorum , quando exemplum statim subjungam, lectorem illuc (brevitatis studio) remittam . Hoc autem addo , quod in celebranda catharsi summa utique cautione , summo opus erit consilio ; ne forte , *αἰχρως* instituta , humoris ille fluxus , & ad articula menta *πονη* , quæ ad istorum hominum vitam & tutelam , omnino necessaria est , in eorum incommodum , arumnam , perniciem interpellatur .

Histor. 1. ab Arthritide Scorbatica , ulcus male tractatum : Unde Visus Abolitio , deinde abscessus , & demum Mors .

Agricola *Devonienfis* , sexaginta circiter annorum , crassus , obesus , *Scorbuto* papulis in capite & manibus insignito, plus quinquennium inquinatus , contra affectum pertinacem , & Medici , [quem consultorem habuit] doctissimi præscripta eludentem , *Evacuantibus* , *Alterantibus* , *Mercurialibus* , *Antimoniatibus* ; e regno *Minerali* , tum e *Vegetabili* quam plurimis a nobis instruitur . Cum circa utrumque æquinoctium , eandem medendi viam , usu diutino comprobata , iterum ac sæpius esset emensus ; & jam , more usitato , holum *Mercurialem* , detracto prius sanguine , demississet ; multus inde sanguinis orgasmus : dejectiones haud paucae , atque adeo copiosæ , tumor , haud ita diu post in utroque malleolo magnus , submollis cum dolore , rubore , lævore , diu persistens , plane *Arthriticus* .

Ut ægro prospiciam , quieti illum indulgere , materiæ , quam *Mediam* vocant , dicta uti ; & ut a sacra & recrementis , ossium juncturas vindicem , & defendam , tumoribus *Epispastica* admoveri , laqueis eos involvi ; calide vestiri jubeo . *Epispasticis* succedit *Ulcus* hic illic superficialium , ex ichoris acrimonia molestum , sed bene coloratum , expletu facile neque periculofum . Æquo ferat illud animo exhortor , quippe quod e re futurum , & lucro ægrum

majori , finon interturbet ipse , remuneraturum .

Contra ille stomachari , de neglectis rebus suis deplorare ; & citissimæ curationis spe allectus , *Agyrtæ* nescio cui auscultare . Hic autem , protinus , medendi qua pollebat arte , omnis universalibus , carne ulcus obduxit , cicatrice texit . Hinc æger capite , facta materiæ in illud translatione , subito perculsus ; visus hinc imminutio , & brevi abolitio . Congestis aliquanto post humoribus , in regione lumbari fit abscessus , ex quo imperite tractato , ulcerato , & partes vicinas (ut accepi) corrodeute , diem supremum obiit misellus .

Histor. 2. Scorbuti Calidioris Soboles Arthritis .

Quidam e T. vir blandus , comis , generosus , a victu lauto dapsilique , dum esset juvenis , *Scorbuto* afficitur ; cui , ætate progrediente , accedit *Podagra* . Numeravit annos quinquaginta , cum utroque gravatus me primum consuluit . *Hujus* paroxysmum habuit plerumque anniversarium , nisi si genio nimium indulgendo , vel aliquo in *Sex non Naturalibus* errato , sæpius accerferet . *Illum* autem ostendebat gingivarum tumor , & papulæ , cubitos summo opere sedantes , cum prurigine & apicibus innumeris , acutis , confertim oriundis . Materia nunc ulcuscula formavit , paulo post siccata in squamas abire solita subalbicantes ; quæ ut deciderunt , locus apparuit ruber , a fricando statim flammeus .

Ut utrique malo pro virili parte occurrerem , tum ea , quæ materiæ apte expriment peccantem , tum quæ potenter alterent , adhibeo . Principio *Calomelane* [catharsi , ne deorsum illud elaboratur , prius peracta] salivam moveo : eoque quoties saliva parciore exigebat iterato , ad sex hebdomadas *ptyalismum* profero ; Posteaque *Cinnab. & Cerussæ antimon. ad ℥ss. Pul. Rad. ari Comp. ℥j. Syr. Melissoph. q.s. ut f. Bolus* horis tribus medicinalibus sumendus , impero , cum *Infusis seq. cochl. v.*

*℥. Summis. Trisol. palud. Siccæ. Mi. aq. Lactis alex. ℥ii. Sp. Junip. ℥iv. misce , & ad alterationem idoneam Infunde : Colatura adde Tinct. aurant. ℥ii. f. Infusum . Perstet autem menses binos , interposito septima quaque die *Eccoprotico* . Effera hanc materiam ut ultra subigam , aquas æstate sequenti *Diureticas* , hortatu nostro sesquimenssem haurit ,*

rit, cum *Salis Martis & Nitri putrificati Preparatis*, quantitate, vehiculis, & methodo convenienti.

Hac medendi arte, morbi materia, non parum mitigata, diu sane conticet: cum vero, annis aliquot post, favire iterum, ὈΨΙΜΩ, & de novo tumultus inchoare coeperat; consilio jam mutato [quoniam pedes jam tumebant, vesperi præcipue, digitum admittentes, & seniori & compotatori hydropa minitari videbantur; tumores autem aliqua ex parte *Scorbuticos* esse, tum inflammatio, tum etiam maculæ comprobantur] per *Calom. & Pil. Eustach. ana Di. & Duobus ℞. Purgationem instituto; & deinceps, altera vel tertia quaque post die, per solutionem catharticam; sicque vicissim repeto.*

Hiscæ medicamentorum ordinibus, non sine aliqua formularum mutatione, vere & ætumno, sæpius renovatis; addito insuper, ad alterandam in potum ordinariam cerevisiam [*e Rad. Oxylap. Summit. Trifol. palud. Sem. Bardan. Bacc. Junip. Flavod. aurant.*] *Saculo, & Martis Sale cum Conf. Trif. & repetito; Ægrum Arthritis Scorbatica* graviter oppressum [levibus subinde hujus paroxysmis, veluti ad salutis rem facientibus, ex industria provocatis] ad senectutem, & quidem lætam perduxit.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti Alumnus, cum Vomitu Bilioso, Δυσπεψία & Volarum Ariditate.

QUinquaginta vir annorum, gracilis, tener, acri & bilioso sanguine donatus, *Scorbuto*, & ei supernata *Arthritis* diu conflictatus est, cum Ἀνοψία nausea, ventriculi inflatione, ructu sæpe acido, vomitu frequenti & cholericò, capitis dolore, & a pastu somnolentia, cute arida, densa, nec Διερρηλω idonea, squamulis hic illic catervatim obsita, in manum volis dura callosaque. Pollicis pedis sinistri majorem, dextrique brachii articulum infestare solita est *Arthritis*; sed neque tumore, neque dolore vehemènti; quin levi potius, in tempus diuturnum projecto, inæquali; & creberrime interciso, diuturnitate pensata levitas. Paroxysmos omnium certissime pomaceum accersivit, idque vel parce sumptum; sic, ut ex poculo communi semel iterumque siccato pes doleret. Plures ille methodos, eaque probabiles, a Medicis celeb. præscri-

ptas expertus, hanc commodissime, & ideo sæpiissime, prosecutus est.

In paroxysmo, *Broassica Folium* tumori impositum acre serum elicit, dolorem mitigavit. Extra paroxysmum, ad prophylaxin, præmissa per Aqq. *Alfordenses* [alvum hæc subducunt] ter quaterve catharsi, *Basthonienfium*, omni mane ℥ii. decima seq. *Infusi amari alterantis* haustum usurpavit: quinta pom. *Bolum & Chal. Nutrito &c. deglutiit*, superbibendo julapii perlari coch. aliquot; interponendo identidem lene quoddam emolliens, & alterantium usum ad hebdomadas sex vel octo quotannis profereundo.

Hac, inquam, methodo anniversaria, ad artus, ad ventriculum, præcipue ad vomitum quod attinet, maxime levatus, a malo tam *Scorbutico*, quam *Arthritico*, graviore, se jam multos annos immunem præstitit; hodieque illam ad senectutis principia perductus, non impune negligit, usque vero mansit ista, quam modo dixi, volarum ariditas, callositas, ut opinor, usque mansura.

Hist. 4. Scorbuta suborta, & ejus Eruptionibus adjuncta. Arthritis.

DUM in hisce versor, Fullo me appellat *Exoniensis*; vir robustus, athleticus, ætate media, constitutione sanguinea. Frontem illi, tempora, atque faciem propemodum omnem sædarunt, turpiter infecerunt pustulæ, sobrio certe & temperanti, [tanquam ebrioso] magnæ rubicundæque eum intervallo coccineo, flammeo. Æstus & pruritus erat universalis, maxime vero partium obsessarum; noctu per stragulas ingravescens. Turgebant venæ, & sanguinem plus solito ζυμώσαι, & ebullire, commonstrabant.

Hæc cum acceperam, virus in sanguine *Scorbuticum* effertur, & cælo [quamvis instabant tum temporis saturnalia mitissimo, & effervescentiæ provehendæ apto] favente proscribi, sum opinatus: neque enim alio de affectu vel somniare erat. Sanguinem mitti jubeo, deinde alvum molliri, alia deinceps suo quæque loco præcepturus. Sanguini cremor impurus, sebaceus in cyathis quiescenti, post aliquod tempus innatavit.

Ex Ref. Julapii, Extracto Eustach. deglutiuntur Pil. quibus inanitur alvus. A cathar-

rharrico, sanguine commoto continuoque, ægrotans Πόδευρις adeo nempe naturæ perinde erat, humorum vitiosorum Δουάμης & Α'κρόδοντες, per articulos, atque per cutim, exterminare; & tam levi de causa, ad illam ab hac evacuatione, discedit illa digrediturque catharsin, quam quidem amplius destinaveram, ad Α'κροδοντες prorogo; ne videlicet, nimium subtrahendo, intercidatur res articularis, & prorsus abscindatur. Ad eam ediverſo confirmandam augendamque lenem interdum ambulationem, cothurnos laneos, quibus in pedes humor demittatur, invitetur, impero; repellentibus interdico.

Extra paroxysmum, ad Arthritidos hujus puræ putæ Scorbuticæ prophylaxin, ut sanguis corrigatur, ea præcipio, quæ sequuntur.

℞. Succis, e Nasturtii aquar. Summitatibus expressi Partes iv. Succis Limonum p. 1. per digestionem fiat clarificatio.

℞. Conf. Fr. Cynosbat. ℥i. Salis Maris Riverian. gr. iv. Syr. de Corall. f. gr. f. Bolus.

℞. Aq. Ulmarie, Melissæ, e Succis ana ℥iv. Linac. Lumbr. Marg. ana ℥ii. Marg. pp. ℥ss. Sacch. qs. f. Julapium.

Premissa Venæ sectione, & per Vinum & Oxymel. Scillit. Vomitione; perque Salem Cathart. Manna, & Tartarum lax. Jusculo Avenaceo solutum, Purgatione: & deinde septimo quoque die repetita: sumat, diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum eum sul. Haustu; bisque indies Succis Clarificati cocti. 1. cum Serri Lactis, vel Possesi Haustu, idque per mensem unum alterumque, cavendo alvi Tarditatem.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus Arthriticus, cum Pruritu serino.

Dominus E. generosus, agricola Devonienſis, ætatis flore Scorbutico, & deinceps Arthritide, tentabatur: illius fluxu dolores Arthriticos sensim miteſcere, sed & eodem tempore pedes tumescere, percepit. Inſequenti senectute, corpulentus & obesus. Pedem utrumque tumefactum moleſte tulit. Cutis admodum distenta est, rubicunda, gravate pruriens, post levem aliquam digitorum injuriam flammea, ichorem falsum & acrem ad dies aliquot exudans: Ob pedes æquo grandiores & extensos sollicitum, Hydropsis timor cruciavit; sed de Hydrops

tanquam instanti, aut præ foribus, (cum urinam satis copiosam, probeque coloratam excerni; neque sitim intendi; sed e contrario appetitum a tumoris initio magis latrare deprehenderim) non esse quod se tantopere afflictum haberet, pronunciavi.

Quo auxilium adhiberem medicum, in eo laboravi, ut humoris acrimoniam, indefinenter acerbam, evacuantibus alterantibusque quam celerrime reprimerem. Hunc in scopum, rebus usquequaque collineatis, conceptis hisce verbis præcepi.

℞. Calom. quinquies sub gr. xv. Spec. Conf. de Hyacinth. Conf. Ros. r. ana ℥i. Syr. de Sympb. qs. f. Bolus, sera nocte sumendus: mane seq. Pilulas e Rudii ℥ss. Res. Jal. gr. v. Ol. Junip. ch. gutt. i. Bals. Per. qs. deglutiat, cum custodia. Quarto vel quinto quoque die, ad quinque vel sex vias, utrumque repetat diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum e Cinnab. & Cerusse antim. ana ℥ss. Cort. Citreor. Cond. ℥i. Syr. Garyoph. qs. Hora somni Pil. ex Æthiopia Min. [cum Mercurii crudi, & Flor. Sulf. ana p. a. sine igne facti] ℥i. Syr. Melissoph. qs. assumat cum Jul. Haustu. Potus vero sit Infusum seq.

℞. Calcis vivæ Devonienſis, [id est, fortissima] ℥ss. solve in aq. pluvie ℥xxiv. ad xii. coquendo evaporatis. Post Clarificationem leniter detrabe liquorem, eique adde Rad. Sarsæ, China. L. Sassafr. ras. ana ℥iii. Cort. ejusdem, Baccar. Junip. ana ℥ss. Milleped. siccæ. No. 200. Coccinell. ℥ii. Uvar. passar. exacin. ℥vi. Infunde clausa, Balneo arena, per noctem; Colaturæ adde Tinct. aurant. ℥ss. f. Infusum, per se, vel cum exiguo Canarini loco Cerevisiæ usurpandum. Externe vero, Desiccantibus Repellentibusque Cane pejus & angue vitatis, Forum adhiberi jubeo.

℞. Summit. Malvæ, Alibæ, Lauri vulg. ana Mi. Flor. Chamæm. Sambuci ana Mss. coque in aq. font. ℥iv. ad ii; sub finem adde Lactis Vaccin. ℥ii. Immergantur Laneæ, Pedibus, quoties Pruritus instigaverit, applicanda. Utroque denique Brachio Fonticulus aperiatur.

His obtemperando æger multum profecit; pruritum hunc ferinum mitigavit; ad diutinum tempus delevit, & quoties reverteretur, hisce præsentissimis auxiliis, perſugio, & præsidio salutis certissimo, creberrime propulsavit.

CA.

CAPUT VII.

De Arthritis Læi Venereæ Succedenti.

ART. I. **Q**UOD immoderata Venus ad *Arthritis* inclinet, eamque crebro introducat, ab antiquo positum est, ab omni sæculo decantatum; sic, ut in ejus *Πορυγαίνας* haud injuria cumprimis habeatur. Similiter notandum, quod postremis his temporibus, cum isti luem (forſan ad humanus genus monendum deterrendumque) adjicere, rerum Auctori, Reſtori, placuit, ab illa utique in *Arthritis*, tam facilis migratio, ut ætate noſtra, quæ luis imperium longe lateque dilatavit, frequenti populo ſtabilivit, tyrannida confirmavit, ab aſſectu, quem reſciverim, nullo, faciliſor quæquam aut uſitatior.

II. Iſtam rem inſpicienti, & ejus rationem perpendenti extra controverſiam videtur. Primum, quod hoc commune cum *Arthritis* (ut taceam alios aſſectus) habeat *Paturſa*, nempe inſectum (1) & *αἰσθητὸν ὄντος*, maſſam inquinans ac corrumpens ſanguineam, atriſque morbi cauſam eſſe proximam & continentem: deinde, quod *Paturſa* etiam miasma, non minus quam *Arthriticum* illud, cum extollit ſe & ingraveſcit, e ſinu ſuo ejicere, & ſanguine expellere, vim operamque det natura: Adhæc, quod virus *Veneræum*, e ſanguinis flumine jam expulſum, ſolidiſque partibus inhærens, non pauca faciat Symptomata, cum *Podagra Paturſe* communia; membranæ ſcil. dolores; oſſibus, cariem; cuti, ulcera: unde denique conjectari licet, iſtorum aſſectuum miasma ſimile, & alterum alteri tanquam germanum, exiſtere. Eccei verb novum videatur, quod, in materia ſimili tractanda ejiciendaque, natura (quæ nihil temere, nihil oſcitanter, ſed norma & conſilio ſemper agit) evacuatione utatur ſimili, porta eadem, id eſt, articulis?

Has ob cauſas & hujusmodi alias, quæ eſt hodie *Arthriticorum* pars haud exigua, ab *Læi* incipientes, ad *Arthritis* perducuntur; nec graſſatorum uſquam veterem, aut decrepitarum quæpiam, & admutilatum obtuemur *Arthriticum*, quin apud vulgus ſu-

ſpicio de inſauſta olim militia conſeſſim oriatur.

III. Nemo autem hominum [quantum auribus, vel oculis accepi] a recenti *Læi* & nuper contracta, natam unquam *Arthritis* detexit; neque naſci poſſe facile concedam: motu ſanguinis non minus inteſtino, quam periodico, cum eo commiſceri intime; corpusculorum illius varie figuratorum appulſu frequenti, mutari egregie; atque ita tanquam maturari & evehi diutius miasma *Veneræum* prius oportebit, quam articulis illidi, & ad *Podagram* inducendam impingi potuerit.

Hac de cauſa raro grandiores, & ætate procedentes, [ſerius ſcil. quam *Primigenia*] invadit hæc *Arthritis*, id eſt, ex ſola *Læi* derivata; juniores vix quidem: at nullo modo adoleſcentes, quippe quibus evehendo miasmati nondum tempus ſit idoneum.

IV. Sed e diverſo, nec a veteri *Paturſa*, terra, horrida, carie & ulceribus ſpurcata, *Arthritis* generari vel ſolere, vel etiam poſſe, cogitandum eſt: Id quod minime ex iſtius defectu, quin potius natura, quæ debilitata, fracta, enervata, hoſti fugando, *Arthritis* moliendæ, impar reperiatur.

Hiſce mediis generis *Paturſa*, *Arthritidos* genitrix, cauſam habet, ſanguini per minima inſinatatam, ac quaſi municipem, poſtius quam hoſpitem, ob aſſectatas res novas exulantem, & præfractæ & cum luſta, licet ex naturæ mandato, per articulos abeuntem.

V. *Læi Venereæ* ſua natura ad *Arthritis* inclinati & tendenti, manus aſſert adjutrices, calcar addit, Empiricorum moſ ille pernicioſiſſimus, quo, in curanda gonorrhœa, puris ſuppreſſioni propere nimis inſiſtunt hi Ardeliones; neglecta interim vel remiſſe facta, quæ maximopere, quæ ſtudioſiſſime præmitti debuerat, purgatione. Ita enim intus hoſtis retentus, ſanguinem integrior, & fortior ſubintrat, partesque primum *Paturſe* agit principes; demum ævo labente *Arthritidos* ſpeciem præ ſe fert: & ab hac iſtorum *Περίπυξις* poſſiſſimum, ex *Læi* tot ubique *Arthriticos* eſſe, jure merito ſuſpicemur.

VI. Illis de *Aſſectu Primario* præmiſſis, de ipſius ægri corpore jam proxime dicendum eſt; quod utrum *Arthritis* [ſecun-

(1) Vide *φουικώτατος Liſterum*, Colleg. Doctiſſimum de *Læi Ven.*

cundario] adsciverit , an secus , ex illius ad eam propensione pendet quam plurimum : Quo major erga *Arthritidem* a natura corporis proclivitas , eo planius ab ea [mendaci] absorbetur .

Porto intelligendum est , quod etsi ista *Lues* in *Arthritidem* *mutuatur* sæpissime sit in eodem corpore , tamen nonnunquam diversa complectatur : cum , a marito *Lue* , *Arthritis* in uxore per concubitum accendatur , & illam iste incester . Hujus rei , ut ut nova credatur , historias omnino luculentas & exceptione qualibet majores , quando plures in adversaria retulimus , unam itemque alteram huic Capiti subicere non gravabor .

Nec quidem hanc *Arthritidem* improprie *Lui* secundariam , tametsi corpus aliud exerceat , appellari posse existimo , quandoquidem ex *Lue* *mutuatur* oriatur , illiusque naturam , *eadem* & *eadem* , nihilo certe minus quam si in eodem corpore sit , participet . Neque magis novum aut peregrinum hoc habendum , quam quod , in gnatos aut alumnos , oculorum *Epiphora* , seu quid aliud morbi a parentis aut nutricis *Lue* , derive- tur : quo quidem nihil magis in vulgus notum , aut pervagatum .

VII. Qui hac *Arthritide* conficiantur , sæpe macilenti sunt , tennes , vultu quodammodo subsidenti , & ipsius præsertim , margine , lurido ; oculis retractis , quodque eorum album esse debuerat , interdum subluteo ; voce fusca , & cum roncho edita : verum non naturæ , sed morborum opera . Nimirum duram hi homunciones servitutum fervire : primum *Dea Blandea* obsecuti , deinde *Lue* , postremo *Arthritide* , laborantes .

VIII. Morbi hujus dolores vagi & erratici [sive præcurrentes , sive ejus accessionibus interpositi] a *Rheumatismi* doloribus eo distinguantur , quod hi posteriores a frigore tum ordiri , tum reverti , soleant ; a vagæ *Arthritidos* , ut & a *Rheumatismis* istis ; quod illi , origine nati *Veneræ* , nocturni magis sint : deinde quod , ipsius paroxysmi hac in *Arthritide* , dolores , quam alia quavis , *ceteris paribus* , [ob acriorem causam continentem] atrociore sentiantur . Raro enim videas immanius vociferantes , quam a *Patura* qui dolent articulis . Hoc , inquam , *ceteris paribus* , quatenus ad sanguinem , ad animales spiritus , & ea universa quibuscunque doloris sumus plus ini-

nus patibiles , respiciamus . Quineriam (præmissa , & *Primigenie* doctrina , quod dolor quo vehementior , eo paroxysmus regularis brevior , eo plerunque rarior) nulla unquam *Arthritis* paroxysmos habet adeo acri dolore stipatos , tam cito reversuros , tam simul longum duraturos .

Hæ sunt hujusce affectus certæ quædam conditiones , in eo illustrando signandoque usus & momenti haud exigui : quas si fides optima deficiat , neque semper illæ morbum oculis ex voto subjiciant , quicquid in diagnosi desideratum est , ex *Lue* præcurrenti & ejus vestigiis percunctando adimplendum .

IX. Quousque se laudabiles ostendant paroxysmi , suum habent commodum , suas utilitates ; quam autem primum interciduntur , aut multum illi remittuntur [ut in aliis *Arthritidos* speciebus] non hoc nihil periculi . Si intercisus hisce nulla fuerit eruptio cuticularis , nulla aurium , suborta humiditas , nullum uspiam ulcus , hæmorrhagia nulla , *Congestio* nulla ; sed e contrario , in muliebri sexu sistantur etiam menses , & partus omnino cesset ; Diis hoc iratis accidit . Porta jam obturata omni , & occlusa fugæ via , in caput transferri solet hoc casu materia , *vaporum* & vel apoplexiam , vel motus convulsivos , ægro sere fatales , excitare . Cujus quidem eventui , iterum & sæpius a nobis observati , mentionem idcirco feci , quod ex eo prognosticum haud inutile , tametsi mæstum , identidem eliciatur .

X. In hujus *Symptomaticæ* paroxysmo , ad doloris impetus solito majores quodammodo sedandos , & ex aliqua parte permulcendos , hypnotica dari prodest , pro rei necessitudine [caute tamen , ne illorum abusu materia morbi nervis impingatur] ditionenda . Reliqua , quæ ad paroxysmi therapiam pertinent , ex alio fonte [*Primigenia* scilicet *Arthritide*] ducta , ad hoc negotii facillime accommodantur .

XI. Quæ vero pars curationis *Prophylaxin* habet , & in accessionum intervallis exercenda est , a *Lue Veneræ* mutuatur indicationem . Nam *Antisiphyl.* [cum evacuantibus , tum alternantibus] a miasmate causa morbi conjuncta , sanguis ruendus . Hæc loci e *Lignis ex antimonio* , e *Mercurio* , comparata , quæ quam alia quavis *Arthritide* , in series ac methodos artificiose digesta , commodissime proponantur . Certe

Ma-

Mayernus, (1) experimentis & usu longe nobilissimus, Mercurio [penitissima corporis subeunte, instar viverræ, jugulum morborum petente, Fermenta eorum adorto] arthritidem veneream certo curari, non dubitavit asserere. Si per vires liceat, & nihil adversetur, usus hic eximii Salivatio; quæ tamen in arthritide Primigenia & ægroti & medici votis sæpe excidat, in hac arthritide Symptomatica, ab ipsa Luis ipsissima profluente causa, magnarum esse virium, virtute singulari, æstimanda est. Quæ vero Salivæ optima movendæ ratio, quis modus obeundus? utrum spissus ille, paucis aliquot hebdomadis sed jugi rivo, qui absolvitur; an potius rarus, sed ad tempus diuturnum qui excurrit; utrum continuus, an intercisus eligendus? id, ex ægri rebus omnino decernendum est.

De tempore Ptyalismum instituendi maxime opportuno, ut verbum addam; æstas a nonnullis præfertur, eo forsitan nomine, quod durante illa sanguis scilicet evehitur huic operi paratior habeatur; tum quod a frigore minus ea tempestate periculi: contra facit spirituum languor & impotentia, æstati propria, qua ad ptyalismum inhabilis redditur ægrotans; & media profecto hyeme, qua firmiores sunt *ὀπώριος*, & longe vegetiores, quam æstate, qua fatiscunt, expeditius stadium hoc percurri constat. Verum autem ego malim, & hoc incipiens, quo æger per se ad hoc officii promptus, & tempore, ut ad salivam protrahendam, sic ad vires exinde resarciendas, diutino fortunatus.

Qui Sputum horret, Calomelana per annum exturbari patitur. Dentur idcirco gr. ejus v. cum *astringentibus*, bis die, per triduum, vel quatrimum. Postea Catharticum, quo Mercurius, cum pravis ab eo subactis & devictis humoribus, expellatur. Huic autem muneri Catharticum, quod ventrem leniter, at certo, acuet, sanguinem minus agitet [ne videlicet arthritidis irritetur] imprimis seligendum: conducunt *aque Purgantes* cum Manna hausta, post *Extra-cti seq. 3ß. ad ʒii.* horas ante aliquot deglutitos.

ʒi. Agarici, Hermodact. Helleb. N. Epithymi, Turpeti, Mechoac. ana partes ii. Salis Tart. p. i. cum Spiritu Vini digerendo; exprimendo; tum Scammon. pul. partem unam

addendo; dein evaporando, s. *Extractum*. Repetenda vero hujusmodi purgatio, cum præmisso Calom. quarto vel quinto quoque die, tantisper dum materia *ροσπῆ*, vel tota prorsus expelli, vel evacuando enervari, jure merito credatur. Sin ex ulceribus, & saliva, os affectare Mercurium advertas; ad eum subtrahendum, veluti frequentius, sic etiam copiosius, adhibenda Catharsis: Et quidem hisce per Salivam, per Sedem, excrementis, optime omnium perfectissime quæ miasma hoc eliminari posse cogitandum est.

In sanguinis crasi redimenda, & veneno [si quod intus delituerit] cicurando, nunquam quidem non oportet *Decoct. L. Sri. Sassafr. cum utriusque cortice*, forte & efficax, pro anni tempestate, per hebdomadas aliquot, ne dicam menses, assatim quotidie, post usum Mercurii, miscere.

Aquæ porro Diuretice, quales sunt *Bathonienses, Bamptonenses*, [valentissimum potentissimumque sanguinis *Καδιπρί*] recte diuque perpotæ, ad eluendam morbi hujus materiam non parum promittunt. Cujus quidem rei amplam & luculentam historiam, huic Capiti subjectam licet perlegere.

XII. Quinetiam posthæc, ad majorem cautelam, aut *aque* [si conveniat] omni æstate repetendæ, aut omni vere, & autumno per *Merc. d. & aq. Purgantes*, primum purgare corpus; deinde per *alterantia* [qualia sunt *Cin. & Cerussa antimonii, Æthiops Min. Panacea Hartmanni*] humores ejus corrigere juvabit. Imo quidem iis, qui, vel constitutione infirmiori, vel annosiores, salivam, ventrem, & urinam, moveri respuunt, *antisiphyl.* prædicta, cum *e Lignis Decocto*, summi erunt adjumenti.

Hist. 1. De arthritide impura, aquis Diureticis subacta.

Fœmina quædam e *Brigantio* integerri-
ma, viro dissimili juncta, post annos aliquot dolores sensit, per musculos & membranas exteriores sere omnes, erraticos, rodentes. Caro inter hæc tabescit: vultus pallet: vires enervantur. Currente media ætate, [id quod auspiciato incidit] sæpius enixa est. A quo defie-
rat

(1) In Prolegomenis ad Tractatum de Lue Venerea.

rat ἐν γαστρὶ ἔχειν, *Rheumatismus* (quod dicitur) ingravescit, doloribus nocturnis, iisque peracutis stipatus: præter quos, externarum partium internodia lacescentes, per septimum & octavum ætatis lustrum & quod excurrit, artuum alii juncturarum erant pene omnium, fixi & permanentes; cum earundem tumore, rubore, ardore, cæterisque quod est paroxysmi *arthritici* Πάθος συμφορὰν. Verum, in muliere sanguinis parum calidi, temperante, morboque fatigata, tumores nec in eam molem effeuntur; nec æque rubent, nec pariter dolent, nec quæ alia symptomata sunt, similiter urgent, ac in *arthritide* calida maximeque recta; imo ad *Frigidam* propius accedunt, tempus in diuturnum procurrunt, & cito revertentia *arthritidem* quasi continuam, & perpetuo Παροξυσμὸν, indicant. Quo tempore mulstantur artus, viscera, & quæ intus sunt tuta omnia. Cum ad tempus, etsi pauxillum, isti liberantur, (quod utique non sine summo discrimine plus semel obrigit) illa statim afficiuntur. Tum moribus, gelatina turgidis, ætate fugiente, succedunt rofi, numero complures; granum nunc hordeaceum, nunc sabaceum æquant, *antimonii Mercurii*que *Preparati* longum utebatur; at ab *aquis Diureticis* (quas, ad libram unam alteramque omni mane, plerunque per dimidium anni, aliasque in potum ordinarium perpetuo fere adbibit) omnium maxime profecit. Jam quadragenaria major, & (quod dictu necessarium) matrimonio paucis annis soluta, faciem sic satis coloratam, *Rheumatismum* (ita loqui amat humanitas) mitiorem, robur adauctum, aliaque naturæ revirescentis signa, læte gloriatur. Ob partus aliquam multos, & menses ordinate iuges; ob materiam per articulos pulsam, *arthritida*, si non rectissimam, tamen utilem; ob medicinam opportune & diligenter adhibitam, vitam hæc Matrona piissima, venerabilis, etiamnum agit vitalem, actura [quantum hac in re conjicere datum est] diuturnam.

Probat historia; ex *Lue*, alio corpore existente, posse alio, per concubitum, suboriri *arthritida*; tum etiam *aquis* præsertim *Diureticis*, posse permulceri.

Hist. 2. De *arthritide*, Luis Sobole, a Δυσεντεραι, irritata, Febrim excitante, Caput aggrèssa.

Patursæ quidem adolescentia tactus [cujus perperam tractatæ, qua sanguine, qua viultu, ad senium usque passus est reliquias] vertente nono & decimo vitæ lustris, ex macie pristina corpulentus & habitior factus, Πάθος. Plures ille paroxysmorum vices subierat, tristes sane & calamitosos, [sed rectos & idoneos] cum, ex crapula cibo difficili & inepto avide ingesto facta, αἷμα καὶ χυμὸν affatim ejecit: capitis hebetudine, & vertigine, correptus: pulsu celeri: actu universali. Quando in febres istius tempestatis [erant enim alius plane indolis affectionem istam περιτλὺν referre neutiquam valuerim, & *arthritidos* insultus cum multiformes, tum etiam [tanquam lupi in fabula] semper huic ægro, minima quavis ex causa evidenti, paratos esse recoluerim; ex ea, sed αἰσχυρὰς se fundente, illam optime derivari posse, una cum ægro, & qui affabant aliis harum rerum haud ignaris, judicavi: eique fundamento firmiter innixus, hunc in modum [profecto, quam in febre essentiali, vel capitis morbo quovis idiopathico oportet, longe diversum; imo in horum plerisque contrarium] curationem ordinavi.

Ut *arthritidis* materiam, capiti impactam, illinc excitem, & in artus partim expellam partim invitem, pulverem primum *e Chel. C. C. & Purp. quarta quaque hora*, cum *Jul. Haustu*, exhibeo. Deinde *Phænigmos* [e *Sem. Sinapios*, *Summit. Rutæ*, *Raf. Radicula*, *Halecis fumo indurati ana part. i. Fermenti vet. p. iv. cum aceto vini albi, ad consistentiam Cataplasmatidis*] componi & applicari jubeo. A Pulvere suscitantur *Spiritus*, oritur diaphoresis; a *Phænigmo* malloleis [ea solebant, in hoc corpore, *arthritidos* stativa esse] admoto; & quoties refrixit, quoad tumor hinc inde oriatur, renovato, caput omnino sanum & inclumme redditur, idque præsentissime. Tumoribus, ad majorem cautelam, [ut ne in sanguinem, quod evocatum est, relabatur] epispastica superaddi jubeo; unde ichoris *arthritici* fluxus ad dies aliquot jugis, ad aliquot annos salutaris: mirior enim aliquandiu post *arthritidis*; quod affectionem hanc *arthriticam* esse ab eventu comprobavit. Cum jam ulcuscula per se exsiccarentur

E

tur

tur [nec quidem antea, ne fluxum tam felicem, tam blandum, tam ex omni parte benignum beatumque quodammodo abiscindere videatur] ventriculum, me hortante, movit : diebusque posthæc otiosis *Trifolii Paludosi Infusum*, horis medicinalibus ; *Menses binos*, bono cum fructu quotidie potavit.

Historia confirmat *arthritidem*, *Luis Venereæ* progeniem, posse *Δυσμείστοις* irritari ; posse caput invadere.

Hist. 3. Luis Venereæ succrescens, caput impetens, arthritidis.

SUB hujus sæculi initium, fœmina quædam, ortu incolumis, piissima, lectissima, nec uno nomine spectabilis, marito jam olim patura, nuper *arthritidis*, diro morborum pari, mulctato, & miserrime cruciato, annos circiter viginti nupta, semel bis pepererat ; exinde diu catameniis recte est potita. Postea *Scabiem* habuit, aliam in cubiti summitate, siccam, subfuscâ, multiplicem, cum interstitiis & ambitu purpureo ; aliam in capite subalbidam, squammatim decidentem : in femore, & latere, impetigines, & mali mori maculas : his adde capitis ; in tota parte sinistra, & colli posterioris, dolorem nocturnum. Ad hæc hallucis articuli majoris primum tenebrositas, deinde dolor acutus & pungens ; tumor item, & rubor supervenit ; quæ quidem ita sunt accidentia, ut *arthritidem* ostendant. Certe dolor ad integum usque mensẽ aliquoties mansit, alios atque alios digitorum articulos, pedum etiam plantas, identidem torquens, a cathartico improvide ingesto exacerbatus ; sic ut de *arthritide Luis* succrescente minime dubitandum.

Ut eruptiones tolleretur, ex refrigerantibus nescio, quid temperatum clam oblinivit ; unde brevi caput tremere, manus & pedes *Παραλύσεως* cœpere ; nec erecto corpore stare, nedum ambulare, potuit. Hisce circiter diebus menses supprimuntur, quæque vitia nota & manifesta erant, ab eorum una suppressione nasci putabantur. Caput inde plus solito afficitur, magis enim magisque tremit, vel ex imbecillitate antrorsum inclinat. Cum oculi somno conniverant, horror ingruit universalis, & ex improviso totius subita corporis exultantia. Fugiente somno, brevis stupor, & motus sæpe convulsivi, tum labii superioris, tum oculi sinistri, tum etiam totius capitis.

Oculi porro dolor, visus obscuritas, & caligo. Sub hæc utriusque genu, sed occipitii maxime frigus intolerabile ; faciei rubor erat alvo : soluta refectio ; cum ingravescerent symptomata, nec ; quo illis occurreretur, a quoquam unquam, quod sciam, quicquam adhibitum, [ex prima enim morbi origine, rem ejus totam pertinacissime occultavit] tandem, fallente lingua & tertiatis verbis, summum enarrat, & implorat (heu ! post bellum) auxilium. Nam insultu gravissimo, motibus convulsivis, & *Αναισθησία* comitato, brevi tempore morbus absumit ægram, meliori fato (si Deo visum esset) dignissimam.

Hoc casu miasma *Venereum*, quod & *Podagricum*, intra sanguinem aliquandiu retentum, neque partu frequenti, neque medicamentis, aut diminutum, aut satis cicuratum, naturam aggravare cœpit ; cum inimico illa colluctatur ; & ejus eliminandi satagens, *arthritidem* molitur. Cum autem (ob sanguinem forte *Δυσμείστον*, vel alia aliqua de causa) ad *arthritidem* ægra minus sit proclivis ; cumque per cutim, virus parce expellatur, & jam menses suppressi sint, adeoque fugæ via omnis occlusa ; caput illud aggreditur, & genus nervinum, itaque laborantem opprimit.

Monet historia, *Paturse Podagram* æmulatæ materiam, in aliud corpus aliquando per concubitum infundi ; in illo, veteri sævitia procedere ; caput denique obstructis exeundi viis, adoriri.

Hist. 4. arthritidis Luis επιγαστρικῆς, victu Digestivis, & Equitatione moderata, tandem Intestina invadens, Sanguinis αἵματι καὶ κίττω Missionem pariens.

CUPIDINIS in castris, a prima juventute versatus, miles quidam, *Mollior*, (quod ajunt) *anseris Medulla* : ejusque præliis haud parum confusus, circa mediam ætatem *arthritide* corripitur ; quæ, omni fere anno, suapte sponte, accessiones iteravit ; a malis autem moribus sæpius, supra modum invitata. Cum annos æger nondum quadraginta, in *ascitem* incidit, durum habuit [*Jupiter!*] & ancipitem, quem demum eluctatus, curæ mex aliquanto post occurrentis, se commisit, ut adversus *Podagram* [ipso consistente reo] minime *Primigeniam*, item

item adversus *Hydrops*, prophylaxin obsecrans. Claudum aspicio, emaciatum vultu, præsertim ipsius margine, lurido; sed oculo flagranti, sed animo asacri vividoque.

Et medicinæ, & aquis mineralibus hostem internecinum hortor, quod illis tentare non liceret, diæta & exercitatione, quoad ejus fieri possit, conficere conetur: Ideoque equo, sæpe, & multum, se oblectet; de victu maxime sollicitus, non nisi *Artemis* nutriatur; & a prandio semper *Rubellum* (quod vini genus ventriculo erat gratissimum, & usu diutino probatum) hauriat: mature se in lectum det, parce, vel non cœnatus. Nec quid adhibui medicamento- rum, præter *Infusum Gentianæ*, *Zedoariæ*, & *Cubebarum*, eodem vino paratum, omni mane usurpandum, & *Pil. Stom. cum G.* omni mense, ad tuendam servandamque coctionem, *arthritide* permittente, assumendas.

Horum adjumento (virandis simul iis, quæ obsessent) diu vixit ille, *arthritide* non nisi recta, quantumvis *Symptomatica*, sed acri, [forfan ob peculiarem ejus materiam, magis] sed acerbo dolore comitata prægravatus.

Verum ad senectutis principia perductus, *Febre* cum *Diarrhœa* laboravit, & alvo restricta abdominis secuta est inflatio, ventriculi & intestinorum dolor; austera postmodum materiæ, deinde sanguineæ per os, brevi vero nigra (pariter sanguineæ) per anum missio. Ab ingruente *Dysenteria arthritidis* ei *rois* *ἔσδεν* nulla. Ut his opitularer, per literas rogatus, primo *Leniens præcepti*, *Sennæ* & *Rhab.* *Xerano infusorum*. Tum *Bolum astringentem* & *cardiacum*, [eo nempe, quo in artus expelleretur *arthritidis*] *ter die* cum *Infusi amari* *Haustrum deglutendum*.

Istius hominis initio *Lue*, mox *arthritide*, tum *Hydrope*, iterum *arthritide*, qua recta, qua reflexa & *Dysenteriam* inferente, iisque suo genere gravissimis, affecti, robur & patientiam sæpe demiratus sum: Hæcenim universo animo præsentī, forti, & illis omnibus majori toleravit; spiritu nempe animali firmo, alacri, & elastico donatus; equitando summopere levatus; nam, ex podagra fractum, imbecillum, languidum, eo solo certissime citissimeque frequenter restitutum, observavi. Si status postulaverit, nec *arthritidis* vetuerit paroxysmus, bis terve hebdomada injiciatur enema.

2j. Flor. Chamem. Mi, Sem. Fenic. d.

Carui ana ℥ii. Coq. in aq. font. ℔i. ad ℔. Colatura adde *Cenarini* ℔℔. Ther. andem. ʒi. Sac. rubri ʒiii. f. enema.

Et in tormina *Decoct.* & *Carminantibus*, vesica inclusum, & ventri admodum; aliasque pannus *Vullicus* abdomini imponendus.

Diu illum *Dysenteria* superuisse audio, & tandem emaciatum, morbis & ætate confectum, diem supremum obiisse.

Historia significat *arthritidem Lue venerea* procreatam, victu idoneo, digestivis, sed præsertim equitatione, non parum sublevati, *Dysenteria Productricem* auferri.

Hist. 5. arthritidis, Lue Venereæ superveniens, melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & demum Mortem, inducens.

Occurrit e plebe viri cujusdam historia, natu integri, *Lue*, dum adhuc adole- sceret, corrupti. Huic affectui, multum ope medica retuso, nequaquam extirpato, constanti jam ætate, supernata est *arthritidis*, quæ, lustris minimum tribus, recte agens, & omni anno semel iterumque redux, tandem in *anomaliam* degeneravit: sesquiannum nulla fuit. Exinde æger melancholia, gravedine, caligine, sensim est afflictus; uti etiam vertigine, eaque gravi adeo, ut in notos & familiares sæpe inscius irrueret. Cum iter aliquando intempestive faceret, ex frigore, primum visum, deinde sensibus internis omnibus, ipsoque judicio laeso, per dies aliquot deliravit. *Arthriticos* hos errores esse, quando mihi persuasissimum erat, [& tribus ab incurso mali primo mensibus, eum recurrere immanio- rem, cum, auditus gravitate præmissa, vultus pallore, flatibus ætu & xantho creberrimis, urina limpida copiosaque, spiritu difficili, & demum *Arterochole* accedentibus deprehenderam] quæ medendi ratio plurimum profecit ita se habuit: ut capiti succurratur, sanguinem mitti jubeo; ventremque per enema, per catharticum, subduci; & ad hostem in artus evocandum, utrique malleolo [solebat æger illis dolore] *Phenigmu* applicari, tumoribusque hinc inde ortis *Epispastica*. Humor effluxit ichorosus copiose; magis vero, quod *Cardiaca*, [Pul. Gascon. Vinum Hispanicum rubrum, Sp. vol. oleos] promota in auxilium, & quotidie exhibita, E 2 ad

ad τὰ ἔξωθεν materiam expulere. Porro, in *Prophylaxin* crebra fit per *Pil. Ruffi*, sed lenior, *Purgatio*: Et, utroque latere spinæ, inter homoplatas, fonticulus, sex ipsorum capax.

Atque hisce artibus, laborantem, & tanquam animam agentem, ab ipso orco eripui. Verum materia, propter naturam refragantem, neve satis evocata, neve paroxysmum, utut tentatum, faciens regularem, caput, dudum enervatum, iterum aliquandiu post adorta, ægrum media nocte post somnum placidissimum, *Spasmo* universali correptum, brevi temporis spatio interemit; & indicio fuit, eam, quæ *arthritis* est a *Paturfa* natæ, jam non amplius expulsam, interdum *καλινδρομῶν*, cerebrum adoriri, convulsionem universalem, eamque lethalem, ægro asserre.

C A P U T VIII.

De arthritis Astmatica.

ART. I. **A**sthmati succrescit *Podagra* creberrime pituitosa, sive ei, quod a phlegmate pulmoni inhaerente, & bronchia infarciante, sicque spiritus meatum obstruente, factum est: Hoc in causa morbi hujus idiopathici, proxima & conjuncta, ponitur; dum in primis iis stabulans saburra, & sanguis in canaliculis ad plethoram actus, sociam aliquando operam adjungit, & ad hunc affectum confert κατὰ *ἑντάδα*.

Spiritu hac de causa difficili laborantes, interdum per se, alia ex medicina, nono & decimo plerunque ætatis lustro, raro quidem maturius, *Ποδαλγῶσι*. Si, per vitium inordinatum, *Δυσπνῶσιαν*, aliasve causas antecedentes virium copiosus alitur, & in sanguine congeritur materia, *Podagra* effeatrix, proprio illa Marte potest, & per se, in Paroxysmum erumpere; verum multo facilius paratiusque, si medicina fuerit extimulata.

II. Sunt autem stimulo, huic *arthritidi*, uti aliis plane permultis, cujuscunque fuerint generis, *Cathartica*: quando eorum beneficio, ad amoliendum hostem, eumque in articulos extrudendum, natura promptius & habilis operatur, tum, ad hoc operis, e catharticis *Δρασικώτερα*, præcipue faciunt; quando sanguinem exagitando, [quod ante

dixi] novum asserunt orgasmum, quem e vestigio sequitur alieni *ἐξαγωγῆ*.

Valent hac in parte *alterantia*, ad debellandum *asthma* vulgo adhibita, quotquot uspiam a naturæ partibus stant cardiaca, & in fugando hoste ei opitulantur: quæ quidem alterantia, *antiasthmaticorum* maxima, vel saltem immanis, portio putanda est.

III. De *arthritidos* hujus materia, minime recentem illam esse, sed in corpore quod diu paroxysmum extiterat, in eo se occultans, vel hac de causa merito, suspicari licet, quia nemo repente *Ποδαλγῶσι*. Imo quidem verisimile est, quod in corpore phlegmatico, ruffi agitato, pituita involvatur, simulque cum ea, pulmoni commissa, per sputum illa κατ' *ἑντάδα* excernatur.

Quod ad amplectendam hanc sententiam me impellit, eique confirmandæ stabiliendæque unum sufficere videatur, non leve pondus argumenti, hoc est, (hujusce *arthritidis*, prout observavi, *καρκαρτιστικὸν*) nempe, quod, aliis omnibus *arthritidis* quæ veræ, quæ symptomaticæ speciebus, eo nomine dispar, æstate lætetur. Cum *arthritis* reliqua omnis sua natura hyeme, vel minimum Sole infra æquinoctium vergente; hæc nostra, eo supra, imo ipsum circa Cancris tropicum aliquando erecto, suapte sponte, neque ex causa ulla evidenti *Παρξάγεται*.

IV. Illud tamen nequaquam ita capiendum, ac si hæc *arthritis* omni omnino hyeme prorsus obdormire, neque per illam tempestatem quicquam unquam moliri soleat. Contra *φασιμον* hujus ætiologiam, in eo locari censendum est, quod hyeme, quo quidem perfecto tempore cutis densatur, fallit *διαπνοή*, & in pulmonem mittitur pituita, cum eadem in eum miasma etiam *arthriticum* abripiatur; æstate vero cum superficiem & ambitum corporis humidum evocetur, extra idem tendat & artus appellatur. Ut hyeme ab *asthmate* vincatur, sub ejusque vultu & persona delitescat, æstate, propria eluceat.

V. Propterea quod *arthritidis* hujus materia frequenti expulsionem magnam partem eliminatur, profluere autumno, quod illius paroxysmi, [utut dolore, tumore, rubore, aliisque symptomatibus, satis ad diagnosin signati] raro utique infestissimi cernantur, aut ex eorum numero, qui tofis, qui ulceribus, qui ossium carie, cæterisque fru-

fructibus istiusmodi acerbissimis, vel etiam nodis, doloribus diutinis, & id genus mitioribus, affligunt agros, sed tolerabiles, & æquo animo ferendi sunt.

Cum autem istud sive paroxysmorum tempus, sive eorum clementia, non eo usque huic *arthritis* propria est, ut ex eorum alterutro, vel utroque possit illa inter nosci, quo aliquod *Διλωτικόν*, in medium promam, quotiescunque *asthmatis Pituitoso*, præsertim gravi & diutino; maxime vero omnium, quoties usitate, & ex more subijlitur *arthritis*; hæc ipsa est, quam ego *asthmaticam* appello; primigeniæ, si paroxysmos, eorumque symptomata circumspiciamus, certe persimilem, successione luculentius, & fere sola agnoscendam.

VI. Ex dictis sequitur, quod *arthritis* hæc *asthmatica*, tametsi puram materiam & puram *arthriticam* habere, per seque omnino veram esse concedamus; [quod tamen itane sit, an focus haud definitus facile] quando quidem *asthmatis* submissa est, ipsaque ejus materia quædet, in *Symptomatis* censenda est; habita, videlicet, morborum successionis, & tam primarii, sive genuini, sive spurii (*asthmatis*) quam secundarii [*arthritidis*] ratione.

Ex eoque patet, quam sit ea sui generis *ἐν τῷ πράπτῳ* æstimanda, quam modo peculiari expugnanda, a vera *arthritide* separata, quoniam nullam hæc successionem præ se fert, nullum agnoscit morbum primarium, a cæteris vero *Symptomaticis* quibuscunque, quoniam *asthmate* subnata, ab eo pectoris, spiritus, tussis sputi, considerationem deducit, necessarioque comprehendit.

VII. Ut hæc apertius exponantur, quoties de epicænz hujus *arthritidis*, nunc pulmonem; nunc artus infestantis *ὥσπερ*, constiterit, & curationem meditabimur, haud dubie prodest in priori statu (tametsi *Pituitosam* existimetur *asthma*) rem *arthriticam* non negligere; quin ad *asthma*, quoties ingravescat, depellendum, in externis; simul atque fieri potest, dolorem excitare; quo neinpe facta materię ad articulos *Διαδοχῇ* leveretur pulmo. In eo certe operam locari commodissimam; in eo intentionem utilissimam, non inani conjectura, sed experimentis ex medio usu depromptis, & (ut opinor) ratione fretus, habeo persuasissimum. Hoc igitur spectans, *venæ sectione* vel prorsus abstineo; vel, quam in simplici pituitoso *asthmate*, sanguinem mi-

nori quantitate detraho: ne scilicet natura, missione nimia & improvisa debilitetur, enervetur, & *arthritidi* protrudendæ impar reddatur.

VIII. Catharsin per *aloetica*, sive quævis illa, quæ tum alvum moveant, tum etiam sanguinem exagitant, & in orgasmum adigant, instituo. Novi quendam *asthmaticum*, *arthriticum*; qui *Spiritu Cochlearie aureo Purgante*, [cum *Scammonio*, *Julapio*, vel fortasse *Gambogia* comparato] ad guttas circiter triginta, ex vehiculo convenienti, felicissime creberrimeque utebatur: satis enim hinc deiecit, nec ita diu post optato doluit. Potionem ego sequentem, hujusce classis, sed magnarum virium *arthritico*, secundis avibus, semel iterumque propinavi.

2℥. Fol. Sennæ ʒss. Fibrarum Holleb. nigri, Turpetiana ʒj. Coq. in aq. sant. q. ad ʒiij. Colaturæ adde Syr. e Spina, Elix. Solutis ana ʒss. f. Potio.

Catharses ea quidem *asthmaticis* utilitas, ut, præterquam alvum, etiam pulmonem exonerent; quandoquidem pituitam ab ea tenuari, discutique, sputum abundantius exantlari vulgatissimum est. Atqui purgatione jam semel instituta, non opus erit, ut de illius repetitione (quæ, a pituita simplici *asthmaticis*, per neque *Podagram* medendis, sæpe necessaria) nisi ex intervallo quodam, & urgente nova intus saburra, simus solliciti: ne scil. nimium exhaustiendo, naturam, *arthritidem* rectam & regularem impense desiderantem, alio infauste divertamus.

IX. Ad ea potius progredior, quæ, ut debelletur *asthma* & (illius gratia) commoveatur *arthritis*, validius connituntur: ideoque omni mane; haustum *Infusi anari Chalybeati* misceo, *Bechicis*, ne ventriculo, per se nimium languenti & obtuso, officiant; ad tempus pomeridianum relegatis. Tum vero, quarta circiter hora, iterumque nona vespertina *Bals. Peruviani*, vel *Chiliensis*, vel *Sulf. anisati*, vel *Tinct. Sulf.* Dosis majusculam, [*Tinctura put. gr. xv. ad xx. & de Balsamis simili proportione*] ex Syr. *Balsamici*, vel e *Succo Erysimi*, *Coch. r.* cum altæ sortioris, vel decocti pectoralis clarificati, haustu præcipio.

Post dies aliquot hisce medicamentis collocatos, quamprimum iis effereatur sanguis, & pulsus digitum fortius repeller, statim, extra, loco sæpissime dolenti, admoveatur *Ceratum viride*, vel *Emplastrum Cephalicum*,

cum

cum *Picis Navalis* pari quantitate vel, (si placuerit) *Phenigme*. Tumori demum facto, si locus erit, vel, si in digitis sit tumor, carpo, vel malleolo vicino *Epispasticum*, ut evocetur *arthritis* materia, nec in sanguinem repelli permittatur.

Altero vero statu, quo propria persona agit, & artus invadit *arthritis*, ei studiosius insistendum, per amara, per *chalibeata*, per idonea cujuscunque generis *cardiaca*, si placuerit, excitanda, per involucra, per crepidam, ceterumque mundum articulare, si vigerit, tuenda servandaque. Rata enim esto, & indubitata fidei norma, naturam *asthmatis* descripto per *arthritis* occurrere, medicari, & in ejus paroxysmo, conciliando praestandoque oportere illam adjuvari.

X. Interea vero temporis, si istius ordinis sit *asthmaticus*, qui sputo carere nequit, tametsi dolet articulis, ad illud sive retinendum, sive revocandum, *Beebies* vel e praescriptis in minori quantitate, vel leniora quaedam, ut *Balsamum Gileadense*, seu *Lucatelli*, vespere praesertim, ex vehiculo jam scripto, assumantur: quorum beneficio, mane sequenti sputum egregie projicitur, nec ad meridiem usque [quod ab iisdem, mane demissis, solet evenire] obtrundet appetitus.

Et si dolor & vigilia, comites *arthritis* importuni, premant aegrotantem, hypnotica tamen, quae in *asthmatis* speciebus aliis plerisque omnibus, tum etiam in *arthritis*, nonnunquam ope sunt eximia, virium pene divinarum, in hoc affectu, dosi aliqua notabili non sunt temere largienda; quippe quae, cum multum *asthmatis* pituitoso, tum etiam non parum *arthritis*, sua natura vix satis asperae, repugnent. Ad invitandum somnum, artes exerceantur, ut minus nocivae; quales sunt *Lectio*, *Friccio*, *Palpitatio*, & ejusmodi alia.

XI. Simul ac castra in externis partibus metata est *arthritis*, ibique fixit; abolefcit corporis universi gravitas, spirituum hebetudo, respiratio angusta: tussis magna ex parte discutitur: pituita quod vesiculis inhaesit pulmoneis, ejicitur; perque *arthritis*, jam demum regularem, cautum est, ne quid supra modum in eas infundatur: verum in iis, quibus *Pituitosis* ex consuetudine opus est sputatio, persistit ea usque, sed diminute.

Solet hujus *Symptomatice* paroxysmo adungi (qui, cum *asthmatis* *Pituitoso*, tum

ita *arthritis* vera interdum a satellitio) *pedum tumor serosus*, digitum accipiens, aegro saepe metum hydropis incuriens; qui tamen brevi temporis spatio, ambulatione, & motu corporis leni & idoneo aufertur. Hujus item pellendi ergo, frictio, bis die peracta, cum linteo crassiori, adhuc beatur.

XII. Qui nuper hac *arthritis* descendunt, in regionem eos apertam, & ventilatam quam primum migrare, equitatione crebra exerceri, convenit: movetur enim inde, quod in pulmone reliquum est pituitae; & simul is sanatur, & tono restituitur: quinimo spiritus eo reficiuntur animales, redintegratur appetitus, instauratur oeconomia. Et quidem hunc in modum tractatos, ex hoc affectu vegetiores, & quam ante aggressionem longe tutiores observavi, donec otio, satietate, victu dapili & opiparo, eidem iterum tradantur.

Cui quidem malo ut quodammodo occurrerem, e re futurum arbitror, cibi potusque rationem aptam accurate prosequi; ventriculum digestivis roborare, *Aperientes* fices, & reliquias eccoproticis identidem subducere; itaque tum *asthma*, tum *arthritis* opportune praecavere.

XIII. Sicco nonnunquam *asthmatis*, exquisito, dicam, an notho? certe idiopathico, nec inflationibus nato, subnectitur *arthritis*. Spitandi premuntur organa, per humores quantitate nimia illis commissos, neque vero in vesiculis pulmoneis simul depositos, & spiritus pro causa hujus magnitudine plus minus est difficilis: tussicula est, anhelatio: & pectus interdum maxime gravatum. Nullos hoc *asthma* [quantum ego rescivi] aggreditur, nisi partium insigni conformatione, vel inclinatione hereditaria, ei qui proclives sunt; & autumnos illos, & euro increbrescente (pro more pituitosi) maximopere infestat.

Cum aliquandiu saevit, interdum ei se adjungit *arthritis*, tam cito secuta, & ea spiritus levatione, quae humorum *Metastasi* in externas partes; eoque harum dolore, qui *arthritis*, aut genuinam, aut eam probe simulantem, abunde monstrat.

XIV. In *arthritis* hac *asthmatica* per venae sectionem, & purgationem materia pectore detrahenda, tum iis, spiritus animales quae diffundant; quae per fibras longe projiciant; quae motus eorum regant; maxime vero omnium, quae in artus materiam pellant, ibique figant, omnino infest-

stendum est. Neque enim inhibeatur hæc *arthritis*, multo minus supprimatur repellaturque atque adeo intendatur, in ægri salutem augeatur. Minime vero dubitandum, quin ægri vita & incolumitas per *arthritis* recte moderatam conservetur, san- ciatur.

Arthritis asthmate, qua sicco, qua pituitoso nata, exemplum mox subijciam, *asthmate* ab inflatione [per nobilissimum *Floyerum*, graphice depicto] nulla unquam, quod meminerim, est subnata.

Historia 1. De asthmate Pituitoso, per arthritis mitigato.

Vetus quidam e proximo, triginta annos *Δυσπνοϊκός* labori olim assuetus, nuper ob ætatem emeritus, ideoque crassior, & obesior factus, difficilius spiravit. Hyeme, Anni 1696. [quo quidem tempore, propter autumnum humidiorum, & frigus inde impressionum, grassabantur *catarrhi*] multum laceffabatur ea *asthmatis* specie, quæ (a materia) *pituitosa* nuncupetur. Pectoris enim oppressione, spiritu sublimi laboravit, & deinde tussi, primum arida, postea pituitam exantlante, crassam & tenacem. Neque spiritum sine anhelatione traxit, neque cervice nisi noctu erecta; eo vero facilius, quo pituitæ plus emissum.

Ut opem feram, ex curatione *asthmatis* familiati, ventrem ter quater, diebus quatuor interpositis, subduco, majorique deinceps intervallo. *Anacatharsin* ad augendam *Massæ pillularis* ℞. ex *Linæo*, *Cochleari*, quarta pomeridiana & hora somni, deglutit, cum vini medicati haustu: omni vero mane, quæ ventriculum tueantur *Infusi amari alterantis*, *Xerano compati*, *coch. aliquos*.

℞. Bals. Lucat. 3℞. Flor. Benzoin 3i. Bals. Sulf. anisati 3℞. Succ. Glycyrr. 3i. cum pice liq. f. *Massa pillularis*.

℞. Syr. e Succ. Erysim. Ol. amygd. d. r. ana. p. a. cum Sacch. cryst. probe temperando, f. *Linæus*.

℞. Alsi incis. 3℞. Sem. anisi, croci ana 3℞. Infundi in *Xerani* ℞i. post debitam alterationem coletur *Infusum*.

Post aliquod tempus [ut mutatione *Medicamentorum a Nausea* caveretur] *Tinct. Sulf. gut. xii. ex Syr. Bals. coch. i. pilularum loco assumpsit*.

Ægro hisce sublevato sit, ut *Προφύλαξιν*

aggredi jam liceret, ad eam præstandam, *Xerani*, *Rud. Gens. Summit. abs. ℥. cent. M. Marrub. albi*, & *Fv. cubeb. alterati*, haustum, omni mane *Senex* potavit, idque per menses multos.

Horum ideo remediorum mentio a nobis facta, quoniam iis prospere utebatur, tum ea hyeme, tum post sæpissime. Nam cum *asthma*, per reliquum vitæ, sub brumale solstitium, semper recurreret, ad hæc ille, certissima præsidia, recurrere solebat.

Anno 1698. vertente vere, cum insultum *asthma* vice jam tertia, tristem & severum renovasset, ægro in hunc usque diem *arthritis* (quod putavit) immuni, neque de de illa somnianti quidem, dolet halli pedis sinistri articulus major: inflammatur, rubet, ardet, more pertinaci & plane *Podagrino*. Gratulor vicino, de morbi tam commodi, tam salutis, adventu. Contra ille obmurmurare, dolorisque impatiens, ex dolore periculum metiri. Ego vero exhortor, pulmonem eo liberati, anhelationem minui, contendo, & *asthma* per *arthritis* oportere vinci.

Hyemem Anni 1700. tolerabilem habuit, ver insequens periculosum, sole enim supra æquinoctium evecto, spiritus admodum gravis, imo quam per anteauctum sesquiannum gravior; agritudo universalis: appetitus prostratus: nausea & sitis erat permolesta. Cum ita diu valetudine quadam obscura teneretur, solstitio instante æstivo, tempestate fervidissima, paroxysmorum, quos unquam perpeffus erat, omnium gravissimo, correptus est *arthritis*. Per universum pedis convexum extensa est inflammatio, elata, ardens; ad calcem, ad tibie medium tumor; pulmo ab incipiente eo tutior, expeditior; ventriculus avidior. Placuit novam rerum faciem obtueri; per jucundam humorum *Μεταρραξι* contemplati; ad eamque promovendam *Tinct. M. & Elix. propriæ. d. ang. gutt. xx. cum Xerani amaris alterati Haustu*, bis in die, sumendas imperavi. Porro vini istius [quando jam ætate grandiori delictum erat, neque ventriculo ingratum] ℥i. quotidie bibendam quonempe, miasmata *arthritis* in pedem exulante, sanguis purgaretur; defenderetur pulmo.

Menses circiter binos duravit paroxysmus, & ægrum usquequaque beatorem fecit, vegetum nempe, acutum, alacrem, ventriculo præter modum avido & latranti, ut decennio

centio novissimo nunquam magis. Unus filum pedis tumor gravatum habuit, qui tamen commodum suum, & utilitatem tadio longe majorem attulit; cum a materia pedi affixa pulmoni melius cessisse, minime indubitandum est.

De hujus aegri *arthritis* nequaquam prtereundum, quod aliis *Speciebus*, quæ Anni dimidio hyemali sua natura *παροξυσμικαὶ* ad unam omnes, hac ex parte multum ab- similis, æstatem amat: ne semel quidem in externi, partibus, sole citra æquinoctium versato, jam ter emicuit, & paroxysmos totidem perfectissimos exegit.

Paroxysmi, modo tam memorabili, tam præter morem reduces, istius *asthmatis* naturam indignant, exponunt; & in *arthritis* illud ex facili migraturum esse, & diebus saltem hisce postremis, a puto *asthmate* pectus non multum abhorre- monstrant.

Hist. 2. De *arthritis*, *asthmate* ex
Plethora, feliciter
adjuncta.

Vir nobilis, crassus; plethoricus, decen- nio labente sexto, *asthmate*, cui ex thoracis brevitæte, abdominis prominentia, præcordiorum distensione, pronus erat, afficiebatur. Quo me tempore primum ac- cessit, afflictum ægrotavit; pene suffoca- tus, spiritum traxit sublimem, & ob or- gana constricta laboriose: rufiando nihil excrevit.

Spiritus impedimenta, per cataractin & ve- næ sectionem deduco. Deinde, quibus co- ctio perficiatur, itaque status pervertatur, quibus roborentur *ὀρεῖναι*, dilatentur, expandantur, adeoque modo omni augea- tur respirandi spatium; ea præcipio quæ sequuntur.

℞. Conf. abs. Pul. Rad. ari c. ana
℥i. chal. Nutrit. ℞. Syr. Melissoph. qs.
f. Bolus.

℞. G. ammon. Vedellii ana ℥i℥. Flor.
Benzoin, Extr. croci aa. ℥. Balsam. Lucat.
q. s. f. Pilul.

℞. Aq. Rutæ, Hyssopi aa ℥xii. Pæon. c.
Bryon. c. aa ℥ix. Marg. pp. ℥℥. Sacch.

cryst. qs. f. Jul.

Sumas Bolum. omni mane, Pil. quinque
omni nocte cum Julap. Haustu, eique instil-
lentur Tinct. cast. gutt. xx.

Quod liberius spiravit, id *Evacuantiæ*; quod adhuc multo magis, id ex proposito fecerunt *alterantiæ*, sed diutius usurpata. Isti vero libertati par, novum exoritur malum, si modo ita possit appellari, quod in vitæ tutelam, quodque ægro auspiciatissimum evenit: Quippe compositionum jam dictarum & istiusmodi aliarum opera factum est, quod humeri dolor, tumor, ru- bor, ne plura, quod *arthritis* emicuit; quod per artus, ex eo tempore quam plurimos peragravit: quod frequentem in eos crude- litatem exercuit: quod exinde pectori pari mensura longe melius. Constat enim, & omni majus est exceptione, quod ab *ar- thritidis* exortu spiritui pulmonique longe felicius cessit; ut ægro jam sere unicum restet tempori tam *arthritis*, quam *asthmatis*, causas remotiores prævenire; aut deinceps *asthma* per *arthritis* cu- rare.

De *arthritis* Febri Sucedanea.

ART. I. **A** *Rehritides* chronicis oriundas hucusque dedimus de illis Febre, qua continua, qua Intermittente, morbo acuto, quæ nascuntur hodie sermo- nem faciemus.

A *Febricula* quadam *arthritis* paroxy- smum serme omnem exordiri, manifestum est. Differt autem illa, brevis scil. parva, symptomatica, quoque ad Tribum, aut *Fe- brium* perfectarum classem ullam referri ne- quit, ab ea, quæ a nobis hoc tempore di- cenda, exquisita, & in genere suo consum- mata est.

II. Cum *Febris* nonnullius speciei ratio, & essentia in eo poni videatur, quod esser- vescentia sit, ob *ισχυρῶς* & indomitum aliquid, in sanguine contentum, tumque perturbans, (illius nempe expellendi ergo) concitata. Aliæ vero *Febres*, (1) quod ab auctore nupero argute propositum ex obstru- ctis glandulis, & inæquali, quæ deinde se- quitur, enormique fermentatione, oriri cen- seant.

(1) Vide *Synochorum Theoriam Novam*, addam etiam *Αἰτιολογικὰ τῶν*, impressam

Londoni Anno 1711.

seantur. Immo quidem omnes, cujuscunque generis sint, hoc inter se commune habeant, & in quo convenient, quod sanguinis motum, & orgasmum ægrotanti talem faciant, qui supra naturæ tenorem, (mitis ille & benignus esse reperitur) immodicus, vehemens, & morbosus est: palam esse reor, quicquid horum respicias, quemcumque fontem adeas, *Febris in arthritidem abiturum* & Πᾶσι βῆσις, ut naturæ, sic rationi consentaneam, deduci posse perfacile.

III. Ut enim hisce singulis parumper instam, quoties a miasmate, (quod prius dixi) *Febris* occæpit; nec incomprehensibile, nec explicatu difficile est, ab eodem primum concito, & debacchanti, *Febrem*, ab ipso postea lenito, subactoque, *arthritidem* accersiri; sic, ut eadem sit utriusque causa (quæ dicitur) conjuncta, sed diverso modo longeque dissimili agens; nunc iracunde omnia, supera, & infera, conturbando, pacate nunc, & leniter, rem gerendo.

Cui quidem opinioni favet id quod sequitur, cum experientia maxime conveniens, esse nempe virus *arthriticum* sanguini movendo, *Febri* concitandæ valde per se appositum; quodque raro ut paroxysmus [integrum volo, & numeris absolutum,] sit ἀπύκνως committat. His autem addere proclive est, quod idem, quoties exulare arduum est, orgias in sanguine pertinaces, id est *Febrim* accendat, quoque magis arduum, eo magis pertinaces. Itaque materia, sive *Febrilis*, sive etiam *arthritica*, utrumque potest affectum, tam videlicet *Febrim*, quam *arthritida* progignere.

IV. Sin a glandulis obstructis, (quod altero loco confirmavi) *Febris* oriatur, miasma tamen *arthriticum*, in sanguine quiescens, & obscurum, sive per hanc, sive per aliam quamcumque *Febrilem* effervescentia, in paroxysmum adigi posse, & impelli, nihil utique vetat, quin etiam verisimile est. Quando per æstum ambulando, equitando, aliove quovis exercitationis genere, adscitum, sive etiam diaphoreticis, interne sumptis, sanguinem exagitantibus, paroxysmum effici posse certissimum est, & frequenti constat experimento.

V. *Arthritidos* hujus a *Febre* descendentes ortum, & natales, quam quæ maxime, illustant ea, quæ a nobis de *angina arthritica* in *anomalis* sunt perscripta. Quamquam enim *angina* illa videatur, at manifeste sit *arthritidis anomala*, [quod suo loco divulgabitur] ideoque infra debeat exquiri;

Sydenham Opera Med. Tom. II.

tamen in præsentia notari potest, hanc *arthritidem* non nisi *Febre*, eaque magna, & gravi præcedente, esse.

Ratum igitur esto, & persuasissimum, *Febri*, id est, morbo acuto, non minus certo, quam hydropi, quam lvi venereæ, quam scorbuti, quam morbo hypochondriaco, quam alii cuivis affectui, chronico, & diuturno, *arthritidem*, tamen si forte rarius, supervenire.

VI. Ratione paroxysmorum, una est *arthritidis* ex *Febre* nata; quandoquidem illi [ut istam rem video] & inter se, & ab *arthritidis primigenie* paroxysmis haud multum discrepant. Ratione vero ortus, non uno nomine diversa est, & a se dissentiens. Alia enim *arthritidis* ex materia *Febrili* παροξυσμός; alia ex tranquilla, & dormiente; alia ex ipsa *Febris* materia; alia ex diversa, & a febrili distincta; sed per *Febrim* in paroxysmum casu & fortuito eveniēte, procreatur; alia habitudini πυρετικῇ in *Febrem* crebro erumpenti, sed tandem intercissæ; alia *Febris* insultui subjicitur; alia *Febri* continuæ; alia intermittenti; alia denique usitate, & ordinis quadam perpetuitate; alia semel tantum, & quasi casu. Harum ego exempla statim exponam, & ea quæ dicuntur confirmabo experimentis.

VII. De curatione monendum, quod quæ febri, sive πυρόχῳ, [cujus exemplum est insigne] sive πυρετῷ, subjiciatur *arthritidis*, sic, ut ea gliscente, & ferociam exercente hæc in conspectum se det, omni diligentia, summo, quo possumus, studio promovenda est; quo nempe per illius augmentum minuat *Febris*. Et quidem omne illud, quod, in curanda hujusmodi symptomatica, notatu dignum & diligentius persequendum invenitur, in ea provehenda collocatur. Cujus quidem rei, qua perfici possit, methodus, quando toties hoc scripto enarratur, non est, hoc loco quod de illa speciatim agam.

Verum in hujusce *arthritidis* prophylaxi navanda est opera, ut *Febris* illius, cujus ea symptomatica fœtus est & germen, habeatur ratio. Si habitudine, uti dixi, πυρετικῇ *arthritidis* oritur; in eo laborandum, ut istam tum habitudinem, tum *arthritidem*, efficiens materia, *Venæ sectione*, *Catharticis*, [lenientibus, & blandis,] aquis *Diureticis*, *Dietæ Lactææ*, & istiusmodi aliis, in *arthritide Calida* præscribi solitis, exterminetur, corrigatur, prævertatur.

F

Si

Si Febri Ερυσιπιασμοδον supervenire, eique crebro (in constitutione cholericâ, quod aliquando exploratum) subesse, gestiat *arthritis*; cum utrumque morbum, naturæ (sui defensionem molientis, & alienum nunc per ambitum corporis, nunc per articulos expellentis) opus esse cogitandum est, eniti oportebit, ut, dum insultus sit, utrique faveatur; Febri scil. per diaphoretica, *arthritis* per cardiaca, causam utriusque continentem expellendo; & dum vacatio fuerit, causa utriusque antecedens *aquis Diureticis* eluenda, Lacte asinino, & mediæ materiæ diætâ, permulcenda.

Simile fere modo procedendum, si ab ulla alia Febre ortum habet *arthritis*; illius scil. prophylaxis secundum morbum antecedentem omnino instituenda, & in affectos studiosè derivanda.

Hist. 1. *arthritis Synocha Secundaria.*

Mercator Exoniensis, suavissimis moribus, & leni vir ingenio, vultu florido, & constitutione sanguinea donatus, Cerei & Baccho (quod quidem illius temperamenti hominibus familiare) per ætatem mediam indulgendo, favente etiam corporis ad *arthritis* inclinatione hæreditaria, septimum, vel octavum agens ætatis lustrum, illa corripiebatur.

Dolor hujus affectionis signum prima acie luculentum, per annos plures *πλευραχός*, hos illos artus pervagatus est, rheumaticus esse visus; neque prius quam articulis est affixus, arthriticus censebatur. Hic autem dolor, hæc *arthritis* ita obfirmata est, ut æger, annos habens vix quinquaginta, membra permolestè traheret, gravia scilicet, *δυσκίνητα*.

Catarrhis item, autumno & hyeme fauces usitate obsidentibus, infestabatur; qui materiam forsitan *arthriticam* ex aliqua parte dimitterent, & imminuerent.

Sexagenarius prædium petiit suburbanum, ubi ob ærem apricum & bene ventilatum, victu pleniori se implevit. Exinde per biennium, articulis parum doluit; sed coloratior, sed habitior factus est. At, vix arthriticis crassescenscibus! Dum ita res erat, & ad morbum aliquem magnum & gravem corpus paratum, ex frigore mense Octobri 1701. febricitavit; & quidem paulo post hæc infestissime. Algor erat, sopor, lingua subfusca, tussis, dolor lateris, qui sanguinis missionem suadere videretur: febrium mos,

per illam tempestatem epidemicorum malus, diffusit: pulsus ægri languidus & inæqualis, cum voce tremula, suspirio frequenti, spirituum inconstantia repugnarunt.

Ego certe remmecom volvens, materiam *arthriticam*, seu *Febrilem*, seu *arthriticam*, in ambitum corporis oportere, & quidem commodissime per cardiaca & diaphoretica posse extrudi, febremque optime judicari opinatus, sic præcepi.

℞. Pulv. Lapid. Contray. ʒj. conf. Lujule ʒj. Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus, quarta, 5ta, vel 6ta quaque hora [ea scilicet frequentia, quæ ad excitandam diaphoresin suffecerit] assumendus, cum Jul. Haustu.

℞. Aq. Melissæ. lactis alex. ana ʒvi. Tberiac. Epidom, ana ʒiii. Margar. pp. ʒss. Sacchar. qs. f. Julap.

℞. Rad. Petasit. ʒii. Scorzon. Cond. ʒi. Hord. mundat. ʒss. coq. in aq. Font. ʒiv. ad ii. colaturæ addo Sacch. Crystal. qs. f. Decoctum Nycthemeri spatio ebibendum.

Ex horum usu sudor extillavit, emanavit; & inter hæc emicuit dolor pedis articularis. Partium mearum esse duxi naturæ obsecundare, & pro virili dolorem intendere, tumorem excitare, materiam artubus infigere. Quocirca *Phænigmenum ex Ras. Radicula, Sem. Sinapios, &c.* pedi affecto applicavi. Hinc paroxysmus *arthritidos* absolutus, dolore vehementi, tumore, ardore, &c. notabili signorum globo stipatus, progrediente paroxysmo, & quidem pro ejus progressu, declinavit febris. Facta denuo *ἀνυπαξία*, propter animales spiritus, qua Febre, qua *arthritide*, debilitatos, & pessundatos, propter appetitum debilem, & prostratum, instaurandum, *infusi amari alterantis* haustum bis quotidie potavit.

Tametsi omnis *arthritidas* paroxysmus *Febrim* habeat, in prima acie flammam excitantem, & quidem in plethoricis & sanguineis simili fere modo, & utriusque mensura, ut qui multum doliturus sit, multum ante febricitet, & contrario; non adeo tamen accendi solet evehique, nec ita perseverare, febris ista *arthritidis* paroxysmo præludens, ac quæ modo a nobis declarata est. Ideoque febrim istam *Essentialem* esse tandem in *arthritida* desinentem, pro certissimo habendum.

Tanti esse judico, isthæc commemorare. Primum, ut ostendam *arthritida*, non semper ratione totius morbi, sed & unius ratione paroxysmi, posse esse aliquando secundariam. Dein-

Deinde, hujus nostræ symptomaticæ paroxysmum, quam maxime possumus esse promovendum, augendum que, ut illius augmento de morbi primarii, de *Febris acrimonia* & viribus, derogeretur.

Hist. 2. De arthritide Habitudoιν τυραννικῇ Subjecta.

Vixit jampridem apud nos spectabilis & illustris scæmina, vultu vitali, temperamento post hominum memoriam maxime sanguineo, patre prognata *arthritico*; quæ, dum media ætas ageretur, *Febre*, eaque magna, creberrime revertenti, & raro annum amplius absenti, laceffita est. Quicquid inidonei & naturæ proposito alieni, in sanguine coactum, per illam magnopere, temporibus stasis, deturbatum est; sanguis expurgatus; atque adeo res salutis facta recta, & ad tempus aliquot immunis. Cum vero, progressu ætatis, sanguis imbecillior, & efferrî minus proclivis erat; *Febris* intercidit, ex eoque tempore [quamvis ægra sæpissime enixa est, nec adhuc sefellere, quin etiam more prorsus salutari fluxere, catamenia] debito profilit *arthritis*; non ea quidem frigida, segnis, ignava, lento gradu prorepens, paroxysmum habens languentem, at diffusum, & ad temporis spatium excurrentem,] qualis solet esse scæminarum] sed e diverso vegeta, sed acuta; quæ calorem habuit universalem intensum, partis affectæ inflammatum; quæ ruborem plane igneum; quæ tumorem insigniter protuberantem; quæ dolorem acriter mordentem; quæ paroxysmi cujusque symptomata difficilia, gravia, rapidiori gyro exacta; quæ denique paroxysmum brevi circuitu redeuntem, & animi alacritatem articulorum nodos tofaceos, cæteraquæ *arthritidis* calidissimæ consummatissimæque vestigia relinquentem est amplexa. At [quod hoc capite præsertim observandum] a *Febre* ad *arthritidem* tam propere, transituque tam exiguo, abripiebatur ægra, ab incunabulis affecta; ut materiam in sanguine latentem, primum per *Febrem*, ea vero cessante per *arthritidem* ejici, sine ulla dubitatione statuendum: Sic, ut *arthritis* superveniat *Febris*, & [quod in præsentia discutiendum] ex istius quasi cineribus exoriatur.

Hist. 3. De arthritide, cum Febre
Ε'πυσπιλατίνδα vices
exercente.

Nobilissimus senex, hypochondriacus, *arthriticus*, paroxysmos habuit olim frequentes; per biennium ante quam hæc scriberem, nullum. Delinquente verum *arthritide* regulari, simili, proportionem ingruit vertigo; & interdum *Α'ναρθεσία*, ut, his affectibus procedendo longius, æger in humum persæpe caderet; & ne cum damno præcipitaret, summum erat periculum. Quinetiam, membranz, & ligamenta cervicis, per acceptum miasma *arthriticum*, dolere multum affecta, spasmo identidem riguerunt. Nuper item ventriculus agrotavit, acidum, erosum, cholericum ejiciens. Hoc ego tempore accersitus, & hosce capitis affectus, meras esse *arthritidis* nuper occultatz anomalies advertens, quæ ad materiam ex capite ducendam, & vel e corpore, vel in artus, sollicitandam, per venæ sectionem, & catharsin, erant necessaria, persequi destinaveram; cum (eccam!) ultro se transfert *arthritis*: ejus vero, tanquam clavo trabali, sistendæ figendæque gratia, *Phænigum* in præscriptis dedi.

24. Fermenti veteris partes .iii. Raf. Raph. Sylvestris, Sem. Sinapios. Fimi Columbini ana P. i. cum aceto vini albi ad Cataplasmatem consistentiam temperentur super linteo duplicato pars calida ostendatur, totis utriusque pedibus applicanda; laneis cingenda, cum refrigerit repetenda, donec usque tumor augeatur.

Si ex doloribus Syncope suboriatur, Sp. C. C. gutt. aliquot cum Jul. Cardiaci Coch. quatuor vel quinque assumantur.

Horas post duas tumuit utrinque malleolus; ex eoque caput, supra quam dici potest, allevatum. Diu manebat inflammatio; oculi vigor restitutus: capitis tutela est. Istam autem historiam, [alius certe inscriptionis, si modo dicta perpendamus] huc loci retulimus, quod, de hoc affectu, cum ægroti Medico familiari & domestico, quo tempore nobis sermo intercederet, nuntiavit vir præclarus, omnem hanc *arthritidem* ex *Febricula* pendere; quæ, eruptionibus quibusdam in cute miliaribus sociata, commode, & cum sanguinis depuratione, vigere, & insultus anniversarios agere solet; nuper autem intermitteret: ea catere cum nequireret æger, sic, ut dictum est, *arthritide* laboravit.

Hist. 4. *Quartanam, Corticem suppressam, arthritis sequitur cum arenulis.*

NEc continuè tantummodo, *Febri* etiam *Intermittenti*, pedissequa est *arthritis*: Cujus rei historiam, luculentam (Hercules!) & notabilem, ad hæc admiscere non gravabor. Etiamnum in vivis est ob præclare acta vir insignis, qui, ante decennium & quod excurrit, de valetudine, tum præterita, tum eo tempore præsentis, certiore me sermone fecit. Fuit illi, robusto a natura & atletico, nec adolescentiam prætergresso, ob tabem forte veneream, [hoc enim subolebat] corpus summe sceleratum, *Κακοχυμία* mire inquinatum; sub qua *Προσγυμνή* Febre primum *Quartana* correptus, eaque tum gravi, tum diutius, confectus est: donec cortice [quem *αἰὼς οὐ κίετο* præcessit catharsi] Peruano levaretur. Nondum hebdomada quartana siluit, cum inopinato doluit, tumuitque, & quidem tum temporis primum pedis digiti majoris articulus. *Podagra* erat, signis suis diacriticis satis superque manifesta. Ut morbus non tam periri & deleri, quam sopiri; non tam extirpari, & de medio pelli, quam vultum mutare videatur. Hoc autem casu fieri ne quis existimet, urgente, non ita diu post, eadem necessitate, *Quartana* scil. recidiva; *Febris* eundem cum repetere necessum erat, idem iterum evenit, præclusa etenim per *Quartanam* exturbandi hostem methodo, natura ejus auxilium molitur, & quidem derepente, [sic, ut prius] per *arthritis*.

Cum *arthritis* ægrum deseruit, depravato sanguine & humorum *ἁρμόσι* penitus eversa, substituit sibi alterum in ægro exercendo quasi collegam, *Calculum*. Materia per renes partim expulsa, & eo loci in arenulas coacta, & concreta, vomitum, *Ἐρπυγγοίαι* dolores acerbissimos, cruciatus intolerabiles, induxit; eosque tam frequentes, ut rara sex mensium ab his vacatio; quin affectus hujus vel illius esset insultus; & eorum fere alternatim. Longe hinc agentem quando ita voluit per literas suasi, ut debita præparatione, per venæ sectionem, per utranque catharum, præmissa, aquis diureticis sanguinem purgaret. Vino, quoniam ei inimicum, erat, & perraro impune haustum, penitus abstineret. Quid horum factum sit, quave utilitate, mihi per distantiam omnino latet.

Hist. 5. *De Quartana in arthritisdem mutata.*

IN morborum successionibus & derivationibus explicandis, nonnullius momenti videatur id, quod de *Quartana* in *arthritisdem* mutata, altero jam exemplo, profertur. Vitam hoc tempore apud nos urbanam sequitur, insigni probitate, nec quo melior est, homo; qui, cum media circiter ætate esset, per autumnos septem ex aliis aliis, ut ab ipso audiui, laboraverat *Quartana*: exeunte Anno 1696. misere torquebatur. Ut ægro natura imbecillo debili- que primo quoque tempore Medicus subveniret, per *Decoctum Corticis*, & *Opiata*, morbum sufflaminavit, *paroxysmos* ejus suppressit: quæ ad auferendam, & expellendam morbi materiam opus essent, iis ad tempus opportunum & magis idoneum necessario dilatis. Non desuerunt, qui *paroxysmis* liberato, & immuni, ut a reliquiis *Febrilibus* eum tuerentur, certissimum probatissimumque hac in re auxilium, *acidulas* proponebant, & tantum inducias, non autem pacem, inire morbum, acriter urgebant. Hisce vero posthabitis vitæ genus quietum, neque laboriosum satis agens, ab *arthritisdem*, quam antea parvam, & mediocre tulit, gravi nunc & molesta non ita post desedit. Recurrit *arthritis Quartane* copiis adjuncta, tum multo fortior, tum item frequentior: variis postea symptomatibus signata, morem varium affecuta, donec æger *arthritisdem*, *Quartane* viribus adaucta depressus, nec ab imbecillitate ei vel tolerandæ, vel carendæ par, e vivis excessit.

C A P U T X.

De Arthritisdem ex Colica.

ART. I. **A**ffectio *Colica*, sic a veteribus ab intestino *Colo* nominata [quamvis *Cecum*, & *Tenue* quodque intestinum, imo *Ventriculum* eodem affici certissimum est] hisce regionibus adeo gravior, ut in morbis hujus populi pervagatissimis, tanquam vernaculus habeatur.

Prætermissa vero *Colica*, cum fortuita, tum symptomatica, tum hysterica pure dicta, aliisque ejus speciebus, quæ ad *Dionysum* nostrum nequaquam pertinent; ut de illa tantum, quæ *arthritisdem* præcurrere, in

in eamque (falsam & mendacem) mutari solet , faciam ferronem , est illa diuturna , alvo plerunque dura , creberrimis interdum *Dejectionibus* soluta , dolore porius constanti & obruso , quam acri & acuto signata ; nec non eos potissimum invadit , quibus *Intestinalis* fistula muco parum oblita , vel quibus illius fibræ tenuiores , vel spiritus hæc incolentes sunt teneriores ; citoque irritabiles . Quique ad hoc morbi homines a natura proni sunt , ex pravo victu , frigore vel *Autumno* , causis hac in re procacatilis , in eum præcipitant .

II. Quoniam vero *Colica* , quæ *arthritidem* antecedit , natura multiplex & diversa est , ut de hac aperte & luculenter dicam , de variis illius membris omnino aliquid differendum .

Alia igitur , a materia peccante , *Biliofa* dicitur , & ei qui proclives sunt ætate adulta , maxime vero si natura *ὀυλαγχρως* sunt , & cœli æstus , aut iniqua victus ratio præcessit , torminibus primum , deinde nausea , sapore ingrato , amaro , & vomitione postmodum *Cholerica* , premuntur . Alvus his diebus astricta , at incommode . Urina ruffa ; faciei , sed oculorum præcipue , quod album esse debuerat , fit luteum . In bilis per os ejectione peculiare aliquid notandum , quod in scrupulis positum nonnunquam ægrum male habet : a sumpto quippe emetico , nifus & conatus inter robustissimos , bilis sæpe ne hilum ejicitur ; quæ tamen prompta alias & absque stimulo libere solet exterminari . Bilis hæc incerta per os emissio , ejus in duodenum vel saltem in ventriculum impulso flumini similiter incerto , videtur respondere . Cum intestinis inhærendo ea diu laceffivit , ab alvi duritie suppressa & retenta , sanguinem redux per lacteas subintrat , eumque tam incendit , ut hoc tempore febriculam , æstu sitique immodica , urina icterica ex luteo rubenti , cure arida & densa , pulsu frequenti , & elato , manifestam , liceat observare , per sanguinem materia ad caput usitate fertur , & *ὀυλαγχρως* atrocissime impetens , aut ægrum apoplexia percussum derepente interimit , aut in nervos se insinuans eos resolvit .

III. Hoc , inquam , morbi hujus *ἄσθενης* & *ἰσθμίου* ordinariū est , verum aliquoties , certe plus semel notavi , post istiusmodi , quam modo dixi , dierum aliquot febriculam , dolere , rumereque , interdum etiam ardere , partium extremarum articulos ; idque , signorum sive complexum pon-

deribus suis , sive ordinem examinemus , more præfatus *arthritico* .

Qua vero proportionē fulget efferturque hæc *arthritidis* normam per artus & articulos extollens , eadem plane caput defenditur . Ut ea quam sausta quantaque ægri cum utilitate oriatur , illis solum innotescit , qui ex hac parte *arthritidis* mala , tamen si gravia , tolerabilia tamen ; ex illa vero bilis caput invadentis sævitiam , ad eaque hujus periculum , intime perspectum habeant ; qui , inquam hæc cum illis opposita conferant , æquaque lance perpendant .

Quinetiam de capite conservato quæ a nobis traduntur , de intestinis item proponi poterunt ; eatenus certe , ut , quemadmodum materiam peccantem artus suscipiant , ad eundem modum ea liberentur intestina ; & ex eadem translata , & pro ejus mensura leveretur *Colica* ; quoque plus ægri dolent articulis , eo minus interaneis .

IV. *Colica Biliofa* , cum *ὀυλαγχρως* *arthritidis* , in eo medicam locari decet operam , eam præferri indicationem , qua externis quibuscunque materia foras ejectetur . Quæ ad hanc rem auxilia , nostris hominibus explorata præsuere , per ea , toties hoc scripto passim memorata , non est hoc tempore ut percurram . Sed , quæ hujus curationis quædam proprietas est , cardiaca interna , utut aliis curationibus ad paroxysmum conciliandum idonea , hic loci vel prorsus omitti , vel caute admodum usurpari par est ; ne , incitata febre , & mutata simul inclinatione materiz , consertim ea in cerebrum impellatur . Quem utique impulsus eo magis perhorrescas , quod huic affectui primario [*Colica nempe Biliofa*] jure quodam avito proprius esse reperitur ; tum quod istius materiz in artus expressio non ita familiaris sit , aut morborum ordini tam conveniens , immo potius fortuito facta , & facillime abscindenda .

V. Alia vero *Colica* , apud *Damnonium* , ex pomaceo immitti & acido , nimis usurpato , derivatur , id quod ex eo liquet , siquidem illos solum infestat , qui porioni isti assuevere , eademque ratione qua sunt assueti : sic , ut iis tempestatibus , quæ pomaceo abundant , crescat & in vulgus ea grassetur . Contra vero , Pomona copiam negante , rarius obversetur .

Seprimo & octavo ætatis lustro sæpe *Colica* tentatur ii , qui vinum hoc indigena potare soleant , itaque pergræcari : Et , ubi illa

illa confirmatur & jam inveterascit, non raro *Colica* suppullulat *arthritis*, cum articulorum *ἐν τοῖς ἰσοδυνάμοις* dolore, tumore, ceteroque apparatu, ad puram & genuinam *arthritis* faciem ordinato.

VI. Istam metamorphosin, in iis corporibus, quæ *arthritis* parata jam olim habuit, natura per se nonnunquam molitur; sæpe vero numero per causam aliquam evidentem & procatarcticam, virus irritantem & extra propellentem. Hujus autem generis esse solet per drastica, & supra modum elateria, purgatio: illa enim corpori inimica, non tam peccantem, & pravum expellant humorem, quam universum sanguinem exagitant, & perturbant: cui demum motui & perturbationi (pari propemodum more, atque de *asthmatica*, de *Hydropica*, aliisque pluribus symptomaticis, supra declaratum est) creberrime substituitur *arthritis*. Et ab hisce pharmacis *ἀρχαῖος* sumptis, aliquam multi *Colici* *Ποδαγρίδος*.

Nonnunquam usu venit, ut ex cardiacis (aqua puta *Mirabili*, *Ussuebac*, *Tberiaca Andromachi*, *Zinzibere*, *Chalybe*, aliisque id genus) actu vel potentia calidis, adversus *Colicam*, vel præsentem permulcendam, vel quiescentem abigendam, adhibitis, ex ventriculo & intestinis in artus amandetur aliena sanguini materia, & in iis munus & officium colat usquequaque *arthriticum*.

VII. Habet hæc *arthritis* dolorem, præ quod in aliis plerisque *Symptomaticis*, acutum; sed ab *arthritide* recta, & genuina, tum item omnibus *Symptomaticis* eo primum distinguitur, quod in *Colicam* ex facili revertatur; iterumque *arthritidos* personam capiat, iterumque deponat. (Enim vero materiam *ποσπεύουσαν*, intestina, & artus vicissim præmens, morbos hosce, *Colicam* & *arthritida*, mutuo se excipere facit & alternare:) Deinde articulorum oppilationes, steatomata, abscessus, tofi, ulcera, quæ exquisitæ *arthritis* crebro. *Secundariæ* hujus nostræ raro accedunt: quod, ex materia partim per anum expulsa, partim intestinis dolorem inurente, sicque articulis parcente, fieri credibile est.

VIII. Est & alia; *Podagræ* gignendæ apta, quæ a *Dyspepsiis* emanat, *Colica*. Qui ad tuendam alendamque vitam ingeritur victus, etsi nec qualitate, nec quantitate peccet, propter vitiatam coctionem,

in massam turpem degenerat; in virosam, & inimicam; deest cibi in ventriculo sine tumultu concoctio sive liquatio, tranquilla, facilis, & perfecta: deest ejusdem in putredinem versi, motus per intestina lenis, certus, æquabilis: desunt, inter duras & liquidas dejectiones figuratæ, hora consueta exclusæ, nimirum laudabiles: quæ, naturæ rectum agentis semper comites, ejus œconomix monstrant integritatem. Sed e contrario adest a cibo gravitas, inflatio, ructus: massæ adest inutilis, spumosa, & cruditatibus plenæ, tum acrimonia, tum ab ea *σπόροι*, vel contorsiones interaneorum ærumnosæ: adsunt denique dejectiones, vel plures, vel pauciores, nunc liquidæ nimum, nunc coactæ, naturæ modum hac illac excedentes; cum desurgendi cupiditate importuna, doloreque ani, & aliis accidentibus; quæ coctionem depravari, & ejus officinam a *καταρδύματι* descivisse, planum faciunt, & magnopere probant.

IX. Qui sunt hujusmodi *Καταρδύμαχοι*, provecta ætate, aliquando tandem *arthritide* vexantur ea, quæ jam delineatam opere quam maximo repræsentat; ab aliis vero *Symptomaticis* distat longissime. Illius instat *Colicam* exceptat, quoties catharticis fortioribus, vel cardiacis, ad exteriora mall materia propuditur; tum a *Colica* excipitur, quoties materia, vel ad intestina retroceditur, vel in primis viis de novo generatur: quorum alterum sæpe, & ex facili fit; alterum quotidie.

X. Si quis autem *arthritidem*, *Colica* hujus vel istius profapiæ supervenientem, non tam *Symptomaticam*, & *Secundariam*, quam *Primigeniam*, esse contenderet; ipsamque *Colicam* (aliter atque prima facie videretur) *arthritidem* esse, sed anomalam, & demum regularem; profecto quidem hac in parte neque difficilem me inveniet, neque vehementer repugnantem; ut neque temere concedentem. Dubium esse fateor, vel Apolline dignum, & nodum Æsculapio vindice. Nihil habent symptomata, quod *λόγος ἀναγκατικός* alterutrinque fidem hac in re conciliet; atque adeo, dum ista silent, præcise aliquid statuere temerarium habeatur. Utcunque sit, haud minori jure *Symptomatica* esse confirmetur hæc *arthritis*, ac contra negetur: immo quidem majori; propterea quoniam *Colica* manifeste insequitur, eamque spe veterem, & (quantum hac in re perspicere datum est) genuinam, & exquisitam:

ve-

verum utut res se habeat, in arte facilitanda eodem fere recidit; nam dubiæ hujus *arthritidos*, nunc intestina, nunc artus instantis, pro duabus istis sedibus, & ab altera ad alteram illius migrationibus, curatio propria ac peculiaris excogitanda est; nec in hac *arthritide* sananda depellendaque medicina uti decet, quis exercuerit, nisi *Colicam*, cui ea subjicitur, ob oculos posuerit, & ex hujus consideratione illam vincere tentaverit.

XI. Hanc ad normam agentis consentaneum videtur, sive a pomaceo, vino subacido, cerevisia veteri, vel a dyspepsia proficiscenti *Colica arthritidis* subnascatur, quod paroxysmi ferme eadem, ac in *arthritide* exquisita, medendi ratio; prophylaxeos autem alia atque alia est, pro causæ remotioris diversitate: verum, ac in *Colica arthritica*, nequaquam alia. Ubi in poculis errarum, mos ille perniciosissimus primo quoque tempore abruptendus: tum quod intus alieni, iterata catharsi deducendum. Hunc in finem aquæ purgantes, per se, vel, cum *δυσλυσία* postulaverit, per salem catharticum adjunctæ, conducunt egregie. Quotiescumque vero *Colicam* a dyspepsia sequitur *arthritidis*, coctionis *Ερυσσιπριον* bene & frequenter purgari, coctionem digestivis stabiliri, pari fere ritu atque in *arthritidos Exquisite* prophylaxi, oportebit.

XII. Novissime corollarii loco addam, hujus tribus *Symptomaticis* præter ceteras sui generis quascunque, præter *arthritidem* exquisitam, omnibus hoc commune esse, quod istarum paroxysmi per eccoprotica subin iterata maxima vel præcaventur, vel saltem minuuntur.

Histor. I. Arthritis Colica Biliosa Secundaria.

Fœmina quædam, constitutione post hominum memoriam maxime *Cholerica*, nunquam *ἐν τῇ γαστρὶ ἰχθυα*, sub ætatis flexum, *Colica* pertinaci *Biliosa*, cum ingrato sapore, *Δυσοσμία*, vomitu bilis frequenti, dejectionibus raris, & parum coloratis, urina rufa, ore luteo, & lenta quædam febricula premebatur. Horum autem malorum procatartelicam habuit errorem in victu assiduum, utputa crassorum, & *δυσαντίτων* estrix. Ubi alvum inanientibus

(præsentissimo illi remedio) plus semel levaretur *Colica*, ex bilis incremento, constantiaque & acrimonia, menses post aliquot, iterum & sæpius, recidiva est. Fugiente sæculo superiori, cum affectui gravi tollendo tempus aliquod apud nos impenderet, præter *Colicam* memoratam, pedum item orta est debilitas; quæ primo aspectu paralyticam, hujusmodi *Colicæ* *ἰνιγύρνη* familiarissimum, prædicere videretur. Quo per anum bilis exularet, neque se in nervos infiltrare permitteretur, catharticum adhibui. tum insecutus est utriusque (sed potissime dextri) pedis tumor, malleolum, & pedis convexum, hallucem autem præcipue, distendens; quem comitabatur hujus majoris articuli teneritudo mirifica, dolor pungens, rubor, ardor revera *arthriticus*. Peræqua vero proportionem increvit *arthritidis*, qua minuitur *Colica*. Cum de suis exinde interponerem, matre admodum *Cholerica*, & demum *arthritica*, fuisse progeneratam; veterique *arthritico* diutius junctam accipi; sic, ut vitium partim hæreditarium, partim contagiosum esse suspicari liceat. Recte se habent muliebria, & cum *πυρίπριον*.

Ad medicinam morbi genio accommodandam, in eo fui, ut materiam, quo possim artificio, extra dimoveam; ideoque internis eam protrudentibus, externis eam invitantibus, diversis scilicet diverso modo idem operantibus, insisto; ut, & toti malleolo, & dextri pedis summitati, *Epispasticum* imponi, sinistram pedem lancis involvi, calideque vestiri: & paulo postea soccos, ex cerato illo viridi, quo sunt petasothecæ, perpetuo gestari jubeo. Unde exudavit humor, nec inutiliter: quandiu enim perduravit iste fluxus, recessit usque *colica* & visa est declinare.

Erat autem ista, per articulos, crisis imperfecta; quod reliquum erat materiæ, finita re *arthritica*, & ejus spe fallente omni, avitos intra limites se recepit, moreque proprio agens caput est adortum: ideoque de hujus ægrotæ malo non est quod amplius addam: unum istud volui, ex *colica Biliosa* posse *arthritidem* exoriri.

Histor.

*Histor. 2. Arthritis colica ex Pomaceo
δυσίγγομα.*

Vir amplissimus, animi & fortunæ doctibus insignis, natu integerrimus, ætate constanti, venatione aliisque exercitationibus otiose, & raro se fatigans, poculis plus solito indulgere cœpit. Ex temperamento sanguinis præservido, in deliciis habuit pomaceum, vinum indigena; propterea quod, (defæcatum modo, & tenue) absque sanguinis immodico fervore, pro illius natura potionis, hilaritate animum perfudit. Nondum ita diu indulgit, cum, dolore colico, & annos aliquot deinde post arthritico, teneretur; utroque interdum magno, sed tolerabili. Sic se habuerunt hi affectus, ut ne semel quidem unquam concurrerent; ut nec vices, aut periodos remeandi certos unquam exercerent; contra, nullo ordine (pro materia, vel in intestinis, vel in sanguine ex causa evidenti congesta, & ad αἰμὴν evecta) ægrotum alter, & alter occuparet; interea temporis notatu erat facillimum, arthritidem hanc, ab ipsissima colica materia, in artus translata, haud dubie fieri. Itaque se rem habere in propatulo fuit, tam ex eo quod arthritidis sæpenumero colicam exciperet, eamque (sic, ut duratio paroxysmi erat) mitigaret; quam etiam, ab eadem ægrotum quod ad tempus aliquod defendere cerneretur.

De vitanda morbi hujus utriusque προπόδον vir nobilis non nimis sollicitus, solito ex more egit. Prophylaxin autem utilem, efficacem, simplicemque Deus illi fortunavit. Quoties enim dolor intestinorum ingrueret, inter ipsa ejus initia ut occurrat, *Syrupus Domestici* præter propter unciam idoneo vehiculo temperatam, hauriendo, morbum εὖ καὶ πρὶν præcidit, contundit, fregit. Quid tamen quod eo ipso causam arthritidis προηγεμίστω primis viis avulsit. Ceterum, vere & autumno, aliasque quoties intestinorum inflatio, æstus corporis universalis, & plethora (quæ materiam recrudescere, & gliscere indicavit) exigere videretur, aquas *Alfordenses* in se ingurgitando, fistulæ intestinali proluendæ satagebat: adeoque Colicæ causam conjunctam, arthritidos remotam, amovendo, utriusque sævitiam magna ex parte antevertit.

Neque mitti oportebit, quod ex frequenti materię πλεονεξίᾳ, & arthritidos pa-

roxysmis (qui per annos plus viginti creberrimi fuere, ut & regulares) tametsi articulos hodie corruptos, recrementis arthriticis distentos (neque temere) quivis expectare potuisset, vir hic egregius aliter multo pedes, manus, habiles exercet; eorum usquaqueque compos impræsentiarum est, & quantum præfensione possum assequi, futurus.

*Histor. 3. Colica, ex Dyspepsia
diuturna, Gonagra
superveniens.*

Matrona quædam colico dolore, annos pene viginti confictata est, ut raro mensem immunis ageret; ut indies propemodum gravaretur. Torquebantur intestina, & post vermiculationes unius circiter horæ πρὶν αὖτις quoddam acre & pungens, non sine dolore sphincteris acutissimo, quantitate modica dejici solebat: dejectionibus secuta est spirituum submissio, sive languor, incredibilis; unde in lectura se projicere, quocumque fors permetteret, medio interdum itinere, donec ægra somno, vel quiete, vires integraret, indentidem necesse habuit. Deficienti maxime profuerat cardiacum, vel actu calidum aliquid pytissare. Post breve deliquium, vitæ munia sicuti prius, repetiit. Cibus sic satis sumpsit, & quamvis eo, ut dixi, more crebro lacerata est, vires & colorem retinuit. Plures illa Medicos (doctos, Jupiter! & exercitatos) hac de re consuluit; quibus, ut ipsa mihi renunciavit, communis erat, quæ & maxime probabilis, sententia, colicam hanc a Dyspepsia proficisci. Sub finem anni supra quam moris erat, urgebat colica, & hysterica affectione sociata dominam valde emaciatam, debilem, languentem pene confecerat. Nihil potius illius causa volui, quam alvum aperientibus expurgare materiam, turbas illic concitatas, & inquietem paregoricis sopire, & componere; cumque restituissem, ut tenerem quem cœperam locum, & ægram fido tuerer prophylactico, *Decocti Corticis Martiati* haustum, bis vel ter in singulos dies propinavi.

Habes illud Decoctum pul. patrum, & Limaturæ Ferri ana ℥j. in aquæ pluvie ℔viii. coquantur ad ℥j. per pannum Pvallium

cum sit colatura, ejus ℥ij. adduntur aq. Hystericæ Londinensium ℥ij. Tinct. Aurant. gutt. x. Sær. Caryoph. q. s. fit in usum præfinitum Haustus. Remedium hoc, ad menses aliquot, ad congios plures usutpatum, magnum attulit momentum. Melius inde perfectiusque concoxit ægrotæ; rarius & tolerabilius doluit; bonis erat viribus.

Æstate proxima, majoris utilitatis spe allecta, ad aquas se recepit, quas antea commode adversus hunc affectum hauserat, *Tunbrigenfes*. Martiatorum, qua præparatorum, qua naturalium, usu, partim etiam currus agitatione milliaria quadringenta brevi spatio metientis (quod hercle vero proximum) in artus statim ab itinere, propellitur materia *ægræ*. Erat utrumque genu natura imbecille, nec ad motum, maxime ad declivem, idoneum satis. Utrumque obtorpebat, nec absque dolore flectebatur: dolori adjunctus est utrinque tumor, cum mira debilitate, & motu læso; rubor autem nullus, ex temperamento corporis (quod opinor) frigido, neque ardor ullus apparebat, sed tumor, qualis solet esset frigida *arthritis*; Interea temporis *trōis corpōis* adeo prorsus integra est, ut nunquam magis.

Ut *Gonagræ*, morbo *Colico* hunc in modum *ἐνδύρομα*, pro facultate mederer, utriusque affectus habita ratione, aquam adhibui *Spadanam*; ejus ampullam modice replectam, instillatis cuilibet ℥ss. Sp. vol. ol. gutt. aliquot, horas inter sextam, & nonam, omni mane exsiccat.

Decima seq. Vini albi Lusitanici Haustum; *Gentiana Zedoariaque* Infuso alteratum; *Quarta pom. Decocti cort. Martiati* Haustum, cum *Hibernorum Usquebach. pauxillo*. *Quinimo, septima quaque die* [quoniam illud *Termina*, subinde recurrentia, postularunt] *Catharticum e Calomel.* ℥ss. Extr. *Eustach.* ℥j. *Scam. pul. Castor. ass. fœtid. solut. ana. gr. v. diluculo sumendum.* *Vesperi Bolum e Ther. Androm.* ℥ss. *Zinzib. in Indiis cond. conf. Fruct. cynorrhod. ana* ℥ss. *Syr. Aurant. qs. cum aquis idoneis & Diacod.* ℥ss.

His auxiliis, qua per renes, qua per anum, emissa est causa *Gonagræ* conjuncta; utriusque genu tumor subsidit: *Colicæ* item materiam, cum emolumento ægrotæ lauto & locupleti, tum ejici, tum ex parte aliqua præcaveri constat.

Sydenham Opera Med. Tom. II.

Non est autem reticendum, quod ex dyspepsia brevi tempore recurrente, denuoque materiam ministrante, *Colica* recruduit; & semoris dextri internodium menses inde post aliquot infestavit dolor; idem fere ac si *Rheumaticus*; vagus certe, quippe qui ad acetabulum coxendicis sensim ascenderet. Hunc comitabatur ejusdem *Pedis* (late sumpti) rotius debilitas: qui tamen dolor &c. non alius esse jure potiori censeatur, quam *arthritis*, ex materia recens orta partem nuper affectam, & eo nomine debilitatam, occupante.

Hisce vero diebus, anno nempe 1702. *Gonagra*, & omne genus *arthritis* immunis ægra, affectionibus interdum *colicis*, at frequentissime *hystericis*, quibus olim per *Gonagram* utrisque liberabatur, afflicta, aquis prædictis usa est, & fructum ex ea re ingentem retulit.

Hist. 4. Ex Colica Paralyticus,
Arthriticus, Inunctione
trucidatus.

Dominus R. propter viam *Apsamensem*, ætatis flore, *Colica*, quam *Pistonicam* appellant, aliquandiu gravatus, ex more & progressu istius mali ordinarium, incidit in *Paralysin*, artus exinde marcidos, graciles, *ἀκίνητος* habens, per reliquum vitæ clinicus; *Paralysi*, sub ejus initium, accesserunt dolores erratici, incerti, horum illorum artuum internodia cruciantes, autumno & tempestate pluvia maximopere sævientes, & tam ad amussim *Rheumatismum* simulantes, ut æger eo morbi plus decennium ægrotasse (Medico, nec indocto, nec inexercitato, tota cum vicinia consentiente) passim haberetur.

Cum ætas præcipitavit, dolor iste vagus in fixum mutatus est articulorum juxta positum, & nova symptomatum cohorte stipatum; id est, tumore, rubore, lavore &c. quæ cum *arthritis* eo loci jam esse *Fixam*, cum a decennio fuisse *Πλαγῆκω*, vel luce clarius ostenderunt. Materia in articulos impulsæ, & *arthritis* ibi paroxysmos faciente, peritarum aliquod, notatuque dignum, observare licuit; artus scilicet eosdem ex *Paralysi* flaccidos, macerimos; tantum non emortuos; ex *arthritis* floridos, inflammatos, vegetos

G

& vi.

& vitalis vitæ indicta commonstrantes.

Cum eo loci res erat, perfectæ (vide-licet;) consummataque curationis spe deceptus, circumforaneo cuidam, hominum impudentissimo, nec quidem vulgi stupore nobili, se vitamque suam commisit. Hic factum testum protinus ut ægrotum redderet, membrorumque omnium omnino compotem, Unguenta illa nescio quo (*Mercuriali*, an secus,) oblinivit. Quid exinde factum est? Qui per annos aliquam, multos, si vitæ momenta perpendamus, sic satis habuit, (bene enim appetere, concoquere, dormire, generare, familiaque eum officia recte obisse, certo certius est) ista inunctione absorptæ, ulla concurrente causa, tanquam *Apoplemate*, suffocatus, animam agere cepit, & aliquanto postea expiravit.

C A P U T XI.

De Arthritide, Morbis quibusdam Cuticularibus subiecta.

ART. I. **Q**Uæ suppressioni *Gonorrhææ* virulentæ subijcitur *Arthritis*, ad luem ea pertinet veneream; cujus quidem mali ista suppressio in causa est, & cui *Arthritis* illa proxime succedit. Quæ scabiem *Scorbuti* flammeam, quæ *Paturse* siccam, quæ *Febris Eruptionem Miliarem* sequitur, ea non tam horum symptomatum, quam ipsorum est morborum. *Επιρριμία*: nec ea re hujusce loci. Quæ *Achoribus*, quæ *Hæmorrhoidibus*, quæ *Ulceribus*, aridis & siccatis superest, illa hoc capite perstringenda est.

II. De affectibus hujus *Symptomaticæ* primariis generatim acceptis, primum observandum est, quod multa naturæ opera & labore, illi (uti *Arthritidum Symptomaticarum* morbi primarii plerique omnes) materiam, quam habent ineptam, inidoneam, & alienam, in ambitum corporis expellunt, ibique exterminant. Quo quidem nomine, cum *Arthritide Primigenia* recta, & legitima ad amussim concordant.

Tum, de his notandum, quod, quoties eorum materia, seu victu pleno & immo-

derato, sive otio adaucta, per excernicula priora minime expressa, in sanguine cumulata fuerit, ex ea sanguis discordiam, & turbas subit, supra naturæ modum vehementes, atque his succedit alieni per articulos expulsio, id est, ipsa, quam dicimus, *Arthritis Symptomatica*.

Deinde advertendum, quod *Arthritico* durante paroxysmo primariæ maxima ex parte conquiescunt affectiones; sistuntur evacuationes istæ morbosæ; latices isti exiccantur: eo vero ad exitum perducto, scaturiunt denuo, & quidem tantisper, dum nova repullulante, & urgente materia, prælium redintegretur, & *Αὐτὴ ἡ Ἀρθρίτις*, revertatur.

III. Ex eo vero, quod *Symptomatica* hæc nostra morbo semper alicui externo submittatur, pronum est conjicere, eadem illa, cum primario suo, sed aucta, sed in orgasmum majorem evecta, & per excerniculum insolitum, id est, articulos expulsa, gaudere materia: necnon exinde tum a reliquis *Symptomaticis*, tum ab *Arthritide Primigenia*, vel prima facie distinguui.

Sufficiunt enim, ex Instituti nostri ratione, morbi hujus derivationes successioneque, propter quas in *Symptomaticarum* numero ille censeatur; tamen concedamus (quod tamen non concedimus) materiam ejus cum pure *Arthritica* revera *Specie* convenire. Et quæ res est, ut plane & latine dicam, ex hujusce morbi ortu & metamorphosi quam facillima, ex ejus concordantia, & similitudine cum *Arthritide Primigenia*, vel eandem his utrisque esse materiam, alio corpore in ano, alio in tibiis, alio in auribus, *αὐτομέλως*, postea vero in artubus, *ὀρθῶς*, se gerentem; *Symptomatica* huic nostræ materiam esse, *Arthritica* illi longe simillimam, & germanissimam, existimandum est. Et quia hæc *Arthritis* vel ipsa est *Primigenia*, vel ei quam simillima, idcirco de illa postremo hoc loco differuimus.

IV. *Symptomatica* tam peculiaris subijcienda est curationi quodammodo peculiari. Etiam si enim in ejus paroxysmis eadem medendi ratio, & in eorum intervallis idem victus, ac in *Arthritide Primigenia* valebit; in iis tamen alia locum merebitur, immo vindicabit, quæ huic affectioni propria est medicina, mirum quantum a prædictarum methodis varianda.

Nihil

Nihil enim ægro per vacationes paroxysmorum commodius, aut quod adjumenti plus contulerit, quam ut morbus, quicunque fuerit primarius, sustentetur, alatur: ut e. g. *Ulcus*, siquod extiterit *Cuticulare*, ne carne obducatur aut arefiat, per *Cathartica* sive carnem modice rodentia, enizi. Placet huic in finem *aqua Viridis exedens Barbettiana*.

Ad *Achores* revocandos *Epispastica* prope aures applicentur; vel lenia quædam *Astrahentia*, quæ humorem illuc peccantem & vitiosum invitent, eliciant.

Ut *Hemorrhoides* aperiantur usui esse possunt *Aloetica* interne adhibita externe vero *Hirundines*.

Quemadmodum salutare sunt evacuationes, per *Ulcera*, per *Achores*, per *Hemorrhoides*, hæ prædictæ, ideoque promovendæ, ita quidem, si hydrops, colica, tussis, apoplexia, vel siquid aliud mali, ex earum suppressione oriri videatur, omnino necessariae sunt, & primo quoque tempore conficiendæ.

Atque ista volui de *Arthritide Morbis his externis* supervenienti, quæ pro eorum numero multiplex habenda, & diversa: Hoc autem capite, propter eorum convenientiam & *Arthritidum* iis enatarum vicinitatem, ac si una tantum esset, explicatur.

Hist. 1. De *Arthritide Aurium Achoribus* subiecta.

CURRENTe sæculo priori, *Dæmonio* hoc *Orientali* florebat ordine equestri gens, humanitate, opibus, & pietate insignis, illoque tantum nomine infelix, quod ea tota, tam sœminæ quam mares (erant autem illæ quamplurimæ) *Podagra* miserissime torquerentur.

Harum una, articulos non adeo graviter affectos habens, dolore, artus alios aliosque perreptante, multos annos est afflicta, *Rheumatismi* nomine, pro vulgi more, malum isthuc appellatum est, quod tamen potius *Arthritis Vaga* æstimandum. Decedente eo tussis exoriebatur, facta in pulmonem materiæ *μικροπύσι*, & phthisi paulo post occubuit.

Hujus *Arthritice* filius jam quadrimus aurium morbo tentabatur; ex omni parte

tumuerunt illæ; præcipue vero *Helix*. Tumor initio rubet & *φλεγμονώδης*, brevi exinde tempore subalbicans. Serum illud acre, quod intus contentum, in tumorem cutim extulit; fibras autem cuticulares solidando, spiritusque earum incolans irritando, pruritum immanem, perpetuum & fere intolerabilem excitavit; in crustam posthæc albidiorum condensatum est; quæ quidem crusta, demum exarescens, & in squamulas diversa, decidit; relicto loco, tanquam a variolarum frustulis, inflamato. Confertissima erant hujusmodi excrementa, & quidem adeo crebra, ut propemodum perpetua viderentur. Veteri subito nova messis successit; pro materiæ peccantis abundantia, & cœli humiditate (quæ ad hujusmodi *πύσις* contribuere notabatur) major. Ichor autem, quando largiter profluxit, non sine fœtore erat gravissimo, naribusque ingratissimo: ea spes amicorum erat, ut ætate progrediente sisteretur iste fluxus, & quidem tuto; ex eoque annis puerilibus ita profuso, melius & tutius augeretur quod vitæ reliquum.

Ineunte quidem adolescentia, forsitan ob exercitationes eo tempore vehementiores, fluxus est remissior: at annorum vix triginta, vir sobrius, neque *Veneri*, neque *Baccho* deditus, *Arthritide* corripitur, post homines natos acerbissima. Per idem tempus aurium illa affectio major recurrit, sed cum *Arthritidos* paroxysmis vices habens alternatas. Horum enim vocationibus scaturiunt aures; at natura paroxysmum moliente, ad eumque sese, quasi accingente, siccantur hæ; & ab his siccatis, instantis paroxysmi non leve ortum est indicium.

Hæc sunt, quæ de hujus *Arthritidis* ortu & derivatione dicenda habui; quæque si recte judico, illius generis eam esse ostendunt, cujus materia partim per *Achores*, partim per *Articulos* expellitur: eaque ratione, quod ordinario, prior illa sufficiat evacuatio, quamprimum autem *ἐπὶ πύσιν* in sanguine cumulata & congesta fuerit materia, itemque ad exilium parata, paroxysmum illa concitet *Arthriticum*. Sic, ut materiæ ad hanc vel illam partem determinatio, ex ejus quantitate & naturæ nisu fortiori, prorsus pendeat Si vero ipsam spectemus materiam, esse illam, utrique harum pari fere mensura propensam, & æqualiter faventem.

G 2

Sunt

Sunt autem alia, quæ cum aliis quibusdam *Arthriticis* huic nostro communia, memoratu digna censeantur. Primum, præter labem hæreditariam modo dictam, causam hujus & *Arthritides* & *Achorum* antecedentem esse procul dubio *Dyspepsiam*: Cibo enim difficiliore (porcina, bubula, & istiusmodi aliis) nimium delectabatur; is autem ventriculo minime confectus, simul cum corpore morbum alere indicetur. His addendum ægri genus vitæ otiosum, neglectis scilicet exercitationibus, quibus juniores satietatis mala seu prævertunt, seu refarciunt. Otio facta est (quod tertio notandum) perspirationis diminutio; cuticulæ universæ, manuum vero præsertim, ariditas unde humores intus retinentur; unde malorum ilias, urina huic ægroto in paroxysmo pro doloris & inflammationis ratione rufula, alias straminea, semper autem pro quantitate proculenti larga. Ingruente pluvia semper ille venarum distensionem, sanguinis orgasmum, corporis hebetudinem persensit. Complures ille periclitatus est, per aquas *Bathonienfes*, per *Cathartica*, sanguinem expurgandi methodos. Nulla vero profuit. Adeo illi sanguis intractabilis, & *δυσμετέωρος*. In cibo *λίγυμω καὶ ἀπειρῶ* parce sumpto, quo morbi causa præpediretur, spes sita erat prophylactica. Ille vero Cererem indulgens, & quicquid gratum erat, utut difficile cocto, demittens, bis terve anno ferme omni derelict *Arthritide*.

Unum adjiciam, quod huic ægro proprium esse videatur; *Arthritida* nempe aliquando dextram invadere patellam: drachmæ occupare spatium: per dies aliquot durare: paroxysmum autem insequentem, diuturnum esse, gravem, genuque labefactare, & valde imbecillum reddere. Ob genu imbecille factum est, quod gradus scalares multo facilius expeditiusque farsum, quam seorsum iret: quando in descendendo necessum, ne corpus antrorsum rueret, summis illud viribus cohiberi. Hoc autem silicerniis, & depontanis fere omnibus commune.

Hist. 2. De *Arthritide Ulceribus*
subolefcenti, Epispasticis
alleviata.

Ulceribus, quæ cutim mordent & exedunt, *ἐπιγυρωματὶς* *Arthritidis* varia præsto sum exempla; ex quibus, uno, quod ob oculos rem hanc omnem plane & perfecte repræsentabit, contentus ero.

Vivit etiamnum apud nos, ætate adhuc constanti vir, cujus ut in ipsis *Arthritidos* paroxysmis, ita non minus in eorum originibus, occurrunt plurima notatu longe dignissima.

Ingruente paroxysmo præmitti solet fastidium, symptoma creberrime prænuncium; tum urinæ tenuis & pallidæ, tanquam in *Hysterica affectione*; profluvium: nonnunquam etiam mandibulæ dolor, quasi propter imminentem *O'dontalgiæ*: spinam autem ischisque ossis inter acetabulum, usitare dolor acutissimus, pariter ac ab affectu illo molestissimo, quem idiomate nostro a *Grick* appellamus: ab illo vero diversus, eo quod vagetur, & spinam perreptans ad homoplatarum usque intercapedinem ascendat. Eo loci quam diu iste viget, spiritum æger difficillime trahit, ac si *Asthmate* pæne suffocatus. Hoc in statu, pomaceo liberaliter ingesto, sæpe ille ad tempus aliquod paroxysmum protelat: Grallator alias artuum exinde compos. Hæ vero tantum induciæ sunt, earque breves & infidæ. Die enim postero, qua pedibus, qua manibus, solet universe & quidem acerbissime dolere. Cum deservuit sanguis, in carne musculosa tumores facere materiam *ρσφλῶ*: durosque & longos, restis in modum, excitare; & per artus alios aliosque *θλαστικῶ* articulos aggravare, constat.

Quemadmodum *Febris* & dolor accedunt & intenduntur, urina magis flammea & rubra est: iste vero rubor remittit simul cum dolore, idque ejus proportionem. Veteris jam *Arthritici* summitatem cubiti sinistri tumor occupat *Οιδνωτῶδης*, nuci juglandi par, tofos habens intermixtos, duritie & mobilitate distinguendos.

Hæc sunt, ad hujus *Symptomaticæ* paroxysmos quæ præcipue spectant; eorum vero de origine considerandum est, quod æger hic noster *Ulcusculis*, quorum alia minora erant, pisi majoris secti basin exæquantia, alia ad diametrum *Thaleri* largiora, omnia

omnia vero tibias obsidentia, ante multos annos afflictatus est. Quibus cum *Arthritis* subiciebatur, quamprimum hujus cura mihi demandata est, nihil potius habui, quam ut, naturæ methodum imitando, ejusque vestigia reprimendo, materiam per cutim elicerem. Ideoque *Vesicatoria*, quibus id negotii perficiatur in usum proposui; quin & malleolo, carpo, cæterisque articulis dolore cruciatis, vel eos quam proxime, nunc plura, nunc pauciora, prout exigere videretur ægri res, admovi.

Hæc autem eo cum successu acta sunt, ut acris feri sordidique admodum, uncias sæpe quatuor, identidem sex, nonnunquam octo, unum idemque extraheret *Emplastrum*: Unde vicini dolor articuli statim mitigatus, & paulo post sublatus. Artificiose hisce colis adeo delectabatur æger & profecit, ut quoties dolor recruduit, ac si esset *αῖμα δυνάτος*, ipsius sæpe numero *Epispastica* superponi juberet; ut, eodem tempore, sex septem interdum gereret.

Ex eorum dolore & fluxione macescit æger; caro illius impendio absumi, vires debilitari & pessumdari solent; sed cum emolumento & fructu certe amplo locupletique. Quamprimum enim *Ulcera* exsiccantur, somno & fame postliminio restituti, cibo multum idem reficitur: vires reparantur. Hisce vero adaugendis non parum conducit aer apricus, & pomaceum; quorum alterum mirifice appetitum acuit; alterum animales spiritus fovet recreatque.

Cum miasmate *Arthritico*, sive per paroxysmum, sive per epispastica, liberatur æger; nemo unquam hominum vegetior, nemo hilarior. Ut coctio recta sit, *Infuso amaro Chalybeato* me hortante utitur; nonnumquam etiam, ad sanguinem instaurantum, *aquis Germanorum Spadanis*; utroque certe, eventu non infelici, imo felicissimo. Redit exinde *Ἀσπία* sanitasque sic, ut horum in paroxysmorum intervallis uxorem quotannis gravidam faciat, valetudine, si unum excipias claudicationem, factus integerrima: donec cibi abundantia, & satietate corpus ample nutritum, & nimis sit impletum; inque artus denuo erumpat humor, iterumque *Παροξυσμός*.

Hujusmodi cyclus, paroxysmum simul cum vacatione continens, quotannis in annos singulos ter quater repetitur. Solet autem paroxysmus nunc unius mensis esse, nunc duorum, interdum etiam trium, pro mate-

ria plus minus cumulata & evecta.

Ulcera, quæ ab *Emplastris* sunt *Cuticularia*, brevi tempore sanantur; maxime vero quoties *aqua Calcis vivæ* abluuntur.

Cum aliquando pedes tumescerent, ad detrahendum miasma *arthriticum*, una cum sero in iis depositum, amici cujusdam hortatu catharticum e fortioribus assumens, malo id eventu fecit, adverso *Æsculapio*. Si evacuationes spectemus, instar omnium erant, in paroxysmo, *Epispastico*, in vacationibus, *Diuretica*. Horum autem usus uti perrarus fuit, illorum vero creberrimus; illis potissimum deberi agnoscendum est. Quod, dolore æger etiam si acerrimo subinurgeretur, tamen ei sustinendo tolerandoque usque par existeret; neque per decennium nuper elapsam, etiam si tot tristissimis accessionibus comitatum, si præcipue notæ viscera, si vitæ pondus attendamus, evolveretur, aut multum debilitaretur.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre Intermittente) ex Hemorrhoidibus oclusis,

His affinis illa *Foresti* observatio, de *Hollandiæ* præside quinquagenario; qui, cum *Hæmorrhoidibus* affici soleret, ex iis oclusis in *Tertianam* incidit, & paulo post in *Podagram* & *Chiragram*, adeo vehementes, ut per dies viginti lecto affigeretur.

Hujus mali causam esse, vir clarissimus existimavit, non solum phlebotomiam ac catharsin prætermittam, sed (cum aliis quibusdam) & quidem maxima ex parte *Hæmorrhoides suppressas*: neque vero perperam; rarus enim id, quod erat, per lenientia, ventrem inanivit. Quo subducto, & dolore cataplasmatibus mitigato, in excrementis denuo conspicitur ex *Hæmorrhoidum* apertione sanguis. Hoc viso, sanitatem Medicus pollicetur, & quidem brevi admodum æger *Arthritide* liberabatur; neque annis post sex dolores *Podagricos* *Chiragricos*, aut *Articulares*, etiam si illa jam ætate quæ ad hosce prona & proclivis, sensit.

CAPUT XII.

*Corollaria & Spicilegia quædam
cum Epilogo.*

ART. I. *S*ymptomaticarum isti, quem pro-
tulimus, censui *Corollaria*,
quæ ex his recognitis sive omnibus, sive
pluribus, inter se comparatis oriantur, &
Spicilegia quædam, quando ad illas amplius
illustrandas utraque nonnihil conferant, jam
denique superaddam.

Ex omnibus, gregatim sumptis, omnino
liquet, quod *ἰσχυροτέραις* iis, quæ puræ &
germanæ *Arthritis* sunt vicinæ (id est,
Arthritis Colicæ, & *Morbis Cuticularibus*
supervenienti) maxime consentire cernun-
tur illæ, si missa morborum primariorum
consideratione, & ab iis *Symptomaticarum*
emanatione omni, illarum *Materiam* tan-
tum intueamur, quæ *Chlorosi* & *Hydropi*
ἰσχυροτέραις Symptomaticæ minus propria
nominantur. Iste vero consensus ex illarum
simili materia proficiscitur. Vicinis illis
Speciebus magis propriis materia, vel *Ar-
thritides* genuinæ ipsa, vel (uti supra de-
claravimus) ei quam simillima est, (sicut,
e diverso, magis propriis, sed remotioribus,
pro distantia, dissimilis) jam vero *Sym-
ptomaticis* minus propriis materia, (quod
item ostensum est) pura puta est *Arthri-
tica*: unde elucet dicti veritas. Et quidem
ob istam minus propriarum cum *Exquisita*
Arthritida convenientiam, magis propriis
postponi illæ poterant, imo (ut ordinem
hac in parte corrigam) debuerant.

II. Secundo. De *Symptomaticis* magis &
propriis adverteudum, quod nihil me mo-
vebit, si quis e perspicacioribus & nimio
plus subtilibus, eadem materia morbos oriri
posse diversos, eosque *Specie* distinctos as-
serens, *Luis* ex. gr. materiam; non *Arthri-
tida Falsam*, & *Mendacem*. sed *Exquisitam*
& *Genuinam* parere contenderit: itaque
Symptomaticas (aliter quam a nobis statu-
tum esse videatur) & inter se, & cum
Arthritide Exquisita congruere, pro certo
habuerit; nihil, inquam, istuc me mo-
vebit.

Primum enim, morborum *Materia*, sive

Causa Conjunctæ, revera sunt in obscuro;
& quis atomorum globus, sive *Ἐχημασµὸς*
ex. gr. pestem, quis *Variolas*, quis *Hydro-
phobian* & ita affectum quemcunque conta-
giosum, aut exigua materia, quasi fermento
narum, afferat & producat, Deo soli
cognitum & perspectum est: nec quis un-
quam mortalium hæc in operto naturæ sa-
bricata fideliter repræsentaverit, aut palam
exhibuerit. Ideoque de *Symptomaticis* hisce
nostris, utrum germana sunt *Arthritis*, an
ejus tantummodo *Simulachra*; cum in utran-
que partem disputari potest & quidem fru-
stra; ex *Earum Materia per se considerata*,
non est temere decernendum; quin philoso-
phis magis oculatis, *λεπτοτάτων λόγων ἰσχυροτέραις*,
missum illud faciemus.

Tum, de illarum materia, *secundum phæ-
nomena*, si sentire & judicare liceat; certo
certius est, primum, diversis illas primariis
affectibus, iisque *Specie* distinctis, exoriri.
Deinde, eorum *materiam*, signis suis dia-
creticis usque manifestam, propriisque re-
mediis impugnandam, in statu peregrino
illas retinere. Et quoniam morborum *Spe-
cificatio* a nulla alia reducenda magis,
quam ab illorum materia peculiari, signis
suis diacreticis ostensa: his consequens vi-
detur, illas *Symptomaticas*, pro affectuum
diversitate primariorum, *Specie* distingui,
propriasque postulare medendi methodos; ut
& propria vocabula.

Neque enim, tertio, siquis eas *Arthriti-
dis* nomine comprehenderit, earum muta-
bit naturam, aut curationes; sed, nimis
lata significatione, vocem eam, morbum
singularem exprimere solitam, reddet *Æqui-
vocam*; morbos longe disjunctos, eosque
non paucos, complectentem, qua quidem
re, *ἐν τῇ ὀνομαστοποιῇ* nihil magis su-
giendum.

Nos certe opus practicum moliri, & hos
affectus eo modo tractare studuimus, qui
ad eos tollendos, aut mitigandos, maxime
conducant: quem in finem, ut in superiori-
bus *Arthritides* alias *Genuinas*, in *Secunda-
riis* & sensu laxiori *Symptomaticis* censui-
mus; quod *Chlorosi*, quodque *Hydropi*
subiiciuntur; ita hic multo satius esse du-
ximus, tametsi veræ sint omnes hæc *Arthri-
tides* (quod tamen ita esse, nec a quo-
quam unquam probatum, nec a nobis con-
cessum) ut *Adulterine*, interque se diver-
sæ, & magis proprie *Symptomaticæ*, habeantur:
Quoniam hæc positio, ad earum cu-
ratic-

rationes & aptius lucubrandas, & felicius exigendas, ulus est immensi.

Perimetrum circulare ad suam diametrum in ratione *Tripla-fesquiseptima*, sive ut 22. ad 7. esse statuunt, & quidem omnium consensu recte statuunt, *Geodutæ*: Quamvis id non tam ex rei veritate, quæ profecto nulla est, quam ex positæ commoditate & in solidis dimetiendis utilitate, factum est.

III. Unum adhuc restat, quod quidem me sollicitum habet, quodque Lectorem moneri par est, non eam hujus scripti mentem esse, quæ *Melancholia*, *Scorbuto*, *Lue*, vel alio quovis morbo e primariis supra dictis laborantem, *primigenia* simul *Arthritide* laborare posse diffiteatur: quin e contrario (quantum video) posse ita fieri, (ut, illorum altero qui ægrotet, *podagra* similiter ægrotet, *primigeniæ*) lubens agnosco. Mihi vero cum hisce solum morbis negotium, qui statum pristinum vel partim vel omnino deferentes, sub falsa *Arthritidos*, imagine laceffunt ægros.

IV. Præter has *Imagines Arthriticas*, quæ suo quæque genere perfectissimæ, & omnium, quas ego notavi unquam, maxime sunt elaboratæ: aliæ cernuntur minus perfectæ, neque tam ex amussi ad exemplar illud ingens, *Arthritide* videlicet *primigeniam*, formata. Sunt illæ fœtus naturæ, sed abortivi; sunt illæ conamina, sed languida, & frequenter, vacua. Habent tamen nihilominus dolorem; aliæque tumorem, aliæque etiam ruborem, breves habent plerunque paroxysmos, neque ex stadiis omnibus perfectis conflatos; atque adeo intercisos, interraptos.

Harum *Abortionum* causa, ex naturæ imbecillitate, & ad *Arthritidem* eluctandam impotentia; vel ex materiæ defectu peccatricis; vel ex sanguine *δυσμετεβλήτω*, & ad *Arthritida* subendam minime apto & proclivi, ut intelligo, petenda est: Certe tanta illarum *Απορία*, mox ita dubium, ut ad hæc nostras *Symptomaticas* nihil esse censeantur, neque sermone longiori persequendæ.

Minime vero tacendum, quod hæc *Abortiones* nunc, ut aliorum morborum aliæ non paucæ, (quod jampridem detexit clariss.

Sydenhamus) apud vulgus *Scorbuti*; nunc etiam *Rheumatismi*, facti, vel imperfecti, nomine insigniuntur; & passim curationi, pro hoc vel illo nomine, (quam autem auspiciato conjectari facile est) subjiciuntur.

V. Postremo addam, quod *Articulares Glandule*, quæ tantopere in statu corporis secundo & naturali, per secretam mucilaginem, (1) articularum motui, immo vitæ animali conservandæ; in statu ejus vitioso adverfoque sanguinis depurationi & purgationi, pari modo intervniunt; quando per has exprimitur venenum, in alio corpore. *Ποδάγριον*; in alio, *Melancholicum*; in alio, *Scorbaticum*; in alio, *Venereum*; in alio, *Febrile*; aliud videlicet aliudque longe diversum, summe perniciosum. Ut dictæ *Glandule*, ex incerniculis totius corporis celeberrimis sint: neque per *catharos*, infantum; neque per *Reumatismum* muliebrem, sæminarum; neque per *Hæmorrhoida*, profectionum; quam per *Pūem* hanc *Articularem*, seniorum vita, salus, & incolumitas, magis sustentetur.

EPILOGUS.

Ita demum absolvimus *Systema Arthritidum Symptomaticarum*; eas *Species* percurrendo omnes, non quas imaginatio peperit; non quas opinio commenta est; vel auctores, scripta sua compilantibus, sunt elargiti; sed quæ nobis usu & experimentis; quæ observatione & exercitatione medica occupatis, sese prodiderunt.

Harum modos & proprietates expiscari fuimus conati, medendique rationes & indicationes singulas, quam possimus aptas idoneasque, earum singulis accomodare. Nunc *Calcar* adhibendum, & *Arthritidem* in nonnullis omni industria promovendam; contra, *Fræno* opus esse, & morbos artificiose sisti sufflaminarique oportere: materiam nunc per *Locos Muliebres*; nunc per *Renes*, nunc per *Ambitum Corporis*; nunc per *Anum*, nunc per *Os*, evacuari; nunc, emissa evacuatione omni, alterari; nunc, & alterantibus & evacuantibus neglectis, tantummodo præcaveri, in ipsoque

(1) Vide Clarissimi *Haverii Osteologiam novam* Diatribam *De Glandulis Mucilaginosiss.*

que ortu *supprimi*, debere demonstravimus.

Si, in ponendis hisce indicationibus, isque designandis, errasse nos constiterit, (in re vero tam multiplici, tamque intricata, nihil errare, plusquam humanum est) certe suam cuique *Symptomatica Arthritidi* propriam esse, ex derivatione propria, naturam; tum item harum singulis, pro suo cujusque derivatione & natura, curationem excogitandam esse propriam & peculiarem, omnino comprobatum est.

Facto isthoc fundamento, quæ mediocriter (pro earum dignitate, si quidem mediocriter) a nobis aperiuntur *Symptomaticæ*; tum eas amplius explicare; tum eas illustrare; tum earum numerum explere pote-

rit observatio posterorum, quibus in medio relinquam *Scrofule*, *Rachitidos*, *Pfore*, *Diabetis*, *Icteri Dysentericæ*, aliorumque complurium chronicorum erga *Arthritidem* inclinationes & demigrationes, si quæ sint, & qualescumque, evolvendas: esse vero plurimorum; easque longe inter se diversas, & discrepantes; ex jam prolatis, quæ a nobis, ut dabatur occasio, per paucis annis spatii cogerentur, abunde verisimile est.

Animus erat, de *arthritide Anomala* quæ habuimus dicenda, his subnectere: sed, in præsentia, manum hac de tabula, & spatio jam exacto, sistentes (anhelantium more cursorum) paulisper respiremus.

F I N I S.

Δὲ τῶ ἐνδύσεως Οἶον.

DISSERTATIO SECUNDA.

D E

ARTHRITIDE ANOMALA^s

S I V E I N T E R N A.

P R Æ F A T I O.



IN Dissertatione non ita pridem edita , de morbis iis sermonem fecimus, qui ab *Arthritide Primigenia* distincti, natura & indole plus minus remoti, stationes suas deserunt ; ad illam appropinquant ; ejus ritu paroxysmos agunt , *Artus* affligunt : quoniam vero , præter *Arthritidis* , sive *Symptomatica* , sive *Primigenia* paroxysmos eos , qui in artubus omnino locum habent , & a me *Idones* , *Recti* , & *Regulares* appellantur ; alios adhæc insultus faciat *Arthritis* utraque , & interdum *Trunci* partes has illas , sedes , & regiones intret alienas , atque illas sæpe mulctet gravis-

sime , hos utriusque *Arthritidis* errores , has obliquitates , & *Ανωμαλίας* hoc loco exponere decrevimus.

Dari vero sibi postulat hæc Dissertatio , (& quidem optimo jure postulat dari) suos esse *Arthritidi* cancellos , suos limites certos , & definitos ; quibus se quandiu continet , tandiu *Regularis* illa judicari potest ; quotiescunque vero eos excedit transilitque , toties *Anomala* . Dicam planius & apertius *Arthritidi Subjectum* , unos *Artus* esse *Regulari* , proprium , & suum hanc illos vendicare ; domicilium in illis collocare : contra vero , organicam *Trunci* partem aliquam , sive *Provinciam internam* , non nisi *deviam* usurpare ; non nisi *Anomalam* invadere . Quæ quidem harum in corpore regionum designatio partitioque , non ex arbitrato nostro fieri , vel opinionis commentum esse , verum , e diverso , in natura stabile , & fixum habere fundamentum usu ; & experientia confirmatum invenietur .

Quoruscunque Medicorum *Impetiginem* , e. g. virus in *Cutim* effundentem , squamas (sic , ut moris est) præ se ferentem , animo perpendens , *Cutim* illi propriam esse sedem , non existimaverit ? quotus etiam quisque est , qui , relicta *Cute* , si materia vitiosa *Pulmonem* ingrederetur , & *Tussim* faceret ; non , hanc illius a suo in alienum locum aberrationem esse , judicaverit ? Quis , hujusmodi *Tussim* , a vulgari & exquisita diffidere , multumque discrepare , non libenter affirmaverit ? Quis , alia medendi methodo , quam quæ *Tussi* conducat exquisite , tractari eam oportere , vel secum dubitaverit ? Immo quidem istiusmodi *Tussim* , etiamsi *Bechica* , reliqua- que remedia *Pulmoni* dicata , minime respuerit ; tamen , per materię translationem in corporis superficiem , in sedem illi usitatissimam , (unde *Pulmoni* cautum esset , donec e corpore prorsus expellendæ ejus daretur occasio) id est , per renovatam *Impetiginem* , modo renovari posset , apposite curari , quis in arte nostra prudens abnegaverit ?

Quæ hic de *Impetigine* , mutato nomine de *Arthritide* , narretur fabula ; pari enim modo , atque illi ambitus corporis , huic artus , *Subiectum* & sedes est

Sydenham Opera Med. Tom. II. H exo-

exceptatissima. Quod vel eo liquet, quoniam hos suapte sponte adit *Arthritis*; hos incolit; hos invita, plerumque exacta, linquit; hos celerissime revisit: *Truncum* autem, nisi coacta, raro premit; causa nempe fortuito aliqua naturæ consilium mutante, rationem morbi conturbante, morem alterante: unde jure merito, quæ artuum est *Arthritis*, habeatur *Regularis*; quæ reliqui corporis, *Anomala*. Simili etiam modo, atque de *Tussi Impetiginosa* diximus, quæ e. g. *Tussis* est *Arthritica* (quandoquidem ex miasmate *Arthritico* fiat) a vulgari & primigenia *Tussi*, si recte compareretur illi, primum differre existimeretur. Postremo, (ut in *Impetiginosa Tussiente*) nihil hac *Tussi* laborantibus conducibilius, nihil *Arthritidi* huic *Anomala* magis aptum, quam ut in viam ea, quaqua possit arte, reducatur, & fiat *Regularis*, id est, in artus ut ejiciatur.

Premissa hac *Arthritides* (in *Regularem*, & *Anomalam*) divisione, tanquam hujus scripturæ basi, de *Arthritide Anomala* differere non jucundum modo, verum etiam utile; sed & difficile cogitandum. Est enim illa, primum, perobscura tenebris reclusa; neque perpetuo animadversa; maxime, si ex primo ejus aspectu, nempe symptomatum concursu, (qui vulgi mos est) diagnoses statuatur. Partium quas invadit, morbes, adeo examussi illa proprios & vernaculos, imitatur; ad eorum modos se tam accurate comparat; ex eorum vultu, suum tam mimice componit; ut a Medicis omnis seculi omnino omnibus, aut prætermissa, aut tantum leviter tacta; a nemine unquam hominum, quod sciam, explicata fuerit; nedum a quoquam, uti par est, impugnata.

Deinde, illa ita numero (veluti erroris alias natura) multiplex est: ut raro ullam in *Trunco* regionem, ea prorsus immunem; nullam fere, quam non aliquando ingrediatur, animo liceat comprehendere, ut *Trunco* quot partes sint organicæ, tot propemodum *Arthritica* sint earum *Anomalia*. Porro tam a se diversæ sunt, ut malorum, quotquot undique corpus humanum infestent, eorum omnium vix ullum magis, vix ullum observare licet æque πολύτροπον, πολύμορφον.

His adde postremo, importunam semper eam esse, (sed ratione valde dissimili, & inæquali) imo quidem non raro summe periculosa; quoties nimirum miasma *Arthriticum* viscus aliquod e nobilioribus, & ad vitam maxime necessariis ingressum illud sic, ut assolet, corrumpat. Hoc autem crebro fieri, hæc nostra *Dissertatio*, nisi quid me fallit, manifestum & testatum reddet. Testatum, inquam reddet, *Arthritida* non solum (*Regularem*) artubus dolores, tumores, tofos, aliaque istius generis mala (quæ *Arthritidem* omnino omnem indicare, vulgo fuere judicata) inferre; verum etiam (*Anomalam*) modo *Ventriculo Nauseam*; modo, *Intestinis Tormina*; modo, *Renibus Nephritida*; modo, *Pectori Asthma*; modo, *Pulmoni Tussim*; modo, *Faucibus Anginam*; modo, *Cerebro Apoplexiam*; modo, *Nervis Paralyzin*; & quod *Trunki* partes, affectibus indigenis satis superque afflictatas, usque novis & peregrinis aggraver; usque miseros mortales excruciet; tunc, ut sæpe accidit, maxime crudelis, quando minime suspecta.

Tantæ pestis & tam funestæ impetum, ut Ego pro virili sisterem; harum *Anomaliarum* Doctrinam, & disciplinam attentavi: Quos in *Trunco* locos adeat *Arthritis*; quibus in corporibus, quæ præferat *Diverticula*; quæ *Latibula*: itaque quos illa, generatim; quos, speciatim, *Meandros*, *Anfractus*, & *Obliquitate* amet: quibus de causis eas incipiat; qua velocitate percurrat; quo eventu terminet; quodnam item *Anomala* cujuslibet *Eidos*; quæ *Accidentia*; qualis, a morbo partis affectæ proprio *Differentia*; qua demum arte præcipue quam peculiari, & privata, quælibet oppugnari, quaque præcaveri debeat, tradere conatus sum.

Circuli, curvarum linearum perfectissimæ, natura & proprietatibus explicatis; ea re minime contenti Geometræ parvam & tantum inchoatam istiusmodi linearum ma-

mathesein, esse putavere; nisi etiam curvæ minus regulares enodatæ fuerint: atque ideo *Ellipticam*, *Asymptotas* aliasve curvas, *Circulari* minus perfectas, suscipere, & in iis extricandis operæ multum impendere; tam sibi met ipsis, quam aliis, utile & jucundum.

Quæ vero me ad opus hoc aggrediendum impulerunt, in primis duo sunt. Alterum, quod *Damnonios*, Populum nobilissimum, & de me optime merentem, *Arthritide Anomala*, perinde atque *Recta*, multum urgeri vexarique, jam diu observaverim; illaque multo plures, quam hæc occidere; ut *Arthritis Anomala* morbus non immerito *Lethalis* habeatur; uti, quæ *Recta*, *Salutaris*: raro enim hæc ægrotum interimit, nisi *Anomala* prius facta. Quibus tamen hominibus, cum plerisque aliis, morbi illius facie misere deceptis, de vero ejus ingenio, nempe *Arthritico*, raro unquam ullam fuit suspicio. Et tantopere sub aliena larva debacchatus est in eos hic affectus, ut, ex iis qui *Α'ρροξία*, qui *Colica*, qui *Syncope*, qui *Phthisi*, qui *Asthmate*, qui *Apoplexia*, (ne dicam alios affectus, utique complures) exquisita, pura, & genuina perimi, & e medio tolli censerentur; revera *Arthritide*, unum eorum aliquem æmulante, & larvam induente, non pauci, atque adeo (quod verissimum est) permulti fuerint sublati: non solum morte, sed & ignota ejus causa, infelices. Quas tamen eorum *Arthritides Anomalas*, methodis hisce nostris opportune adhibitis, quam iis, quæ continentem, & proximam earum causam minimo attigerint; nec quidem unquam respexerint: facilius cedere potuisse, conjectura ducor ad suspicandum.

Quod vero præterea calcar, atque animum, ad scribendum dedit, altum erat illud de *Arthritide Interna*, sive tollenda, sive dignoscenda, apud Auctores medicos silentium. Etsi enim patet, eam, ut, & periculum, quod eam insequatur, non esse novum, aut artis professoribus ignotum; tamen, quia neque illud periculum, neque ipsa *Arthritis*, multo minus ejus curatio, dedita unquam opera, vel pro ejus dignitate, & momento, fuit a quoquam unquam exposita, nec, quod sciam, inchoata; idcirco ejus Doctrina, quatenus diagnosis, & therapiam ejus comprehendit, inter artis Medicæ defectus, & desiderata, non immerito censeatur.

Ne vero quis, ex eo medicinæ consultorum hæc in re silentio, *Arthritidis* hujus in dubio ponat *Τάραξιν*, & de morbo, non tam gravi periculosoque, quam commentitio imaginarioque, disputare me coarguat; Operæ pretium existimo, veterum, quorum autoritate morbus ille (*Arthritis* scil. *Interna*) confirmari possit, e multis aliquot testimonia proferre.

Annos certe millenos abhinc septingentos (i. e. sub *Augusti Caesaris* Imperium) *Areteo* illi *Cappadoci* innotuit, ita de *Arthritide* verba (1) facienti, *Τισὶ δὲ νύμτασι ἐστὶ τὸ πένθος σκληρὸς περίσσεια*. Id est, *Quibusdam in omnis Corporis ambitum vagatur*. Et deinceps, *Ἡ δὲ Μετάβασις ἐς τὸν μῦα, καὶ Θώρακα*. *Ἀπίστον, οὐδὲν ἴσται τὸ Κακόν*. *Σπόνδυλοι ἀλγίστοι παχέος τε καὶ αὐχίνος, καὶ ἐς ἄκρον ἰσίδου τὸ ἱερὸν ὄστέον*. i. e. *Transitus quoque in Dorsi Thoracisque Musculos fit: Incredibile est, quam late Malum (i. e. Arthritis) serpat. Vertebrae Dorsi, Cervicisque dolent, & in summo Sacri Ossis Dolori inhaerescit*. Et paulo post *Τέροντες, Ἀδύναμις, Μῦες ἑαυτοῦ ἀλγίστοι*. *Γράβον καὶ Κροσφάρον μῦες τοσούτων καὶ κύριος ἡ διαδοχή*. *Ἐπὶ τὸ Θώρακος*. i. e. *Tendines, & Musculi cum distensione Dolorem patiuntur, nec non Maxillarum & Temporum Musculi. Item cum Renibus, & Vesica communicatur*. *O Rem admirabilem!*

Secundum hunc *Galenus* apertissime, *Satius*, inquit, est, ut *Humores parvi relictis*

H 2

Prin-

(1) Lib. 2. Cap. xii. Ed. in Fol. August. Vindel. 1603. per Henischium.

Principalioribus partibus in Ignobiliores ferantur, quam quod ab Ignobilioribus in Principes impellantur. Aspeximus etenim saepe in his, qui Articulari Morbo, aut Podagræ obnoxii erant, quod, repulsis ab Artibus Humoribus eo delatis, illi in Principem aliquam Partem contendentes, Homini interitum attulere: cui ea sola relinquebatur Spes Salutis, si iterum possent ad Artus revelli. (1)

Paulus etiam Ægineta nonnullorum meminit, qui Aures, Dentes, Guttur, & nonnunquam Jecur, Lienumque, Arthriticis Doloribus conficari pronunciat: Aquibus, nisi desubito Vitium in Artus sese recipiat eructetque, periculum brevi tempore Laborantes occupaverit. (2)

Adhuc Ælius (3) (Jano interpretante Cornario) Qui vero, ait, extreme ab hac affectione (nimirum Arthritide) apprehenduntur, his & Spina Vertebra, & Costarum Juncturae, & Genæ dolent: aliquibus autem & Iris, sive Corona pupillam Oculi ambiens neque est aliqua Ossium Connexio, quæ ab hac Affectione sit immunis.

Quibus animadversis Trallianus (4) sapienter monet, Ne astringentibus & repellentibus in affectis Partibus utendum esse, nisi totum prius Corpus Recrementsis liberaveris. Nam quod Articulis influit, ne ad Principales Particulas recurrens, Suffocationis causa fiat Ægro, periculumque Mortis adferat, metuendum est. Et in sequentibus, Multos attonitos, inquit, fieri conspiciamus, ubi Pedes tentari desierint.

Quid? quod Demetrius, inter recentiores Græcos, Pepagomenus, Michaelis Paleologi Medicus, his assentiatur; Libro (istius Imperatoris jussu) de Podagra scripto, Non tantum, inquit, in manus, pedes, omnes articulos sales ferri fluxiones: verum etiam in cerebrum, jecur, atque adeo ipsum cor. Easque teterrimas esse liberatque difficillimas. (5)

His accedunt ætate nostra Sennertus, Sylvius, Etmullerus, Sydenhamus, & complures alii; ut, tametsi Arthritidos Interna, qua late patet, diagnosi certa & fidelis, superfit nulla; nedum ejus ulla curatio propria; morbum tamen eum, Medicorum omnis fere ævi opinione, revera esse; eumque magnum, & ancipitem esse, omnino con-

con-

(1) Ἀπὸ γὰρ τῆ Κυριωτέρων μερίων εἰς ἀκυρώτερα μεδίσσεται τὰς κυριώτερας χυμῶς, ἢ ἀπὸ τῆ ἀκυρώτατων εἰς τὰ κυριώτατα, βελτίονός τι. Πολλάκις δ' ὕδωρ σπιδάμεθα, ἢ ἐπὶ τὰ κῶλα φρομεύων ὕμῶν ἐν ἀρθρίσιν τι καὶ ποδάγρας ἀποκρυδεύκων ἐκίδειν. ἂν ἐπὶ τὴν Κύριον ἐλθόντων, ἀπὸ θανάτου τὴν ἀνδρῶν, εἴται τὸ μίαν ἐλπίδα σωτηρίας, ἐὰν δαυδαύμεν αὐτοῖς ἐπὶ τὸ Κῶλον αὐτοῦ ἀναπαύσαι. Librum de Natura Hominis, Commentario II. ad Textum quintum: Editione Parisiensi.

(2) Τισὶ δὲ καὶ ὥστε, καὶ ὀδόντες, καὶ φάρυγξ, καί ποτε καὶ ἡπαρ, καὶ σπλῆν, ἢ ἀρθρικών μετέχων ἀλγημάτων ἐφ' ὧν μὴ διὰ τὰς ἐν τοῖς ἀρθροῖς ἢ μετὰ πύμασι ἐγίγαντο, Κινδῶνος ἐν ὀλίγῳ κατελάμβανεν τὰς Κάμνοντας. Libro 3. Cap. 78. Editione Aldina.

(3) Vide ejus Tetrabiblii tertiæ Sermonem quartum, Cap. vi. Editione Frobeniana: Basileæ MDXLII.

(4) Εγὼ δὲ φημι, μηδὲ ποῖς εὐφροῖς καὶ ἀπὸ κρείσσαι δαυδαύσεις ἐπὶ τῇ πεπονδῶν ἰσχυρὴν κεχρησθαι, μὴ ὠρότερον ὅλον ἀπερίττον ἰγασαμένον τὸ σῶμα. Τὸ γὰρ ἐπὶ ῥέον ἐν ποῖς ὄφθαι, διὸς ἐπὶ, μὴ ὠρὸς τὰ κύρια μέρη κατενδραμεύαν, αἴσπον μινύσει τε τῇ κατεπυγίῳ, καὶ κινδανεύσαι θανάτῳ τῇ Πάσχοντα. Ἐπὶ πολλῶν ἐρῶ μετ' Πιπυμὸς ἰτακολυδῶντας, ἢ Ποδῶν πυσσασμένων τῇ ῥάμασιζισσαι. Vide Alexandri Tralliani, Lib. II. Cap. I. Basileæ MDLVI.

(5) Οὐ μόνον δὲ εἰς Χῆρας, καὶ Πόδας, καὶ εἰς πάντα τὰ Ἀρθρα γίνονται οἱ ποῖτοι ῥάμασιζαι, ἀλλὰ καὶ εἰς Ἐγκέφαλον, καὶ εἰς Ἥπαρ, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Καρδίαν, ἀπὸ εἰς θανάτου, καὶ δυσπαλλακτώματα. Cap. v. Editione Parisiensi, per Chartierum.

conflet : & quidem mirari aliquando subiit , in morbo , toties a veteribus significato , per tot sæcula genus humanum affligente , explicando curandoque ; ab eorum temporibus ab hunc usque diem , progressum adeo parvum fieri ; adeo nihil agi : Utinam , quæ a nobis hanc ob rem in medium feruntur , proposito respondeant.

Illud denique adjiciam , unde Lectori *Hippocratis* æmulo , (id est , Præceptoris in medicina optimi Discipulo) Dissertatio nostra , uti spero , commendetur , & gratiam ab eo ineat : omnem hanc *Arthritidum Anomalarum* disciplinam , sive ætiologiam , sive therapeuticam , cum medicina *Hippocratica* , quantum in me est , convenire ; & (posthabitis hypothësis , naturæ vero judiciis tum avide investigatis , tum etiam diligenter examinatis) ad ejus normam & legem componi . Nec enim ille parum auspicato medicinæ operam dat , qui id aliter facit , quam *Natura* duce , & comite *Ratione* : Hoc autem minime omnium illi videntur facere , qui , neglectis phænomenis , *Natura* nomine venditent *Opiniones* ; itaque sibi , sui que similibus fraudi , aliis sint ludibrio .

Quare , de humorum *Transitu Migrationeque* & ab artubus in partem aliquam internam *Recessu* ; de eorum in ea parte *Receptione* ; deque eorum medicamentis ore , sumptis , in artus *Expulsione* , extra vero applicatis , *Revulsione* , creberrime nobis sermo . Sunt autem ista plane *Hippocratis* *Mnemones* , *Διαδίκτες* , *Ἀπορίαι* , *Ἀποκρίσεις* . Imo quidem , hanc , nostram medendi methodum , verbis generalibus , ipse divinus senex proposuit , præcepitque : Præcepit enim † *Ἀποκρίσας* , ἢ μὴ ἢ δὲ περὶ . τὰ δὲ ἄν δὲ , αὐτίαν δὲ σοφῶν , οἷος ἵκασα περὶ . Id est , *Revelanda ea , quæ quo non oportet , repunt : Sin autem quo convenit , iis Viam sternere oportet , ut singula eo vergant* . Quo quidem aphorismo , (tanquam oraculo , *Apolinis* instinctu edito ,) tum *Anomala* , tum *Primigenia Arthritidos* curatio tota brevi comprehenditur .

Morbi *Hypochondriaci* diversitates & morborum innumeras aliorum imitationes , quæ per omne ævum Medicis fucum , ægrotantibus molestiam fecerunt ; a clarissimo *Sydenhamo* graphice depingi , solertissime curari vidimus . Utinam etiam *Arthritidis* , morbi similiter multiformis varietates , simulationes , flexiones , *Anomalias* qui exprimeret , & pro rei dignitate , & amplitudine describeret , par esset *Sydenhamo* . Hisce vero desperatis , huc spectantia , quæ a me fuere passim observata , lubens in medium fero ; ea spe fretus , etiamsi non perfectas & absolutas , tamen nonnullas harum *Anomaliarum* , per hæc nostra qualiacunque , fieri tum *Historias* , tum *curationes* .

Habes , Lector , instituti rationem & consilium : utrique fave .

D E

ARTHRITIDE ANOMALA,
G E N E R A T I M.

CAPUT PRIMUM.

ART. I.



UM materia peccans, & aliena, quæ *arthritidos* sive *Primigeniæ*, sive *Symptomaticæ* causa proxima, continens, & conjuncta est; post aliquam in sanguine moram, naturæ demum molesta, ideoque expellenda, jam exilio parata est; permagni sane refert, quas in corporis partes ea mittatur; quibus in locis deponatur: Si enim in *artubus*, maxime vero si eorum commissuris; sicque ut de ejus in sanguinem reditu nullum sit periculum; profecto quidem hoc est ipsum naturæ propositum, quod in sui defensionem omni illa studio, summis viribus attentat: hæc morbi hujus solutio fida, accommodatissima: hæc *arthritis* exoptatissima, quæque jure merito nominetur *Regularis*.

II. SIN aliter acciderit, & ad corporis *Truncum*, sive aliquam ejus partem, materia fuerit appulsa, & in ea malum more suo machinata; longe alia rerum facies, alius est eventus: nam aut nulla morbi fit solutio, aut saltem inepta, naturæque votis minime respondens. Novus ex eo morbus exoritur, isque sæpe periculosus, sæpe perniciosus; indole, & ingenio propter materiam ab *arthritide* ductam, admodum singulari. Atque hæc illius materiæ, in ea quæ intus sunt, e sanguine ablegatio, & in iis commoratio; quandoquidem ex primo naturæ instituto (quæ semper *Regularem* præfert, & quoad fieri potest, molitur *arthritide*) minime peragatur; verum multo aliter ex illius errato, vel defectione: hæc, inquam, *arthritis* a nobis appellatur *anomala*; ea vocis illius significatione, qua apud veterem (1) Etymologum le-

gitur *anomalia*, id est, *extra Regulam*.

III. *Arthritidum anomalatum* *Διαγνώστας* difficultatibus quamplurimis involutæ, tenebris densissimis obscuratæ sunt; ut autem excudam, & ante oculos ponam earum rationem aliquam generalem, omnino distinguendum est inter eas *anomalas*, quæ *Regulari* nullo præcurrente paroxysmo sunt; & eas quæ regularem *arthritidis* paroxysmum insequuntur.

Illæ quidem partium, quas afficiunt, morbos tam mimice legitimos & exquisitos imitantur; ut internoscere illas, & ab hisce charactere proprio discriminare, prorsus *αδύνατον* existimetur. Quis enim, e. g. morbosam istam affectionem, quæ in corpore, ad hoc usque tempus immuni, neque *arthritidis* paroxysmo regulari vel semel unquam tentato, vel ei (quantum apparet) proclivi locum habens, anginam inducat; eaque angina legitimæ tam similem, ut neque ovum ovo similis; quis, inquam, istuc malum; quis hanc anginam, *arthriticam* esse somniaverit; quando nulli testes, symptomata nulla, vel minima quidem ex parte id arguere videatur? Nihilominus tamen *arthriticam* esse posse hanc *anginam*, omni dubio procul usu medico confirmatum est. Quare prætermittis hisce, quæ, ut nunc sunt symptomata, & eorum interpretationes, supra captum humanum esse censeantur; ad eas progrediar *anomalas*, quæ, paroxysmum *arthritidis* regularem a tergo secutæ, *Diagnoses* habent probabiliores.

IV. HÆ vero *Diagnoses* non ex caterva sive globo symptomatum, simul semelque concurrentium, (quod in affectibus plerisque locum obtinet) expectandæ; sed ex symptomatum serie, vel ordine, in longum productæ, capiendæ sunt. Ut autem istæ catervæ, *Συρροπαί* ab antiquo *παθολογονομικῆς* fuerunt nominatæ; ita quidem hi *Ordines*, *Pathognomonici* non inepte nominantur.

Qui quidem *Ordines arthritidum anomalatum Pathognomonici*, pro istarum *arthritidum* diversitate, diversi sint, oportet; & quidem alias conveniunt, alias inter se magnopere sunt disjuncti. Conveniunt in eo, quod

(1) Isidori Lib. I. Cap. 27.

quod ad unum omnes ab *arthritis* regulari sumant initium : quandoquidem , de *anomala arthritis* ὑπάρξει minime unquam constabit , nisi de *Regulari arthritis* præcurrente prius constiterit . Atque hæc istarum Διαγνώσεων pars prima est .

Discordant eo . quod , - eodem loco incipientes , diversas omnes ingrediantur vias : uti radii ejusdem circuli , ab eodem puncto , nempe centro , incipiunt ; sed in varia peripheriæ puncta desinunt . Ut hoc exemplo clarius ostendatur , *Dysenteria* , v.g. *Phthisis* , & *apoplexia arthritica* consentiunt in eo , quod ab *arthritis* regulari , & in artus sæviente , exordiantur omnes : verum , quoniam miasma nunc ad intestina appulsum est , ubi loci *Dysenteriam* facit ; nunc ad pulmonem , ubi *Phthisin* ; nunc autem ad cerebrum , ubi *apoplexiam* ; idcirco *arthritice* hujus *apoplexie* , *Phthiseos* , *Dysenterie* Diagnoses ex cerebri , pulmonis , & intestinorum , nempe ex locorum affectuum signis , maxima ex parte sunt eliciendæ . Atque ista locorum , ab *arthritis* in eos translata affectuum , accidentia , Διαγνώσεων harum est quod reliquum .

Quoniam vero hi affectus postgeniti , *arthritidem regularem* nunc e vestigio sequuntur , nunc ex intervallo ; eoque alias brevi , alias longiori ; magna profecto , ob hanc rem . earum est diversitas . Alii originem plene & plane continentur *arthriticam* ; alii , utrum habeant , an secus , minime declarant . Adeoque , ut diagnoses hæc finiam , hic Canon istorum affectuum *Pathognomonicus* . Quo certior *arthritis* regularis ὑπάρξει , & illius materiæ , in ea , quæ intus sunt , quo postea certior est translatio ; eo confidentius *anomalam* , & quidem in parte jam nuperrime occupata , esse *arthritidem* possimus statuere .

V. CUM autem *arthritidem* ea , quæ intus sunt , *anomalam* infestare dicam ; vox (*intus*) ut & alibi (*Partes interne* ,) uti etiam τὸ (*anomalam*) & (*Truncus*) sic a me sumuntur , ut *interne Partes* sint trunci omnes : *Truncus* autem tres ventres comprehendat , & cum artubus (quorum respectu partes ejus dicuntur *Interne*) constituat universum corpus . Ut autem voces (*interne*) & (*intus*) & (*Truncus*) sensu largiori , ita vox (*anomala*) strictiori accipitur : Non enim omnes *arthritidos* in trunco *anomalias* , non artuum ulla , trahere propositum est .

VI. HINC *Arthritidem* inter *Regularem*

& *anomalam* , quæ sit differentia , quod discrimen , explicatu facillimum . Primum enim illa tantum artus invadit , eorumque præcipue articulos ; tum humerum , & condicem , tum cæteros omnes : Hæc corpus reliquum ; cujus partes , nunc *contentas* , nunc *continentes* ; aliasque sæpenumero adoriatur , multifariam affligit .

Deinde , *arthritidos* regularis , cuicunque articulo affixæ , quoscunque artus pervagatæ symptomata , simul sumpta , inter se consentiunt , similiaque faciunt *Pathognomonica* , & (quod de similibus triangulorum lateribus solet dici) ὁμολογῶσι . Nam in *arthritis* regulari fixa , dolorem fere perpetuo , tumorem creberrime , ruborem sæpe , neque raro ardorem & tofos cernimus : & in vaga dolorem , unde ipsius nominis ratio , vagum ; cui nonnunquam accedit tumor albus , & tanquam οἰδηματώδης . Contra vero *anomala arthritis* , uti in locis ea longe plurimis est , ita longe plurima & diversa sunt symptomata ; in ordines ejus *Pathognomonicos* & numero plures , & valde dissimiles (secundum partes ab hac *arthritis* tentatas & affectas (disponenda , & digerenda .

Postremo *arthritis* regularis est a natura potissime perita ; maxima ex parte tuta , perpetuo desideranda , crisi : ut ad vitam servandam in primis necessaria ; neque alium quemvis (nisi idcasu fiat) morbum gravem , & ærumnosum habens supervenientem . Hæc contra ortus est sinistri , & ex naturæ frustratione ; raro absque ægroti periculo , interdum summo comitata , exituque crebro fatali . Adeo nempe a *Regulari* distinguitur *anomala arthritis* .

VII. Id autem memoria tenendum , non solum exquisitæ *Primigeniæque arthritis* esse has Ἀνωμαλίας , verum etiam *Simulata Symptomaticæque* ; easque esse *arthritides Symptomaticas* , quæ *Primigeniam arthritis* non tantum modo recte agentem , sed etiam deviam , sed *anomalam* sequantur , & in rebus permultis æmulentur . Hujus autem verbis vis , & interpretatio non ita intelligenda , ac si omnes *Symptomaticæ* ad *anomalias* ἀδιακριτῶς omnes æque proclives essent ; & contrario , has illis sapius , & longius excurrere , & quidem ad alios corporis , locos est exploratissimum .

VIII. At truncum illa universum non æqualiter infestat , aut pari modo ladic ; verum , ut in provincia exteriori *arthritis* regularis , sedem in pedibus principalem ponit ;

nit; quam creberrime frequentat, habitatque constantissime: aliam secundi ordinis sedem elegit, nempe manus articulos; quos aliquanto rarius, sæpe tamen invisit: alias habet tertii, videlicet genu, cubitum, humerum, & coxendicem; quos articulos adit, quasi invite omnium rarissime. Ita quidem in provincia interiori, sive corporis trunco, *arthritis* se gerit *anomala*. Namque omnium sæpissime ventriculorum, & intestina petit, & in iis tyrannidem exercet: hinc *Ἀποπλῆξις*, *Δυσεντερία*, *Vomitus*, hinc *Colica*, *Dysenteria*; *Diarrhæa*; hinc interdum *abscessus arthriticus*. Sæpe caput, tanquam arcem munitissimam aggreditur; & nunc *Vertiginis*, nunc *Cephalalgia*, nunc *apoplexie* partes sustinet *arthriticae*. Aliquando etiam in nervos se insinuat: unde *Paralysis arthritica*. Non raro pectoris regionem, spirandique tentat organa; & est vel *Asthma*, vel *Tussis*, vel *Hæmoptoe*, vel *Phthisis arthritica*. Aliquando etiam fauces invadit, & sub *angina* vultu ludificat ægrotos. Interdum gingivas, & appellari solet *Dentium Podagra*. Interdum renes afficiendo *Calculum* infert, *Dysuriam*, *Stranguriam*: alias, scilicet aliasque trunci partes, viscera, membranas, musculos, glandulas, tendines, ligamenta, ne dicam ossa penetrat inficitque, ut in omni trunco, quod ea liberum, & ex toto sit immune, vix reperitur.

IX. Ne cui vero *arthritidi* videatur alienum, tot ei, vel erranti, *anomalias* obtingere; inque morbos, si eorum facies spectemus, numero tam multos, naturam tam diversos, illam distindi, & dispertiri; hoc cum animo cogitet. Primum, virus *arthriticum*, sanguine commistum, una cum eo corpus univertum circumvehens, in singulos ventris singuli recessus, in partes corporis omnino omnes immitti, earumque adyta intrare. Deinde, iter ad articulos non adeo recta facere miasma illud, ut in aliis corporis regionibus minime unquam divertatur; verum ex contrario, ad partem trunci aliquam appulsum, in ea sæpe morari, sedemque tanquam propriam occupare. Postremo, illa commoratum, illius electum aliquem, sed novi moris affectum, sed *arthriticum* inducere tum posse, tum etiam solere. Ut *arthritidis* imperium, usquequaque dilatatum, amplum esse constet, pariterque sere atque humanum corpus immentum.

X. Causæ loco proximo perpendendæ ve-

niunt; Ex vero, uti mihi videtur, ita se habent. Alia est ipsum *Miasma arthriticum*, vel in sanguinis sinu inclusum, vel ad corporis extremitates amandatum; quod tamen iis minime defixum, aut inhaerens, repercussu proclive sit, & in trunci organicam partem aliquam facile repellatur.

Alia in ipsis Trunci partibus, quæ miasma depositum accipiunt, inest. Earum enim infirmitas & *ævis* maior, minor; eaque interdum naturalis, alias acquisita, reddit eas *arthritico* plus minus oneri ferendo idoneas. Atque hæc duæ causæ internæ sunt, & procatasticæ, & in *anomalis* huiusce generis quibuscunque locum obtinent.

Alia est externa, & evidens causa; ut emplastra, cataplasmata *Ἀποκρηστικά*, frigus, & quidem omne, quod materiam, vel a *οἷς ἑωδὲς* repellens, vel iis affigi prohibens; ad ea, quæ intus sunt, illam intradat. Atque hæc causa frequens & pervagata, minime vero constans, & perpetua est. Trunci enim partes aliquando debiles, & *ἀσθενεῖς* nulla omnino urgente vi externa, oris per se recipiunt ultroque sustinent.

XI. DIFFERUNT inter se *arthritides anomala*, primo, secundum *Locos sive Subiecta*: Alia enim est ventriculi; alia intestinorum; alia pulmonis; alia faucium; alia cerebri; alia nervorum; &c. Et quidem adeo differunt, ut, tot diversæ inter se morborum species, a plerisque omnibus fuerint existimata.

Tum, in eodem subiecto, differunt secundum *Causa*. Ut enim illæ varietate magna distinguuntur; ut illæ nunc fortius, nunc remissius agunt; utque hoc illoque modo, *πολυτρόπως* implicantur; *anomaliarum* oritur *arthriticarum*, quæ pari gaudet diversitate, vis & copia similiter varia.

Dicam planius, & distinctius; primum *ratione Materiae*, sive causæ continentis; quam modo puram putam *arthriticam*, modo alienam, uti *Scrofulosam*, *Scorbuticam*, vel istiusmodi aliam, habet hæc *arthritis*; modo materiam recta e sanguine effusam; modo ab extremis partibus translata; modo in iis partibus sævientem, membranas acriter rodentem; modo mollem, edentulam; modo in iis nuperrime; modo ex intervallo. Unde *arthritidum anomalorum* multiplex varietas, discrimen ingens.

Deinde, *ratione Subiecti*, nunc illud a natura debile; (uti sunt glandulæ serme omnes:) nunc materiæ vitiosæ a sanguine fecer-

secernendæ natura destinatum ; (uti præcipue sunt conglomeratæ :) nunc malis moribus illud debilitatum ; (quod in ventriculo sæpiissime observatur ;) nunc , prægresso aliquo morbo , (quod in hæmoptoicorum pulmone ,) suscipiendo miasmati *arthritico* magis paratum est . Unde etiam harum differentiarum *anomaliarum* pene innumeræ . Alia porro est differentia , ad hunc ordinem referenda : nam ab alio *Subiecto* , uti a faucibus , ad artus facillime , sua quasi sponte adit ; expeditissime , promptissime demigrat ; ab alio , ut a nervis , non nisi difficillime removetur , & summis medicinarum viribus , remediis , veluti *μοχλικοῖς* ; interdum vero ne quidem ullis . Unde etiam ἐν τῇν διαπεπλυν harum *anomaliarum* magna diversitas .

Postremo , *ratione Cause externe* ; nonnunquam mero extremitatum robore , partium internarum *ισορροπῶν* exuperante ; sæpe emplastris , cataplasmatibus , unguentis , linimentis repellentibus ; nonnunquam aëre perfrigido ; nonnunquam pedum , in aquam frigidam , vel salsam , immersione ; alias ligaturis , aut tibialibus nimis angustis fit *arthritis anomala* .

Ex hac varietate qua *Subiecti* , qua *Causarum* , *arthritides* sunt *anomale* tam variez , tamque multiformes , & detectu sæpe tam difficiles ; ut vel *Æsculapio* , vel *Herculi Medico* facebant negotium .

XII. MEDENDI indicatio generalis est , ut *arthritide anomala* pars affecta quam citissime , quam tutissime levetur . Hoc autem fit , materiam in ea depositam partim e corpore evocando , partim in artus transferendo . Evocatur e corpore materia modo venæ sectione , modo catharsi , modo diaphoresi , modo epispasticis , modo apoplegmatismsis , modo errhinis : Quæ quidem omnia , sicut hujusmodi cætera , quando *arthriticis* omnibus *anomalis* simili nequaquam modo adversentur ; verum e contrario , aliis alia : quæ illorum auxiliorum quibus *anomalis* , quaque ratione opponantur , infra speciatim explicabitur .

In præsentia dicam , e corpore materiam evocantibus (quæ primo loco erant) etiam si crebro necessariis , non ita crebro solis , ægrum sanari ; interdum lædi : *Lædi* nimirum , quoties perperam & imprudenter electa , vel incaute & supra modum ea fuerint adhibita , unde nonnunquam malum augetur , aut alias ægri conditio pejor red-

Sydenham Opera Medica Tom. II.

data est . Non autem semper sanari , quia materia , quæ relicta est in corpore , *arthritica* , tametsi evacuationibus retusa , quando jam maturata & ad *αἷμα* est evecta , brevi se attollet , iterumque turgendo cristas eriget , neque nisi propriis excerniculis (id est , glandulis articularibus) ejus fiat excretio , vel minimum artubus appositio , sanguini quies erit . Præmissis igitur , quæ par est , evacuationibus , optime felicissimeque curatio perficitur , per materiam in artus translationem . Hoc enim ipsum est naturæ propositum ; hoc illi maxime optatum ; quod dum molimur , ei laboranti , neque alienum ex more , & qua via solet debeatque exturbanti , ferimus suppetias . Ἀδὲν ἀγνῖν , ἐκ αὐτῆς μάλιστα βεβῆν (ἡ φύσις ,) αὐτῇ ἀγνῖν , διὰ τοῦ ἐξυλαρόντων χυμῶν . Hoc est , Quæ educere oportet , eo ducenda , quo maxime Natura viam afficiat , per loca convenientia . Hippocr. Aphorism. 21. lib. 1.

Medicamenta , huic intentioni apta & inservientia , sunt duorum generum , quæ ore sumpta materiam in artus amoliantur ; quæque extra iis admota , eo illam invitent .

Interna , *arthritidem expellentia* , sive Πεδεργαγογὰ , sunt e classibus cardiacis , & diaphoreticis , magna ex parte , selecta præsidia ; uti .

Pulveres Zedoaria , Contrayerva , Gentiane , Serpent. Virg. e Chel. C. C. Purpureus Batei ; Lapid. Goani , L. Contrayerva , Species Diambra , Confect. liberantis ; Cl. Fulleri Pulvis Alexipharmacus ; ejusdem P. Stomachicus amarus ; Cl. Villisii P. Bezoarticus ; Pulvis Ruber Exoniensis ; Flores Salis armoniaci ; & id genus alii .

Electuaria , Theriaca andromachi , Mitbridatium , Elect. de Ovo .

Spiritus C. C. Simp. vel Succinatus , Sp. Sanguinis humani , Urina , Volatilis Oleosus , Serici , & ejusmodi alii .

Vinum album Gallicum , Campanum , Mosellanum , Rhenanum , Burgundicum , Burgigalense , Lusitanicum ; Pomaceum , maxime subacidum .

Quoniam autem Ferro , ad extrudendam *arthritida* , nihil potentius inveni , aut quod ægrotanti sæpius sit auxilio ; quod ethicax , & tutum ; quod annorum usu multorum a me expertum , ejus Præparatum accipe .

℞. Limatura Ferri ℥x. Sarsagine , vel Patella terrea , vitro obducta , Urinam mada-

fac humanam, æstivo Sole, vel ad Ignem sicca; iterumque (Spatula Ferri particulas, ne coalescant, bis in die agitando), irrota, donec abeat in Rubiginem Massa. Exeam, & Rubigine confectam eam in mortario ferreo contunde: Tusam, & in Pulverem redactam Situla, quatuor circiter Congios aque fontane continenti, injice. Pulverem cum aqua commisce. Horæ post quadrantem, aquæ, quod summum est, & minus turbidum, levis detrahe; & ad Pulveris, in ea natantis, siccitatem evapora. Quod in situla relictum est humoxis, similiter evaporetur. Pulvis in fundo crassior, Urina irroretur; &c. uti prius. Itaque Nutritio, Tritura, perque aquam Separatio repetatur, donec omne Ferrum in Pollinem mutabitur. Chartæ Emporeticæ, Coni in formam circumvolutæ, Pulveres siccatores inde; aquam fontanæ fervescant, paulatim, & per vices, superaffunde; donec urinoso sale penitus abluto, exstillet aqua insipida. Pulverem denuo exsicca, & usui serva.

Est illa Rubigo Ferri subtilissima, merum alcohol, non solum arthritide, verum etiam chronicis plerisque aliis, ægrotantibus, præcipue teneris & imbecilibus utilissimum. Dosis ℥ss. semel, bis in die, pro re nata.

Pulvis Ruber Exoniensis ita preparatur.

℥. Cacumin. Anagalid. Scabios.

Draconis, Betonicæ, Scordii.

Tormentillæ ana ℥iv. misce:

incisa digere, igne arenæ, horas xxiv. in Vini albi Lusitanici ℥iv. Vitro probe clauso. Tunc fiat Colatura: & Expressio.

℥. Boli armene pul. ℥i. Infuso prædicto in spissitudinem Linimenti temperetur; crebra agitetur, sole exsicceatur; rursus irrigetur; &c. Itaque Massa Infusa nutriatur: at cum ultima ejus semilibria, illi addatur.

Mitridatii ℥i.

Diascord. ℥i℥.

Conf. Alk.

Pul. Rad. Curcumæ ana ℥ss. Serp. Virg.

Crocii Brit. ana ℥ii. misce, exsicca; f. Trochisci, vel Placentule, solis æstu durandæ, loco calido servandæ, Dosis ℥j. ad ℥i℥. vel ℥ii.

Ad arthritidem expellendam Pulveres, Bo-

li, Pilulæ, post evacuationes necessarias exhibendæ.

℥. Ferri hujus Nutriti, sive alcohol. Martis ℥℥. Sacchari albiss. gr. xv. Pul. Nucis Myrist. gr. v. f. Pulvis, cum vini Haustu assumendus, vel

℥. Pul. e chel. C. C. (vel Lapid. Contrayervæ, vel Rubri ℥i. alcohol. Martis ℥℥. f. Pulvis.

℥. Ther. andram. ℥i. (ad ℥℥.) alcohol. M. gr. v. (ad x.) Syr. Caryoph. q. s. f. Bolus, vel

℥. Pul. e chel. C. C. (vel alexipharmaci) ℥i. Spec. Diambre, Ferri Nutriti ana ℥i. conf. alk. q. s. f. Bolus.

℥. Pul. Serpent. Virg. ℥i. alcohol. Martis ℥℥. Ol. absynth. chym. gt. i. Ext. cent. q. s. f. Pil.

Detur aliquod ex hisce compositionibus, semel, bis, terve in die; uti res ægroti postulet, & patiat; cum idoneo vehiculo, Vino puta, Pomaceo, vel Julapio Cardiaco.

Si liquidum malis, in eundem finem propinetur Infusum amarum, cum Tinctura Martis; vel ejus alcohol.

℥. Rad. Zedoar. Gentian. ana ℥ii.

Cacum. abs. Rom. agrimon.

Cort. exter. aurant. siccæ.

Crocii Brit. ana ℥i. misce, & digere, in Vini rubri Lusitanici ℥ii. ad idoneam alterationem: Tunc f. Colatura. Dosis ℥iij. cum alcohol Martis gr. v. ad. x.

Sunt & alia medicamenta, arthritidi protrudendæ apta; quæ anomalis quibusdam singularibus occurrunt, & suis in locis tradentur: hac autem maxime commania.

Internis hisce Πόδαγγογός, vel hujusmodi aliis, dies quatuor aut quinque usurpatis; si in Artubus nihil excitabitur doloris, ad ea, quæ extraimposita arthritidem ad τὴν ἰσχυρὰν eliciant, descendendum est. Articulo dolere solito admoveatur Empl. ex Cummi Caranna vel Oxycroceum, vel Cephalicum, cum Picis Burgund. dimidio, triente, vel quadrante. Valet Urticatio, veteribus in usu adversus dolorem ischiaticum, valent Balnea, sed calidissima; uti etiam Pelles animalium recens detractæ. Vel applicetur Ceratum illud viride, ex quo sunt Pefasotheca; vel si vires ægri ferant, & res in dubio versetur, Phenigmus

℥. Fermenti vet. partes ii.

Sem. Sinapios.

Raf. Raph. Sylvestr. allii,

Cacu-

Cacumin. Rutæ ; Fimi Columbini , ana partem unam ; cum aceto Vini albi contunde ; ad spissitudinem Cataplasmati redige .

Admoveatur ejus portio , quam fieri potest , calidissima , cum vestitu apto , laneorum nempe involucris ; & quamprimum illa refrixerit , donec tumor erit , usque eo renovetur . Ægrotanti , si inter cruciatus animo defecerit , *Julapium Cardiacum* , vel , quod præferre soleo , *Vinum* aliquod generosum sæpius propinetur . Tumori demum facto , ne sanguini reddatur in eo contentus humor , *Epispasticum* , cujus beneficio is educi possit , applicetur .

Ubi nulla præsentis auxilii necessitas , aut ægrotus debilis , & tener , doloris fuerit impatiens , tibiis , vel cubitis (prout *arthritis* , imos , vel supremos artus solet occupare) primum *Epispasticum* commune superponatur ; quo duodecim vel duodeviginti horis post detracto , imponatur id , quod sequitur .

℞. Axung. Porcin. ℥i℥. Empl. Melilot. f. ℥i℥. Pul. cantharid. ℥i. m. f. Emplastrum .

Hujus *Epispastici* auxilio , dies sex , octo , vel decem educatur , quandiu nempe visum fuerit , *ἰχθυόδης αἷμα* . Quacunque via progrediare , salutaris hæc severitas , inanem omnem clementiæ speciem longe multumque vincens , *arthritis* paucis diebus solet allevare . Ita falsum est quod effluit , ut ex eo sæpe pruritus , & partium aliquando vicinarum inflammatio , & tam diutinum esse flumen observatur , ut ne perpetuum sit , interdum eximescat æger . At , quantum mihi notare licuit , inanis hæc sollicitudo . Nam , ichore supervacuo exulante , concidunt symptomata : ex quo æger vegetior , appetitu avidiori , animo majori est donatus ; ab *arthritis* accessione nova ad tempus aliquod incolumis .

At ! Tribum *arthriticorum* delicatam , mollem , & doloris impatientem instare video ; quæ periculum ex dolore meticus , & ex *ἀλγίᾳ* felicitatem , omnem hanc *arthritis* expellendæ medicinam , illiusque professorum crudelitatis arguit ; neque inter hæc tormenta (*Phænigmos* scilicet aliaque dolorem excitantia) aliter , quam in *Phalaridis* Tauro , vivi contendit ; neque sine indignatione quadam me objurgat , ac si verbis *Æschyli Prometheus* usâ .

Ἐλαφρόν , ὅς τις πημάτων ἔξω Πόδα
Ἐχαι , παραινῆν , νυδιστῆναι τῆς κακῆς .
Πράσσειναις . Id est .

Facile , quisquis Pedem extra mala habet , adhortari , & monere infelices . Et , ut verum fatear , quærimonias hac de re me plus semel audivisse , non dissimulabo . Pii autem Medici est , dum morbum sedulo & artificiose conatur relevare ; quidquid in ea re occurrat impedimenti , studio , & constantia vincere , vel patienter ferre . Exponenda igitur his hominibus est *arthritides anomala* malitia ; & quanto melior , & mitior sit hæc crudelitas , quam permisericordiam methodus ; illa brevi , & tolerabili dolore sanitatem ; hæc quiete , multo destabiliore : mortem accelerat .

His in genere præmissis , *anomalas arthritis* speciatim explicandas , jam nunc aggrediar .

C A P U T II.

De Ventriculi affectibus arthriticis .

ART. I. *A* Ventriculi & Intestinorum malo , nempe dyspepsia , creberrime potissimeque nasci *arthritida primigeniam* ; ex ejus doctrina , luculenta & idonea , liquido patebit . Ejusdem *arthritis* ut etiam *Symptomatica* naturam exquirenti manifestum erit , nullam in universo corporis trunco partem , *Ventriculo* & *Intestinis* , eam utramque perfectam antepone ; nullam frequentius ingredi ; nullam diutius tenere ; nullam gravius affligere ; nullam sæpius repetere . Quæ quidem res , uti methodi nostræ , ab *arthritide* eorum *anomala* incipientis , rationem abunde comprobant ; ita quidem merito requirit , ut , quæ sit hujus lævitæ frequentæque causa , studiose examinemus .

Quo vero clarius & dilucidius *anomalavum* , hæce partes sic infestantium , expositio sit ; de iis , quæ in *Ventriculo* locum habent . hoc capite ; de iis , quæ in *Intestinis* , suo ordine postea disputabimur : ut , in quibus ea inter se concordent omnia , & in quibus discrepent ex conjunctis & juxta se positis facilius innotescat .

II. Ut *Ventriculum arthritis* occupet , & in eo commoretur , duo videntur esse necessaria . Primum , in sanguine miasma *arthriticum* , sive nativum , sive malis moribus acquisitum . Sæpe quidem nativum , huic affectui suo Marte generando , par & æquale reperitur . Sin ebrietate , gula , vel

I 2 utra-

utraq; id adaugeatur; fortius inde factum, cernem molitur efficacius accessionem, præcipue *anomalam*. Neque tantummodo inesse sanguini, & cum eo circumvehi sufficet; nisi etiam in fugam abiturum; nisi exilio, quocunque vult natura, fuerit paratum. Alterum est, ut huic miasmati accipiendi, in tunicarum vel fibrarum intervalla adsciscendo, *Ventriculus* accommodetur; & ad illud in recessus intimos admittendum, aptus & conveniens sit.

III. ADVENAM illius accipit *Ventriculus*, sæpe propter imbecillitatem ab incunabulis ductam, ipsoque ortu factam; ob quam in illo expellendo arcendoque partes minime possit sustinere.

Et quidem tanti, ad inferendum hunc affectum, momentique tam magni, est hæc imbecillitas, ut ex his, qui eo laborarunt, antea *Ventriculo* laborare, plerique omnes invenirentur. Illa vero, quam dixi, imbecillitas aliquando subita est, & uti conjicio, ex improvviso. Quoties nimirum Venere absumantur; vel, ex dolore, timore, aliove quovis animi pathemate, recedant spiritus animales; *Intestinorum* membranz flaccescant; itaque advenæ, sese intrudendi non ad *ισοππορίας* adversentur, atque adeo viam aperiant. Cujus quidem rei, (*anomalie*, videlicet, hoc in loco *arthritice*, a mœrore inductæ) exemplum mox subjiciam.

Nonnunquam autem crudum, acidum, biliosum, aliudve aliquod ineptum & vitiosum, in *Ventriculo* coacervatum, miasma illuc allestat, & tunicas ejus irritando vellicandoque, ut in iis illud deponatur, efficit: non alio modo forsitan, quam, in ambitu corporis *Epispastica*, *Phenigmi*, & id genus *atrabentia* vulgo dicta, curim, mordendo stimulandoque, serum, & nonnunquam ipsum sanguinem ad se invitant, & quasi attrahunt. Quod quidem usum venit admodum frequenti; sic, ut in causis hujus *anomalie* procatarelcicis nihil, ut opinor, frequentius.

Interdum miasmatis, in *Ventriculum* missi, causa est externa: uti *cataplasmi*, *Emplastrum*, aliudve quod vis istiusmodi repellens: quo ne extra in articulis maneat, neve in eos emittatur *arthritis*; verum e contrario, ut in *Ventriculum* pellatur, effectum est creberrime. Atque huc referri frigus oportebit; seu balnei, sive aëris fuerit: & quidem, multum hac in re valere frigus externum, iterum & sæpius observavi.

Ex hisce causis; qua antecedentibus, qua evidentibus; sed ratione, modo, & *εὐεχία* alias alia, valdeque inter se diversa operantibus; *anomalias* notare licet, in *Ventriculo arthriticas*: quarum *ἴδος* & *ἴδος*, ut ad illa descendamus, plerunque tale est.

IV. Cum *arthritis* aliquandiu *Regularis* fuit, & in artubus accessiones recessionisque multas ex intervallis iteravit; sæpe quidem videmus, paroxysmum ejus, vel ex *Frigore*, *Emplastro*, *Cataplasmo*, *Unguento*, vel istiusmodi aliquo externo repellente, vel post satietatem, aut crapulam; & in victu erratum aliquod, nunc abscindi abruptique; si nempe esset: Sin nullus fuerit tunc temporis paroxysmus, spatio præter morem excludi prorogarique. Hanc paroxysmi regularis sive intermissionem, nonnunquam sequitur *Ἀρροξία*, cibi fastidium; eique postea se adjungit pectoris gravitas; & deinde ructus, vomitio, & interdum cardialgia. His sæpe additur *Intestinorum* oppressio, dolor, constrictio, & aliquando æstus, respiratio impedita & angusta, oscitatio crebra, cephalalgia, vertigo, & interdum mœstitia, *Σκόνευς*, faciei pallor, & post aliquod tempus imbecillitas universalis, & totius corporis macies.

Et si hæc symptomata fortasse nunquam in eodem corpore simul semel observantur omnia; ea tamen horum caterva creberrime videtur, quæ *Ventriculum* maxime, secundum cum *Interranea*, malo quodam intestino affici, gravarique significet; eique *κατὰ Σπυταῖαν* *ιτιγίαν*, tum imo ventre, tum medio tum etiam supremo, cum systemate nervino, ea, quæ recitavimus, symptomata: quod ea singulatim examinari facillime patebit.

Abs quo hæc intus oboriuntur, rara in extremitatibus *arthritis*. Fixus, vagus dolor, tumor rarus. Qui diu clinicus fuit, nonnunquam, hunc in modum affectus, expedite & prompte ambulat. At, quod externo omni dolore pejus, magis indies intestina mala magisque ingravescent: Sic, ut æger (nisi fortunate *Deus* se interposuerit, & vel tempestate ab immoderata & perfrigida, ad mitem & benignam mutata; vel medicina apposite adhibita, reducta fuerit *arthritis regularis*) inedia, languoribus, & dolore confectus, e medio sensim abiens, post menses aliquot tristissime actos, mortem denique misellus obeat.

V. Quicunque hæc symptomata, maxime vero

vero eorum ordinem, quo ex aliis emanent alia, iudicio rite ponderavit, mecum, ut opinor, sentiret; *arthritidem*, olim regularem, nunc *anomaliam* fieri, & in *Ventriculum* divertere. Cujus rei probabilitas ex hisce paucis, simul consideratis, omnino sumi potest. Primum, quod nullum unquam hominem, nisi *arthriticum*, adoriatur hic affectus. Deinde, quod nec eum, nisi miasmate *arthritico*. eoque maturo, & volatili turgentem. Deinde, quod neque illud, nisi vel a paroxysmo vacuum, vel eum habentem intercisum, imperfectumque. Deinde, quod e vestigio sequatur recte *arthritidos* defectum. Quibus omnibus, uti par est, pensatis, nihil verosimilius videtur, quam quod *arthritidos* materia, *Ventriculum* appulsa, dictam moveat tragediam. Hujus autem opinionis fides ut amplius stabiliatur, hoc, quo nihil clarius, nihil luculentius optari potest, unum superaddam; nempe quod *arthritide* regulari denuo inducta, (id est, materia *arthritica*, a *Ventriculo* in artus amandata) nihil huic affectui citius, nihil tutius medeatur.

VI. Senes hac *anomalia* maximopere conficiantur; quorum sanguis, in miasmate, per ætatem ingravescente, expellendo; quorumque viscera, propter imbecillitatem ætate crescentem, in eodem avertendo, minus valent. Sed non iis propria est habenda; quando in adultos, in illis juniores sæpenumero cadat: Et quidem adeo, ut *anomaliarum*, quotquot sunt, *arthriticarum* nulla unquam, quod meminerim, magis. De cujus rei causa, ut conjecturam faciam, nihil magis in promptu, aut verosimilius habeo dicendum, quam istam in victu incuriam; licentiam istam (inutilem dicam, an perniciosam?) qua istius ætatis homines in mala se innumera immergunt. Quod ut pateat, unicum isthuc adjicere necessum est, in juvenibus ab errato in potu aut cibo, incipere eam quam sæpissime solere.

De anni tempore, quo potissime gliscat, enunciari potest; etiam si nullum illa non arripiat tempus, nullo tamen magis vigere, quam autumnus, quo, ad spumam omnem *arthriticam* e sanguine eruendam, vires exerit natura, & ut illam ad se alluciant, per fructus horzos æstate devoratos, & in ductu suo retentos computrescentesque intestina præparantur.

VII. Hæc cum hujusce *anomalie* ratio sit creberrima, operæ pretium esse videatur, eam cum *arthritide* regulari paucis compa-

rare, & utranque, quasi trutina, examinare. Age igitur, calculum ineamus, & initio, quod in confesso est, ponamus, diatesin in sanguine *arthriticam* tam hanc, quam illam præcedere. Deinde miasmatis, e sanguine ablegationem similiter utranque anteire: Et quidem, in his duobus, eis inter ipsas convenire.

At, quod altero loco dicendum, in quibus secum dissentiant, sunt quam plurima. Nam in accessione regulari sanguinis orgasmum, pulsus celerem, carnis æstum, eumque aliquando ingenem, naturæ nixum molitionemque plus minus intensam observare licet: contra vero in *Ventriculi arthritide*, nihil horum evenit; at anxietas, inquietudo, languores ægrotantem urgent. Illa naturæ vegetæ, vividæque, & magnam aliquod moventis opus; hæc fatigatæ, hæc oppressæ, & oneri succumbentis. Postremo, illa vitam reddit securiorem, hæc mortem imminentiorem. Tantum inter hæc *arthritides* est discriminis: & tam certo, si earum altera *Regularis*, alter huic contraria est.

VIII. Neque de istarum *anomaliarum* Historia, vel ejus fide, derogari quicquam arbitror; si forsitan earum aliqua (prout diversæ sunt, & eorum numerus pene infinitus) sine ulla sive e prædictis, sive alia quavis evidenti causa, fiat; vel, si una cum paroxysmo regulari, non autem post eum, uti nos statuimus; vel, si ab ejus interruptione intervallo, quam proposuimus, longiori. Quandoquidem fingi potest, in ipsis hisce *anomalis* quædam inesse perfectio; quam in descriptione nuper allata conati sumus exprimere: Et quotquot eam habent *anomalie*, censeantur *expressæ*, suoque genere absolutæ; quæ vero carent, & ab ea desciscunt, minus perfectæ: De quibus tamen omnibus sententia, per regulam datam, per *anomaliam* absolutam, facillime ferenda est.

IX. Illa porro symptomata, quæ dicuntur *Hypochondriaca*, notitiam *arthritidum* in ventriculo *anomaliarum* identidem obducunt, earumque diagnosin interturbant. Nam cum ea senes sæpissime invadant; eosque maxime, qui post madidam, & temulentam juventutem, mutata vitæ ratione, senectutem degunt sobriam & siccam, a vino abstinencia languores fere perpetuos, ructus, anxietates, tristitiam, & nonnunquam dolorem, aliaque *Ventriculi* mala non raro infert; quæ *anomaliam* in eo *arthritidem*

dem diuturnam (qualis ea interdum est) non parum æmulantur. Ut autem eam internoscat, & ab affectu hypochondriaco distinguat; ejus insultus explorare, modos eorum, vehementiam, & intervalla perscrutari, medentem oportebit: unde ab illo istam facile deducet.

X. Hisce libet adjicere, perinde fere esse, *anomalam*, ut per se est, spectemus, utrum artubus relictis in *Ventriculum* materia directo se insinuet; an vero primum in fauces, in partem aliquam contusam, altamve quamvis; & tandem, quasi per circuitum, ineat *Ventriculum*: cum diversa ista progrediendi via, ad naturam hujus *anomalæ* permutandam, ne hilum quidem faciat.

Idem etiam erit, siue *anomala arthritidem* fixam, siue erraticam sequatur, siue neutram harum; sed niasma, sine ulla in artubus mora e sanguine recta in *Ventriculum* mittatur: Idem, inquam, erit; modo mitti constet. De istarum *anomalatum* natura, eandem nempe esse omnibus, nihil dubii est; de earum ὁμαλῆς modo certi essemus.

Hoc autem adnotandum, uti ætate pro-
vesti, (quod supra positum est) quam juniores: Ita labe *arthritica* ab ortu inquinati, quam integri: grandioribus, quam maturis parentibus oriundi, appetitu malo, quam bono donati, *arthritide* frigida & languenti, quam calida & acri dolere soliti; *anomaliis* his assueti, quam iis semper liberi, hac *anomala* citius, & diutius ægrotant.

XI. Medendi indicatio *Ventriculum* quam citissime, quam tutissime levare, & ab *arthritide*, ei incumbente, liberari postulat; quem in finem, duo semper consideranda, ut & sæpe exequenda veniunt.

Prius, ut per catharsin idoneam, & ægroti rebus convenientem, impura & aliena ista massa, in *Ventriculo* contenta, qua ad eum quasi attrahi, & (tanquam compede) in ejus tunicis detineri solet *arthriticum* miasma, foras per os, per anum eliminentur.

Posterior, ut peracta catharsi, vel, si nullius usus erit, prætermissa, *Ventriculodimoveatur*, in extremas partes exulet *arthritidis*. De quibus ordine.

Si respiratio angusta & præpedita, si *Ventriculi* gravitas, & inflatio, maxime vero si ructus, si nausea, si vomitus urgebit; adhibito leni emetico, sed tamen effi-

caci, modo vires annuerint, & nihil repugnaverit, *Ventriculum* moveri plane opus erit. In emetico seligendo curam & cautionem multam impendi, neque tantam rem negligenter agi oportebit. Ut enim, modo tuta, vomitio necessaria, ita, quæ languida, est inepta, & quæ justo vehementior, est periculosa. Qui sunt *Διυμν*, iis satis esse solet *Foliorum Tæ Viridis*, vel *Cacuminum Cardui Decoctum*, copiose potum, ad quatuor, quinque vel sex eurgitandi vices, ad octo, decem, vel duodecim libras, si cum *Ἀσπίδι* fieri potest, demissum. Quibus segne nimis hujusmodi decoctum, neque satis irritans, iis conducatur liberis singulis, alternis, tertiiisve, *Salem Vitrioli* pro re nata adjicere. Qui non nisi difficulter, iis opus esse videatur initio *Vinum* vel *Oxymel Scillis*. Vel ex eorum æquis ponderibus compositum, ad duas vel tres uncias sumere: & post horam quasi dimidiam, possetum aliquod simplex, vel amarum. Qui vero *arthritici* possetum, aquam tepidam, vel liquidum aliud aliquod quantitate bene magna, vel nequeunt, vel nolunt bibere; iis ne detur ex officina emeticum, maxime cavendum. Ut etiam aliis id incommodo esset, ita quidem *arthriticis* præcipue. Ne viz. allecta e sanguine ad *Ventriculum* materia multa, ejecta vero nulla, laboret æger. Est ubi nec possetum, neque decoctum, nec medicamentum aliud quodvis exhiberi potest; propterea quod, ex eorum quopiam, torminibus, spasmis cito inutilibus corripiatur æger, in primis vino deditus. Hoc casu, vino assatim, & ad vomitum usque sumpto, sæpiusque repetito, rejectoque, (quod simul & emetici & cardiaci vires habeat) totum isthuc, utut difficile, & plenum opus alea, nonnunquam absolvi, itaque ex fati faucibus ægrum eripui.

Quæ per vomitum evacuari solet materia, nunc biliosa, nunc quæ in *Ventriculo* computruit & coaluit, cruda est, maxime post *anomalam* ex Cerere vel Baccho natam. Respirationis spatium ex eo dilatari, pectoris gravitas auferri solet: quinetiam ipse vomendi nixus, & quæ ab eo sanguinis agitatio est, ad *arthritida Ventriculo* excutiendam aliquando non parum facit, & æger statim ποδάρπιε.

Hora post finitum vomitum, maxime si pharmaco moveatur, (ut in intestinis quicquid assumptorum manserit, evocatur) enema vulgare injiciendum; eosque vespere, quo

quo reficiantur vires, *Bolus ex Theriaca androm.* & *Pul. Cantiano*, una cum *Vini ustulati Haustu*, dandus. Tunc infusionis amare *Vino Lusitanico*, vel *Xeresano factæ Haustum*, cum *Pul. Cantiani* ℥j. vel ʒʒ. ter quaterve in die assumat æger, donec alvo tempus erit inaniendæ.

Si vires ægri patiantur, interposito die uno post vomitum, instituatur purgatio: Sin imbecilliores eam vetuerint, in aliud tempus differatur: quam autem primum commode fieri potest, eam aggredi juvabit. In ea ordinanda curæ esse oportebit, ut ægri viribus conveniat; ut, in ductu alimentati quicquid insit alieni, tuto illud emittatur; sed neque medicamento tam forti, tanquam elaterio, ut faciat hypercatharsin. Uti hæc ægroto non nisi periculo plena, ita quidem purgans nimis lene exhiberi, malum erit. Hoc casu enim, nisi brevi repetita fuerit purgatio illuc, ubi peccatum erat, postea, majori cum incommodo, redeundum; & venter iterum movendus. Rarum enim isto, auspiciatissimam hujus *Anomale* curationem fore, si a *Ventriculo* & *Insestis* bene purgatis ordiatur. Mihi solemne est, per *Tincturæ sacre* ʒiii. vel iv. vel per *Extr. Rudii* ʒʒ. ad ℥ij. vel per *Pul. Vuarvicensis quasi* ʒʒ. vel per *Manna* & *Salis Cathartici* Solutum, addito *Elixir Dasseano*, Alvum ducere; & si spatio sex horarum nihil effluxerit, clysterem immittere; vespere post purgationem, (uti post vomitum) bolum exhibere.

Interdum accidit, post utranque catharsin, non nimis parcam aut debilem, nauseam manere importunam; ipsaque medicamenta, quæ sanguine suscitando, *Arthritidique* transferendæ sunt a Medico destinata, ore confestim reddi. Hoc, uti conjicio, sit per acre illud *Arthriticum* miasma, quod *Ventriculi* tunicis inhæret. Ad vomitum hunc inanem, imo noxium compescendum, *Laudani liquidi gutt. instar.* x. cum *aq. cin. fort.* vel *abs. C.* vel *Sp. Menthe* ʒiii. quarta, quinta, vel sexta quaque hora misceantur; ea nempe dosi, & frequentia, quæ vomitionem tollat, & in ventriculo *Podagragoga* retineri facit. Laudanique dosibus, post vomitionem aliquantisper compositam, intervallo ea medio interponantur, sic, ut si laudanum horis sexta & duodecima, remedia *Arthritidem* moventia tertia & nona exhibeantur. Quamprimum ea retinet, *Ventriculus*, tanquam inutile quoddam, ne dicam ineptum, & postea nocivum, omitti

laudanum, & in methodo præscripta progredi juvabit.

Hæc autem omnia circa catharsin a me proposita, de iis tantummodo ægrotis intelligi velim, quibus & purgationis utriusque opus, & ejus sustinendæ vires sunt. Quoties autem ejus nulla in conspectu, necessitas; (quod in *anomala* per mærorem inducta, aliisque paucis observare licet) vel quoties eam admittere nequeat ægroantis imbecillitas; a *Podagragogis*, omissa ea, incipiendum. De quorum usu verba jam proxime faciemus.

XII. Peracta re cathartica, quæ prior erat medendi *Intensio*, ad alteram illam, quæ *Arthritidem Ventriculo* moveri juvet, & quoad fieri potest in artus mandari, properandum est. Hoc ut effectum reddam, iis utor non modo stomachicis, quæ *Ventriculo* contra inimicum defendendo; verum etiam iis cardiacis alexeteriisque, quæ sanguini, eum in corporis ambitum pellendo, quæ miasmati exturbando conferant. Quoniam vero istarum classium medicamenta non possunt omnia; selectiora quædam, & huic proposita utiliora, in medium feram.

Possunt illa vel *Pulveris*, vel *Boli*, vel *Pilularum* vel *Infusi* formæ exhiberi: Atque hisce pene omnibus *Ferri* (propter ejus excellentiam, & in *Arthritide* expellenda vires mirificas) præparatum aliquod adjiciam.

24. *Pul. e chol. c. c.* (vel *Purpurei*, vel *Lapidis contray.* vel *Goani*, vel *Rubri Exon.*) ℥i. ad ʒiʒ.

Serp. Virg. ʒʒ.

Chal. Nutriti gr. v. misce f. *Pulvis*.

Loco *Rad. Serpent.* dare licet *Gentiane*, *Zedourie*, vel *contrayervæ* tritæ, eandem vel majorem quantitatem.

24. *Pul. Rad. ari C. P. Rubri Exon.* ana ʒi. *alcohol. Martis* gr. v. misce f. *Pulvis*, vel

24. *Spec. Diamb.* (vel *aromat. Rosat.*) *Pulv. Gascon.* ana ʒi. ad ʒʒ.

Chal. prædicti gr. v. misce f. *Pulvis*, vel

24. *ZZ in Indiis cond.* ʒi. (vel *Piperis in racemis c.* gr. vi.)

Pul. purpurei ʒi. ad ʒʒ.

Chal. N. gr. v.

Syr. abs. S. qs. f. Bolus, vel

24. *Spec. Diambre*

Pul. Lap. contrayervæ ana ʒi.

Alcohol. M. gr. v.

Conf.

Conf. alb. qs. f. Bolus, vel
℥. Spec. aromas. Rosat. (vel Dian-
thos) ℥ij.

Flor. Salis armon. gr. x.

Syr. Garyoph. qs. f. Bolus, vel

℥. Conf. abs. Rom. Pul. e chel. c. c.
ana ℥j.

Olt. Sem. carui gutt. i.

Chal. N. gr. v.

Syr. cort. citreor. qs. f. Bolus, vel

℥. Theriac. androm. (vel Mithridatii,
vel Elect. Stomach. a clarissimo Fullero
descripti)

Pulv. cascon. ana ℥j.

Chal. prædict. gr. v.

Syr. Menthe q. f. Bolus, vel

℥. Camphoræ gr. v.

Pulv. Rad. contrayervæ gr. xv.

Extr. Ruta qs. f. Pil. vel

℥. Piperis longi pul. (vel Spec. Diatr.
Piper.) gr. v.

Pulv. Gentian. ℥ss. Myrrhæ gr. v.

Extr. cent. Min. qs. f. Pil. vel

℥. Pul. Serp. Virg. ℥j.

Chal. N. gr. v.

Syr. aurant. qs. f. Pil.

Cum enim Bolo, Pulveris, vel Pilularum
dosi, sumendus est Julapii haustus.

℥. Aq. cardui, Menthe, Lactis alex.
Gent. comp. abs. c. (vel cin. fort.) ana ℥ij.

Marg. pp. ℥ij. Sacch. qs. f. Julapium.

Olea chymica, Sacchari beneficio, in Ju-
lapium addita, longe illud efficacissimum
reddunt. In forma liquida placet hujusmo-
di Infusum.

℥. Rad. Zedoar. Gentianæ.

Cacum, absinth. Rom. agrimon. (vel
Trisol. Palustr.) ana ℥j.

Coccinell. ℥j. cort. ext. aurant. ℥ij.

Infunde in Vini rubri Lusitanici, vel Xe-
rani ℥ij. ad idoneam alterationem; tunc f.
colatura. Dosis ℥ij. vel iij.

Simili modo ex aromaticis, cortice Win-
terano, Fruct. cubeb. Sem. cardamom. Ex
Seminibus anisi, carui, Fœnic. d. cochleariæ
paretur Infusum. Quilibet autem Infusi sive
amari, sive aromatici Haustus habeat Tinct.
Martis Febricianæ, vel cum Succo Limoneo
preparatæ gutt. x. vel alcohol. M. gr. v.

Pauperibus &ropisor esse potest allii, cro-
ci, Zinziberi, & Radiculæ rase, cum absin-
th. Roman. cacuminibus infusum. Est ubi
nulla in forma sicca placent medicamenta,
nec ulla quidem Infusa. Hoc casu tum
prodesse, tum placere potest Spiritus Men-
thæ, vel Juniperi, vel Spiritus absinthii.

Nonnullis magni æstimatur, & quidem mul-
tarum virium est, aqua, quæ nuncupat
Hispanarum arthritica, cujus hæc est for-
mula.

℥. Caryophyllorum aromaticorum Nucum
Myristic. Zzberis, Maceris, cinnamomi,
Piperis nigri, croci, Zedoariæ, Galangæ,
Baccar. Juniperi, corticum citreorum & au-
vantiorum, Spicæ nardi, cubebarum, aloes
Hepaticæ, Ligni aloes, calami aromatici,
Stachados, ana ℥ss.

Cacum, Salviæ, Ocymi, Rorismarini,
Menthæ Majoranæ; Baccorum Lauri vulg.
Pulegii, Raf. Gentian. Florum Sambuci,
Ros. alb. & rubr. chamæpit. chamædryos,
calamenthæ, Melissæ, Origani, Matricariæ,
ana Mii.

Ficum, Dactylorum, amigd. amar. Nu-
cum Pinearum, Nucleorum, Uvar. passar.
major. ana ℥vj.

Melis Virginis ℥j. Sacch. optimi ℥j. Mo-
schi triti ℥j.

Incisa & contusa indentur Spiritus Vini
canarini optimi ℥xv. Infunde dies x. vel xii.
in MB. destilla.

In affectibus stomachi & intestinorum Ar-
thriticis valentissima habetur.

Dosis ℥ss. cum sacchari momento, vel
cum mica panis, uti videbitur, repetenda.

Est etiam externi usus, ad Dolorem mi-
tigandum Articularem; modo calidissima do-
lenti articulo superlinatur.

Transacta catharsi, vel si nullus ei locus
fuerit, prætermissa, ad jam dicta medica-
menta, sive iis non multum absimilia, de-
scendo, eaque hoc sumenda ordine præci-
pio. Mane, horam circiter nonam, Infusi
Haustum ministro; tertia pomerid. Pilulas;
vel Pulverem; nona vespertina Bolum, ma-
ximeque Theriarchalem; & tertia maturi-
na Pulverem, vel Pilulas exhibeo, cum
Vini Lusitanici, vel Julapii haustu, post
eorum quodlibet.

Aliquando tridui, vel etiam bidui spatio,
interdum citius, hujusmodi remediis, hac
methodo datis, exturbatur Arthritis, &
articulis impingitur; ubi nimirum sanguis
tener, & tractabilis subito medicamenta sen-
tit, eisque facile obtemperat; Alias, non
nisi longo tempore, sit translatio: Alias,
non nisi aliis insuper remediis in auxilium,
& operam sociam vocatis.

Quando biduum istiusmodi Podagragogix
dicatum fuit; si tumoris, si doloris nihil
erit obortum, locis eorum mris ægodes occupari
solitis, admoveatur vel Empl. cephalicum
cum

cum equali quantitate Picis Burgundicae, vel ceratum virido; vel utrique cubito, sive tibiae Epispasticum, quo in artus humor evocetur.

Si remedia tum interna, tum externa, modo dicta, viribus ita junctis, *Arthritis* removendae minime sufficiant; intendatur, oportebit, eorum alterum, vel utrumque, & auxiliis (si videbitur) novis & ascriptiis augeatur. In remediis siccis, *Chalybis Nutriti Dosis ad ℥ss.* in liquidis *Tinctura Chalybis*, ad guttas xx. amplificetur. Porro, hora quaque media, remediis praescriptis interponere juvabit *Vini Lusitanici Haustum*; sic, ut ejus ℥ij. vel iij. nyctemeris spatio, si quantitatem ejus isto tempore, (qua per se qua cum medicamentis sumpti, universam comprehendamus) ebibantur. Hoc autem in iis praecipue locum habet, qui *Vino* diu consuevere, & sine noxa indulgent; verum, ex contrario, non abstinere sine noxa: quorum e numero non pauci sunt, *Anomala* isthac aegrotantes. Qui *Vinum* hoc modo potare nequeant, *Spiritus c. c. succinatis guttas aliquot*, cum *Jalapii Haustu*, horis istis interpositis sumant. Eo autem usque (ut huic praeepto finem imponam) evehendus, eo continuandus, ore datorum, tam vini, quam pharmacorum usus, si nihil repugnaverit, donec, aestu & orgasmo in sanguine facto, *Ventriculus* allevabitur.

Intendenda eodem tempore externa, & quidem eo usque, quoad in locum aliquem externum, *Arthritis* recipiendae aptum, humor coactus, & in eo tumor excitatus fuerit. Hunc in finem pelle vervecina recens extracta, artus involvantur. At nihil certius hac in re, nihil praesentius, quam *Phenigmm* aërem & stimulantem applicare calidissimum; & dum tumor oritur, tantisper renovare frigescentem. Qui vero auxilium illud, ut graveolens, hoc, quia crudele, abhorreant delicatuli; per laterem, aut ferri laminam calefactam, linteoque inclusam, & loco admotam, idem praestare poterunt.

Ut autem promptius *Arthritis* educatur, vel in lecto, vel cubiculo, se a frigore, per omnem hujus methodi decursum, tueatur veger. *Panacella*, *Gelatina c. c.*, *Jusculo pullino*, & ejusmodi tenuibus, concoctuque facilius vescatur. Si dolor, arte factus, forte fortuna nimius, ad lipothymiam tendat; de eum facientibus, de cutim irritantibus aliquid detrahendum. Si febris exar-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

deat, vel minuenda, vel omittenda sunt *Cardiaca*, quae sanguinem accendant. *Decoctum album* ad arbitrium suum bibat, itaque temperetur aestus. Eo denique modo, peragantur omnia; quo, cum *Asopia* finem propositum aegrotus assequatur; quoque per tolerabilia semper usurpata, cito tutoque foras *Arthritis*, etiam si non jucunde, eliciatur. Nequis autem, methodi hujus sive novitate, sive insolentia motus, cardiaca tam fortia, tamque larga a me praescripta, tanquam aliquod *ἐπιπαιστρον* actum improbaret; sciat omnino velim, ut hoc semel dicam, copia, quae rem efficiat, me contentum esse minima: sed neque nesciat, ea (quod profecto non temere dictum) & magnam saepe oportere, & sine damno, esse. Nam (ut, meos quod attingit, dicam) etsi complures ea medicina ferventes, & ad tempus ejulantes novi: eorum tamen multos, ad sanitatem perductos; neminem vero unquam hoc aestu laesum, quod meminerim observavi. Cujus id in causa esse videatur, quod, quibus illa fortiora, & quasi *Μεχλικά*, sive interna, sive externa, opus sint, iis sanguis plerumque frigidus; nunc malis moribus, nunc aetate debilitatos; nec ad febrim concipiendam aptus.

Quamprimum orgasmo satis vehementi sanguis exagitur, solet ille virus *Arthriticum*, quod in *Ventriculi* tunicis inhæret, & vasis capillaribus continetur, abluere, resorbere, circumvehere; & tandem, quocunque vocant extremitatibus applicata; ibi deponere: Sic, ut unius horae spatio, post *Phenigmm* admotum, tumor interdum oriatur.

Dum morbus ore sumptis oppugnatur; aliquando ea, quibus ventri extrinsecus impositis, viscera foveantur & corroborentur, non negligenda. Placet igitur, bis vel ter in die, foris sequenti, vel huic consimili, ope stuparum e panno *Vulvico*, aliove quovis rito, uti.

℥j. Cacus. Abs. vulg. Mentha.

Flor. Rosar. Chamem. ana ℥ss

Sem. Anisi, Carui ana ℥ij.

Puly. Cinnam. Cubeb. Garryoph. Aromat. incif. N. M. ana ℥j.

Sp. Vini vulg. ℞ss.

Vini rubri Lusitanici ℞ss. macerentur horas tres vel quatuor, vitro bene clauso, in *Balneo Mariae*: colatura calidissime adhibeatur.

Vel *Emplastrum* abdomini admotum continuo geratur.

K

Ter

*M. Terra Japon. Balsam. Chilians. vel
Pruan. ana ℞.*

G. Galbani ℥j.

Picis Burgund. ℥ij.

Empl. Stomach. Mag. ℥℥.

Ol. Cin. chym. N. M. ana gutt. ij.

Ida vero, post purgationem maxime profutura iudico; Et quidem maxime, vel ætate, vel morbo enervatis: quorum viscera topicum postulent auxilium. Ne vero, quod in robustioribus & sanguineis suspicari oporteat, non tam illa *Ventriculum* defendant, quam ipsorum abusu *Arthritis*dem allelent, Medico curæ erit.

Tumori jam facto, & ad magnitudinem conspicuam & notabilem evecto, (ne, quod insit humidi, in sanguinem remigret) admoveo soleo *Epispasticum*; itaque serum in eo contentum educere. Salsum illud, acre, virosumque esse constat; cutim etenim inflammat; pruriginem facit permolestam. Dies sæpe fluit compluscule; aliquot interdum hebdomadas; & ad libras interdum aliquot: Ut, ipsum *Arthritis*dem, miasma, ipsam causam continentem una cum sero ejici, non sit dubitandum.

Hactenus occupari fuimus in adducendis *Ποδαγραγγοις*; verum, ut primum tumor cum dolore factus est idoneus, statim de remediorum internorum sive dosi, sive frequentia, sive utraque, remittendum est aliquid; neque majori copia jam utendum, quam quæ, *Arthritis*di continuo propellendæ, & ne intus refluat, inhibendæ; satisfaciatur. Huic autem operi pars eorum dimidiata plerunque sufficit. *Bolum* igitur e. gr. duodecima quaque tantum hora, *Chalybisque Dosis* non nisi vicibus alternis & duplo intervallo damus.

Sin eveniat, ut, vel ob æris inclementiam & tempestatem perfrigidam; vel ob erratum in cibo & potu, aut aliud quodvis, artubus relictis, *Ventriculum Arthritis*di, dum hæc aguntur, repetat, (quod quidem minime rarum est) causa ejus recidivæ diligenter exquirenda, & sine mora removenda est. Si novæ in *Ventriculo* cruditates, aliæve impuritates sint collectæ, leniente quodam & alvum molliter inaniente, deducantur. Si ex algore contrahatur cutis, itaque repercutiatur humor in tumore comprehensus; per calorem externum, per vestitum, aliæque, jam dicta, applicata, denuo evellatur. Utroque vero casu, interna plena manu sunt administranda: Ut nempe locum, quo per infortunium, vel ex

incuria & negligentia cessimus, cum industria & vigilantia recuperemus.

Et quidem nullo, quod sciam, hujus *Anomale* casu (ut tandem hoc argumento aliquando finiam) *Podagragoga* vel fortiora, vel majori quantitate danda; quam ubi illa recidiva est, aut in corpore cruditatibus onerata; propter imbécillitatem minime purgando, longaque morbi obsidione debilitato: illi enim ex *Chalybe*, *Zinzibere*, *Pipere* composita: illi *Spiritu* maxime volatili referta, & quam a nobis dictum est, longe copiosius sumpta, sæpe vix sufficiunt, imo sæpenumero ne vix quidem. Ager enim, misere afflictus, spirituum inexplicabili dejectione languens, inter remedia, utut ardentia & cardiaca, de *Ventriculi* frigore & depresso animo clamans; e vita, & quidem interdum inopinato, stupente undique astantium multitudine, excedit.

Quamvis id desiderandum, & quidem in primis optandum, ut articulo *οὗ τῆς ἰσθμῆος* aliquod figatur *Arthritis*: nihilominus interdum satis erit, e. gr. in *Arthritis*de *vagæ Anomalie*, si ad internodia sua reducat; Imo quidem ex miasmate tantum resorpto, & in sanguine retento, itaque *Ventricula* immuni facto, agrum aliquando novi servatum. At in *Arthritis*di *fixæ Anomalie*, omnium commodissimum, exoptatissimumque erit, si denique in articulo aliquo defigatur.

Id autem observatu facillimum, pariterque visu jucundissimum, quod, quibus gradibus dolor, tumor, aliæque rectæ *Arthritis*di symptomata in extremis partibus oriuntur & augeantur; iis plane illa, quæ post vomitum manent *Ventriculo*, levantur, & imminuantur: speciatim, iis omnino passibus *Ανορεξία*, ventriculi dolor, cibi fastidium, cardialgia, nausea, &c. vincantur & fugentur; quibus succedit fames, cibi concoctio, oculorum vigor, & scintillulæ, aliæque redemptæ & recuperatæ salutis indicia. Ut ægotanti denuo rectam in viam reducto, e re sua sit in eadem sedulo & constanter progredi, donec *Arthritis*di materia *ὑπόδωρ* emissa, spumaque omni effusa, tum is alacriori, tum etiam tutiori vita fruatur.

In hujus *Anomalie* prophylaxi valent *Aque Ferratæ*, diu recteque potæ; quibus adjungi possunt remedia *Stomachica*, famem & coctionem promoventia, cum modice resstringentibus; speciatim e *Cons. Absf. R.*

Fior.

Flor. Ros. rubr. Fruct. Cynosb. Pul. Rad. Ari C. Sale Martis, Ente Veneris, & ejusmodi aliis, lege medica, composita & assumpta. Danda etiam opera est, ut dyspepsia, frigus, aliaque causae evidentes, maxime quam primum repullulavit, & in sanguine renovatum est *Arthriticum* miasma, evitentur. Prodest etiam fonticulum in brachio; vel infra genu, prout *Chiragra*, vel *Podagra*, est frequentior, aperire. Qui vero sibi hac in parte prospicere minime curabant, *Anomalam* eos expectare par est, tum crebro, tum graviter recidivant.

Hac ex illa medendi methodus, quam meis utiliter & salutiferam, in tractanda isthac *Anomala*, expectus, si per tenuitatem nostram licuerit, aliis commendare velim, donec ea meliorem dies docebit.

HISTORIA I.

In Ventriculum & Intestina irruens
Arthritis, foras expulsa.

Historiarum agmen ducat Venerabilis & Praenobilis Dominus, *RICH. ANNESLEY*, in Ecclesia Cathedrali nostra, *Exoniensi*, Decanus, in *Hiberniae* Regno Baro *Altham*; Magni Comitissae de *Anglesey* Filius: Qui, cum naturae muneribus eximius, cum ingenio plane divino, ex Illustrissimo Parente derivatam (Nam, ut dictum est, *ad bona cuncta ne quidem Agamenon natus*) accepit *Arthritidem*. Id autem huic *Arthritico* bene cessit, quod per annos complures apte, quodque recte dolerent: & quod, in paroxysmis quoties spuma a sanguine effunderetur *Arthritica*, non id cum vitae periculo, (sic, ut in plerisque solet *Anomaliis*) sed cum acri emolumento & tutela perageretur.

Ita illi vitae ratio si non integra, minimum incolumis dicta fuerat; cum, ab *Arthritide* aliquando feriatum ultra modum, ex ea tanquam antecedente causa, miasmate *Arthritico* corpus habens *ὑπερλαμνον*, in malum incidit gravissimum, in summum capitis periculum.

Nam horæos fructus nimio plus devorans, biduo vel triduo post, nempe quam primum ii in *Ventriculo* computrescentes illum aggravarent; primum, cardialgia, tum animi deliquio, moribus, convulsivis, spasmo oris cynico, ut vel ipsam animam agere videretur, est correptus. Statim, atque tragedia incipit, accessit ad aegrum

advolavi, malique tam atrocis, tam etiam repentini sciscitando causam indagans, eam, quam memoravi, esse inveni; neque nisi vomitione tolli posse judicavi.

Quando vero huic aegroti, medicamentorum minime amanti, propter aliquod ex natura fastidium, *Emetica*, abhorrenti, neque sine periculo toleranti, ea, quae pharmacopolii sunt, *Emetica* non conveniret, vel liceret dare; aliam tentare viam necesse habui. *Vini*, aegro familiaris, rubri, Lusitanici quantitatem bene magnam exhibui; eaque ore rejecta, haustum repetii; & quidem eatenus *Vino*, & tam celeriter dato, donec *ἄν* crudiatum massa omnis ejiceretur; quae quidem magna erat, impura, acida, graveolens. *Emetici* hujus *Cardiaci* beneficio factum est, ut tum *Ventriculus* exoneraretur, tum etiam eodem tempore a deliquiis aeger incolumis servaretur. Tormina, quae postridie supererant, *Intestina* etiam premi ostenderunt: Et quidem aliter, quam in vulgari *colica*, ea premi mox constitit. Nam cum aeger jam diu ab *Arthritide* claudus fuisset; ea, quae jam in visceribus congesta sunt, impura, materia artubus inhaerere gressuque aegrum privare solitam, ad *τὸ αἶμα*, ad se vocarunt: Quod vel ex hoc innoteat, quoniam visceribus aeger acerbissime dolens, eodem tempore pedum factus est compos; & quidem magis, quam per annos ante multos. Huc enim illuc expedire, & erecto corpore, quasi vinculis solutus, ambulavit, ut ab artubus ad *Intestina* materiam *ὑπερλαμνον* *Arthriticam* minime ambigatur.

Ad *Intestina* expurganda leniens praecipit, & deinceps aliquot post diebus altera vice. Dolor, qui post purgationem utriusque generi satis vehementem mansit, *Intestina* aggravans, naturam mali *Arthriticam*, adhuc plenius monstravit.

Ut in artus hospitio novo moveretur hostis, (quod jam proxime faciendum) *Pulvere Gasconico*, & quod in hac re momenti erat maximi, *Vino* praedicto usus est aeger. Quorum ex usu, primum dolor, deinde tumor, cum cute laevi & nitente, ortus est, & *chiragram* indicavit. Tum post longam intermissionem rediit fames, & ex alimento largiori paulatim vires; ut, qui susurro, languide & debilitate, verba jam diu ediderat, voce iterum nunc viva loqueretur; iterumque gravidam faceret uxorem.

Aegrotanti profuit, quod ea fuit illi spirituum

tuum animalium vis, & tam *Elastica*, quanta utique raro observatur, quanta putari potest maxima: Quæ quidem plurimum in eo restituendo valuit.

Annos posthæc alioquin multos exegit vir præclarus, purgantibus, coctionem corripientibus, & *Arthritidem* expellentibus, ea, *Ventriculum* & *Intestina* multum affligente, cum fere conclamatum esse, allevatus.

HISTORIA II.

Arthritis idonea, Balneo frigido in Ventriculo, & ea quæ intus sunt, repulsa.

Homo adolescens, Καλοκρηδὸς, ætate provecto patre oriundus, eaque de causa corpore tenerrimo, spirituque animali minus firmo donatus; cum e quinto vitæ lustro nondum excefferat, *Articulari* morbo plus semel laboravit. Appetitum habuit admodum languentem, coctionem imminutam; unde ali desinere cœpit, & inopia consumi. Cum eo res deducta erat, consilio certe non optimo uxorem duxit. Adeo nempe verum est, infortunio raro solitaria mortalibus obvenire, matrimonio nihil huic homuncioni gravior, nihil unquam intolerabilius esse potuit. Corpus cito enervatum, & vitæ vix sufficiens innuptæ, maritali vero impar, æstus invasit universali febricula Ζωτῆσι; cui postmodum accessit *Dolor Articularis*, cum tumore, rubore, &c. signis *Podagræ ταδωγγραμμοειδούς*.

Ut æstum mitigaret, dolorem allevaret, aliaque quæ ægrotum maximopere urgebant, accidentia reprimeret; quando calor invitaret æstivus, aqua pedes immerfit, in frigida & falsa (nempe marina) consistens. Hic pedum evanuit tumor, rubor, *Podagræ* indicia; simul & vomitus & intestinorum dolor est obortus, isque diuturnus, ingens; sic, ut ex eo plane colligi possit, materiam ad ductum alimentarem, e pedibus transferri νοσηλαί. Sub id tempus, ut viscera, quæ multum exæstuarunt, refrigeraret, reficeretque, fructus horæos ad gulam usque devoravit; devoratos, nec eorum, nec cuiusvis generis cibi tenax, statim eiecit. Cumque iste victus non unius tantum dieculæ esset, verum aliquot mensium, & omni eo tempore *Ventriculi* gravitate, vomituque, & dolore, vel continuo, vel ex brevibus intervallis redeunti, ager afficeretur; & medicinam aut negligeret, aut ea

perperam & perfunctorie uteretur; isto denique statu erat, quò nullum medicinæ præsidium, nullam opem conferre potuerat.

Uti, ad hujus viri interitum, sociam operam quamplurima dare; ita quidem ex iis aliquo in numero esse, ne dicam primas obtinere, *Arthritida* verosimile est; quandoquidem materiæ νοσηλαί, sive *Arthritide*, pedibus affixæ, ad ea quæ intus sunt translatione, tanquam cardine principali, tota res morbi versa est.

HISTORIA III.

Recta Arthritis, & in Ventriculo Anomala, se vicissim excipientes, cum Anomalæ curatione.

VIR generosus, ætatis mediæ, *Arthritide Symptomatica*, sed & ea languenti, neque satis regulari, diu per vices ægrotavit anno MDCCIV. circa æquinoctium autumnale, hallucis articuli majoris, globique infra positi dolore tentabatur; postea vero plantæ pedis, & deinde malleoli; sed eo incerto, & vago.

Elapso vix triduo retrocessit humor (cujus tamen rei quid in causa esset, dubium erat) neque amplius pedem momordit. Ægrotantem e vestigio invasit aliorum universalis, tanquam febri præludens intermittenti. Huic accedebat *Ventriculi* gravitas, pectoris oppressio, nausea, respiratio angusta, & in suprema regione *Verrigo*, & somno appropinquante subita spirituum exulatio.

Anomaliis olim *Arthriticis* vexato, & eorum non ignaro, laboranti minime latebat; hunc *Ventriculi* affectum, etsi prima facie vernaculus appareret, esse revera peregrinum; & in *Ventriculum*, relictis pedibus miasma *Arthriticum*, hujusce mali causam, mitti. Qua ductus opinione possetum hausit, amaris alteratum; ad vomitum usque copiosum; ad impuræ, crudæ, biliosæ vomitum materiæ. Ano etiam, injecto ea nocte *Enemate*, subducta est ejusdem quantitas non exigua. Cervici admotum erat *Epispasticum*; *Pulvis* datus e *Chebis C. C.* Illo multum feri elicatum; hoc animales spiritus, humiles antea & depressi excitabantur. Interposito die uno, *Tinctura sacra* levabantur *Intestina*, *Bolus* e *Pul. Prædicto*, & *Tberiaca Androm.* eo vespere refecit ægrotantem. Posthæc, horis tribus medicinali-

nalibus, *Alcohol. Martis* ℞. cum conf. *Abs. R. Spec. Aromatici Rosati*, & *Syr. Corr. Girsor. forma Boli deglutiit*: cum infusi amari, *Vino Xeresano facti*, vel *Vini simplicis ustulati Haustu*. *Pedibus Emplastris*, ex *Cephalico*, & *Pice Burgund.* pari quantitate, applicata, continuo gerebantur. Si caligo, vel lipothymia postularer, vel quoquomodo spiritus deficerent, in præceptis erat, *Sp. C. C. succinati guttæ aliquot*, cum *Julapii* vel *Vini Haustu*, darentur.

Hisce aliquandiu usus, æger beneficium inde bene magnum accepit: purgatis etenim *Intestinis*, ad *ta* *æger* amandata est *Arthritis*. Pedum factum est dolor; tumque brevi tempore cibum capeffivit æger: melius, quam solebat, eum concoxit. Quin illi lætiores esse spiritus animales, commodiusque vitæ rem agi, vel ex una oculorum acie plane constabat.

Cum eo loci res erat, de valitudine restituta nimium securus, *Emplastris* pedibus abiecit: Hoc autem observatu dignissimum consequebatur, quod intus cito remeans, materia, ab integro *ta* *Æger* invadens, nauseam iterum induxit. *Emplastris* iterum admotis, & medicamentis ad mensem unum alterumque continenter usurpatis, omnia prospere cedebant.

Huic ægroto inter alia, tutelæ gratia præcepi, ut, fonticulum infra genu aperiret; & ut quas olim summo suo commodo putavit, aquas *Bamptonenses* iterum hauriret.

Habes *Arthritides*, rectam & in *Ventriculo Anomalam*, se vicissim excipientes; cum *Anomala* curatione, alienum expellentibus & educentibus absoluta.

HISTORIA IV.

Arthritis semel iterumque; in Ventriculo Anomala, toties expulsa.

Agricola suburbanus, ætate maturus, *Arthritide*, uti ex intervallis solebat, dolens, ex hæcicum esu immodico, materiæ biliosæ & crudæ vomitu, dolore *Ventriculi*, & *Intestinatorum* immani, respiratione difficili, cordis palpitatione, *Cephalalgiaque* premebatur. Magna erat viscerum oppressio, & quasi constrictio. Tabacchi, qui in numero deliciarum erat, usus jam nullus. Ut primum illa intus suborta sunt mala, deliquit illico *Arthritis* externa, quæcunque fuit articulorum. Nutriculis,

& familiaribus palam erat, ab *Arthritide*, membra relinquente, cum *Intestinis Ventriculum* impetente, totam hanc oriri malorum *Iliada*.

Medendi intentio erat, purgato prius ductu alimentari, suam in sedem, in artus propellere *Arthritidem*: ideoque *Vinum* exhibitum est *Scilliticum*, posteaque *Pulvis Vuarvicensis*; unde *æger* & *æger* multum, & cum *Coopie* purgatus æger: peracta, catharsi, data sunt *cardiaca*; iisque postmodum auxilio erant externa, *Arthritidem* educta, articulis admota.

Horum beneficio visceribus remota est *Arthritis*, & in artus amandata: Verum, propter erratum aliquod in *Sex non naturalibus*, cum ad viscera brevi post redierit, ea, quæ sequuntur, in usum adhibui.

℞. *Theriac. Androm.* ℞. *Pul. e chel.* c. c. ℞. conf. *Alk. qs. f. Bolus*, omni nocte cum *Vini rubr. Lusitanici Haustu* sumendus.

℞. *Gentian.* ℞. *Zedoar.* ℞. Infunde, igne arene, in *Vini prædicti ℞. ad idoneam alterationem*, tunc f. colatura; Sumat colaturæ ℞. additis *Tinct. Martis*, & *Aurant. ana gutt. x. horis duabus Medicinalibus*: cum *Pul. Rad. Aric.* ℞. *chal. Nutr.* ℞. Bis in die sumat *Spir. Vol. Oleos. gutt. xv. cum Vini prædicti ℞. Potui sit Decoctum album*, cum *aq. cin. fort.* Utrique *Tibi applicetur Epispasticum*.

Auctis in hunc modum *cardiacis*, & majori quantitate, sed neque nimia, datis, viscera plane liberata, articulis affixa est *Arthritis*, æger restitutus.

At ille, ut erat *ἀναισθητός*, & *Arthriticis* pronus *Anomaliis*, iis, sed diversis formis, sæpe recurrentibus affligebatur: de quibus suo loco.

Historia profert *Arthritidem in Ventriculo & Intestinis* semel iterumque *Anomalam*, toties arte medica remotam, suras ad domicilium proprium, ad *ta* *Æger* pulsam.

HISTORIA V.

*Arthritis iterum ac sepius in Visceribus
Anomala, toties in Artus ablegata;
cum ejus Prophylaxi.*

VIR quidam, a prima ætate *Arthriticus*, quinto & sexto vitæ lustro, magnos articulorum habuit dolores; septimo & octavo, *Ventriculi Intestinorumque*. Cum enim corpore valde imbecillo, sanguine tenui, cumque infirmis esset visceribus, post frigora, satietates, & cruditates fere omnes per hosce annos, *Arthritidi* recte vix sufficientes, ad ea, quæ intus sunt, appellata est *Arthritis*. Harum *Anomalix*, ad rem nostram conferentes, nonnullas in medium asserere non gravabor.

Mense oct. MDCCV. propter cruditates, maxime a fructibus *apocynis*, in *Ventriculo* & *Intestinis* collectas; omissa, qua ad ea tuenda solebat uti, medicina; appetitu læso, nausea dolore *Ventriculi*, pectoris gravitate, spiritus angustia, oscitatione crebra corripiebatur.

Ut tanto onere, *Visceribus* incumbente, *Arthritidem* iis impingente, levaretur æger; purgatio per os, per anum, mediocris, & ejus viribus æqualis, adhibebatur. Cum vero, propter imbecillitatem ægri, nullus ei medicinæ, qua ad ventrem inanandum opus erat, daretur locus; neque *Cardiaca*, ore data, tamen fortissima multum prodesse; ire in pejus omnia, conclamantem esse rem, quotquot adstabant, existimarent omnes: Nec quidem timere; pulsus enim debilis, membra pendula, & quasi resoluta, faciei pallor, corpus subfrigidum fidem fecit opinioni.

In hoc miserrimo rerum statu, *Vinum Lusitanicum*, modica dosi, sed crebra propinavi: quo, ad libras aliquot sine vomitu poto: pulsum augeri, vires aliqua ex parte fieri notabam. Utrique tunc malleolo, ubi sedem habuit primariam *Arthritis*, *Phænigmm* admovi, quam ferri potuit, calidissimum, frigidumque renovavi, quoad dolor & tumor exoriretur: hoc vero paucis horis spatium perfectum est:

℞. *Cacum. Rutæ*, Sem. *Sinapios Raf. Raph. Sylvest. ana part. i. Fermenti vet. p. iii. cum Aceto Vini albi misceantur, & fiat phænigmm.*

Tumori, ne in sanguinem alienus humor retrocederet, *Epispasticum* applicui; cujus virtute, quantitas feri bene magna elicie-

batur. Dies etenim permultos, ne dicam hebdomadas, effluxit; & quidem flumine tam jugi, tamque magno, ut pro certo habeatur, sorsibus his apertis inimicum in auxilium mitti; causam *Arthritidis* continentem una cum sero amandari.

Hujus sententiæ confirmandæ gratia, duo subiciam, quæ eam maximopere probare, omnique suspicione liberare mihi videntur. *Alterum* est, quod, qua proportionem serum emanavit, ea plane augetur respirandi spatium; ea, rediret fames; ea, *Ventriculi* gravitas; ea, dolor reliquaque omnia symptomata tollerentur. *Alterum* est, quod diutiorē ab *arthritide* vocationem, longiorē ab ejus paroxysmo quietem, ex eo tempore quā per annos ante complures, æger obtinuit; sanguine nimirum, methodo jam dicta depurgato.

Ut autem extrudatur *arthritis*, ut evacuatio feri tam benigna, tam commoda, promoveatur, utque ei tolerandæ sustinendæque par reddatur æger; vinum ei, jam dictum, quotidie dedi bibere, & quidem assatim; *Murisque Alcohol* bis in die sumendum præcepi: eo quidem cum eventu, quod, uti primæ rerum mutationi conciliandæ multum contribuit *Phænigmm*; ita ei continuandæ *Mars*; utraque vero ratione *Bacchus*.

Biennio post, cum ex *Ventriculi* gravitate, materiæ biliosæ vomitu, oscitatione, pandiculatione, aliisque signis istius *anomalix* in hoc ægroto prænunciis, eam in propinquo esse præciverim, aquis *Purgantibus*, semel iterumque opportune datis, *Ventriculum* & *Intestina* purgavi; malum, eo loci mansurum, anteverti.

Ut contra *arthritidem ægrotum*, contraque *anomaliam* ejus *Ventriculum* defenderem, aquas *Bathonenses* biberet; ea, quæ roborant *Ventriculum*, simulque faciant, ut bene concoquat, *Chalibeata* nempe, *Stomachica*, & *Astringentia* sumeret, ægroto inter *anomaliarum* initia suasi. Et quidem adeo ille fecit imperata, cumque exitu tam felici, ut, qui claudus antea, pedum vix compos, non nisi difficulter incederet, miliaria duo vel tria ambulando jam facile metiretur: Ex eoque tempore sanior & integrior evasit, diuque perstitit. Neglecta vero postea, quam dixi, prophylaxi, vel parce, & indiligerter adhibita, multum ille torquebatur *arthritide*, nunc recta, nunc *anomala*, donec ea, multis post

post annis, confectus & oppressus, e vita cessit.

HISTORIA VI.

Cum plenitudine Arthritis, partim recta, partim (in Ventriculo) Anomala, Purgantibus Podagrogis allevata.

Civis Iscanus, vitam agens inertem, & desidiosam, ea de causa Pletoricus & arthriticus evasit. Etate constanti, postquam ex intervallis saepenumero recteque doluerat, tumore pedis dextri tenebatur, eo, qui tum arthritidem, tum Plenitudinem, manifeste agnosceret. Cum eo simul orta famis imminutio, cibi fere omnis fastidium, similemque habuit cum eo progressum, & vehementiam. De causa malorum istorum altera, communi, neque Pletora, nemo unquam dubitavit; de altera, nempe arthritide, pedem afficiente, quando dolor articularis, ceterumque pathogmonicon, eum monstraret, non est controversum: Sed de ea locum in Ventriculo habente, æger murmurare; & Podagram Ventriculi morbum esse commentitium, & imaginarium, æstimare visus, multa secum mullitare.

Ego, ut ejus ingenio morem, gererem, humanissimum, & prisci moribus, artisque medicæ cumprimis intelligentem, Dominum Doctorem Hele, eo tempore medicinam hac urbe faciliantem, in consilium vocari, lubentissime consensi. Huic ego totius morbi, sic, ut erat, compositi, historiam enarravi; maxime vero arthritidem, olim importunam, nuperis diebus nimio plus quietam, explicui. Quibus auditis, propositam ille viam mecum calcare non est dedignatus. Socia igitur opera, ægroto, antea per-purgato, Chalybis & Pul. Rad. ari c. a me datorum usum, sed aucta quantitate, continuantes, hisce verbis consulimus.

℞. Pul. Rad. ari c. & chel. c. & chal. cum Sulf. pp. ana ℥ss. Ext. Calami arom. q. s. f. Pilul. horis duabus medicinalibus sumende, cum Haustu seq. Julapii.

℞. Aq. Menthe Flor. Chamem. ana ℥v. Stephani, Gent. c. ana ℥iij. Marg. pp. ℥ij. Sacch. q. s. f. Julapium.

℞. Sp. Vol. Oleos. Castorei ana ℥ij. visce, sumat gutt. xxx. primo mane, & hora somni, cum Julapii, vel Vini alicujus Stomachici Haustu.

Horum usu medicamentorum, maxime vero Pilularum, multo & diligenti, famem æger conciliavit; unaque opera humores Ventriculi tunicis vitiosos exturbavit.

Historia dicit arthritidem, cum plenitudine conjunctam; partim rectam, & in extremitate corporis agentem, partim anomalam, & in Ventriculo latentem; sed & eam medicina expulsum, in sanguinem re-legatam.

HISTORIA VII.

Arthritidem ex animi perturbatione Anomalam, in viam ducunt
Ποδαγραγωγία.

Domina R. . . . quinquagenaria major, arthritide frigida diu mulctata, eaque pedem nuper afficiente, propter animi pathemata, & turbas, nescio quas, domesticas, materiam *ροσφλῆ* (intercilio paroxysmo) in Viscera retroactam habuit. Remisere malleoli (id est, partis affectæ) symptomata, dolor tumorque, & simili proportionem intendebatur *Ἀνορεξία*; nausea, acidi & pituitosi vomitus, oscitatio, *Ἄστυα*, cum affectione Ventriculi Idiomate nostro appellata (*Vvaterpangs*;) Nam œsophagum ascendens, bis vel ter in die, ad ℥iij. vel iv. ab ægrota, tanquam utero gerente, aqua ore ejecta est. Hanc affectionem imbecillitas spirituum, palpitatio cordis, faciei pallor, vox tremula, languens, & inusitata animi dejectio sequebatur.

Ab arthritide anomala, & ad ea, quæ intus sunt, inversa, symptomata ista proficisci minime dubium erat. Hoc historia morbi, & symptomatum ordo demonstravit. Utque deviam arthritidem in locum proprium, in artus ducerem, propositum mihi palmarium erat, & medendi indicatio.

Quem in finem, impedimentis, quæ Stomachum & Intestina premerent, per alvi ductionem expurgantis, Infusam amarum Martiatum, horis duabus medicinalibus, Botum cardiacum; (& Pul. cantiano, chalybe Nutrito, &c.) hora somni, cum Jul. Haustu Spiritus vol. Oleos. gutt. aliquot, sæpius in die, cum idoneo quolibet vehiculo dedi. Unde fructus, brevi temporis spatio, spe omni major, votis par, restituta sunt viscera, scintillarunt oculi, doluit iterum malleolus, servata est agra, & quidem

dem una *arthritidos* amotione, & in pedes
ἀναγογῇ.

tibus infirmatis. Tanti usus sunt, in ordi-
nanda *arthritide*, *chalybeata*.

HISTORIA VIII.

Arthritis vaga primo Partibus ex con-
tusione laesa; deinde Ventriculo he-
rens, in Sanguinem resorbetur,
in artus emittitur.

Vetula quædam, origine, *arthritica* do-
lores habuit diu per artus huc illuc
erraticos; postea, contuso corpore (cum
ab equo forte cecidit) læsis & debilitatis
partibus inhærentes. Hi vero deinceps, lo-
cis hisce relictis, nescio qua de causa *Ven-*
triculum invadere: namque nausea, & vo-
mitio secuta erat permolesta, cum moti-
bus convulsivis; & hystericiis aliquot acci-
dentibus.

Nihil clarius esse potuit, quam quod ea,
quæ olim membra infestaverat materia, pec-
cans & *Podagrica* primum partibus contulis,
deinde *Ventriculo* committeretur: Atque
huic confusus opinioni, principio curandum
existimavi, ut vomitu sedato materia *Ven-*
triculum aggravans per anum ejiceretur.
Præmissis igitur *Laudani* guttis aliquot, sub
ejus præsidio pilulas exhibui purgantes;
quarum ope, ut & enematis postmodum
immissi, ægrota dejecit impura bene mul-
ta. Peracta catharsi, *Pulvis e chol. c.c. &*
Rad. ari comp. ana ℞. tertia quaque hora,
sumebatur; cum Julapii haustu Hysterici, &
sp. Vol. Oleoso.

Hisce remediis ex lege usurparis, notatu
jucundum erat, quibus gradibus sanitatem
ægra recuperaret. Primum, ut ex istiusmo-
di *cardiacorum* usu solet, calor oriebatur
universalis; eique tandem aucto, & ma-
gnum in modum everso *Ventriculi* successit
allevatio; sic, ut a sanguine celerius &
rapidius circumvecto, miasma *arthriticum*,
Ventriculi tunicis infixum, resorberi, & in
sanguinis sinus recondi censeatur.

Ad tuendum *Ventriculum*, & *arthritida*
procul emittendam, *Tinct. Martis* (*ex ejus*
Limatura & succo Limoneo confecta) gutt.
xx. semel bis in die sumendas, cum *Infusi*
amari alterantis Haustu, præcepi. Quorum
ope *Ventriculo* cautum erat, & recte egit
arthritis. Nam ex illorum usu (uti
posthæc, ex illis repetitis, sæpe) ægrota-
vit Anus hæc articulis, at, per integrum
jam decennium, & eo amplius, ne semel
quidem, ut observavi, *Ventriculo*, vel par-

HISTORIA IX.

Multum interesse, qua tempestate labores æger
hac Anomala, ad eamque removendam,
tam externa, quam interna: non
nunquam in corpore validissi-
mo requiri.

UT autem pateat, multum interesse qua
anni tempore, qua tempestate labores
æger hac *anomala*; exemplum hujusce rei
magnum adducam. Homo *Damnonius*, prope
Isca ripam agens, *arthritidem* habuit a
parentibus ductam, autumnno vel hyeme
maxima ex parte redire solitam. Hyems
erat, cum, nescio quo de causa, *Ventricu-*
lum arthritis iniit, eumque crudelissime
gravavit.

Cum eo loci res erat, accitus, de mor-
bi ingenio & natura ex symptomatum or-
dine judicans, *arthriticum* eum esse compe-
ri, & in artus materiam amoveri vitiosam
quam citissime debere. Atque illuc rursus
dirigens, *Vini & chalybis* eam quantitatem
dedi, eoque cum eventu, ut ex animi sen-
tentia pes doleret, *Ventriculus* sublevaretur;
ægri vero rebus favere, & ad educendam
arthritida non parum conferre, inventa est
cæli; medio hyeme, clementia.

Sub id tempus, vento, qui aliquandiu
mitis fuerat, in aquilonem mutato, tem-
pestas ingruit acerbissima, frigus intensissi-
mum: atque hujus sævitia, ambitum cor-
poris urgente, retroacta est, in ea, quæ
intus sunt, *arthritis*. Expellentibus altera
vice usus sum, & ut materia denuo extru-
deretur, elaboravi: quod tamen, nisi re-
mittente prius frigore, minime patratum.

Iterum pede doluit ægotans, & quidem
eo usque, donec renovato frigore *arthritis*
jam tertio *Ventriculum* invaderet. Huic au-
tem adeo jam per frigus (quo ut terra
obriguit, ita valde constricta suit ægri cu-
tis, humidumque intus actum) infixa est;
ut eo loci dehinc ad ipsum vitæ terminum
maneret; neque *Vino*, neque *Ferro*, etsi
plena manu exhibito, neque ulla *cardiacorum*,
eriamsi fortissimorum, vi dimoveretur.

Qui per *Phanigmos*, & ejusmodi externa
arthritidem evocantia, fieri potuerat, (quan-
do tyroni, militiam istam nuper ingressio,
mihi nullus erat tum temporis eorum usus)
nihil habeo, quod dicam. Ex eo vero dici,
Ven-

Ventriculi hac affectum unis ore assumptis, in corpore validissimo, non semper auferri; verum externa, in auxilium & operam iis sociam adjungi, nonnunquam oportere.

HISTORIA X.

Cibi fastidium, & Asthma, ex Arthritide Ventriculū infestante; ea expulsa, sublata; ea denuo repulsa, recidiva.

Senex *arthritidem* dolore pedum, cui olim assueverat, aliquandiu liber, appetitu laeso, difficili respiratione laboravit: utroque tam urgente, ut in dubio non modo salus, verum etiam vita esset. Tum denique de Medico querere coepit. Cum illam esse rerum conditionem, mihi denunciatum est, ab *arthritide*, inversa, *Ventriculū*, & spirandi organa afficiente, turbas hasce concitari, sumi arbitratus; ideoque, quando *agri* vires infractae consumptaeque purgationem minime paterentur, primo quoque tempore *Bolū*, ex *Pul. Cantiano*, & *Theriaca Andromachi* deglutendum, una cum *Vini rubri* *Haustu*, spiritusque vol. *Oleof. gutt. aliquot*, dedi, & hora quaque quarta repeti. *Cardiaco* isto forti & generoso, pro re nata, repetito, factum est, ut in artus statim expelleretur *arthritis*; ut ab ea dolerent, tumerent articulamenta, felici huic humorum *Mutationi* debuimus, quod in mediis periculis, in extremo discrimine non omnino spe destitueremur.

Ut cum, quem ita nacti fuimus, locum teneremus, *Infusum* dedimus *amarum*, *Vino Xeresano* factum, modica quantitate, ter in die, potandum. Unde quidem multum aeger articulis doluit, multum profecit. Hæc autem æstate acta, & favente cælo vix aderant saturnalia, cum malum recrudit, propter hyemis inclementiam, forsitan gravius, & intolerabilius, *Chalybe*, *Cardiacis* valentissimis tentata est curatio; sed nequicquam. Morbo, hyeme, senecta oppressus aeger e vita excessit. Qui vero per evacuationes opportune adhibitas fieri potuerat, quando earum nulla mihi data fuit opportunitas, nihil ausim affirmare. Iis autem, modo vires annuissent, opus fuisse autumo.

Est *Asthma* & *Aropeſia*, & *arthritide Ventriculū* infestante: ea vero in artus *Sydenham Opera Med. Tom. II.*

expulsa, eadem sublata: repulsa denuo *arthritide*, recidiva eadem, importuna, mortifera.

HISTORIA XI.

Ex Arthritide Cardialgia, ut & alias Aropeſia per Catharticum & Humores in artus expellentia feliciter curata.

Senex honorabilis, a multis annis paralyticus, *arthriticus*, sexagenario major, tumore pedum continuo laboraverat tali, qui hydropa antecedere, præque foribus eum esse videretur ostendere. Totum enim propemodum pedem ad genu usque occupavit, digito prementi cessit, ejusque foveam retinuit diutinam. Jampridem autem, (quod in hoc casu maximi est momenti) evanuit tumor omnis, sive *Hydropicus* seu *arthriticus*.

Erat insuper huic ægroto, quæ quidem paralyticis familiaris, sputatio jugis, sic, ut diei spatio semilibram sæpe expueret, & quidem quo plus, (quod observatione longa palam erat) eo illi melius. Nam, cum noctu lecto, cum interdum cathedræ perpetuo figeretur; itaque exercitatione pene omni, ejusque effecta, tum urina, tum perspiratione liberiori, privaretur; majori salivatione usa est natura, & per eam aliarum evacuationum defectus quodammodo refarcivit. Saliva autem, hoc tempore suppressa, una cum tumore pedum abeunte, aliisque mali moris symptomatibus in periculo versari ægrum manifestavit.

His adjiciendum, quod paucis post diebus *Cardialgia* suboriretur; quæ, cum perpetua fere esset, & *Aropeſia*, cum *Melancholia*, tanquam satellitibus stipata, ægrum adeo confecit, ut simul & caro multum, & una cum ea vires absumerentur.

Cum mihi jam antea daretur, celeberrimi hujus viri rebus invigilare medicis, salutique prospicere; malum illud nihil aliud esse judicavi, quam *arthritidem* inversam, *Ventriculo* fixam, & quæ ab ejus *anomaliam* fluxerunt accidentia. Proindeque, ut *Ventriculus* & *Intestina* primum exonerarentur, & tunc in artus emitteretur *arthritis*, conceptis hisce verbis, præscripsi.

℞. Aloes rosat. Pulv. Myrrhæ, Scammon. ana ʒ℥. Res. Jal. gr. v. Ol. abs. Chym. carr. j. Extr. cent. q. s. f. Pil. v. mane deglutienda.

L

Tart.

℞. Tarr. Laxant. ℥iv. cum Jusculi avenacei haustu; circa horam decimam sumendus; si Pil. tardius operabuntur.

Hora somni post purgationem, sumat Pulv. & chel. C. C. & Marg. ana ℥℥. cum aqua cin. bord. ten. Melissæ ana ℥℥ss. Pæoniæ. C. ℥iij. Sp. vol. Oleos. gutt. xx. conf. alk. ℥j.

℥. Conf. abs. Rom. ℥j. Pulv. Rad. ari C. alkool. M. ana ℥℥. Syr. abs. f. qs. f. Bolus.

℥. Tinct. Myrrhæ ℥j. Sp. vol. Oleos. ℥℥ss. Pul. Gentian. ℥. misce, igne arena digere, f. Tinctura.

Præmissa purgatione, sumat Bolus bis in die, cum Julapii haustu; hora ante prandium, Tinct. gutt. a xxx. ad xxxx. cum idoneo quovis vehiculo.

Pharmacis hisce assumendis, solito diligentius æger, alias pharmacorum osor, incubuit; & quidem eorum viribus *arthritis*, a *Ventriculo*, & iis quæ intus sunt remota, in artus exulare: dolere articuli; tumere pedes; quodque est hoc amplius, abire *cardialgia* redire fames, incohuitaque, pro ægri ætate, cæteraque ejus conditione, magna.

Quando ex quiete nimia, aliisque in *sex non naturalibus* erratis, vitium alio tempore contraxerat *Ventriculus*; paucis post diebus derumere pedes; fluere desit saliva. Malum ex eo notabatur ingravescere. Cibi enim omnis obortum est fastidium, *Intestinatorum* æstus, & dolor erat; faciei pallor. Ab ore & pedibus, ad *τὰ ἄνω*, ad *Intestina* humorem *arthriticum*, & serosum ejus vehiculum ferri constabat. Per *Vinum* & *Oxymel Scilliticum*, perque *Solutum purgans*, ductum alimentarem exinanivi. Pituita & cruditate omni amota per *Infusum amarum* forte & generosum; perque *chalybeata* factum, ut *Ventriculo* fames; ut ori saliva; ut pedibus tumor; ut faciei color: Verbo dicam, expulsis, ad *τὰ ἵσα* humoribus vitiis, ut ægro nobili conciliaretur, quanta maxima potuit, incolumitas.

CAPUT III.

De Colica Arthritica.

ART. I. **P**ost affectus eos, qui in *Ventriculo* sunt *arthritici*, lata ducente via, ad illos, qui attingunt *Intestina*; descendendum est: Quorum e numero *colicæ* dandus est principatus; tum quod ea frequentissime omnium occurrit; tum quod (uti solet evenire) magno cum subpicio laborantium. Hæc autem *colica*, minime uno contenta *Intestino*, fistulam a *Ventriculo* ad anum omnem, etiamsi non eodem tempore, tenet, & in ea sedem ponit. Imo quidem sæpe fit, ut cum *Intestinis* hac *colica* vexatis, *Ventriculus* etiam, & quidem *διεσπασμένος*, afficiatur: nonnunquam multum affligatur.

II. *Colica* vultum induit *arthritis* & fixa, & vaga; & regularis, & *anomala*; primigenia, & symptomatice. Horum omnium membrorum omnino nullum extat, quod interdum ita non faciat. E symptomatice vero ea creberrime, quæ *colica* succedit; quæ a *colica* incipiens, in eam desinit. Ea citissime partes has invadit.

Ad limina nota.

Ipsa domus se fert;

& artus & *Intestina* vicissim occupans sedem habet ambiguam. In natu grandioribus, & infirmis (qui *anomaliarum*, ut dixi, *arthriticarum* mos & consuetudo est) induit sæpissime; in athleticis, & ætatem nondum mediam ingressis, aliquando. Hujus autem metamorphoseos modus & ratio talis est.

Cum æger diu recta *arthritide* per vices doluit, & jam ætate provectus est; vel ex debilitate, vel alia aliqua de causa statim exquirenda, Natura paroxysmos identidem intermittit; & nullos, aut raros, aut raros, aut parvos & breves edit. Paroxysmorum istam defectionem usitatissime sequitur, ocus aut tardius, in iis; quæ intus sunt, novum quoddam malum; interdum autem caterva, symptomatum illa, quæ *colicam* manifeste indicat. Primum, universi corporis agrotationem, & *Ανοσις* æger; non raro nauseam quoque sentit: tum *Dolore Intestinatorum*; qui plerumque fixus; & eidem quasi puncto (pali instar) hærens, portionem quandam abdominis tantillam (quod sæpe observavi) præcipue

que *πρὶ τὸ ὄμαλον*, pungit exēruciatque. Huic symptomati aliud fere æquale est, pectoris nempe oppressio; & tanquam ab opere incumbente gravitas; quæ, ut hujusmodi *colica* afflictis fere cunctis accidit, ita quidem iis molestissima est. Hæc duo symptomata, (*σπῆξι* nimirum, & gravitas pectoris) summa & primaria judicentur; quibus secundo loco annumeranda præcordiorum dissentio, *Βορβορυγμοί*, ructus materię plerunque biliosę vomitus, alvi segnities. Tertio loco accidentia κατὰ *Συμπτώματα* nata; qualia sunt oculorum languor spirituum dejectio, vigilia, animę remissio, anxietas, & si morbus duraverit, universi corporis imbecillitas & macies.

Et si non semper, tamen sæpe autumnus incipit hæc tragœdia; & nisi opem auspicato medicina fert, per insequentem hyemem agrum affligit, & quidem miserabiliter. Nam a prima *Intestinorum* aggressionē, flatu, tristitia, dolore languet ille & deprimatur; noctu vigilat; interdum lamentatur; dies noctesque calamitosas agit; donec somno, cibo, refectionibus vitę necessariis privatus; vomitu creberrimo laceffitus, dolore fractus & enervatus, macie confectus, serius citiusve (prout illius vires sunt) vitam cum morte ærumnosissimam commutet.

III. Ex his phænomenis, de morbis hujus genio & natura statuere, non erit difficile. Quid enim magis in propatulo, quam quod materia ista *Arthritica*, quæ ad τὴν *Ἄκρην* propelli sueta est (Natura novis, utente consiliis, alioque instituto) jam in visceribus deponatur, ibique dictam moveat tragœdiam; illa famem tollit; illa *Δυσπεψία* infert; illa vomitum ciet; illa præcordiorum inflationem creat; illa pectus aggravat; illa dolere facit *Intestina*.

IV. Unde sequitur, quod, in hoc affectu detegendo, ejusque formanda diagnosi, quamquam prima facie plurimum valere videantur e prædictis aliquot symptomata; *σπῆξι* præcipue, & pectoris gravitas; tamen, cum *colica* huic *Arthritica* illa non sunt tam propria, quin aliis *colicę* speciebus eadem convenient; hanc ob rem *Arthriticam*, nostram ut rite dignoscamus, alio progrediendum est. A nullo autem alio fonte melius petenda est illius notitia quam a morbo præcedenti, *Arthritide* scil. *regulari*: præsertim ab illius nupero paroxysmo; ab ejus silentio, sive intermissione, paroxysmum istum insequente; & *colica* isti

silentio superveniente. Quam quidem morbi historiam, ejusque aliam ex alia partem ordine perspicuo fluentem, quisquis studiose ponderaverit: de *colicę* hujus natura, eamque revera esse *arthriticam*, ut opinor, minime dubitaverit.

V. Hæc, de causa hujus *colicę* proxima, sive continente, quæ est ipsa materia *arthritica* τῆς *Εὐρίτης* infusa; qui vero ea infundatur, sive quæ sint hujus morbi causę remotiores, loco jam proximo dicendum.

Eæ duum sunt generum, externæ, vel internæ. *Externæ* materiam hanc, extremitatibus sive commissam, sive committendam, intro pellunt, & *Intestinis* illidi faciunt. Cujus ordinis sunt frigus, tibialia nimis arcta, vincturæ, emplastra, unguenta, cataplasmata, &c. repellentia. Frigus, uti *colicam* exquisitam ab omni ævo incurere, & vel ideo in causis ejus evidentibus locum non ultimum mereri; ita quidem *arthriticam* identidem antecedere, eique producendæ multum conferre, certissimum est.

VI. *Internæ* sunt permultæ: earum vero princeps habeatur *Intestinorum* a natura imbecillitas sive *Ἀνωρία*; quæ, ad sustinendum humidorum in corpore libramentum, impatiæ redduntur illa, & (secundum leges a mundi principio ratas & stabilitas) oneri nimio tum accipiendo, tum ferendo, prona. Quæ quidem causa, quandoquidem, constans, & perpetua est, non modo *colicę* conducit primum afferendæ intendæque; sed, quod magis est, eidem postea sæpius revocandæ redintegrandæque.

Alia magnæ ad hanc *colicę* efficacitatis causa, impuritatum & cruditarum massa est in visceribus cumulata. Res notissima est, ab hepate a pancreate, glandulisque fragiformibus, in ductum *Intestinorum* mixti sanguinis impuritates & recrementa: pari etiam modo notum est, & *Ventriculo* cruditates accipi creberrimas: in *Intestinis* sisti copiosissimas. Quoties vero *arthritico*, quoties *Δυσπεψία* id obvenerit, ad progignendam hanc *colicam* mirum quantum operetur. Alienæ huic massæ contagio & afflatu inficiuntur *Intestina*; & *arthritide* intro (non aliter quam *Emplastro*, sicut ante dictum, aut *Phenigmo* attrahente pedibus admo- extrorsum) invitata est. Verum, ut hic loci *σημείον*, sæpe a me notati, mentionem faciam; nullæ unquam impuritates hac in re plus efficere videntur; aut ad *coli-*

eam gignendam magis valere, quam quæ sunt *Biliofa*: quod, ægrotantium excrementis, sive ore, sive alvo redditus, ostendi solet. Impuritates in huiusmodi ægris hac via copiosius e sanguine effundi, id facere videtur; quod, vitam agendo sedentariam, parum ii per cutim emittant, humoresque per *Διαρρηκτὴν* expelli solitos, intus ferri, & in *Visceribus* deponi sinant.

Inter hæc causas porro censenda sunt, & quidem merito, aliena ore demissa, ut fructus *ὤσπιδος*, &c. pomaceum nimis acidum, immoderate sumptum; aliaque in victu, præcipue frigido, errata.

VII. Huius morbi notionem quicumque rectam habuerit, a *colica*, humoribus, aut flatu orta, a *biliosa*, *hysterica*, reliquisque speciebus, quantum ille separetur, facile perspexerit. E contrario, quænam species ad hanc nostram maxime appropinquent, & qua in re, ut videamus: Ratione *Originis*, *Colica Humoralis*, quoad a quiete nimia & æris constitutione frigidiori fiat, eatenus cum *arthritica* concordat, & eandem habet cum ea causam evidentem, quæ materiam utrobique committat *Intestinis*. Ratione *Materiæ*, *colicam* hanc maxime repræsentat ea, quæ pestilens; (qualis ab *Ægineta* describitur (1). Huius autem *colicæ*, ut & *Humoralis* cum *arthritica* similitudo tam languida, tam mediocris; ut in hac re Medicus, si symptomatum attendat ordinem pathognomonicum, ne decipiatur, non est ut multum veremur.

VIII. Hæc, ut ab aliis morbis sejungatur hic affectus, jam a se quemadmodum differat, & quotuplex sit, examinemus.

Ratione *Materiæ*, nunc pue *arthritica*, nunc autem (ut in tribu symptomatica) *Scorbutica*, *Scrofulosa*, &c. differentias habet, cum affinis symptomaticæ tribus *anomaliis*, communes.

Ratione *Subiecti*; modo eidem quasi puncto, uti terebrum, infigitur, modo, sed raro quidem, *Intestina* pervagatur; modo etiam *Ventriculum* comprehendit.

Ratione *Causarum Procatarticarum*; alias externa aliqua materiam repellente; alias massa in ductu alimentari coacervata, & eam intus alliciente; alias binis hisce causis conjugatis; alias earum agente nulla, sed mera viscerum imbecillitate, contrahitur.

Itaque licet hic affectus unam eandemque retineat naturam; modos tamen, & ejus accidentia, præ se fert diversa.

IX. *Colicam* exquisitam raro vitæ spatio aliquid demere, magnaue ex parte periculo vacare, pervulgatum est. E diverso *Arthriticam*, morbum sæpe lethalem esse; semper autem periculosum, habemus exploratum. Si pectoris gravitas, si *Intestinatorum Dolor*, præcipue pungens, diu persistenterit; malum. Gradatim it in pejus æger, donec e medio cedat. Rara unquam, hoc casu incolumitas, nisi *Arthritis* in extremis partibus apparente; sed neque ea omni, aut semper. Nam si *Dolor* erit *Articulorum*, manente interea in visceribus sterquilinio; ab isto dolore externo spes evanida, innanis. Intus statim allicitur *Arthritis*, & ægrum sæpe opprimit.

At si *Intestinatorum* dolor, pectoris oppressio, alvique tarditas penitus tollatur, simulque sit in extremitatibus *Arthritis*; ea morbi facies hilarior; is status optabilior.

Si vero prorsus sileant eorum, quæ intus sunt, querelæ; si revertatur appetitus, & eodem tempore fulgeat in extremis partibus *Arthritis*; tunc demum æger *ἰσὺ βελῶν*; tunc gallum *Æsculapio* litabit. Quod ut fiat, quaque methodo medendi, jam proxime dicetur.

X. Quandoquidem ad hunc affectum interdum febris; a bile orta, se adjungit; in curationis initio id agendum, ut pulsus, ut æstus, ut sitis ut reliquorum febris indiciorum habeatur ratio; & ad præcavendam *επιγαστρὴν* si opus erit venæ sectione, in ipso limine operis ea fiat, parce vero, neque supra modum huic symptomatici levando necessarium; ne, cum nimis excedendo, *Arthritidis* posthæc expellendæ tollatur omnis facultas.

Secundo loco videndum, una cum *Intestinis* utrum *Ventriculus* *ἰδιοναδιδὸς* afficiatur; præsertim, cruditate & alienis rebus utrum aggravetur: Hoc casu nihil antiquius habendum, quam ut, epoto *Tææ*, vel *Cardui Decocto* (neque enim *Emetica* suaderem valentissima) cieatur vomitus.

Postridie vomitus, si vires ægri permiserint, aut interposito die uno, fiat purgatio; vel per *Extractum Eustachianum*, & *Res. Julap.* quibus si placet, adjungi potest

(1) Lib. 3. Cap. 43.

test *Mercurius dulcis* ; vel per *Syr. e Spina*, & *El. Salutis* , vel , si febris urgeat , per *Mannam* , & *Salem Catharticum* , aqua *hordeata solutum* , vel per aliud quodvis purgans , ad hanc rem appositum . Vespere , tam eo post vomitum , quam eo post purgationem , nihil paregorici (nisi si *Δυσμαδυσος* , aut aliquid improvisum id exegerit) adhibeo , ne illo *Arthritis* , in paroxysmum eruptura , tanquam sufflamine , retineatur .

Adeo valet , hac in re , & tanti est momenti purgatio , ut omissa illa sive negliger acta , si non mudentur *Intestina* , perturbata erit curatio ; & post conatus in ea varios incassum factos , saepe illuc redire necessum erit , ubi per negligentiam est peccatum ; ad *Intestina* nempe expurganda . Quare , si purgatio minus perfecta fuit , neque rebus aegri conveniens , omnino repetenda est ; & quidem eo usque , donec proposito respondebit . Atque hoc casu , diebus purgationi interpositis , nunc *Pulveribus Testaceis* , nunc *Infuso amaro alterante* ; illis , si acido ; his , si biles abundant *Intestina* , ne plane nihil agam , insisto .

Quibus absolutis , & iis , quae viam praecludebant ; amoris expeditisque , (quo quidem iter quasi medium confici videtur) ad *Arthritidem* extrudendam , nec quidem citius , incumbo . Hunc in finem faciunt , praeter *Arthritidem* expellentia , (Capite primo memorata) nonnulla remedia *Colica* ab antiquo propria , ut & *Aromatica* , quae cum praedictis non inepte complicantur . Haec autem sunt pulvis *Zedoaria* , *P. Rad. Ari Com.* *P. Aurant.* *C. Cl. Fulleri* , *P. ejusdem Bezoarticus* . *Sp. Diatr. Piper.* *Sp. Calaminth. simpl.* *Sp. Diambra . Dianthus.* *Elect. e Baccis Lauri* ; *Mistridatum* , *ZZ in Indiis cond.* cum ejus *Syr. Olea Chymica* , *Bacc. Juniperi* , *Seminum Cumin* , *Carvi* , *Feniculi dulcis* , *Anisi* , & ejusmodi *Carminantium* , & *Aromaticorum* . Vinum *Xeresanum* , aut *Rubr. Lusitanicum simplex* , vel *amaris & Aromaticis alteratum* .

His munitis auxiliis , ad *Arthritidem* expellendam , & in artus emoliendam , ita progredior . Egro in lectum dato , *Pulverem* , vel *Bolum* , vel *Pilulas* praecipio .

℞. Pul. e Chel. C. C. ℥i. ℥ii.

Chal. Nutriti gr. v. misce f. Pulvis comp. vel

℞. Pulv. Zedoar. ℥ss. Spec. Calaminth. Simp. (vel Diambra) ℥i. Alcohol. Mar-

sis gr. v. f. Pulvis ; vel forma Boli.

℞. Elect. e Baccis Lauri (vel Mistridatis) Pul. e Chel. C. C. ana ℥i. ℥ss.

Alcohol. M. gr. v. Syr. Aurant. qs. f. Bolus , vel

℞. ZZ in Indiis cond. Pul. Rad. ari C. ana ℥i. ad ℥ss. Chal. N. gr. v. Syr. N. M. qs. Bolus , vel

℞. N. Myrist. cond. Spec. Diambra ana ℥i. Chal. N. gr. v. Ol. Junip. Chym. cutt. i. Confect. Alk. S. M. qs. f. Bolus , vel , forma Pilulari.

℞. Spec. Diatr. Piper.

Pul. Serpent. Virg. ℥ss.

Chal. Nutrit. gr. v. Extr. Ruae qs. f. Pil.

Hisce compositionibus superbibatur *Vini Xeresani* , vel *Rubri Lusitanici* ; vel *Julapii* haustus .

℞. Aq. Cardui , Menthae ,

Lactis Alex.

Chamem. comp. ana ℥iii.

Sp. Juniperi ℥ss. ad j.

Marg. pp. ℥ss.

Sacc. albiss. qs. f. Julapium , vel

℞. Aq. Lactis Alex. ℥xii.

Sp. Cerevis. Brunsvicensis ℥iv.

Marg. pp. ℥ss.

Saccb. qs. f. Julapium .

At si forma arridet liquida , *Infusi* haustus , cum adjecto *Marte* , detur ebibendus .

℞. Rad. Zedoar. Galanga , Calami Aromat.

Cacum. Absynth. R. ana ℥ii. Bacc. Junip. Croci Brit. ana ℥i. Infunde in Vini Xeresani ℥ij. ad alterationem idoneam tunc coletur Infusum .

℞. Hujus Infusi ℥ij.

Alcohol. Martis gr. v. f. haustus , ante bibendum agitandus .

Ex hisce , vel hujusmodi medicamentis , sumatur aliquod , quarta , quinta , vel sexta quaque hora , medioque medicamentorum intervallo , *Vini* , e praedictis vel ejusmodi generosis , haustus , ea quantitate , quam aeger tuto poterit haurire maximam . Quae quidem regula , de medicamentis etiam tenenda est : ea nempe dosi , & frequentia oportere illa dari , quae non aliam febrem , sive in sanguine orgasmum , excitaret , quam quae , *Arthritidi* ad rem ita amovendam , satis inveniretur .

Ita subinde fit , in robustioribus scilicet , aut spiritu animali valde *Elastico* donatis ; ut a *Purgatione* , maxime si utraque (tam

ea ,

ea, quæ *αὐτὸ* movet, quam ea, quæ *κατὰ*) præcesserit; sive propter agitatam sanguinem, sive propter impuritates) quibus uti dixi, in visceribus retineri solet *Arthritis*) expulsas, ea jam suapte sponte erumpat in articulos, & evadat *Regularis*. Hoc quancumque fiet, unicum restabit, ut eo loci illa, quicquid iracundiæ permanet, exerceat; quicquid humoris effundendi, effundat. Verum, ut hoc interdum, & quoties fieri contingit, auspiciato fiat; ita quidem, & contrario, antequam illuc perventum, & *Arthritis* artubus affixa erit, plures sæpe interveniunt difficultates; plures scopuli deteguntur, qui moras in sanando agro medenti faciant gravissimas, quibus quasi digito demonstrandis, jam proxime incumbam.

Interdum igitur *Intestina* torqueri, & spasmodis ita contrahi manifestum est, ut medicamentum ea purgans, etiamsi *ἄριστότατος*, non sentiant: multo minus obsecudent, & obtemperent: quo rerum statu, abdomini *Fortum* admoveere oportebit, eumque aliquoties repetere.

℞. Cacum. Abrotan. Artemis. ana ℥j.

Rad. Aristoloch. rotund.

Flor. Chamen. ana ℥ij.

Bacc. Junip. ℥j.

Sem. Carui, Fenic. d. ana ℥ss. coq. in aq. Font. ℔x. ad v. Colatæ adde Sp. Vini vulg. ℔j. pro Fotu Ventris calidissimo.

Post omnem fovendi vicem, eo, quod sequitur, *Venter* illinatur.

℞. Unguenti Martiati ℥ij.

Ol. Tereb. vel Picis liquid.

Rhod. Cb. gutt. vi. f. Linimentum.

Galbanetum Paracelsi, ut apud *Riverium* est, (Capite de *Colica* (Linimenti hujus locum implere, & totus eo venter illini potest.

Nonnunquam autem, maxime in teneris corporibus, etiam postquam *Intestina* fuerint purgata, multæ restant eorum contractiones, multus dolor; hunc continuus, nunc intermittens: qui quidem eorum affectus, cum sit omnino *Σπασμώδης*, partim *Fotu*, & *Linimento* prædicto; partim *Enemate* sequenti) quod animales spiritus mulcere, delinire, & in ordinem poterit redigere) vincendus est.

℞. Vini Canarini ℔ss.

Elect. & Baccis Lauri ℥ss. f. Enema, alvo diu retinendum.

Est autem, ubi *Ferri* præparata, propter

imbecillitatem, *Intestina* respuant, & quam citissime ano ejicient, una cum medicamentis ei conjunctis, His agrotantibus ere esset, omisso *Ferro*, medicamenta præscripta per se dare.

Alias observare licet non modo *Ferrum*, sed & aliquando *Pul. Testaceos*, *Arthritis* propellendæ causa datos; duos scilicet difficileque, descendere, & per alvum reddi. Quoties hoc fiat, astringenda prorsus ea priusquam in *Arthritis* dimovenda, quicquam profeceris: neque enim, fluente alvo, *Arthritis* expectanda *regularis*. Ea vero, *Terra Japonica*, *Creta*, *Sanguine Draconis*, & ejusmodi mollioribus astricta, per *Ther. Androm. Elect. & Bacc.* per *Species prædictos* & *Regno Vegetabili sumptas*; perque *Olea Chymica*; illa nempe remedia, quæ minus irritent, progredi juvabit.

Quamprimum medicina, quæ *Arthritis* extrudat, ægri rebus est aptata usui ejus interno, per bidui, vel tridui spatium insistendum est; eoque tempore in ea consumpto, si per hosce dies in artubus nulla in conspectum venerit *Arthritis*, ad *Emplastrum*, *Cerata*, *Phenigmos*, & ejusmodi *Arthritis* evocantia, (Capite primo relata) confugiendum est. Quinimo postquam in articulis apparuerit, *Πεπραγμένης* ore sumendis usque uti conveniet; donec articulis hærens, & affixa de suo in *Intestina* reditu & *πυλιδρομία*, locum ea suspicioni nullam relinquat. Hoc autem punctum cum attigeris, & in rectam *Arthritis* viam denique redieris; in ea, cum remediorum portione dimidiata (duplo scilicet eorum intervallo, vel *subdupla* dosi, ut in capite præcedenti declaratum est) procedere juvabit; & quidem dies quatuor, sex, vel octo; eo nimirum usque quoad alienum sive per extremitates eliminetur, sive in eas adeo protrudatur, ut de *Intestinis* iterum, intra breve spatium, impetendis nihil metuamus.

Notatu vero hoc dignissimum, atque adeo jucundissimum, quod, articulis quamprimum fixa est, *Arthritis*, læto quidem omine, spem & vitam pollicetur. Visceribus statim melius est; quæque intus mali fuerint vestigia, subito tolluntur. Oculorum acies, vultus vigor, fames, & concoctio restituitur, & in vado res salutis est.

Dicæta per totum hunc decursum, qualis & quanta esse debeat, ex omni parte *κατὰ μέτρον* ordinanda est. Nihil admittendum,

dum, quo in ea uspiam peccari possit. *Panatella*, *Gelatina*, *C. C. & Eboris*, *Panis biscoctus*, *Jusculum*, maxime autem *Vinum* prodest, vel *simplex*, vel *Decocto albo* temperatum. Certe *Vino* assuetis ab eo permagna expectatio, permagna est utilitas: quare iis præsertim illud largiter exhibeo; eam nempe quantitatem, quæ calorem *Intestini* conciliet; quæ *Arthriticum* miasma ex iis ad tæ æta pellat; quæque eo loci id impune figat. Hanc autem operam optime navat; quod e *Lusitania* rubrum hodie nobis apportatum est; agro ad ℥ss. ad libram integram, vel etiam duas, nycthemeri spatio, si ad rem propositam opus fuerit, concessum. Alvus si dura, (quod, tum lecto incumbenti, cum *Colica*, tum *Arthritide* laboranti familiarissimum) *Enemate Oleoso*, vel e *Jusculo Vervecino*, lubricante, diebus alternis mollienda.

Interdum observare licet, agrum; *Arthritide* e visceribus expulsa, perque artus exulante, penitus emancipatum; ventris adhuc inflatione, doloreque *Intestinatorum* urgeri; sic, ut exspes & despondens ille, per tanta artis molimina, parum in salute sua renovanda fieri; postque iter procellosum & scopulis plenum, in ipso potu se denique periturum opinetur. Hac autem statuum, & naturæ morbo debilitatæ, sunt indicia. Valet hac in re, ad status educendos, *enema e Vini Canarini ℥xii. Elect. e Baccis Laur. ℥ss. diebus continuis*, vel alternis immixtum; valet *Infusum amarum*, & ejusmodi *Stomachica*, quæ tum famem acuant, tum etiam coctionem emendent.

Ista medendi methodo, primum nempe vias purgando, posteaque foras *Arthritidem* mittendo) *Colica Arthritica* laborantem curare soleo; cumque hanc methodum, huic *Colicæ* aptam, multoque usu comprobata, & confirmatam esse noverim; idcirco lubens in mediis eam propono; aliorum meliora, modo proferre dignarentur, sequi paratissimus.

XI. In *Prophylaxi* enitendum, ut roborentur *Intestina*, contraque inimicum, ne illuc denuo se intrudat abfirmentur; simulque, ut reliquæ τὰς Δυσκοιλιὰς nullæ, massa impuritatium nulla, in iis posthæc collecta, eum ad se alliciat. Qua de causa, hujus classis *Arthritidos* studere cûmi, & concoctioni, ductum alimentarem ecoprotico

sæpius purgare, aliisque *Stomachicis*, cum modice restringentibus uti, oportebit. *Aquas Minerales* multis hac in re prodesse novi, tam *purgantes*, quam *Diureticas*. Non pauci apud nos huic *Colicæ* proclives, aquas *Alfordenses*, vel *Salem Catharticum*, aut *Tartarum laxantem*, aqua hordeata solutum, bis vel ter in anno bibunt: itaque cruditates, a *Ventriculo* in *Intestina* derivatas, temporis tractantes, *Podagræ* præoccupant materiam, ano expellunt. Nonnulli meo hortatu commode *Purgantibus* aquas adjuverunt *Diureticas*. Ut autem aquæ *Barbonienses* ab antico *Colicæ*, ita quidem ei, quæ *Arthritida* est, quæ cæteris adversari censeantur. *Aquarum usus Diureticarum* interponantur ea, quæ ad propositum faciant *Alterantia*. Hora nempe decima, *Infusi amari Vini albo Lusitanico facti, Haustus*: quin etiam post prandium quotidie, ejusdem *Vini* simplici cochlearia aliquot. Hora quarta pom. *Elect. seq. ℥i. cum vehiculo* convenienti.

℥ss. *Conf. Fruct. Cynosb. (vel Ros. rub. per Set. traject.) abs. Rom. ZZ. in Indiis cond. ana ℥ss.*

Salis Martis ℥iv.

Syr. ZZ. ℥i℥ss. Ol. Cin. cb. gutt. v. f. Electuarium vel.

℥ss. *Trochisc. Hedych.*

Conf. Flaved. Auran. ana ℥ss.

Salis M. ℥i. Spec. Diamb. ℥i.

Alcohol. M. ℥iii.

Syr. Abs. f. qs. f. Electuarium.

Quatenus vero ab externo frigore oriatur hæc *colica*, vestitu idoneo, vitatoque aëre nimis gelido, illud eatenus fugiendum, hæc cavenda.

Id adjiciam, quod hoc affectu laborantes, quotquot ætate maturiores, & voluptatibus, aut rebus civilibus imoediti, *Prophylaxin* neglexere, raro sine multa id fecerunt: sæpe quidem magno cum salutis, sæpe cum ipsius vitæ, damno.

XII. Placet denique, citato divini senis oraculo, monstrare, *Arthritidis* hanc in *colicam*, & *colicæ* rursus in *Arthritida* migrationem, *Hippocrati* non fuisse incognitam. Ita enim ille: ὅ τὸ Εἶναι ἐν δεξιᾷ Ἀρθρίτιδος ἡμῶν, ὡς ἡρῶντος, ἐν δὲ τῇ αὐτῇ ἡπὸ δεξιᾷ, ἰσχυρότερον. Id est: Qui articulari Morbo desensus, *Intestini* dolore dextra parte verubatur, levius habebat; ubi vero Hic curatus fuit, magis dolebat. (1) Quod de coli-

(1) Vide *Epidem. Lic. vi. Sect. iv.* & in eam *Galenii & Foesii Commentaria.*

colico Dolor, in *Morbo Articulari* obveniente, eumque allevante; postea vero, facta humoris huc illuc transpositione, in *Arthritidem* iterum mutato, est intelligendum. Sed hæc hæc hactenus.

HISTORIA I.

Colica Arthritica male tractata, demum lethalis.

Vir ex *Tremulorum* secta, probus, & generosus, ingruente senectute, per integrum decennium, bis ter quotannis ægotavit *Arthritide*; nunc pedem, nunc manum occupante; semper autem regulari. Annus erat vitæ sexagesimus, cum ea primum intermisit, neque more pristino ægrotum visitavit. Istamne vero quietem, & a dolore immunitatem, bonam, optabilem, & comodam existimaverit? Imò potius formidabilem, exitiosam. Doloris enim salutaris, & externi vice, alio intra anni spatium *Intestinalium*, præcipue τὸ περὶ τὸν ὀμφαλὸν acerbo, & constanti, & fixo est correptus. Interea temporis elanguit appetitus: languenti prostratoque ei successit oculorum gravitas, faciei pallor, totius corporis macies & imbecillitas. Ad hæc colerica & cruda, vomitu emissa *Ventriculum* aggravari ostenderunt.

Increcente morbo, Empirici consilio, *Aque ferrata*, ut & e *Ferro preparata*, aliaque permulta sunt adhibita; eo vero eum eventu, ut ab *aquis interanea* nimio algore; a *Ferri preparatis*, utpote concoctu & confectu difficilibus, e vestigio diarrhoeæ vexaretur.

Ad senem hunc denique accitus, eumque graviter ægotantem, neque intra cathartico-
rum opem (quæ alias essent necessaria) locorum inveniens, ore datis βαρυνυοῖς *Arthritidem*, educantibus extra applicatis, ut in artus ea transferretur enifus sum. Et cheu! frustra: *Visceribus* hærens miasma *Arthriticum*, & coctionem impediens, aliud sibi malum adscivit comitem; nempe *Ventriculi*, & τὰν ἑντέρων impuritates: quibus utrisque depressus æger, viribus sensim inclinatis, post anni dimidium, e vita discessit.

Sæpe quidem mihi in mentem venit, robusto huic ægroto, tametsi vetulo, fuisse melius consultum; si *colicæ* principio facta purgatione, miasma, per idonea, per stomacho minus gravia, per e *Regno Vegeta-*

bili sumpta cordiaca, fuisset expulsum. Illud initio fieri potuisse, vero non est absumile: At oppresso ei, viribusque deficienti, ipsa medicamenta, neque nimis considerate electa, neque nimis scite data, mortem accelerarunt.

Historia narrat *Arthritidem* diu *Regularem*: at quæ progressu ætatis, *Intestina* perturbans, *Colicam* fecit, neglectaque therapie opportunitate ægroto mortem maturavit.

HISTORIA II.

Arthritis vaga, Colicam mentita, ad regularem Arthritida reducitur, cum ejus Prophylaxi.

Pellio quidam ad *Isce* ripam, annos habens quadragenos, athleticus, & bene coloratus, patre generatus *Arthritico*; dolore artuum huc illuc vago; hyeme præsertim, & tempestate pluvia; cum articulo-
rum tumore, rubore, nitore crebro recurrente, diu infestatus est. Hujus sæculi initio, defubito cessavit artum dolor, sed intestinalium ortus est obtusus, constans, una cum febre quadam symptomatrica, pulsu magno.

Nihil probabilius visum est, quam, in ægroto jam diu *Arthritico*, materiam alienam *Intestina* invalisse; quod utique judicium, emissi postmodum sanguinis, superficiem tegens gelatina, crassior certe & albidior (quæ *colicam* genuinam raro comitatur, *Arthritidi* vero familiaris est abunde confirmavit.

Ut ægro prospicerem, nihil prius habui, quam universum *Arthritidis* ordinem mutare, id est, *Intestina* versus sanguinis impetum & inclinationem, arte quanta possim maxima, sistere; & materię vitiosæ ad ea defluxum impedire. Secundo, ut ad ea, quæ sunt extra dirigatur, & ex *Arthritide Anomala*, fiat illa *Regularis*.

Ut utrique satisfacere indicationi sanguinem detraxi; *Catharticum*, ex *Pil. Rud. Scammon.* & *Calomel.* dedi. Vespere post purgationem, ut sanguinis orgasmum incitarem, & simul *Arthritidem* in artus amandarem, *Pul. & Cbel. c. c. ʒ℥.* sexta quaque hora, cum *Julapii Perlati* haustu miscui; & ordinata re dietetica, discessi.

Quid ex eo fit? Intra biduum recrudescit *Dolor articularis*; cumque vel adhuc lecto ægrum detineri crederem, domi meæ

me salutat; alacris, jucundus, deque noviter reverso hospite gloriatus. Digiti in pedemagni articulum iste, more suo, primum & majorem, plantæque ligamenta potissime momordit. Placuit sane, & pergratum fuit, tam facili ægrotum redimi, durioribus suetum. Quæ ad *Prophylaxin* facerent, in aliud tempus, & magis opportunum, distuli.

Ea vere, mense Majo sequenti, sicerat: *Premissa Venæ sectione, perendie salis Cathartic. ℥℥. Manna ℥ii. aq. purp. ℥i. Solutas ebibat; omnique hora deinceps hauriat, donec usque reddiderit: itaque diebus tertiis, quartisque, ad tres vices, repetat. Postea omni mane, aq. ferratarum ℥ii. ebibat, quinta pomerid. sequentis Elect. ℥i. cum Julapii hauritu sumat.*

℥℥. Conf. Flor. Salviae ℥i. Pul. Rad. Ari comp. ℥℥. Pul. cor. rub. e Chel. Simp. ana ℥℥. Salis Martis Riveriani ℥i. Syr. Garyoph. qs. f. Electuarium. Cerevisia Cucumini Hed. ter. Baccis Junip. Semp. Dauci, in potum ordinarium, medicata esto. His in mensem unum alterumque incumbat.

Ex eorum usu, propitio cum Deo, multos ille annos, tum *Anomala*, tum recta *Arthritide* immunes, egit; ad medicinam hanc stabiliendam, & figendam, exemplar utique luculentum.

HISTORIA III.

Colica, ex Quiete Arthritica, in Arthritida regularem versa.

Magnificus senex, *Arthriticus*, paralyticus, aut sellæ, aut lecto complures annos insidens, humoribus vitiosis (qui, non uno exercitationum genere, in omnes membrorum partes, cum eorum *Dolore Articulari*, solebant exprimi) occasionem dedit, aut in viscera plus æquo immitterentur, ut in iis commorarentur.

Ex hac potissimum causa, mense Majo, MDCCII. in *Dolorem Colicum* vir illustris incidit: Interea vero temporis salivatio, quæ diu magna fuerat, suppressa; pedum tumor, qui jam multis annis immentum, imminutus est, facta videlicet humorum ad *Intestina* translatione. Pectoris fuit totius gravitas, & oppressio, tanquam ab onere quodam molestissime ei superimposito.

Morbi hujus historiam contemplant mihi perspicuum erat, humores inverti & jam *Intestina* versus, eorum fieri inclinationem.

Sydenham Opera Med. Tom. II.

Quo circa, primum huc incubui, ut scæcibus, quibus ipsa premerentur, & tanquam retinaculis eo loci detineretur *Arthritis Intestina* quam citissime liberarentur: ideoque *Pill. ex calom. Res. Jal. Extr. Eustachiano* dedi; quibus satis ex voto deiecit æger impura, biliosa. Purgationem e vestigio secuta est a *Vomitu*, *colica*, & oppressione dicta immunitas; uti etiam in extremis partibus *Arthritis*. Hujus promovendæ gratia *Gutta*, quæ ab Inventore nuncupantur, *Godardianæ*, & *Alcohol Martis*, bis in die sumpta sunt. Ita naturæ ferebatur auxilium, aptum quidem, & ejus agendi modo accommodatum: recte enim doluit, & *Colicus*, ægrotans. Quid enim septuagenario, morbis & ætate confecto, poterat accidere fortunatius? Cum *Arthritide* redux est & salivatio, & pedum tumor.

Nihil hujus *Arthritidos* in *colicam* metamorphosi manifestius; nihil hujus *colicæ* ad *Arthritidem* reductione desiderabilius.

HISTORIA IV.

Colica multarum Hebdomadum Arthritida, eadem Methodo curata.

Sexagenarius quidam, ingenio natura subtili, rebus agendis elaborato, *Arthritide*, semel bis anno constanter reduce, per decennium afflictatus est: quo quidem tempore nonnunquam catharro, fauces invadente, & in tumorem eas elevante sæpe correptus est. Huic catharro se adjunxit, & quasi latus clausit, febricula quedam; itaque *Angina* speciem præ tulit. Post dies aliquot, huic affectui supervenerunt indicia *Podagræ*: digiti nimirum majoris articuli primi dolor, tumor, ardor: & plane indicarunt istum sive catharrum, sive *Anginam* esse omnino *Arthriticam*; *Arthritidem* hoc modo deviam, abnormem, *Anomalam*, demum in rectam conformem, idoneam migrare.

Cum hujusmodi *Anomalias* iterum & sæpius est perpeffus, anno MDCCII. propter usum pomacei tenuis, acidique, immoderatum, incidit in *colicam*, dolore non tam acerbo, quam pertinaci, & constanti comitatam; umbilici regionem, sive potius illius portionem tantillulam indefinenter aggravantem. Ab hac *colica* spiritus animales multum & oppressi sunt. Crebra hinc suspiria, magna animi dejectio, magna corporis debilitas, *Στρέψος* auxit frigidorum

M

usus

usus imperitus, improspere; cardiacis potius, & calidis evincendo. Dum ex colica decedit ager, in articulis externis emicuit *Arthritis*; sed quæ, brevi intus se propiciens, vana spe decepit ejulantem.

Quando colica, binos circiter mens agrotaverat, & quidem adeo graviter, ut peiori loco res esse vix potuerat; id egi sedulo, ut quicquid alieni, quicquid cholerici (quo maxime se gravari renunciavit ager) ductu alimentari inclusum esset, quam citissime per anum ejiceretur: ea scilicet opinione fretus (quod ante dictum est) vanam & frustra, *Arthritidos* regularis in artubus excitandæ, spem & expectationem fore omnem; quandiu *Intestina* fuerint immunda, facibusque onerata. Quocirca præmissis, qui humorem evacuandum molliret, pratumque redderet exilio, Pulvere Alcalisato, mane multo Extracti Eustach. ℥ss. cum aq. cin. bōd. ℥ij. El. Salutis ℥℥. propinavi. Inanitis ex sententia visceribus, iisque, quæ viam obstruerent, amotis ipsum curationis apicem attentiavi; nempe ut *Arthritidis* materiam ab intestinis eruerem, & in artus propellerem. Quam in finem, omni mane, infusi cochl. v. cum Tinct. Martis gutt. xv. assumenda dedi.

M. Ras. Gent. ℥v. cacum. abs. Rom. ℥ij. cubeb. ℥j. coccinell. ℥j. infunde in Vini Xerani ℔ij. ad idoneam alterationem; sunc fiat colatura Hora quarta pom. Bolum, ex Pul. Rad. c. ℥j. Alcohol. Martis, conf. Abs. R. cort. exterioris Aurant. cond. ana ℥ss. Spec. Diatr. Piper. gr. iv. Syr. zz. q. Hora somni Bolum, ex Theriac. Andromach. ℥j. Alcohol. M. ℥ss. Pul. cantiani ℥ss. conf. alb. q. Porro Vini rubri Lusitanici, meo hortatu, ℔j. quotidie potavit, carnibus & πικρῆς, & χυμοῖς, est nutritus.

Ne multis hac & hujusmodi medicina, diligenter adhibita, dolor factus est *Articularis*: levatus is *Intestinarum*; & cum fere conclamatum esset, ægroti vita & salus in tuto posita: quibus, etiam nunc post quadriennium, illum uti, frui, nuper accepimus.

Colica Arthritica, Vomitu, Purgatione, Πονογαστρῶς extra missis Miasmate, sublata.

Æ Tate nostra Fullo Exoniensis, parte ortus *Arthritico*, etiam si adolescentiam vix egressus sæpe doluerat. Erat hujus viri *Arthritis* nunc anomala, fauces invadens, (de qua alibi sermonem faciemus;) magna vero ex parte Regularis. Exeunte anno MDCCI. pedem occupaverat; per triidui spatium tenuerat; cum, sine ulla ex 7 ἑξωθεν προκατῆρται evidenti causa, abscessam excepit nausea, & dolor *Intestinarum*, una cum anxietate animi, & pectoris gravitate.

Contra hunc affectum, Mannam & Salem catharticum, aqua Alfordensi soluta hausit; ea spe & opinione, ut humores alienos, dolorem excitantes, per anum eluendo, restitueretur. Eventus opinioni non respondit. Quare arcessitus, *Ventriculum* etiam quod a vomendi cupiditate palam erat, opprimi; neque nisi eo, per *Emeticum* prius purgato, colicam levare posse, monebam. Epoto cardui decocto (fuit enim ὀλίγη) biliosa multa ejecit. Eo vespere Pul. Gasconic. & Theriac. androm. ana ℥ss. demisit, cum julapii haustu cardiaci. Postero mane Podagra, pedis sinistri convexum, marginemque exteriorem invasit. Ex quo statim *Ventriculo*, & iis quæ intus sunt, bene. Dolor, anxietas, pectoris gravitas sublata sunt. Ut autem opus, tam feliciter inchoatum, medicina perficerem, chal. Nutriti ℥ss. Pul. Gascon. conf. Flor. Salvia ana ℥j. cum Syr. Garyophyl. q. s. ut f. Bolum, bis in die, cum Jul. haustu propinavi: ager hac methodo commodissime doluit, morbo gravissimo levatus est.

Arthritis ista primo Regularis, crudiatum, quæ in Visceribus constructæ & coactæ fuerant, illecebris attracta, colicam facit *arthriticam*; iis vero per catharsin expulsi, naturæ, & partim medicinæ viribus effectum est, ut in *arthritida* regularem illa denuo remigret.

Colica, una cum capite aggravato, Arthritica
plus semel allevata.

Iscanus artifex, ætatis anno trigesimo quarto, laboravit tertia jam vice pedibus, posthæc humero, cubito, carpo, per quadriennium, bis vel ter in annum: diversas *arthritide* commissuras attingente, pervagante; nunquam autem diu affligente. Mense Decembris MDCCI. pedum iste vir dolorem habuit, sed brevem, neque ulla biduum manentem. Abscissum eum excepit distentio *Ventriculi*, cibi fastidium, dyspepsia, vomitus, *Στροφοί* vermiculatio *Intestinorum*, & diarrhœa; quam insecta est suffocatio, tanquam hysterica; & a flatibus, κατὰ σωματικὰς capitis affectus.

Ista quando jam tres circiter menses, eosque hyemales, pertulerat, agrum visitavi; cumque humores in ductu alimentari præparantibus, & evacuantibus; materiam autem *arthriticam*, ei adhærescentem, in artus expellentibus, curari illum oportere reperi, iis suo loco utrisque usus sum: diem nempe unum alterumque *Pul. e chol. c. c.* quarta vel quinta quaque hora dedi; tunc catharticum e *Pul. Eustach. cum calom.* dein, neglecto post catharsin paregorico, *Ferrum præparatum*, una cum *Pul. prædicto*; usque donec *arthritidis* ad τὴν ἰκθὺς expulsa fuit. Quod ut præstium, confestim oculorum acies acuta facta, vigor restitutus: viscerum, & quæ intus sunt eorum omnium quærelæ desierunt. Ita quidem ægrotanti opem tuli, simulque, per materiæ in artus expressionem, hunc affectum utiliter auferri posse perspexi.

Annus agebatur, alter quam solebat, *arthritide* regulari penitus immunis, cum Mense Aprili, MDCCIII. eundem hominem flatus, ructus, nausea, præcordiorum distentio, dolor *Interaneorum*, præcipue τὸ ὤμφαλον, est adortus. Quibus sese comites adjunxerunt, ex necessitudine quadam, tanquam eadem stirpe oriundi, & ὁμογενεῖς, oculorum languor, & capitis gravitas. Hisce omnibus ut eatur obviam, primum venæ sectio, tum, per *Extract. Eustach. Syr. e Spina*, & *Elix. Salutis*, purgatio facta est: qua vincuntur imi ventris accidentia pleraque omnia. Posthæc *Pul. Gasconio*, *P. Rad. ari c. Ol. Junip. & cumini chym.* *Ther. androm. chal. Nutrito*, *Infuso amaro*, & istiusmodi aliis, *Intestina* roborantibus,

arthritidemque expellentibus; una cum *Emph. cerbal.* parti sæpissime dolenti admoto, & *Decocto* interea rubicundo potui dato, affectui gravissimo penitus succursus est.

HISTORIA VII.

Arthritis *Intestina atrocissime invadens*,
sæpissime expulsa.

Dicam viri nobilis historiam, a me non uno nomine prædicandi, omnium utique cultu & honore percolendi. Erat ille parentibus *arthriticis* procreatus; corporis habitudine tenera, spiritu animali emicante & elastico donatus: Unde sæpe numero tum improvise ægrotavit; tum etiam citius spe, & contra expectationem convaleuit. Amplo illi, & diviti male id obvenit, quod hæreditas, a longa majorum serie derivata, in tractu non nimium molli sita, aëre frigido, & magnam anni partem immiti, perflata esset: quæ quidem cœli solique inclementia dolorem *colicum*, atque adeo *arthriticum* domino, una cum multis aliis, inferre censeretur.

Ver erat, anni MDCLXXXIV. cum, nescio qua de causa, qui partes extremas solitus est extruciare dolor, ea jam cessante, intus incidit morbi vis, & sibi comitem adscivit pectoris gravitatem, tanquam ab onere imposito, permolestam. Erant tormenta *Interaneorum* peracuta, quæ ut allevarentur, *cathartici*, si Diis placet, & *Opiatis* nimio plus elaboratum est. Nam ex nimia *Purgatione* spiritus (per se agiles, & volatiles) ita perturbati, agitati, & quidem ita profligati sunt; ut jam orbatum somno & quiete, ægrotantem, vertigine mulctatum, menteque caput, vires plane deficerent.

Hoc modo laborantem, tum primum arcessitus, invisi: cumque, ex totius morbi, maxime vero ex gravi pectoris consideratione, appareret, eum esse *arthritidem anomalam*, medicina auctam; ut omnibus eius medendæ incitationibus simul semelque satis facerem, (id est, ut somnum conciliarem; ut vires rescicerem; ut *arthritidem*, ad τὰ ἰκθὺς, amolirer; itaque ægrum in ruto collocarem) *Pulveris cantiani*, dosim majusculam, exemplo deglutiendam, eaque nocte repetendam, dedi. Ex animi sententia res successit; somno enim recreatum, & tanquam vitæ denuo restitutum ægrumquæ perpeffus erat, eleganter enarrantem, mane

posero audiui. Ut autem therapiam perficerem, & humorum mutata inclinatione materiam alienam artubus infligerem, *Ferri præparatum* adhibui; quod paucorum dierum spatio, eam validissime extrudendo, pectoris gravitatem, *Intestinorum* dolorem omnino omnem evicit.

Hæc erat hujusce mali therapia. Quandocumque vero, in corpore delicato, multumque debilitato materia *arthritica*, nunc a frigore externo repulsa, nunc a cruditatibus in *Ventriculo* & alimentari fistula contentis, intus allecta, *colicam* hanc *arthriticam* identidem revocaret; quibus eam auxiliis, qua methodo, quo demum eventu recurrentem oppugnavi, hisce paucis accipe.

Menses aliquot agebantur, læti quidem & dolore expertes; cum ex fructibus *citricis* aliisque pravis avidè ingestis, & frigore eodem tempore contracto, redintegrata est *colica*: Facta vero, per *Decoctum fol. Tea* *arborescentis* per catharticum mite *rata* purgatione; datoque *Pulvere Testaceo*, & *Calibem arthritidem* expuli, regularem feci.

Cum aliis in eodem agrotate *arthritidem* meto frigore repelli, & *colicam* mentiri novèrim; non nisi purgatis primum *Intestinis*, adhibitoque tum demum *Diaphoretico*, in fugam mitti illam, externa solum causa factum, expertus sum. Materiam vero emittendæ nihil in hoc agroto melius conducere, aut votis respondere magis potuerat, quam *Pulvis* ille prædictus, qui larga (3j.) dosi, & quidem crebro (tertia nempe quaque hora) demissus, dolori *Intestinorum* allevando, partium extremarum illi movendo augendoque maximi sæpe fuit momenti, & efficacitatis.

Cum vero alias hæc invaluit *colica*, neque adversus eam *Vomitio*, *Purgatio*, *Pulveres Testacei*, ipsum *Martis Alcohol*, viribus junctis, vel nihilum profuere ad *Bacchum*, miserorum præsidem & consolatorem, *arthritidis* averruncum confugiens, ejus auxilio plane divino, materiam in artus commodum ablegavi.

Postremo addam, cum neque medicina, neque vinum huic agroto, eadem *colica* alias affecto, prodesset; languenti, & animam tantum non agenti; cum ruinosa conturbata, conclamata viderentur omnia, (quod quidem omnium expectationem vicit) opem ei, sed madido, sed bene poto, tulit *Phenigmus*; articulis dolori furis admodum, aliam fecit humorum inclinationem; ægrum manifestissime servavit remedium præsentissimum.

Ita quidem, multos annos *Θεός οὐδὲν παράμειπεν* viro illustri medicinam feci; & tamen, propter viscerum imbecillitatem, victus rationem non semper optimam; ne dicam ambulationem, equitationemque, quibus exercere se, & humores vitiosos extra pellere consuevit, intercisas; & prophylaxin omnem aut penitus omissam, aut indiligenter actam, *Intestinis* ii minima quavis de causa insunderentur: tamen ita factum est, ut in hujus *colicæ* accessionibus, & creberrimis & difficillimis, æger semper relevaretur; & quidem eatenus, ut non nisi consumptis & exhaustis viribus, nulla vero *arthritide* intus agente, supremum ille obiret diem.

HISTORIA VIII.

Colica Arthritica; cum superveniente Paralyfi.

MOrbus honestis & ingenio singulari vir, *arthritide* per viginti annos, autumno quoque altero, (is fuit illius hoc in agroto typus) laboravit. Loci, quem invasit, diversitas ea fuit; ut nunc dexterum, nunc sinistrum, nunc uno eodemque tempore pedem utrumque, sed dexterum maxime lacefferet.

Excipiendum autem est, per hosce annos, quod typum ea semel atque iterum mutavit; quod autumno illo altero deficiens, insultum mense Februario fecit. Quibus vero autumnis intermisit *arthritidis*, iis semper agrum adorta est *Epiplora*; qua ex oculis, per hebdomadas sex vel octo, serum acre & pungens emanavit; & quidem adeo perpetim & constanter, ut *arthritidis* vicem gerere, & ejus materiam secum ferre, non immerito crederetur.

Autumno Anni MDCCV. cum, in sanguine, & visceribus, sordes & illuviem, otio & satietate, contraxerat, crassior & obesior eo factus, *Dolore colico* corripiebatur; eoque, propter iter intempestivum, urgente frigore & imbribus, infirma valetudine susceptum, gravi demum molestoque cruciabatur. Interdum huic adjuncta est diarrhœa, qua cum alvus exonerata fuit, dolor remisit; ea vero sistente, recludit, una cum vomitione, nunc cholericæ, nunc pituitosæ. Urque mederetur æger, clysteribus, emetico, & purgante usus est; ex eoque mala ad tempus allevata, brevi autem ex novo frigore recidiva.

Cum

Cum ad ægrum arcefferem, & præter jam dicta in morbi res minutas inquirerem; (tales initio judicantur eæ, quæ facta indagine ad explicandam morbi naturam interdum maxime conducunt: (præcipue, quæ *arthritidos* esset conditio; quæque ad præsentem morbum ratio, quærenti patuit. Primum, *Dolorem colicum* esse τὰ περί τὸ ὀμφαλόν efficientem, iis coherentem; venito insuper *Intestinorum*, appetitu læso, oculorum languore, facile pallida, pulsudebili, stipatum: tum paulo ante *Podagram* fuisse pedis primum unius, deinde alterius; nunc autem talum, nunc pollicis metacardylon; eam invadere, sed edentulam, neque satis crudelem: Deinde, ægrum tabescere; vires ejus enervatas, & (quod præcipue notandum erat) partes externas non modo Διαιτησῆν, sed & calore sese privatas, ac si vitæ lampas extingueretur, multum frigescere.

Cum ista, maxime quatenus *arthritida* respicerent, animo perpenderam, *arthritidem* esse malum, ea quæ intus sunt, ingressam, & *Intestina* cruciantem, existimavi. Hoc in homine significavit *arthritico colica*, tam curatu difficilis: Hoc palam fecit ipsa tum temporis, etiam si mitis, in artubus *arthritidis*.

Quare id conatus sum, ut e visceribus hostis in artus excuteretur, & quidem iis, quæ sequuntur. Primo, *Catharsis* instituta est, per *Extr. Eustach. ʒ℞. Scam. pul. gr. v. Bals. Per qs.* eaque nocte *Paregoricum* cum *Bolo Cardiaco* datum est. Quando nausea alvi ductionem maneret, vomituque opus esse indicaret; *Emetico* levi, posseto nempe amaris alterato, is peractus, ea sublata est.

Catharsi præmissa, *arthritidi* protinus expellendæ memet accingo, compositionibus hincce usus.

ʒ℞. *Tberiac. Androm. Diascord. ana ʒj. Spec. Diamb. Flor. Salis Armon. ana ʒ℞. Chal. Nutriti gutt. v. Ol. Cin. Cb. gutt. j. Syr. Garyoph. qs. f. Bolus, nona vespertina, tertiaque matutina demittendus, cum Vini rubri Lusitanici tepescæcti, ʒiv.*

ʒ℞. *ZZ in Indiis Cond. Diascor. ana ʒj. Pul. Serp. Virg. ʒ℞. Chal. Nutrit. gr. v. Ol. e Sem. Anisi Cb. gutt. i. Pul. Macropip. gr. iij. Syr. Z. Z. q. s. f. Bolus hora nona matutina, tertiaque pomeridiana cum eodem vehiculo sumendus. Porro, Nycthemeri spatium, epota alia Vini prædicti ʒ℞. Emplastrum ex diascord. & Emplast. Stom. mag. ana*

paribus mensuris, cum Picis Burg. q. s. Ventri impositum est.

Horum usus, dies instar octo impenduntur: eoque factum est, ut pulsus, antea debilis & parvus, jam augeatur; & carni, antea subfrigida, laudabilis & naturalis æstus concilietur.

Roborato itaque cruore, ad mutandam humorum inclinationem, eamque ad τὰ Ἀρθρα usque vertendam *Phenigmonum* utriusque pedi calidissimum, eoque frigefacto, ad quatuor vel quinque vices, novum imperavi applicandum: posteaque malleolis ambo-
Vesicatorium. Hinc acre serum ulcusculis elicitum; hinc *Podagra*; hinc *Gonagra*; & pro eorum ratione τὸ Ἐντοθίον indolentia. Qua utique animadversa re, medicamenta, sed paulatim, minuimus; nunc eorum doses extenuando, nunc assumendi tempora extrahendo.

Interea vero; sorbitiones; ex *Jusculo Pul- lino, Avenaceo, ex Chocolata*, & ejusmodi cum tenuibus, tum *Analeptics*; sæpius in die, sed modice demittuntur. Carnes etiam σόχομαι & εὐπεπτοι quam primum per stomachum liceat, apponuntur. Pedis sinistri calcem, dextri astragalum, utriusque hallum occupavit *Podagra*; rediit vero cum ea fames, & concoctio; rediit oculorum acies; animi alacritas; spirituum robur, & ovatio; aliaque vitæ & salutis indicia.

Cum ita res salva esse videretur & omnium opinione in portu navigaremus; alter ecce turbo exoritur, quo in procellosum mare rursus abripimur.

Podagra, laudabilis & invidenda, (ad quam accessit *Chiragra*, ejusdem generis) æstu mordaci, eum stragulis æger coopertus incalcesceret, eum noctu affecit, qui tamen per sudorem, brevi temporis spatio, magno cum ægri fructu, solitus est abire. Hujus æstus, rosionis hujus impatiens ille, ut eam vitaret, raro se in lectum commisit; cathedra totas fere noctes, hyeme frigidissima, consumpsit. Perspiratione multum hinc diminuta retunditur appetitus brachia τὰ ἀνωτέρω & nisi opportune miasma *arthriticum* e corpore fuisset emissum de-
agre procul dubio actum esset, lecto ei denique affixo, diaphoreticis motum, aqua *Bathoniensis* famem restitui. Post menses quinque tristes sane & dubios, summo vitæ periculo liberatus, æger, dicta methodo, (favente vere, Deo consilia nostra fortunante,) convaleuit; Excepto, quod digiti vehementer resoluti, quamvis iis multum pro

pro

profuit balneatio, ad consuetudinem suam autumnino sequente, quo hæc scribo, minime redierant. Scripsit enim & quidem pristino caractere, lectuque facili; sed litteras vacillantes, neque semper ex æquo ductas: Cætera belle se habuit, & quam morbo primum ineunte, longe melius.

C A P U T IV.

De Diarrhœa Arthritica.

ART. I. **C**olicam prædictam sequitur ejusdem numeri *Diarrhœa*; naturam habens, & curationem postulans, quodammodo privatam. Diximus, *arthriticum* in sanguine miasma, αἷσι φθαρμένον, fere perpetuo renovari, & certo quodam temporis spatio repullulare: Diximus, adauctum & evectum in *Intestina* sæpe mitti. Hisce positis, advertere licebit, nonnunquam pancreati, & glandulis *Intestinorum fragiformibus* (a Clariss. (1) *Lislero* primum, uti verisimile, detectis; a Clariss. (2) *Peyero* plenissime descriptis) illud infundi; atque hinc in cavum *Intestinorum* a natura pelli; & demum, urgente ejus acrimonia, spiritusque animales stimulante, crebris dejectionibus e corpore exterminari.

II. Hanc autem *Diarrhœam* esse revera *arthriticam* si symptomata, tum ea, quæ intercidunt, tum quæ alia ex aliis, insigni profecto ordine, emergunt, accurate, & suis ponderibus diligenter examinemus; per ea satis superque declaratum est. Quis enim, quotiescunque veteri *arthritico*, mediis in doloribus versato ex causa aliqua evidenti, materiam in *Intestina* derivante, accidit *Diarrhœa*, eamque statim excipit doloris, & tumoris externi diminutio; postea vero libertas ab *arthritide* diutior: quis, inquam, inficiabitur, hanc *arthritidem*, initio rectam, *Intestina* jam petere perque alvum effugere, id est *Diarrhœam* illam esse *arthriticam*?

Ita certe, *arthritico* dolenti quæ hujusmodi obvenit, *Diarrhœa* est plane *arthritica*: Quæ dolore communi contingit, & materiam, adhuc in sanguine latentem, sed in artus abituram, manifeste alio divertit,

perque *Intestina* exprimit; quamvis argumento fortasse minori, certe tamen satis valido, & firmo, non alia, quam *arthritica* est habenda.

III. Hic affectus, si consideremus ejus indolem, & causam continentem, est tantummodo unus; quippe qui *Arthritidos*, per *Intestinorum* excernicula, perque dejectiones, quam ex consuetudine, frequentiores, fugam comprehendat, oculisque semper objiciat. Si vero illius initia, sique exitus varios evolvamus, longe a se diversus est: Miasma in sanguine *arthriticum* nunc a natura directe, & quidem eo nomine quod ingravescat deorlum pellitur; atque illiusmodi fluor paroxysmos interdum *arthriticos* antevergens, salutaris esse reperitur. Expulso etenim inimico, clauduntur januæ; pax, & quies restituitur; viget œconomia. Hoc autem in corporibus ἀσπαργχοις, id est, fibris robustioribus, firmis spiritibus donatis. Sæpius autem multo, vel assumpto *Cathartico*, vel a cruditatibus, *Intestina* irritantibus, *Ventrem* aperientibus, miasma illud e sanguine elicitur, & una cum illuvie *Intestinorum*, ano expellitur.

Hujusmodi *Diarrhœa* incerti admodum eventus est; si enim tempori cohibeatur, neque modum excedat, utilis sæpe invenitur; & quidem *arthritidis* materiam, etiam si via non usitatissima, tamen tuta emittere: Cui isthuc consequens, quod paroxysmus non nisi diu post recurrit *arthriticus*. At in iis, quorum *Viscera* satietate crapulaque sunt debilitata, cum natura *Ventris* impetum comprimere, crisisque legem imponere nequit; *Diarrhœa* nimium pertinaci, minimeque tolerabili, illa identidem opprimitur. Non tantum inimicus, verum etiam amici, spiritus scilicet ipsi; vigiles & præsidēs salutis, in exilium mittuntur: œconomix subversio est, & plane παρολεθρία.

Hujus utriusque casus exempla mox in medium vocabo.

IV. Therapiam hisce casibus ut accommodem, in *Diarrhœa* ista *arthritica*, quæ in sanguine initium habet, nihil inepra sedulitate stultius, dicam, an periculosius; quæ, pharmacis perperam ingestis, naturæ opus sæpe interturbet, interdum abruptat. Suo potius arbitrio ea, patiaris, agat; quodquo intus

(1) Vide *Acta Philosophica* Londinensia N. 95.

(2) Vide Clarissim. *Peyeri Parerga Anatomica*.

intus laesurum erat, suo utiliter ingenio effundat; Si vero *Diarrhoea*, nimirum excurrat, viresque excedat, adstringentibus sistenda est; cardiacis æger roborandus. Sive per se desit *Diarrhoea*, sive per medicinam, eius reliquæ *Aquis Purgantibus*, *Tartaro laxante*, & *Manna* (si opus fuerit) adjectis, post tempus aliquod egerendæ sunt.

Sin a *Cathartico* accidat ista *Diarrhoea*, similiter, atque casu præcedenti, parum utilis medicina; de *Τριπναδάριον*, tantum cautio sit.

In *Diarrhoea arthritica* cruditatibus exorta, quæ omnium mihi periculosissima videtur, alia res est: Hic, *Ventriculus* sæpissime aggravatur; ideoque, si ita sit, *Decocto Teæ*, vel *Cardui*, movendus. Postea, (sive vomitu neglecto,) venter leni *Cathartico* subducendus: tunc ad *Adstringentia*, & *Fluorem cohibentia* festinandum. *Bolus ex Diascord. Spec. Conf. de Hyac. Croco Martis astr. Terra Japonica*, *Syr. de Ros. f. quarta*, quinta, vel sexta quaque hora demittatur, cum *Julapii Cretacei* *Hauslu*. In *Alvum* detur *Enema*, ex *Vino Canarino*, cum *Gelatina Amyli*, vel *Diascordio*: *Ventri* admoveantur *Laneæ*, *Decoct. Rad. Bistort. Tormentill. Balaust. &c. Cerevisia* generosiori facta, immersa; & sæpius repetantur. Potioni sit *Infusum Ros. Rubr.* vel *Decoct. album*: Et ad vires instaurandas, *Vinum rubrum ustulatum*.

Si pulsus sinet, optime conducet *Opiatum*, *Laudani* puta guttas aliquot, vel potius *Opii* quasi granum, cum *Theriac. Androm.* ʒʒ. ʒij. dari.

Si periculum est, in *Dysenteriam* ne transeat *Diarrhoea*, sumatur *Emulsum* sequens.

ʒʒ. C. C. C. ʒʒ. G. *Arab. Tragac. ana* ʒij. coq. in aq. *Oryzæ* tertia *Decoctionis* ʒiiij. ad ʒij. *Colatura Amygd. d. cortice nudatis*, & *Sem. Pap. albi* inter contundendum affundatur; iterum colata, aqua *Cinfort.* aromatizetur; *Saccharo* dulcetur.

Quæcunque vero vomitum & purgationem excitent, ea non, nisi caute, in usum trahenda; ne, quæ auxilio esse debuerant; ægroto imbecilli graviterque laboranti obsint. Quod quidem in monitis ideo præcipue a nobis positum est; quoniam hujusmodi laborantes, fluore multum enervati & depressi catharsi tolerandæ sæpe impares inveniantur: quo quidem in casu, *Cardiacis* & *Adstringentibus* solis utendum est.

Cujuscunque demum originis sit *Diarrhoea*

prædicta, *Prophylaxis* optime per *aquas fer-ratas*, & quidem jucundissime, patrata est: quibus addi potest, ut in artus eructatio fiat materiæ, & *Ferro præparatum* aliquod; omnium autem optimum id quo *Alcohol Martis* appellavi.

HISTORIA I.

Diarrhoea Arthritica crebra & salutaris.

MATRONA quædam, in regione civitatis septentrionali, multos annos *arthritide* per vices ægrotavit; initio vaga, deinde fixa; nunc recta, & idonea, nunc anomala. Primum gutture, tum manu dolentem; *Angina* primum *arthritica*, tum *Chiragra* laborantem, invasit aliquando *Diarrhoea*: de qua, ut illam supprimerem, cum arcesceret; ejus de vehementia frequentiaque percantanti, mihi narratum est, neque tam urgentem, ut quæ non possit tolerari; nec quidem aliameffe eam, quam quæ commode & utiliter possit; pariterque, alvo soluta, paroxysmumque finiente regularem, non sine ingenti fructu, ægram iterum & sæpius fuisse.

Quæ cum ita esse acceperim; vitæ hinc, quæ *Diarrhoeam* intenderent; illinc autem maxime, quæ contraherent; in eo operam navavi, ut ægra mediocritatem, multo usu comprobata, probatione multa commendata teneret; ipsamque naturæ, *Medicorum Principis* in sanando methodum, omnino persequeretur. Nec quidem minus aliquid, imo majus eo factum esse arbitror; quam si inutili, ne dicam ancipiti plane, *τρίπυρα*, corrasis usquequaque medicamentis, multaque arte compositis, ægra, tanquam corbita, oneraretur.

Hoc autem, in tempestivæ illius negligentia laudem, addi insuper oportebit; quod, tametsi ægra sæpius ex eo tempore desedit *arthritide*, eaque semper in *Diarrhoeam* desinente, perque alvum exeunte; nihil illa damni propterea tulerit, lucri vero permultum. Cujus quidem rei causâ nescio an ulla probabilior excogitari possit, quam quod ægra, spiritibus firmis, constantibus, ad munera sua obeunda paratissimis, (qui nempe tum malum civem prompte expellant, tum eo expulso foribus occludendis subito invigilent) donaretur. Rara autem hæc *arthritide* cō τῷς Ἐπίποις ægrotantibus felicitas, quorum pars maxima, alvo vel liquida nimis, vel nimis dura, esse observatur.

vatur. Agra, post sex hebdomadas ab *arthritide* triformi immunis, sanior & vegetior evasit.

Historia tradit, ex una eademque *Febre*, ad amolendum mialma *arthriticum* suscitata, diversis posse illud deponi locis, perque diversa excernicula proturbari; nempe per glandulas oris *Salivares*, per artuum *Mucilaginosas*, perque *Intestinarum Fragiformes*; & cum *arthritide* regulari, *Diarrhoeam* esse posse simul *arthriticam*, eamque salutare.

HISTORIA II.

Diarrhoeam ex Cathartico, Arthritica opportune suppressa.

Aliam novi generosam, lectissima, cultu & honore profecto dignissimam; quæ, cum marito juncta esset *arthritico*, ipsa etiam cito laborare cœpit. Cubitos, humeros, hos illos in manibus articulos habuit affictos. In cubiti dextri extremitate tofus erat, a durato steatmate, juglandi par: digitus ejusdem manus longissimus, tofis distentus, motu privatus. Articulaamenta, præcipue medium ejusdem digiti infarctum. Malleolus itenr, pedis plantæ, calcis tendo, & genua laborarunt. Paroxysmi solebant esse gravissimi, dolore multo comitati, mensem integrum, interdum etiam alterum, permanentes.

Nuper autem, cum per hosce sex menses urgeret ægrotatio quædam, torpor videlicet, inertia, una cum vertigine, visu oculi dextri imminuto, dolore ejus, ut & universi corporis externi molestissimo, appetitu depresso, (quæ quidem omnia, neque satis fixe, neque satis recte *arthritidos*, erant accidentia) sumpto, nescio cuius hortatu, cathartico, sed neque eo fortiori, aut elaterio; vomitu illa, & *Diarrhoea* materię viridis præcipitante, corripiebatur; sic ut sex dierum spatio sexagesies minimum deiceret. Sordium hæc *arthriticarum* erat per ventrem evacuatio copiosa, neque ex omni parte inepta. Nam symptomata hinc collapsa sunt, & evanere omnia. Digitorum tumores, ob *arthritida παροξύνουσαν* eo tempore magni, sublevere: quæque ab ista *Diarrhoea* fluxerunt incommoda, lucro & compendio eam consequenti, facile cedebant. Ab effusis hisce purgamentis, corpus liberum, & ad tempus aliquod inco-

Hoc pene totum naturæ opus, unum artis erat, *Diarrhoea* nimium ne excurrat, curare, & ægræ vires sustentare. Hoc ego propositum, hanc metam spectans, nihil aliud, quam astringens & cardiacum aliquid, præcepi; illud autem opportune adhibitum, languenti, debilitatæ, pulsus humilem & imbecillum habenti, alvum compressit, vires instauravit.

Habet exemplum *arthritidos* (catharticos viam monstrante) in fugam se per *Anum* conjicientis; *Diarrhoea* habes *arthritice* curationem.

HISTORIA IH.

Arthritis Vaga Intestina occupans, solo Externorum usū evocata est, & Artubus affixa.

Duodeviginti annorum adolescens, patre inde ab incunabulis *arthritico* natus, artuum habuit dolores; a longo tempore vagos, & ut amicorum opinio tulit; *Rheumaticos*; cum tumore albo, submolli, articulorum intervalla sæpissime, ipsos etiam articulos aliquando infestante. Sanguini, quem identidem & copiose detraxi, cutis usque crassa & densa, brevi semper innatavit. Ut eius dyscrasiam auferat, æstate anni MDCCV. hortatu nostro, varia periclitatus est æger; *Succum* nempe *Taraxaci* & *Cocledrie* depuratum, cum *Hordei*, *Rad. Gram. C. Fœnic. d. Asparagi* Decocto; *CrySTALLUM* item *Minerale*, *Chalybeata*; suoque loco *Lacticia*, & aq. *Bathoniensis*. Ex quibus omnibus utilitates & fructu capitali quando multos, observantiæ pares: intermisit dictus ille *Rheumatismus*.

At post sesquiannum, cum æger sanguinem, uti par erat, minime correxerat, *Intestinarum* tormina, cruciatus subiit immanes, *Diarrhoeam* pertinacem, neque medicinæ facile cessuram: unde enervatus, multumque debilitatus æger, neque morbum diutius, neque remedia ferre posse videbatur; sed in ipsa mortis propinquitate versari.

In hoc ancipiti & pene deplorato statu, morbi naturam plane *arthriticam* animo advertens, methodo, quam in *arthritide Intestinarum Anomala* interdum non infelicitè adhibueram, uti animus fuit. Neglectis scilicet medicamentis, quibus ore sumendis impar erat ægrotus, externis incumbere. Ideoque iis utriusque brachii locis,

eis, quos exercuciare solita est *arthritis*, e *Fermento veteri*, &c. *Phænigmos* iussi calidissimos applicari, & cum refrixerint iterari; donec oborti fuerint tumores, iis, qui a *Rheumatismo* credebantur esse, persimiles. Tumoribus his, ex voto factis, admovi epispastica: unde ichor, ad hebdomades aliquot, jugiter effluxit.

Quantum hinc utilitatis, quæ commoda, quam subita curatio, capi vix potest. Quo tumor est eversus pari certe cum eo passu sublata tormina; suppressa *Diarrhœa*: quinimo novatur appetitus, restituuntur vires. Aegroti status, sive viscera, sive artus spectemus, omni dolore paulo post immunis, quam per annos aliquot antea cætos sanior, & quidem multo jucundior evasit.

En *Arthritidem*, artus pervagari solitam, *Intestinis* adhærescentem; cum torminibus, *Diarrhœam* inducentem, solo externorum usu ad τὰ ἰσχυρὰ evocatam.

HISTORIA IV.

Cruditatibus exorta Diarrhœa Arthritica, Medicine viribus inhibita.

Vir amplissimus, antiqua *Damnonii* nobilitate natus, *Podagra* utroque stemmate derivata confictatus, ejus impetum bis vel ter in annum constanter est perpessus, Ad hospitem tam certam, tam fideliem, pro utriusque ingenio accipiendam, mundum ille *arthriticum*, comptum adeo ac elegantem, in promptu, apparatus habuit, ut, e *Ποδαγρίῳ* natione magna & lauta, raro ullus unquam magis.

Annos ille permultos hunc in modum (id est, duriter) exegit; cum ad tuendam concoctionem opera, diligentiaque, quam omni vere & autumnus, per catharsin, &c. ponere solebat, penitus omissa, vitæ acta nimis sedentaria; primum, plane conticuit *arthritis*; neque more suo, in extremis partibus eluxit; mox, in *Ventriculo* & *Intestinis*, sordium massa collecta, compressa est. Hinc *Ἀπορίη* ructus sæpe impuri sapor ingratus, a pastu ventriculi gravitas, præcordiorum distentio; hinc oscitatio creberrima (symptoma *arthritidis*, in visceribus latentis, huic ægroto familiare;) dolor a statulateralis, pungens: illarum videlicet imparitatum indicia. Hæc subsequitur *Diarrhœa*, qua tum illæ, tum quæ *Visceribus* adhæserunt *arthritica*, per anum exprimuntur.

Sydenham Opera Med. Tom. II.

Cum autem ista *Diarrhœa* neque naturæ rebus, nec ægroti votis responderet; per *Decoctum Tæ*, ventriculum; per *Rhabarb. Infusum*, addito *Salutis Elixir*, *Interanea* purgavi; itaque facta, quanta opus erat, evacuatione, per *Diascordium*, per *Crocum Martis*, & ejusmodi alia, *Ventrem* cohibui. Aqua, sed cocta, & vino mista, potui daretur; cibi, sed solidi & intus mansuri, paululum caperetur, in præceptis posui. Ut autem appetitum languentem, & prostratum excitem, ut *arthritica* sanguinis recrementa ad τὰ ἰσχυρὰ propellam; & in artubus, uti moris erat, deponi faciam; aquas *Bathonienses* omni mane hauriendas, *Bolum* & *Pul. Rad. Ari C. Conc. fior. Salvie*, *Chal. Nutrito. Symploque Garyoph. cum Vini haustu dimittendum* præcipio: itaque in viam *arthritide* reduxi, ægrum τὰ *ἔντονα* restitui.

Diarrhœam, cruditatibus exortam, miasma, *arthriticum* ad τὰ *ἔντονα* invitantem, perque anum effundentem, arte curatam, exhibet historia.

HISTORIA V.

Diarrhœa Arthritica lethalis.

Dominus C. tum *Cereris*, tum *Bacchi* cultor egregius, *Arthritidem*, non uno nomine hæreditariam, malis moribus, victu autem inordinato maxime, auxit & exasperavit. Ab ineunte pueritia minime temperatus, adolescentiam vix ingressus, cacoehymæ factus est *Arthritica* gurgēs, neque tam affectu isto tentari, quam ab eo occupari diceretur; anni enim vix dimidium vacavit.

Cum ita materia gravaretur *Arthritica*, eaque de causa in statu esset dubio; casus intervenit, qui exitum ægrotanti fecit non minus severum & tristem, quam improvissum & inopinatum. Ea fuit tempestas, quæ fructibus *ἁπλοῖς* cœpit abundare: hos ita devoravit, præcipue (quod maxime appetiit) fragum, ut diu nihil aliud esculenti capessiverit. Vini autem loco, quod τὸν *ἁπλοῦς* frigidum mitigare debuerat, lac, vel aqua fontana erat, saccharo dulcorata.

Gulæ tam insolitæ post impensam circiter hebdomadam, *Diarrhœa* immani æger est correptus; quæ non solum massam *Ventriculo* & *Intestinis* inclusam; verum etiam *arthriticam*, in sanguine contentam, & exilio paratam, ano ejicere jure merito cen-

N

sea-

featur. A dejectionibus ita crebris & immodicis, vires adeo prostratae sunt & pessumdatae, ut agri res (iis, quae opportune data auxilio esse potuerat, neglectis,) statim in pejus ire cernerentur. Primum enim, pulsu debili, deinde sensu communi vacillante; tum motibus convulsivis, & deliquiis atrocissimis, & brevi tempore revertentibus est oppressus.

Ita quidem aegrotans, qui, dum *Arthritis* impetus fecerat, idoneos, etsi vitam non beatissimam, at non temnendam, innotutam egit; *Diarrhoea* (quam quidem solitariam, & *Arthritidi* minime conjunctam, tutius & melius, si non *capere* subire valuerat) hac exorta, illico una cum morbo, vitam effudit.

HISTORIA VI.

Aliud Exemplum Aegroti Diarrhoea Arthritica occurrentis.

HUic consimilis est historia viri, apud *Damnonios* olim notissimi, quae, quantis in angustiis, qualique discrimine versetur ii, qui fluore alvi laborant *Arthritici*, luculenter explicat. Fuit ille aetate integra laxo & obeso corpore, alvo (quod habitioribus solebat) plerumque liquida. Inordinata victus ratione, quicquid occurrit avidè ingerendo, vomitus effluos, & *Diarrhoeam* arcessivit; quodque temere dimisit, statim ore, vel brevi temporis spatio ventre reddidit. Hoc etiam modo *Arthritidis* paroxysmos quibus in singulos annos affligi solebat, regularibus & idoneis, (eius scilicet materiam ad *Intestina* sollicitando, *Diarrhoea* fere perpetua per anum expellendo) ingruentes abscidit, plus biennium aspulerat; neque ad fastidium aliquod notabile, & observatu dignum, unquam, eo tempore toto evehi permiserat. Prostratus appetitus ciborum omne genus fastidium erat; caro absumpta, cutis flaccescens, languentes oculi, faciei macror, quasi ab aurigine, flavescent, urina exigua, & colore rubro, suspiria crebra, animi dejectio miserabilis, pulsus debilis & celer, sitis importuna. Quibus animadversis, non hæc ab una *Intestinalium* imbecillitate (tamen illum esse non negaverim,) aut natura quasi confecta; sed ab aggravata potius, & *arthritide anomala* agente oppressa, oriri contendebam; ideoque *arthritidem*, deviam & palantem, ad externas partes, ad artus

expellendam. Cui quidem opinioni cum Medicus aegri ordinarius, & *Συνεργός* meus est astipulatus, primum ut sordium massa, quae *Ventriculo* onerosa, *arthritidem* eo loci detinere visa est, dimoveretur, *Emeticum* dedi: *Decoctum* nempe *Carui*, cum *Vino Lusitanico*, *Aegroti imbecillitatem*, admisso. *Phlegma* ejectum est, cum *Σπέρμα* copiosum. Nullum eo vespere paregoricum. Postremo mane, respiratio liberior, vigor oculorum vegetior, major animi alacritas, & quod desideratissimum, en etiam manus & pedis dolor, tumor, rubor *Arthriticus*: Qui, in statu tam lubrico, ut augeatur, *Bolas* ex *Ther. Androm. Croco M. astring. Pul. a Chel. C. C. Syr. de Ros. f. quarta quaque hora sumitur, simul cum Vini rubri praedicti haustu*; cui *Tinct. Martis nutriti gutt. xx. sunt adjecta*. *Sp. C. C. Succinatus* subinde datur, & *Potui Vinum, Aqua Fontana cocta dilutum*. Quinimo, ut quem auspicato nati sumus, eundem caute & diligenter locum tueamur, *Phenigonos* (e *Seminibus Sinapios, Raf. Rasb. Sylv. aa. p. j. Fermenti vet. p. iij. Aceti vini albi q. f.*) tumoribus *arthriticis* calidos admoveri, & quam primum refrixerint, iterari praecipimus, donec in molem illi majorem eleventur. Aucta hoc modo utraque inflammatione, ad evocandum illius serum, & materiam simul *arthriticam Epispastica* super eam imposuimus, quibus ichoris salis vitiosque librae minimum duae, spatio quadridui, sunt elicitae. Pallidior hinc paulatim urina, & ab *arthritides* quies.

Finito paroxysmo, ad instaurandam constitutionem, & robur *Interaneorum* confirmandum, socia opera primo *Lene Catharticum*, deinde *Chal. Nutritum* adhibuimus. Dietam omne quantitate & qualitate aptis accommodavimus.

Quamdiu *κατά μέρος* egit, monitis & praecipis his obtemperatus aeger, tulit observantiae fructum. Cibum avidè satis appetiit, tenuit, digessit; raro, neque nisi laudabiliter dejecit: integra & tuta videbantur omnia. Ante vero, quam vires, nupera tempestate labefactatas, refarcire valuerat, suo se iterum more gerens, & genio indulgens, *Diarrhoea* subito recidiva, motibus convulsivis, &c. stipata, paucarum horarum spatio est surreptus.

CAPUT V.

De Dysenteria Arthritica.

ART. I. **Q**Uæ tormina, qui *Intestinorum* cruciatus, graves utique & terribiles, ex *Arthritica* materia illorum tunicis impacta oriuntur, in superioribus tractatum est. Tenemus, & ultra, & utrum hæc tantummodo, an etiam alia; an his majora miseros mortales interdum non excrucient, & demum morti obijciant, serio expendamus. Quocirca, hoc Capite de *Dysenteria Arthritica*, & in sequenti de *Abscessu Intestinorum Arthritico* sermonem inferemus.

II. Et quidem hæc res inspicienti palam erit, acrem illa & virosam *Arthritidos* materiam, & causam continentem, qua dolores passim in corpore crudelissimi concitantur, qua membranae vellicantur, & exulcerantur, qua ipsa interdum ossa corumpuntur, & carie conficiuntur: *Intestina* etiam aliquando mordere: illius rosione perfodi, & exedi vasa eorum exilia: sicque fieri posse *Dysenteriam*, quam tradimus, *Arthriticam*. Verum, ut ab hujus morbi probabilitate, ad ejus *ὑπαρξιν* & experientia medica transeam, revera dari hunc affectum explorato constat. Ejus autem *αἶδος & ἴδιος*, quantum expiscando consequi valeo, tale est.

III. Gracili & tenero corpore *Podagrosos*, *Intestinis* præcipue teneris donatos, & *δυσπαλαιῶν* aggreditur. Præire solet dolor colicus, pariter *arthriticus*: & cum crebris ejus accessionibus læsæ & corruptæ sunt *Intestinorum* tunicae, debilitatæque flaccet eorum fibrae: miasma *arthriticum*, causa aliqua externa illud intro pellente, vel intus posita eo alliciente, in arterias, (*Cæliacæ* nempe *Intestinalis* ramum, & utranque *Mesenteridem*) *Intestina* irrigantes, *ἠδρῶς* infunditur. Hinc dolor *Intestinorum* mordax, erodens, cum pulsu celeri, & febricula quadam. Si eodem tempore externis partibus *arthritidis* insit, celerrime omnis evanescit; ad τὰ *ἔντερα* festinat. Vasis sanguine distentis, erosis, ruptis, in fistulam

demum alimentarem is exstillat; qui, in ejus cavo collectus, alvo, & interdum ore ejicitur. Emissi quantitas sæpe unius libræ, aliquando binarum pondo. Qui tantum, & humoris tam commodi dispendium excipiunt languores, ab eo cavernæ *Interaneorum* commisso magni sunt; ab expresso, & e corpore expulso, majores. Collabuntur vires, artus frigescunt, frequens est deliquium, plane in dubiu vita. Levantur ex hac evacuatione tormenta, & si æger insultus vim & ferociam tolerare valeat, (1) quies sequitur, & a paroxysmi impetu *arthritidis* ad tempus aliquod inducitur. Materia modo jam dicto per *Intestina* exulante aliena, non iterabitur insultus, donec in sanguine nova condatur, & coacervetur; quam autem primum illud fiet, tam in artubus citissime, vel *Interaneis*, iterum expectandus erit.

IV. Observatu facile est, ingenio & natura quam singulari sit hic affectus, & a *Dysenteris*, quotquot uspiam inveniantur, aliis, quam diversus. Quod ut pro certo habeatur, animadvertendum (præter istam τῶν *ἑντέρων* imbecillitatem, qua dirigitur sanguis, & in ea derivatur) ab una *Arthritidos* materia in sanguine contenta, affectum hunc, constanti norma & ratione manifesta, dependere: ab ea ebulliente, fieri: ab ea minuta, minui; neque nisi ab ea renovata, & in novum orgasmum excitante sanguinem, renovari: Quo quidem argumento, ad confirmandam morbi hujus *Ἀιτιολογίαν*, nihil gravius, nihil, ut opinor, validius asferri potest.

V. Ad hujus morbi exitum, sive prognosin, ut descendam; non semper ille missione sanguinis contentus unica; verum, e contrario, insultus sæpe repetens, *arthriticis* illos facit paroxysmis, si typos & utriusque frequentiam spectemus, respondentes & analogos. Ad hæc, vel prima vice, vel postea (secundum miasmatum *arthritici* in sanguine incrementum (recurrens, quando videlicet miasma in tunicis *Intestinorum* adhærescit, aut affigitur, & eas suo more mordet inficitque nunc in ulcus *Intestinorum*, nunc in abscessum degenerat, itaque notas illis inurit tristissimas, morbos incutit ærumnositissimos.

VI. Profluente sanguine, commodissimum

N 2

(1) *Dysenteria* solvi posse *Arthritidem* notavit olim *Hippocrates*, hisce verbis. *ἴστανται τῶν* (*Ποδαγρίωνται*) *ἀριστα*

μετ' Δυσεντερίαν *ὡς ἐπυγίνονται*. Sanantur (*Podagrosos*) optime *dysenteria*, si successerint. Prædictionum lib. 2. Sect. xv.

mum erit, ut æger conquiescant: ne, corpus nimium agitando; ne profluvium, supra quam ferri potest, intendendo, gravius ille luat: quare lecto; vel cathedræ se det, quam primum morbus ingruerit. Nefas autem habeatur ea, quæ cardiacorum titulo, ubique ad manus sunt matronis, (quæque sua, modo opportune propinentur, non earent utilitate (sic ingerere; ut, sanguinem accendendo, noxam magis augeant, quam ægrum levant. Cautè ista, neque largius adhibenda, quam ad spiritus reficiendos, & a deliquio sustinendos, opus esse invenietur. Contra, si profluvium *ῥογίας* excedat, *Laudano* illud comprimendum; ideoque linguæ super illinantur, ore teneantur illius guttæ aliquot, (quoniam demissæ vomitione reddi possint) donec cohibeatur. *Romanis* in curanda, quoties importuna fuit, *Dysenteria*, aquæ bene, frigida, potio in (1) usu erat; quippe quæ astringat, vulnusque sanet: & a (2) recentioribus, unde confirmentur illius in sanando vires, præclara multa referuntur: quorum authoritati innixus, *Decoctum album*, *Dysenteria* hac afflicta, non sine fructu & emolumento, sæpius præcepi. Oportet autem modice, sed crebro, laborantem forbere, & quidem eo, ad tempus aliquod, loco cibi potionisque omnis, solo uti.

Quibus curæ fuerit, ne *Intestina* nimium aperiantur, iis, etiam, ut ne astringantur nimium, aut præpropere claudantur, vitium nempe contrarium, est cavendum; & si corpus astrictum, leniter est solvendum. Est enim illa *Dysenteria* omnino critica, ex alterutra parte, sive major, sive minoræquo, vitiosa, cum mediocris optima. Et virium contemplatione debita, mediocritas illa tum intelligenda, tum item obtinenda.

Post breve temporis spatium expelli solet inimicus, & jam tum pacari & deliniri sanguis: quod si aliter eveniat, & sanguis pertinacius descendat; quæ eum sistant, & vulnus contrahant, expediet dari *Tinct.* puta *Japonicam*, *Decoct.* albo, vel *Traumatico instillatam*; vel *Balsamum Lucatelli*, cum *Olibano*, *Mastiche*, *Sanguine Draconis*, & *Croco Martis astringentis*, vel *Bolo vera*, forma *Pilulari*; vel cum *Conf. Fr. Cynosbat.* *Rosar. rubr.* per setaceum traject. *Spec. Conf.*

de *Hyacintho cum Syr. de Rosis siccis*, forma *Boli*, ex eodem vehiculo. *Tinctura Japonica*, solvendo *Terram* ejusdem nominis, sive *Gummi Catechu*, in spiritu vini rectificato, vitro probe clauso, igne arenæ conficitur. *Lanea*, decocto astringenti, cui adjectum est vinum rubrum, immersa, super ventrem imponantur.

Si prope anum vena dehiscat, ex *Gelatina amyli* vel ejusmodi *Κολλατικοῖς*, *Hemorrhagia* persistente, immittatur enema, & diutius retineatur. Interea vitentur, etsi astringant, acida; ne (propter eorum stimulum) major ex eorum usu damni metus sit, quam emolumenti spes. Cibus ex *Gelatina C. C. Eb.* aut pedum *Vetulinarum*: ex *Ovo tremulo* & *sorbili*; ex *Lacte*, cum *oryza* ei incocta; vel ex *Oryza Cremore*, & ejusmodi aliis, quæ simul nutriant, & incrassent, quæque vulnera conglutinent.

A therapia *Dysenteriae*, proprie sic dictæ, hanc *Arthritica Dysenteriae* therapiam multum abluere, quilibet harum rerum vel imperitissimus videbit: quando ista purgationem, eamque interdum repetendam, enixe postularet, & nisi illa esset, raro unquam perficeretur; hæc aut nunquam, aut certe petrato ventrem medicamentis solvi patietur.

Cum ad *Prophylaxin* accedas, nihil valentius, nihil ex omni parte fructuosius, quam *Aqua Turabrigenses*, sive *Bamtonenses*, vel istiusmodi ferratæ; quæ, satis diu recteque potæ, *Intestinarum* adyta ingrediantur, vulnera persanent, ulceribus medeantur, fibras constringant, tunicas corroborant: hæc porro humorem vitiosum per renes efficacissime avertunt, itaque *Intestine* maximopere defendunt. Hisce vero, ad mutandam humorum inclinationem, & deducendam in artus *Arthritidem*, non incommode adjiciantur, cum astringentibus, & *Ferro præparato*.

HI.

(1) Vide *Synopsin Discursum Magistri Vander Heyden*, *Impressum Londini, Anno*

1653. pag. 53. & quæ sequuntur.

(2) Vide *Celsum, Lib. 3. cap. xviii.*

HISTORIA I.

Tenesmum & Dysenteriam inferens Arthritidis omisso Externorum usu, lethalis.

QUUM rure Anno MDCC. mense Majo, forte agerem ad *Iscanum* ostium, me consuluit septuagenarius *Arthriticus*; qui ita sæpe doluit articulis, & quidem vere tum nuper elapso, ut in rem esse arbitremur. Sub initium Aprilis, nescio qua de causa evidenti, (nisi hoc in numero ponenda, propter res domesticas, quæ illum mire exercuere, animi perturbatio) derelictis artubus, ea, quæ intus, invaluit *Arthritis*. Fames, antea naturalis, ab eo tempore multum imminuta, fere nulla: animales spiritus humiles & depressi. Vidimus, at non sine commiseratione vidimus agrum, in lecto jacentem, oculis concavis, & retractis, respiratione difficili, cibi omnis fastidio, nausea, ventriculi gravitate pene perpetua, *Ἀγρυπνία* etiam afflictum.

Malis hisce, circa eorum initia, vires & incrementum dedit. *Lac Amygdalinum*, pessimum omnium eduliorum, & alia istiusmodi frigida. Hæc ille interdum, noctu, demisit assatim; calida & cardiaca (ne videlicet dolorem moverent in articulis) cane pejus & angue, fugiens. Ab ipso victu confirmatum est cibi fastidium, cæterumque malorum agmen.

Puduit sane misertumque fuit ægroti, (hominis alias sapientis, & civili prudentia præclari) in tanti re momenti, in ipsius vitæ re, tam egregie hallucinati. Calidorum enim egentissimus, frigida calidis præposuit.

Malum indies aggravescens adduxit *Tenesmum*, & dein *Dysenteriam*: unde pejus omnia. Ut his occurrerem, primo *Theriac. Androm. & Diascord. ana ʒiſs. Julapii Cretacei haustu dedi; ex intervallis sæpius repetii. Potui dabatur ordinario Decoctum album.* Hinc alvus suppressa, dejectiones solidæ, & bene coloratæ.

Hæc vero inducias, quando parum fidas esse suspicarer; nisi etiam *Arthritis*, quæ τὰ Ἐντὶς jam ipsis nutriculis aggravare visa est, ἀπὸ τὰ Ἀρθρὰ extruderetur; cum in fine *Podagragoga* interna (nempe ex *Rad. Serp. Virg. Pul. Cantiano, Lapide Contrayerva, Conf. Alk. Bolum*) præcepi, cum istiusmodi aliis. Quorum beneficio maleoli, & ad genu usque; carpi, & ad cu-

bitum usque dolor, quaque ratione proportionemque doluerunt artus, liberata sunt *Intestina*. Erat autem adhuc pectus aggravatum; erat, tanquam a cingulo, strictum abdomen.

Ne vero hisce remediis, sanguinem exagitantibus, in ægroto *Dysenterico*, nimium insisterem; in *Arthritide* removenda, quantum operis maximum potueram, externis, *Arthritidem* educantibus, agere institui. Quocirca, pellem vervecinam, jam tum extractam, artubus applicari, in præceptis dedi.

Ille his gravatus, omnium, quæ dolorem excitarent, osor acerbissimus, eorum usum non admisit, non sine indignatione respuit; ut vel perire mallet, quam dolere. Neque salutis, neque ipsius vitæ consideratio, etiamsi ab amicis amantissime: proposita, studiose commendata, ut animum mutaret, vel hilum fecit. Retrocessit denuo *Arthritis*; & æger, viribus infractis, morbo dicam, an pertinacia? periit.

HISTORIA II.

Dysenteria Arthritica in Abscessum migrans.

DOCTRINÆ hujus ἀποτέλεσμα in superioribus traditæ, fidem conciliat agricola *Devoniensis*, antiquis moribus, & malo tantum habitu infelix. Fuit ille tener, gracilis, visceribus imbecillis, *Arthritide* primo per multos annos idonea, tum ἀνωμαλῶς *Intestina* simili frequentia immetente, aggravatus. Post ἀνωμαλῶς hujusmodi complures, (quibus sublevandis non incassum ei medicinam factitavi) per quas effectum est, ut ad *Intestina* citius & facilius diverteret *Arthritis*; tandem anno sæculi novissimi postremo, exeunte vere, *Arthritide* omni jam diu vacans, novum in morem ægotavit. Prægressa enim corporis plethora, vomitu, sanguinis & *Dysenteria* corripiebatur, adeo vehementi, ut brevi spatio libræ aliquot sanguinis ore & alvo redderentur, & æger animam agere videretur.

His angustiis versato, *Bolum astringentem* (ex *Conf. Ros. v. ʒi. Pul. G. Arab. ʒss. Sang. Draç. Boli vere ana gr. v. Syr. de Cymphyt. q. s.*) bis in die, cum *Julapii Cretacei Haustu sumendum*, præcepi. Potui datum est *Decoctum Album*, & in cibum *Pedes Virulini*. Ad sanguinem vero quam

quam citissime reprimendum & intra cancellos suos retinendum, *Laudani* aliquot liquidi guttæ, bis ter quaterve indie (modo postulatet hæmorrhagia, & vires ægri paterentur) reperenda. Id enim agendum arbitrabar, ut hæmorrhagiæ, quadam ex parte forsitan necessariæ, & huic ægroto salutari, modum ponerem, naturæ rebusconvenientem; nec quidem alienum egi; quandoquidem hac medendi via, ne lethalis ista, ne injuria esset, provitum est. Hisce difficultatibus liberato (qua vulnus sanaretur) *Tereb.* dedi *Vinetam*, forma pilulari, cum *Pul. Dialthææ*, bis in die sumendam, & quod superbiberet, *Julapium*.

Quando vero posthæc, propter restitutas ægri vires, sanguinem instauratum, & *Arthritidem* interruptam, pulsu ille magno, cibi fastidio, *Intestinorum* æstu immodico, doloreque pungenti, cum aliis mali hujus reversuri notis, urgeretur; brachio sanguinem detraxi; orgasmum ejus mitigavi; *Interancis* prospexi: utque pacem, quam eo natus sum modo, confirmarem, *Aquas Bamptonenses*, vivas & de fonte, per mensem biberet, imperavi. Paruit æger, adjecitque cuilibet aquarum selibræ, *Syr. Balsamici* ℥ss. & hora somni, *Balsami Gilead.* ʒss. ex ejusdem *Syrupi* cochl. deglutiit. Recte bibendo, medicamenta recte sumendo, recteque vitam instituendo, quantos ille progressus fecit, vel hinc conjicere liceret, quod fame & concoctione domum rediit laudabili, vultuque bene colorato. Vitæ res & salutis cætera, qualis sano: & incolumi solebat esse; & quam dudum, multo integrior.

Non dum annus effluxit, cum *Arthritide* pertinacius silente, nec in artubus unquam quidquam moliente, materia vero ejus (uti licet opinari) in sanguine congesto, eadem fere, atque nuper, *Intestinorum* accidentia, materiam eo loci denuo coire, manifeste ostenderunt: quæ quidem mala, methodo pene eadem, qua prius, erant sublata. Verum, ut tutelam ægro certam & diutinam præstarem, eum hoc admonui; ut de plenitudine sollicitum se haberet tanquam morbi hujus genitrice certissima, altrice paratissima.

Quæ cum ita præciperentur, vel ægri incuria, vel morbi magnitudine, & ad re-

nascendum propensione factum est; ut aliquoties, nec opinato, recurreret *Dysenteria*: Cujus accessiones cum iam quatuor aut quinque essent, exque omnes, ex intervallo anni quasi dimidii; (quo temporis spatio novam *Arthritidis* materiam pullulare credibile est,) *Dysenteria* tandem in *Abscessum* migravit, suo loco tractandum.

Observatu facile est, primum, ab hoc affectu, pristinis in ventriculo & intestinis *Arthritidos Anomalis* succedenti, licere nobis opinari, earum locum illum tenere, & quasi numerum explere: deinde quod cum omnes illæ *Anomalie* (qua in hac regione pristina, qua novæ & *Dysentericæ*) rectos & idoneos *Arthritidos* paroxysmos subsequantur, horum paroxysmorum illæ vicem gerant; nihilque aliud sint, quam *Arthritis*, commissa *Intestinis*, & illac exulans: cujus quidem rei argumentum, idque nostra sententia firmum est; quod deseruerit ægrum *Arthritis recta*, quo tempore, & qua portione occupavit eum *inversa*, sive *Anomala*; & quod *Arthritidi rectæ*, & *Anomalæ*, accessionum essent intervalla plane eadem; distantia par, quo nihil magis probare potest, affectus hosce, (si tantummodo vultus eorum intueamur) varios & diversos inter se, ab una eademque propagine derivari; eademque fieri materia, pari semper ratione nata, & quantum in se est, pari modo semper operante; sed, propter aliquod sibi externum, & locos novos ingrediente, & diverso in iis modo agente.

Huc quodammodo referri potest *Dysenteria*, quæ ad *Arthritidem* ex *Lue Venerea* generatam pertinet; cujus olim protulimus (1) exemplum, si placet, ad-eundum.

CA-

(1) Vide *Dissertationem* de Arthritide Symptomatica, cap. vii. Hist. iv.

CAPUT VI.

De Abscessu Intestinelum Arthritico.

ART. I. **A**bscessus sequitur *Intestinelum Arthriticus*; hic enim est naturæ ordo, quæ a *Dysenteria* ad *Abscessum* migrare, ut ab *Hæmoptoe* ad *Phthisin*, observatur. Alienum & virosum, & sanguinis sinu expelli, partibus a corde remotis & debilibus immitteri, tumoremque iis usitato inferre, passim experientia confirmatum est: ad *Abscessum* vero conficiendum proclive, & suapte sponte pronum esse virus *Arthriticum*, vel eo constat, quod in artubus is identidem cernatur; eorum articulos, post duras & iteratas accessiones, quibus materiæ multum illis illiditur, aggravans & extendens; sic, ut veteres *Arthriticos*, (quos omnium frequentissime morbus hic affligit) hac de causa claudos, eorumque pedes manus laqueis obvolutos sæpe tueamur.

II. Virus illud, *Intestinis* a sanguine commissum, in eorum tunicis nidulatur; fibras earum corrodit, exedit; spiritus iis inclusos extimulat, in spasmos adigit. Hinc calor interdum acris, pungens, lancinans, quem ut deliniat, & humoris acrimoniam diluat natura, non alio modo, quam in apostemate gingivarum ex dolore dentium, vel alio quovis apostemate, ex aliena & virulenta materia, seri copiam suffundit: Ex his humoribus hoc in loco depositis, conflatur & efficitur *Abscessus*, qui, serius citiusve, (pro ejus compositione, & calore innato, vel adventitio (maturatus, extensa primum, mox rupta, vel aperta, qua includitur, pellicula, Pus evomit. Quod utique, si natura copiose ejicitur, vel arte eximitur, ceteraque curatio recte procedit, ægroto commodum; proscripto malo cive, conciliatur incolumitas; purgato sanguine, salubritas: si vero latice nimis exiguo pus exprimitur, ægroto, propter retentum malum civem, difficultas; propter reliquias intus servatas, affectarum partium durties, & nonnunquam in gangranam degeneratio.

III. Causæ hujus tumoris manifesto binæ

sunt; quarum altera *Intestinelum Imbecillitas*, sive *Αἰτία*, quæ ad *Intestina* sanguinem invitat, eumque) prout leges volunt *Hydraulica*) facit inclinare. Hanc autem esse, ipsa morbi natura arguit; evincit id, quod hominibus vel ab incunabulis, vel malis moribus *Δυσπλάγχθυσις*, hic affectus sæpissime contingat. Altera, *Sanguinis Depuratio*, sive miasmatis *Arthritici* (secundum normam, a natura in alienis rebus exturbandis, observari solitam) expulsio: utque binæ istæ causæ se habent, & majores aut minores sunt; *Abscessus* inde orti accidentiæ, mores, conditione sint, necesse est.

IV. Magnus hic *Intestinelum Abscessus* esse solet, duarum, trium aliquando librarum materiæ capax; contra, quam qui vulgo sunt extremitatum: hi etenim sere parvi. Notandum etiam, nullam totius trunci partem magis, quam alimentariam fistulam, infestare: ut hæc illi regio gratissima; hæc sedes (1) principalis esse censeatur. Tertium, addi potest, (quod huic nostro *Abscessui*, pro ceteris sive artuum *arthriticis*, sive totius corporis *Abscessibus primigeniis*, primum & peculiare) esse eum creberrime, paucis post mensibus, recidivum. Hæc autem omnia causis modo dictis, alteri nempe vel utrique potentiori, sunt attribuenda.

Quo enim celerius *arthriticum* miasma in sanguine denuo condatur; quo frequentius natura conditum expellere, & e sanguine conetur in exilium ejicere; quo exulanti, & expulso ei recipiendo, propter imbecillitatem, proniora sint *Intestina*; eo hi illorum *Abscessus* majores; eo frequentiores, & qui repleantur aptiores sint, necesse est.

V. Si in *Ano* fuerit *Abscessus*, eadem prope curatio, ac in *Abscessu Ani* primigenio. Si in *Oesophago*, *Ventriculo*, vel *Intestinelum* aliquo; (quæ, extra sensum posita, ortum, & incrementum, vix unquam manifestum esse sinunt;) ante ruptam vomitum & pus evacuatum, ejus sæpe nulla, sive ægroto, sive Medico, vel minima incidit suspicio. *Abscessum* hisce locis oriturum una, quantum video, prædicit *Vomitio Sanguinis*, sive *Dysenteria*; quæ appellatur *arthritica*: qua prægressa, ejus prophylaxi

(1) Vide *Celsi* Lib. v. Cap. 28. §. 11.

laxi magnopere studendum : hæc enim adversus Vomitionem , adversus Dysenteriam , adversus Abscessum , erit utilissima .

Rupta autem vomica , in lectum se det ægrotans , vel minimum quieti , quoad poterit , indulgeat . Si copiose nimis , supra vel infra , pus emissum fuerit , Hypnotico moderanda evacuatio , minime sistenda , Laudano madesiant tempora , nares , lingua , donec cohibeatur , & ad *ὑποπρίαν* , ut ne videlicet eam excedat , redigatur . Puris autem diluendi , gradatim & partitis vicibus educendi , ulcerisque detergendi gratia , hujusmodi *Apozematis* , quarta , quinta , vel sexta quaque hora cyathus assumatur .

℞. Hordei mundari ℥℥. Rad. Symphyt. maj. ℥j. Cacus. Betonicæ , Saniculæ ana ℥ij. coq. in aq. font. ℔jij. ad ℥j. colaturæ adde Mellis Rosarum ℥ij. vel ℥jij. f. Apozema .

Julapium præsto sit cardiacum , aut Vinum aliquod generosum ; cujus , in languioribus summis , cochlearia aliquot hauriantur . Interea temporis (ut celsi verbis utar) Nihil facere oportet , quominus , quicquid est Puris , exeat .

Cum vomitus , & diarrhœa , & puris evacuatio desierint , ex usu erit *Tereb. a ℥℥. ad ℥j. cum Ovi Vitelli pondere æquali temperatum , vel Balf. Lucat. ℥℥. cum Myrrhæ pulv. q. s. in Pil. redact. bis in die , ex Apozematis haustu demitti .* Vitentur acida , vitentur acria , & quibus læsa pars exasperetur , quibus noxa augeatur , omnia . Ipsorum cardiacorum vitetur ea vis , quæ sanguinem nimis exagitet , & e foribus jam apertis eum eliminet . Eboris , c. c. Pedum Vitulinorum Gelatinis : *Hordeaceis , Avenaceis , Pullinis , Ovinis , Vitulinis , & ejusmodi sorbitionibus , vescatur æger .* Si alvus soluta nimis fuerit , potioni sit *Decoctum album : si dura nimis Hydromel .*

Prophylaxis , sive in Ano , sive intus sit Abscessus , aquis Diureticis optime perficitur ;

quibus adjici potest *Sal & crocus Martis , Myrrha , Terra Japonica , cum Syr. cydon. forma Pilulari .* His enim partes vulneratæ debilitatæque contrahuntur , & defenduntur ; quodque maximi est momenti , materia vitiosa per renes emittitur ; unde visceribus major , etsi non ubique certa , erit tutela . Conducet item *Vene sectio* , præsertim in corporibus plethoricis , sique nihil repugnaverit . Conducet *Ambulatio , Pedum , Frictio , & in aquam calidam immersio : Purgatio fugienda .*

VI. Unum huic Capiti , veluti coronida , subnectam . Veteres *arthritici os* non tantummodo colica , aliisque *Interansorum* morbis , (ut ante dictum) verum etiam morbis *ani arthriticis* identidem affligi , nonnunquam misere cruciari : maxime cum ætas exacta est , & vires jam imminutæ , ad miasma in artus expellendum minime satisfaciant . Ea morbi mutatione , in *ano* materia deponi *arthritica* , in eam infundi videtur : cujus utique rei argumentum hoc est ; quod quandiu *ani abscessu , Fistula ,* vel ejusmodi morbo aliquo gravi afficiantur homines hi *arthritici* , tam illi diu raro articulis ægrotent , ubi vero ea tollantur *ani vitia* , recurrat *arthritis* , (quod iterum & sæpius observavi) in extremis partibus *regularibus* .

VII. Hæc , & hujusmodi alia , cum ab *arthritide* fiant in visceribus , sexcenta mala , videre licet , quam apposite , quam belle sit a (1) Luciano , ex Erasmi Schmidii versione , de ea dictum .

HI.

(1) Σπλάγχων δ' ἐπ' αὐτῶν διάπυρον
ἀρίχην κακὴν
Δίηται φλογμῶν σάρκα πυρπολούμενον ,
Ὅποια κρητὴρ μεγὸς Αἰτνῆϊ πυρός ,
Ἡ Σικελὸς αὐλῶν ἀλιπέρι διασφάγος ,
Ὅπῃ δυσσεβέλια κυματῶμενος ,
Σύραξι πέτρῳ σκολιὸς αἰλᾷτε κλυδῶς .

Visceribusque in ipsis ignitum discurs-

vit Mālum ,
Verticibus Flammatarum Carnem ignis
more depascens ;
Veluti crater plenus Ætnæi ignis ,
Aut Siculus Canalis æquorei interstitii ,
Ubi confuse fluctuans ,
Ob fissuras petrarum , obliquus vol-
vitur assus .

*Abscessus Intestinatorum Arthriticus as-
spicatus sanatus, recurrendo
Letalis.*

Abscessum in visceribus, *Arthritica* fieri posse materia, probat agricola, prædio nudius tertius suburbano agens. Fuit ille corpore pertenui, *Διπλάγχιος*, annos *Arthritide* permultos, primum *Regulari* tantum, mox etiam *Anomala*, τὰ *Εἰσόδεια* premente, *Dysenteriam* inferente cruciatus.

Dysenterico ei medicinam, ex utriusque nostri sententia, iterum ac sæpius feci, duæloque prognostico a vulneratis multumque læsis & debilitatis *Intestinis*, uti etiam ex eo, quod illa jam frequentaret *Arthritis*; de *Abscessu* ægotantem, de eo, tanquam imminente & pertimescendo, monui. Nec quidem aliter evenit: namque elapso ab *Arthritidis* paroxysmo brevi spatio, cum jam repletum esset corpus, & dolerent, *Intestina*, (quæ duo accessiones itidem *Dysentericas* solebant antecedere) materiam, rupto in *Intestinis Abscessu* purulentam αἷμα & χυμὸν reddidit. *Vomitum* & *Diarrhæam*, ut ne violenta nimium urgeret, *Laudano* compescui; eorum sævitiam mitigavi. Finita puris *Evacuatione*, *Bolum astringentem* (ex *Conf. Bos. rubr. Croco Martis*, &c.) bis in die, *Pil. Balsamicas*, ex *Bals. Lucat. Pul. C. C. C. hora somni demittendas*, cum *Julapii* *Haustu* dedi. Pötui, quod dilueret puris acrimoniam, simulque reprimeret *diarrhæam*, *Decoct. Album tenue* dabatur, cibus, e *Jusculis* & *Gelatinis*, erat *Analeptibus*, porro, *Prophylaxeos* ergo, decem post diebus, omni mane, *Aqq. Bathoniensium* *ßii.* paululum tepesactas, hausit; singulis selibris adjiciendo *Vini Canarini* cochl. unum alterumve. Per *Elect. Lenientis* dosin, uti opus fuit, assumptam, alvi prævenit tarditatem.

Caro, color, vires ab hac methodo augmentur; sic, ut hyeme sequenti, menses inde post quatuor vel quinque, pedibus iterum doleret, & omni periculo liber esse prima facie videretur. Contra vero, ob ipsa hæc indicia salutis, (ita vulgo æstimantur) censenda erat hujusce ægri salus in dubio versari. Quandoquidem illa, tametsi quodam modo salutem, modo longe majori contrarium indicarent, & *Intestina* denuo gravari minarentur, de *Venæ sectione*, *Sydenham Opera Med. Tom. II.*

ut de *Intestinis* mihi curæ sat esset, delibetavi: vetuit corpus a natura tenerum: vetuit male constitutum: morbis multatum, atque adeo *Arthritidi* rectæ vix obeundæ pat.

Anni circiter dimidium erat, cum recurrebat acris ille & pungens *Intestinatorum* dolor, novum materię coitum ostendens. Subloquitur, paucis post diebus, puris tenuioris subalbidique, ad tres minimum libras, paucarum horarum spatio, per os; per annum excretio. Vires ægri statim collabuntur, & *Cardiacis* frustra, licet copiose datis, oppressis oculis obductum est θάνατος μὴναι νίψος.

Notatu dignum erat, *Arthritidem* ex quo *Intestina* primum est aggressa, nova illa sede adeo delectari, ut intra triennium sexies eam inviseret; & toties vel *Dysenteriam*, vel *Abscessum* eo loci faceret: *Visceribus* scil. a natura imbecillibus, & morbi crebris insultibus enervatis, depositum, immo infusum erat, expulsionem jam tum idoneum, *miasma Arthriticum*. Sed neque præteriti illud oportebit, quod, qua proportionem *Visceribus* inhæserit, ea usque *Arthritis* artubus pepercerit. Quinetiam observari potest, quod ab *Arthritidos* paroxysmis regularibus, per accessiones *Dysentericas* & *Abscessus* hosce *Intestinatorum*, magna ex parte defenderetur æger: quandoquidem hisce crebro revertentibus, illi tum rariores, tum etiam mitiores invenirentur: ut, tum *Arthritidos*, tum *Dysenterie*, tum etiam *Abscessus* causam continentem & conjunctam, eandem prorsus, nonnunquam artus, alias *Intestina*, sed alio alioque modo infestantem, esse constet,

HISTORIA II.

*Abscessus Ani Arthriticus feliciter
curatus.*

Antistes nobilis, ingenio summe prædicando, nisi quod animi magnitudo superaret ingenium, *Arthritide* nativa, (ea prosperarum cum adversis, ea rerum humanarum mistura) quam & ipse minime tenuavit, est affectus. Diu ille, semel bis in anno, doluit; sed apte, sed utiliter, tandem *Ventriculum*, *Intestina*, & eorum extremitatem, *Anum*, a muneribus suis desciscere compertum est, & novo more affici: hanc humoris nimium recipere, *Hæmorrhoides* extrudere: illam cibum minus re-

O

æ

de conficere ; illum minus appetere . Hæc autem mala , sive naturæ per se deficientis & debilitatæ , sive *Arthritidos* inversæ signa erant , (cum *Interanea* multum iis enervari confitendū est) rectæ & externæ *Arthritidi* intus vocandæ , non parum conculere .

Hujus procatarseos maleficio factum est , quod , ex errato in re diæretica commisso , materia , (quæ digitos etiam tum extendit , quæ in tumores idoneos elevavit ,) *Arthritica* , intro invitata , *Ano* impacta , *Abscessum* in ea faceret . Primum , ossis coccycos regionem , mense Decembr. Anno 1692. invasit : inde per dies aliquot dolor , & totam pene hebdomadam *Abscessu* vena , Medici consilio , pertusa est . Nihilominus increvit tumor ; dextram , sinistram , partes circa *Anum* omnes comprehendens , & ad suppurationem tendens . Quo citius maturescat , ei *Cataplasma* admoveatur . Horis post triginta sex , cum jam moveretur intus contentum , & fluctuaret pus , phlebotomo per *Jenkinsonium* nostrum est apertus : unde materiæ putridissimæ foetissimæque quasi libra effluxit ; mundificantibus ab eo injectis detergitur sinus , fomentis roboratur .

Curatio perfecta , & absoluta esse visa est , cum exeunte Majo *Arthritis* , quæ tum temporis in artubus emicuit , ob *propter* nescio quam , ad *Ani* regionem , non ita pridem læsam , se proripuit , eamque magnopere corruptit . Pelle ovina , recens extracta , involvi pedes & abdomen ægrotantis , imperavi . Hinc suppuratio maturior , atque adeo celerrima , adjuvante *Ung. Basilicæ* &c. per penicillum admoto , secto tumoris apice , puris altera quasi libra expressa est . Perjucundum erat notare , non tantum omnia , statim ab emissio pure , symptomata concidere ; sed & appetitum , aliquandiu languentem , ex eo tempore vigere , latrare , & (quod eo amplius) ægrotantem comesta concoquere .

Quicquid hujusce mali reliquum erat , (hoc autem neque grave , neque longum ,) id omne laboranti , non nimium morigero , deberi statuendum est ; id etiam brevi sublatum . Nam factus rectus evasit æger , neque , tamen si sæpe posthac *Arthritide* , hujusmodi unquam *Abscessu* , de integro laboravit .

En igitur *Ani Abscessum* , in quem , tantum in sentinam , missa sunt *Arthritica* purgamenta : cujus rei noticia vel eo ma-

nifesta , quod ex *Abscessu* favetur artubus , neque iterum , dum nova in sanguine coacervata fuit materia , tantisper in eos savitum .

HISTORIA III.

De Ani Arthritica , propter Aloeticum , Inflammatione , cum instante Gangrena .

Matrona nobilis , sancta , venerabilis , ob causam alibi dicendam *Arthritica* , exeunte anno 1705. dolorem artuum , huc illuc vagum , & repentem habuit , articulos etiam aliquando , more solito , perstringentem . Sub isto rerum suarum statu , & conditione , *Tinctura Sacra* dosin , hortante quodam e vicinia sumpsit ; heu ! infausto omine , & irato *Æsculapio* ; *Hæmorrhoidum* enim dolore alias afflicta , tantam earum injuriam , tam grave malum ex eo pertulit , quam quod gravissimum .

Magna vis humorum , qui in sanguine jam eveci & exilio parati erant , ut hac vel illac levi ex causa verterentur , *Aloetico* viam ostendente , ad *Anum* pulsa est , & eam distendi maximeque cruciari fecit .

Non agræ profuit , quod e gallis , aliisque restringentibus , aqua ferrata incoctis , stuparum ope , *Fotus* adhiberetur ; contra , malum ex hoc acerbius , ægram inveni , cruciatus inter & tormenta , misere oppressam . Per *Anum* humor nigerrimus , odore cadaveroso effluxit , & de *Gangrena* impendente me admonuit . Paulo post , in *Ani* margine rumore rupto , tam jugiter emanavit humor , ut de agræ vita pene conclamatum esset , parum aberat , quin opprimeretur . Libræ minimum binæ effluerunt , quibus nihil foetidius , nihil graveolentius . Non nisi *Cardiacis* copiose creberrimeque datis , ægra sustentari potuerat , iisque mercuri vix quidē .

Sistente demum flumine , cisternam ejus immisso stylo exploravimus . Ab orificio , quod in dexteri podicis medio propter *Anum* erat , versus os *Coccygeum* , duas circiter uncias sinus intravit : altera vero parte , prope *Intestinum Rectum* , eique parallelus , circa quinque uncias . Tanta vero ejus latitudo , quanta humori contento responderet . Præterea , caro prope orificium ad drachmæ spatium livida , sensuque valde obtuso , *risum* in propinquo esse manifestavit .

Ut

Ut autem ea prohibeatur, eodemque tempore sistatur humor, nimium profusus, per *Injectiones* aptas, aliaque topica, Chirurgis adhibita; provisum est. *Turunde* immisae sunt, paulatim breviores; & demum, mensis usque spatium, ne nimis cito occludatur, tanquam fonticuli, os apertum est: postea feliciter reclusum. Ex morbi gravi, & prorsus ancipiti, convaluit agra, & partum intra breve spatium gessit.

Commonet exemplum, in corpore *Arthritico*, materia ad fugam prona saturato, quam dubia, autem imo quam periculo plena, maxime per *Aloetica*, purgatio.

CAPUT VII.

De Melancholia Arthritica.

ART. I. **P**ost *Ventriculi & Intestinorum* affectus *Arthriticos*, qui appellari possunt idiopathici, (de quibus supra disputavimus) ad eos jam deveniendum, qui loci saepe remotis & distantibus, semper autem aliis, κατὰ Συμπέθεμα, inesse deprehenduntur. Hi vero, tametsi plures, & quidem prima facie longe inter se diversi reperiuntur, (uti *Melancholia*, *Syncope*, *Cephalalgia*, *Vertigo*, *respirandi difficultas*, alique permulti,) quando hoc conveniunt, quod ex causa *primis Viis* contenta omnes exoriantur; eaque sublata, auferantur; eorum curatio, maximam partem, ex praedictis elicienda est. Par autem unum, ceteris praelucens, (nimirum *Melancholia & Syncope*;) cum utrumque ita interdum ingravescat, ut symptoma evadat *ιναρ*, & morbi rationem ambiat; hoc, & sequenti capite, speciatim exponetur.

II. Nullos aequae laceffit huiusmodi *Melancholia* (ut de ea primo loquar) ac qui molles, teneri, delicati, animi praediti pusillo, vel alia aliqua inclinatione naturali, *Melancholia* sunt ab incunabilis additi. Quandiu horum *Arthritis* paroxysmos agit regulares, & natura, visceribus parcendo, materiam in artus alienam exprimit, tam certe diu aegrotorum prosperes res succedunt: & in paroxysmorum vacationibus cor illis laetum: vultus hilis: sudum undique, & serenum est. Quoties autem hoc salutare opus, sive prorsus intercisum, sive remisse & oscitanter actum

est; maxime; quoties *Ventriculo*, & *Intestinis* committitur materia; primum, appetitus, & concoctio depravata est: hinc eo loci massa, brevi spatio putrescens, & inepta, coacervatur: hinc status hypochondriacus, Βορβορύμοι, praecordiorum distentio, & interdum dolor *Intestinorum* tere continuus: hinc illi, per consensum, cerebri & nervini generis affectus; illa *Mixoxia*, illa *Melancholia*. Turpis scilicet illius massae afflatu & contagione, deprimuntur spiritus, sensui jam motuique obeundo impares. Nihil isthoc hominum genere tristius, nihil infelicius. Neque somnum capeunt, neque cibum. Poenitet, piget, pudet, ipsos vitae suae tædet. Quodque omnium gravissimum est, quae, in summis calamitatibus, perfugio: quae aegrotantibus, solatio; quae *Arthriticis*, certissimo esse solet praesidio; hosce plane deficit spes.

Nullas unquam *Arthritidis* anomalias hac nostra diuturniores inveni; nec quidem multas temere frequentiores. Nono vel decimo circiter aetatis lustro, aegrotantem aggreditur; & per reliquum vitae (nisi medicinae viribus depulsa fuerit) eum perraro deserit; quin ex intervallis, iisque crebro brevioribus, affligit. Est autem ad *arthritidem*, in eodem corpore *Regularem*, (si ad eam comparatur) proportionem, quae dicitur *inversa*: quandoquidem, quo minor, quo rarior, quo mitior haec: eo major constanter, eo vehementior illa; & e contrario.

III. Quod autem ita sit diuturna, causam esse puto in praecedentibus enunciatam; *Dyspepsiam* nempe, & *Ventriculi* imbecillitatem: quae, ut usitate materiam ad *Primas Viis* arthriticam invitare solet, crebramque facit (ut ostensum est) huiusmodi *anomaliam*, ita quidem usitata major, (qualis his aegrotis est) tum invitat allicique magis, tum etiam arctius complectitur, retinetque diuturnius.

Ne vero, cum *Arthritide Melancholica* idem hic affectus esse censeatur, advertere oportebit, illum esse *Melancholiam* puram, & exquisitam, in *arthritide*: hunc *arthritidem* similiter genuinam, in *Melancholiam* desinentem, eamque propria materia facientem.

IV. Requirit *Therapia*, ut morbo aegrum prementi, *Ventriculum & Intestina*, αἶμα (si opus fuerit) & αἷμα purgantibus, primum adferemur. Ista vero blandiora sint, necesse est; e *Decocto* puta *Fol. Tæ*, vel

Poffeto Carduato, Vomitorium; ex Rhabarbaro, Pil. Tart. Bontii, Stom. cum G. vel illiusmodi aliquo leniente, Catharticum. Statim a purgatione, eo nempe vespere, omisso Paregorico, locum habeat Cardiacum; quod materiam visceribus adhærescentem extra propellat: posteaque, cum ad Alterantia descendens, ea quantitate propinentur, sed dosibus idoneis, quæ si nihil repugnauerit, intentioni therapeuticæ (i. e. materiæ Arthriticæ, a suis caüs educendæ, & in artus ablegandæ) satisfaciatur.

Vult autem *Prophylaxis*, primum, ut aquis *Diureticis*, recte diuque potis, e sanguine virus evehatur *Arthriticum*. Deinde, ut *Arthritis*, vere & autumnò, altero nempe vel utroque, si per se quiescat, medicamentis ad eam finem datis, cieatur: regulares paroxysmos, suoque numero perfectos (quoties opus erit) edere cogatur: & ut alias coctionis summa teneatur ratio, in victu minime peccetur. Quare *Eccopropticum* frequenter adhiberi, putres sæpe extrudi reliquias oportebit; & in eum finem usui erunt *Pilule*, quibusdam in pretio habitæ, *Melancholica* ab *Exoniensibus* appellatæ.

*℞. Pil. Macri, Stom. cum. G. ana ℥i.℥.
Rudii ℥i.
Ref. Jal. ℥℥.
Ol. Cin. Chym. gutt. x.
Bals. Per. q. s. f. Pil.*

Dosis ℥℥. primo mane, omni mense; vel, eodem intervallo, sumatur *Tart. laxantis*, & *Manna ana ℥℥. ad ℥i Aqq. purgant. ℥ij. soluta*. Omni vero purgationi prophylacticæ succedat, hora somni, *Paregoricum*. Prodest porro corporis exercitatio, præsertim equitatio. Quæ vero reliqua huic affectui medeantur, ex supra dictis hauriuntur.

Melancholia propter Arthritidis accessiones minus idonea.

Tempus olim nobiscum homo traduxit alienigena, ingenio prorsus singulari: affectu *Hypochondriaco* non parum multatus. Ægritudini importunæ permolestæque ut occurreret, *Baccho* ille, non nimium modo, verum etiam intempestive (pernoctando scilicet) indulgit: quo quidem more, *Arthritidos* perniciosissimæ, senectutis tristissimæ posuit fundamenta.

Adolescentiam vix egressus, *Arthritis*, malo hæreditario ægrotavit, quod *Melancholiam* vel primum intulit, vel magnopere auxit. Quandiu paroxysmos edere solet *Arthritis*, ista regulares, (satis scilicet magnos & frequentes) nihil illo homine mutabilius, aut sibi dissimilius; utpote lætitia nunc elato, mœstitia nunc depresso. Quoties enim paroxysmus aliquis finierat, cantu, jocis, salibus effundendis, carminibus aut pangendis, aut recitandis occupato eo, nihil usquam gentium festivius jucundiusve: quamprimum autem *Baccho*, *Cere*, & ignavia, nova in sanguine cumlaretur materia, & jam expulsionì parata esset, nihil illo tristius, lugubriusve.

Non dum annos compleverat quadraginta, cum *Arthritis* rarius & remissius agere occupavit; & pro illius remissione, ægrotanti evenit male: nam *Melancholia* ingravescere reperta est, & quidem eatenus, ut in eam demum mutaretur *Arthritis*; quibus autem modis, & qua metamorphoseos ratione, (quippe ad explicandam *Melancholiam* hujus *Arthriticæ* naturam cum primis faciens) narratu dignissimum.

Qua proportionè paroxysmi, sive earum acrimoniam, sive frequentiam spectemus, cessavere; ea semper, rata perpetuæque, crevit *Aproptia*, ea *Autorbia*; ea, status immodici; ea, dolor & innumera *Ventriculi* querelæ; ea, *Melancholia*: ut materiam ad *Arthriticam* minime propulsam, visceribus infundi, res sit evidentissima.

Chalybem ille, *Amara*, non unius generis *Cardiaca* initio commode; *Corricem*, cum *Vino*, omnium multo commodissimæ; postea vero frustra, ingessit. Validus a natura, & athlericus, morbo gravi & ærumnoso, animum cum corpore pessundanti,

danti, impar, ætate adhuc constante succubuit,

Victima nil miserrantis Orci.

HISTORIA II.

Arthritis Melancholico saluti.

Homo *Damnonius* per omnem primam juventutem cœlionis pravitate, ventriculi a pastu distensione, flatu, capitis gravitate identidem afflictus, de majori malo adveniente monebatur, Annis aliquot post, exorta *Arthritis*, nunc uni eidemque articulo inhærens, nunc per artus erratica; semper autem regularis, & cum Morbo *Hypochondriaco* (uti cum *Polluce Castor*) vices habens alternatas. Quæ istorum affectum *Επικληρία*, communem utriusque materiam asse, nunc, quæ sunt intus, afficientem: nunc, quæ extra, corrodentem, ostendebat. Gravedo etiam, per hosce dies, humorem multum, & acrem, in vacationibus *Arthriticis* emittere, sicque capitis gravitatem minuere solebat.

Sub finem anni 1702. paroxysmi, qui lenes semper, & parvi reperiebantur, *Arthritici*, præter morem intermiserunt; neque jam per annum integrum emicuit *Arthritis* ulla, sive fixa, sive contraria: quanto vero ægroti cum discrimine, vel ex eo disci potest quod nausea frequens; quod appetitus exinde prostratus, quod cœlio vitiosa, neque nisi liquidorum ulla; quod flatus, *αἶμα & κίττω* sæpe emissi; quod, eis aliquantisper retentis, auditus ad tempus aliquod omnino nullus; quod dolor lateris pungens; quod spirituum defectus miserabilis; quod marcor, quasi junctis undique corporis, ægrotum pene conficerent.

Considerata istius morbi natura, plane visa est *Arthritis*, quæ diu recte egisset; jam vero, brumæ vigente frigore, sanguinemquem deprimente, intus in *Ventriculum*, &c. repelleretur, & dictam faceret *Melancholiam*.

Proposita medicinæ via, ut languentes spiritus suscitarem, ut inimicum ab intestinis dimoverem, & ad artus propellerem; eum aggredior. *Aquarum Ferratarum*, quæ in propinquo erant, *Tavvtonensium*, modice tepesfactarum selibram, hora septima matutina, hauriendam; omnique horæ quadrante, ad hora usque duas repetendam; cuilibet vero selibræ *Sp. vol. gust. x. vel xv.* instillandas; nona sequenti, *Infusi Tee*,

eadem aqua comparati, *℥ss.* horo deinde post, *Infusi amari alterantis Cochl. v.* quarta pom. *Bolum Absynthiatum*; hora somni, *Cardiacum* sequentem, cum Julapii, aut vini Xeresani haustu demittendum, imperavi.

℥℥. Rad. Zedor. ℥ij. Gentian. ℥ss. Caccum. Agrim. ℥ij. Coccinella ℥j. Corr. ext. Limon. Flor. Rorismar. ana ℥j. Infunde in Vini Xeresani ℥℥ii. ad idoneam alterationem; tunc coletur infusum.

℥℥. Pul. Rad. Ari C. ℥ss. conf. Abs. R. ℥ss. Syr. ZZ. ex Indiis q. s. f. Bolus.

℥℥. Pul. Gascon. ℥ss. Spec. Diambra ℥. Syr. Garyoph. q. s. f. Bolus.

Carnibus *Απτερις & Εχέματος*, pullina sc. vitulina, agnina, & ejusmodi aliis vesci; & loco cerevisiæ, huic ægroti pestiferæ, aquam dari bibere prædictam, cum crusta panis incocta, Xerano demum addito, præscripsi. Utrique *Bolo*, paucis post diebus, nempe quamprimum Martem ferre valuerat teneritudo *Intestinatorum*, adjecta sunt ejus *Nutriti* gr. v. primoque aq. haustui, omni mane, *Tinct. Martis Feburiana gutt. xx.*

Porro, ad caput per nares purgandum (quoniam hoc innuere visa est Gravedo) Pulverem adhibui *Sternutatorium* sæpius in die usurpandum.

℥℥. Causum Tabacci ℥j. caccum Majorane; Rorismar. Salvia ana ℥ss. Rad. Helieb. albi ℥i. Moschi gr. ii. & Siccatis f. Pulvis Επὶπρεα.

Ista medicina, vix crebile est, quam celerissime restituta, & quanta ægroti sanitas. Spiritus animales, ab assumpta aqua maxime, & quidem subito recreati: paulo post vigere cœpit, & deinde latrare, appetitus; partim medicamentis, partim victu, sed aqua potissime, vegetior factus, oculos homo sustulit, vultum explicavit. *Arthritis* recta, pedem alterum occupante, postmodum est tentatus. Maximi erat momenti dolor iste regulari; utpote qui materiam, relictis visceribus, *πρὸς τὰ ἔσω* arceri comprobavit. Medicina eadem, vel simili dies quadraginta usque continuata, memet *Exoniæ* visitavit; ex mœstissimo, & tristissimum in modum languente, in sanum & vividum, in lætum & alacrem mutatus. Ego, ut morbi recurrentis metum adimerem, & in tuto rem omnem ponerem, ad dies adhuc viginti plures, medicinæ usum protuli. Quinimo, contra *Melancholiam*, aliæque *Ventriculi* & *Intestinatorum* mala, ut

in posterum se incolumem præstet ; de *Arthritide* curet, exhortor, ut ea rectum, & idoneum, semel minimum anno, paroxysmum edat.

Historia narrat *Arthritidem*, intus ad *Ventriculum* & τὰ ἑντέρια missam, ægrotum mirifice lædere ; *Melancholia* gravi afficere ; demum medicina ad τὰ ἑντέρια auspicio pelli.

HISTORIA III.

Melancholiam, & Hydropa Arthriticum, sanat, arte comparata. Arthritis idonea.

Aliud dicam *Melancholiae* hujus *Arthritice* exemplum, nobile & inusitatum. Vir Reverendus, antiquis moribus, per ætatem mediam, nunc *Arthritide*, nunc *Melancholia* premebatur : hujus sc. accessibus olim, ante annos viginti ; illius nuper omisso tabacci usu, ante sexennium, ortis : hujus perpeffu gravioribus ; illius, tum minus molestis, tum etiam raris ; at semper commodis, semper utilibus ; siquidem *Melancholiam* illi ad tempus diuturnum, ad annum quasi dimidium, semper abegerunt.

Sub finem anni 1702. post appetitum aliquandiu læsum, *Melancholia* ille multum angebatur ; *Mixopexia* & depressione spirituum importunitissima, incredibili stipata. Lamenta, querimonias, ejulatus die noctuque effundentem, tanquam ægrotorum post hominum memoriam afflictissimum, audiui. Mehercule ! se arbitro, nemo unquam mortalium, nec quisquam gentium æque miser. Paulo post omicuit, qui sævitia longe *Melancholiam* excellere visus erat, tumor pedum ; deinde femorum, profundas digitorum foveas accipiens ; isque serofus, hydropicus. Umbilici regione exudavit, tanquam e colo, liquor. His accessit difficultas spirandi, debilitas universa, & δυσκίνησις, brevi tempore, fere paralytica ; sitis etiam insatiabilis, urina pauca, & lixiva, portionis nec quadrante plus : Ut, de ægroto plane conclamatum esse, non immerito omnium fere sermone percrebuerit opinio.

Quo affectui tam periculoso medicinam facerem, idcirco primum ex usu esse judicavi, seri vim minuere, hydragogis amandare ; rum, quibus rebus possem, *Arthritidem* (quam horum omnium causam esse

suspicabar) evocare, & τὸν ἑντέριον infigere. Hac proposita medendi lege, *Pil. Aloeticis* facta semel iterumque purgatione, meo jure sic præscriptum est.

℞. Rad. *Gentian.* ℥i. Infunde in Vini albi Lusitanici ℔ii. ad alterationem idoneam ; Colaturæ add: Tinct. Aurant. ℥ii. misce. Dosis ℥iii. sexta quaque hora, cum seq. *Pil.*

℞. Sal. Martis, Chal. Nutriti, ana gr. v. Rul. Serpent. Virg. ℥℔. Syr. Absinth. symp. q. s. f. *Pil.*

℞. Sp. Vol. Ol. ℥iii. Tinct. Stom. cum M. ℥i. misce sumat. gutt. xxx. cum idoneo quovis vehiculo, bis in die, sæpiusque, si languores urgebunt.

Quantum ægrotanti ab hac methodo utilitatis, opinione majus est. Quando per evacuantia, seri, quod nimium erat, vix dimidium expelleretur ; ita quidem factum est, ut natura, per cathartica, perque chalybem adjuta, tum in pedem Materiam extruderet *Arthriticam* ; tum etiam serum per renes abundanter emitteret. Septem, octo dierum spatio usurpandis hisce *Pil.* dicato, pedis sinistri doluit malleolus, & digiti majoris articulus major ejusque orbis. Dolori paulo post successit urinae profluvium, tam jube, tamque copiosum, ut, diebus quinque vel sex, pedum, & femorum tumor omnis hydropicus, etiam si immanis, auferretur ; & simul cum tumore, parique proportionem, sitis. Ex sententia succedere omnia. Alacrem, vividum, cibi appetentem, animo plenum denuo conspexi ; vitam hodie quadriennio postquam ita fuit correptus, vivit ; & quidem eam, quæ sola vita est vocanda : ut uno hoc exemplo demonstrari possit, quantum *Hydropa*, quantum *Melancholiam* faciat *Arthritis anomala*, quantam etiam utrunque sanet *Regularis*.

Hactenus de *Melancholia Arthritica* ; ad ejusdem originis, & naturæ *Syncopem*, accedo.

CAPUT VIII.

De Syncope Arthritica.

ART. I. **A**lius est affectus, ei, qui præcessit, sive causæ utriusque continentis & proximæ, sive κατὰ Συναρτησιν ortus, habeatur ratio, congener & geminus; Syncope nimirum Arthritica, hunc in locum aptissime referenda.

Ante dictum est, Arthritidem, maxime in corporibus senecta, vel ebriositate læsis, & enervatis, Ventriculum, & Intestina minima quavis de causa petere. Quinetiam exploratum est, in eas partes ingressam Arthritida, non semper Anorexiam, Nauseam, Tormina, Diarrhæam, & hujusmodi morbos διαταραχὰς inferre; sed uti nonnunquam Melancholiam, (in superiori capite tractatam) ita etiam interdum Syncope.

II. Compertum, inquam, est, a potione nimis frigida, & tenui, vel δυνάμει aliquo, ore sumpto, & Ventriculum aggravante, primum, universo corpori male esse; tunc paulatim os pallere, sudore frigido deinde cuticulam madere; pulsum imbecillum, modo nimis tardum, nunc inæqualem, reddi; interdum minui tantum, alias intermittere; solvi denique spiritus animales; sensum, motumque deficere; vitæ omnes corrumpere facultates: interea vero temporis, Arthritidem, (siqua forte in articulis, antequam hæc inciperet tragœdia, comparuit) desubito recedere. Ne multis, ægrum, nisi remedio quodam efficacissimo præsentissimoque, nisi Deo in vicinia mortis opem ferente, servatus fuerit, e vivis exturbari.

Hanc ego Συναρτησιν, quatenus a miasmate Arthritico commissa est, Arthriticam; quatenus vero per omne corpus se diffundens, a causa (in Ventriculo, & τοῖς ἑντέροις sita) longe posita elucet, κατὰ Συναρτησιν natam appello.

III. Huic ut occurratur, ancipiti prorsus, & acuto morbo, nihil æque valere judico, ac, cardiacorum permagna dosi potentium adhibita, indicationem vitalem tueri; spiritus animales sistere, & instaurare; ut & alienum (si modo id fieri possit) ad τὰ ἰσχυρὰ arcere. Quo circa Aquæ Hispanice quantitatem amplam, in ægri rem, plus semel dedi bibere, proque re

nata repetii. Ubi illa defuit, aliam, quæ sequitur, (quando medicamenta in forma liquida citius adjuvant, & propterea solidis anteponenda sunt) præscripsi.

℞. Aq. Abs. C. ℥xij.

Sp. Menthae,

Tinct. Lavend. C. ana ℥ij.

Sacch. albiss. q. s. f. Julapium.

Dosis ℥℥. j. ad ii. ubi usus veniat, adhibenda; & ut per usum videbitur, iteranda.

Cum dosi prima, vel secunda, si placet, demittatur Bolas, seu Pulvis sequens.

℞. Theriac. Androm. ℥℥.

Flor. Salis Armon. ℥℥.

Conf. Anthus ℥j.

Syr. Cort. Citreor. q. s. f. Bolus vel.

℞. Pul. Serpent. Virg. ℥℥.

Spect. Diambra ℥j. ad ℥℥.

Micropip. gr. jss. jssj. v.

Ol. cin. Chym. gutt. j. f. Pulvis.

Pauperrimis, & indigentibus (uti etiam aliis, ubi medicamenta non ad manus erunt aptiora) Spiritus Vini detur ustulati quantitas ea, quæ proposito respondeat: vel aquis Cardiacis superaddi possit, Spiritus C. C. Succinatus.

Cum hisce Frictiones simul adhibendæ sunt; & in Vino, vel Spiritu Vini calefacto, immersæ Stupe, scrobiculo cordis, & toti abdomini applicandæ, crebroque renovandæ sunt.

His, vel hujusmodi similibus, utendum eo usque, donec æger refectus, & (modo hoc effectum reddi potuerit,) in solido locatus fuerit: quod utique raro fit, priusquam Arthritis in articulos ablegata, & iis sit infixæ.

Si a δυνάμει aliquo temere comesto Syncope proficiscatur, & æger facile vomat, aut ad vomendum pronus sit; quamprimum ita factum sit, ad se ut paululum rediret, per Decoctum Teæ, vel cardui, largiter exhaustum, alienum ejiciatur. Verum, si ad incitas ita redactus sit æger, ut moræ locus relinquatur omnino nullus; quin, ad salutem ægroti quicquid peragi possit, uno id, necesse fuerit, eodemque tempore peragatur omne, hoc casu, inquam, Vini quantitas ebibatur ea, & quidem ea celeritate, quæ tum viribus redintegrandis,

dis, tum vomitui movendo satis esse repariatur.

At si revertantur, & importuna fuerint huiusmodi *Συνοπται*; ut iis initio statim occurratur, præsto sint oportet istiusmodi *cardiaca*, prout facto opus erit, ingerenda. Quanquam enim sanis, integraque valetudine usis, nullum unquam potionis genus huius *cardiacis* (*Spiritibus* nempe, & *aquis generosis*) pestilentius aut magis noxium, si in usum communem trahantur, excogitatum fuit; tamen *Arthriticis* veteribus, præcipue vino deditis, hisque *Lipothymiis* invadi solitis, nihil, quod sciam, utilius, salutariusve. Adeo, videlicet, quibus alii, certe permulti, rebus cōficiuntur, & e vivis extruduntur, iisdem ipsis alii servantur, & multos annos, eorum beneficio, vivunt valentque. Hoc autem, uti re ipsa constat, animoque a me sincero, & in humanum genus benevolo dictum, boni velim consulari; nec in peiorem partem, & sui peniciem a quoquam, tamquam ad malos mores licentia, rapiatur. Qui *cardiacis* hac occasione nimio plus indulserit; qui erratum tam turpe, tam stultum erraverit, ipse viderit.

HISTORIA I.

*Syncope Arthritica, foras abacta
hospite, curata.*

MOribus & ingenio præstantissima scemmatum, eadem fere de causa, quam in sequenti Historia repetam, se in vitæ periculum redegit. Diu enim *Arthritide*, culpa non ex sua, laborans, paroxysmo gravi, imo quidem omnium, quos unquam est perpeffa, longe gravissimo, vix ad exitum perducto: aquam illa fontanam, & frigidam potavit, eoque forte largius, quoniam antea non solum impune, verum magno suo commodo fuerat aquæ potrix. At in rebus humanis, utranque facit paginam opportunitas: multumque refert, in iis agendis, quæ sint earum singulis accidentia.

Circa idem tempus (ut aliud esse solet ex alio malum, *ἐπὶ δ' ἄλλοις ἀλγυσι καὶ τοῖς*) cibo quodam inepto, & difficili comesto, mirum quantum ab eo in victu errato, & quam mox adductum est discrimen. *Ventriculo* primum agrotavit, nausea & fastidio gravata: doluit deinde vehementer, tamquam spasms arctissime contrahentibus.

Orta tunc erat hysterica (talis esse videbatur) suffocatio. Erat vomitio, sed inanis. Sensuum, & vitium erat diminutio. Dum ista fiunt, *Arthritis* (quæ in extremis partibus paroxysmum, aliquot jam per menses, exercuerat) illico regressa est, ad ea, quæ intus sunt, vocata.

Plumæ juxta comburuntur; ut nimirum spiritus animales, præpostere agentes, odore foedo cœrceant, instruantque, aqua datur *Hispanica*, semel atque iterum, quanta nempe *Ventriculum* reficiat, & *Arthritidem* deorsum adigendo, neque artus pellendo, ægram restituat. Trium, aut eo amplius, horarum spatio, *Syncope* remisit. Dolor in extremis partibus recruduit; ægra servata est.

HISTORIA II.

Ejusmodi alia.

NAvis olim Præfectus, neque *Veneris*, neque *Bacchi* cultor parcus, & infrequens, propter iniquam eorum observantiam, *Arthritide* multatus est. Graviter, & diu ille doluerat, cum forte fortuna simul in eadem domo essemus, & de Navarcho nostro, tamquam animam agente, ex improvviso clamaretur. Ægrum advolavi; quid hoc clamoris, inquisivi; pulsus inveni languidum, imbecillum, rarum: qui se lebat esse maximus, & durissimus. Os expalluit. Anhelitus sublimis, & cum intervallo longiori tractus. Corporis superficiem frigus sudorque occupavit. Sensus, motus, vires universæ sunt collapsæ, ipsiusque propemodum œconomix subversa ratio.

De mali causa interroganti declaratum est, ægrum, *Pedibus dolentem*, febricitantem, sitientemque fontanam paulo ante aquam hausisse frigidam; ad ejus quasi se libram; itaque sibi malum arcessivisse.

Aquæ Ego *cardiacæ*, maximeque generosæ, dosin illico prælargam, cum *Sp. Vol. Oleos.* guttis aliquam multis, in os immisi; & post tempus aliquod, cum *The-riac. Androm. & Pul. Gascon. ana ʒ℥.* repetii, imo quidem *Hausum* tertia vice, spatio quodam interposito repetere, necessum habui. Ne plura, non nisi remediorum summe cardiacorum immensa vi restitutus est æger.

In eo vero restituendo, duo notatu digna erant. Primum, neque ea *cardiaca* febrim; sed e diverso æstum modo benignum, sudo-

Indorem blandum, auspicatum inferre: Cuius id in causa esse videbatur, quod zgro mari versato, frigori assueto, *Cardiaca* minime nova essent, & quod illius sanguis, *Arthritide* diuturna depressus, non cito incenderetur. Deinde, non multo post, quam in artubus calor redierat; quod *Dolor* redierit *articularis*, & cum eo incolumitas.

Habetis *Syncopem Arthriticam*; facultatum omnium perturbationem; animalis vitæ eclipsin; *Arthritide* revocata, & ad ea, quæ intus sunt, allecta factam. Habetis eam, *Arthritide* foras abacta, sublevatam.

HISTORIA III.

Arthritide diu ignava & inerti generata, Syncope illius Paroxysmo regulari sublata.

VIr melancholicus, solers, ingeniosus, patre natu *Arthritico*, ætate progrediens ipse doluit *Arthritide*; sed ea, quæ segnis, & ignava, paucos habuerit paroxysmos; & ex iis paucis idoneos & ex iis paucis idoneos & laudabiles certe paucissimos. Huiusmodi anni prope viginti erant cum, ingravescente jam ætate, diu quieverat *Arthritis*, & in ista quiete quando fortuitu accidit (tanquam *πρόζωον*, sive causa evidens) in potulentis erratum, æger ultra morem largiore vino menses aliquot usus, non ita diu post *Syncope* correptus est. Frigus occupavit artus; pallor faciem; spiritus animales perturbati, & depressi sunt; pulsus in carpo humilis, iectuque omni tertio intermittens. Nihil fuit propius, quam ut periret. Stupebant astantes, unde, & qua ex causa, malum tam grave, tamque repentinum oriretur.

De *Arthritide* interrogavi, quam illa pridem *παροξυσμια* esset; & quam perfecte. De insultu ejus tum raro, tum miti certior factus, operam dedi, ut per *Arthritidem* (quoad ejus fieri posset) in artus exturbatam, malo præsentī occurreretur. Quocirca, præter *Hausus Cardiacos*, *Spiritusque* C. C. vim magnam, iterum atque sæpius datam, *Electuarii Arthritici* quasi 3j. ter *quædam* ea die sumendam, imperavi: cumque horum, & *Pul. Gasconici* opem, fausto quidem omine, pes inciperet dolere; ut bene res feliciterque verteret, & inceptum *Sydenham Opera Med. Tom. II.*

promoveretur opus, *Alcohol Martis* grana aliquot ex *Julapio* propinavi.

Nondum ejus scrupulum demisit æger cum paucis horis spatii tantus in sanguine factus est orgasmus, quantus observatione dignissimus. Pulsus illico celerior, elatior: æstus universalis, ingens: venarum hæmorrhoidum apertio: sanguinis eruptio, sitis immodica; spirituum agitatio vehementissima; quæque spes & ratio sanitatis erat, in pede sinistro digiti & articuli maximi tumor, ruborque orgasmum indicavit.

A quantitate *Martis*, utut valentissimi, tam exigua, tantas excitari turbas, equidem perrarum est, Cassum aliquod, & viribus spoliatum *Martem*, esse nostrum hoc illius præparatum, nemo prudens affirmabit; quando tam cardiaca, prius sumpta, tam longe virtutibus exuperet, tamque potenter *Podagram* expellat.

Ut autem humor evocetur, vel minimum in articulo retineatur, *Vesicatorium* alio quoque loco impositum est; loco autem affecto *Emplastrum*, ex *Picis Burgund.* & *Emp. Cephalici* paribus mensuris. Pedi vero toti, ex *Cerato viridi* cothurnus, fascia lanea constrictus.

Propediem humerum, usque sumptis ore *Cardiacis*, invasit *Arthritis*; ejus alliciendæ ergo, *Empl. e G. Catanna*, cum vestitu laneo, illi superpositum est. Horum, qua intus, qua extra, adhibitorum usus partim per *Podagram*, & *Σμύγμα*, partim per *Diaphoresin*, alienum amandatum & exemptum est, spiritusque instaurati; & quam vidi gravissima, multoque omnium atrocissima, *Syncope* levata est.

CAPUT IX.

De Calculo Renum Arthritico.

ART. I. **R**enum ille *Calculus*, qui concretio est *Arthritica*, cum eorum calculo vulgari, tam per omnia concordat; ut, de ea verba hoc loco facere, supervacuum opinarer; nisi in ejus *Therapia*, & *προσυνάξι*, ne dicam *Historia*, quædam occurrerent, quorum consideratio specialis sit habenda.

De *Calculo* primum annotatu dignum est, raro cuiquam unquam morborum eum frequentius supervenire, quam *Arthritidi*, quod ut aliis in regionibus aliorum obser-

vatione palam factum, ita in *Damnatio* nostra esse certo scio. Minime vero cogitandum est, *Arthritis* tametsi gravi vetustæque, calculum esse *Comitem individuum*; nec quidem fere *individuum*: quando *Arthritis*: aliquas nunquam, aut certe raro, ille comiteretur; (raro enim *Frigidam*, quæ dicitur, *Arthritis*; raro languentem, quæ tamen *Arthritidis*, late sumptæ, partes urique permagnæ sunt,) nec quidem ullas semper.

II. Qui a cunabulis ad affectum horum alterum, maxime vero qui ad utrumque sunt proclives; ipsa nonnunquam adolescentia *Calculo*, ne dicam citius, afficiuntur. Alias vero ita fere se res habet. Cum *Cereri*, & *Baccho* æger diu indulset, tam mala vitæ ratione condi, & in sanguine coacervari solet, aliena illi materia; quæ, naturæ molesta, & inimica, partim per articulos, (unde *Morbus Articularis*) partim per *Renes*, una cum sero, quod illi vehiculum esse videtur, amandata est. Ad ureterum autem initium adhærescens, in *Arenulas* eo loci primum coit, uti postmodum arenulæ in *Calculum*. Huic autem materiæ, in sanguine cumulandæ, maxime conferre censeatur diæta, succo lapidescente abundans, eumque sanguini impertiens: confert etiam mala concoctio: visorum conferunt *Lactearum* ora nimis aperta: ut & *Renum* a natura imbecillitas.

III. De *Calculi* humani, generatim accepti, productione, multa quidem, tum ex ejus analysi chymica, tum etiam pondere *Specifico* proferuntur; quæ ossibus magis, quam lapidibus, eum appropinquare annumerarique oportere, non parum arguunt. Hæc autem omnia non tam naturæ *Calcularum*, quam certis quibusdam eorum accidentibus, præcipue crassamentis, a sanguine acceptis, quæ *Calculum* magna ex parte constant & efficiunt, debentur. *Calculi* vero ipsa *Genes*, ex particularum quarundam lapidearum, cum affine sale, (calcarii nempe lapidis, cum sale suo calcario; vel ocræ, cum sale vetriolico) coitione fieri; iisque sanguinis crassamenta, tanquam vinculis, connecti judicentur. Ista vero quando non sunt hujusce instituti, & a clarissimo *Listero* *quæritur* & dilucide, sunt tractata; ad eum lubens quidem lectorem remitto. (1)

IV. *Calculi* autem *Arthritici* partes: & compositionem, si attente inspexerimus, eandem fere, quæ *Calculi* renum vulgaris, & non *Arthritici*, esse inveniemus. Hæc autem res ex duobus *Leeuwenhoekii* pronuntiatis, elucebit. *Calculum* cremavit ille, crematoque adjecit aquam fontanæ, idem fecit cum calcearia, & tofacea *Arthritico-rum* materia. In his lixiviiis, beneficio microscopii, apparuit salinarum copia particularum plane similium; rigidarum nempe, concretioni aptarum, dissolutioni resistentium. Jam vero, (ut, quod dixi, inferam) si *Calculus*, ex corpore non *Arthritico* extractus, adeo cum toto *arthritico* conveniat; multo magis, qui est *arthriticus*, cum utroque, cum *Calculo* præcipue, convenire judicetur. Hoc autem, utut primo aspectu probabile, non tam argumentis, quam experimentis statuendum, & definiendum.

V. *Calculi* jam facti, sive *arthriticus* fuerit, sive non, symptomata prorsus eadem inveniuntur: at a vulgari *arthriticus*, ea re potissime distinguendus; quod *arthritidis* cum sit *Επιδήμιος* naturam ejus participet; materiam amplectatur, & comprehendat. Ideoque, utrum æger in *Παραπύριον* numero fuerit habendus, & a paroxysmo quandiu vacaverit, diligenter inquirendum, ut de *calculi* natura constet.

A *Colica* exquisita differt, per ea, quæ *calculum* exquisitum ab illa differre faciant: A *colica arthritica*, quod nullam spirandi difficultatem, nullos in umbilici regione *Σπάζους*; sed neque melancholiam adeo tristem, & urgentem, aut materiæ crudæ, acidæ, biliosæve vomitum adeo constantem habeat.

VI. Medendi etiam intentiones eadem, ac in *calculo* vulgari; at, quod in hoc nostro momenti est præcipui, per auxilia quædam propria, per methodum particularem exequendæ. Nullus enim hic, aut certe perrarus, *acidorum* usus; quinetiam, *Forus*, *Linimenta*, *Cataplasmata*, aliaque dorso applicari solita, maxime si paroxysmus simul *arthriticus* erit, tanquam periculo plena, sunt prætermittenda; fugienda.

At ejus dolori, si cum artuum dolore concurrat, & intolerabilis fuerit, delinendo conducunt *Paregorica*; & quidem maxime, si nulla sanguinis detractio (quæ

in

(1) Vide *Dissertationem Ejus Medicinalem, de Calculo Humano, & de Petrificatione*.

in calculo alias utiliter præmitti solet ; at in hoc nostro, ad ea, quæ intus sunt, vocare possit *arthritis* ; vel, ut ne exulet, inhibere) præmissa, agrotò propinentur. Illa vero *Paregoricorum* dosis, ejusque repetitio optima ; quæ dolori sublevando satisfaciens, cerebro interea non obsuerit, neque materiam ei vitiosam impegerit.

Si, nullo *arthritis* comitante paroxysmo, calculus erit ; alia rerum facies, aliaque medendi via est. Hic enim, in plethoricis, & multo sanguine distentis, ad prohibendam *Inflammationem*, secetur vena : *Enema*, ex *Decoctis com.* & *Ol. Amygd. d. rec. ana ℞.* cum *Tereb. Ven. Ovi Vitello* solut. ʒj. injiciatur. Postero die, *Electuario leniente*, *Pul. Rhab. & Syr. Violac.* forma *Boli commistis*, vel, *Jusculo Avenaceo*, cum *Foliis Sennæ incoctis*, & *Manna superad-dito*, purgante, venter aperiatur, eoque vespere *Paregoricum*, (quale sunt *Pil. Matthæi* grana totidem, quod opii granum continebunt unum) locum merebitur. Quinimo, si a calculo dolor urgebit, ne intestina spasmis contrahantur, ad hosce præveniendos, & illum compescendum, horas aliquot ante purgans, sumatur *Paregoricum* ; ipsumque purgans, si justo lenius fuerit, suo tempore sequatur *Enema*.

His, ad dilatandas urinæ vias, ætis, ad *Calculus* exprimendum usui erit *Balsamum Gileadense*, *Chiliense*, vel *Pervuanum*, ex *Syrupo Dialthææ*, vel *Balsamico* datum, & bis, ter, quaterve in die, repetitum.

Syrupus Balsamicus, quem vidi, elegantissimus, hoc modo præparatur.

ʒ℥. *Aq. Hordeat.*, (*tertiæ Decoctionis*) colata, & per *subsidentiam* clarificata, ℞ij. *Balsam. Tolutani* ʒij. Infunde calida, ad ℞i. *consumptionem* ; deinde adde *Sacchari Crystallini optimi* ℞ij. leniter eoque ad *consistentiam Syrupi tenuioris*, quem per *linzum densum*, frigidum trajice, & usui serva.

Si forma *Boli* aridet, *Opob. Ἀβ.* vel alius *Balsami* dosis, cum *Ovi Vitelli* ʒj. temperetur ; & intervallis jam dictis assumatur.

Hisce vehiculo esse potest *alla* nostrorum hominum mustea, (*Grout Ale*) præsertim alba ; quæ cum primis generosa, tum etiam maxime *Diuretica* ; vel, *Rad. Althææ*, *Glycyrr. Eryng. Cond. Hordei*, aliorumque his similium apozema ; *Saccharo Crystallino* ; vel *Syrupo Balsamico dulcatum*. Adeundem finem utile *Foliorum Tææ Infusum*, libere

potum ; vel, ex *Decocto præscripto*, & *Amygd. d. emulsum* ; vel id, quod sequitur.

ʒ℥. *Amygd. d. corticibus purgatarum*, N. x. inter contundendum, affunde *Infusi Tææ* ℞ij. postea coletur emulsum ; eique adde *aq. Rosac. vel Cin. bord. & Sacch. cryst. q. s.* Nonnullis *Vinum album*, vel *Decoctum modo scriptum*, cum *Ol. Amygd. adjecto Sacchari cryst. momento*, propinamus.

Extra, *Cuniculi adipem*, dorso superillitum, adversus dolorem mirifice valere, a sene calculoso, tanquam expertum, accepi.

Ad *Prophylaxin* optime conducunt *aq. calidæ Bristolenses*, quibus adjungantur *Opobalsamum*, & *Syrupus* e prædictis lubricans. Quibus nulla istiusmodi *aquarum* copia, illis usui esset *Tææ Citreæ Infusum*, omni mane bibere. Novi *Calculosum*, qui methodo sequenti renes subinde purgans, ad senectutem veterem & tutam est perductus. Ter, quaterve in anno *Terebinthine Venet.* quasi ʒj. cum *Pul. Glycyrr.* forma *pil. sumpsit* ; *Cerevisiæ*, vel *Posseti* libras aliquot superbibens : confectum milliaria quatuor, vel quinque, equo succussatore mentus est : unde sæpe *arenulas* excrevit, seque si non immunem, tamen incolumem servavit. *Cerevisia* omnium optima, quæ cum *aqua pluviatili* comparata : illam volo, quæ, neque in nivem unquam, neque in glaciem mutata, sincera sit, & pura, nulla testis calce, nullis salibus, aut particulis lapideis inquinata : ea *aquarum omnium levissima* ; ea cum primis *Diuretica*. Medicamentis autem urinam moventibus præmitti, & nonnunquam interponi oportere ventrem & ductum alimentarem inanientia, lippis notum & tonsoribus.

Libet his adjicere, in *Dysuria*, (quæ *Calculo* interdum accedit) quoties a ductuum urinosorum spasmis oriatur ea, nihil efficacius, conducibiliusve, quam *Opiata* cum *Diureticis* juncta ; quibus, utut urinæ alias sistendæ illa conferant, simul & remittantur spasmi, & urina cieatur.

At, a dorsi dolore, de *Renum Calculo*, ne quis temere statuat, unum his subjungam. Olim vetulæ, hydrope interemptæ, *Anatome* interfui ; quæ, cum per annos aliquot eo dolore gravaretur, *Calculoque* effici a familiaribus haberetur, illo tamen, ut ex cadavere aperto constitit, omnino caruit, *Reni* dextro ingens adnata erat *Hydris*, sive *vesicula*, sero insipido plena, doloris fortasse causa.

Atque hæc de *Calculo Renum Arthritico*.

HISTORIA I.

Calculo & Chiragræ una occurrentibus, facta simul Medicina.

Quarto ab urbe lapide, prope *Isœ* ostium, sexagenarius *Arthriticus*, simul & *Chiragra* & *Calculo* doluit: illam ostenderunt tumor articularum; aliaque *Arthritidis* indicia, ordine & concursu *Pathognomonico* apparere visa: hunc in dorsi regione lumbari dolor, ut & intestinorum quasi colicus; quodque fidelissimum hac in re symptoma, *Arenulæ* sub id tempus excreta.

Morbis adeo diversis ægrotanti, ea dari par erat, quæ contra utrumque prodesse, quæ neutri faverent. Itaque therapiam, *Balsami Peruviani* quantitate, bene magna & frequenti, cum vehiculo idoneo, tentavi, atque adeo perfeci. *Balsami* hujus guttæ plus minus x. ex *Syr. Balsam. coch.* j. bis, vel summum ter in die, sunt adhibitæ. Hoc, qua *Cardiacum*, in extremas corporis partes *Arthritidem*, qua lubricans, & *Terebinthinum*, e *Renibus* arenulas per urinæ vias expelli fecit: sicque una eademque fidelia, non infelicitè duo simul dealbati sunt parietes.

HISTORIA II.

*Adversus Calculum Arthriticum
Prophylaxis.*

Viro præcellenti & eximio, qui diu *Arthritide* pervices doluit, aliquando etiam calculo, in se a patre derivato; cum adversus utrumque malum *Prophylaxin* exigeret, consului; ut exercitatione pertinaci, & crebra, sabulum e *Renibus*, e sanguine materiam alienam exturbaret, itaque salutis suæ prospiciens, senectæ viam faceret incolumi.

Facta per *Lac Scammonii* purgatione, aquas hausit vir illustrissimus *Barboniensis*, menses binos, libere & recte equo assidue corpus exercens. Hic adjunxit *Balsami Peruviani*, stomacho non ingrati, *Renibus* utilissimis, guttas aliquot, omni nocte, ex *Syr. Balsam. coch.* j. cum ejusdem aquæ haustu. *Renes* inde melius habuere, sabulo purgati. Dorsi calor, qui ægrotantem multum affligeret, evanuit. Hac, & hujusmodi *Prophylaxi*, aquis scil. purgantibus & diureticis, statis anni temporibus, iteratis,

equitatione, ambulationeque fere continua, contra malorum par crudele, hodie vir insignis se defendit, momenta vitæ propugnat.

Fatendum autem, quod hujusmodi *Prophylaxis*, non nisi corpore perpurgato, & evacuationibus generalis exonerato, in usum trahenda sit, ne videlicet in *Penes* sanguinis impuritates effundantur. Quinimo notari fas est, quod ipsæ interdum aque *Diuretica*, succum lapidescentem habentes, non tam e *Renibus* arenam eluant, quam iis impertiant, & in iis concretam faciant. Atque hoc casu, *Infusum Tee*, aqua pluviatili confectum, *Diureticis* illis aquis anteponendum.

HISTORIA III.

*Calculus Arthriticus, Vertigo Arthritica,
& Arthritis regularis se mutuo
excipientes.*

Quoniam vero a nonnullis, de *Calculo Arthritico* dubium existimetur, utrum ille concretio sit *Arthritica*; an non potius ex sanguinis recrementis, emeritis, & inutilibus; per quietem, & vitam nimio plus inertem; in *Renibus* depositis, nata atque facta: unum his subjiciam, quod (opinione nostra) tollendo huicce dubio omnino satisfecerit.

Vir summa familiaritate mihi conjunctissimus, ex intervallis diu *Arthritide* recta conflictatus, enormem eam ætate suprema habuit. Loco rectæ; primum vertigine *arthritica*, longa utique, ancipiti, & periculosa (quippe, qua in humum ne irrueret, sæpe quidem summum erat periculum) est correptus. Postea vero quamprimum iste capitis affectus inclinavit, æger *Renibus* dolere cœpit, calculosque varios, non sine ingenti cruciatu, per urinam excrevit: nunquam autem *Calculo*, nisi *Vertigine*, & *arthritide* regulari liber, ægrotavit.

Post menses aliquot, *Pedibus* denuo laboravit; verum eo tempore, tum *Vertigine*, tum item *calculo* immunis. Et quidem ita res erat, ut, tametsi horum affectuum alio, atque alio posthac creberrime; tamen, eodem tempore non nisi uno semper, aggravaretur. His etiam adjiciendum, quod eundem ordinem minime tenuerunt hi affectus; verum *calculus* interdum, post *arthritida* diu vacantem, (cum in sanguine nova materia coacervata, novaque facta esset

esset illius germinatio) ægrum per se invasit; interdum *arthritis* paroxysmum e vestigio excepit, tanquam morbus ei geminus, a communi stirpe oriundus; vel potius, in alia corporis regione, ejus pars altera.

Magni vero hic momenti esse arbitror notare, quod ex quo *arthritis* se adjunxit interdum *Vertigo*; alias *calculus*; pro istorum morborum malitia frequentiaque tenuata sit *arthritis*; & quidem ea proportionem, ut ab illa demi, quicquid istis attribui, confirmetur.

Istorum autem morborum ortus, incrementum, ordo, vicissitudo, & inter se relatio, nunquid aliud significant, quam, quod ii omnes simili gaudeant causa continente; quæ nunc, in artubus *arthritis*dem; nunc in capite, *Vertiginem*; nunc, in renibus, *calculus*, & quidem hosce omnes, pro istius causæ renovatione, viribusque, tum crebros, tum vehementes pariat, & producat.

CAPUT X.

De Asthmate Arthritico.

ART. I. **T**Ractata imi ventris *arthritis*de, ad eam jam progredior *anomaliam*, quæ est *Thoracis*, quæque respirationis organa præsertim afficit. Ubi primum de *Asthmate Arthritico*; tum de *Tussi Arthritica*, de *Phthisi Arthritica*, deinde sermonem faciam.

Asthmata sunt hujusce tituli permulta, quæ a causis alibi locorum; nec in *Pectore* extantibus, oriunda, (nausæ, verbi gratia, colicæ, anginæ, vel hujusmodi morbo alicui *arthritico*), κατὰ συνπαράθεσιν, ἐκτείνονται; & istorum, quibus superveniant, morborum Capitis, sunt vel dicta, vel dicenda. Unum, hoc Capite, *asthma* dicam *arthriticum*, nimirum ἰδιωματικόν.

II. Hoc affectu omnium creberrime laborant ii, quibus breve, vel aliis male compositum pectus, aëri reciprocando minime accommodatum, & quorum parietes *asthmate* & *arthritide* fuerant, maxime vero si utroque, gravati. Hic enim, multo apparatu & molimine, producendo huic affectui, quasi studetur: cumque, nato & perfecto homini, respiratio usus sit perpetui, & ad vitæ opus sustinendum, conti-

nui; mirandum non est, illius impeditiorem, & difficultatem aliquam insignem, sæpe periculofam, sæpe lethalem esse.

III. *Asthmati* huic inferendo (ut, de aëre spisso, carbonum fumo, ventis, aliisque tam hujus *asthmatis*, quam vulgaris & primigenii causis evidentibus, nihil dicam) huic, inquam, inferendo confert miasma *arthriticum*, pectori inflictum; illius utpote causa continens, & conjuncta: itaque ut, tametsi plures illud causas evidentes & remotas, alio sc. tempore & corpore aliam) unicam tamen habeat continentem, & proximam, videlicet *arthriticam*.

IV. *Pectori* miasma nunc opiata, perperam adhibita, insigunt; nunc quicquid alia *arthritida* repellat, & pectus appelli faciat; nunc, urgente nulla vi externa sive causa evidente, pectus angustum, gracile, gibbosum, breve, aliterve male formatum, ipse per se *arthritis* intrat, tanquam domicilium maxime conveniens. Interdum evacuatione aliqua solemnī (qualis est fluxio sanguinis, ulcus, vel etiam partus naturalis) suppressa, quæ miasma sensim amandare solita est; in sanguine cumulatam illud, neque, uti par est, in articulos expulsum, pectori committitur, *arthritica*, utero ex more non gerentis, *asthmate* hunc in modum aggravata, exemplum memoratu dignum his subnectam.

V. De hujus *asthmatis* ἰδιώτης, & de ejus natura plane *arthritica*, ut palam fiat. advertendum est, *asthma* nunc e vestigio sequi *arthritida* regularem intercissam; & ἀπὸ τῆς ἰσότητος, ad ea, quæ intus sunt, materiarum vitiosæ fieri μεταβολήν, aperte monstrare: nunc, e contrario, *asthma* in *arthritidem* mutari; antiquam sedem, & avitam regna, se denuo ingredi, materiam indicare: nunc, hos affectus se mutuo excipere, vicisque agere alternas: unc ab *asthmate*, *arthritidem* vinci, absorberi; uti nonnunquam, ab *arthritide*, *asthma*. Qui quidem istorum malorum ordo, reciprocatio, habitudo, & ratio inter se nihil magis significat, quam quod, ex eadem materia, *arthritis*di propria, nunc in artubus, nunc in pectore vires exercente, utrumque producat; & *asthma* illud sit vera *arthriticum*. Quod quidem enunciatum eo magis probabile, quoniam *arthritidem* sua gaudere materia, peculiari & propria, quæ in alias aliquando regiones evagetur, omnino constat; *asthma* vero, non tam a propria ulla materia, quam a vitiosa

tiefa aliqua communi, (five alia quavis inimica, & aliena) una cum mala corporis febricitatione, partiumve respirationi distarum imbecillitate, causa hujus morbi privata, fieri.

VI. Quæ vero hujus profapia *asthmata* duum sunt generum; alterum (uti de exquisito *asthmate* pronunciatum esse solet) siccum: alterum humidum. In sicco isthoc *asthmate* anhelum videre licet *asthmate* anhelum videre licet *arthriticum*, & tanquam animam agentem, spiritu difficili, respiratione brevi, pectore gravato, tussi vel nulla vel mediocri, sputatione parca laborantem. Qui vini spiritibus dediti fuerunt *arthritici*, eos sicco hoc *asthmate* plus semel agrotare novi.

Asthmate, quod *arthriticum* est, humido affecti, tussiendo sputum plerumque crassum, & viscidum, idque nonnunquam vitreum exantlant; unde levare solet *asthma* donec, nova in *Pulmonem* missa, feri vitiosi copia renovabitur: hoc autem, in teneris corporibus, tenui, laxoque sanguine, & ad colligendum apto, donatis, & quidem autumno maxime, locum habere mos est.

VII. Pituita crassa involvitur; una cum eo, *Pulmoni* incurritur; tussique ejicitur miasma *arthriticum*: sic, ut permultos interdum annos, inversa *arthritis* hac via fugam capebat; eaque sputatione, (simili fere modo, atque paroxysmo *arthritidis* regulari) a periculis gravioribus defendatur ager. Et quidem *arthritidum*, quotquot observantur, *anomalarum*, nullæ videntur esse benigniores, aut minus timendæ, eo, quod nunc dico, humido *asthmate*, & diarrhœa *arthritica*: eo videlicet, propter materiam *Pulmonibus* emissam; hac autem, ano.

VIII. Ex diversis hujus *asthmatis*, qua sicci, qua humidi symptomatibus, opinari fas est; in priori, membranas, nervos, aut musculos spiritui trahendo inservientes affici, & iis materiam impingi; unde *Respirationis*, cum siccitate labor: in altero, miasma, sanguinis sero implicatum irretitumque, una cum eo *Pulmonibus* committi, & iis inhærendo respirationem impedire: atque pro diversitate symptomatum, diversa morbi hujus *Subiecta* esse, non temere judicamus.

IX. Nonnunquam equidem *arthritis* (quod ante traditum) ipsis a carceribus, ipso ab initio devia; neque pede, neque manu salutata quidem; *Pulmonem* adit, occupat, laceffit, tanquam *asthma* germanum; nec ab eo facile distinguitur; donec, ætatis progressu, aliquando foras erumpat, artus exerceat, recteque se gerat. Cujus quidem in artus translationis, hoc effectum esse solet, quod, quo rectius se gerat *arthritis*; eo *Pulmoni*, & posthac reliquo corpori universo, melius. Qua de causa licet existimare, malum isthuc nihil aliud esse, quam *arthritida*; primum in pectore deviam, ipsoque principio *anomalam*; postea suo loco regularem.

X. Hujus *asthmatis* Πόρον quam legitimi, veri, & genuini, longe alia videtur. Legitimum enim, curatu difficillimum: Juvenes non sine magno labore, Senes nunquam eo liberari dicuntur. (1) Contra vero exploratum, hoc *asthmate* laborantes, facilius allevari, sæpius liberari; & quidem interdum, (quod de vero *asthmate* rarius affirmari potest) ex toto.

Ut autem in re tam multiplici distinctius dicam, adjiciendum, *asthmate* isthoc humido gravatos: sputatione, quod dixi, servatos, sæpe diu vixisse: arido effectos maximo sæpe in periculo versari; brevi tempore, non raro strangulari; sed & ope medica opportune adhibita, factaque humorum metastasi, nonnunquam subito restitui: denique, nulla arte sublevatos, eo se modo habere, & demum e vita cedere, tanquam *asthmate* legitimo oppressos.

XI. Curatio tollit impedimentum respirandi; vel e corpore illud evocando, vel in artus amandando. Materiam e corpore vitiosam evocat *Vena sectio*, & *Purgatio*; quarum illa plethoricis, & nimio sanguine distentis; hæc gulæ deditis, satietate læsis utilissima: utraque vero talis sit, oportet, ut ab *arthritidis* οὐκ ἐκ τῆς ἐξουσίας expulsio promoveatur. Hoc autem optime fit sanguinis detractione mediocri; purgatione quæ per *Drasticum* aliquod, & sanguinem exagitans, peracta. Detrahantur igitur, (quando res postulat, & vires ægri patiuntur) unciz quasi novem: *Enema* brevi post injiciatur: die proximo *Purgans* (ex aloë, Syrupo domestico, Pil. cochiz, vel ejusmo-

(1) Vide Rivorium, Cap. de *asthmate*.

ejusmodi aliquo) sumatur, sine paregorico vespere sequenti propinando.

Post evacuationes haece generales, in sicco *asthmate arthritico*, magnarum virum & momenti sunt *Sp. c. c.* alique istius generis *Volatiles*, & flores *Salis armoniaci*.

℞. Pul. e chel. c. c. conf. Tussilag. ana ℥j. Flor. Salis armon. ℥ss. Syr. Balsam. q. s. f. Bolus, quinta, vel sexta quaque hora, cum idoneo vehiculo demittendus.

In *Humido*, *Vesicatorium* dorso inter omoplatas applicatum, allevandis *Pulmonibus* summopere confert. *Pituicam* movent, eodemque tempore *Podagram* expellunt e *Sulfure* preparata; qualia sunt *Tinctura*, *Balsamum*, & *Flores Sulfuris*: uti etiam, his affinia, & plane congenera, *Gummi antiasthmaticum*, *ammoniacum*, *Bdellium*, *Balsama Naturalia*, *Peruvianum*, *chiliense*, *capi-vi*, &c. Placet *Tinct. Sulf. gut. xx.* vel *Balsami seq. gut. x.* ad *xv.* ex *Syr. Balsam. cochl.* dare; & sexta, nona, vel duodecima quaque hora, prout opus fuerit, repetere.

℞. Tinct. G. Guajac. Balf. Per. ana p. aq. misce.

In utroque vero, tam humido, quam sicco *asthmate*, remediis hisce, cum vehiculis idoneis, uti juvabit; usque dum *Pulmoni* conciliabitur quies, & in ducendo spiritu facilitas.

Clysteres, & *Purgantia*, quae in vulgari *asthmate* non incommode plus vice simplici adhibeantur, in *arthritico* hocce post primam vicem minime praescribenda: ne videlicet humorum in artus eruptionem, quae rebus quibuscunque aliis longe praeferratur debeat, sufflaminetur.

Pulmoni phlegma quod impactum est, *Oleo amygd. d. Ol. Lini*, *Syr. Balsamico*, *cap. Ven.* & aliis ejusmodi *anacatharticis* movendum, excreandum.

In *Paroxysmo*, liquidem urgebit ille, neque auxiliis supra dictis mitigabitur; maxime valet *Oxymel Scillit.* vel *cochleatim*, & per vices datum, ut eo spirandi spatium adaugeatur; vel ea dosi, qua vomitio cieatur, humorum inclinatio mutetur, & in articulos vertatur. Certe, per unam vomitionem, *arthritidem* ex *anomala Regula* fieri; plus semel novimus. Nonnullis in *Paroxysmo* profuit *Fumus Tabacci*, *Potio coffee*. Valent suo loco *Frictiones*. Non magni aestimantur *Unguenta*, vel *Linimenta*, *asthmaticis* vulgo commendata, in re praesenti parum valitura.

Prophylaxis in *Humido asthmate*, praemissa purgatione: instituitur per *Diuretica*; quae serum apte & tempori amendant: per *antiasthmatica*; quae *Pulmonem*, & spirandi organa tueantur: per *Fonticulos*, dorso inter omoplatas apertos; vel *Epispastica*, maxime diuturna: perque ea, quae *arthritidis* primigeniae *Prophylaxin* agant. *Siccum* autem *Marte* cum *antiasthmaticis*, *Gummi* puta *ammoniacum*, &c. juncto; iis videlicet, quae spiritus animales una cum pectore respiciant, sugandum. In utroque, usus est immensi aer apricus, & probe agitatus; uti etiam bona victus ratio: quam ut teneat aegrotans, fugiat necesse est, τὸ πικρὸν τῆς διαίτης, a Medicis non sine causa passim improbatum, & cibo simplici vescatur.

HISTORIA I.

Adolescens, ab Arthritide Asthmaticus, Empirici Narcotico peremptus.

AD trium supra viginti annorum adolescentem, in regione urbis septentrionali, vergente saeculo superiori, anxie & propere arcessebar. Ut aetatem hominis adimpleret, a natura ille destinatus esse videbatur. Erat enim forti, & quadrato corpore, vultu colorato, uno mialmate *arthritico*, quod a patre acceperat, infectus. Sanguinem, ab ipso vitae exordio vitiosum, ipse malis moribus non parum inquinavit. *Spiritus ardentes* avidè potavit: malam victus rationem affectavit: coctionem, quasi de industria, pessum dedit.

Podagra, quae paroxysmum regularem plus semel ediderat, & dudum artus exercuerat, nescio qua de causa relictis artubus, ad ea, quae intus sunt, translata, respirationis organa invasit: hinc *Pectus* aggravatum, spiritus difficilis, respiratio brevis & laboriosa.

Visa est materia, vel e musculis respirationi inservientibus aliquem, vel eorum membranas occupasse; vel in nervorum *Paris vagi* fibras se insinuasse. *asthma* enim siccum erat; nec quicquam *Sputum*, nec quicquam *Tussim* sibi adscivit.

Dum ita res erat, Empiricus e laniorum vico, ad vitam & salutem (proh Deum atque hominum fidem) instaurandam, est accitus. Ille, historiae neque caput, neque finem ob oculos habens, *Empirici* familiari & usitata, multa factitavit; nihil egit: donec elapso pene quadriduo, propter *γυναικα* (hanc

(hanc argumenti speciem obtendebat) paragoricum audax, & nequam, sub noctem dedit. Hinc illæ lacrymæ : hinc ille properus ad Medicum nuncius.

Ægrum ego ἀσθματι inveni, moribundum, & jam per totam, quæ præcesserat, noctem, animam agentem. Rem astantibus palam feci, & (honore habito) discessi. Τὸν ἰσχυρὸν, τὰ ἴσα.

HISTORIA II.

*Asthma siccum Arthriticum, Venæ sectione
& Cardiaco sublaturum.*

Ingenio, scriptis, & eruditione vir præclarus, Rad. Bobun, hypochondriacus, asthmaticus, cruditatibus acidis, dolore artuum *arthritico*, sæpe vago, interdum fixo, diu afflicatus; dolorem istum nuper acutum, ex improvise abruptum, & intercisum habuit. At brevis ista mali intermissio. Ægrotantem; olim collegam meum, & eo tempore convictorem, visitavi, lecto inveni prostratum, jam per noctem anhelum; & ea respirandi fuit difficultas, reciproca-tione crebra quasi animam agentem. Neque *Sputatio*, neque *Tussis* erat ulla. Pulsus in carpo fortis, & elatus.

Ex omni parte re perpenſa, materiam *arthriticam* in *Pulmonum* adyta, in eorum membranas, nervos, aut iis movendis intervenientes musculos, per *Metastasis* ingredi, & eos occupare censeui.

Pertusa meo consilio vena, missus est sanguis; cui, post horas aliquot, innatavit, gelatinæ viscidæ similis, placenta. Deinde, ut e castris inique usurpatis hostem exturbarem, *Spirit. Volat. Oleosi* copiam, ex idoneo vehiculo, propinavi; & pro rei necessitate repetii. Auxiliis hisce paucis, & paupertinis, sed opportune adhibitis, sine difficultate respiravit æger: *Pulmone* liberato, & relicto, in pedum & manum articulos (non novos illi locos) fugatus est hostis: confirmatus æger.

HISTORIA III.

*Arthritidis in Paralyſin & Asthma
Metamorphosis.*

Quidam artis sciens chirurgicæ, semel aut iterum in anno *arthritide*, per puſtra quatuor recurrente, multum ægravavit; atate vero proveſtus, neque tam cre-

bra, neque tam vehementi, per biennium minuta, & sensim mitigata est *arthritidis*; cum in ejus locum mala, multo graviora, simili modo & mensura, succedere: sinistri nempe brachii, pedisque resolutio, cum totius lateris imbecillitate: deinceps *asthma*, tam molestum, tamque importunum, ut non nisi recta cervice spiritus traheretur. Siccum autem erat *asthma*, paroxysmos habens, sed nullo *Typo* regulari signatos. Mari æger diu artem exercuerat; ubi *Spiritum Vini* nimium pytiſſando, tum *arthritidi*, tum *Paralyſi*, tum etiam *asthmatis* viam fecisse, & fundamenta jecisse non immerito censeatur.

Ita laboranti *Venæ sectio*, *Oxymel. scillit. Purgatio - Antiasthmatica Podagroris* juncta, cum aëre aperto, nonnihil profuere. At cum illa morbi natura esset, quæ nervos, eosque valde afficeret, quæ spiritus in iis contentos, (id est, intimum totius corporis humorem) mirifice debilitaret, eum ætas simul ingravesceret, ægroque fere jam inutilis esset medicina; partim morbis, partim ætate consumptum eum, sine nullo in articulis dolore renovato, abstulit ἀσπας θάνατος.

Eatenus vero rei nostræ conducit Historia; ut ex ea disci potest, maxime vero ex denſo morborum ordine; subitaque mutatione *arthriticam* in nervos transferri materiam; & tum *Paralyſeos*, tum *asthmatis*, causam fieri proximam, & continentem.

HISTORIA IV.

*Arthritis, in Asthma, & Hydropa,
desinens.*

Mulier *Exoniensis*, brevi pectore, neque respirationi satis apto, diu *arthritica*, nuper omni dolore libera, nec pro more utero gerens; propter hæc causas, annum circiter quadragesimum, *asthmate* & *Tussi* corripiebatur; illa non parum, isto multum excruciat.

Audita morbi historia, symptomatum ordinem & momentum meditantem mihi, luce clarius videbatur; illius materiæ, quæ per iterum, perque articulos soleret amandari; quod in corpore relictum, vel de integro cumulatam esset; in respirandi organa infundi, eorumque motum impedire. Quia quidem opinione ductus, ut aëre puro, & aperto, frueretur ægra, (perpurgato prius corpo-

corpore) rursus illam mihi; sed *Antiasthmaticis*, & *Arthritidem* expellentibus munitam. Neglectis autem medicamentis nulla in articulis visa est *Arthritis*: verum e contrario nova, tum in imo, tum medio ventre, coacervata est materia: unde tantus abdominis tumor, spiritusque tam gravis, ut non nisi cum sono & anhelatione spiraret ægra, propemodum strangulata.

Clysteribus ex urina crebris subducta est alvus, tumor abdominis sublatus: atque sic amotis impedimentis, *Sp. C. C. Succin.* aliisque *Podagrogis*, uno eodemque tempore, extrusa est in articulos *Arthritis*; & amplificatum respirandi spatium: atque adeo (quod attendendum) æqualiter.

Hinc aliqua curationis spes; at fallax, & inanis. Natura enim deficiente, neque operam conferente, frustra omnis medicina. In *Hydrops* incidit ægrotans, *Diarrhæa*, & narium *Hæmorrhagia*, symptomaticis, & sæpe recidivis, comitatum: quibus demum oppressa, mortem, omnium morborum finem, oppetiit.

HISTORIA V.

Asthma, cum *Iliade malorum*, *Arthritidos defectu* regularis, exortum.

VIR Reverendus, quo cum magna per-
vetusque mihi familiaritas, natura firmus, temperamento sanguineo, vultuque colorato præditus, post juventutem non tam intemperantem, quam delicatam, & dapsilem, matura ætate corpulentus, & habior factus est; annoque 1674. & deinceps, *Arthritide* per vices ægrotavit.

Postea solum, & cælum, (quorum illud siccum, hoc perflatum erat) humido, & minus salubri mutans, ætateque procedens, *Arthritide* non, ut antè fixa, verum per artus, ad instar *Rheumatismi*, vaga & erratica, laboravit. Sed neque diu morbus istud adeo retinuit: nam paucos post menses, quam in corporis ambitu ille sævierat, *Catarrhis* & *Tussi* correptus est æger: unde sputum magna ex parte laboriosum; utpote crassum, viscidum, ab imo *Pectore* citatum. *Tussi* accessit *Asthma*, grave profecto, importunum, & quod ægrotantem multos annos, autumnæ maxime & tempore hyemali, divexarit. Quamvis autem *Asthma*, nec interdiu unquam, neque noctu penitus cessavit; ea tamen natura erat, ut eadem nycthemeri hora constanter redux, (tan-

quam ad horologii fidem) & quidem multos in menses continuos, paroxysmum ageret. Dum ita res erat, *Vena sectione*, *Vomitu*, *Purgatione*, *Desolitis Pectoralibus*, *Spiritibus*, *Gummis*, &c. *Antiasthmaticis*, plus semel levatum *Asthma*, minime vero sublatum.

Alias *Hæmorrhoidum* tumore, magno utique, & diutino, torquebatur æger; eoque tempore illud præcipue notandum, quod neque spiritum difficulter traheret; neque *Articulis* doleret.

Alias *Vertigine* tenebatur, adeo vehementi, ut quæ ægrum neque ambulare pateretur, neque erectum stare: durante vero illa, cætera bene se habuit.

Mense Junio, 1685. ex vino nimio plus poto, incidit in *Pleuritidem*, *Hæmoptoe* comitatum: auxilio, cum plerisque aliis, sed omnium multo maximo, fuit sanguinis detractio, iterata, copiosa. *Pleuritidi* nondum penitus evictæ, subnata *Arthritis*, in extremis corporis partibus, regularis. Ea vero, nescio qua de causa, sive quiescente, sive repulsa; febricitavit denuo ægrotans, *Angina* affectus. *Angine* paulo post suborta est *Arthritis* (uti post *Pleuritida*) regularis.

Anno plus minus 1687. suadente nescio quo, fortissima sumens *Hydrotica*, (ut erat æger remediorum empiricorum amanti-
mus) sanguinem, a natura calidum, adeo exagitavit, ut *Impetigo* statim erumpens corporis superficiem mire turparet. Tumore lato, & inæquali, facies inflammata est. In *Squamulas* subalbicantes, & fursur, abiit tumor; eoque exeunte, loci, tanquam a *Variolis*, rubor apparuit. Multum, & diu, gravissimo hoc affectu laboravit æger. Alio enim loco restituto-sanatoque alium, sed a novissimo distantem occupavit; & quidem ita, ut maculas crescentes, maturas, arescentes simul semel aspicere daretur. Facies autem maxime, & pene continuo scedata est. Cui addendum, quod æstus corporis universalis, pruritus, & ex eo spirituum inquietudo, ægrum, molli teneraque constitutione præditum, supra quam dici potest, excruciauit. *Impetigo* sanguinis missione, purgantibus cum calomel. sæpius iteratis, & *Antimoniatis*, est curatus.

Verbo dicam; ex quo *Arthritis* idonea, & regularis, ægrum deseruit; affectu hoc, vel illo, raro autem mitiori, & minus periculoso, annis fere singulis, urgebatur; sæpe tantum non opprimebatur.

Q

Ex

Sydenham Opera Medica Tom. II.

Ex *Impetigine*, mutata rerum facies; namque, anno post uno, vel altero, redux *Arthritis* (tanquam ex postliminio) paroxysmos *αὐτὸς ἑαυτοῦ*, aptos & satis crebros, agitavit. Nihil opportunius, nihil commodius esse potuit; nam *Arthritidis* denovo *regularis* ope, servatus ager, per extremum vitæ decennium multo magis, quam solebat esse immunis, non tam morbis, quam ætate fractus, e medio excessit.

Hic animadvertendum (quod quidem maximi, in re præsentī, grande pondus argumenti) agrum, quo tempore sive *asthma*, sive *Tumor Hemorrhoidum*, sive *Vertigo*, sive *Pleuritis*, sive *Angina*, sive *Impetigo* locum habuit, *Articulis* nunquam doluisse; nec quidem, in istorum morborum intervallis, ita crebro, aut tam graviter, atque ante *Asthma*: unde verisimile, hos affectus, aliqua saltem ex parte, per materiam *Arthriticam*, (in pulmone *asthma*, & singulos affectus in singulis eorum locis facientem) excitari. Cujus enunciati fides eo confirmatur, quod in *arthritidem*, etsi minutam, & parvam, tum *Pleuritis*, tum etiam *angina* semel; *asthma* vero sæpius mutaretur. At, quod (testium mille instar) omnem argumenti metum adimat, hoc est; per *arthritidem*, iterum recte, & debitis ex intervallis, edentem paroxysmos, tum *astmate*, tum *Impetigine*, ne dicam alios affectus omnes, agrum liberari: difficillimisque vitæ annis, supra quam spes, aut amicorum expectatio fuit, defendi.

Minime vero credendum, morbis hisce procreandis unam sufficere materiam omnibus *arthriticam*; quin potius serosa sanguinis eluvie v. gr. in *astmate*, eam involvi, irretiri, & simul cum aliis sanguinis recrementis, per *Pulmones* exterminari. Quod vero de *Asthmate* propositum, de *Impetigine*, cæterisque affectibus jam dictis, aliqua parte affirmari posse, cogitandum est.

Hinc opinari par est, ægrotantem illum, bono corporis habitu a natura donatum, vitæque ratione non adeo prava, aut inepra usum, in tot gravissimos affectus, forsitan non alia potius de causa, incidisse, quam quia *Arthriticum* miasma, (quod *αὐτὸς ἑαυτοῦ* ex more usitato, & regulari minime, sic, ut debuit, expulsum fuit) in ea, quæ intus sunt, ferretur; ibique dictos, vel ex toto, vel ex parte, eaque nunc majori, nunc minori, faceret affectus.

Unde probabile, si longo illo multorum

annorum spatio, (discessum inter reditumque rectæ, in artus molestæ, & vehementis *arthritidos*) quo tot tantisque modis ager afflicatus erat; habita *arthritidos* ratione, fuisset illa tractatus, & in *arthritide* reducenda, locata fuisset opera; medendi viam tutiorem; agroque multo fuisse commodiorem.

HISTORIA VI.

Asthmatis Vultum induens Arthritis.

Nonnumquam artus, ut ante dictum est, relinquit *Arthritis*, & ingressa *Respirationis Organa*, vel ea continenter urget, vel accessibus adeo crebris, & molestis; ut, in illa corporis regione, non tam peregrinus, quam morbus indigena, & vernaculus esse videatur. Hujus rei exemplum hic subiciam, mihi notissimum; virum medendi arte percelebrem, eamque hodie feliciter exercentem, fuit ille parentum altero, diu *Asthmatico*; altero *Phthisico* procreatus; brevem, & male formatum habens *Thoracem*, tanquam ad *Asthma* factus, *Pectoris* affectibus ab ipso ortu proclivis existimari potest.

Post adolescentiam floridam, sed & temperatam, ætate matura, laboravit *arthritide*, crebro recurrente, satisque apta. Anni aliquot hunc in modum agebantur, cum a *Catarrho* spirandi difficultas *arthritidi* succrevit, progressu temporis ingravescens. Huc non parum contulit aer, summo carbonum salinis (e vicino mari) vaporibus, & officinarum, quæ in propinquo erant, graveolentia repletus. Flante euro, vel euro-aquilone, raro ille sine difficultate spiravit; ut vel ea de causa, (vento nimirum eo exorto) sæpe lectose ejicere & corpus erigere cogeretur. Eo durante vento, semper *Δυσπνοία*; cessante eo, vel in alium mutato, tanquam incantamento, levatus est. Cæna interdum absuit immodica, & in victu error fere omnis. Obsuit cutis, alias a frigore, alias ab aëre nimis spisso, constipata, & impedita *Δυσπνοία*. Quin etiam *Asthma* nonnumquam intulit, ab equitatione, vel ambulatione, vel alia aliqua exercitatione nimia, fatigatio; uti etiam nonnumquam aëris, & planetarum ardor æstivus: unde spiritus animales, sive exhausti, sive debilitati, recipiendo pectoris motui vix sufficerent. Sæpe a cruditatibus incepit *Asthma*: namque inde flatus; inde abdo-

abdominis distentio ; Inde thoracis coarctatio, in spiritu trahendo ; inde labor, & difficultas.

Sanguis huic ægroto, *Inflammationi* contrahendæ admodum pronus erat : sæpe in *Peripneumonias*, aliasque *Febres*, (nunc *Sudoribus*, nunc *Diarrhœa*, nunc *Urinæ profusio* signatas) evehctus ; semper autem pertenuis, quique minima de causa colliqueret ; qui nunc per renes efflueret ; *Pulmones* sero qui nunc obrueret, & spiritum elideret. Illud autem serum, post aliquam in *Pulmone* moram, vitreo sæpe colore exantlatum est.

Ingruente *Asthmatis* insultu, reliqua ejus symptomata antecedere solebat ventriculi inflatio, cum intestinorum vermiculatione, & dejectione postmodum insequente : magna *Pectoris* erat constrictio ; lateris præcipue dextri, subtus mamillam : ubi loci æger in omni *Asthmate*, potissime torquebatur.

In paroxysmo *Asthmatis* (quoniam unum idemque raro diu profuit) medicamenta in usum trahebantur varia. *Mixtura* nempe *Riveriana*, *Tabacci Fumus* *Tubo haustus*, *Empl. Epispasticum* *Dorso inter Omoplatas* admodum. *Ol. Amygd. d. cum Diacod.* *Potio Tee*, cum adjectis *Bals. Sulph. Terebinthinati* guttis aliquot : at omnium maxime, certissimeque, *Inflationem* mirum in modum cicuravit, compescuit *potio Coffee*.

Ad *Prophylaxin*, & adversus *Asthma* sui tutelam, æger, (auxilium ab exploratis sumens) *Eccoprotico* idemidem adhibito, tempori cruditates exterminavit ; itaque malum anticipavit. Profuit *Decoctum Corricis*, eo namque sanguini robur conciliatum. Profuit diætæ ratio accurata ; cœna parca, vel nulla ; loco cerevisiæ *Vinum Burdegale*nsis, aqua dilutum ; profuere *Fonticuli*, dorso aperti. Id autem, ut recte concoqueret, & frigus evitaret, ægro præcipue curæ erat.

At, quod rem nostram maxime attingit, eamque non parum illustrat, ex quo tam gravi *Asthmate*, omni mense, ne dicam hebdomade, recidivo laboravit æger (id est, per decennium ultimo lapsus, & quod excurret) rarius, minus ille doluit articulis : & quod in primis notandum, hujusmodi dolor, quoties occurrit, e vestigio *Asthmatis* insultum est securus, eique conexus : ut, ab eadem causa communi, nempe *Arthritica*, non immerito fieri credatur uterque hic affectus ; & quod *asthmatis*, natura tam *arthritico*, per *arthritidis* paroxysmum regu-

larem, (modo vires aliæque ægri res annuerint) utiliter occurratur.

Huic quidem ægro persuasi, ut quo fieri posset artificio, præsertim *Marte*, *Pbenigmis*, a pectore longe arceretur, in extremas partes evocaretur *Arthritis* ; ea nimirum opinione ductus, quo plus *Pedibus*, eo illum minus *Pulmone* laboraturum. Neque huic opinioni refragatus est æger ; imo maxima ex parte consensit : istam autem medendi viam exclusit ægri constitutio tenera, *Pbenigmorum*, aliorumque, quæ dolorem excitarent, usum non admittens. Quæ ad hanc rem adhiberentur omnia, *Pectori* ne obessent, *Asthma* ne inferrent, potius quam ut *arthritida*, cavendum erat.

Ut autem *Historiæ* nobili finem imponam, habetis *arthritidem*, dolore articulorum, tumore, certisque omnibus numeris absolutam, germanam, exquisitam ; habetis, inquam, eam castra mutantem ; pectus invadentem ; idque sic afficientem, ut in *Asthma*, morbum illius regionis proprium, & vernaculum, mutari existimetur.

HISTORIA VII.

*Ab Arthritide percussa, Pectoris
externi Oppressio, Spiritus
impeditus.*

Vir insignis, illustri domo natus, post adolescentiam opiparam, & non nimis siccam, sub ingressum juventutis *arthritide* correptus est ; eaque multos annos apta, & regulari laboravit. Pede doluit, cum, a frigore percussa, *arthritis* sternon, & respirandi organa derepente invasit. Pectus hinc gravatum : impeditus spiritus : nulla vero expuitio, nulla *Tussis* erat, ut in membranas musculosque, pectus ambientes, materiam impelli vitiosam, omnino judicemus.

Vomitum, quando illi proclivis erat, per *Decoctum Cardui* citato, tamen non multum ejecit, dilatavit tamen spiritum, & caput dolore affectum allevavit. Visum erat *Diaphoresi* materiam evocare ; quem in finem *Epithemate* (ex *Aq. Regiæ Hungariæ*, *Tinct. Lavendulæ*, *Spirit. Vol. Oleos.*) immerso lintea, *Pectori* applicantur ; stragulisque simul pro rei necessitate adjectis, sudor elicitur exoptatissimus, utilissimus. Verum materia nondum penitus educta, sed interdum *Inguen*, nonnunquam *Oculos*, alias,

alias *Cervicem*, modo etiam *Genu* afficiente; ut magis regularem *arthritis* facerem, & extremarum partium articulis infingerem, *Infusi amari*, haustum, cum *Tinct. M. gutt.* xx. bis in die sumendum, imperavi: nec quidem frustra: paucorum etenim dierum spatio pes doluit; expulsa est *Arthritis*; ea, quæ intus, sunt liberata.

Alio tempore, cum a frigore pariter repelleretur *Arthritis*, ejusque materia cum sero abrepta *Gravedinem* faceret; usu *Tincturæ Sulfuris*, (cujus beneficio materię inclinatio commodum mutata, & ad tã celeritatem versa erat) ager convaluit.

C A P U T XI.

De Catarrho, Tussi, & Peripneumonia Arthritica.

ART. I. **Q**UAMVIS hi affectus, quoties absoluti & legitimi reperiantur; propter diversos eorum vultus, & pathognomonica diversa, non immerito *Specie* distingui; proindeque non unius tituli esse judicentur: nihilominus has *anomalias*, quando ab eadem causa, nempe *arthritica*, idem *Subjectum*, nempe *Pulmonem*, afficiente producantur; propter hanc earum inter se convenientiam, & necessitudinem, una, non inepte hoc Capite, tractari fas est. Ut autem de illis clare, & perspicue dicam; primum, earum communia, quæ omnibus, vel minimum plerisque sunt: tunc, quibus illarum, quæ propria sint, edisseram.

II. Omnibus hoc commune est, illas tam cito nullos unquam invadere, nullos æque male habere, & mulcare, ac quos sive gibbosos, sive graciles, sive *Pectore* nimis brevi, aut acuto, aliove quovis modo angusto, nec satis apto, natura fabricavit, aut etiam constitutione nimis tenera donavit. Si qui etiam *Ictu*, *Casu*, *Vociferatione*, vel *Exercitatione* aliqua vehementi injuriam *Pulmoni* intulerunt; vel a parentibus *Phthisicis*, aut *Asthmaticis* exorti, vel ipsi tales fuerunt. Hos, inquam, omnes *arthritis* sæpe larvato vultu aggreditur; cumque ejus suspicio ne vel minima incidit; *Pulmonis* adytum intrando, membranas ejus corrodingo; tarde crebro, at certo, perimit. His enim corporibus, *Pulmo* læsus, & debilitatus, alienum facile recipit; diffculter rejicit, itaque tandem acri, & vi-

roso eo corrumpitur.

III. Hujusmodi corpora vexantur his *anomalias*. Utrum vero *arthritis*, vel quousque ea, priusquam se Regularem ostentavit, & in *Artubus* unquam emicuit, *Pulmonem* afficiat; quoniam indicia non habemus manifesta, & fide digna, explicari nequit. Suspiciari vero licet, naturam, in iis, qui parentibus nati *arthriticis*, una cum ipsa vitæ lampade miasma acceperere; quoties illi, ætate prima & ineunte, *achoribus*, *Catarrhis*, *Tussi*, aliisque hujusmodi malis supra modum urgeantur, (eos autem crebro sic urgeri, & morbis his alienum aliquod exterminari constat (miasma, a parentibus acceptum, in natorum sanguine retentum, ibique copiis adventitiis quotidie auctum, hinc morbis, aliqua ex parte ablegare. Hoc autem, utrum ita revera sit, an secus; ex natorum, & parentum malis simul comparatis, optime (tamen, propter rei obscuritatem, non sine aliqua dubitatione) colligendum. Quare in medicis, uti dixi, *Suspicionibus* hoc habendum, eoque magis, quoniam, data positaque conjecturæ hujus veritate, medicinarum *arthritidem* expellendæ reducendæque, ætate hac tenellula, omnium minime locus inveniat.

IV. Ad eas transeo *anomalias*, quæ disquisitioni nostræ magis exponantur, & patefiant: Postquam *arthriticis* paroxysmos aliquot idoneos, & regulares sustulere, non raro accidit; maxime, si iidem corpora modo descripta habent, a paroxysmo sive interciso, nimis leni, vel raro, materiam in *Pulmonem* transferri *recipit*. In *Paroxysmo* interciso, vel abrupto, sæpe per *Emplastrum*, *Cataplasma*, *Frigus*, vel externum aliquod aliud istiusmodi repellens, ad tã celeritatem retro agitur materia, cujus utique repulsioni statim superveniunt pectoris gravitas, & sæctura, spirandi angustia, asperæ arteriæ titillatio, tussis, sputum primo tenue, postea crassius; quæ quidem accidentia, qua sunt proportionem, *Pulmones* affici, & in eos humidum impelli *arthriticum*, aperte indicant. Hæc est *arthritidos* in *Pulmonem* translatio, omnium maxime evidens & certissima.

Est autem ubi, *Paroxysmo* minime abscisso; verum, propter ejus sive lenitatem, sive raritatem, mala eadem oboriantur; & dubium magis reddant, sintne ipsa *arthritica*, an non? Hoc autem dubium, *arthritide* brevi post in *Paroxysmum* regularem erumpen-

penite, non raro eluitur: & ea, recte nunc demum agendo, se nuper minus rectam fuisse confitetur. Ita ex *arthritis* regulari præcedente, comitata, vel insequente, habes de istarum *anomaliarum* natura prorsus *arthritis*, quibus tuto possis acquiescere.

V. Porro, in hoc concordant hæc *anomalie*, (uti cum iis cæteræ fere omnes) quod sæpissime seniores, interdum media ætate viros, at rarissime juvenes, quantum observatione constat, adorianur. Ut de meis loquar; ex huiusmodi laborantium numero, quem vidi, non exiguo, unum tantummodo adolescentem inveni; alios omnes aut ætate grandi, aut saltem matura, ac constanti.

Hujus rei causa minime obscura est; quia, licet *arthritis* nativa, & a parentibus ducta, ægotantes, ipsa quidem adolescentia, nonnunquam pueritia, dolent; hoc in *arthritis* acquisita non temere cernendum. Ebrietate, gula, malisque ea moribus acquiritur; atque ideo, ante medium vitæ, raro paroxysmos inchoat regulares perraro *Ανωμαλίας*: in sexu vero muliebri, raro ante partus, catamenia finita,

VI. Sputi ratio est habenda. Primo illud tenue, nec quidem multum esse solet; brevi post tempore copiosius; aliquando cum humorum tanto in *Pulmonum* flumine, quantum pectus aggravet, *Pulmonem* infarciat, vocem obtundat, spiritus impediat, quodque, si diuturnum esse contigerit, ægri corpus attenuet, infirmet; & demum opprimat. Qua vero proportionem *Sputum* excreatur, eadem fere minuitur, in extremis partibus, *arthritis*, sic, ut quo plus *Sputi* ejiciat ægotans, eo minus *articulis* afficiatur. Etsi vero istiusmodi *Sputatio* maxima ex parte salutaris (quoties nimirum non immodica, neque temere suppressa) esse reperiatur, in extrema tamen senectute, nimiam, & perniciosam, interdum novi, sic, ut ea multum æger enervaretur, & demum enecaretur. Hoc autem, ut opinor, rarissime occurrit.

VII. Nihil hos affectus esse *arthriticos*, evidentius significat, quam unum illud, quod sint omnes *arthritidis inversa* ratione, qua paroxysmum vel regularem, vel interruptum excipiant, vel absentem introducant, vel deficientem suppleant, & quidem ita, ut quo minor, rariorve ille, eo hi majores, ut ex imminuta *arthritis* externa, pro affectuum horum acrimonia &

importunitate, internos hos affectus *arthritica* origine esse constet; & a miasmate *arthritico* pulmonem ineunte, *Tussim*, vel *Catarrhum*, vel *Peripneumoniam* excitari.

VIII. De *anomalis* hisce singulatim sumptis, jam proxime dicendum; & quidem, primo de *Tussi* observandum, illam harum omnium esse frequentissimam, quæque paroxysmum *arthritidis* regularem usitatissime insequatur, raro autem comitetur, nisi ægrotto valde *arthritico* pulmonem admodum imbecillum habente: huiusmodi ego *arthriticos*, nimirum *Phthisicos*, ægotantes, uno eodemque tempore tussientes, & dolentes, aliquando inveni. *Tussis* hæc *arthritica* nonnunquam in paroxysmum regularem, (materia in artus translata) suapte sponte desinit; promptissime vero, si *Cathartico* non nimis leni, sed sanguinem miscente, & turbante, fuerit adjuta.

De *Tussi* porro aliud notavi, silentio minime prætereundum: nempe, in nonnullis *arthriticis* paroxysmum eam omnem antecedere; ægrum, dies quatuor, vel quinque exagitare; inter accessionis symptomata prænuncia jure merito censeretur; cumque ea sputi multum ejiciatur; (aliquando permultum ejici exploratum habui) una cum eo miasmatis partem aliquam *arthritici*, per *anacatharsin*, quod probabile videtur, expelli.

IX. Hujus generis *Catarrhos*, uti semper *asthma* comitatur; ita interdum *Hæmoptoe*: Immensa seri copia spiritus viæ occluduntur, unde *asthma*; & in eodem sero demum exantlando, quia *Pulmo* (simul cum universa *Pectoris* compagine) concutitur, rapide convellitur, ipsumque serum, acre & mordax, vascula exedit; ab ista agitatione, acrimonia, fit interdum *Hæmoptoe*. Quæ tamen ægro terribilis, horroremque ei, forsan alias meticulofo, incutiat; minime tamen pertimescenda, tanquam pessimi prorsus ominis, modo *Pulmones*, a natura *ὑγιῶσι*, nulla evidenti causa læsi, & curatio matura, & apta fuerit instituta.

X. Hæ *Tusses* sæpe, & interdum hi *Catarrhi* ex intervallo aliquo revertuntur, quando nimirum miasma, (ut est semper nascens) in sanguine renovatum, ac cumulatam, *Pulmoni* infigatur. Accessionibus his in primis favet autumnus, qui, cum illud tempus sit, in quo, ad τὸ παρῳισθῆναι. & miasma emittendum, moveri soleat *arthritis*, & in quo *Catarrhis*, & *Tusses* grassentur exquisitæ; quidni hisce nostris favere judi-

judicetur . Unum autem hisce omnibus inesse, & quidem magnopere ad eas contribuere censeo, nempe *Pulmonum* a natura imbecillitatem, & *Αῖτιον*: unde ii, *arthritico* miasmatis, (quandocunque fuerit in sanguine congeſſum, & expulsionī aptum) peſtus adeunt, in se recipiendo, ardeſque complectendo, perpetuo sunt parati.

XI. *Tuſſientibus* his *Febricula* seu nulla, sive lenis eſſe reperitur; ſi eos algere, aut cardiācis nimium indulgere contigerit, (unde *Febris* sive accedatur, sive augeatur) *Peripneumoniam* eſt quod timeas. Quacunque vero de causa initium capiat hic aſſectus, ſigna eum ostendentia, quæ *συνδρομῶν* conſtituant *παραγνωριστικῶν*, plane ſunt eadem, ac in *Peripneumonia* vulgari, & absoluta, & utrum aſſectus hic *arthriticus* ſit, an vero minime (niſi forte dolor *articularis* ſimul occurrat, extraque dubium rem ponat) ex ejus *Hiſtoria* tantummodo petendum eſt. Quoties autem *arthriticus* eſſe apparebit, hujus rei in eo curando rationem aliquam haberi, oportebit.

XII. *Anomaliis* hisce medendi indicatio generalis, eo, quod alienum eſt, citiſſime tutiſſimeque *Pulmonem* liberat: illud autem in diverſis his aſſectibus, modo non uno perficiendum. In iis omnibus *Venæ ſectio* prodeſt, ubi nihil adverſatur; in teneris, & debilibus, vix unquam adminiſtranda; in morbis, & ætate fractis, ne vix unquam. *Hæmoptoe*, & *Peripneumonia* laborantibus eſt aptiſſima; præcipue *Peripneumonia*, qui omiſſa *Venæ ſectione* raro curantur. Ubi-
cunque vero inſtituta fuerit, caute & provide cavendus eſt; ut, *arthritidi* poſtmodum in artus expellendæ fugandæque, natura ne reddatur impar.

Proximo loco de *Purgatione* cogitandum: ea etiam omnibus hisce malis occurrit, & probabilis videtur, ubi vires ægri conſentiunt, maxime vero, ubi corpus craſſum, & plenum; aut inteſtina ſunt immunda, & nulla ſuit *Venæ ſectio*. Illa vero *Purgantia* jure merito præferenda, quæ ſanguinem exagitando, & turbando, ad *arthritida* movendam conferant: de quibus iterum, & ſæpius alibi.

Præmiſſis his, ad ea descendimus, quæ *arthritidi*, hoſpicio novo, & inepto, (*Pulmone* ſcilicet) excitandæ, & ſoras ejiciendæ faciunt. His adjungi, & cum iis ſimul componi juvat illa, quæ, *Pulmoni* dicata, ei, ſive per *Anacatharſin*, ſive alio quovis modo inſerviant. En horum exempla.

2. *Alcohol. M. Baſſum. Capivi ana ℥ſſ. Conf. Fruct. Cynosbat. ℥j. Syr. Cap. Ven. q. ſ. ſ. Bolus.*

2. *Flor. Sulſ. (vel Benzoin.) Chal. prædicti ana ℥ſſ. G. Ammon. ſoluti q. ſ. ſ. Pil.*

In *Tuſſi*, vel *Catarrho arthritico*, (modo nulla *Febris* ſuſpicio fuerit,) ſumatur *Bolus*, vel ex *Syr. Baſſamici choch. j. Pil.* bis in die, cum *Decocti Pectoralis* hauſtu: quem quidem *Syrupum*, vel ejuſmodi aliquem, alias ſæpius in die lambat: alias, forma liquida ſiquidem aridet, iſdem temporibus propinetur *Hauſtus*.

3. *Syr. Tuſſilag. (vel cap. ven.) ℥ſſ. Tinct. Sulſ. gutt. ii. quibus prope mixtis adde Pul. Olib. Chal. N. ana ℥ſſ. aq. Hyſſop. ℥iiſſ. ſ. hauſtus.*

Loco *Tinct. Sulſ. Baſſamum* ejus *Aniſatum*, vel *Terebinthinatum*; *Baſſamum Capivi*, *Gileadenſe*, *Chilienſe*, vel *Peruvianum* certis ſuis doſibus adhibeantur.

Quando malum inveteravit, ad prohibendam ſanguinis colliquationem *Decoctum Corticis* aliquoties præſcripti, in ægroti emolumentum non mediocre.

Tuſſienti proſunt *Tbroch. Nigri Londinenſer*, *Ecligmata*, & ad ſputum educendum, *Tuſſim* mitigandam, quæcunque tuto faciant *artheriaca*.

Cum remediis internis dies tres, vel quatuor impertiveris; unde roboretur ſanguinis, & ad το παρακίνησις extimuletur; ſi nulla in articulis apparebit *arthritidis*, applicetur extra, parti creberrime dolenti, *Empl. Cephalicum*, per ſe, aut cum picis *Burgund.* quantitate æquali, vel *Ceratum viride*. Sin iſta, nimis imbecillia, materiam non movebunt, & ex eorum uſu nulla *Pulmoni* fiet utilitas; validioribus opus erit auxiliis, & majori mole pugnandum. Hoc caſu *Phenigmi*, *Veſicantia*, *Setacea* poſſunt uſurpari. Eo autem modo in eorum uſu, progredi juvabit; ut à mitioribus ſemper incipias, neque niſi illa fruſtra fuerint, ad ſeveriora aſcendas: cumque ſeverioribus uti neceſſum erit, non niſi naturæ permiſſu, & ſic, ut ejus vires pati poſſunt, intentandum.

XIII. Hac methodo, in his aſſectibus, *Pulmoni*, ut opinor, optime proſpicitur; maxime, ſi tutelæ gratia, in dorſo *Fonticulus* aperiatur, ſique aëre ſicco, & ventis agitato utatur ager, ſique eo omnia dirigat, ut recta perſtet *arthritidis*, & ex intervallis debitis recurſet.

Hiſce vero prætermiſſis, aut otioſe, & negli-

negligenter actis, *Tussis* ingravescit, corpus non alitur, nullus in eorum, quæ decedunt, locum subeuntibus, succedit *Macies*: pituita, quæ principio tenuis erat, jam crassior fit, excreatuque difficilior, & interdum cruenta. Exulceratio fit *Pulmonum*, unde, tanquam exquisita *phthisis*, oppressus æger, e medio excedit.

XIV. In *Peripneumonia* vero *arthritica*, rapidiori gyro versatur res. Inter initia, morbo protinus occurrendum; alias sane non facile vincendo. Sanguinem cito detrahi, *Enema* post horas aliquot immitti, *Purgationem* die postero institui, oportebit. *Linctus* ex *Oleo Amygd. d.* vel *Oleo Lini*, omni fere hora delingendus. Vitanda sunt *Emulsa*, & *Decocta* nimis frigida; sique apparebit in artuum aliquo *arthritis*, vel, eam educi posse, spes erit; per eam eductentia consulendum est ægroto. Hoc enim perpetuo ratum esse arbitror, *Peripneumonia*, ex *arthritide* inversa, & in febrem adaucta, natam, ejusdem *arthritidis* expulsionem, & in artus amandationem, & in viam reductionem (modo hoc effectum reddere licebit) commodissime posse removeri.

XV. Non ignoro *Clarissimum Sydenhamum*, *Medicum isidori*, de sanandis his affectibus aliter scripsisse, nimirum, metastasi materiæ vitiosæ facta in *Pulmonum* lobos, intentionem medendi non ad ipsam *Podagram*, esse dirigendam; verum, (hoc symptoma, pari modo tractandum, quo *peripneumonia absoluta*; venæ sectione scilicet repetita, cum *Diaeta*, & remediis refrigerantibus, ac *incrassantibus*; *Purgandum* insuper ægrum, inter venæ sectiones, idque potionibus lenientibus: *Sudorem* autem obfuset, materiam pulmonibus impactam inducendo; unde generentur *abscessus*, & tandem ægri mors certissime subsequitur. (At per ego *Hygieus*, per *Æsculapium*, per ipsius *Sydenhami* manes, oro obsecroque; quænam *Morborum Venenosorum* (cujusmodi sunt hi omnes) curatio probabilior, quam per ipsius *Veneri* e corpore, vel in artus, in partes a centro vitæ remotas, & minus nobiles, expulsionem? Annon natio Medicorum omnis, ipseque alias *Sydenhamus* *isidori*, quoties ingravescat, & in orgasum evehatur, exterminari, exturbari, ejicique jubet? Annon hoc ipsum naturæ opus, eique ministerio, & auxilio, medicorum esse, prædicatum est. Hisce vero, tanquam basi & fundamento, positis, quæ (secundo loco) medicina hanc alieni ex-

pulsionem magis promovere possit? ea, videlicet, quæ *Venæ sectiones repetitas*; quæ *Diaeta*, & *Remedia refrigerantia*; quæque *Cathartica* blanda, & lenientia, (quæ quidem omnia, sanguinem deprimendo, *Venenum* in eo retineri faciant) speretis interea, neglectisque *Diaphoreticis*, *arthritidem* expellentibus, comprehendat: An, e contrario, quæ ex remediis calidioribus, venenum, ad naturæ votum, & propositum, in artus tuto extrudentibus; quæque ex *Venæ sectione* & *Purgatione* ad hoc opus accommodatis; quæque auxiliis, extra admotis, *arthritidem* evocantibus, sit composita? Si a *Febre*, medicamentis calidis ne inferatur, erit periculum; hoc ut devitetur, missione sanguinis sufficienti, & calidorum usu non nimio cavendum est; sed neque rei ullius, propter ejus, qui incidere possit, abusum; speranda protinus utilitas; præsertim ubi magna, & humano generi salutaris. Altera vero ex parte *Veneno* retento, licet depresso; quam exulante, & amoto, tum commodi minus, tum periculi plus, oris certum est: itaque esse, non suadet opinio temere suscepta, sed cogit experientia, non subleste fidei, verum iterata, firma, & (uti mihi videtur) rationi consona.

HISTORIA I.

Tussis Arthritica.

Um hæc in manibus sunt, memet interea consulit e propinquo quidam, humili loco natus, annos circa quinquaginta, pectus aggravatum, vocem impeditam, & *Tussim* habens, media ætate molestissimam. Screatu ille multum ejecit, *Tussi* exantlavit; nonnihil elanguit; febricitavit. Erat, quod *Tussim*, qua magnam, qua diutinam, qua tempestati non minus congruentem, ingenio & natura esse singulari, submovere videretur,

Quæ per annum materiam e sanguine leniter educerent, ex usu medico remedia præscripsi: quibus sumendis, postquam æger dies aliquot, tam utiliter, quam sedulo, incubuerat; novum ecce malum, improvisum, inopinatum est exortum; *Genus* nimirum dextri *Dolor*. Cumque, didicerim, *Pedibus* illum antea, more prorsus *arthritico*, doluisse; per annum autem integrum, & quod excurrit, minime; dolorem hunc *arthritidis*, sese in *Paroxysmum* efferentis, indicium esse existimaui. Cum brevem eum, medio-

mediocrem, neque satis acutum observaverim, partim materiae per anum, partim per *Pulmonem* ejici, *Tussimque* illam revera *arthritisicam* esse, judicavi.

HISTORIA II.

Tussis Paroxysmi Arthritici Symptoma prænuncium.

Senex perhonorificus, morum suavitate, animique integritate clarus, cum de varia, & multiformi *arthritis* natura, sermones una secerimus; de sua, qua triginta jam annis per vices aegrotaverat, sciscitanti mihi confirmavit, se febricula, per omnem fere juventutem, quotannis fuisse, deinde vero rheumatismo, affectum; cum hoc eventu minime reticendo, quod, ex quo hic primum apparuit, illa desierit, neque semel unquam aegrotantem ex eo tempore invaserit.

Rheumatismo ut mederetur, hortatu Medici, per totam *Angliam* tum temporis, celeberrimi, *Diaphoretica* sumpsit; iisque afflatim assumptis, quæ per artus hic illic sparsa erat materia, jam articulis affixa est, & vulgi quidem opinione æger *Podagra*. Eo more *Paroxysmus* erat, ut *articulavi* (digitorum maxime) *Dolore tumoreque*, noctis unius spatio, excitatis, se ostendere, & omni vere, & autumnus, multos annos reverteretur. Quod vero memoria dignissimum, *Paroxysmum* omnem prævit *Tussis* importuna, vehemens, molesta, qua, dies quatuor, vel quinque, aegrotum exagitante, multum ille tussiendo semper ejecit, & una cum pituita (quod quidem verisimile) miasmatis *arthritici* partem. Cetera vero, quantum ab aegroto accepi, *arthritis* se recte gessit.

HISTORIA III.

Sputatio Arthritica, in extrema ætate nimia.

TAbernarius quidem in vicino oppidulo, per ætatem mediam & constantem, *arthritis* doluit recta, & idonea; grandior autem, inversa & *anomala*. Nunc *Ventriculum* ea, nunc *Pulmonem* est ingreſſa; illi *Ἀντιέμελον*, *Ἀναρτία*, nauseam inducens, huic, *Tussis*. Erat *Tussis* admodum molesta; pituitæ tantum movens, quantum aegrotum ætate proſectum debili-

taret, alimento privaret, macilentum redderet: qua vero ratione gliscebatur in visceribus *arthritis*, in extremis partibus ea remisit, & quidem e vestigio; sic, ut de materia, ad τὰ ὅρια a τῇ ἰσχύ, translatione, & de his affectibus, ab eodem causa communi oriundis, nihil omnino dubitandum. E *Cortice*, *Marte*, & *Sulfure* præparatis, varia præcipiebantur, una cum incrassantibus, & sanguinem roborantibus: eo videlicet, ut in artus expelleretur *arthritis*, itaque defenderetur *Pulmo*, natura autem viribus deficiente, (πρώτος μὲν πᾶσι τοῖς ὅμοις) frustra erant omnia. Medicamenta, utut probabilia, sexagenario, annis & tristitia fracto, parum profuere. Sputatio nimia, virium imbecillitate, animi mœrore, propter res domesticas depressum, & medicamenta vix sentientem. Mors abstulit; *ultima morborum Medicina*.

HISTORIA IV.

Anacatharsis Arthritica Salutaris.

INeunte sæculo supra millesimum septingentesimo, ad presbyterum *Exomensem* arcessor, qui, eo tempore quadragenarius, constitutione tenerrima, & jam annos septem *arthriticus* fuit. Paroxysmo dudum gravissimo affectus est, manus, pedes, genu alterum obsidente, eoque adhuc consistente, mox apparuit *Catarrhus*, nares, os, pulmonem, more pene *serino*, obruens. Hinc *pectoris* sæctura, spiritus difficultas, *Tussis*, sputum primo tenue, postea crassum & copiosum, & imo pectore, magnoque cum molimine eductum. Quemadmodum illud *σπυῖον* (Sputum volo) increvit, ad eundem plane modum & rationem, signa pure *arthritica* (id est, *Dolor & Tumor articuli*) sunt minuta. Ut *arthriticum* miasma aliqua ex parte per *anacatharsin* expelli, compertum habeatur.

Ad *Tussim* mitigandam, & *Sputum* simul movendum, *Syrupum Balsamicum* & de *Meconio*, sæpius in die lambendo; & *Pil.* hora somni, sed modica quantitate, *Stryacinas* dedi: Quod humorum nimiam inhiberet *Colliquationem*, & ab ea sanguinem tueretur, *Decoctum Corticis*, iisdem *Syrupis* dulcatum, imperavi: quæ cum fructu, & emolumento non mediocri adhibebantur.

Biennio post, ab una eademque causa evidenti, nempe frigore, & *articulis*, & *Tussi*

Tussis laboravit æger ; eoque procul dubio magis , quoniam , cum autumnus esset , ille sanguini depurgando non parum saveret , is erat dolor *arthriticus* , quo nunquam huic *arthritico* major , nunquam acerbior ; ea vero *Tussis* , quæ , sputatione multa , & pituita larga vi emissâ , dolorem penitus absunderet , ejusque causam , per *Anacatharsin* , amoliretur . Cujus rei veritas vel hinc eliciatur , quod doloris interruptio *Sputum* derepente sequeretur , & pari passu comitaretur . Hujus *Sputi* movendi citandique gratia , *Opobalsamum* ex *Syrupo Balsamico* sæpius in die , non sine fructu , datum est . Omnia denique sic comparata sunt , ut *arthritidi* , per *Pulmones* fugam molienti , via patefieret . Ex sententia res successit .

HISTORIA V.

Peripneumonia Arthritica .

MATRONE lectissima , sanctissima , majores habens inter Aborigines *Damnios* , stirpe tam nobili dignissima , *Pectore* a natura brevi donata , nonnullis ejus affectibus , ea de causa proclivis esse visa est . Quæ , ab ipso vitæ initio , *Pulmonem* illius ingredi , *Tussimque* facere sueta fuit pituita , crassiorem jam , & ætate progredientem ægram , magis aggravavit . Hinc *Tussis* illi , per ætatem omnem mediam , permolesta ; hinc *Dyspnœa* fere perpetua .

Vitæ annum circiter quinquagesimum , cessante *Tussi* , locum ejus supplevit *Dolor Artuum* erraticus . Tumuerunt digiti , doluerunt articuli , præsertim *Genua* , & *Carpi* ; qui interdum tumore , sed in omni paroxysmo dolore sunt affecti . Ruboris , splendoris interea nihil unquam est visum .

Cum materies crebro *Subjectum* mutaverit , nunc quæ extra , nunc quæ intus sunt , obsidens ; frequenti observatione palam factum est , ea foras erumpente , & in *Artibus* subsistente , *Pulmones* esse tutos , *Respirationem* integram : contra , intus agente materia , immunes esse artus . *Tussienti* nihil magis profuit , quam *Trochisci nigri Londinenses* , & istiusmodi pharmaca pituitam educunt . Potioni fuit pomaceum , cerevisia longe commodius . Nihil algore pejus , hoc enim spiritus brevi impeditus , ægra pene strangulata .

Cum iter hinc in locum , carbonibus & fumo celebrem , facere decreverat ; *Plethorice* , *Tussienti* , *Asthmaticæque* suasi , ut ,
Sydenham Opera Med. Tom. II.

priusquam inciperet , sanguinem detrahendo , ventrem inaniendo , *Sputum* movendo , materiam in artus vitiosam expellendo , itineri (quando hyems erat) inauspicato , civitati *Tussientibus* infestæ , se quodammodo paratam redderet , Prætermisissis autem hisce , *Tussis* itinere adaucta est , fumo spiritus impeditus , ut , accedente ad hæc febre , (Medico longe nobilissimo frustra vocato) vita paucis post diebus cederet .

Per *Tussim* veterem & humidam , id , quod alienum erat , naturam exterminasse ; sicque articulis pepercisse , non improbabile est : per abruptum *articularem* morbum , ejusque materiam *Pulmonibus* impactam , fieri *Peripneumoniam* , interfici ægrotantem , manifestum est .

HISTORIA VI.

*Catarrhus , Asthma , Tussis Arthritica ,
per Humorum in Artus Añææum ,
& deinde Evacuationem , mitigata , sublata .*

A Bhinc annos tres vel quatuor , forte mihi obvenit hujusce Tituli Historia , nisi fallor , observatu , memoratuque digna . Erat in suburbiis *Totonesii* , de meliore nota , vir , olim athleticus , valentissimus , corpore quadrato , constitutione firma , senectutem eo tempore ingressurus ; qui septem annis algere , & levi quavis ex *causa* tussire solitus , hunc in modum sæpe graviter afflictus est . Frigore quod *Tussim* & algorem creberrime præcurrit , interdum etiam effectum est ; ut per artus dolor incertus , & erraticus pervaderet ; ut internodia , sive articulorum intervalla , magnopere pungeret , ac si esset rheumaticus ; ut aliquando *articulos* , (præsertim *Humerum* , & *Coxendicem*) morderet : cum dolore tumor . Rubor etiam interdum *articularis* erat , ut de mali natura nulla restaret dubitatio .

Olim hic illi valetudinis status erat : nuper autem , interciso , nescio qua de causa , in extremis partibus dolore , tanto in *Pulmonem* impetu & copia , morbi infusa est materia , quanto raro advertatur . Serè vi immensa pectus aggravatum est ; tussit æger indefinenter , & quidem enixe . Non nisi difficillime spiravit , neque nisi erecta cervice . Sæpe tussienti deliquit animus , neque spiritus , (cogitandi munus exercentes ,) agitati jam & profligati , pristinum ordinem cito recuperarunt . *Sputum* modo te-
R nue,

nue, & falfum; modo fanguine, ex tuffis importunitate, interfperfum. Facies pallidior, corpus attenuatum.

A quo tam mire affectum eft *Pectus*, id eft, per menses duos, vel tres noviffimos, nullus in extremis partibus (qui tamen alias creber effe confueverat) *Dolor*: nullæ querelæ. Quibus omnibus recte ponderatis; uti etiam quod a parte, post homines natos maxime *arthritico*, gigneretur æger; ea fui fententia, non alium effe morbum, quam *arthritida* vetuftam, membra olim *ἰσθῆς* nunc *Pulmonem ἀνωμαλῶς* excruciantem; neque facilius expeditiusve poffe illam removeri, quam ejus materiam, *Pulmonem* occupantem in membra; fedem illi propriam, quaquā poffit arte, expellendo reducendoque.

Ita mecum arbitratum, post *Vene* fectionem, utrique malleolo *Phenigmm* (ex *Fermenti veteris part. iv. Seminum Sinapios, Fimi Columbini, Raf. Radiculæ, Cacum. Rutæ ana p. i. Aceti Vini albi q. f.*) calidiffimum applicui, frigidum ufque renovavi, donec tumor utriusque pedis eft exortus. Tumori hic illic factò, vel quam proxime eum, admovi *Epiffafticum*. Hæc, ut *arthritis* evocaretur, ut autem expelleretur, eodem tempore *Πολυαραγὰ* præfcripti.

℞. Pul. Gascon. ℥i. Ther. Andom. ℥i. Bals. Per. gutt. v. Conf. Alk. q. f. f. Bolus, vespere fumiendus cum Julapii Haufiu. Interdum vero, loco Theriac. Chal. N. ℞. cum prædictis, forma pilulari, ex Syr. Balsam. cochleari. Pro potu ordinario Decoctum Pectorale, ex Rad. Helenii Cond. ℥℥. Eryng. C. ℥i. Raf. C. C. Eb. ana ℥iij. Balsam. Tolut. ℥ij. Sem. Coriand. ℥ii. aq. Hordeat. ℥iij. ad ij. incoctis. Ad Tuffim mitigandam Eclegma datum eft, (ex Syr. Balsam. de Mecon. ana ℥i℥. Tinct. Aurant. ℥ij. fapius ufurpandum. De Tuffi caveret, monui; ut ab ejus acrimonia ne Pulmo laderetur; ideoque Bechicis fæpe uteretur.

Hifce politis, & jure meo præcepti, medendi viæ ægrotum commifi; ea fpe plenus, fi *Pulmones* adhuc integri & fani effent, fiquæ ad τὰ ἰσθῆς humor transferretur, fervari poffe reftituique ægrotantem, fi aliter res fuerit, occubiturum.

Dolor, fiti, & languori, a *Phenigmorum* ufu ortis, propriis remediis; *Paregorico* leni, *Decocto* fitim extinguenti, & *Julapio Cardiao* medetur.

Phenigmorum ope tumor factus eft utriusque pedis, ad utque furas, immenfus *Vefi-*

cantibus feri non parum elicitum eft. Quod vero maxime aufpicatum, & ominis erat optatiffimi; qua ferum elicitum eft, ea penitus proportionè mitigata *Tuffis*; ea reftitutum eft *Pectus*. Qua de caufa *Veficantium* ulceribus, cito nimium exficcatis, (ut, quod inefset tumoribus feri, penitus educeretur) in utraque fura *Setaceum* meo confilio factum eft. Hinc jugè feri flumen: quicquid ab *Epiffafticis* defectum, hinc fuppletum eft.

His auxiliis, extra, intus, fimul femelque adhibitis, factum eft; ut a *Tuffi*, ab *Asthmate*, a pectoris gravitate, ceteroque ejus malo omni liberaretur æger: eorum autem loco fubortus eft *Humeri Dolor* plane *Arthriticus*; itque, fi confideremus ferum nuper evacuatum, fatis acutus.

At quia longa morbi obfidiōe *Pulmones* enervatos, & debilitatos effe jam liqueret; propterea (tutelæ graria) quando *Setacea* ferum emittere jam finietant; utroque spinæ latere, inter omoplatas, aperiri *Fonticulum*, magno certe ægri cum emolumento, juffi, & *Hydragogum* aliquoties adhiberi.

Hac ille medicina, morbo certe ancipiti, & periculoso liberatus, habitum & colorem brevi tempore bonum obtinuit, omnino convaluit; nempe fubleſta fide teſtabatur, *Rheumatifmum* illum veterem, quo per annos alioquin multos fe gravari æger opinatus erat, *arthritidem* revera effe erraticam; nec non illum *Pectoris* affectum, iſtius effe *arthritidos ἀνωμαλῆς*. Sic opinari fuadet *Historia morbi*; fic curatio.

C A P U T XII.

De Phthifi Arthritica.

ART. I. **A**ffectum in pulmone *Arthriticorum* proximus, longeque periculofiffimus eft *φθίσις*: quæ, ut permulta habet cum absoluta *Phthifi* communia; (ita quidem propria, five caufam ejus continentem, five medendi methodum intueamur) tam multa, momentique tam magni habet, ut eam præterire nefas æſtmetur. Hujus autem morbi hæc conditio effe folet.

II. *Arthriticus*, ex materia vitiofa, vel per caufam aliquam externam in *Pulmonem* reperiſſa, vel per ejus imbecillitatem alle-

allecta, acceptaque; primum, pectoris gravitate, *Dyspnœa*, & raucedine corripitur: deinde, sputum excreatur; quod, initio tenue, paulatim crassescit. Progressu temporis, caro flaccescit, simili fere proportionem, qua crassum id ejicitur, & paulatim absumitur; vires enervantur. Interea verodum ista fiunt, nullus in extremis partibus tumor, dolor nullus articularis; aut si ullus occiderit, parvus, & brevis spatii, apparet. Crescit autem faciei pallor, & corporis universi macies; & comitem, (propter vasa, frequenti, & violenta *Tussi* excitata, & disrupta,) interdum nanciscuntur *Hæmoptœen*. Demum, calor hæcticus exoritur, cum pulsu celeri, cute arida, præsertim vesperti; quibus mane succedunt sudores symptomati. Atque ita æger, tussē pertinaci, sputatione multa, sudore colliquante, *Diarrhœa* impatibili, nec quavis arte diu sistenda, vel (si non sit *Diarrhœa*) tumore pedum aggravatus: & tanquam exquisita *Phthisi*, certe ei simillima, oppressus, cum morte, ærumnarum requie, vitam miserrimam commutat.

III. Etsi vero ultimum hujus *Phthiseos* stadium, ab exquisitæ ultimo, (tanta earum inter se converſientia est) vix potest internosci, aut signis diacriticis distinguui: duo sunt, in ejus stadiis prioribus, (incremento nempe, & statu) quæ *Phthisi* exquisitæ raro convenient, aut de ea dici mereantur.

Unum est, quod, aliter quam *Phthisis* exquisita, quæ adolescentum, aut juvenum morbus esse, neque alia, quam firmissima ætate, facile reperiatur, hæc nostra *Phthisis*, & contrario, adolescentes raro aggreditur; sæpius autem constantes, & interdum (quod de *Exquisita* nondum videre licuit) viros natu grandiores: mulieres autem maturius, propter naturæ privilegia, (partus sc. & catamēnia; quæ tum *arthritis*, tum *Phthisi* arcent) maturius cessare solita.

Alterum, quod *Calor Hæcticus* (qui in *Phthiseos* exquisitæ statu, & initio, gravis esse solet, reliquaquæ interdum symptomata præcurrit omnia) serius in *Phthisi* *arthritis*; nec quidem usitate ante sputum largiter excreatum, corpusque eo debilitatum, oritur. Cujus quidem *paroxysm* ratio ex jam dictis (hunc affectum non nisi annosiores, id est, sanguine frigidiori præditos, invadere) eliciendum partim ex eo, quod *arthritis*orum, siquidem juniores fuerit, sanguis, propter frequentes *arthritis*is paro-

xyſmos, neque temere incendatur, nec quidem incensus adeo exæstuet: Et quidem *Phthisis* *arthritis* lenta esse solet, neque multa *Febre Hæctica*, nisi ultimo vertente stadio, comitata.

IV. Prædicto fere modo res agitur, quæ in *Pulmonem*, a natura debilem, miasma *arthritis*um; gravi aliqua urgente causa externa, impellatur; aliave quavis ei infigatur; neque medicina satis efficaci, vel satis opportuna, removeatur.

Interdum autem ad *Pectus*, non adeo recta itur; verum, a *costis*, ad *costas*, & retro, variaz sunt itiones, & reditiones; exque, non nisi annorum aliquot spatio, peractæ; donec denique, post *Tussis* varias, graves, & importunas, succedit *Phthisis*, absolutæ similis, *arthritis*. At, ubi *Pulmonis* *Scrota* est, & medicina tempori fuit adhibita; materiæ vitiosæ partim in artus exturbatur, scretu partim ejicitur; *Pulmones*, crebris insultibus debilitati, sanantur: æger & colorem, & robur pristinum acquirit. Quibus autem modis hæc præstari possint, statim exponetur.

V. Ex supra dictis (ut opinor) liquet, nullo modo hujus morbi indolem, & ingenium, posse magis pateſcere, quam per ejus *Paroxysm*. Quæ enim dixi, illi propria, quando neque semper, neque soli competant; atque adeo fidei non spectatissimæ perpetuæque, verum e diverso dubiæ, sint habenda, ut de morbi hujus ingenio constet, quæ illi cum *arthritis* necessitudo; quæ conjunctio; quam illa prope *Paroxysmum* excipiat; utrum e velligio, an e longinquo; utrum, & qua de causa, intercisum, an vero deficientem suppleat, & ejus vicem gerat, pro ejus declinatione, increſcens: Ne plura, utrum ejus ratio, *arthritis*idi rectæ sit, & quatenus sit, inversa, sedulo quærendum est.

VI. Curatio postulat ut levetur; ut hoste infestissimo, quam citissime, liberetur *Pulmo*, id autem modis alio alioque tempore diversis, & quam in *arthritis* *Tussi* aliis, elaborandum est.

In principio morbi, uti *Tussis* urget, & tantum inpropinquo *aditus* est; multum a *Phlebotome* & *Catharsi* rite factis, expectare licet. Hisce potest fieri, ut e corpore exturbetur, vel minimant ut e *Pulmone* eruatur id, quod alienum. At quia non semper hoc effectum esse, nec evacuationibus illis commode confiditur; ita illæ fiant, oportet, *Paroxysmi* regularis excitandi ha-

beaturn ratio; id est, intra modum: ne natura nimium debilitetur, & expellendæ *arthritis* impar reddatur.

Post sanguinis detractionem, & alvi dissolutionem; alteram nempe, vel utranque; vel, ubi inutiles censebuntur, iis omissis, ad alia confugiendum, bechicis, & *πιδυραγγοις* utendum: His, ad materiæ in artus expulsionem: illis, ad expuitionem. Hos in fines *Litus* (ex *Ol. amygd. dul. rec.* vel *Ol. e Seminibus Lini*, & *Syrupo Balsamico*, vel de *Præssio*, vel de *Rapo*, aliove quovis *Sputum* movente) componendus; & hora quaque altera, tertiave, ad cochleare unum adhibendus. Atque ubi nulla febris indicia repugnant; *Pilule ex Pul. Gascon. Chal. N. Succo Glycyrr. Balf. Peruan. sexta*, vel *octava quaque hora*, adjectæ, isto ex vehiculo sumantur, & in positionem ordinariam *atozema* detur *Pectorale*, vel, in forma liquida, cochleari *Ecligmatis* instillari possunt, *octava*, quaque hora, *Balf. Peruan. vel Tinct. Sulf. gutt. x.* & intervallo omni medio, *Chal. N. gr. vi. vel viii.*

Eo vero usque calidis hisce remediis utor, quoad siverit a febre periculum, & *arthritis* expulsio postulaverit. Et quidem eo lubentius hac via progredior, quoniam a calidis hisce, præsertim in senioribus, & *arthritis* crebro recurrente depressis, non magnum unquam oriri periculum observavi; & si quod unquam extiterit, desubito tolli posse, non vana spes est: at commodum & diverso uberrimum est, adversus hisce longe uberius. Et, ne medicina hæc nostra, tanquam nimis calida, & *Phthisis* inepta, male accipiatur; sancte profiteor, me ea prospere, magnaue agri cum utilitate, plus semel fuisse usum: cujus ego rei statim exempla proferam.

Si vero febris, seu per se, seu pharmacis excitata; quam ad rem præsentem opus fuerit, major exardeat, *Pulmonique φλέγμων* intendat: ei, per detracta isthæc calida, per *Enemata*; per sanguinis missionem; per *Corticem Peruanum*, temporis adhibitum, & quandiu incurfat febricula, repetendum: perque alia, quæ *Peripneumoniam* tenuare solent, est cavendum. Neque enim *arthritis* ex *Pulmone*, nisi tuto, licet amoliri; neque vitæ, nisi per ei conducibilia prospicere. Febre vero tenuata, medicina jam

dicta (quoad commodè fieri potest) similis, in usum denuo vocanda.

Quando remediis istiusmodi internis, (*arthritis* expellentibus, una cum *Bechicis*) dies aliquot teruntur, nimirum duo, vel tres; citiusve si in articulo & *τὸν ἄρθρον* aliquo dolor fuerit excitatus; articulo jam affecto, vel qui sapius efficitur, extra id, quod materiam educat, applicari par est; eo, quo, in Capite præcedenti, aliasque passim, modo declaratum est. His autem eo magis insisto, quoniam ab antiquo commendari video, veterumque usu confirmari. „*In tube, ubi vehementior noxa* „*est, ac neque Febricula, neque Tussis quie-* „*scit, tenuarique corpus apparet, validiori-* „*bus opus esse auxiliis, inquit, (1) Celsus:* „*& exulcerandum ferro candenti, sic ne sa-* „*nescere sinas Ulcera, nisi Tussis finita* „*fuerit* „. Quod quidem auxilium, etiam si acce & severum, tamen, ut in *Phthisi* absoluta commodum; ita in hac nostra, propter venenum intus contentum, eliciendumque, commodissimum.

Unum hic monendum, agrotantibus hisce ponderis & momenti non exigui: *Opiata*, licet vulgo *Phthisicis* utilissima, in hoc casu suspecta esse, neque copiosa tempore præscribenda: ne videlicet miasma *arthritis*, jam in *Pulmonem* inditum, eo loci insistant. Dentur itaque sic, ut *Tussim* supra modum importunam inhibeant, & quietem ab ea tutam concilient. Quod autem de *Opiatis* dictum, id etiam de iis, quæ pituitam faciant crassiorem, quæ *Pulmonem* obstruant, eique impedimento sunt; ex parte aliqua dicendum.

Quoties hac, vel huiusmodi viâ, in extremas corporis partes amovetur *arthritis*, mirum quantum inde levetur *Pulmo*; nihil, ut opinor, agrotantibus his commodius; quo enim magis *articulum* illa mordet, eo minus *Pulmonem*. Vidi equidem *Tussim* hanc arte primum fieri tolerabilem; spurum minui; utrumque post auferri: vidi restitutam oculorum aciem, *Scapular*, *Expectorat*, & a *Phthisi* incolumitatem. Quæ quidem omnia, quo certiora fiant, opus erit, *arthritis* tam expellentia, quam evocantia (id est, tam interna, quam externa) continuare; donec omne id, quod naturæ alienum est, e *Pulmone* fuerit dimotum.

VII. Quo-

(1) Lib. III. Cap. XXII.

VII. Quoniam vero *Pulmonem*, pituita diu gravatum, enervati debilitarique necessum erit; ad ejus robur instaurandum, cum primis facient *Aqua ferrata* per urinam exeuntes, & *Aer*. Finito igitur *arthritidos* paroxysmo regulari, aliasve æger restitutus, prophylaxeos ergo, bibat per mensem integrum istiusmodi *Aquas*; Sin earum copia non detur, vel ex ægroti re civili non sit, eas bibere, bibat omni mane *Fol. Theæ Injusi* quasi selibram, per menses aliquot. *Cerevisia Herbis pectoralibus*, *Hedera nempe terrestris Lingue Cervine*, *Capilli Veneri*, *Abietis*, *Cupressi cacuminibus*, *Bardane*, *Dauci Sylvest. Seminibus*, *Juniperi Baccis*; *Milleped. siccatis medicata esto*, & *potioni detur ordinariæ*.

Aëris gratia, commodissime *Torofanum* ex *Isca* itur: quoniam ille, maritimus, *Pulmoni* benignissimus sit; & naturæ raro *Tussi* vexentur; rarissime *Phthisi* moriantur. Si ægri imbecillitas, aut loci ratio aëre maritimo uti non patitur, equo vetari, & quidem sæpius, juvabit. Aërem vero profuturum arbitror, tam quia spiritus animales recreat; quam quia *Pulmonem* subintrando, eum roborat confirmatque. Profunt etiam *Frictiones*; modo vehementer, bis terve in die, perfricentur externæ partes. Profunt *Fonticuli* in dorso magni, aperti, juges. Placet *Sorbatio ex Chochoolata*, *Ovi Vitello*. Cavendi vero, & quidem maximopere, *Catarrhi*; ne miasma, denuo germinans, & in sanguine renovatum, ii ad *Pulmonem* abripiant: quod quidem hisce laborantibus, si frigoris sint impatientes, (uti sunt plerique omnes) non inusitatum; præsertim eo temporis spatio, quo repetere solet paroxysmus.

Hac de causa, præter jam dicta, quæ *Pulmonum* tueantur, *Pectoralia*; quæque in primo *Phthiaseos* stadio, cum fructu adhibeantur; istiusmodi reliqua frequenti sint in usu, quæ contra hostem non jam victum, quam repulsum, & viribus redintegratis insultus iteraturum, eos defendant. Quare,

per anni dimidium hyemale, *Decoctum L. Sassafræ*, cum ejusdem *Corrice*, *Rad. Chine*, & *Sassa*, bis in die sumatur.

VIII. Hac de *Phthisi*, a miasmate *arthritico*, per sanguinem, cum *Pulmone* communicato. Siquis autem *Phthisin arthriticam*, a fermento e nervis suppeditato ortam, ejusque indolem, & tractandæ modum intueri velit; clarissimi adeat *Mortoni*, collegæ, dum viveret, amicissimi *Phthisiologiæ*, Lib. III. Cap. XI.

Ut autem pateat, antiquitati non latere, materiam *arthriticam* in *Pulmonem* aliquando invehi, & morbum ei incutere quam gravissimum, fluxionis *arthritice* mentionem fecit (1) *Galenus*, primum per universum corpus oberrantis; tum a *Pulmonibus* ad se attractæ, donec æger fuerit suffocatus, idque se in multis exploratum habuisse.

HISTORIA I.

Phthisis Arthritica lethalis.

INEunte anno superioris sæculi novissimo; scæmina *Clissenfis*, e multis una, fere quinquagenaria, me vocari voluit. *Tussis* illi fuit, eo tempore gravissima; cum sputo, interdum sanguineo, semper autem, quoties ab imo pectore decurreret, crasso, & purulento. Respiratio porro difficilis, vox tremula, & (ab imbecillitate) cum clangore quodam: pedum item tumor, pulsus debilis, & hecticus, tabes universalis, virium prostratio fuit: ut in ultimo *Phthiaseos* stadio ægra; *Febris* autem mitior, quam in *Phthisi primigenia* affectis eo morbi tempore solet, esse videretur.

Difficillimi, & jam obfirmati hujus morbi originem, & causam antecedentem, inquirenti perscrutantique mihi, ipsa narravit, matrem sibi fuisse diu multumque *Podagra* cruciatam, eaque demum extinctam: sibi autem ipsi, ante annum, & quod excurrit, tumere tarsum, & pedis convexum; atque

(1) Τα μετ' γὰρ ἄλλα τῶν φαρμάκων, ὅσα εἰς ἀπαλλαγὴν τῆ νοσήματος οἱ ποδαγριῶντες πίνουσιν, τῷ μετ' ἐπὶ τὰς πόδας τῆ ρέματος φορὰν καλῶς γίγνεται, καὶ ἐξαπαλίσκονται δὲ τῷ περιττῷ ὑγρασίαν, ἀλλὰ αὐτοὶ μίζοντος νοσήματος γενέσθιν ἐργάζονται. Πλατῶμενός γάρ ἐν τῇ σῶματι

τῇ ρέματος ὁ πόνος αἰ κινούμενος διὰ τῷ τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκῃ, καὶ διὰ τὸ μακρὸν τῷ σώματι δέχεται τὸ ρέμα ραδίως διαάμενος, καὶ οὕτως αὐτὸς ἐφ' ἑαυτὸν ἔλκων, ἔπει πνίγει τὸ ἄνθρωπον, ὅπως ἰσοκρῆς ἐπὶ πολλῶν ἐγὼ σὴ πύργματιμαδον, De Theriaca, Lib. I. Cap. XV.

atque adeo rubere, nitere, dolere: sed, cum mature nimis tumor aut evanesceret, aut repelleretur, quod *Tussis*, (qua, per multos ante annos, fuisset identidem afflicta) defubito ingravescebat, *Phthisis* viam aperuerit; ut a materia *arthritica*, pedem languide nimis afficiente, in *Pulmonem* irridente, longaque eum obsidione subvertente, *Phthisin* hanc oriri; & (auxiliis medicis, sive neglectis, sive incite usurpatis) inveterare; res esset fide omnino digna, paucis post diebus, e vivis excessit agra, *Phthisis*, sed *arthritica*, quæ vero a primigenia *Phthisi*, non facile distingui poterat, oppressa.

HISTORIA II.

Phthisis Arthritica Medicamentis calidioribus sepe levata.

Mercator *Exoniensis*, gracilis, *arthriticus* natura factus, ætate constanti leves habuit paroxysmos: extrema vero, & decrepita, jam diu nullos. Bellum pax secuta est, omnium opinione alma, tranquilla, salutaris. Sed (ut eventus comprobavit) dubia, sed fide Punica. Aliquando post (Septembri MDCCIII.) suborta est sputatio, cum aliquo spiritus impedimento, cum *Pectore* gravato; sed, ex crassa mane pituita, affatim citata, exantlatæque, ad tempus aliquot immunis. Languit appetitus; flaccuerunt artus; obtusa fuit oculorum acies, & decolor vultus. *Tussis*, sed *arthritica* est, & *Phthisis*, ultima senectute, tempore prorsus inusitato, incipiens.

Ut contra hostem, atrocem & truculentem, ore larvato redeuntem, mo paratum habeam, præmissa, ad intestina leniter inanienda, *Eccoprotico*, *Infusi amari alterantis coch. v. Tinct. M. gutt. vx. bis in die. Tinct. vero Sulf. gutt. xii. ex Syr. de Succo Erysim. coch. i. hora somni, cum Julapii Pectoralis haustu*, demittenda meo jure præcipio: *Spiritus item Vol. Oleosi guttas subinde aliquot, cum veteris Malacani haustu*. Eo nempe hæc omnia, *Phthisicis* rato præscripta; ut medicamentis hisce calidioribus, in artus, siqua fieri possit, hostis expellatur. A præscriptorum usu melius certe se habuit, tumuere pedes; levatus est *Pulmo*; *tussis* elisa.

Mense primo Decembri, nescio qua de causa, detumuere pedes; *Catarrhus* ortus

est propemodum *fervus*, cum sputo tenui copioso. Ut humorum partim eliminaret, *Decoctum Sennæ* (duplicatæ) *Gerconis* partim, ad τὰ ἰσχυρὰ, ut amandaret, *Bolus e Pul. Rad. Ari C. Zi. &c. cum infusi amari haustu*, horis duabus medicinalibus sumendum dedi. Medicamenta ex voto profuerunt: pedibus iterum paulo post, ab eorum usu, doluit ager.

At vere sequenti, (qua anni tempestate insultus iterare solita est,) cum jam plane filuit *arthritis*, in illius locum tanquam sublesta, *Tussis* recruduit, importuna, pertinax, cum sputo tenui, raucedine, tracheæ titillatione fere perpetua, spirandique difficultate: Ad quæ *Pomacei*, ægro gratissimi, usum pene quotidianum nonnihil conferre, verisimile est. *Tussis* ista negligenter habita (toto enim sesquianni spatio, nihil unquam medicamentorum, uti docuit, assumptum est) *Tussis*, inquam, inveteravit; caro absumpta est, pulsus plane hæcticus. Mense Julio MDCCCI. iterum accessit, ea, quæ sequuntur, adhibui, bis scilicet, in die *Decocti Corricis Chalybeati Zi. cum Syr. Balsamici Zi. Aq. Cin. fort. Zi. Hora vero somni Tinct. Sulf. gutt. x. e seq. Ecligmati coch. i. cum Jul. Pectoralis haustu*.

℞. Syr. de Mecon. Balsam. Aq. Hyssopi ana p. æq. misce: de quo insuper Ecligmate, nocturno tempore, sæpius ad delinendam Tussim pitiffet. Corevisia Cacuminibus Hed. terroft. Rad. China, Sarsæ, Eryng. meditata erat. Inter Omoplatas, utroque Spinæ latere Fonticulus, sex pisorum capax, aperiebatur.

Medicamentis hisce dies xx. usurpatis, micuit oculorum acies, vultus *Exoratus*, remisit *Tussis*, largiter ex intervallis faciens pituitam. Hinc pectus liberum: hinc *ὑγίεια*. Pro hæctico, calor mitis, blandus, benignus, plane naturalis, cum diaphoresi, tam utili, quam jucunda. Verbo dicam, omni ex parte sanior evasit ager, & a *Phthisi* visus est incolumis. At cheu! senibus incerta res salutis: autumno proxime sequenti, sine causa evidenti ulla, in *Diarrhæam* incidit, gravem, & impatibilem, excrementis liquidis, & biliosis signatam, quæ, alvus indurantibus suppressa, brevi recurrit; & una cum tumore pedum hydropico, naturæ subversionem ostendens, agrum, ætate grandem & imbecillum, media hyeme occidit.

Phtisis Arthritica incipiens curata.

Memorabilis certe Historia Dominici C. ex Insula Iseana, adolescentis septem supra viginti annorum patre artbrico procreati, gracilis, teneri; frigus sine injuria non facile tolerantis, & diu *Phtisis*. Ante triennium *arthritide* correptus ille, anno novissimo (tanta morbi fuit pertinacia, pedum, manuum alium aliumque digitum invadentis, & vicissim occupantis) vix binos menses egit immunes. Paroxysmi non ex illo fuerunt genere, quod inflammatione, ceteroque istiusmodi satellitio more suo stiparentur; quin potius lenes, mites; quique in longum idcirco tempus extraherentur. Quoties animus (is autem creber fuit) pedibus imminentem antevertere paroxysmum, tibialia ne vel lectum ingressurus exuere consuevit; tam noctu, quam interdiu gerens; neque sine successu: hoc enim artificio, *arthritidem*, paroxysmum molientem, identidem protelavit.

Hujus sæculi initio, mitius se habuit *arthritidis*, & diutius solito conticuit: *Pulmonem* interea obsedit pituita; quæ spirandi intulit difficultatem, anhelationem immodicam, pectoris gravitatem, *Tussim*, sputum, tam mane crassum, quam etiam copiosum. His accessit faciei pallor, universi corporis imbecillitas, languor, & in propinquo *Tabes*.

A materia *arthritica* pectus aggravante, malorum hanc catervam induci, luce clarius fuit meridiana; neque enim tunc primum istius in *Pulmonem* metastasin, etsi nunquam antea tam magnam, & tam molestam, est perpeffus. Tutor autem artus, & dolore liberatos, quoties pulmo premeretur; & e contrario, *pulmonem* liberum, quoties aggravarentur artus, semper observavi. Calor autem vespertinus, & sudor ei usitate superveniens; qui, prædictis hisce accidentibus, in *Phtisi* affectis, præcipue hac anni tempestate, solent se adjungere; certe in hoc nostro ægrotante nondum emicuerunt.

Quibus omnibus serio pensatis, in eo operam & studium impendi; ut primo pituitam, *Pulmonem* impactam, *Astrucum* amolirer. Secundo *arthritidem* deviam, & anomalam, ad ræ iis ut reducerem, itaque tueretur *Pulmonem*. Ut indicationibus hisce

satisfacerem, haustum ex aq. *Hyssopi*, cardui ben. ana ℥i. Tinct. croci ℥i. Alcohol. M. ℞. Syr. Bals. ℞. omni mane sumendum, Pilulas e G. Anioniaci ℞. Mirrbæ pil. alcohol. M. ana gr. v. Picis lip. q. s. hora quarta pom. Alias vero e Bals. Lucar. ℞. Pul. Dialthææ q. s. hora somni, ex Syr. Bals. coch. i. demittendas, cum julapii Pectoralis haustu, præscripsi. In potionem ordinariam, Apozema e Rad. chinæ, Sarsæ, L. Saffapbræ ana ℥i. corr. ejusdem ℞. Vuarum passarum exacinat. ℥i. in aq. font. ℞iv. ad dimidium coctis; colatura Saccharo crystallino dulcata. Ægreum porro sæpius apri cari, *Crispus* vesci, parce cœnare jussi, & *Hydromel* interdum bibere.

Vix per unam, & alteram hebdomadam, præscriptis usus fuerat; cum, exantlato fere omni phlegmate, spiritus liberior evasit; *Tussis* minus importuna, imo rarissima. Vires, & cum iis vultus *exigua* rediit. Quicquid fuerat symptomatis, breve intra tempus obtusum, & mitigatum est; paulo post subactum. Quinimo corporis æstus universalis, sed blandus, salutaris, benignus, quique naturæ vigorem, potius quam *Febrim* indicaret, est subortus. Posthac intra triduum in pedum altero successit dolor, tumor, rubor, *arthritidos* regularis signa. Hinc pectus, a *Phtisi* graviter urgente liberum, & si *Asa* excipias a natura *Phtisicam*, bono cum Deo, usquequaque integrum. Imo quidem postea, per annos septem, bona usus fuit valetudine; nisi quod *arthritide* laboraverit, recte interdum recurrente & quidem (uti licet opinari) propter eam ita recurrentem, bona.

CAPUT XIII.

De angina arthritica.

ART. I. **P**ost febriculam, ad expellendum miasma *arthriticum*, a natura in sanguine concitatam, quoties ea per *Fauces* illud expellere conetur, & eo loci, una cum vehiculo, id deponens, inflammationem afferat, spirandi deglutientique vias obstruentem, *angina* fit *arthritica*; morbus certe *Hæc* habens peculiare, & a Medicis parum adhuc consideratus; ab *angina* pura, & exquisita (ne dicam alios affectus, ei consimiles, & congenere)
five

sive *Therapiam* intueamur, sive *Ætiologiam*, accurate distinguendus.

II. Ut autem initio, de morbi hujus *ἵστασις* verba faciam; dari hujusmodi *angina* omnino liquet. Primum, quod ex eodem actu febrili, simul cum articularum dolore, tanquam illi gemina, *ὑποκρίνεται* ea sæpe deprehendatur, & quidem (ut frequenter accidit) interposito quodam intervallo post *arthritidos* regularem paroxysmum, quo utique intervallo novam in sanguinem materiam cumulari certissimum est; uti, cumulatam expulsionem jam esse idoneam, est probabile.

Denique, quod hæc *angina*, per se exorta, modo perfecta sit, in abcessum desinens, & copiose pus ejiciens, paroxysmi *arthritici* vicem explere; quod, ejus causam vacuare, quod, ab ejus incurfu *Podagram*, ad tempus aliquod, immunem, & saluum præstare; quod, vegetum eum, & latum reddere; (quæ sunt *arthritica* decessionis indicia) crebro advertatur.

Postremo, quod *angina* hæc, per materiam *Νόσση* in artus translationem, alias fortuitam, alias arte procuratam, intercisa, sæpe in *arthritidem* mutetur *Regularem*; sæpe etiam suapte sponte transeat; eadem plane ratione, qua *Vertigo*, qua *asthma*, qua *colica*, vel aliud quodvis *Νόσση* *Πόδα* *γρῆσις*, & eodem agri cum emolumento: ut de morbi hujus, proinde ac illorum *ῥῆσις*, nullus superesse possit dubitandi locus.

III. Eos creberrime invadit hæc *angina*, quibus, ad eam a natura fractis, collum breve, crassum, humidum, tono fibrarum laxo & imbecilli præditum; itaque humoribus tum accipientis, tum retinentis aptum: viros præ sæminis (sic enim ipsa *arthritidis*) sæpius, sed & utroque aggreditur: ex illis præcipuo eos, qui media sunt ætate; ex hisce vero eas, quæ catameniis dudum orbata; ex utrisque maxime biliosos, sanguine præservido, vel tenui donatos; nec quenquam, uti mihi videtur, unquam; nisi materia prius *arthritica* (causa videlicet procatartica) copiosa, & evecta in sanguine turgentem, jam jamque articulis doliturum. Interea vero tempore, a causis *angina* *exquisite* prævalidis, & urgentibus, in partes suas, levem & quiescentem illam aliquando trahi, non est distitendum; ita vero quæ se habet *angina*, cum parum *arthritica* sit, & propriam medendi legem minime requirat, non est hujusce tituli.

Causa hujus *angina*, (externa & evidens) frequentissima est *Potatio*; maxime pomacei, aut vini alicujus tenuis, liberior; maxime vero omnium, si accedat algor.

IV. Ut ad *Diagnosin* qualemcunque descendam, præcurrit febris; eaque sæpe, quam in alia quavis *arthritide* præmitti solet, vehementior: quæ, tamen prorsus *Symptomatica*, febrium nonnunquam æquare videatur *Essentialem*, ardentem; & est, pro ægroti temperamento, ætate, & pro causæ evidentis magnitudine, plus minus ardens. Paulo post exoritur *Faucium Dolor*, & *Tumor* *πλεγμονώδης*, unde deglutiendi spirandi que viæ semper arctatæ; interdum autem adeo, ut tridui, vel quadridui spatio, nihil unquam victus possit demitti, neque spiritus nisi difficillime trahatur. Saliva interdum affatim emanat; alvus adstricta est. Sanguis, a *Vene sectione* Gelatinam (uti in *Pleuritide*, & *Peripneumonia*) præ se fert, in excipulis supernatantem, puram, tenacem, sebaceam; & quidem; quam in *arthritide* solet exquisita, magis. Utrum vero *arthritica* sit *angina*, necne; id, ex *arthritide*, vel *angina* prægressa, vel ex ea simul semelque cum *angina* locum habente, vel eam e vestigio insequenti, id est, ex horum affectuum ratione inter se, omnino intelligendum est.

V. De *angina* pura & genuina, passim apud Auctores observatum est, *Viscidum* illud, quæ est illius causa conjuncta, modo in latus, modo in pulmonem transvehi; iisque in locis pleuritidem, vel peripneumoniam facere, morbos scilicet non tam materiam, quam locorum affectuum diversitate distinguendos. Eadem de *arthritica* narretur fabula: pari enim ritu *angina* *arthritide* materiam, sive causa continens, sæpe in pedem; nonnunquam in manum; interdum in genu (ut taceam alias corporis partes quamplurimas) transfunditur; & in illis *Podagram*, vel *Chiragram*, vel *Gonagram* affert; affectus, uti nonnullis visum fuit, longe diversos: at revera ejusdem indolis, & naturæ, locorumque ratione maxime discrepantes.

VI. Curatio vult, ut *Fauces*, quam primum liberentur: & quidem methodo ei, quæ vulgaris est *angina*, longissime diversa. Nam, cum indicatio illa generalis, duobus perficitur; quorum alterum humores evocat e corpore; alterum e parte affecta tantummodo revellit, & in artubus depo-

deponit; cumque prius illud, (quod *Venæ sectione, Purgatione, Gargarizatione, Vesicatione, & ejusmodi aliis effectum est*) utrique *angine*, purè videlicet cum *arthritica* commune est; posterius vero (quod *arthritidem* in viam reducentibus, & paroxysmum ejus regularem facientibus absolvitur) uni *angine*: Nos ea duo conjungentes, medendi legem, quam iterum & sæpius, nec infelicitè fuimus securi, & aperiemus, & quasi digito demonstrabimus.

Quoties igitur ad *Anginosum* aliquem accersor, explorata prius tumoris magnitudine, reliquisque ejus, quæ maximi sunt momenti, symptomatibus, in illius causas inquirō; & si æger fuerit ex *Arthriticorum* numero, quamdiu ab *Arthritide* vacavit, interrogo. Eam autem si invenio frequenter olim paroxysmos, statisque temporibus regulares; eosque magnos, & vehementes habuisse; nuper autem præter morem interrupisse; ex eo suspicor, *Arthriticam* in sanguine materiam, per hanc vacationem cumulatam adauctamque, in eo turbellas facere; jam nunc exulare; & in fauces, ob earum imbecillitatem & *arterias*, immissam, inflammationem in iis excitare. Major autem erit hujusce rei suspicio, si nausea, & fastidium; si gravitas, & torpor; si dolores vagi (uti solent ante paroxysmum regularem) ad tempus aliquod præcesserant.

II. Hac igitur opinione ductus, primum sanguinem (nisi nuper ille detractus fuit) detraho, & quidem copiosum. *Enema* paulo post immitti jubeo. Postridie *Venæ sectionem*, purgatio, per *Rhei* puta, *Sennæ*, & *Agarici Infusum*, cum *Syr. Ros. Solut. q. s.* lenè videlicet aliquod, instituenda; quando sanguinem exagitantia, propter ejus orgasmum, (qui hoc affectu jam satis rapidius esse solet) ne obsuerint, periculum est. De alvo sollicitanda, si cathartico fuit inanita, per dies quatuor vel quinque postea nihil laboro, ne alienum ad *τὴν Ἐντομήν*, contra naturæ propositum, alliciatur. Cervici *Epispasticum* post purgationem applicandum, idque prælargum, quod nempe colli dimidium obtegat; hinc autem, horis post viginti quatuor, succedat *Emplast. Meliloti, Cantaridum Pulvere* aspersum; sæpe renovandum, ut flumen jube & diutinum sit. Ab initio morbi usus fere perpetui est *Gargarisma* incidens, aperiens.

℞. Aq. Hordeatæ ℥j. Diamor. ℥iij. Sp. Sulph. per. Camp. quantum Lingua ferre potuerit, fiat Gargarisma, vel Melli Rosaceo
Sydenham Opera Med. Tom. II.

addatur *Sp. salis, sive Nitri ad acorem summum & tolerabilem*: Indatur ori paululum, & cum saliva post aliquot tempus ejiciatur. Nihil vero pulvere sequenti præstantius efficaciusve novi.

℞. Cryst. Min. Sacch. Christall. ana p. eq. Misce. Teneatur ℥i. donec Saliva abundaverit: tunc expuatur, & horæ post quadrantem vel dimidium, (modo sinat Vigilia) repetatur. Mirum, quantum hinc Salivæ.

Profunt herbarum *Artemesie, Salvie, Majorane, Rosismarini, Sambuci, Chamemel. Calamiothæ, Matricariæ* (quæ acti, & volatili spiritu refertæ, discutiant) decoctarum halitus, obvelato capite, & hiantè ore, in arteriam immissi. Die perendino, vel etiam citius, si necesse fuerit, de iteranda *Phlebotome* deliberandum, Iterari illam, & quidem interdum plus altera vice, postulat deglutiendi spirandique, si fuerit, difficultasurgens, importuna, periculosa, sique venam iterum secari oportuerit. *Jugularis* esto. In summo *Gutturis* dolore admoveatur extra *Cataplasma*, ex *Rad. Althææ, Fol. Malvæ, Ficus incis. Aqua Hordeata coctis*; addita hujusce *Magmatis ℥iij. Cepar. coct. ℥iij. Sem. Lini ℥ss. Mice panis ℥i. Ol. Lil. alb. q. s.* Gargarizetur autem os *Aqua Hordeata & Lactè Vaccino*, paribus mensuris, ad ipsas fauces, capite resupino, intromissis. De gravissimo symptomate, (*Spiritu nempe intercluso*) ut verbum addam, quoties ita ingravescat, ut ægro pene suffocato statim moriendum, nisi aliquis *Apollo* intervenerit; in hoc casu *Laryngotome*, tutissimum, præsentissimumque remedium, omnino facienda. Tuto certe illam, commodeque posse fieri, *Arterie penitus divisa* (cujus Historiam, admodum luculentam, videre licet, *Actorum Philosoph. N. 258.*) curatio probat.

VIII. Dum hæc aguntur, & quidem eo modo omnia, ut ne materia in partes internas transferatur; (cujusmodi *Metastasis* in *Angina Arthritica*, quam in vera & exquisita, tum frequentior, tum incommodior) alia faciunt ad *Faucium* allevationem *Arthritida Regularem* inducendo; quapropter *Acida*, sicut *Pomaceum, Vinum Album*, aut *Rhenanum*, vel alia quævis potio, dolorem arcessens *Articularem*, post purgationem, & quidem interdum libere potanda. Articulo *Arthritidi* usitatissimo, vel *Empl. ex Oxyroc. Cephalico & Pice Burg. ana p. eq.* Vel, si efficacioribus utendum, *Phænigmas* acris & stimulans admoveatur, & prout

prout usus erit, interetur. Huc confert, quæ olim veteribus familiaris, in aqua, quanta tolerari potest calidissima, *Pedum lotio*. Tumor excitatus, *Panno Vvallico*, aliove quovis raro & molli, vel *Linteo duplicato* vestiatur. Ut ille tumor *Artuum* in conspectum venit, plerunque subsidit *Faucium* iste, recurrit dolor, aliaque jam denovo rectæ *Arthritis* indicia: atque tum in tuto omnia, καὶ γὰρ τρίτην τὴν Νόσον: quod *Hippocratis*, in simili casu, argumentum est.

Si rumpatur vomica, *Gargarisma* componendum emolliens, & suppurans, (e *Decocto* puta *Hordei*, *Glycyrrhizæ*, *Ficubus*, cum *Syr. Cap. Ven.*) & demum modice astringens, *Jusculis Avenaceis*, *Hordeaceis*, & ejusmodi tenuibus velcatur æger; &, ut humorum effervescencia minuatur, utque collum versus abscindatur Πόνι, lecto, tempore diurno, quantum potest, abstineat; sella erectus sedeat; pedes deorsum versum inclinet; & in lecto alias caput elevatum, habeat. Finita re paroxysmi, leniente quodam alvus subducenda.

Exempla jam in apertum proferam, quæ lucem, uti spero, non mediocrem prædiculis scenerabuntur.

HISTORIA I.

*Arthritis, Fauces, & Artus simul
semelque occupans.*

HOMO *Ischanus*, e regione Portæ Australis, decimo ætatis lustro, ex frigore, quod ante præcesserat, *Angina* laboravit. Febris, pulsus celeri; æstu carnis immodico signata fuit: *Fauces*, cum robore, tumuerunt: voce nihil displicite significavit: spiritum difficillime traxit: cibi transitus præcludebatur. Non dubito fore plerosque, qui ex his indiciis *angina* istam simplicem & veram esse judicaverint; quam vero recte, confessim apparebit. De dolore, interrogavi, Satin salve? Numne alias corporis partes iridem occuparet? Quem cum genu, etiam & malleoli sinistri, eo ipso tempore, tametsi mitem & tolerabilem esse, cum eum articulos invadere, & more prorsus *arthritis* reverti, solitum acceperam; *anginam* hanc non tam veram exquisitam, quam in *arthriticarum* numero & classe ponendam æstimavi; ideoque non iis opus esse auxiliis, (sanguinis scilicet missione copiosa: *Clysteribus* crebris, *Emulsis*, & istiusmodi *Refri-*

gerantibus) quæ quidem omnia, in affectu absoluto commoda, in hoc nostro partim frustra, partim incommoda essent: sed ab hac methodo desistendum & id, quod strangulat, aut evocandum, aut in artus transferendum esse. Quem in finem, colli dimidio posteriori *Vesicatorium* superpono; *Cry-stalli Mineralis* ℞. & *Sacchari* tantundem (remedium ad salivam hac in re movendam efficacissimum) ut ore teneatur, ut retentum solvatur, ut solutum expuatur, omni horæ quadrante adhibeo; hinc fluidum salivæ, os, pryalismus hinc immanis.

Ut alteram, curationis partem aggrediar, & materiæ reliquum in articulos, transferam ita præcipio.

℞. Pulv. e Chel. C. C. ʒ℞. Conf. *Anthus* ʒj. *Serp. Virg.* pul. gr. v. Conf. *Alk.* q. s. f. Bolus, hora quaque octava sumendus, cum *Julapii* haustu *Perlari*. Potui vero dabatur *Decoctum Sarsæ*, *Chinæ*, *Raf.* C. C. *Eb. Sem. Coriandr.* genu & malleolo dolentibus, ut illuc materia invitaretur, *Empl. ex Oxycroc.* & *pici Burgund. ana* p. æq. admovi.

Horum usu, temporis spatio perbrevis, biduo nempe; tantus artuum, tam acris erat dolor, ut neque *Bolo* diutius, neque *Emplastro* opus esset, hoc amplius pari etiam modo & proportionem, *Fauces* deturgere, spiritus, cibique transitum aperiri, *Anginam* curari, certissimum erat. Ægroto gratulabar, quod redierat jam in viam, itaque vale dixi.

Paroxysmo illo, quo quidem nihil unquam utilius, nihil opportunius evenit, jam finito; cum illius eo tempore recidivi, nullum omnino periculum extaret: ut alvus subduceretur *Catharticum*, at (ne materia de novo irritaretur) blandum, & leniens propinavi cum *Paregorico*, hora somni post purgationem assumendo.

Mense inde post aliquot, ad *Prophylaxin* incubens, *Aquas* omni mane *Diureticas*, quarta pomeridiana *Pil. ex Salis Martis* gr. v. *Pulv. Chamæpit.* gr. xv. cum *Syr. Abs. f. q. s.* demittere, Initio vero, & deinceps septimo quoque die, per *Salem Polychrestum*, & *Magna aquis purgantibus solutum*, ventrem movere, in præscriptis habuit.

Historia profert *Arthritis* primam, febriculam ex algore generantem, tum *Fauces* graviter prementem, nec quidem artubus interea parcentem; deinde *Faucibus* (medicinæ beneficio) expulsam, & in articulos mem-

membrorum missam: Quæ quidem omnia, cum ejusdem morbi irritatio & progressus sint, de *Arthritide Anginæ* mentiente, sententiam nostram magnopere corroborant.

HISTORIA II.

Anginæ Arthriticæ ad Abscessum tendentis in Arthritida Regularem Metamorphosin.

HUc etiam facit agricolæ cujusdam suburbani exemplum, qui, annorum plus minus viginti, *Arthritide* subinde revertenti diu afflictatus, initio veris, (nescio qua de causa) *Faucium* inflammatione gravi corripiebatur, cum æstu corporis universali, & pulsu magno. Dies ille complures nihil devoravit; voce nihil clare significavit; spiritum ægre traxit. Sanguis, ingruente morbo, missus est; cui gelatina, post aliquod tempus, supernatavit densa, crassa. Saliva jugiter effluxit.

Ut *Fauces* quam citissime relevarem, (hoc enim medendi postulavit indicatio) sanguinem, quoniam abundavit, iterum mitteret; &, ad sputum augendum, *salis prunellæ saccharique crystallini* partes æquales ore sæpius teneret, solutas postmodum expueret, ægroto imperavi. *Mistura* porro data est, est, ex *Syrup. Balsam. & Aq. Cin. bord.* ad deliniendam humorum acrimoniam, & tussim mitigandam. *Chlyisma* emolliens quotidie injectum. Loco cerevisiæ, *Decoctum Hordei, Rad. Eryng. C. Glycyrrhiz. Cacum. Adiant. cum Syr. Viol.* brevi post tempore, peropportune recidit, quod genu alterum diu multumque dolebat, tumeret: unde *Fauces* levabantur, facta in hunc articulum materiæ reliquæ translatione; qua quidem re, ut nihil utilius, nihil esse potuit ægroto desiderabilius, quando per eam gutturi maxime caveretur, vitæ & saluti consuleretur.

Historia confirmat *Anginæ Arthriticæ* doctrinam; simulque monstrat, iis, quæ affluxum ad *Fauces* cohibeant, quæ gravatas eas exonerent, (*Revellentibus*, sc. *Derivantibus*, & *Resolventibus*) *Abscessum* aliquando præverti, in faucibus, *Arthriticum*.

HISTORIA III.

Materia Arthritica partim Abscessu Anginoso, partim per Articulares Glandulas expressa.

Vir amplissimus nec uno nomine colendus, humida constitutione, collo crassiori præditus, catarrho otis fere indefinente, per primam omnem pueritiam delibutus, circa juventutis initia, tum *Arthritide*, tum etiam *Angina*, morbo, uti videtur, hæreditario, verum non eodem, tempore, solebat affici. Ætate progrediente, cum ex levi in poculis errato, post artuum dolorem vagum, urgeret *Angina*, spiritus animales impendio deprimeret, suffocationem minaretur; neque vulgarem medicinam, etsi multiplicem, sentiret; ad eam allevandam arcessitus, de *Arthritide* quæro, nunquādo illa nuper idoneum ex more paroxysmum egisset? quænam apud ægroto illius ciendi ratio probabilior? Cumque ad hoc operis, prævalere ceteris, quibuscunque *Pomaceum* inaudiverim; illius subacidi, sed generosi lib. j. alteramque propinavi, eo nempe animo, ut *Arthritida*, quam diutius silentem *adumbrans Fauces* invadere subsensit, in artus propellerem. Eventus suspicionem comprobavit; paucis enim post horis, emicuit altero pede *Arthritis*. Laneo vestiri, blande tractari, molliter haberi, secundum illius genium, admonui. Sub hoc tempus, aperto *Facium Abscessu*, pus emissum est: *Gargarisma* suppurans, & modice detergens, sæpius adhibitum.

℞. Decocti Hordei, cum Ficibus incisis, & Vini Rubri Gallici ana ℥ss. Diamor. ʒij. f. gargarisma.

Doluit interea, cum ardore tumuit ex animi sententia articulus: post exitum paroxysmi, *Aq. Purgantes*, quibus ablueretur reliquæ morbi, diu potavit æger.

Anginam hanc *Arthriticam* esse constat. Primum, ex diutino *Arthritidos* silentio: tum, ex dolore prævio, antequam materia figeretur, efratico. Tertium, ex subita & facili *Regularis Arthritidos* emersione: quibus simul consideratis arguitur, præter istam *Anginæ* causam evidentem (in potulentis scil. erratum) fuisse etiam *πρωγματικός*, *Arthriticum* intus in sanguine miasma evectum, ebulliens, ambitiosum, quod, junctis causæ externæ copiis, naturam eo naturam eo usque lacessiverit, donec illa vires recolligens, hostem in exilium, materiam alienam

in *Fauces*, (ab origine debiliores) & demum, arte adjuta, in artus amandaverit.

Docet historia, in *Arthritide Anomala*, *Anginam* æmulante, spiritumque elidente, posse utiliter, artis ope *interire*, *Arthritida* fuscitari *Regularem*.

His subjiciam, ægrotum hunc nostrum, posthac, *Articulis* sæpissime laborare *Angina* vero non item: imo ratione prorsus *inversa*; sic, ut quo minus hac, eo magis illa: quæ quidem istorum affectuum, adeo inter se dissimiles mutationes pondus aliquod habent, &, demum *Arthritida* se in viam dare, & magis rectam esse ostendunt.

HISTORIA IV.

Arthritis primum Fauces, deinde Articulos invadens.

Mulier lectissima, dignitate domus, suæque celebris, nunquam *ex capiti iuxta*, quamquam marito satis probabili diu nupta, cum annos quatuor supra quadraginta compleverat, & deficere catamenia jam menses aliquam multos persenserat, obesior, & crassior evasit. Eo corporis statu ac conditione fuit, cum, vere anni MDCCV. ineunte, febricula & tumore faucium repentino corripere: quibus ut occurreret, suasionem amicorum, primum, sanguinem detraxit; dehinc cervici *Epispasticum* admovit: quorum beneficio quicquid humidi in *Faucibus* depositum fuerat, vel evocatum & elicium, vel sanguini redditum & repensum est.

Post *Tumoris* abolitionem, perpauca agebantur horæ, cum genu alterum, tum malleolus, tum digitus in pede maximi globus, & vicinus ei articulus ordine dolere; tam recte, tamque ex more *Arthritidis* exquisita, ut, utrum ipsa esset, an secus, nullus extaret dubitandi locus.

Horum autem malorum ordo, quem exposuimus, *Angina* hujus naturam non parum explicat: nam, ut *Anginam* e vestigio secuta est *Arthritis* omnibus numeris aboluta; sic, *Arthriticam* esse hanc *Anginam*, liquido & manifeste probant. Et quidem, utrumque hunc affectum eidem febriculæ subnasci, ab ea sustentari, & in *Fauces*, & in artus, alienam e sanguine materiam, per eandem febriculam expelli, minime ambigendum.

Ex hac historia, & hujus numeri aliis, verisimile videtur, non tam extremæ, & decrepitæ ætatis, quam mediæ, & constan-

tis effectum, esse hanc *Anginam*. Certe ea laborantes, qui ad hunc usque diem mihi innotuere, adolescentes, aut juvenes, excepto tantum uno, fuere omnes.

HISTORIA V.

Anginæ Arthriticæ auspiciis supervenit Arthritis Regularis.

Vir nobilis HEN. COURTNAT, Regia stirpe oriundus, & majoribus suis dignissimus, ætate media, plus semel *Arthritide* doluerat; cum, ex intervallo aliquo ab ejus paroxysmo, (nulla, quod sciam, urgente causa evidenti) *Faucium* dolore; tumore *exiguus*, spirandi glutiendique vias intercludente, tentabatur. Gustus summe depravatus; saliva viscida, sitis permolesta, æstus universalis, vigilantia gravis, febris acuta erat. Ad therapiam vena illico pertusa est, & postridie per *Pulv. VVarvicensem*, alvus subducta: *Vesicatorio*, cervice tota posteriori serum elicitur: omni horæ dimidio, salivam movens, adhibetur id, quod sequitur.

℞. Crystall. Min. ℥iii. Salis Vol. Succini ℥i. Sacchari Crystall. ℥ss. Misco, & divide in partes æquales, N. xxiv. teneatur ore particula, quoad dissolvatur; deinde cum saliva expuatur.

Potui datum est *Decoctum* sequens, calidissime pytissandum.

℞. Rad. Gram. Can. Eryng. Cond. ana ℥j. Hordei mundat. ℥ss. Coccinell. ℥i. Coq. in Aq. Font. ℔iii. ad ii. Colatura adde Syr. e Corail. Simp. ℥iv. Tinct. Aurant. ℥i. f. Decoctum. Bolus ex Salis Saturni gr. iii. Nitri purificati gr. v. Conf. Lujul. ℥j. Syr. Melissoph. q. s. ter in die sumendus, cum Jul. haustu, & ad alvum molliendam, omni vespere Enema præscriptum est.

Quibus sedulo observatis, salivam mirum quantam, ac si *Mercurio* concitatam, eiecerit. *Faucibus* allevatis, spiravit, glutiit facilius. Restitit febris, quam in declinante *Angina* solet esse, pertinacior, & huic rei aliquid amplius subesse, neque omnia conspici, comprobavit. Accessit *Podagra*, rem totam aperiens, *Anginam* esse puram *Arthriticam*, curationem postulare propriam ostendens. *Bolo* igitur, & *Decocto* refrigerantibus, ne fraudi sint ægroti, omissis, ad ea quæ *Podagram* absque nimio febris incremento promovere possint, despecto.

℞. Salis Martis gr. iv. Pul. e Chel. C. C. ℥ss.

C. *Iss.* conf. *Fruct. cynosbat. Jii. Syr. Garyoph. q. s.* bolus, bis in die sumendus cum *Julapii* haustu. Et quoniam ad invocandum augendumque morbi hujus paroxysmum regularem, plurimum valere *Pomacœum*, in experimentis est, libram illius unam alteramque, nycthemeri spatio bibat, exhortor. Pedi affecto *ceratum* viride admoveo. Doluit exinde pes, & quidem laudabiliter. Expulsa est ad ejus articulos *Arthritis*, & relictis *Faucibus* jam recte *παραφύεται*. Aquas aliquanto post, finita paroxysmi re; *Diureticas* hortatu nostro hausit, alias aliasque; primum *Bamptonenses*, anno sequenti, *Bathonienses*, utraque commode.

In *Arthritidis* silentio, supra modum longo & ancipiti, *Angina* si acciderit; utrum *Arthritica* sit, quam merito suspectum habeas, ostendit historia.

HISTORIA VI.

Angina & Abscessus Arthriticus, cum Arthritida insequenti, recta & idonea.

ANni sunt complures, cum adolescentem visitavi; sanguineum, robustum, & bene coloratum; cui *Faucium* cum dolore *Inflammatio* fuit, spiritus & cibi vias obstruens, (quam Græci *Συνδύχλω* nominant) cum actu immodico, pulsu celeri. Numquid *Articulis* unquam doluerat? interrogo. Dolui, inquit, acerbissime, ter quaterve; istud vero quid ad rem? Ego quidem, maxime, reposui, nec in curatione negligendum, sanguinem quamprimum misi, sed, pro ægri ætate & temperamento, parce, & quam in *Angina* fieri solet exquisita, parcus: ea vero copia, quæ ad demittendos cibos, & spiritum recipiendum satisfaceret. Eo vespere *Enema*. Postridie *catharticum*.

*℞. Rhei incisi ℥i. Fol. Sennæ ℥ii. Pulpæ cassiæ, & Tamarind. ana ℥iii. coq. in Aq. font. ℥vi. ad ℥iii. colaturæ adde Salis cathart. Elect. & Succo Ros. ana ℥ii. f. Potio, bene mane ebibenda. Sæpius desurrexit cum levamine, Gargarismum resolventem (ex *Ficuum pinguium* N. iv. *Rad. altææ ras. ℥℥. in aq. Hordeat. ℥℥. ad i. incollis, Mel. Mororum ℥iii. Sp. Sulf. per camp. qu. s. ad æcorem temperata*) præscripsi; eumque sæpius adhibendum: in potum ordinarium, *Pisifanam* propinavi; articulis olim dolentibus, ad *arthritidem* in eos, siqua fieri posset, invitandam, *Emph. ex cephalici, &**

Oxyeroc. ana p. æq. admovi. Paucis post diebus, aperto tumore, puris emissâ est quasi uncia. Lenito, non composito, sanguinis orgasmo, post breve tempus, articuli dolent, tument, rubent, arthritis recte agit, & anginam arthriticam fuisse monstrat. Finito paroxysmo, ad Prophylaxin, purgatis prius per aquas & Salem catharticum interaneis, aquas Diureticas omni mane hausit; hora decima seq. Trifolii fibrini Infusum; quarta pom. Bolum, cum Sale Martis, demisit: Hydragogo septima quaque die interposito, menses binos perstitit; methodumque in multos annos commodissime repetiit.

Eos, qui dolere solent *arthritide*, *angina* cum invadit; sitne illa genuina, an *arthritica*, recte ambigitur; & *anginam* contra *arthriticam*, optimis auspiciis, consilio saluberrimo *arthritis* invocatur *Regularis*.

HISTORIA VII.

De Arthritide multos annos Erratica; tunc Anginam iterum & sæpius simulante; postremo Regulari Fixa.

ADdam denique historiam, tum *angine* hujus nostræ naturam, tum *arthritidis* morem varium, & incertum, cum primis ostendentem.

Pharmacopei *Exoniensis*, viginti annos *arthritici*, uxor fere sexagenaria, *Rheumatismo*, per quinque lustra creberrime recurrente, cruciari visa est: dolore quippe artuum, brachii potissimum sinistri internodia laceffente, rodenti, erratico, vexata; *Rheumatismi* hujus larvati originem *Pomacœo*, quæ illi potio fuit, acceptam retulit.

Sub finem sæculi superioris, circa vernale æquinoctium, *angine* correpta fuit illa specie, quam *Synanchen* appellant, adeo atroci, ut (ad illam minuendam, humoresque alio detrahendos, etiamsi collo *Epispasticum* admotum, alvus enemate soluta, vena semel iterumque pertusa fuerat) toto quadridui spatio, ne hilum quidem victus ore demiserit. Eodem tempore, & pari ferme proportionem, capo exorsus est tumor, cum dolore, rubore, calore, nitore prorsus *arthritico*. Dies minimum sexaginta perduravit, in rugas demum contrahente se cuticula, & squamatim ultimo decedente; sic, ut cujus generis, quaque esset familia, tumor omnino palam faceret. Et *anginam*, & *Chiragram*, ab eadem viscida, & acri gela-

gelatina, in sanguine producta, fieri credibile est; quæ hic illic capillaris inhaerens, oppilationes, tumores, dolorem, cæteraque morbi utriusque faceret symptomata.

Adversus *anginam*, cum humores derivantibus, & repellentibus, initio morem gerere recusaret, & maturationem affectaret tumor, *Gargarismum e Decocto Ficum, Hordei, cum Melle Mororum* (postea ad detergendum, *Mel*, adjectum est *Mercuriale*) in præscriptis dedi: externe vero *Theriace Ven. Empl.* gutturi applicandum. Quicquid intus purulenti fuit; tumore post quatri-duum aperto, sensim expressum est.

Contra *Chiragram* imperavi, ut, admo-to parti affectæ *Vesicatorio*, vel (quoniam illud abhorrere visa est ægrotæ) panno molli & denso, per cutim evocaretur quicquid humidi præter naturam articulis inesset. Carpi post paroxysmum mansit imbecillitas, & ad motum impotentia; quæ tamen aliquanto post evanuit: animi vigor & alacritas major, cibi appetitus, uti ab *Arthritidis* paroxysmo solet esse, avidior fuit; sic, ut ex trium pene mensium adversa valetudine, melior ægrotæ & sanior evaserit.

Ad tollendam utriusque causam, & sanguinem (cujus in cyathis facies sebacea) corrigendum, primum, misso *Pomaceo*, & leni per *Salem Catharticum*, &c. facta *Purgatione Teraxaci Cochleariaeque Succos* clarificatos, *Lac Asininum*, *Stomachica* sumeret, imperavi. Medicina vero omni (quod ejus odium fuit) neglecta, insequenti autumnæ, vagos iterum dolores ægra persensit; qui tamen postea progressu temporis evanuerunt, in fixos sensim mutati.

Anginam postea sæpissime recidivam habuit, vere vel autumnæ quotannis, in annos complures reducem, &, vel ei a latere conjunctam, vel a tergo famulantem *Arthritide*; nunc carpum, nunc digitum, nunc talum occupantem, κατὰ λόγον aggravantem, cum solita in decessionibus animi latitia, spirituum alacritate, ventriculi latratu. Hoc vero cum discrimine, & quasi privilegio, quod, ex quo figi acciperat *Arthritis*, eo lenius & pacatius se vaga gesserit, eoque minus vagata fuerit, &, quæ diebus hisce fuit hujusmodi *Angina*, ferre blandior observata; *Vene sectioni, Vesicato-*

riis, clisteribus Gargarismis facilius cedens, & in *Arthritida Regularem* promptius, & quasi ultro abitura.

Evincit historia, primum, *Arthritidem* multos annos πλαστική, & *Rheumatismi* usquequaque similem, & in *Fixam* posse demum migrare: deinde, in erraticam retrogradi, iterumque defigi. Tertium *Arthritidem* in eodem corpore, ex eadem febre exoriri posse duplicem; in faucibus *Anomalam*; in artubus, *Regularem*. Quibus hoc adjiciendum, quod ægra, genere nata saluberrimo, cum nullum habuerit a parentibus miasma, itemque diu veteri juncta fuerit *Arthritico*; hoc contagii suspicionem alere censeatur, & *arthritidis* a marito acceptæ.

Ita quidem *angina arthritice*, (morbi, nisi fallor; hætenus obscuri) secundum illius symptomata, naturam, & morem, quantum in me est, explicui, curationem exaravi; & exemplis utranque illustravi.

C A P U - T XIV.

De Dolore Capitis, & Vertigine arthritica.

ART. I. **A**D Caput jam ascendimus, & ab *arthritide* factas in eo errationes. Istius autem morborum, uti vulgo describuntur, numerus est adeo multus; *Ætiologia*, tam difficilis, limites, & fines (propter obscuros illius partium, & (1) incognitos usus) explicatione sic egentes, ut nemini mirum videatur, morbos eos communiter receptos, hos a me prolatos non æquiparare. Paucas in apertum proferam *arthritides* in capite *anomalias*; sed, quas exploratas habeo, quæ certas, evidentes, & perspectas, *Cephalalgiam* nempe, *Vertiginem*, *apoplexiam*, & *Paralyfin arthriticam*. De duabus primis in hoc capite, propter earum conjunctionem, sicut evenire solet, frequentem, postea de reliquis, verba faciam.

II. Eos sæpe invadit iste Dolor, (nam de illo separatim, & primo loco dicam) qui, cum multos annos *arthritici* fuerunt, traducto jam vitæ medio, poculis & diætæ nimis amplæ, plus æquo indulgent; exercita-

(1) Vide Clariss. Stenonis, de Cerebri Anamote Dissertationem, impressam Lug. Bat. anno 1671.

citationi vero interea, laborique (quæ eorum mala possint corrigere) vix satis; quique ea re *Plethorici* evadunt, & solito crassiores: *Sanguinei* vero quæ ceteris quibuscunque, tum graviter hoc affectu, tum crebro affliguntur.

Ex hisce vero illos sapissime invadit, qui collo breviori natura sunt; vel qui, in *Capite*, vasa sanguinem vehentia, supra modum magna, habent, vel, qui nimis imbecillia, sanguinique in circuitu propellendo minus valentia: illos scilicet omnes, quibus ea corporis fabrica & compago, quæ humorum in *Caput* inclinationi, diutiusque in eo moræ, nimio plus saveat, opemque conferat. Ad hoc conferre non parum videntur, in *Cranio* foramina nimis angusta, quibus (veluti ligaturis) coarctentur *Venæ Jugulares*, & sanguis (sic, ut in venæ sectione) vasa tumefaciat; itaque fibras extendendo nervinas, spiritusque in iis contentos perturbando, creet *Dolorem*.

Atqui illos maximopere hic infestat *Dolor*, quando jam ætate grandes, aucta humorum vi & plenitudine simul gravati, simul iis tolerandis impares, illi, malo vehementer pariter, atque intempestivo consistuntur.

III. Sic constituto, & ad morbum hunc excipiendum aptato corpore, cogitare licet *Arthritis* id, quæ est *Arthritidis* causa proxima & conjuncta; post aliquam a paroxysmo quietem, iterum repullulans, se iterum movens, & attollens, itaque orgasmum in sanguine faciens, eo nonnunquam ipso (pari ferme ritu, ac in variolarum initio solemne est) *Dolorem* excitare; *Membranas* scilicet nobiles, tam intra, quam extra calvariæ, aut *Tunicas Vasorum* membranaeas extendendo, *Spiritusque* animales, earum *Fibras* incolentes, irritando vexandoque. Nonnunquam evenire potest, ut, in his *Membranis*, acutissimo sensu præditis, depositum miasma, virulentum & acre, pungat eas, arrodat, atque ea ratione faciat *Dolorem*.

Quocunque vero modo fiat *Dolor*, omnino palam est, eum miasmatis, sese in paroxysmum errigentis; signum esse non rarissimum, & prænuncium, ad dies aliquot durare; & tunc in paroxysmum delinere regularem. *Arthritis* vero delinquente, & accessiones sive nullas, sive languidas iterante, *Cephalalgia* sæpe oritur gravis & diuturna, ægrum hebdomadas (ne dicam, menses) aliquot exoruciat; & demum nisi

miasma ad artus transferatur, vel a capite alias abducatur, *Apoplexiam* introducit.

IV. At de natura ejus *Arthritica* ut plane constet, non solum ex *Arthritidis* silentio defectuque oritur, (quod tamen unum magni hac in re momenti est, multumque valet) verum etiam pro miasmatis *Arthritici* renovatione, incremento, & in paroxysmum eruptione, renovatur, periodos easdem, quas *Arthritis* ipsa, servat, frequentissime in eam regularem, & genuinam migrat; & quidem raro finitur, nisi per regularem paroxysmum, (quo quidem oriente statim evanescit) vel per *Apoplexiam*; quibus simul sumptis, morbum hunc miasmate *Arthritica* in caput irrepente nasci, nihil, ut opinor, indicio potest esse inculentiori.

Dolor ille non semper magnus, sæpe tolerabilis, sed dierum sæpe multorum; interdum autem pene ad delirium usque gravem observavi, patientia majorem omni.

V. Quanquam iste *Dolor* insultum aliquem *Arthriticum*, & quidem usitate regularem, vel *Apoplexiam* antecedit; interdum accidit, ex regulari paroxysmo, (repellentibus, vel animi pathemate, aliave aliqua causa interciso, & abrupto) eum excitari, mediaque naturæ opera, & molimine, primum apparere. Quod tamen eodem pertinet, quando utroque casu miasma, minime sic, ut debuit, expulsum, *Capiti* inflatum est, in illud vires exercet, & *ὀλύμπια δόματα ναιε*.

VI. Nonnunquam ægrum hæc *Cephalalgia* per se lacessit; identidem *Vertigine* commitata: hæc enim illi est tanquam soror gemina, & comes fere individua. Adhæc aliquando accedunt tinnitus aurium, spirandi gravitas, pulsus magnus, artuum dolores vagi, faciei color saturatior, aliqua istiusmodi manifesta sanguinis *ὀργασμοὶ* indicia: quæ quidem omnia, ut ab *Arthritide* inertis, neque satis idonea proficiuntur: ita quamprimum illa artus occupaverit, & ad tempus aliquod recte se gesserit; confestim ea, simul cum *Dolore* capitis, redeunt; neque aliam videre licet *Arthritida*, quam quæ ex omni parte regularis.

VII. *Vertiginis Arthritica*, sicut omnīs, *Subiectum* est ea *Cerebri medullaris* pars, quæ cogitandi officina est: in qua, dum spiritus animales ejus instant tubulos, & in iis sese movent, uti placuerit *Anime Rationali*, (cujus sub præsidio, nutu, & imperio, totum istud *Cogitationis* opus effici-

sicitur;) hi eorum motus; sive pleno flumine, sive tenui; sive in tubulis pluribus, sive paucioribus; sive prorsum, sive retrorsum; sive magno cum impetu, sive remisso; sive inflectione, sive evolutione; sive denum alio quocunque modo, & figura ferantur illi, ipsæ videntur hominis, sani & valentis, esse *cogitationes*; & pro harum varietate talem in numerum variari, ut, quo singula *cogitatio* formetur exprimatque, suis singulæ spirituum rite ordinatorum, & huc illuc rite fluitantium, *Motus* respondeat.

Hoc ut clarius ostendatur, quivis seipsum examinando facile perspiciet, quanta sibi in somno tranquillitas, quam alta quies, & a sensu motuque omni voluntario (in somno, veluti in ipsa morte) vacatio, Contra, somnum excutienti palam est, primum omnium in cerebri meditullio derepente quoddam *micare*; eodemque ipso temporis articulo, *cogitandi* solitum munus, & pensum instaurari. Prima vero *cogitatio*, vel pro re nata omnino nova est, & jam tunc incipiens; vel) quod ad hujus rei explicationem non parum confert) quæ somno interrupta quarum prior modulationi, organis, pneumaticis inchoatæ, quodammodo similis videtur; posterior intercisa, & medio systemate fracta; sed aliquanto post elaboratæ, & ad finem perductæ. Atque istam in cerebro spirituum *ἐλάττω* illico sequitur (nonnunquam comitatur) motus ab ea propagatus, in corpore muscularis, &, (1) *Galeno* jam olim observante, *Qui expergiscuntur, e vestigio pulsus magnos, vehementes celeres, & cum quadam vibratione habent; qui mox mediocritatem assequuntur.*

Quis autem unquam, in somno spiritus extingui, & ad nihilum redigi putavit? Annon potius credendum est, durante somno in medullaris cerebri tubulis eos stagnare, & (tanquam aërem, in tibiis organi silentis) quiescere; *micansque* istud, quod expergiscences primum sentimus, horum esse *Spirituum* in iis (ad instar venti, in tibiis organi) *Motuum*; &, quod erat explicandum, *cogitationes* humanas nihil aliud esse, quam *Προμαθηζίας*, sive *Spirituum animalium* certis quasdam, in tubulis prædictis, *Fluctua-*

tiones, secundum leges, & regulas, ab *Αἴμα Rationali* positas, & datas.

VIII. Hisce præmissis, altero jam loco dicendum est, in *Verrigine* spiritus animales cogitandi munere exequendo impediri; in rivulis a suis aliquot ordinandis, eorumque motibus regendis, interturbati; eumque in modum perverti, qui externa quæque *Objecta*, tanquam in gyro circumacta, repræsentet, itaque, ut ex eo fallatur *Imaginatio*, *Judicium* autem maneat integrum, & inconcussum. Perinde forsan, ac in modamine faciendo, si una, vel altera organi tibia, rauca fuerit, & dissonans; ex illius vitio, (tametsi reliquæ omnes claræ fuerint, & illasæ, statim auribus peritis gravitas quanta maxima sit, harmonia perimitur.

IX. Scio nonnullos, arte nostra principes, hac de re aliter opinari; spiritusque animales, acie quasi militari, & veterum iritionum reditionumque tractibus relictis, in gyros agi, tradentes, per *Rationem*, & spirituum *ἑλάντων*, *Verriginis* modum & naturam explicare. Cum vero, quo in campo eorum acies instruantur; quo, eorum fiat *Ἀπαξία* nulla unquam detexit *Anatome*: contra vero, *cerebrum Medullare* totum, ex *Tubulis*, sive *Ductibus*, in *cerebri cortice* incipientibus, una hoc loco colligatis, & in *Nervos* infra divisis, & dispersitis constare; sicque spirituum gyris, & vorticibus, (aliter quam in *Tubulis*, qui quidem iis admittendis minime sufficiant) ineptum esse, quando Clarissimi *Malpighii* *Anatome* detexit oculatissima; longa satius videtur, per *Tubulos*, perque spirituum in iis motus, quales in rerum natura esse, pro certo habeamus; (etsi, quis spirituum motus cui conducatur *cogitationi*, prorsus ignoretur,) quam per ea, quæ nusquam inveniuntur, aut esse judicentur, morbi hujus explicationem aggredi.

Quinimo, dici potest, rerum extra sitarum, totiusque hemispherii visibilis, per ea, quæ sibi sunt dissimilia, veras intus in *Cerebro* posse fieri representationes: (nisi velimus, objecti *Viridis*, v. g. concipiendi ergo, *Viride* quoddam in compendio; sicque *Rubri* ergo, *Rubrum*, *Nigri* ergo, *Ni-*

(1) Τῶν δ' ἐξ ὕπνου μεταπεπρωκότων, οἱ ἐγρηγόρουν παραχρῆμα μεγάλοι, καὶ ταχῆς, καὶ πυκνοί, καὶ ἀνὰ κλόνον ἔχοντες, μετ'

ὀλίγον δ' εἰς συμμετρίαν ἔρχονται. De Causis Pulsuum, Libro tertio, Cap. x.

Nigrum, &c. in *Cerebro*, quo nihil unquam absurdius; statuere:) eoquē posito, rerum externarum falsas imaginationes, quales sunt in *Vertigine*, per iis rebus dissimilia posse fieri dicamus; adeoque, ad earum in gyro & circuitu moventium imaginationem, etiam falsam spirituum in cerebro motu simili nequaquam opus esse.

X. At qualescunque fuerint eorum motus (neque enim in his *symplicibus* diutius hærere lubet) certe perturbari possunt, vel per alienum & inimicum aliquod, in *Cortice Cerebri* a sanguine depositum; hæc in penetralia, & sacrosancta adyta, se insinuans, *Spirituum* choro se immiscens; ad eos adhærescens; eosque inter se confundens: vel, per vasa sanguinem vehentia, in propinquo tumefacta, tubulosque spiritus continentes coarctantia. Quæ posterior ratio probabilior est, in *Vertigine* cranii depressionem excipiente; ubi angustiis *Spiritus* urgentur, nec, quo possint choreas exercere, theatro satis spatiofo gaudent. At in *Vertigine* variolas antecedente, vel ab ebrietate, & in hac nostra *Arthritica* locum obtinere potest (uti videtur) utraque.

XI. Præterea *Vertigo* hæc, cum *Dolore Capitis Arthritico*, concordat ex amussi: similia namque cum eo corpora, crassa nempe, plethorica, maximeque senilia, invadit; similem habet originem, ex miasmate *Arthritico* repullulante, cristas erigente, fugam e sanguine consciscente: similes habet periodos, & typos, *Arthriticis* paroxysmis respondentes, eosque in nonnullis ægrotantibus numerò permultos: similes habet comites, sive signa *Symptomata*, dyspneam, capitis gravitatem, aurium tinnitum, spirituum depressionem: similem etiam exitum, cum paroxysmo plerumque regulari terminetur; interdum *Apoplexiæ* cedat *Arthritica*.

Aliquando levis hic affectus, & *Arthritidis*, paroxysmum molientis, signum insuper primum, & prænuntium. Molestus sæpe sic, ut eo laborans, ne in humum cadat, baculo adniti; fere continuo cavere, necessum habeat. Quæ levior est, *Arthritide* regulari, serius aut citius erumpente, fere concluditur. At quando nulla venit in tempore *Arthritidis*, *Vertigo* interdum aggravescit, & deinde paulo post in *Apoplexiæ* migrat. In *Epilepsiam*, utpote morbum confinem & proximum, *Vertiginem* mutari exquisitam, a Medicis passim observatum est; at in eam mutari *Vertiginem Arthritici*. Sydenham Opera Med. Tom. II.

cam, ex nostra, vel aliena observatione, ne semel quidem novi, ut miasma *Arthriticum Epilepsie* generandæ minime aptum existimeretur.

XII. Curatio partim fit per ea, quæ utrique his affectibus sunt communia; partim per iis propria. Inter communia, primum *Phlebotomia* consideranda est, quæ, ut humoribus e *Capite* derivandis, tam repentino, quam magno est auxilio, sæpe commoda reperitur, & ubi *Dolor Capitis*, aut *Vertigo* isthæc urget, maxime vero ubi oculorum caligine, faciei rubore, arteriarum in temporibus pulsu, & ejusmodi (quæ sanguinis ad *Caput* inclinationem indicant, & *Apoplexiæ* minantur) aliis comitatur, apud prime necessaria est; Ea vero ratione copiamque (quod in malis similibus alias sæpe dixi) mittendus sanguis, non qua vulgo in his affectibus absolutis, & minime *Arthriticis* soleat; sed qua, *Arthritidi* in artus abigendæ saveatur; nec quam ad *Caput* allevandum opus fuerit, uberiori.

Pertusa vena, & orgasmo in sanguine novo, miasma expellente, facto, nonnunquam illico dolent articuli; sin aliter fuerit, *Purgatio* instituenda est. Si qua ventriculi querela sit, hoc tempore *Vomitio* moveatur, & quidem per *Decoctum Tee*, vel *Posssetum carduatum* aptissime. Ea vel peracta, vel (tanquam inutili) prætermissa protinus ducenda alvus; dato, in eum finem, e *Pil. Ruffi*, vel *cochiæ min.* vel e *Duobus*, una cum *Res. Jal.* granis aliquot, purgante, quod nimirum intestina non solum inaniat; verum etiam sanguinem exagitet, turbet, & a miasmate, foras illud expellendo, liberet. Opus istud duplex (humores alios per alvum evocandi, alios in venis agitandi) interdum mitioribus, in constitutione scil. tenera purgatuque facili, perficitur. Interdum *Aquæ*, sive *Alfordenses*, sive *Fontana*, *Sale cathartico* saturata, rem conficit. Est ubi *Purgatio*, sive propter ejus lenitatem, sive propter humorum colluviem, una vice non sufficiat, atque pro re nata repetenda sit; ita vero ut *Arthritide* *non* *esse* affigendæ accommodetur.

Purgationem, uti par est, factam creberrime sequitur extremitatum dolor; At si usque se miasma in sanguine contineat, usque delitescat, turbis in eo intestinis & ciendis, & augendis, quam exilio, pro naturæ jussu, capeffendo pronius; hoc casu, ea, quæ ore sumpta fortius *Podagram* expellant, quæque extra admota eveillent, usur-

usurpentur. Quæ vero, ore data, *Podagram* expellant, non nisi caute (præmissa nempe venæ sectione, alvique ductione, & *Capite* multum iis sublevato) adhibeantur; ne, quæ sanguinis, & simul cum eo miasmatis, in artus extrudendi causa præbeantur, contra in *Caput* utrumque pellant; itaque malum intendant, & mortem arceant. Et quidem, a *Chalybeatorum* potentissimorum, & *Arthritidem* maxime expellentium usu, manum idcirco melius abstinere possumus; quia *Cephalica*, mox dicenda, suoque tempore propinanda, istorum medicamentorum magna ex parte vices supplere judicentur.

Quæ de causa, in *Dolore Capitis* (ut ad propria descendam) *Pulv. e Cbel. C. C.* vel *e Corall. r. e Cbel. Simpl. Succini albi*; vel istius classis alii mitiores, sive per se, sive cum *Conserva Anthus*, vel *Cons. Flor. Betonice*, & *Syr. Stæcobados*, vel *Syr. Pæon. Simp.* sub forma *Boli* aut ex iis *Pulveribus*, una cum *Pul. diſtamni Cretici*, *Castorei*, vel *Sem. Pæon. & Extracto Gentiane*, *Pilulæ* componi possunt. Quinetiam hisce, sive *Bolis*, sive *Pilulis*, tuto interdum, & utiliter adjicere licebit *Salis Martis* (vel etiam *Alcohol. M.* post evacuationes copiosas) gr. iii. vel iv. & compositionem, sexta vel octava quaque hora, repetere. Omni autem ejusmodi dosi superbibere oportebit *Julapii* (ex *Aqua* puta *Cerasorum nigr. Flor. Tiliæ, Pæon. simp. & comp. & Spiritu Lavend.*) *Haustum*: *Mediis* autem intervallis ex usu erit *Tinctura Succini*, vel (ubi febris, non immodica, fuerit) *Sp. Vol. Oleof.* vel *Sp. C. C. cum Speciebus destillati*, guttas aliquot, ex cacuminum *Salviæ tenuifol.* vel *Rorismar. vel Tee*, infus. *Haustu demittere*. Hæc enim remedia, præmissis universalibus adhibita, spiritus animales blande reficiunt, & *Arthritidi* in artus expellendæ quodammodo opitulatur. Neque *coſeæ Sorbito*, quando *cephalalgia* ritu singulari medeatur, præcipue si *cephalica* ei superjiciantur, ægrotis hisce deneganda.

Simili fere modo in *Vertigine Arthritica*, post evacuationes jam dictas universales *pul. Sem. Rutæ, pæon. maris, castorei, Rad. Valerian. Sylvest. cyperi, cort. Vvinteran. cort. ext. Aurant. Species Dianthus, Diamosch. dul.* per se possunt adhiberi, vel eorum aliqua cum *cons. Flor. Pæon. & Syr. eorum*, vel *Syr. N. Myrist. ex Indiis allato*, electuarii forma. Porro ex *pul. de Guttæ, & Ente Veneris*, cum *Extr. calami Aromatici*, vel *Aſſa fatida* solutione, fermentur *pilulæ*: vel,

cum iisdem pulveribus adjungi potest, in eadem forma *Sal Martis*, vel *Sal Succini*. Ex his composita sumantur, hora quaque sexta, vel octava, dosi videlicet adeo tum frequenti; tum etiam magna, quæ spiritus animales ordinet, recreetque; non quæ confundat, irritetve. Dosi vero cuilibet æger superbibat *Julapii cephalici* haustum: uti mediis etiam intervallis *Infusi* præscripti cyathum, cum *Tinct. Succini* guttis aliquot. Proſunt graveolentia naribus admoda, *Sp. Salis Armon. cum Sale Tartari, castoreum, Aſſa fatida, &c.* proſunt etiam *Eſſia: Balsamum*, quod ab humanissimo sene, D. D. *Vvatherouſe*, hac in urbe Medico, dum viveret, præcellentiſſimo, communicatum fuit, ad tempora & nares inungendas, his aliisque *capitis* affectibus quamplurimis, utile & jucundum erit.

℞. Ol. Rorismar. Lavend. Majoran. Thymi, Origani, Hyssopi chym. ana ℥j. cinnam. Aurant. Angelicæ, Rutæ ana ℥ſſ. Gaioph. ℞ſſ.

Ol. Nucis Moschat. per express. ℥iv. Ambra grif. ℥ij. Moschi ℥j. Bals. Per. ℥v.

Ambra grif. & Mosch. ponantur super Lapidem marmoreum; humectentur Oleis; & simul tritentur Lapide molari, donec fiat Massa, instar Pomati inspissata. Huic mixtura adde Bals. Per. Per horæ dimidium tritentur. Deinde adde Ol. N. M. per Expressionem, & per horam fiat Trituratio. In phiala servetur usui balsamum cephalicum.

Quamquam autem ista *Caput* multum allevent, spiritusque labentes fuscitent, non iis solis adhibenda fides, Nusquam major incolumitas, nulla perfectior curatio, quam per *Arthritidos* in artus expressionem. Quare, post diem unum, aut alterum, *Cephalicis* ore sumptis impertitum, in utroque hoc affectu (par enim utriusque ratio) *Externa*, quæ *Arthritidem* educant, adhibeantur articulo nempe sæpiſſime dolenti applicetur *Empl. ex G. Caranne part. ii. Cera flavæ p. j. Ol. Lumbric. q. ſ.* vel aliud aliquod *Ἀνακαταρτικόν*. Hoc autem si nullarum erit virium, & *Capitis* affectus remanebit, maxime, si increſcet, tanquam in *Apoplexiam* abitura, ad *Sinapismos, Vesicantis, Vestitum laneum, & Laqueos* hac in re idoneos, (quibus *Arthritis* summopere edusatur) quasi ad sacram anchoram, confugiendum est.

Quam parum autem adjuvent in utroque hoc affectu; imo quam suspitiosa, ne dicam

dicam periculosa, sint *Emulsa*, *Decocta refrigerantia*, *Narcotica*, *Oxyrrhodina*, *Epithemata*, *Capitis aqua frigida* *Lotio*, & ejusmodi alia, quæ ad compescendum sanguinis orgasmum alias cum fructu usurpentur, facile apparebit: quando illa materiam alienam, protinus evocandam expellendamque, medicina prorsus adversante, & repugnante, *Capiti* infigant. Neque satis, ut opinor, tutus sanguinis per *Hæmorrhoides* suctus: quando eo, nimia sit humorum in anum derivatio, quæ vel *Inflammationi*, vel *Fistule* viam aperiat.

Ut autem materia vitiosa, tutelæ ergo, præscindatur, alioque divertatur, operæ pretium erit *Epispasticum* brachio, vel cervici aliquando imponere: ineunte anno, (quando *Apoplexia* tempus esse solet) aliasve, si urgebit *capitis* affectus, sanguinem detrahère: *Purgans*, omni mense, repetere: alvo nunquam diu astricta esse: artus, at præcipue pedes calidissime vestire. Quin & his hominibus incumbit *Errhinis*, & meditationibus, religiose vero nimia potatione, abstinere.

HISTORIA I.

*Ab ignava Arthritide Vertigo, Sanguinis missione & Alvi ductio-
ne, vitæ.*

Quidam annos quatuor supra quinquaginta natus, *Vertigine* affectus, dum in his lucubrandis occupor, e vicino oppidulo me appellit. Fuit ille jamdiu *arthriticus*, paroxysmos habens, sive eorum frequentia, seu severitas inspecta sit, idoneos. Autumno anni MDCCV. *arthritis*, ignava jam & socors facta, non eo, quo solebat, ardore & vehementia se gessit; paroxysmum, uti moris erat, laudabilem non ullum edidit; verum, in mediocri & imbecilli edendo, languide enixa est. Loco paroxysmi regularis, & acuti, *Vertigo* ægrum invasit, multumque cruciavit. Quoties enim lecto ille jacuit dextro latere, statim *Vertigine* prorsus intolerabili (quippe qua universa sursum deorsum rapidissime ferri viderentur) tanquam oppressus, & pene moribundus, posituram corporis illico mutare necessum habuit. Porro ea fuit hominis fabricatio, quæ plenum, subpinguem, brevique collo donatum eum, morbis cephalicis pronum, & proclivem abunde redderet.

Sic constituto suasi, ut quam citissime venam incideret; *Pilulis Purgantibus* (e *Rudii* 3℔. *Res. Jal. gr. v. calum.* 3℔. *Balsam. Per. q. s.*) Ventrem inaniret; itemque altera vice, pauculis post diebus, nisi dolor *articulorum* novus id vetaret. Eo vero redeunte, parti affectæ *Empl. e cephalici*, & *Picis Burg.* æquis ponderibus, imponeretur. Detracto sanguini, & parumper in cyatho quiescenti, superincrevit gelatina densa, crassa, cum superficie flavescente.

Præceptis æger obtemperavit, & quidem magno suo, quod deinde accepi, commodo.

HISTORIA II.

*Vertigo Arthritica, Purgatione in
Podagram mutata.*

Aurifaber *Exoniensis*, vir priscis moribus,

Integer vitæ, scelestisque purus, ætate progressus, & ex ea nimis desidiose acta, crassior jam & habitior factus, de nimia plenitudine, & ad motum impotentia, de *Vertigine* gravi & urgente (quæ in negotiis obeundis magno illi jam impedimento fuit) me consuluit. Cum *arthritidem*, hujusmodi deviam, & *anomaliam*, me plus semel observasse recoluerim. Num articulis unquam ægrotaverat? Interposui. Olim sapissime, respondit æger: hosce vero per annos minime.

De morbi indole & natura certum me habens, ut eum a capite deducerem, & in articulos, sedem & domicilium suum abire facerem (quæ quidem indicatio rectissima esse videbatur) viam, atque in *Vertigine* absoluta, calcari aliam oportere judicavi.

Quare sanguinis detractione (quæ propositorum alterum tantum promovere solet, alterum autem interdum inhibere (prætermissa, *catharsin*, quæ utrisque illis satisfaceret, institui; purgante, pro *Koiliæ* & *Λουσιæ*, satis forti ad eam rem electo, *calomel.* gr. xv. *Scammon. pul.* 3℔. *Pil. Strom. cum G.* 3℔. cum *Bals. Per. q. s.* pilulari forma, mane demisit: sæpius hinc deiecit; hinc claudicavit; hinc convalevit.

*Vertiginem, & in capite Dolorem faciens
Arthritis, idque usitate, Venæ sectione,
& Purgatione toties in arti-
culos acta.*

A Romatarius hac in urbe, constitutione sanguinea, plethoricus, sexagenario major, anno MDCXCVI. *Vertigine* laboravit. Simul atque cum novi pedibus sæpe doluisse, suspectumque habui capitis hunc affectum esse *arthriticum*; hac re considerata, primo, sanguinem detraxi; deinde alvum semel iterumque movi: postremo, animales spiritus quæ reficerent, eorum *Aromaticas* inhiherent, ea suo ordine sumenda; fonticulos etiam utroque latere spinæ inter omoplatas aperiendos, imperavi. Quæ autem inde fruges? *Pes* iterum jam tum doluit; defensum est *Caput*; civis servatus.

Anno proxime sequenti, circa vernal æquinoctium, idem pene casus altera jam vice accidit. Intermittente enim, ultra quam soleret, *Arthritis*, rediit *Vertigo* cum *Dolore Capitis*: quæ quidem ambo venæ sectione, purgatione, pharmacisque jam dictis, in *Podagram*, (qua nihil capiti salutarius esse potuit) actutum mutabantur.

Æstate anni MDCCII. æger iterum *Vertigine*, simul cum aurium tinnitu, spirandi-que difficultate multatus est: quæ quidem mala, plenitudine & *Arthritis* nimis inertinata, post venæ sectionem & catharsin, articulari dolore finire.

Observationibus hisce toties iteratis, planum omnino factum est, *Arthritis*da suppressam, & a paroxysmo quiescentem, *caput* aliquando visitare; quin etiam derelictum illud, præ cæteris in trunco locis quibuscunque, tanquam alteram domum frequentare. Porro, cum in alieno isthoc, utur charo, & amabili loco diversetur, posse in sedem primariam, in artus, & articulamenta revocari. Denique nonnunquam (in iis scilicet ægrotis, qui firmiores, & multo robore valentes sunt) per venæsectionem, & purgationes, quibus sibi restitatur, & suis viribus uti, suoque modo agere permessa sit natura, sine multo *Ποδαγραγῶν* apparatu, posse egeri.

*Capitis Dolor & Vertigo Arthritica,
sæpe revertentes, simili methodo
curati.*

Medicamentarius *Exoniensis*, quo multos annos utor familiarissime, *Arthritis*diu regulari affectus, sub exitum sæculi nuper elapsi mitius solito, rariusque cœpit dolere. Malorum ex eo tempore statim crudele par exortum est; *Vertigo* nempe, cum *Dolore Capitis* acuto, vel, ægrotum eo deficiente, cardialgia, cum ructu acido, & inflatione ventriculi.

Biennio post, cum *Arthritis* nimium ignava esset, nec, ut opus fuit paroxysmum ageret, *Κεφαλαλγία* rediit, una cum vagis artuum doloribus; & quidem pedum incertis.

Quid autem annos dicam? Decies ego minimum, hunc hominem hac *Vertigine* laborantem vidi: decies eum moestissime querentem audiui. Quando enim *Arthritis* multum affligeretur, neque ea semper regulari; quali eo modo se plerumque gesserit, hisce paucis accipite. Præcessit dolor, hic illic erraticus, per artus, per trunci ambitum propemodum omnem: hunc excepit, ita vero, ut illius fere latus clauderet, torpor, universi corporis gravitas; cum *Ασπῆξια*, sanguinis orgasmo, & tumultu, venarumque distentione. His accessit alias articulorum, alias *Capitis Dolor*, & deinde *Vertigo*. Tum autem magna, tamque molesta *Vertigo*, ut, qua in præceps ne ageretur, sæpe haud immerito perimeret. Ægroto autem forti, robustaque, & omnino firma constitutione prædito, ea fuit felicitas, ut, post dies quatuor, vel quinque, *arthritis* sæpe per se τὰ ἄνω peteret, eodemque tempore *caput* desereret. Si quando gravius urgere, diutiusque *Vertigo* perflare contigerit, quod aliquoties accidisse novi; venæ sectione & purgatione, (altera earum, vel utraque) in articulos semper exulavit. Cui & hoc adjiciendum, nunquam ægri, seu *Vertigine*, seu *Dolore* afflicti, *caput* ex toto immune, & incolume prius reddi, quam in *Articulis* dolor oboreretur; eo vero jam oborto, liberari semper, & tanquam auxilio præsentissimo & plane divino, isthuc incolume reddi. Quæ utique re, ad istarum *Anomaliarum* & explicandam *Ætiologiam*, & confirmandam

Therapiam (ut ego quidem sentio) nihil magis potest conducere.

Causam autem ne silentio præteream, quare sanguis in hoc ægroto toties, & tanto impetu in *caput* irrueret, vel impelleretur; ipsa *Facies* eam monstravit: *Facies*, inquam, hominis pyropi ruberrima, venis ubique turgidis signata, sanguine plenissima. Quæ cum ita se haberet, vasa, in *capite* sanguinem vehentia, supra modum magna, & immenso ejus flumine, quod utrique isti *Anomalie* daret originem, distenta esse indicavit.

HISTORIA V.

Cephalalgia Arthritica, *Vena sectione*
& *Spiritu Volatili*, in *Podagram versa*.

CUM vitam aliquot ante annis Academicam secutus sit, quidam a proximo vicinus, oppidanus, ebrietati satis, socordiaeque satis deditus, (quarum altera vim humorum magnam in corpore congerere; altera non eliminare solet) opem meam qualemcunque medicam imploravit. Erat illi, propter malam vitæ rationem, corpus crassum, *Cacochymicum*, pingue, morbo non unius generis accipiendi paratum: ita vero constitutum sorte fortuna invasit *Arthritis*, & a malis gravioribus, tanquam possessione suam, defendit. Semel, bis in anno paroxysmos, eosque satis longos, & acutos celebravit; perque omne illud tempus abstinere fecit ægrum. Demum, nescio qua de causa, *Arthritis* intermisit. *Cephalalgia* statim orta fuit acris, & toleratu difficilis. Membranas *capitis* majores contrahi, & in spasmos obstinate constringi, verisimile est. Enim vero tantus ægri fuit cruciatus, quantus omnem modum excedere, quantus sensum communem obruere, & pene delirium inferre videretur.

Hæc ut primum novi, & ab *Arthritide* interrupta, devia, & in *caput* inversa, turbas has oriri intellexi; sanguinem extemplo mitti, & quia constanti vir ætate, firmoque corpore erat, non nimis parce detrahi præcepi, spiritum posthæc e volatilibus, cum vehiculo conveniente, dedi. Quam quidem medendi viam ideo calcavi, primum, ut alienum e capite revellerem; denique, ad *id* amandarem, iisque figerem. Neque a scopo aberravi; hac enim medicina factum est, ut dolerent, ut tume-

rent, utque ruberent iterum articuli; & quidem (ut illa facta est) statim, maximeque ægri cum utilitate.

HISTORIA VI.

Miasma Arthriticum in Caput immissum, eique Vertiginem & Dolorem inferens, eo repulsum, & in artus mandatum.

TENERA constitutione mulier, frigida *Arthritide*, & languenti creberrime affecta, tumorem ejus pallidum, tanquam a statu generatum, in utraque manu, & carpo, magnum ostentavit. *Arthritide* sic gravatæ profecto male evenit, animi *Pathe-mate*, propter res quasdam adversas, supra modum affligi. Eo enim effectum est, non ut spiritus solum perturbarentur, multumque deprimerentur; verum etiam ut tumores hi *Arthritici* prorsus subsiderent, evanescerent. *Vertigo* statim hinc exorta est, una cum *Dolore capitis & colli*, cum somno non tantum injucundo, sed inquieto, tumultuoso, & frequenter interrupto. Quæ quidem mala, si ex omni parte *Hysterica* dicantur, temere nimis & parum consulte (quod utique rei exitu probatum) id diceretur. *Epispasticum Nuchæ cervicis* impositum est, & deinde utrique brachio; quibus seri multum evocatur. *Pilule* sumuntur *Aleotice* (ex *Aloes Rosat.* ℞j. *Pil.* e duobus ℞ss. *Ol. Absynth.* gr. i. *El. prop.* q. s.) quibus alvus inanita, sanguis agitated. *Spiritu C. C. succinato*, bis in die cum *Julapii cephalici* haustu, & *Pulvere Podagram* expellente (*chalybis* nempe *Nutrivi* ℞ss. *Pul.* e *chel. C. C.* ℞i. *Maceris Pul.* gr. iv.) pariter bis die, cum *Vini canarini* haustu, per dies circiter decem assumpto, factum est, ut denuo tumores, & quidem intra breve spatium, elevarentur; ut *arthritide* procul a locis principibus arceretur; ut partibus a centro vitæ remotis infingeretur, & detineretur. Qua vero ratione gradibusque sunt hæc effecta, *Cerebri* incolumitas effecta, ipsius vitæ res servata est.

HISTORIA VII.

Cephalæa & Vertigo Arthritica, Medicina pari, cum Phœnigmis, sublata.

VIR reverendus, ætate constanti, doluit *arthritide*; nunc vaga, per hæc illa membrorum internodia; nunc articulis affixa, dolore, rubore, & tumore comitata. Primo supra decimum exeunte lustro, *cephalalgia* & *Vertigine* laboravit, tum gravibus, tum diutinis. Cum me, consilii ergo, primum arcessiverit, ex constitutione sanguinea, vultuque florido judicavi, plenitudinis, & quidem ejus unius, has esse soboles; itaque sola evacuatione posse eas auferri: quam tamen (excussa omni re, & inito cum ægotante colloquio, penitus examinata) sententiam mutare necessum habui, & alienam, & *arthriticam* in caput irreperere materiam, apud animum meum statuere.

Hoc igitur propositum ante oculos statuens, venam primum incidi, & minore quantitate, quam in his affectibus absolutis conveniret, detracto sanguine, *Emeticum* præcepi; posteaque *Purgans*. Quibus malum quando leniri, minime vero tolli persenseram, *Pilulas* (ex duobus, & *Ruffi*) drasticas adhibui, ut in sanguine major orgasmus ciceretur, & alienum proscriberetur. Postridie purgationis, ut humores excitati, foras evellerentur suisque demum locis, nempe *Articulis*, infererentur; curæ mihi erat, utrique malleolo, quem *Arthritis* locum usitatissime frequentavit, *Sinapismum* (ex *Fermento veteri*, *Raf. Radicula*, *Sem. Sinapios*, *Cacuminibus Rutæ*, & aceto *Vini albi*) applicare.

Atque ista methodo in *Cerebrum* insinuantem, *Arthritida* revelli; proprio loco (nempe *Artubus*) mandavi; suos intra terminos, sua spatia coercui; ægrum sanavi.

HISTORIA VIII.

*Vertiginis Arthriticæ, cum Spirituum de-
pressionne gravi, Curatio.*

CIVIS *Isæmus*, *Arthritide* regulari, quottanni redeunte, per senectæ initium, est afflictus: sexagenarius autem, vel eam circiter ætatem, paroxysmos habuit tum paulatim minores, tum etiam rariores, de-

num nullos. At brevi ista fuit serénitas, & ab adversa valetudine vacatio; uti etiam dubia: malum *Arthritide* gravius successit, longeque periculosius; *Vertigo* nempe, cui deinceps comitem sese dedit *Depressio* spirituum supramodum molesta, continua.

Cum ita affectum inviserim, pulsum magnum, & elatum observavi; ac si instaret *Apoplexia*. Quare venam illico pertundi, sanguinemque ea quantitate detrahi, quæ capiti levamento esset, jussi. Porro, quoniam isti capitis affectus non tam absoluti, quam *Arthritici* (quod ex malorum ordine vel ipsi ægro, rei medicæ non ignaro, patuit) existimari possent; quo *Arthritis* educeretur, *Phœnigium*, ex ea evellentibus, acerrimum, & calidissimum, utrique malleolo, quæ *Arthritidis* in hoc ægroto fuere stativa, imposui; frigidum, altera quaque hora, renovavi; tumoribus, eo factis, *Epispastica* admovi; unde feri acris, falsi, viriosi, *Arthritici* multum est elicatum. Æger ex eo tempore convalescens, annos egit postea permultos, eosque pro ætate satis beatos, & tandem morbo, uti accepi, nephritico occubuit.

HISTORIA IX.

Ex Arthritide Vertiginosus, Victu nimis tenui depressus, & vivis excessit.

VIR mihi conjunctissimis diu bona valetudine usus, ætate adulta dolere cœpit *Arthritide*; quæ, propter multas equitationes, & laude dignam in victu temperantiam, raro aliter se habuit, quam quæ maxime regularis, quæque maxime salutaris. *Paroxysmum* enim, semel bis in anno, cumque malo symptomate nullo comitatum, tanquam ad præscriptum Medici, ægotantis egit.

Ita multos annos, si non omni doloris sensu carens.

(τὸ δὲ, τὰ μὲν θῶρον,

Ἀπὸ τῆς ἀρθρίτιδος ὅτι αἰσθάνεται;)

beate tamen, & tuto, imo ipsam per *Arthritida* tuto vixit.

Huic, ingruente senio, accessit *Vertigo*, quæ, paulatim ingravescens, eo increvit usque, ut sæpe ne in humum æger concideret, periculum esset. Quapropter *Venesectio*, *Emetica*, *Vesicantia*, *Purgantia*, aliaque multa, suo quæque loco, sunt a viris arte nostra præcellentibus, imperata, & vel omnia,

nia, vel magna ex parte, ab ægro usurpata. Cum vero ista proposito minime responderet, *Vertiginem* eam non tam exquisitam & genuinam, quam notham, & *Arthritidem* esse suspicatus sum.

Sexagenario jam major, *Arthritidem*, uti illi videbatur, nimis gravem, diutius non alere; sed per diætam decrevit tenuare: proindeque, cerevisia potenti & generosa (quam, per annos alioquin multos, interdum ad hilaritatem, at non incommode, potaverat) abjecta neglectaque, non nisi aquosam, nullarum virium, & vilem adhibuit. Væ autem illis, qui *Arthritida*, diu satietati suetam, abstinentia demum nimia tentant evincere. Male habita *Arthritis* intimas in corpore regiones, ejusque viscera nobilissima invadit, unde ægri res in pectus abiit, & (ut sæpe accidit) in dubio vita. Minus quidem articulis, ex eo tempore, doluit hic noster *Arthriticus*; at inauspicatos minus. Sanguis enim intempestive, & magna ægri cum injuria debilitatus, alieno amplius expellendo, sic, ut olim, non erat. Faciem depressam, nec, ut ante coloratam, oculos concavos, vires enervatas notare familiares, & malum aliquod præ foribus ominari.

Cum vero eo res deducta esset, magni aliquid momenti accidit, dictuque non indigni. Recurrente enim *Podagra*, & insultum denuo, qualem potuit, faciente, aqua frigida pedes media hyeme immerisit æger, itaque temere tumoris *Arthritici* materiam percussit. Pectore, capite subito gravatus primo tussit, & cum impedimento spiritum traxit; mox sensus omnis, ipsa etiam mens defecit; & tota undique astantium mirante turba, non tam excessit, quam surreptus est e medio.

CAPUT XV.

De Apoplexia Arthritica.

ART. I. **D**E vertigine, & dolore capitis *Arthritico* supra dictum est; speciatim, hos affectus in *Apoplexiam* non raro migrare, eaque terminari: quod quidem malum, quando hodie gravissimum, eoque gravius, quo minus suspectum, intellectumque sit; operæ pretium mihi videtur, paulo alius ejus rationem reperere, & totam Historiam, ut potero, describere;

qua, nisi me fallit animus, apparebit, hanc *Apoplexiam*, non minus quam reliquas hujusce nominis *Anomalias* habere privatum, & propria indigere medendi methodo.

II. Docuit rerum medicarum usus, *Arthriticos*, eos præcipue, qui constitutione sanguinea, collo brevi, & toroso donati, multos ægrotarunt annos, seniumque jam ingressi sunt; maxime vero eos, qui *Cereveri*, & *Baccho* indulgentes, ludoque campestri, & exercitatione corporis intermissa, sunt plethorici, sensu motuque, nunc aliqua ex parte, nunc omni, subito privatos. *Apoplexia* non raro corripit. Quæ si *Arthritidis* paroxysmo regulari, sive interciso, sive dilato, minimique, qua par est, sævitia peracta, enascatur; hanc ego *Apoplexiam* non tam exquisitam, & genuinam, quam notham, & *Arthriticam* appellabo. Ea certe est, de qua, ex communi, & apud doctos & literatos hætenus recepta, *Apoplexie* Doctrina, minime ferenda est sententia; minime ordinanda medicina: verum multo aliter, ex eo, quod hic affectui proprium, de utrisque statuendum est.

III. Ut autem proprium illud explicetur, animadvertendum est, in casu jam descripto veri admodum similem esse, *Miasma Arthriticum* in corpore diu affecto, neque paroxysmis utilibus, sic; ut oporteret, expurgato, congeri & coacervari: mox sanguinem, eo saturatum, fermentescere, turgere, & in orgasmum evehi; natura sc. in sui defensionem, & tutelam, alieni summis viribus expulsionem attentante, moliente. Jam vero si acciderit, vel propter *Cerebri* imbecillitatem & *astoriam*, vel propter aliud quodvis *apoplecticorum*, in *Cerebrum* vehementius sanguinem arietare, & cum majori impetu partes ejus tenerrimas ferire; ex eo, primum *Cephalalgia*, & *Vertigo*, altera nempe, sive ambæ suboriuntur; caput aggravatum; facies plenior, & coloratior est; lingua sæpe titubat; morio fit corporis incomposita; gressus inæquales: sique malum ingravescit, & validissimo ægrum insultu urget. Sensu ille, motuque interdum captus, cum oculorum, ac si in ipsa morte, vitreo colore, tanquam *Apoplexia*, percussus est.

Hæc hujusce morbi pars prior; cui si aliud adjiciatur, & ab ejus curatione ducatur argumentum, (nullam melius sperari, nullam citius, nullam tutius perfectiusque fieri, quam per alieni, morbum in

in capite committentis, ad articulos expulsionem) profecto quidem, ad confirmandam morbi hujus naturam *Αρθριτική*, nihil deesse video.

IV. E prædictis liquet, etiamsi nullam hujus morbi, quatenus *Arthritici*, diagnosis, e symptomatum simul concurrentium globo, poterimus ullo, quod sciam, modo elicere: (nam in *Apoplexia* hac *Arthritica*, atque exquisita, motus & sensus similis est defectus, stertor, rhonchus, eademque his utriusque signorum *Συνδρομή*) tamen, si ægri, diu jam *Arthritici*; si paroxysmi, dudum languidi, & inertis; si *Apoplexie*, languorem & eclipsin illam a tergo secutæ, habeatur ratio, horum, inquam, ex symptomatum origine, ipso morbi initio facile erit ingenium, & morem ejus *Arthriticum* investigando consequi.

V. Posito ergo hoc affectu, de ejus *Subjeto*, de causa continente, de remota, de prognosi, aliisque ejus expositioni necessariis, clare dicam, & quoad potero, enucleate.

Subiectum Apoplexie frequentissimum, omnium, qui de illo verba fecerunt, acutissime, partem esse *Cerebri Corticeam*, affirmavit doctrina, ingenio, & humanitate vir clarissimus, *Guilielmus Cole*, collega plurimum honorandus. „Ea (sic ille solidissime, me disputat) morbi omnis sedes, & „*Subiectum* est habendum, quod materiam, „eum committentem initio accipere, & „in quo defigi illa judicetur: nullo autem „in loco materia promptius, quam in *Cerebri Cortice* defixa, facit *Apoplexiam* (1). Huc eam apportant arteriæ nobiles, ingentes, in ramos divisæ tum magnos, tum etiam amplum inter se commercium exercentes. Huc allata, & eo loci sistens, vasorum sanguinem vehementium fines, (surgulos sc. arteriarum; & venarum origines) extendit dilatatque. Vasorum istam extensionem necessario, & quidem e vestigio sequitur, in *Corpore Calloso*, reliquoque *medullari cerebro*, tubulorum compressio, coarctatioque. Hinc spiritus in tubulis istis animales interpelluntur: in motu ordinando, eorum mandata; in sensu, recipiendo eorum impressiones; in cogitationibus elaborandis, eorum fluctuationes interrumbantur, confunduntur. *Sensitiva*, cumque ea *Rationalis Anima* patitur eclipsin.

Quod vero multum in ea *Apoplexie* sede confirmanda valet; ei datæ sunt a natura venæ, prædictis arteriis, qua numero, qua magnitudine, qua denique commercio respondent; quæ, quidquid alieni sit advehctum, (facta præcipue sanguinis detractio, vel minimum *Απορροή* debita) resorbent, asportantque. Hoc modo partim, ut opinor, evenit, quod qui gravissima laborarunt *Apoplexia*, sæpe curentur, de integro nunquam in eam incidentes; *cerebri* nempe *cortice*, sic, ut par est, exonerato, & deinde pristinam recuperante *Arteria*: Quod de *corpore calloso* minime, si eum *Apoplexie* locum esse fingamus, expectandum; nam cum ei nulla sint, quæ tam grande onus (*Apoplexie* nempe causam continentem) auferre possint, animam occupabit non eclipsis solum, sed ipsa nox *Catulli*.

Nox perpetuo dormienda.

Minime vero negandum, miasma *Arthriticum* ipsos aliquando tubulos intrare *Nervinos*; spirituum undulas miscere; nubem animæ, & torporem injicere; & quidem ita semper (alias autem alia ratione) fieri conjicio, quoties hæc *Apoplexia* demigrat in *Paralysin*: ubi nulla videtur alieni, nisi per tubulos prædictos, extrudendi via.

VI. De causa hujus *Apoplexie* conjuncta & proxima, notatu dignum est, illam creberrime vasculorum esse in *cerebri cortice* dilatationem; quæ *Tubulos* in *cerebri Medulla* statim comprimi, spiritusque facit animales in iis obstrui, & turbari. Ista vero *Dilatatio* vel a sanguinis in ea vascula irruentis, & in iis commorati, vitio, vel ab ejus quantitate provenit.

Vitium isthuc, quatenus *arthriticum* est, a miasmate *arthritico*, sanguinem commovente multumque exagitante ortum, procul dubio hac in re non parum operatur: Huic autem aliud vitium accedere solet, sanguinis nimirum *Lentor*; qui, ut omnium pene *arthriticorum*, maxime vero ætate grandiorum, sanguini inesse; eique detracto, & in cyathis quiescenti, innatare deprehenditur; ita hujusmodi laborantium tum inesse sanguini, tum etiam eorum *cerebro* inhærere, vasculaque (sic, ut dixi) resarciendo complere, & extendere jure merito censeatur.

Miasma isthuc *arthriticum* per se, maxime

(1) Vide Auctoris Tentamen Physico medicum de Apoplexia.

me vero τῶν γλεχρῶ involutum, si cortici impingatur, & in eo infideat, sanguinem eo loci sistit; itaque dilationem modo dictam infert, & sæpenumero causa hujus *Apoplexie* proxima, uti suspicor, & conjuncta est.

Quoties autem miasma, penetrato cortice, *Tubulos* in *cerebri Meditullio* subintrat, spiritus animales tunc cominus aggreditur; & proxime tunc facta in eos impressione, *Fluctuationes* eorum ordinarias subvertit permiscere, donec morbus aut in *Paralysin* exit, aut morte, linea rerum ultima, concluditur.

VII. Istam autem sanguinis, seu vitiosi, seu nimii, in *capite* moram, & mansionem, (ut de causis remotioribus nonnihil dicam) in primis *cerebri* creat a cunabulis imbecillitas. Huc confert etiam, quicquid sanguinem impetuosius, & in *cerebrum* copiosius impelli; quicquid etiam in eo diutius retineri faciat. Copiosius autem impellitur excitatione corporis, & labore pertinaci.

Anni ferme sunt viginti, cum celeb. *Matthæus Slade*, Medicus *Amstelodamensis*, *Londonum*, *Oxonio* proficiscens, & in itinere collem (ambulandi gratia) pedibus ascendens, vix superato ejus fastigio, quasi de Cælo tactus, *Apoplexia* prostratus est; neque unquam ad se rediens, animam brevi post efflavit.

Infantuli, paucis ante diebus nati, subitoque, non sine veneni suspitione, mortem obeuntis, corpus olim aperui. Nulla erant veneni in stomacho vestigia, at in *capite*, arteriæ & venæ *cerebrum* amplectentes, bis tanto majores, sanguinem magna illa nascendi lucta & nisu, in *caput* infantuli nimio plus intrudi, & tum *Apoplexie*, tum etiam mortis causam fuisse, verisimile reddiderunt.

Diutius sanguinem in *capite* retineri faciunt, inter alia vincturæ colli nimis strictæ. Non ita pridem, in vicinia nostra, quidam madidus, & Baccho plenus, in lectum commissus, intra breve tempus obiit. Rigidus enim, ore livido, demortuus horis post paucis est inventus. Cum, de causa mortis adeo repentinæ inquireretur, præter ingestam liquidorum vim, collari linteo nimis arcto, & in poculis non exuto (tanquam sune in strangulatis) sanguinis reditum, maxime in corporis situ plano, & *Horizontali*, impediante, mihi probabilius inveniri, aut quidem excogitari potuit. Quæ a nobis *apoplexie* puræ, & genuinæ
Sydenham Opera Medica Tom. II.

apoplexie afferuntur (nimirum, ob accidentia prædicta, sanguinis in *caput* injectio largior, & exportatio diminutior) possunt etiam *arthriticis*, ob accidentia similia interdum obvenire, & in *Apoplexiis* eorum inducendis, locum obtinere.

Huc porro referendus *Opiatorum*, ut & *Errhinorum* abusus, quibus *arthritici* materiam in cruore alienam, magno suo cum periculo sæpe *capite* impegerunt.

His, quæ ritu peculiari humorem in *caput* dirigunt, adjungantur etiam, quibus (externis, & evidentibus causis) a τῶν ἰσχυρῶν humor repellitur, & intro agitur: quæ cum hinc *Anomalie*, simul cum cæteris omnibus *arthriticis*, sunt communes, alibi tum fusius enumeratæ, non satis explicatæ sunt.

VIII. De nostra hac *Apoplexia*, si cum *Exquisita* comparetur, observandum, quod uti vere hæc

----- cum *Spiritus Orbis*
Bacchatur -----

eoque ineunte creberrime occurrit; & calori, se per sanguinem humanum una cum Mundi reliquo, tum temporis fundenti, eumque agitati, debet originem: ita quidem illa, nimirum *arthritica*, pendet ex uno miasmate *arthritico*, præsertim augente & ebulliente; quocumque anni tempore hoc contingat. Ver autem, & Autumnus sunt tempora, in quibus id *arthriticum* maxime ὀργισθῆναι, & in *caput* sæpissime irrumpit.

IX. De hujus *apoplexie* ἀπορροήν jam ordine dicendum: tametsi plures ignorata morbi natura, & ob eam rem instituta medendi methodo non satis idonea, fato cesserunt; tamen (quod hujus modi laborantibus solatio sit) omnino constat, permultos ea tentatos; artificiose, sic, ut decet, ex ancipiti morbo hoc convaluisse, vitalem diu postea vitam egisse, & quam ab *apoplexia* vulgari, & exquisita, longe meliorem. Cujus id in causa esse censeo, quod, debita humorum e *capite* facta primum Ἀνομιάν. & deinde, restituto *Cerebri* tono, saniores ii, tutioremque vitæ rationem ineant, libertate missa inutili, imo perniciose; quod, e gulæ deditis fiant temperantes, e temulentis, sobrii: itaque omnibus sedulo vitatis, quæ aut corpus plenitudine gravent, aut gravatum orbent paroxysmis regularibus, senectutem habeant tolerabilem. Verum, ut omne id emolumentum, tum artis medicæ opus, tum observantiæ fructus est; qui-

quicumque fructum istum, minime calcata potiundi ejus via, speraverit, messem ille, nullo semine facto, (quod est unum ex absurdissimis) videtur expectare.

X. Medendi indicatio postulat, ut quam citissime *Cerebrum* allevetur, ut mens, motusque, & sensus instaurentur. Hoc autem optime faciendum *Evacuatione*, *Revulsione*, & alieni in altus amandatione, Primum omnium inquiratur, utrum calceamentis, aut tibialibus nimis arctis, aliove quovis externo, *Arthritis* *vis* *istius* repellatur, aut, in ea ne erumpat, inhibeatur. Porro, de sanguinis in *caput* flumine, nimis largo, & torrenti num intrudatur, num in eo diutius, quam ex œconomia legibus soleat debeatque, retineatur, est querendum; & ex hisce procatasticis quæcunque fuerint inventa, sunt initio removenda.

In hujusmodi *Apoplexia* fere omni necessaria est *Vena sectio*; nihil ea certius, nihil citius opitulatur. Detrahantur igitur, quam primum fieri potest, (quam citissime conficiet id, tam maxime proderit) uncia xii. xiv. vel libra una & semis pro ægri viribus & constitutione. Paulo post injiciatur *Enema* pungens, & acre; sive ex *Urina Humana*, sive ex *Decocto comuni*, cum *Sale vulgari*, vel *Aloe rosata*, aliove id genus alvum irritante. Sub id tempus adhibeatur *Purgans*, e potentissimis, & sanguinem agitantibus; *Pulvis* pura *Vvarovicensis* a ʒi. ad ʒij. vel *Res. Jal. a gr. vi. un. x. cum Extr. Rudii ʒj. sive ʒss. Elix. Prop. q. s. ut fiant pillulæ*; vel ex *Decocti amari Purgantis ʒiij. & Syr. e Spina ab ʒj. ad iʒs. potio*. Si segnius erit demissum *Purgans*, neque trium, aut quatuor horarum spatio Ventrem movebit, *Enema* repetatur. Toto isthoc tempore, vel lecto, vel cathedra corpore, quoad potest, erecto sedeat agrotans; ne in *caput* depressum, & nimis inclinatum, humor impetu, & copia majori suffundatur, malumque augeatur.

Purgatione facta, de *Vena sectione* iteranda, & quo in loco, brachio, an cervice, deliberandum est. *Cucurbitulae*, hoc tempore, dorso (inter omoplatas) adnotæ, cum multiplici *Scarificatione*, usus sunt eximii.

Vacuato corpore, operæ pretium erit articulo nuperrime dolenti *Emplastrum*, vel e *Pice Burgundica* & *Terebinthina Venet.* vel *Cephalicum cum Euphorbio*, aliudve quodvis potentèr attrahens, imponere; totumque membrum, ut e *capite* materia ducatur, & loco magis idoneo figatur; laneis involu-

cris calidissime vestire. In hujusmodi casu, pedes in aquæ fontanæ balneum, quam potuit tolerare, fervidum immittendo, ibique retinendo; ægrum, omni spe vitæ pene destitutum, & animam, ut apparebat, jam tum agentem, cū *auxilio* servatum, aliquando novi.

Cum hæc aguntur, ad *ta* *istius* *Arthritis* evocari, *Cerebrum* magnopere levare solet; natura, prædictis auxiliis adjuncta, in viam redit; & opus, inauspicato cœptum, felicius & accuratius perficit. Sin aliter res sit, neque per ea sanetur æger, ut alieni fiat evacuatio, quæ nominatur *Topica*, collo posteriori dimidio, sincipiti, vel capiti raso *Epispasticum* applicetur, & dies quatuor vel quinque geratur. Brachiis etiam internis, aut suris (uti *Chiragra*, vel *Podagra* frequentior est) admoventi possunt istiusmodi *Emplastra*. Si verò angustis prematur æger, & graviter laboret, *cervici*, vel *capiti*, ubi *Sutura Sagittalis* cum *Lambdoidea* coit, vel ubi cum *Sutura coronali* (prout *capitis* pars posterior, vel anterior magis afficitur) *cucurbitula* imponatur. Si nihil horum in usum trahetur, tondere minimum ad cutim oportebit; deinde *caput* radere, & ad relaxationem cutis perfricare; postremo, *Emplastrum e cumino*, vel istiusmodi aliud, quod *diastichum* exaugeat, & humores eliciat, applicatum continuo gestetur.

Malo usque permanente, proderit materiæ per nares, per os detrahare. Valent hanc in rem *Errhina*, quæ sine sternutatione serum educant. Sternutationem moventia jure merito vereamur, ne, vi sua & nisu corporis laboriosissimo, humores in *Cerebrum* impellant, ægrumque obruant. Manducare juvat, quæ sunt acerrima; eorumque beneficio salivam largiter educere.

Raf. Raph. Rustic.

Sem. Sinapios contus. ana ʒss.

Pul. Pyretri ʒj. misce, Melle excepta & Serico inclusa ori dentur, & Sputo identidem ejecto Dentibus conterantur. Huc confert etiam *Electuarium Apophlegmaticum* infra descriptum.

Interea vero temporis, dum sunt evacuationes, ea, quæ spiritus animales stimulent, & munus suum obire faciant, magni, & quidem frequentissimi usus sunt, quæ mobrem *Spiritus Volatiles oleosi*, vel *Sp. c. succinati, cum Julapii Cephalici* *Haustu*, crebro & assatim, sic, ut requirat usus, sunt adhibendi. Quinimo *Pulvis de Gutta, cum Castoreo, & Oleo Succini, Assa fo-*
tida

side solutione in Pilulas temperatur, bis vel ter in die demittatur, cum *Jalapii* prædicti haustu. Hæc quidem medicamenta eo potius eligantur, quoniam non solum animales spiritus instaurant, sed & *Arthritidi* etiam expellendæ quodammodo inserviant: verum præmissis evacuationibus, quæ appellantur *generales*, iis potissime utendum, ne, a medicamentis adeo *cardiacis*, in corpore feriato & pleno, malum intendatur.

Si a prædictis *causis* ulla fiat *Arthritis*, ad auxilia externa, magis efficacia, progredi juvabit; ad *Phænigmos* scil. aut ejusmodi alia, quæ valentissime, quæque materiam evellant omnium certissime.

Quamprimum tumor, aut dolor significabit *Arthritidem* ad *τὴν ἀκρὰ* appellari, studio elaborandum est, ut eo loci retineatur, neque retro agatur: Hoc autem optime fit per *Epispasticum*, & *Empl. Meliloti*, ordine applicata, quibus, per ulcuscula diutius aperta, perniciosus humor educatur. Atque huic proposito non alienum erit, *Emplastro* lanea superponere, laqueos iis involvere, pedemque interdum, modo pes afficitur, dorsum versum inclinare.

Omni hoc tempore commodissimæ sunt *Fricationes* artuum præcipue, bis vel ter in die, vehementes: quæ quidem e *cerebro*, sed non e corpore, sanguinem educant, & illius *πύλω* ad corporis extrema vertant.

Arthritide in extrema apparente, veluti præsentē Numine, servator æger. Nihil auspiciatius, nihil ei felicius obvenire potest. Morbi, a quo idoneo & recto ægri vita & incolumitas omnino pendet, a quo (e contrario) inverso, & *Ἀναιμία*, ejus periculum, quantum animo comprehendi potest, maximum est obortum; istius, inquam, morbi hoc modo sublata est *Ἀναιμία*, isque jam denuo factus salutaris.

Cum humorum plane mutatur inclinatio; quique nuper in caput irrepere, foras jam in artus abeunt; ad eos expellendos, & promptius expediendos (nec quidem antea, ne sursum eleventur, & in partem iis affectam impellantur) lene quoddam *Πόδα-γγραγυγὸς* oportet dare; *Pulveris* scil. *Cantiani* quasi *℞. sexta, vel octava quaque hora*: cui, si visum est, & tuto fieri potest, adjiciantur semel, aut in constitutione phlegmatica, bis in die, *chalyb. Nutriti gr. v.* Quod tamen *arthritidem* expellens, si quovis modo repellatur humor articularis, aut caput desubito male habeat, protinus omit- tendum; & auxiliis externis humorem evo-

cantibus, una cum iis, quæ ore data spiri- tus animales recreent, utendum est.

Diaeta, per omnem hunc decursum, e maxime sit tenuibus: placet *Infusum Pul- lini*; *Avenaceum*, *Panacella*, cum *Uvis corinthiacis*, aut *passis majoribus*; placet *cho- colata*; & ejusmodi *Sorbtiones*, molles scil. & faciles cibi, quibus ægri vires nutrian- tur, stomachus autem non gravetur, in cerevisiæ vicem, aut *Pomaceum*, aut *Vinum* aqua dilutum, aut *Salvia*, aut *Tea*, aut *antophylli infusum*. Nihil gola & satietate, præcipue vespertina, periculosius. Alvo ne- que dura, neque lubrica sit æger, illa ca- put aggravari facit, hæc ad *τὴν ἀκρὰ* ma- lum invitari.

XI. Ad *Prophylaxin* nihil conducibilius, quam in dorso *Fonticulos* aperire; rus pe- tere, aëre aperto, & ventis prope agitato frui, vere & autumnō alvum subducere, in robustioribus venam initio Octobris secare; & quod utranque absolvit paginam, ma- ximeque attendendum est, *arthritidos* recte *κατασκευάζειν* curam diligenter adhibere.

Apoplexiam, in *Cerebri Cortice* locatam, curatio jam descripta plerumque tollit; & ea minime recidiva, ægri multos annos im- munes agunt: si vero *Cerebri* medullium, sive aliquam ejus partem, tubulos oppilan- do *Nervinos*, morbus occupat, aut des ubi- to ægrum interimit, aut in *Paralysin* dege- nerat, Capite proximo tractandam.

XII. Hæc curatio, & *apoplexia*, quæ a *Cerebro* oppresso fit, accommodatur: si ma- teria morbum committens, in *Ventriculo* & *Intestinis* sita est, *Symptomatica* illius *apo- plexie* (cujus historiam mox subnectam) curatio, *Purgatione* tum *ἀσκήσει* tum *νέμει*, & medicamentis spiritus animales excitanti- bus, & *arthritidem* expellentibus, est ten- tanda.

HISTORIA I.

Vertigo Arthritica, cum impendente Apoplexia.

SUBACTI vir ingenii, & in rebus gerendis subtilissimi, multos annos *arthriticus*; (quo quidem tempore stans ille periodis), & ut oportebat, doluit hyemem anni MDCCI. nimia transegit indolentia. Ab hoc *arthritidis* defectu, pro consuetudine paroxysmum minime repetentis, (tanquam omissa re qua dam usus egregii, & ad vitam in primis nec essarii) statim œconomiz ra-

tio turbata est: gravitate, & vertigine caput afflictum, facies supra modum colorata, &, tametsi hominis minime temulenti, perque ipsos hosce dies sobrii, nihilominus tanquam immoderato tumefacta potu. Lingua titubavit, & voces edidit non satis claras, notabili nempe cum impedimento. Corporis totius motus incertus, incompositus fuit; neque gestu regulari factus. Quæ quidem accidentia, cum eorum ordine simul considerata, &, uti par fuit, expensa, materiam *Arthriticam*, intus servatam, ægroti Caput adoriri, & ex ea *Apoplexiam* in propinquo esse, manifeste comprobarunt.

Huic autem affectui in isthoc homine generando, præter jam dicta, viam hæc tria patefecerunt. Primo loco, corpus ad hunc affectum concipiendum a natura promptum, utpote collum habens perbreve, cujus opera factum est, ut in Caput sanguis impetu cum majori ferretur. Deinde, crassus hujus ægrotantis & generosus sanguis, qui facile ferveret, minimaque de causa incitaretur, & in orgasmum eveheretur: postremo, ver *Apoplexiarum* tempestas.

His adjuncta *Zuavitas*, malum gravissimum, *apoplexiæ* vicinum, intulit *arthritis*: cui ut occurreretur, hanc medendi rationem inii. Primo, sanguinem misi, & quidem copiose, ad libram usque integram; hoc ferente ægri constitutione, morbo postulante. Tum, adhibito *e Pil. Radii*, & *Pul. Scammonii Purgante*, *Drastico*, (quod in hac re commodissimum esse ostendit usus,) alvum inanivi, sanguinem exagitavi, *arthritidem* expuli. Doluit denuo articulis æger, & quidem auspicato doluit. Nam ex ea tam *Arthritidos* ad τὴν Ἀρχὴν reductione, quam ex humidi, quod nimium erat, e corpore evacuatione, malo gravissimo impendente æger liberatus, & vestitu, aliisque rebus idoneis, quæ a capite procul tenerent *Arthritida*, curatus est.

Biennio post, eadem ille causa, (scilicet *Arthritidis* defectu,) eadem anni tempestate, (nempe vere) simili modo est affectus; capite diu, & impense aggravato, præcipue parte ejus anteriori ea, quæ oculis supereminet. Vena semel iterumque pertusa, *Emmate*, & *Cathartico* fortiori dato, Capite in manus & pedes exturbata est *Arthritis*. Multum hinc æger, at tunc doluit; ejulatus edidit, at inanes; neque, curato per eos Capite, misericordiam moventes. Huic autem *Arthritidis* translationi non parum contulit (nequid hac in re momenti

prætermittam) *Empl. Cephalicum*, quod tendini, ad pedis pollicem pertinenti (quem in hoc ægroto locum *Arthritis* maxime frequentaverat) applicatum, eo tantopere morbi vim allexit, ut trium horarum spatium doloris æger impatiens, illud detrahare cogeretur. Tantæ efficacitatis in hoc affectu nonnunquam sunt externe applicata!

HISTORIA II.

Arthritidi repercussæ superveniens Apoplexia.

CEveris & Baccbi mancipium, vitam agens desidiosam, ex eo crassum, & ventricosum evasit, ipsoque ætatis flore *Podagrosus*. Annos natus fortasse quadraginta, saginatus iste lurco doluit: dolenti vero accidit, quod hic loci memoratu dignissimum, non minus insolens, quam grave infortunium. Hallucis globum, & articulum majorem occupavit *Podagra*, calore, tumore, rubore comitata, cruciatibus eum affecit, sed periculi expers. Ut ejus acrimoniam mitigaret æger scæminæ cuidam medicinam exercenti, (leniendis ægritudinibus procul dubio doctæ) se commisit. Illa medicamentum e suis, scilicet, comparavit: utrum autem ex *Solano lethali*, *Hyo-scyma*, *Cicuta*, aliisque id genus *Herbis*, quibus uti solent nonnullæ; An ex *Ovorum albumine*, *Sapone*, & *Spuma cerevisiæ*, quod utique mihi renunciatum est, in medio relinquam. Constat autem, hora decima matutina remedium isthoc, quicquid erat, loco afflicto superponi: constat, dolorem magnum, acrem, urgentem, horæ unius leniri; duabus horis penitus auferri: Constat, ægrum lecto surgere, cibum capeßere satis modicum: Constat, hora secunda pomeridiana, somno eum gravari, connivere: post paulo abdormire: Constat, hora septimæ vespertina stertere, & tanquam in somno nimis profundo morboßoque, rhonchissare: Constat, tum primum ægri conditionem uxorem ejus suspicari; nec deesse, qui de ea, tanquam ancipiti, & periculo plenissima, fide illam moneret. Monitionibus illis, utut amicis, & prudentibus, spretis neglectisque, (ne videlicet *Epispastica*, *Scarificationes*, aliaque *Tormenta* medica subiret æger, in utramvis autem etiam dormiens, seu potius semimortuus) constat illum, mane proximo, horam circiter quartam, e vita excessisse.

Di-

Discant hinc *arthritis*, quam dubii sint eventus, seu potius quam fatalis, ea, quæ parti extra dolenti superposita, causam morbi repercutiant: discant, eam percussam, & in sanguinem repulsam, posse *cerebro*, visceri omnium nobilissimo, impingi: discant, impactam ferre posse *apoplexiam*, posse mortem, discant, & caveant.

HISTORIA III.

Somnus ab Opiato profundus, &c. ipsa propemodum mors.

Pari temeritate usus est, sed cum minori damno, quidam mihi notissimus, & jam inde ab adolescentia familiaris. Fuit ille *arthritis* multos annos afflictus, & paroxysmis ejus, tam gravibus, quam diuturnis, mirum in modum emaciatus, cum, mense Martio, Anno MDCCIII. nescio qua ex causa, *Misere* (quod in hoc *Arthritico* abundans, sanguinem infecerat universum) viscera, imo ventre contenta, subintravit. Dolor intestinorum ex eo magnus, quem ut delepiret, *Opiati* quantitatem non immodicam assumpsit. Somnus hinc profundus: horis post sex supra triginta, delirium. Mane proximo *Παρασι*, ipsa propemodum mors.

Detraeto prius sanguine, *Sp. e. c.* & *Tinct. castorei*, cum idoneo vehiculo dedi; deinde *Belum*, & *Pilulas*, alternis, sexta quaque hora.

℞. Facul. Bryoniæ, Pul. Castorei, Succin. albi, Assæ fætida. ana gr. v. cum Syr. Artemis. f. Pilulæ.

℞. Pul. de Guttatæ ʒʒ. cum Syr. Pæon. q. s. f. Bolus.

Pedibus totis *Empl. cephalicum*, una cum *Picis Burgund.* subtriplo: Tibiæ, & brachio utrique, *Epispasticum*; Cervici prælargum admovi. Erat etiam in præscriptis id, quod sequitur, salivam movens.

℞. Raf. Raph. Sylvest. tenuissime ʒj. Ol. N. M. chym. gutt. v. Mellis q. s. f. Ele. ctuarium apophlegmaticum, Teneatur ore quasi ʒʒ. usque dum manaverit Saliva, utranque tunc ejiciatur, omni hora repetatur dosis.

Hac quidem medicina cōtemporè adhibita, cum in summo quidem discrimine vita esset, cum fere actum & conclamatum esset, contra omnium opinionem æger restitutus est. Et quidem, malo & intempestivo *Narcoticorum* usu, & morbi vim in ce-

rebrum, & *Nervos* infingente, quanta passim incommoda ducantur, apud eos *Arthriticos*, quibus quies, utut dubia & periculosa, vita charior est, testimonio nimis amplo, & frequenti patet.

HISTORIA IV.

Arthritis, ex Acidorum usu gravior, in Apoplexiam desinens Symptomaticam.

Iscanus Artifex, inde ab incunabulis *arthritis*, una cum omnibus consanguineis, imbutus, multis annis ea premebatur regulari, artus scilicet afficiente, & post debita intervalla recurrente. Cum vero, de affectu valde molesto prorsus evincendo, Medicos suæ ætatis celeberrimos consultor adierat, & quidem (non sine quodam artis nobilissimæ & divinæ contemptu) incassum, Sortis suæ impatiens, & absolutæ curationis spe allectus, *acidorum* usui, *Servo* nescio quo hortante *Medico*, totus incubuit: quali vero cum eventu, & quo fructu, narratione dignissimum est. *Pomaceum* ille regionis hujus (id est, omnium, ut videtur, acidissimum) elegit: quo, in vicem potionis ordinariæ, per biennium paulo plus aut minus, usurpato, cibi appetentiam, antea tenuem, & languentem, omni fere illo tempore, acutam & latrantem habuit; uri etiam paroxysmos tum rariores, tum etiam mitiores. De nova methodo cum ægrotante sermones feci, qualemque exitum haberet, avidissime expectavi, speciatim, utrum illa quies, *arthritis* esset diminutio, an paroxysmi, in aliud tempus, prorogatio tantum, majori demum discrimine (quod ego plus semel observavi) concludenda.

Ab induciis sævior *arthritis*, hujus seculi initio, tum manus, tum ea, quæ intus sunt, invasit, *Ascites*, *Ascitis*, ventriculi inflationem, ructus, spiritusque difficultatem introduxit. Mense Junio sequenti, post narium hæmorrhagiam, motu sensuque omni derepente captus, spiritum ex imo pectore laboriose traxit, tanquam jam statim moribundus: pulsus a natura magnus, ab affectu major erat.

Sanguinis, quam ocysissime, libra detracta est; unde linguam æger, & oculos movit. *Vitrioli albi depurati ʒj.* cum *Decocto cardui* data est, eaque plus semel iterata, ter quater evomit. *Enema* posthæc injectum, acre, & stimulans; unde largiter eiecit.

ejecit. Non nimis ea nocte dormivit. Mane sudum, & serenum; uti etiam die postero. Caput immune, ructus autem perduravit ingratus, spiritus difficilis, ut & cibi fastidium. *arthritidem*, & *Επιδιαιτα*, ore datis, expellere, extra admotis, educere sum conatus. Die, ab insultu, tertio somnolentia continua, oculorum gravitas, & color vitreus, brachiorum motus interdum convulsi, ægro male ominabantur. *Sp. c. c. Succinatum*, cum *aq. cardiois*, dedi, aliaque feci non pauca, ad avertendum, siqua fieri posset, insultum; at inani opera: ægrum eo vespere subripuit.

Θις π μίγυς, & Μαρία κραταιή.

Tametsi primo aspectu videatur, eum hujus ægroti casum esse, qui, ex capite principaliter, & *Πρωταδικῶς* affecto, apte possit explicari: (hoc enim, motus convulsi, somnolentia, *Αρρυθμία*, *Ακίνησις* non parum arguere judicentur; & quidem in primo insultu, nimio sanguine caput aggravari, & ex parte lædi, ob beneficium a venæ sectione non negaverim? tamen, si *Αρρυθμία*, si flatus, si ructus, si *arthritidos*, coctionis organa diutius obsidentis, habeatur ratio, verisimile est, eam esse hanc *arthritida*, quæ primario ventriculum, & intestina afficeret; caput autem, & *Genus Nervinum*, non nisi secundario, & *συμμερικῶς*, & quod ista capitis accidentia, revera naturæ, jam pessundatæ, oppressæ, & in ruinam vergentis, essent indicia.

Si vita, sine *Dolore* jucundior videatur; videndum tamen, ne tutior non sit; Bellum honestum, sui defendendi, & publicæ salutis ergo susceptum, paci infidæ, ignobili, periculoque plenæ, longe anteponendum est.

HISTORIA V.

Apoplexia arthritica feliciter curata.

Mercator Exoniensis, humanus, integer, & probus vir ita natura fabricatus, ut, ob colli brevitatem, & temperamentum corporis sanguineum, ad contrahendam aptus natus sit *Apoplexiam*; per viginti plus minus annos, *arthritide* vexatus est; claudus ea jamdudum factus, neque, nisi sustinente illum aliquo, via progrediens. Cum eo ventum erat, & æger, prope sexagenarius, *arthritidem* mitescere, neque

Παροξυσμῶς ex more duros, & laudabiles, iterare senserat, statim huic sereno horrida infecuta est tempestas. Mense enim Junio, Anni MDCCVII. subita caligine correptus, motu sensuque tam interno, quam externo omni privatus, *Apoplexia* perculsus est, cum oculorum, tanquam in ipsa morte, gravitate. Pulvis, sed & ille perturbatus; cum respiratione, sed alta & gravata, unicum vitæ resistit argumentum.

Mali causa satis perspecta, materiam *arthriticam*, in caput delatam, ex eo evocare nitor: quem in finem, e vestigio sanguinem, eumque copiosum mitto. Primum *Emmate*, dein *cathartico* quamcitissime ventrem emollio. *Epispasticis* cervici, aliisque locis compluribus applicatis, serum elicio. Itaque materię alienæ facta partim evacuatione, an protinus cerebrum, ejusque incolas, spiritus animales sistam, & instancem; eodemque tempore, quod alieni reliquum est, ad *τὴν ἰσθμὸν* amandem; huc ego respiciens, *Spiritu Volatili Oleoso*, *Jalapio cephalico*, *Hausu* etiam *arthritidem* expellente usus sum; & ad *arthritidem* evocandam, *Emplastris ex Picis Burgund.* & *Empl. Oxycroc.* parimensura mistis, & extra plantis pedum impositis.

Cum dolere cepit articulus (quo nihil latius, nihil opportunius huic ægroto poterit obtingere) primum *Frictionibus*, tum *Unguento*, (ex *Ung. Nervino*, *Spiritu Tereb.* & *Sp. Vol. Oleos.*) articulum urgente, & irritante ungi; posthæc calide vestiri jubeo: unde doluit æger egregie, magnoque suo cum emolumento.

Atque ista quidem medicina (Deo operam fortunante) mentem, & motum ægro restitui. Cum vero gravior, & diutior insederit *apoplexia*, sicque caput infirmaverit; quod quidem ex illius sermone, vix satis constanti, aliisque morbi vestigiis, notatu facile erat; ut *Spiritus* vigor; ut *cerebro*, & *Systemati Nervino* robur redderetur: Villæ suburbanæ aërem sicum & apertum, spiritu ducere; & equo corpus sæpe exercere, ægroto suavi. Quibus ille mirifice recreatus, tam oculorum, quam ingenii pristinum adeptus est acumen, & argutias, atque annos jam duodecim, *arthritide* crebro recurrente, verum *apoplexia* ne semel quidem egit.

HISTORIA VI.

Arthritice ut occurratur Apoplexiæ.

Matrona nobilis, illustri domo orta, verum *arthritide* graviter afflicta, nunquam utero gerens circa nonum ætatis suæ lustrum, febre intermittente, corripiebatur; ejusque paroxysmos, typi ratione revertentes, tres vel quatuor toleravit. Cum hi finierant, neque ulla medicina, qua materia, & causa eorum proxima eliminari posset, in usum traheretur; statim a febris abitu, novum aliquod, a proposito nostro non alienum, in extremis partibus exortum: utriusque nempe malleoli dolor, & deinde tumor plane *arthriticus*; sed, propter frigidum sanguinis temperamentum, nitore nullo, nec quidem multo rubore insignitus. Perduravit dolor, quatuor vel quinque dies; eoque exeunte, mansit tumor, alteros adhuc complures. Hujus illa modi paroxysmos, nempe *arthriticos* ex intervallo anni quasi integri, non paucos subierat; cum inopinato caput affectum est, & tanquam invadente *Apoplexia*, perculsum. Ita laboranti, una cum aliis e capite materiam evocantibus, supra quam expectare merito liceret, profuere *Frictiones*, quæ ad pedes materiam invitarunt, & eorum articulis tumores excitarunt. Hinc capitis tutela; hinc ejus malum *arthritica* esse natura, signum ἀποδοματίας.

Meum erat dominæ, *Prophylaxin* ordinando, consulere. Hac duobus comprehensa est. Primum, materię vitiosæ, a patre *arthritico* acceptæ, nullo partu minutæ; verum mensibus obstructis auctæ, (quæ tum febris intermittens, tum morbi articularis causa esse videretur) quanta maxima fieri possit, tam *Expulsione*, quam, ne crescat, & repullulet, inhibitione: deinde cavendo, ne in caput iterum eadem irrepit.

Ut primæ horum indicationi satisfacerem, purgatio omni mense, loco Ἐμψύων imperata est; diebus autem otiosis, aque *Spadaneæ*, & *Stomachicæ*: Ut alteri occurreretur, quotiescunque capitis periculum immineret, & *arthritidis* id invaderet, ad eam educandam *Venesectio*, dorsi *Scarificatio*, cum *Cucurbitulis*, colli posterioris, vel totius capitis, *Vesicatio*, malleolo utrique *Phænigmorum* applicatio, & deinde *Epispa-*

sticorum prope locos tumefactos. Hæc, inquam, una cum *Podagragogis* ore datis, agræ sunt commendata. Hoc autem loco id præcipue notandum, *arthritidem* interdum ad caput, ad pedes, æque fere inclinare, & in hos ab illo, levi *Frictionum* ope derivari.

CAPUT XVI.

De Paralyfi Arthritica.

ART. I. **V**enio ad *Paralyfin Arthriticam*. Cum miasma capiti appulsum, in ejus cortice, speciatim, vas illius sanguinem vehentibus, non diu commoretur, verum in glandularum ductus, in *Nervinas* sc. *Tubulos* impellatur; ex duobus hisce; quæ sequuntur, unum semper eveniat, necesse est.

Nunc in iis, quæ sunt medullæ, *Tubulis* sistendo, *apoplexiam*, *Vertiginem*, *Oblivionem*; Ἀγρυπνίαν, *Somnolentiam*, aliumve aliquem cerebri affectum creat: & quidem aliter, quam in præcedenti capite declaratum est, nimirum (iplos spiritus in officinis suis cominus aggrediendo, eorumque confertim operas, & jam proxime disturbando) Ἰδιοπαθειῶς, itaque agrotantem sæpe opprimit. Quod quidem eo usque cerebrum existimare licet, ut *apoplexia* laborans *arthritica*, quoties (*Phlebotome*, *Catharsi*, aliisque auxiliis, ei tollendæ necessariis, incassum adhibitis) idem occumbit; *apoplexia* hujusmodi *Idiopathica*, potius quam ea, quæ in cerebri cortice locum habet, interimi judicetur.

II. Sæpe vero miasma ad eos *Tubulorum* locos propellitur, ubi *Spirituum* meatus obstruendo & vias implendo, *Paralyfin* affert: eamque hujus, vel illius membri, sicut *Nervus*, qui ad hoc, vel illud membrum pertinet, est affectus. Unde sequitur, istius membri sive *Motus*, sive *Sensus* tantum, sive uterque læsus & diminutus; interdum etiam abolitus.

III. In causa *Paralyseos* exquisitæ, proxima & continente, describenda, Medicis inter se non convenit. Alii enim, duce *Erasistrato*, (quod a *Galeno*, ipsis *Erasistrati* verbis utente, traditum est,) a *Lentia*,

Lenta, tractabili, & excretu difficili Materia, Nervos oppilante. Alii vero, a vim narcoticam, aut alias virulentam habente, ipsosque spiritus confodiente, *Paralysin* fieri contendunt.

Profecto, neutrum horum, opinione nostra, penitus excludendum. Enim vero, ita posse accidere non improbabile est, ut ad committendum hunc affectum, ambo concurrant, & viribus sociatis simul operentur. Nam, ut singulatim hæc attingam, usu quotidiano patet, *arthriticorum* sanguini *Γαίχρον* inesse; eique detracto, & in excipulis quiescenti, post breve tempus, innatare: quod utique (sive antiquorum *Piruita*, sive non) ad *Nervos* obstruendos omnino satisfaciatur.

Et, quod altero loco dicendum, virosum aliquod in *Nervos* se recipere; *Spiritus* in iis contentos afflatu, & contagio perimere, & vel per se, vel cum aliquo alio *Spiritus* inimico; *Paralysin* inferre, exemplo mox addendo, (*Historia sexta*) manifestum, ut opinor, & testatum fiet.

IV. Ut causas investigem magis remotas, eæ sunt, primum, in sanguine *Diatheſis arthritica*, seu virus istiusmodi indomitum, *ἀνέκλυτον*: in fugam, ubicunque possit, abiturum; in *Nervinum Genus* ingressurum. Quæ quidem *Diatheſis*, per se multarum virium, & in hoc affectu producendo valentissima, causam interdum adjuvantem habet, nempe *Plenitudinem*, quæ, apud populum satietati deditum, cum ea solet jungi, & in hoc negotio *ἐμμενῶσθαι*, certe in hac regione, eorum, qui ex *arthritide* perperam agente, & minus *Regulari*, primum *apoplexia*, dein *Paralysi* corripiuntur; non pauci causam istorum malorum antecedentem in sanguine duplicem agnoscunt, videlicet *arthriticum* miasma, *Plenitudine* comitatum.

Deinde, *cerebrum* a natura molle, aut morbo aliquo, aut ictu, aliave quavis evidenti causa, debilitatum, & *Nervi* supra modum teneri: quibus facile, per ora plus æquo dehiscencia, virus admittatur, & diu intra *Tubulos* retineatur.

His postremo loco adjiciendum, quicquid externæ, sive causæ evidentis, via tam parula materiam adeo paratam adigat. Hujus autem generis sunt aer humidus; & palustris, aliaque omnia, quæ in *Paralysi Primigenia* locum inveniant: at in hac *arthritica*, præcipue memoratu digna sunt vita sedentaria & otiosa, mala victus-ratio, fre-

quens *Hypnoticorum* usus, *Spiritus ardentibus* immoderate sumpti. *Venus* immodica, frigus, & in corporibus calidis & biliosis, medicamentorum abusus calidorum; omniaque, quæ *arthritidi*, ne articulis infigatur, obstant; aut iis affixam quæcunque repercutiant.

V. Ex hoc causarum apparatu, facile est conjicere, quem in modum fiat hæc *Paralysi*, & (præcurrente modo *capitis* gravitate, modo dolore, modo vigilia, modo somnolentia, modo vertigine, modo oblivione, modo tristitia, modo mentis alienatione, modo etiam nullo præcedente *capitis* affectu, sed intestinorum colico; modo neque hoc quidem) quam expedite virus *arthriticum* in *Nervos* intrudatur; quaque, eos adimplendo, aliasve *Spiritus animales* afficiendo, cito *Paralysin* hanc inducat.

Ægroti vero conditio, sive morbi *αἶος* pro ratione partis affectæ, aliud atque aliud esse reperitur. Si *Lingua Nervus παραλύει*, aut sonum æger inconditum edit, aut verba (voce confusa blaterans) dimidiata: si qui *Paris vagis* ramus est, ad *Ventriculum* pertinens, (quod quidem *arthritico*, plenitudine gravato, & ex ea *Procatarxi* primum *apoplexia*, tum *Paralysi* perculso, contigisse novi concoctione, & quidem appetitu captus, cibi fastidio pertinaci laborat; donec, humorum penu vitalium indies decrecente, neque novis accessionibus, uti par est, refecto, summa tæmerfi copia beatus, paulatim marcet, tæbe conficitur. *Paralyseos arthritica* in corporibus *Biliosis*, maxime vero *colicæ Biliosæ* supervenientis, alia solet esse ratio, & quidem prima: Hac qui laborant, famem habent imminutam, pene prostatam; corpus attenuatum, cutim universam (at præsertim oculorum album) icterico colore tinctam, aridam, neque ex naturæ lege perspirantem. Adeo nempe diversa facies hujusce morbi, pro loci ab eo occupati, & causæ conjunctæ diversitate.

VI. *Paralysi arthritidi* secundaria, sicut primigenia, multiplex invenitur. *Ratione Subjecti*, nunc unius lateris, nunc unius membri est; & quidem (uti meis obtigit) præcipue linguæ: *Ratione Materie*, sive causæ continentis, interdum eam habet simplicem, & puram *arthriticam*; aliquando *Γαίχρον* involutam, aliquando bile, vel alio aliquo commistam alieno: alias sola, & per se occurrit, alias motibus convulsivis comitata: alia denique imperfecta est, quæ non

non satis habiles redduntur artus, & in moribus obeundis sæpe vacillant, at non ex toto resolvuntur; alia vero perfecta, quæ penduli fiunt, & immobiles; Hæc autem omnia, cum *Paralyfi Primigenia*, nostræ huic *arthritica* sunt communia.

VII. *Periodicam* neque ego novi hanc *Paralyfin*, neque temere, propter materiem *Nervis* impactam, & coherentem, (id est, continenter eos oppilantem) esse posse iudico: quilem tamen aliam observavi, nimirum *Αρρωσία*, statis temporibus, per multos menses, ad finem pene horologii, recurrentem, (& *Regiæ olim Societati* (1) renunciavi:) contra quam *Galenus*, qui *Paralyfin* nullos habere *Typos* asserit (2): nisi forsitan (ut illustri *Pergameno* suus servetur honos) de *Paralyfi* omnium exquisitissima, & *Primigenia* sermonem ille facere, nostra vero, jam dicta, *Paralysis Hysterica* censeatur.

VIII. *Paralysis arthritica* morbus curatu perdifficilis, idque præcipue duas ob causas. Harum altera situs est istius morbi in corpore profundus, nimirum intra *cerebrum*: ex quo fit, quod, adversus eum quæcunque dentur, ore demittenda, remedia eorum tam *cerebri*, quam *Intestinorum* penetrantia: non parum alterentur, nec in alienum, quod est morbi adeo remoti causa conjuncta, pulsu satis valido arietet, aliasve, uti par est, afficiat. Altera vero difficultatis huius causa est, quod in corporibus senio, vel *arthritide* confectatis, aliasve fractis, & debilitatis; itaque medicinam minime sic, ut par est, sentientibus, locum hic affectus plerumque teneat.

Verum, ut singularia persequar, si morbus hic *apoplexia* succedat, propter injuriam *cerebro* inflictam, curatio longe difficilior; & si recurrit *apoplexia*, tanta plerumque vis humorum, & tam *αδρής* in *cerebrum* impellitur; quanta id obruatur, & ægrotus, antea debilis, e medio feratur.

Sin e diverso *Μίασμα*, sine ulla (sive per *apoplexiam*, sive alias) in *cerebrum* gravi facta impressione, in *Nervorum* tubulos irrepat, & se paulatim insinuet: sique interea medicamenta, malo tam immani convenientia, sint adhibita, reliquaque æger ad præscriptum agat idoneum universa; hæc illius conditio minime desperata. Habet

Sydenham Opera Med. Tom. II.

l'αρρωσία, quod (Deo adjuvante) hujusmodi debilem, quod elumbem, quod emaciatum, quod decolorem, motu, viribus *δυσπεία*, *δυστασία*, donet: & ærgotantem, ultra quam expectatio sit, restituat. Quibus autem modis hæc curatio fiat, jam proxime declarandum.

IX. *Therapia* duplex est; vel quæ, in morbo auferendo, vel in eo, ut ne augeatur, neve renovetur, inhibendo, quæ summis viribus contendit. In prima ejus accessione (quæ quidem indicatio primo loco persequenda) ne alieni vis *αδρής* in *Nervos* impellatur, enitendum, quem in finem, si *Plenitudo* sit cum pulsu forti, & nihil repugnet, e re futurum arbitror sanguinem e brachio, aut vena jugulari, vel *Cucurbitulis*, & *Scarificatione* dorso detrahare. *Hæris* aliquot post *Venæ sectionem* immittatur *Enema*. *Purgatio* usus fere perpetui est, maxime vero ea, quæ sanguinem exagitet, & *arthritidi* in artus amoliendæ faciat. Porro conducit, quamprimum morbus ægrum invadat, articulo *ὁ τῶν Ἀγκυλῶν* sæpissime dolenti, *Cataplasma* Clarif. *Beati Apoplecticum*, seu de *Raphano* Cl. *Fulleri* aliudve quodvis acre, *φωτισμὸν* excitans, applicare, & *arthritida*, quæ jam nunc e sanguine fugam meditatur, ad τὰ ἴα educere.

Facta humorum e capite *Antispasmi*, & mutata eorum inclinatione, (nec quidem maturius, ne in *caput* iis, impetu cum majori, a medicamentis inferantur (ad eos extra pellendos, ægroto dentur e *Pulvere Gasconico*, *Purpureo*, aliisque mitioribus *Ποδαγραγγοῦ* sic, ut attris est, composita, bis, vel ter in die, cum *Julapii* haustu *Cardiaci*, *Cephalici*. Quamprimum tumor *ὁ τῶν ἰκτῶν* fuerit, admoveatur ei *Vesicans*, quod humorem, in eo contentum, foras eliciat, neque retro agi pariat,ur,

Huc etiam confert *Epispasticum*, cervici, seu collo posteriori dimidio; huc capitis ad cutim *Tonsura*, *rasura*, & *Eplastrum* ei, de *Cumini Seminibus*, aliudve attrahens, impositum; quod nempe, post *Evacuationes* generales, si aggravetur, *caput* allevavit. Profunt *Gargarismi*, salivam jugiter elicientes, & *Dietæ* ratio tenuis.

Interea temporis, *Spiritus volatiles*, *Tinctura Castorei*, *Succini*, &c. cum *Julapii Cephalici* haustu, vel cum *Anthis*, sive *Sal-*

X

vie

(1) Vide *Acta Philosophica Londinensia*, num. 242.

(2) Ολίγη τὴν ταδῶν ἢ τετῶν ὡς Ἀρρωσία; Παράλυσις, κλ. *Libre de Typis*, cap. 2.

vix Infuso ; quæque indicationem vitalem tueantur reliqua, sive extra, sive intus, ea, qua opus fuerit, dosi, modo, & frequentia, juvat adhiberi.

Quoties autem materia *Nervis* est impasta, & infixa, ad eam tenuandam, & vias *Spirituum* aperiendas; (quæ medendi indicatio altera est) iis *e Ligno Sancto*, & *Sassaparilla*, eorumque *Corticibus Decoctis opus*; iis, *e Ferro preparatis*, *Frictionibus*, *Balneatione*, *Embroche*, *Vestitu*, *Linimentis*, *Ceratis*, *Emplastris*, & id genus aliis, quæ in *Paralyti Primigenia* cum fructu præscribuntur. In *Paralyti arthritica*, viroso afflatu facta, *Decoctum Corticis Chalybeatum* ægro multum profuisse novi.

Hic autem sedulo videndum, corpus ægri frigidum an calidum; miasma simplex, seu *Γαγγραινα* involutum, an bile mistum, ut in *Paralyti arthritica*, colicam *Biliofam* insequente: cujus exemplum mox subjungam satis luculentum. *calida* enim (si ad diutinum tempus, & copiose propinentur) remedia insomnes reddunt ægros, inquietos, & perpetuo quasi febricitantes, spiritus eorum animales, indefinenti tumultu & agitatione fatigati, perimuntur, nec a medicamentis hisce, utur valentissimis, & maxime *cardiacis*, vel minimum iis robur accedit, contra, turbatum & debilitatis multum. Hujusmodi laborantes *aqua* seu *Spadana Germanorum*, seu *Bathoniensi*, seu *Bristolensi*, (& procul dubio alia non pauca *Ferro* gaudente, perque renes exeunte) modo viva hauriatur, magnopere rescinduntur; resinguit enim illa spirituum ardorem, a bile factum, æstrum eorum mulcendo componit, & adjectis, suo tempore, & modo, *Chalybeatis*, hujusmodi affectionum curatio quam jucundissime, quam certissime perficitur.

X. In morbi hujus *Prophylaxi* nihil conducibilius, quam, ut *Arthritis* paroxysmos habeat regulares, studiose niti. Hoc enim, ut opinor, rata, firmæ, indubitandaque fidei axioma, *Paralyticum* hunc *Arthriticum*, quo plus artubus ægrotaverit, eo minus *Capite* & *Genere Nervino* laboraturum. Quamprimum igitur crescit, & in sanguine se attollit miasma *arthriticum*; si nihil veruerit, *Purgans*, & quidem, *Διφθερά* adhibeatur, posteaque *Martis Alcohol. gr. v. bis*, vel ter in die sumi præcipiantur. Quibus in subsidium, paucis post diebus, veniat externum aliquod, *πῶς Ἀρθρίτις* admovendum *Arthritidem* evellens, & in ho-

rum usu perseverandum, donec *Arthritis* si commodè fieri potest, eruatur, & in artubus sistatur. Interea vero temporis, *Alvus* ne dura sit, & humores ne in *Cerebrum* eleventur, est cavendum, &, ut janua nunquam non aperta sit, qua natura, (quoties ei visum fuerit) in exilium miasma mittat, & foras extrudat, in brachio, vel dorso potius, ut fonticuli fiant, utque juges sint, curandum.

Hac quidem medicina, qua *Curationem*, qua *Prophylaxin* exhibente *Paralytin Arthriticam* tum perfectam abstuli, tum etiam (quantum ex usu licet conjecturam facere) quo minus reverteretur, effeci: & morbo, olim gravissimo, & ad recurrendum apto afflicti, senectutem, hac tutela (nimirum *Arthritidos beneficio regularis*) tum longam, tum incolumen sunt adepti.

De *Paralyti Arthritica* hæc dicta sunt.

HISTORIA I.

Cephalalgia Arthritica, cum Paralyti incipiente curata.

Mulier *Exoniensis*, adolescentia nondum exacta, citius nimirum, quam viri solent, *arthritide* laboravit. Sex supra viginti annos habens, permultos ejus paroxysmos ex intervallis erumpentes, dolore primum articuli, deinde tumore, nitore, rubore signatos, est perpeffa: quibus vero modis, & gradibus, increvit tumor, usque remisit dolor, maxime affecti sunt pedes, nonnunquam genu, sub accessionem *arthritidis* nuperam articulum dolentem *Linimento* quodam repellente lenivit. Hinc materia dolorem faciens, sanguini reddita; in *Caput* translato, quod vel eo palam factum est, quoniam ægram *Cephalalgia*, (raro alias, vel nunquam ei molesta) jam tunc invaluit atrocissima. Artus etiam aggravatos, & vi satis habiles, nonnihil affici, atque adeo insultu *Paralytico* tentari patuit.

Contra *Paralytin* incipientem, & *Cephalalgiam* ex *arthritide* repercussa confirmatam, ea præconi, quæ sequuntur.

M. Aloes rosat. ℥ss. Scam. pul. gr. v. Ol. Abs. ch. gutt. j. El. Propriet. q. s. f. Pil. mane demittende. Harum ægra beneficio, ter quaterve, modo laudabili, dejecit. Peracta purgatione, *Bolum* hora somni (ex *Theriac. Androm. ℥j. Pul. Purpurei, & Castorei ana ℥ss. Conf. alk. q. s.*) & quart-

ta alios quaque hora, *Pulveres*, in eo contentos, per se assumpsit, ex *Jalapii Cardiaci Haustis*. Ter etiam in die, *Spiritus Vol. Oleos. guttae xv.* cum posseti, *Floribus Rorismarini* alterari, haustu. Ut autem hæc, quæ materiam in artus expellant, ita comparata sunt alia, quæ, artubus, superposita, eam extrahant: *Emplastrum* nempe, ex *Saponis Veneti*, *Picis Burgund. Empl. Cephal. æquis ponderibus*, utrique genu, & malleolo applicandum: tibiz vero utrique, & cervici *Epispasticum*.

A dejectionibus *Caput* non mediocriter levatum; ab *Epispasticis* multum. *Emplastra* attrahentia pruritus sequebatur; uti etiam *Dolor plane arthriticus*. Egræ succutsum est, tum magnum in modum, tam celeriter, tum etiam opportune brevi, forsan, alias succubituræ. Addam denique, facta hæc, & transacta omnia, tempestate nullo modo favente: frigidissima enim erat, & *arthritidi* educendæ, (quod a me plus semel observatum) ineptissima.

Cum vero *Cephalalgia*, longo post tempore, recruduit, iterato *Cathartico*, & ambobus brachijs admoto *Epispastico*, curata est ægra.

HISTORIA II.

Hemiplegia Arthritica simili modo curata.

DUm in his conscribendis sum, obviam mihi venit hujusce morbi historia, in eo confirmando, explicandoque, momenti non exigui. Civis *Exoniensis*, per omnem vitam sobrius & temperatus, dolore primum brachiorum, crurum, & coxendicis, ad mensis spatium vago, est afflictus. Hunc ut tolleret, *Tberiacam* ille *Venetam* assumpsit; cujus ope proturbatus humor, in pedis digitum missus est. Articuli enim maximi dolor, ardor, rubor erat, simulque globi, infra positi, tumor. Raro unquam *arthritidis* ulla manifestior.

Cum ita res esset, circumforaneus quidam Medicus, nunc oneribus bajulandis, nunc autem medicinæ, uti fors tulit, faciendæ operam dare solitus, ægro persuasit, ut ad dolorem mitigandum ex suis emplastrum, (nobile quoddam antidotum, a *Triphone* acceptum) dolenti articulo superponeret. Quo temere facto, dolor intra breve tempus sedatus est; tumor omnis subsedit, & repulsa, in eo contenta, materia

Caput invasit. Somnolentia primum, inextinguibilis pene dormiendi necessitas oborta est; tum paulo post *Verrigo*; deinde *Apoplexia*, quæ vicos obambulantem ægrum humi prostravit. In domum proxime adjacentem vectum, pulsu dubio & vacillanti, sinistri lateris *Hemiplegia* laborantem, sensu motuque corporis universi prope orbatum reperi. Sanguinis ℥ij . quam citissime detractis, & *Enemate* in alvum misso, rejectoque, nonnihil levatus est. Ad excitandos spiritus animales, iis amicos, & *impyruvū*, volatiles, ex *Julapio Cephalico* largiter, & sapiusculè dedi. Vertici, & cervici *Epispastica*, plantis pedum *Emplastra* ex *Pico Burg.* & *Empl. Cephalico* admoveri; *Sp. Salis armoniaci*, cum *Sale Tart. preparati* sæpe submitti naribus institui: postmodum *Pulvere Varviciensi* alvum moveri.

His similibusque auxiliis paucis post diebus verba distincte pronunciavit, mediocriter ambulavit, *Capiti* sinistram erexit, debilem vero, & sensus adhuc obtusi. Ut hæc secundæ valetudinis initia confirmarentur, utque spiritus animales recrearentur, & ad munera rite obeunda stimulantur, ea, quæ sequuntur, adhibui.

℥ss . *Sem. Rutæ* gr. viij. *Salis Vol. Succini* gr. iv. *conf. antbus* ℥ij . *Pul. Serp. Virg.* gr. viij. *Syr. Pæon. simp. q. s. f.* Bolus, ter in die sumendus, cum *Jalapii* haustu.

℥j . *Aq. Pulegii*, *Rutæ ana* ℥j . *Bryoniæ e.* ℥iv . *Marg. pp.* ℥ij . *Sacch. albiss. q. s. f.* *julapium*.

℥ss . *Tinct. castorei*, *Sp. Vol. Oleos. ana p.* *aq. sumat gust. xxx.* cum idoneo quovis vehiculo, bis in die.

℥ss . *Cacum. Salvie tenuifol.* ℥vj . *Sem. Sinapias*, *rochleariæ confus. ana* ℥ij . *cort. ext. aurant. Rad. Raph. Sylvest. ras. ana* ℥j . *f. Sacculus*, quatuor congits cerevisiæ in *Potionem ordinariam*, infundendus.

Hæc utique medicina, si vitæ rem spectemus, ad sanitatem pervenit, sartus & rectus, æger: cum vero sinistri lateris quædam maneret imbecillitas, illius causa *Parthoniam*, meo hortatu, petens, *Thermias* ingressus est; unde artuum, qui defecerunt, vires & robur pristinum pene redintegratum habuit, ex illoque tempore, subinde dolens articulis, annos ille permultos egit, *apoplexia*, & omni capitis insultu liber, non nisi senio demum confectus.

Paralysis Arthritica, cum Spasmo
cynico, lethalis.

Quidam ad *Credenum* humili loco natus, media ætate permultos annos *arthritide* laboravit; tentationes certis quibusdam periodis, easque rectas, & benignas, iterante. Mense Maio, Anno MDCCII. tum *chiragra*, tum *podagra*, posteaque *Spasmo* oris *cynico* (nullo capitis affectu, nedum *apoplexia* præcedente) correptus est. Verba edidit imperfecta, confusa, dimidio *Lingue* resoluta. Pulsus inveni debilem, vires fractas, neque venæ sectioni, neque purgationi consentientes.

Capiti ad curim tonso, & deinde raso, *Epispasticum* applicui: malleolis, & manibus (locis ab *arthritide* frequentari solitis) *Phænigmos*. Tumoribus a *Phænigmorum* applicatione factis, *Epispastica*. Interea temporis *Pul. & chel. cc. 3℞. chal. N. 3℞. ter in die*, cum *Vini rubri Hispanici 3iv.* Porro, ter in die, debito a *Bolis* intervallo, *Sp. Vol. Oleosi, & Tinct. castor. ana gutt. xv. ad xx. cum Julapii cephalici Hausu. Sp. c. cum calce viva*, naribus subinde in languoribus admoveatur. *Cerevisia, Raf. Radicula, cacum. cochlear. Sem. Bardane medicata* est.

Quod derafo *capiti* impositum fuit, bi-dui spatio parum evocavit. Cætera profuerunt ægrotanti. Postquam enim *arthritidis* ad *τὴν Ἀνα* fuit translata (quod sex aut septem diebus factum) *Spasmi* omnes sublatis sunt, vox restituta.

Minime vero perfecta hæc curatio; etsi enim sputum, (Paralysicis fere omnibus familiare) jugiter effluxit; etsi auxiliorum usu præscriptorum, duos prope menses *arthritidis* artubus insedit; unde fames renovata, facies colorata, aliaque sanitatis orta fuere indicia, (quæ *arthritidi* denuo reditæ ipse æger retulit accepta) *Linguam* tamen usque resolutam, memoriam insuper labefactam habuit.

Contra malum tam pertinax, & δόλοτος, ad tres vices *Purgatione*, & diebus otiosis *Decoctis* usus est *Lignis*, neque sine fructu aliquo. Verum in *Nervos* tanta alieni vis irreperat, itaque eos corruperat, ut post varia medicamentorum genera incassum adhibita, (utpote, causam in corporis recessu tam recondito locatam, quæ non dimoverent) ægrum.

HISTORIA IV.

Colica arthritica in Paralysis degenerans
Arthriticam.

Hactenus *arthritidos* rectæ, in *Paralysis* abeuntis, exempla protulimus, *inversa* jam & *anomala*, eodem modo finientis, ecce tibi historia. Tenui corpore, biliosa constitutione vir annorum ferme quinquaginta, quindecim vero annorum *podager*, ineunte anno MDCCII. pedibus & utroque genu doluit: cessante vero brevi tempore eo dolore, *Colica* tentatus est. Successit brachiorum primo gravitas, & debilitas mox *Resolutio*, ut e digitis nultum movere posset: Fames abolevit, cibi omnis fastidium fuit, quod cum jam diuturnum esset, ex eo reliquisque morbi satellitibus, corpus jam plane emaciatum, faciei color flavus, oculorum, quod album esse debuit, ictericum id omne factum est.

Arthritidem hanc ad τὴν *Ἐντερον* inversam, & a visceribus, una cum bile colicam dudum committente, in *Nervorum Tubulos* translata esse judicavi.

Ut curationis, quod fieri posset, absolute iniretur ratio; primum, *Decocto Cardui* ventriculum moveri; *Solutis* tum *Purgante* ventrem inaniri sedulo institui. Iis, quæ impedimento essent, expressis, *aquam* dedi *ferratam* bibere tepesactam, omni mane, ad libram quasi integram, neque nisi forbiliando, & paulatim hauriendam, aliasque, loco potionis ordinariæ, eandem, cum *Vini Lusitanici* ea quantitate, quæ ad *Ἐντερον* opus inveniretur.

Magno fuit huic ægrotanti auxilio, una cum prædictis *aqua ferrata*: nauseam enim ademit; famem (id est, vitæ spem) reddidit; aliisque posthæc adhibendis viam aperuit. *Chalybem* addidi *Nutritum*, quo in articulos pulsa est *arthritidis*, pedis tumor & dolor factus; quæ tamen, omisso *chalybe* cito decreverunt.

Hac aurem medicina (*Υποπνοία* nempe diu producta, continuataque, & *chalybe* interdum adjecto) visceribus robur, oculis vigor, faciei color restitutus est. Spirituum turbis & agitatione, quæ quidem magna & permolesta fuit, composita, sudum undique & serenum est. Ex elumbi, debili, & emaciato agro, qua morbo, qua inedia prope jam enecto, res salutis adeo servata, & vi-

res

res insauratae sunt, ut, tamen quaedam maneret artuum imbecillitas; negotia tamen obire, itinera equo longa & crebra facere valeret, vitamque alacrem, & vitalem tum ageret, tum etiam acturus esset.

Adeo enim ex medicina profecit, ut jam, annis post quatuor, multo rarius, multo illum mitius dolere, & paroxysmis tuto carere, (manum vero sinistram, ob tendines contractos, motu fere omni privatam esse) per literas nuper accepi.

HISTORIA V.

Arthritis primum, & deinde Paralysis, a materia colica biliosa.

Femina olim memoratae, primum colica biliosa, deinde *Podagra* laborantis, historiam; quoniam eo tempore plenius de illa disserere nihil attinebat, interruptam, hic loci continuare libet, & ad finem perducere. Remittente (sic, ut dixi) (1) *arthritidis* paroxysmo, caput illico tentatum est, & quidem impensissime. Somnus enim inquietus, nec qui, uti par erat, aegrotantem reficeret. Huic adde *capitis* gravitatem, & dolorem: quod vero praecipue notandum, quoties expurgisceretur, quod diceret ageretur, nihil in promptu habuit, oppresso nempe *capite*, & *mente* quasi nube obducta. Periculum erat, ne confestim *apoplexia* proflerneretur: detractione sanguinis periculum isthuc imminutum, nubes sublata. Brevis post tempore *paralysis* secuta est, qua demum egra *Tripesia*, & *Balnatione* diutina liberata fuit.

Quandiu hujus agra membra fuere resoluta, & aquae potationi illa incubuit, *arthritide* tandiu immunis omni perstitit: integra vero ad consuetudinem rediens, & veteri dicitur ratione usa, *arthritide* jam nunc urgetur regulari, qua utique confirmatur, priscos illos, sive pedis, sive malleoli dolorem & tumorem, fuisse plane *Podagricos*.

Aliam novi intestinis pariter dolentem, & quidem ex eadem causa, postea vero *Paraliticam*, cui, cum integrum esset, & intactum adhuc *caput*, at bile sanguis aestuaret, ortus est in manibus dolor, & tumor plane *arthriticus*; & indicio fuit, naturam hac inimicum porta conari expellere. Hi

vero conatus, quantum adhuc observavi, languidi & pene frustra fuere omnes, & *Paralyti* cesserunt: quae denique *chalybeatis*, & remediis sanguinem evehentibus, ut & genus *Nervinum* penetrantibus, una cum *aquarum Bathoniensium* potatione, & in iis *Balnatione* crebra, penitus sanata est.

Hisce vero observatis omnino liquet, materiam colicam biliosam, causam ejus proximam & continentem nunc in *articulis* extrudi, & ab iis in *Nervos* transferri; sicque in nonnullis corporibus eandem esse *colicam*, *arthritidem*, & *paralyseos* ordine materiam.

HISTORIA VI.

Ob arthritidem in nervos inversam, Aegria.

Vir bonus, cum primis honestus, diu meus & tur *supplicandus* familiaris, jam inde ab adolescentia *arthritide*, ad tempus redeunti, laboravit. Vox a pufillo puero, ei densa fuit, obscura, nec quae verba clare, vel articulate satis exprimeret; a *Nervorum*, uti videtur, imbecillitate nativa ducens originem. Ad hæc accessit, ob mortem filii (quem ille quam maxime amavit) dolor vix consolabilis, aegritudo valde discrucians. Cum eo loci res esset, & paroxysmus jam declinaret, nondum autem ad exitum perduceretur, in apricum animi causa aeger vestari voluit. In collem proximum & vicinum, at eminentem, & apertum, bruma tunc temporis sævientem, quando, etiam tum e lecto surgens, elatus fuerit, ibique plus nimio commoratus, moestum, & imbecilli lingua *arthriticum* invasis primum alior, deinde vertigo, tum brevis quaedam mentis alienatio, actionibus absurdis, insolitis, & indecoris manifesta; deinde lateris, postmodum resoluti, imbecillitas, & obeundi motus impotentia; postremo, & paulatim linguae *Paralysis*, *Aegria*.

Non novum huic aegroto hujusmodi malum; nam eum moris erat, exeunte omni paroxysmo, quam citissime poruit, lectum abdicare, & foras illico pedem efferre, vel gestari, raro id impune fecit: imo, quam citissime fecit, tam maxime poenas dedit: tam citissime lingua ejus, tanquam ligamento, impedita, & (quod a familiaribus fir-

(1) Vide Dissertationem. De Arthritide Symptomatica; Cap. x. Hist. 1.

sæpe observatum) aliena vox. *Non novam*, inquam hujusmodi malum, nova mali fuit gravitas.

Ut morbo isti medicinam facerem, quæ sequuntur auxilia sunt a me præscripta.

2℥. Conf. abs. Rom. Spec. Diambre,

Z. Z. in Inaiis cond. ana. ℥j.

Conf. alk. q. s. f. Bolus.

2℥. Pulv. Serp. Virg. gr. xii.

Castor:

Spec. Diatr. Piper. ana gr. iv.

Ol. e Sem. carui chym. gutt. jj.

Bals. Per. q. s. f. Pilulæ.

2℥. Cort. Vvinterani,

Rad. Zedbar. pul. ana ℥ij.

Sem. anist, Carui ana ℥j.

Cochlear. ℥j. misce, & infunde in vini albi Lusitanici ℔ij. usus tempore cochlearia duo, vel tria colentur, cum cerevisia commiscenda. Cerevisie haustus hujusmodi medicatus Bolo, & Pilulis quotidie superbibatur. Ampulla, ad dimidium vacua, vino simplici repleatur.

Porro infundantur in aqua fontana bulliente Sem. cochlear. contusa, Rasura Radicula; Infusum Diambro dulcetur, s. Gargarisma sæpius in die adhibendum. Frictiones artuum sint frequentes. Sumat etiam Spiritus vol. Oleos. gutt. xxx. cum vehiculo idoneo, bis vel ter in die, cervici Epispasticum admoveatur, post dies duodecim, vel duas hebdomadas repetatur.

Horum usu medicamentorum (non quidem perpetuo, sed longo, & cum intermissionibus ad tempus diutinum producto) factum est, ut verba, uno aliquo quamplurima præeunte, ipse, eadem nullo negotio clare repeteret. Vegetior item, coloratior, & hilarior evadere: cibum capeßere, devorare. Arthritis sub id tempus manum occupavit; curationis spem adduxit, at (eheu!) brevem, & fallacem. Relicta man, tam inclementer ægrum habuit, ut e vestigio caput dolore, stupore, aliisque mali moris accidentibus affligens, eum pene confecerit. Hoc ob alvum, incuria domesticorum, nimis duram (unde in caput humores acti) evenit. Ex paroxysmo tam infelici, & naturæ rebus tam male convenienti, nullum Paralyseos levamen, nulla vocis restitutio. Contra, medicamento non uno, neque impotenti frustra adhibito, integrum jam triennium (si verbum unum, at alterum, *περὶ πᾶσιν*, excipiat) mutus fuit, & quod annotatu dignissimum, per eosdem hosce

annos, etiam si satis cibi ingerens, rarius & mirius solito doluit articulis.

Ut historie hujus summam brevi complectar, de hac Paralyse, in homine Arthritico, & jam tum dolenti, frigus infecuta, quid aliud cogitandum, quam, quod homines Arthritici, adhuc in sanguine relict, effœti, & in fugam abituri, algore contracto, & angustato corpore, in Nervos impelleretur, & in eos se abidentes mala jam dicta committerent. Materia vero aliena, quæ e corpore expelli debuerat, in Nervos, natura forsitan nimis apertos, & dehiscences, impulsæ, tanta ex eo œconomix perturbatio, naturæque vires adeo fractæ, & debilitatæ sint, ut, *inversa* in posterum Arthritidi favens ea, regularem, uti olim, paroxysmum minime moliatur.

HISTORIA VII.

Ex morsu canis, Arthritidis recte silentium, Stupiditas, Paralytis, Arthritide ænuo facta Regulari, curata.

R Ara quidem, annis abhinc aliquot, & inaudita forsitan Arthritidos Anomala mihi sese obtulit historia, quæ, ut multa observatu dignissima, ita doctrinæ huic nostræ lucis non parum allatura continet; ideoque protinus adscribenda est. Homo adhuc in vivis est *Iscanus*, qui sub exitum sæculi novissimi, decimo ætatis suæ lustro, pedibus subinde doluit. Podagra nimirum affectus germanissima, malleolum mordente, omnibus numeris absoluta. Hunc in modum ea, per triennium bis terve singulis annis, accesserat; cum ex Morsu Canis (forsan rabiosi) Podagra ægrotavit. Vulnera, cruribus inflata, per mensis spatium, ichorem emisere; sanatis autem iis, suppressoque flumine, nova malorum ingruit caterva, atrox certe, & pestifera. Primum enim late, per universum corpus, sparsum est alienum aliquod, sanguinis *ὀργασμὸν*, corporis æstum faciens immodicum. Deinde Caput tentatum est: sedulum enim, & in agendis rebus antea versatum, ægrum occupavit rerum prope omnium oblivio. Stupiditas adjuncta est, & in sententia de negotiis ordinariis cum judicio ferenda, impotentia. Magna sub hoc tempus erat membrorum undique omnium debilitas, & digitorum huc illuc serpens, tanquam ab acu pungente, dolor. Successit Tetanos, aliaque pedum torpor, & *Ανομιμία*. Simili vero ratio-

tidine, qua corpus, ipsa laboravit, ipsa subdidit anima. Levi quavis de causa ejulationes ager, & lamenta edidit; non raro lacrymas. Postremo loco manuum, pedum *Paralyfi* correptus, eorum neutrum, nisi laboriose, movit. Quod vero maxime notandum, *Arthritis*, quæ (ut dixi) paroxysmos, bis, ter quotannis iterare solita est, jam inde a *Canis Morsu*, per integrum biennium (quo, prædicto more, cruciatus est ager) ne semel quidem rediit. Ut hæc malorum ilias a miasmate *Arthritico*, multum conturbato, perque corpus universum, in ipsos *Nervos* acta (& quidem *Canis Veneno* forsan impellente) proficisci, non immerito credatur.

Docti utique Medici, & experientes, in hujus ægri curam incubuerunt. Quamprimum lex mihi demandata esset, (quando præter symptomata jam dicta, ventriculum etiam ledi *Arsenice*, multoque vomitu urgeri deprehenderim (primum alvum subduxi, tum *Decocti Cort. Chalybeati* ℞ij. ter in die sumendas imperavi. *Decocti* hujus vere *Polybrefti* usu, cum levi corporis exercitatione diu continuato; (nempe, cum intermissionibus quibusdam, ad annos aliquot) mirum quantum ex eo commodi exortum: fames enim, oculi vigor, faciei color, spirituum animalium robur (*Arthritis* denuo ei *toti* se revertente, & paroxysmos, sic, ut olim, edente regulares) tum animæ, tum corporis mala finire cuncta. *Erysipela*, & valetudo, post annorum aliquot interruptionem, omni ex parte integra, & perfecta, felicissime restituta, paulatim, tanquam ex postliminio, redierunt.

Si *Arthritides* isthoc, ex *Morsu Canis*, silentium, si symptomata, per istius silentii triennium oriunda, (pravæ profecto, & terribilia,) si, ex *Arthritidis* reductione, symptomatum istorum fugam animo rite perpendamus, nihil manifestius, quam quod a miasmate *Arthritico*, devio, & in *Nervos* irrepente, fierent ista *Spirituum animalium*, & *Nervorum* mala, & quod, ex eodem miasmate in artus (uti par est) exulante, *Paralyfis* cum malorum ista cohorte tolleretur.

Convulsiones, ex *Arthritide inversa universalis*, *Arte medica sublata*.

His, ob morbi discrepantiam, an affinitatem dicam? *convulsionum* addam universalium, ex *arthritide* intrus in *Nervos* acta, historiam. Vixit, annos ante paucos, in *Isce* nostræ suburbii, familia, proba quidem & honesta, neque Veneri, neque Baccho delita: quæ tamen *arthritidi*, sic, ut raro, quæquam unquam magis, est afflicta. Fratrum unus e medio *apoplexia* subreptus est *arthritica*; alter *arthritide* & *Erysipela* premente obiit; de quibus suis locis. Fratrum tertius, hic noster, articulis olim doluit, tum crebro, tum vehementer. At cum hujusmodi cessavere, aut minus crebræ, minusque vehementes fuere *arthritidis* accessiones, *Convulsionibus* ille correptus est, observari diffusissimis. Primum enim illæ partium externarum erant; deinde, mira spirituum in *capite Arsenice*, postea vero eclipsâ comitate. Cum ad ægrum arcesseret, *Spasmi* enim gravissimis implicitum, sensibus orbatum inveni: cumque diuturnitate malum ingravesceret, (dies enim aliquot jacuit *incedens*) tollendi ejus ergo, medicina, qua possem efficacissima, usus sum.

Præmissis alvum inanientibus, ut caput allevarem, ad cutim tonso, & raso, ei *Epispasticum* admovi. Quod quidem amplum, & diu adhærescens, optimo fuit ægrotanti auxilio; seri enim libras (quinque, vel sex dierum spatio) minimum binas evocavit. Interea temporis, quæ spiritus sustentarent animales, quæque eorum motus ordinarent, ore sumenda dedi.

℞. Pul. castorei ℞j. *G. Galbani*, *Sagapeni*, *assæ fetid. ana* ℞j. *Opopan. solut. q. s. f. f. pilulæ*. Sumantur quatuor, ex *Jalapii* *cerbalici* *Haustu*, quarta quæque hora. *Spiritus castorei*, & *Vol. Oleos.* in eundem finem, ex eodem vehiculo, subinde sunt adbibiti.

Hac ego medicina, supra astantium expectationem, ægrum excitavi, morbo eum ancipiti, & pestifero liberavi, & ut idem ne recurreret incommodum, *chalybe*, & *corrice*, præfidiis hac in re certissimis, ægrum munivi.

CAPUT XVII.

*De Doloribus in corpore vagis, fixis;
de Ophthalmia; de Erysipela-
te, & Achoribus
Arthriticis.*

ART. I. **V**idimus, quanta cum sævitia partes corporis nobilissimas, & vitæ maxime necessarias agitet *arthritis*: quam illa (tanquam malus civis, qui exulare respuens, rebus usque novis studeat, domos illustres ad factionem suam trahat) intestina, pulmonem, cerebrum, viscera ceteris *Koiliis* contenta fere omnia corrumpat. Nunc, in regionibus a Metropoli, & locis principibus, longe distitis & remotis, in provinciæ interioris ambitu, in partibus viscera continentibus, quid eadem faciat, quoque se modo gerat, diligenter exquiramus.

Horum locorum *anomala*, qua a me notata, sunt in iis *Vaga*, *Fixa arthritis*, *Ophthalmia*, *Erysipelas* & *achores arthritici*; de quibus omnibus hoc capite dicam, uti in sequentibus: de *Epiphora*, & *Dolore Dentium arthritico*.

II. *Arthriticis* iis, quibus sanguis acrimia miasmate diu multumque inquinatus, cum ad *æquum* id elatum efflorescit; familiares aliquando sunt *Dolores*, qui nunc vagantur per regiones dorsi, & lumborum, per scapulas, sternon, cervicem, & caput externum: earum nempe partium aliqua incipientes, eam ad tempus aliquod afficiunt, donec alio, quocunque vult natura, transferuntur. Quæ utique loci mutatio interdum crebra est, & in nonnullis hi *Dolores* (quod ab *arthritico* non uno comportum accepi) per corpus serpunt externum, pene universum: *arthritis* sic in *Trunco* vaga, non semper intellecta, *Rheumatismi* nomine vulgo delitescit; quæ tamen, si utriusque huius morbi naturam penitus scrutemur, ab eo longe discrepat.

Nunc in eodem loco commorantur hi *Dolores*, eumque non parum molestant. Novi hominem, cujus sanguis quando plane putruit, & in *arthriticam* degeneravit dyscrasiam, huic, inter alias morbi huius *Arthriticis*, in regione lumborum, (ac

si a renum calculo) *Dolor* immanis, & permolestus accidit; quem tamen a miasmate *arthritico*, membranas eo loci spinam investientes stimulante, fieri probabile est. Vertebrarum hæc *Membranas*, etiam si plurimum urgeri corrodiq. noverim; raro hoc fit, præterquam in iis, quibus, seu ætate, sive morbis pene confectis, regularem *arthritida* præstare nequit natura. Novi *arthritis* calidæ materiam, *Oculi*, *Tunicam adnatam* invadentem, *Ophthalmiam* inferre; quæ cum paulo post articulos inviseret, illique paroxysmum aptum, & laudabilem excitaret, eodemque tempore finem *Inflammationi* poneret, ea omnino *arthriticam* esse manifestavit.

Novi *arthritida*, *Palpebram* in vetulo quodam superiorem, mensem & eo amplius excruciantem, quæ cum *Omagram* habuit adjunctam, & *Podagram* e vestigio sequentem, ingenium & morem suum abunde declaravit.

Faciei porro *Erysipelas* notavi, quod de tractione sanguinis, factaque inde materię in artus *Αιδοχῆν* cum in *Dolorem* mutaretur isthuc *arthriticum*, naturam plane confessum est *arthriticam*, ipsumque esse materię istius generis calidæ & evectæ, eo in loco *ἐκκινεῖται*.

Nullius autem *anomala* in externo corpore natura subtilior, quam quæ est *arthritidos achores* inducentis. (1) Jampridem tradidi, in nonnullis corporibus fere idem esse, utrum per articulos, an per *aurium*, *Ulcuscula*, id, quod alienum, emitteretur: quod quidem observatione mihi non una confirmatum. Sunt enim *Arthritici*, quibus, in paroxysmorum intervallis, (maxime si paroxysmi tenues sint, & nimium mites, aut forte intercisi) ista per *Aures* evacuatio vicem obtinet *Arthritidis* summe regularis. Sunt etiam, in quibus, neglecta re articulari, perque artuum glandulas veneni expulsionem penitus omissa, natura unius *Achoribus* contenta, per eos id exterminet.

III. Affectibus jam dictis, una cum aliis omnibus, quæ *Trunci* relinquuntur, *Anomalis*, hoc commune est, eas periculo, quam *Anomala* sunt *internæ* reliquæ, multo magis expertes esse, & ad *Regularem Arthritida* propius accedere. Cujus rei ratio, tam ex locorum a natura ignobilitate, quam ex eo, quod

(1) *Dissertatione, de arthritide Symptomata. Cap. XI.*

quod auxiliis etiam externis ii tractari possunt, elicienda est.

Quinetiam hoc addendum, a corporis ambitu, ad ejus medullium, a τῷ ἰσχυρῷ ad τὸ ἰσχυρῶν, *Arthritis*dem non creberrime transferri: certe rarius, quam ipsam *Regularem*. Cujus eventui nullam aliam excogitare valeo rationem, quam quod *Artus*, a corpore longe in aërem projecti, sæpe a frigore magis patiantur; & quæ *Arthritida* reperiuntur, causis magis pateant externis; quibus hæ nostræ *Anomala* non sunt adeo obnoxie, & raro intercise viscera subintrant, verum e contrario in artus multo frequentius erumpunt.

IV. Communis harum *Anomalarum* medicina vult, ut, graves eæ si contingant esse, initio detrahatur sanguis; deinde purgans, (sive *Alcoticum*, sive aliud e *Ἀποκυσσῆσαι* aliquod) quo materiæ vitiosæ partim ano possit expediti, partim ad artus amandari, detur.

Præter hæc communia, nisi malum ingravescit, nihil est, quod amplius suadeam medicinæ. Tuta enim est, & incolumis ægroti res, si non ex omni parte placida. Quin & ii homines *Arthritici* molestius sæpe ferunt *Dolores* in articulis, etsi restituendæ sanitatis ergo factos, quam, cui medeantur illi, malum. Mos igitur iis in hoc rerum statu gerendus, & donec malum per se inclinet, aut tempore vincatur, expectandum est.

At si urgebunt *Dolores* (quæ propria eorum medicina est) æger stragulis in lecto coopertus, aut *Spiritu C. C.* aut *Tberiaca Androm.* cum *Pul. Gasconic.* vel *Rubro Exoniensi*, vel ejusmodi aliquo *Cardiaco*, una cum *Posseto Anthosato*, sive sudore materiam foras ejiciat, sive in artus amoliat.

Quod de *Doloribus* hisce, tam fixis, quam vagis, pronunciavimus, id etiam in *Erysipelate* valebit, ut nempe per *Cardiaca*, *Podagram* expellentia, miasma procul arceatur.

Si, post evacuationes jam dictas, intendatur *Ophthalmia*, sive etiam minime levevetur, erit, quo organum, æque pene cum vita earum tenamur, remedio opus: quare *Collyrium* modice discutiens, & corroborans adhibeatur. Inservit huic intentioni id, quod sequitur.

℞. Album Ovi agita, aqua Rosæ. dilue, addde Camphoræ gr. aliquos, f. collyrium, cujus guttæ in Oculum paucae omni mane insillantur, lintheaque eo immersa plapebræ Sydenham Opera Med. Tom. II.

bis terve in die superponantur. Potest commodè *Lapis Calaminaris*, sive *Tusia* præparata *Collyrio* superaddi.

Si Ἀχῆσι permolesti sint *Arthritici*, eandem sere recipiunt curationem, ac qui absoluti; neque enim, eorum causa, in articulis, dolorem excitari velim: tanta eorum incolumitas, tam magna utilitas. Quod de hac *Anomala* (quantum mihi videtur) una proponendum.

HISTORIA.

Achores, ad Arthritide in alio Corpore generati.

Postremo ineunte sæculo, non procul ab urbe, vir egit generosus; qui, ob juventam non nimis sobriam, ea vix finita, laboravit *Arthritide*. Etate progrediente, similem ea progressum habuit, & quotannis increvit: donec artuum motu ferme omni privatus, æger demum clinicus evasit. Erat ille vir, si quis unquam, totus ex *Arthritide* factus, pari certe ratione, atque dicitur.

Οἱ ἄλλοι ἀσθενεῖς ἐκ γυναικὸς τῆς αὐτῆς,

Cum annos prope viginti maritus sine prole esset, favente demum *Arthritide* filiam progenit. Castissima, & venerabilis ejus uxor non tam *Lucina*, aut *Diane*, quam *Arthritidi* debuit, quod facta esset mater. Patris tam *Arthritici* filia, originis suæ labem & maculam non uno modo agnovit. Erat enim vultu pallido & languenti, constitutione tenerrima. Plures enixæ filios, partus ei non parum profuerunt, & a miasmate nativo, magnam illius partem evacuando, tuebantur. Ἀχῆσι autem, præcipue cum illa defierat οὐ γὰρ ποὶ ἔχω, erant gravissimi. Aures externæ, multum tumefactæ, per *Ulcuscula* vires emisere, mordax & acre, cujus acrimonia regio isthæc omnis inflammata est. *Virus* siccatum in squamas abire solitum est, in furfuraceas, subalidas: quibus, sive sponte decidentibus, sive refricando sublatis, ichor denuo jugiter emanavit. Neque *Purgantia*, neque virtutum optimarum *Alterantia*, (a viris arte nostra celeberrimis præscripta) malum hoc vicere; modum ei forsan imposuere.

Ut semel dicam, miasma hoc indomitum & pestiferum, matronæ illius filios hunc in diem aggravat; quorum plerique omnes

Y

(sunt

(sunt autem multi) *Aurium* exudationes, aut alias illius veneni notas, & indicia, veteri nempe contagio afflati, gerunt, & testimonio sunt probabili, miasma hoc virulentum, in alio corpore per *Arthritida* regularem, in alio per *Achorea* natura ejici.

C A P U T XVIII.

De Epiphora & Doloze Dentium Arthritico.

ART. I. **D**E *catarrhis* iis, qui *arthritica* facti materia pulmones, aliaque respirationis organa invadunt, & tussim frequenter inferunt, alibi disputavimus. Qui *Oris* sunt, & *Oculorum*, eadem materia facti, atque eodem e numero reliqui; eos, hoc capite dicendos, jam nunc aggrediemur.

De *Podagra Dentium* libellum olim in lucem misit *Job. Steph. Strobelbergerus*, Thermiater Cæsareus; ut vel propterea super hac re sermonem instituere supersederem. At cum iste liber, quicquid promittat ejus inscriptio, non tam de *Doloze Dentium arthritico*, (cujus neque therapiam propriam, nec quidem diagnosin ullam in medium profert,) quam de affectu isto, quatenus exquisito agat; integrum mihi erit, hanc *anomalam*, cum aliis suis Tribus, una tractare.

II. Quod ut accurate faciam, in primis observandum est, humores illos acres *arthriticos*, qui, per ambitum corporis erratici, dolores ciere solent antedictos, in *Glandulas Oculis* vicinas, & secernendis lacrymis dicatas, a natura nonnunquam infundi, & jugiter isthinc emanantes *Epiphoram* creare: modo in gingivas, & eas, quæ dentes circumvestiunt, membranas immitti, & *Oderoxyias* facere. Qui utique affectus sæpe diutini sunt, & (humore salso teneras, sensusque acutissimi fibras urgente, spiritusque eas inhabitantes stimulante) nonnunquam etiam molesti. Quoniam autem idem, ab *arthritide* nunc a *vis. ita* reperculsa, & paroxysmum interruptente, oriantur; nunc in *arthritida* regularem desinant, utrunque vero ita tum oriri, tum desinere constet,) ideo etiam *arthritici* censeantur; ipsamque esse *arthritida*, sede germana, & vix jam relicta, alieno in regno *anquans* favientem.

III. Si morbi illi tenues sint, nec egrotantes supra modum urgeant, curatio his *arthriticis*, ac quæ exquisitis, eadem sit utilissima: si vero graviores periculum, vel molestiam inducant, hujusmodi velim medicinam.

Primo sanguis mittendus, speciatim, optimeque *Vena Jugulari*: tum venter resolvendus, sanguis turbandus, dato, quod ambobus his sufficiat muneribus, mane postero, *Purgante*: deinde *Epispasticum* cervici applicandum: ulcuscula vero, ne arescant, *Litu* illinantur *Epispastico*, & tandiu quidem, quandiu malignavitas perduraverit. Postea; si *arthritidis* ad affectam usque partem adhærescat, non nisi molimine, quodam in artus removenda, ad rem facient auxilia, tam quæ, extraapplicata, educant eam, evocentque, quam quæ ore sumpta, expellant. Atque hæc istorum medicina morborum est communis.

Propria requirit, ut in *Epiphora* vitatis, initio præcipue, restringentibus (ne sero, acri, & venenoso exeunti viam occludant, & fistulam inducant) *Collyriis* mollientibus seri nimia mitigetur acrimonia. Quæ in finem *Lac* inservit muliebri, recens, *Oculis* immissum; uti etiam, e-*Mucilage Sem. Psylli*, & *Cydon. aqua Ros. extracta*, vel e *Trochisc. albo Rhafis* & *aqua Plantaginis* collyrium.

Sin *Oz. Catarrhus* opprimat, & egrotantem humorum copia, vel asperitas ostendat, prodest *Gargarismus* eos tum diluere, tum elicere. Ad eliciendum, quam quod maxime, conducit *Rasp. Raph. Rusticani*, ore retenta, & manducata, cujus sollicitatione prægnantes se gingivæ possint exonerare.

Si *Dentem* forcipe evelli, postulaverit Dolor, eo, quod alveolum purget, (Molle puta *Mercuriali*, cum *Sale communi*, *aqua fontana mixtis*, vel ejusmodi alio) oportebit gargarizare: quo peracto, rursus in alveolum intrudatur *Dens*, ob evulsionem utilior evasurus.

Epiphora hujus exemplum in capite undecimo protulimus, *Odontaglie* vero *arthritice* in manibus est historia, quam illico adscribam.

Dentium Dolor Arthriticus.

CAPUT XIX.

Corollaria continet, cum Epilogo.

Quidam mihi familiarissimus, & in rebus agendis conjunctissimus, biliosum & siccum habens Corpus, *Catarrhis* jam inde a cunabulis immune; ubi ad ætatis medium accessit, ex pedibus laboravit. Plurima huic *Arthritico* acciderunt, quæ attente observata, recteque considerata, ad morbi hujus inconstantis, dubii, versatilis ingenium & morem explicandum, valeant egregie: Unum habeo in præsentia dicere, alias alia.

Cum ætas præcipitavit, (quæ non humanam modo sanitatem, sed & ipsos morbos afficit, eorumque interturbat, & abrupit ordinem) eclipses primo leviores, paulatim magnas, & graviores passa est *arthritidis*. Pro *Arthritide*, juncturas artuum more suo occupante, multumque cruciante, nunc *Vertigo*, nunc *Cephalalgia*, nunc *Dolores* per universum corpus externum erratici, nunc (quod ad rem nostram attinet) *Dentium Dolor* acutissimus erat. Mirum ægro videbatur, & portentis simile, morbo se vexari tam parum convenienti, vetulum nempe, pumice aridiorem, *Catarrho* dentes infestante.

Inito hac de re colloquio, dubium & sollicitum percunctor, quo se modo gesserat per dies hosce nupetos *Arthritidis*: utrum paroxysmos satis crebros, satis vehementes, sic, ut olim, ediderat. Neque crebros, neque vehementes æger reponit, sed in propinquo esse *Arthritidem*, ex *Cephalalgia*, ex *Doloribus* huc illuc vagis, se hæriolari. Quibus ego; Quid si adventantis illis *Arthritidos* signis, addas etiam *ὀδονταλγίαν*: quando hunc affectum, una cum cæteris modo dictis, eadem causa fieri verisimile sit, *Arthritica* scilicet materia, naturæ jam molesta, janua non optima in fugam pulsa.

Ut in pauca rem conferam, paulo post articulos invasit dolor *Arthriticus* omnibus numeris absolutus; eodemque tempore *Dentium* ille Dolor, ut & omnes alii remisere. Hujusmodi *ὀδονταλγία* ille postea sæpenumero perpeffus est, ex *Arthritidos* aberrationibus, & deliquiis semper exortam; in *Arthritida* regularem & idoneam, semper exeuntem: ut de confirmanda indole morbi hujus *Arthritica*, plura, ut opinor, addere supervacaneum esset.

ART. I. **H**æ sunt *Arthritidis* in Truncu corporis *Anomalie*, non dicam omnes, nec quidem nullas omnibus numeris absolutas, (certe absolutum, & perfectum hujusmodi opus vix unius sæculi, nedum hominis unius esset;) sed insigniores aliquas, & quæ in facienda medicina mihi passim obvenire, notatu digniores.

Ex iis, quales sint, persuasum mihi habeo, quod apparebit, miasma *Arthriticum*, præter artuum mala, omni ævo animadversa, varios, multiformes, multumque discrepantes inter se affectus, si eorum facies, si phænomena spectemus, efficere; & quidem in hac nostra regione (forsan etiam in aliis non minus) cerebro: varios scilicet pro istarum partium, & locorum, in quibus sunt, varietate; multiformes, pro diversa eorum structura; & pro eorum usu, discrepantes.

Deinde, constat affectus, sic a devio hoc miasmate generatos, partium affectarum morbos proprios, & vernaculos, ad amulsum omnes simulare; vultus eorum usurpare; signa vel pathognomonica præ se ferre; neque a morbis indigenis, per ea, quæ concurrunt diagnostica, posse quovis modo distingui; sed e contrario revera cum iis sæpenumero confundi.

Deinde palam, uti spero, factum est, non hos affectus, alienos & *Arthriticos*, quoties ingravescant, & jam magni fiant, etiamsi propriis affectarum partium morbis simillimos, illorum medicinis, (quæ quidem magnis, & gravibus hisce sublevandis, nequaquam aptæ, vel paræ sunt,) tractari oportere; verum e diverso privis, suoque singulorum mori, & ingenio accommodatis. Hæc autem & illæ uniuscujusque horum pro ejus *Subjecto* esse, & cum eo multiplicari: unde tot novæ *Arthritidis* formæ, fereque tot diversæ earum curationes, quot inveniantur ejus *Anomalie*.

Deinde, diximus *Anomalie* singulam singule curationem non alio modo facilius absolvi, nec quidem auspiciarius suspici, quam partem aggravatam, & nova hoste oblesam allevando: illud autem optime effectum reddi, partim evacuationibus, tam universalibus, quam topicis; sed iis, privata ratione,

tione, quæ nimirum malis hisce maxime conducatur, adhibitis, optime vero omnium per hostis expulsionem, & ab iis quæ intus sunt inique occupata, *ὡς τὸ ἴδιον*, ad artus ablegationem. Quibus autem auxiliis, quæ medendi methodo, in prædictis *anomalis* hoc præstari possit, hujus scripti pagina fere omni ostensum est, & declaratum.

Hæc hujusce *Dissertationis* summa est.

H. Hisce positis, manifeste patet, quam ad hominum salutem magni sit momenti, deviam hanc *arthritis* sectari, investigare, quamque latebras ejus perscrutari, larvas excutere, & in artus suos, & domum utcumque invitam & reluctantem, eam, quæ tuto possit arte, reducere. Nam, cum *Arthritis Regularis* & *Anomala* plerumque sint in simili ratione, de *Anomala*, tametsi per se obscura, seque multum occultante; quantum illa grassetur in vulgus, & quatenus sæviat, ex *Arthritis Regulari* laborantibus, (nempe ex illius crebritate sævitiæque, horum autem *sex non naturalibus*) cuius liceat conjicere. Qui recte calculum hac in re posuerit, pro certo invenerit, quod, tametsi *arthritis Regulari*, quam *anomala*, plures ægrotent; tamen *anomala* quam *Regulari*, longe plures occumbant: immo quidem *Regularem* raro, nisi prius degenerantem in *anomalam*, occidere, ita vero creberrime.

Prætermiſſis autem his, & harum *Anomaliarum* investigatione, (quam in suorum commodum & tutelam, medentis semper erit pro re nata exercere) sive neglecta, sive perfunctorie, vel imperite facta, necesse est ægrotos, simulatis his affectibus, *Colica* nimirum, *Phthisi*, *Asthmate*, *Angina*, ne dicam aliis ejusmodi *Arthriticis* (id est, *Arthritis* morbos illos referente) opprimi quamplurimos; quoque longius serpat, & magis gliscat *Arthritis* idonea, ea proportionem plures.

III. Neque nostram hac de re doctrinam, ulla quidem ex parte, convellat, nedum eam evertet id, quod de *Arthritidis Symptomaticæ* speciebus olim dixi, (si quis hæc *Anomalias*, partium affectarum morbos esse vernaculos, & exquisitos, *Apoplexiam* v. g. veram, & genuinam, miasmate fieri posse *Arthritico*; frustra quoque toties, & sine necessitate multiplicatam a me *arthritis* contenderit,) quandoquidem (ut de rerum nominibus, quæ earum naturas explicant, & tanquam icones, in conspectu ponant, elegendis & præferendis, nihil dicam) ho-

rum affectuum, utcumque nominatorum, medicina, quæ a me potissime spectata est, *ὑπερβολὴ* suo usque, sic opinor, stabit talo, recto nempe & inconcusso; *arthritis* in artus expulsionem, quod a me propositum, omnino molienda.

Quibus addi potest veteres (Paulum volo, Alexandrum, Aetium, Galenum, Aretæum) non solum, *τὸν ἴδιον*, sed etiam (ut in Præfatione dixi) *τὴν αἰτίαν* *arthritis* exhibuisse; horumque me autoritate fuisse usum, & vestigia repressisse.

IV. Hæ, quas nunc protulimus, *arthritis anomalas*, suo quæque genere graves sunt, magnæ, & immodicæ *κατ' ἴδιον*: Alias autem minoris ordinis, easque non paucas esse suspicor, quæ nunquam eminentes, aut ad statum hunc notabilem evectæ plerumque visum fugiant & pro nullis habeantur. Enimvero usu medico vel parum exercitatis, hoc latere nequit, *arthritis*, (præcipue frigida, inertis, languida, maxime vero omnium ea suppressa, retusaque,) ægrotantes, interdum *Humeri*, *Pectoris*, *Dorsi*, *Lumborum*, aliarumque in ambitu corporis partium *Dolore vago*, tanquam *Rheumatico*, sæpe etiam capitis affectibus, more prorsus *Hysterico*; alias aliis in corpore malis, quasi *Scorbuticis* urgeri, sæpissime vero *valetudine dubia*, & in tempore diuturnum incerta, & neutra, esse. Qui quidem eorum status, ac conditiones, sensu remissiori, & leniori gradu morbosæ, natales suos *arthritico* miasmati, cæco, in corpus subrepenti; & eo loci clam agenti, se debere, ultro videntur agnoscere. Quinetiam aliquando, multos post annos dubium hunc in modum actos; tandem, apparente paroxysmo *arthritis* idoneo, de istorum origine & natura malorum *Arthritica*, omnis sublata dubitatio est.

V. Quid! quod *Arthriticorum* gnatos quoties obtueor, & nunc *Achores*, nunc *Catarchos*, nunc *acres* intestinorum *Humores*, (ut taceam alios affectus certe non paucos,) iis familiares animo complector; profecto quidem memet vis temperare possum, quin eorum ortus incusem, & affectus hosce nihil aliud esse mecum reputem, quam *Arthritidis* hæreditariæ quædam *Ἀποκατμήνη*, seu scintillulas, a parentibus acceptas, in natorum corpora, simul cum ipsa vitæ lampade derivatas, & in iis, secundum eorum modum agentes.

Hæc vero cum sint tantummodo conjecturæ, nec quidem ullis fide dignis probationibus

bus suffulter, de iis solum *Anomaliis* scripsi, quæ indiciis certis, & argumentis, si non *deductis*, tamen valde probabilibus, *arthritis* esse comprobentur; iisque sui contentus maximam partem *anomaliis*, quæ ex *arthritis* præapertæ, claræ, & manifestæ deliquiis oriri jure merito censeantur.

EPILOGUS.

HÆc sunt, quæ dicere habui de *Arthritide Interna*, sive in *Trunco* corporis *Anomala*, totius *Arthritido graphie* parte (nostra quidem opinione) principali, & potissima, certe cultu & expositu omnium dignissima: in quibus exponendis eo fui prolixior, quoniam magni salutis hominum interesse judicavi, & a Medicis aut nulla fuit harum rerum mentio, vel si ulla, semper utique brevissima, & quasi intranscursu facta: verum de certa *Arthritidos Anomale Diagnosi*; de illius *Reductione*, & ejus præstandæ methodo, nemo unquam

mortalium (quantum scio) quidquam est locutus. Uti vero apud *Astronomos* ista *Solis* theoria, quæ ortus, ceteraque gloriosissimi illius Luminis phænomena describeret, omnino manca judicaretur; nisi etiam *Eclipses* ejus exhiberet; eo certe plenius, & accuratius exhibendas, quæ illæ sint in chronologicis rebus illustrandis, & temporum punctis statuendis utiliores, quoque etiam explicatu difficiliore: Ita quidem *arthritis* historia, tametsi *Regularem* plane & dilucide tradat *arthritida*, nequaquam absoluta, atque adeo imperfecta credatur, si nullos habeat *arthritis* *Defectus*, si nullam *Internam*: cujus insuper notitia, quo humano generi commodior, quoque fuerit ignotior, eo distinctius, eo fusiori calamo tractanda.

Quin hæc a me diligenter observata, non sine labore collecta, fideliter renunciata, & jam, animo erga humanum genus benevolento, in lucem missa, boni consulite.

F I N I S.

Alia res in ultioris Op.

E P I T O M E

DISSERTATIONIS PRIMÆ

D E

ARTHRITIDE SYMPTOMATICA.

CAPUT PRIMUM.

De Arthritide symptomatica,
generatim.**M**Orborum Migrationes Successiones-
que ex Hippocratis Præcepto sunt
inspiciendæ. Art. I.Arthritis alia primigenia; alia
secundaria, sive symptomatica. II.Quæ vel materiam, vel in huius generis
Arthritida Materie Μετεωρισμῶν, Morbo
alicui Primario, & præcedenti, refert ac-
ceptum. III.Hujus Regionis symptomaticæ recensentur,
suntque Arthritidos, generatim sumptæ,
quasi Pars dimidiata. IV.Symptomaticarum Ratio Generalis in eo sita
est, quod cum Morbi sunt a primigenia
distantes, ei tamen gradatim appropin-
quant. Modum appropinquandi certissime
commonstrant: simul cum usurpato Arthri-
tis primigeniæ Vultu, primarii Exuvie.
Conditio Earum specialis. V.Symptomaticarum differentie, si Earum Ex-
terna, si Paroxysmos spectemus: Partus
Facilitas a primarii Indole, & in Arthri-
tidem propensione. VI.Alia Arthritis symptomatica improprie dicta,
quæ rheumatismo superat, Alia magis
propria. VII.Quæ generatione procreatur vel æquivoca ut
ex chlorosi, & ex hydrope arthritis, vel
univoca, quæ eandem cum primario Ma-
teriam habet, quæque ob Crisin ali-
quantæ imperfectam exoritur: ut aliquæ
omnes. VIII.Symptomatica magis propria non nisi Cbron-
icum vetustum sequitur, & grandiores in-
vadit; contra quam minus propria.Symptomaticas hæc specie inter se differre,
& diversas poscere Curationes, existi-

mandum est.

Ex Morbi primarii & Arthritidis primige-
niæ Therapia elicitur, in Medendis sym-
ptomaticis Indicatio. XI.In Paroxysmo, ab Arthritide; in Vacatione,
a morbo primario. XII.Prophylaxis ad menses proferenda, ad Annos
aliquando repetenda. XIII.Ætiologia Arthritica, ob neglectam sympto-
maticæ & primigeniæ Arthritidos Discre-
pantiam, hætenus imperfecta. XIV.

Curatioque inidonea. VX.

Methodi Ratio. XVI.

CAPUT II.

De Arthritide Rheumatismo superven-
ienti, symptomatica fallo
appellata.

TRANSITIO.

Art. I.

Rheumatismo soli Frigore procreato suc-
cedit Arthritis: Is autem, Sanguinis len-
tore gravi & repentino Capillaria infar-
ciente, generatur. II.Qui fiat ea Γαίωσις exquiritur: Non a Chylo
acescente: (Sanguis injecta Lacte non
coagulatur.) III.Neque solum ab Acido. Serum ejus calefa-
ctum per Frigus subitum condensatur:
rheumaticorum Urina minus salsa: serum,
addito Syrupo Violaceo, virescit: Pellicula
Sanguinis, per instillatam Sublimati So-
lutionem, albescit. Lentorem vel a Ca-
lore Frigoreque vehementibus & continuis,
vel a Sale Alcalico, vel ab utroque nasci
concluditur. IV.Rheumatismo male tractato subjicitur hæc
symptomatica, & Arthritidem Frigidam
æmulatur. V.

Illius Facies & Mos. VI.

A reliquis symptomaticis ut distinguitur. VII.
Adver-

C A P U T IV.

Adversus rheumatismum valere posse Vomitionem, sed frequentem & caute precipiendam. VIII.

Ad hanc Arthritida requirit indicatio, ut tollatur iste Lentor. Quem in finem Antiscorbutica, Spiritus Volatiles, adhibeatur. Quid per Oleum Terreb. Quid per Camphoram agatur, periclitare. IX.

Psyalismus proponitur, & Emplastra cum mercurio, ut & ad Articulos exonerandos, Suctus. Quid per Maturantia fiat, deliberandum. X.

C A P U T III.

De Arthritide ex Chlorosi, & ex Mensium Suppressione.

ARTHRITIS a chlorosi Symptomatica est rarissima. Art. I.

Eas tantum aggreditur, qua stirpe sunt Arthritica prognata. II.

Causam habet Continentem, a cholerosos Continenti longe diversam, & ad istum morbum se fortuito adjungit. III.

Interdum vaga est, sub rheumatismi Nomine delitescens: Alias articulis affixa: utriusque Diagnos. IV.

Indicatio vult, ut per Muliebria Materia peccans expellatur: qua partu Maturuli. V.

Qua Mensibus. Hisce procurandis inserviunt Martiata cum Emmenagogis juncta, aqua Martiata, cum Purgatione nonnunquam intercalanda. VI.

Arthritidis ex Mensium Suppressione, Origo & Mor. VII. VIII.

Modendi Lex, ut per Catharsin, sed Modo peculiari celebrandam, Materia dimittatur. IX.

Fonticulus aperiatur. X.

In isto Pari Symptomaticarum impugnando, quantum intersit. XI.

Historia Arthritidis Vaga, Fixa, Nodosa, Hereditaria, ex chlorosi nata, per Emmenagoga fugata.

De Arthritide Hydropi superveniente.

HYDROPI Arthritidis etiam si crebro supervenit, inter Natura Aversa tamen est censenda. Art. I.

Ab Hepate, seu viscerum aliquo nobiliori, Laba indomita vitiato, quicunque fit hydropicus, raro Is Podagricus. At si in Liquido omne vitium, ex eo saepe oritur Arthritidis. II.

Maxime vero post amara & chalybeata, hydragogis submissa, vel (ubi consistunt Vires) statim post hydragoga. III.

Spiritus Sero liberati, vel per Se, vel Medicamentis incitati, emergunt denique, Materiam & Sanguine pellunt alienam. IV.

Atque adeo Seminium, si quod intus latuerit, Arthriticum. V.

Et quidem bono omine. VI.

Nullam postulat hac Arthritidis Therapiam nisi qua servetur, augeatur, ordinetur. VII.

In hunc finem singularia recensentur. VIII.

Ut ea componantur, & in Methodos redigantur. IX.

Ad hydropa propellendum, Vere & Autumno aqua subducenda, & quidem Drastico potius quam Leniente; Eger nec plus, nec aliud bibat, quam Coctioni & Nutritioni quod sufficiat. X.

E Lecto mane quam primo exurgat, Vesperi mature cubet, bis in die Corpus sub Jove exerceat. XI.

Huius Methodi Utilitas. XII.

Historia Prima, De Arthritide hydropi probe curato feliciter accedenti.

Secunda, De Arthritide asciti, ejusque Remediis, auspicio agnata.

Ter tia exhibet podagram, asciti per Nature Vires subortam.

Quarta De hydropo per Diuresin & Abstinentiam victo, cum Arthritide per amara & chalybeata famulante.

C A P U T V.

De Arthritide Melancholica.

EX Univoci ortus symptomaticis, Principatum habet Arthritis ea, quæ diutina succedit melancholiæ.

Art. I.

Hæc melancholia duobus pendet, 1. Spirituum Animalium a Natura Teneritudine, quæ Causis evidentibus sæpe augetur, 2. Rebus Eos Afficientibus.

II.

Natura id, quod melancholiam peperit, aliquando in Articulis trudit, itaque symptomaticam hanc Arthritida progignit.

III.

Clementer Ea ferre se gerit.

IV.

Ideoquæ melancholia, brevi recurrente, excipitur. Ut Arthritide ea dignoscatur.

V.

In Arthritide Morbo hypochondriaco subnata, juvat id, quod primis Viis includitur alieni, per Alvum amoliri, Coctionemque instaurare.

VI.

Precipue vero aquis purgantibus, tartaro laxanti & manna a juris, quæ blande Alvum subducant. His superaddi possunt aquæ diureticiæ, vel infusum Thez, cum e ferro preparatis, vel etiam decoctum corticis simplex, aut chalybeatum. Prodest aliquando, loco Cerevisiæ, decoctum chinæ, sarsæ &c.

VII.

Hist. 1. De Arthritide melancholiæ Diuturnæ succrescenti.

Hist. 2. De Morione melancholia hypochondriaca & Arthritide interempto.

Hist. 3. De Arthritide hypochondriaca Purgantibus preoccupata.

Hist. 4. De morbo hypochondriaco cum agnata Arthritide, aquis absorentibus subactio.

Hist. 5. De gonagra miti hysterica, chalybe concitata.

Hist. 6. De Arthritide hysterica.

Hist. 7. De Arthritide melancholica cum Ventriculi &c. Affectione, per paroxysmum regularem allevata.

C A P U T VI.

De Arthritide fixa Scorbatica.

Melancholicæ proxima est, Arthritis scorbatica, sed longo proxima intervallo.

Art. I.

Scorbutus apud Damnonium paulo ante frequentissimus; sed vicini Belegii scorbuto, hoc est, genuino dissimilis.

II.

Ejus Symptomata celebriora recensentur.

III.

Utrum scorbuti calidi sit ubique sui generis Materia ambigitur.

IV.

Lepa jam pridem in Damnonio Endemia, cujus gratia Nosocomia passim quam plurima.

V.

Partim Illa salis communis, partim etiam tabacci usu cicurata, maxime vero pomacei, in scorbutum hunc Calidum degeneravit.

VI.

Scorbutus hic Noster Arthritida fixam imitari gestit.

VII.

Scorbuti hujus cum Arthritide convenientia.

VIII.

Mites habet Paroxysmos hæc symptomatica, sed diuturnos. Præter ceteras, Morbi sui primarii retinet Symptomata, scorbuti præcipue veteris & confirmati.

IX.

Est semper calida.

X.

In Paroxysmo, materia Articulis impacta blande foras elicienda. In pravo repellentium usu quid illi fiat.

XI.

Extra Paroxysmum, vel ptyhalismum, vel per catharsin Materie Evacuatio, tum per antischorbutica arthriticis maritata, Alteratio. Succii herbarum martiati in usum commendantur, ut & Aquæ ferratæ diureticiæ, & decoctum Thez, pomaceum aliquibus prodesse potest, præsertim æstate, & hyeme cerevisia rad. oxylap. &c. medicata.

XII.

Nullus hic creditus ossium, ac tumor pedum minime prætermittendus, ejus descriptio.

XIII.

Est curatio.

XIV.

Historia 1. Ab Arthritide scorbutica Ulcus male tractatum, unde Visus Abolitio, deinde Abscessus, demum Mors.

Hist. 2. Scorbuti Calidioris soboles Arthritis.

Hist. 3. Morbus articularis, scorbuti Alumnus, cum Vomitu Bilioso, Anæsthiæ & Volarum Ariditate.

Hist. 4. Scorbuto suborta, & Ejus Eruptionibus adjuncta, Arthritis.

Hist. 5. Pedum tumor scorbuticus, arthriticus, cum pruritu serino.

De Arthritide Lui Venereæ succedenti.

AB antiquo Venus immoderata, dudum autem, lue ad Eam se adjungente, Arthritidem maxime creberrimeque intro-ducit.

Art. I. Horum Morborum Convenientiæ, & inter se Consensus, unde ad hanc ab illa tam fa-cilis Migratio. II.

Nemo a recenti lue Πόδαγρᾶ Miasma vene-reum evehi prius & maturari oportebit, quam Articulis impingi potuerit. Ideoque raro nisi Grandiores invadis hæc Arthri-tis, scil. a lue derivata. III.

Sed nec a Veteri patursæ procreatur, ubi Arthritidi moliendæ Natura impar rete-ritur. IV.

Patursam Arthritida parientem adjuvat Mos Empiricorum ille, quo in curanda go-norrhœa præpropere, & neglecta vel remissa facta purgatione; Puris excretio supprimitur. V.

Luis in Arthritidem Mutatio, ex Ægroti Corpore ad Eam recipiendam idoneo, vel secus, pendet quam plurimum, Arthritis ista nunc in eodem Corpore cum lue gene-ratur, nunc per Concubitum in diverso. Uti a Nutricis lue in Alumnus derivetur Oculorum epihora, &c. VI.

Quodnam hæc Arthritide Afflictorum Cor-pus. VII.

Morbi hujus Diagnosî qualiscunque. VIII. Intercisî Ejus Paroxysmî apoplexia, vel motus convulsivî plerunque fatales (si nulla fuerit Evacuatio) superveniunt. IX.

In Paroxysmo, dolor Hypnoticis, sed caute adhibendis, ne illorum abusu, Materia Morbi Nervis impingatur, mitigan-di. X.

In Paroxysmorum Intervallis, a lue vene-reæ mutuo sumenda Indicatio, antisyphi-lis Sanguis tuendus, e mercurio compa-rata adhibeatur, maxime vero per ea sali-vatio: quodnam illius instituendæ Tempus in primis opportunum: Placet etiam pur-gatio cum calomelane. Post usum mer-curii, liænorum decocta misceantur. Va-lent aquæ diureticæ, diu recteque potæ: Valent etiam, ex antimonio, &c. Alte-rantia. XI.

Hist. 1. De Arthritide impura, aquis diu-reticis subacta.

Hist. 2. De Arthritide, luis Sobole, a Sydenham Opera Med. Tom. II.

Αυξήσας irritata, Febrim excitans, Ca-pit aggressa.

Hist. 3. Lui venereæ succrescens, Caput im-petens Arthritis.

Hist. 4. Arthritis lui ιντερμυϊκή, Viâ, Digestivis, & Equitatione moderata, tan-dem Intestina invadens, sanguinis cōvul-sivâ Missionem pariens.

Hist. 5. Arthritis lui venereæ superveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem - Convulsionem universalem, & denum Mor-tem inducens.

CAPUT VIII.

De Arthritide Asthmatica.

POdagra succrescit asthmati creberrime pi-tuitoso; quo affectu laborantes, nono & decimo ætatis Lustris, raro maturius, dolent articulis, maxime si præcesserit Me-dicina.

Art. I. Quæ, ceu Cathartica, præcipue vero Δυσαιμία, ceu ex alterantibus anti-asthmatica, gignendæ Arthritidi cum pri-mis confert. II.

Arthritidis hujus materia minime recens esti-manda. Quia nemo repente Πόδαγρᾶ: Quin potius in corpore diu illam latuisse, pœnitæque forsân involvi: & cum ea per sputum κατ' ἐξίτησιν externi, credibile est. Æstate hæc Arthritis latatur quod quidem ejus χαρὰς ποταμός. III.

Ita hæc Arthritis, hyeme minime obdormi-scens, ab asthmate superatur; sub ejus persona delitescit: Æstate vero, cum ad Ambitum Corporis Sanguis liberius effertur, proprie elucet. IV.

Ex ista hujusce materie frequenti expuitione, fieri videtur, quod Arthritis hæc omnino blanda, minimeque dolore vebementi, mul-to minus Tofis, &c. est signata. Indi-cium ejus optimum in eo locatur, quod asthmati usitate & ex more submitta-tur; cetera Arthritidi primigeniæ persimi-lis est. V.

Ex ista succensione in symptomaticis habenda est, & pectoris, Spiritus, Tussis, Spa-tii considerationem comprehendit. VI.

Neque enim hunc in modum asthmaticos, Arthritidem negligere juvabit; quin simul atque fieri potest in articulis dolorem exci-tare, quo levetur pulmo. Hac de causa, Sanguinis missio, vel parca admodum, vel nulla, ne Arthritidi protrudendæ natura impar reddatur admittenda. VII.

Z

Per

Per Διαίτην Catharsis instituenda, quibus sanguis in orgasmum excietur. Catharsis etiam pulmonem exonerat, spiritumque liberat. Sed, quoties in simplici asthma pituitoso, non toties hoc in asthma repetenda, ne recta Arthritis impediatur. VIII.

Ad detellendum asthma, & concitandam Arthritida, mane inf. am. Chalyb. exhibeatur: quarta pom. & nona vespertina balsami alicujus, vel Tinct. Sulf. Dosis majuscula. Diebus aliquot interpositis, extra loco sepiissime dolenti attrahens admo- vendum; tumori, vel quam proxime il- lum, Epispasticum. Quando artus per se invadit hec Arthritis, omnino promo- venda est. Natura enim, asthma occurrit per Arthritida. IX.

Si Bechicis opus usque fuerit, iis, sed le- nioribus, vespere utendum; Hinc mane seq. Sputum, nec ad meridiem obtundetur appetitus. Narcotica his asthmaticis pa- rum tuta. Ad invitandum somnum, si defuerit, adhibeatur sectio, frictio, &c. X. Minuitur asthma, qua proportione augetur Arthritis.

Huic symptomaticæ adjungi solet pedum tu- mor serosus; ambulatione, frictione sepe brevis tollendus. XI.

Ab hac Arthritide restitutis equitatio com- mendanda; ut & videtur idonea ratio, cum eccoproticis, & digestivis, ad asthma & Arthritida præcauendum, subin- de repetendis. XII.

Sicco nonnunquam asthma subneclitur Ar- thritis, Illius descriptio qualiscunque pro- fertur, & in hanc mutato arguitur. XIII. Ejus curatio breviter delineata. XIV.

Hist. De asthma pituitoso, per Arthriti- dem, exemplo notabili mitigato.

Hist. 2. De Arthritide, asthma ex Pletho- ra, feliciter adjuncta.

C A P U T IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

FEBRI nonnunquam exquisita, & perfecta, succedit Arthritis.

Art. I.

Quæ quidem successio, sive ob aliquid ita præparatum in sanguine contentum, sive ob glandulas obstructas oriatur febris; persa- cile capiatur. II.

Ab eodem miasmate (quod prius dixi) concito & debacchanti, febris: ab ipso le- nius moto, sed exulante, Arthritis accer- siri solet. His addendum, quod virus

Arthriticum concitandæ febris valde ap- positum est.

III.

Secundo, si febris a glandulis obstructis sit, illa obstructio sanguinis orgasmum parere potest, ut & ille orgasmus, (sicut Aëstus exercitatione quavis adscitus) Arthridis Paroxysmum.

IV.

Hujus symptomaticæ Natales optime illustrat angina Arthritica, quæ quidem manifesto Arthritis est anomala, cum febre magna & gravi præcedente. Morbo tamen acuto, varius forsitan quam diutino, izizizitus Arthritis.

V.

Ratione paroxysmorum, una est Arthritis ex febre nata, eaque Arthritidi primigeniæ persimilis: ratione ortus, multiplex est, & longe a se diversa, quod particulatim ex- ponitur.

VI.

Quæ febrim comitatur Arthritis omnino pro- vebenda est & promovenda, quæ præcipua, & unica hujus medendæ indicatio thera- peutica. Verum in hujusce symptomaticæ prophylaxi, febris illius, cujus symptoma- tica Fetus & Germen est, habenda ratio. Si habitudini Περικταιν suboleseat Arthritis, habitudinem istam efficiens materia exter- minanda, corrigenda, prævertenda. Si febrî Ερυσιταλιν submittatur, durante insultu, per cardiaca & diaphoretica utri- usque materia dimittenda est: in vaca- tione, causa antecedens aquis diureticis auferenda, lacte Asinino, &c. permul- cenda: Et sic in aliis hujus generis sym- ptomaticis.

VII.

Hist. 1. Arthritis syncho secundaria.

Hist. 2. De Arthritide habitudini Περικταιν subjuncta.

Hist. 3. De Arthritide cum febre Ερυσιταλινά vices exercente.

Hist. 4. Quartanam, cortice suppressam, Arthritis sequitur, cum Arenulis.

Hist. 5. De quartana in Arthritidem mu- tata.

C A P U T X.

De Arthritide ex Colica.

COLICA in Chronicis hujus populi perua- gatissimis est; ejus, quæ Arthritidem præcurrit, Descriptio generalis.

Art. I.

Est autem ea nonnunquam biliosa; quæ breviter depingitur.

II.

Ejus in Arthritidem metamorphosis: istiusque commoaitas, sive caput, sive intestina spe- ctemus.

III.

In

In hac Arthritide materia foras ejicienda, idque remediis potissimum externis. Cardiacis interna (quæ hujus curationis proprietas esse videatur) admodum caute usurpanda, ne in caput arietent. IV.

Alia vero colica est (Arthritidis productrix) a Pomaceo immixti acidoque : Et est ejus proportione. Quò tempore nostros homines invadat, confirmata illi, & inveterata supervenit Arthritis, genuina persimilis. V.

Natura istam mutationem per se nonnunquam molitur, sepe vero numero per purgationem drasticam & elateriam, nonnunquam etiam Cardiacis internis excitata. VI.

Habet hæc Arthritis Dolorem acutissimum, in colicam ex facili revertitur, iterumque Arthritidos Personam inducit, iterumque deponit, raro Tosis &c. signata est. VII.

Alia podagram progignit colica, quæ ab dyspepsiis oritur : Hujus descriptio. VIII.

Qui sunt hujusmodi *Karostipaxoi* Aetatis fluxu aliquando Arthritide laborant, quæ colicam tum exceptat, tum ab ea sepe excipitur. IX.

Verum hæc Arthritis a colica derivetur, an potius Arthritis sit, dudum in intestinis Anomala, jam vero in Externis partibus recte se habens, etsi in dubiis ponatur in arte facilianda eodem fere recidit : Neque depelletur hæc Arthritis, nisi colicam, cui subjicitur, intueamur. X.

In Paroxysmo ferme eadem, ac in Arthritide Exquisita, medendi ratio : Prophylaxeos alia atque alia est, pro causæ remotioris diversitate. XI.

Hujus Tribus symptomaticarum Paroxysmi omnium maxime per Eccoprotica, vel precaventur, vel minuuntur. XII.

Hist. 1. Arthritis colicæ biliosæ secundaria.

Hist. 2. Arthritis, colica ex Pomaceo *ἰσχυρὸς πομακὴν*.

Hist. 3. Colicæ ex Dyspepsia diuturna, Gonagra superveniens.

Hist. 4. Ex Colica Paralyticus, Arthriticus, Inunctione trucidatus.

C A P U T XI.

De Arthritide Morbis quibusdam Cuticularibus subiecta.

QUæ achoribus, hæmorrhoidibus, & ulceribus superest Arthritis, hoc Capite tractatur. Art. I.

Morbi Ejus primarii alienum aliquid expellunt, adaucta eorum materia Turbat ciet

in sanguine, quas sequitur Arthritis. Arthritico durante Paroxysmo, conquiescunt affectiones primariæ. II.

Hujus Symptomaticæ Diagnosin : est ea primigeniæ Arthritidi conjunctissima : ideoque postremo hoc loco discutitur. III.

Morbus quicumque fuerit primarius omnino promovendus : Ulcus, per cathartica, achores, per epispastica, vel leniter attrahentia, hæmorrhoides, per aloetica interne data, per hirudines externe adhibitas. IV.

Hist. 1. De Arthritide Aurium achoribus subiecta.

Hist. 2. De Arthritide ulceribus subolescenti, epispasticis allevata.

Hist. 3. De Arthritide (cum febre intermittente) ex hæmorrhoidibus oclusis.

C A P U T XII.

Corollaria & Specilegia quædam habet, cum Epilogo.

EX prædictis sequitur, quod symptomaticis quæ genuinæ Arthritidi sunt vicinæ, (id est, colicæ, & morbis cuticularibus submissæ) maxime consentiunt illæ, si tantum materiam earum intueamur, quæ sunt minus propriæ, chlorosi nempe, & hydropi *ἰσχυρὸς πομακὴν*, ideoque magis propriis postponi poterant, imo quidem debuerant. Art. I.

Si quis materiam, v. gr. luis, non Arthritida falsam, verum exquisitam parere; itaque symptomaticas hæc, & inter se, & cum Arthritide exquisita congruere argumentetur; nihil isthuc auctorem morbat, quando symptomaticarum a morbis specie differentibus successio, eas etiam, (quoniam morborum primariorum materiam, unde ducenda earum specificatio, manifeste retinent (specie differre monstrat, proprias postulare curationes, ut & propria vocabula; si quis autem eas Arthritidis vocabulo includi voluerit, quanta quæso hæc æquivocatio in (Arthritis) singularem morbum exprimere soliti; jam vero quamplurimos, eosque specie discrepantes morbos exprimentis. Dato vero hæc symptomaticas convenire (quod tamen nec probatum, nec concessum) ad earum curationes tum explicandas, tum exigendas, ex usu erit eas haberi differentes & discordantes. II.

Scorbuto, aliove quovis e Primariis a Febris superadditis laborantem, Primigenia

simul Arthritide posse laborare, non diffi-
tetur Auctor; cui cum hisce tantum mor-
bis negotium, qui Arthritidos induunt per-
sonam.

III.

Aliæ sunt Imagines Arthriticæ minus perfe-
ctæ, quæ sæpe scorbuti, vel rheumatismi
nomine appellantur.

IV.

Glandulæ articulares sunt ex celeberrimis to-
tius corporis excerniculis.

V.

Epilogus.

Observationes Anatomicæ &c. in Actis
Philosophicis Londinensibus, ab
Auctore divulgata.

Numero 151.

Intestinum canis *Cecum* feliciter exectum.

Numero 162.

Instrumentum Cœctionis primarium esse *Spi-*
ritum Alkali generis Volatilem, & de
Glandula in ventriculo *Lucii Piscis Tu-*
bulata.

Numero 166.

De liquorum in lacteas *Ingressu subito*, co-
loreque in iis non semper Albo. Contra
Vrealum, &c.

Numero 167.

Molis immensæ Glandula cor bubulum, præ-
ter naturam, comprehendens.

Numero 240.

Primarius Respirationis usus experimento il-
lustratus. Pro D. Thruston.

Numero 240.

Pectoris Hydrops artificialis.

Numero 242.

Aphonia Periodica.

Numero 247.

Magni Regis Aræburi Cimeliarchum: in
Reverendi Viri D. Geo. Hickes S. T. P.
Thesauro linguarum Vetr. Septentrionalium
Grammatico Critico, brevi edendo, pla-
nius & accuratius describendum.

Numero 258.

Branchotoms promota.

Numero 266.

De *Polypo* raris magnitudinis in carne re-
perto.

Numero 271.

Menstrua viri cujusdam *Hæmorrhagia*, te-
mere suppressa.

Numero 275.

Vena lactea (post *Clarissimum Listerum*)
Colorata.



E P I T O M E

DISSERTATIONIS SECUNDÆ

D E

ARTHRITIDE ANOMALA, S I V E I N T E R N A.

C A P U T P R I M U M.

De Arthritide Anomala generatim.

Artus sedes Arthritidis regularis. **ARTICULUS I.** Truncas, sive quod reliquum est Corporis, anomalæ; **II.** Arthritidum anomalatum, quæ Regularem nullum præcurrentem habent Paroxysmum, Diagnoses admodum difficiles, **III.** Earum, quæ Regularem Paroxysmum insequuntur, Diagnoses, variis Symptomatum ordinibus sunt eliciende. De anomalæ Arthritidos Τράχη minime constabit, nisi de regulari Arthritide præcurrente prius constiterit. Eodem Puncto incipiunt hi Ordines, at diversos habent exitus. Quo certior Arthritidos Regularis Τράχη, illiusque Materię quo certior, in ea, quæ intus sunt, Translatio; eo certior anomalæ Notitia, **IV.** Internæ partes intelliguntur esse trunci omnes, **V.** Arthritidem inter regularem & anomalam quæ sit Differentia, **VI.** Tam symptomatice, quam primigeniæ Arthritidos Ανωμαλίαν, **VII.** Trunci Partes fere omnes, sed alias aliis frequentius, invadunt, **VIII.** Unde tam Vastum earum Imperium, **IX.** Cause earum enumerantur, **X.** Ut & differentie, **XI.** Medendi Indicatio generalis, ut Arthritide anomala pars affecta citissime, tutissime levetur. Materię Partim e Corpore evocando, partim in artus transferendo. Premiſſis, quæ par est, Evacuationibus, Curatio reliqua per Materię in artus Translationem afficienda est: Quam ejus expellendæ viam Natura maxime aſſectat. Medicamenta huic Intentioni ſervientia ſunt vel interna Arthritidem expellentia; maxime conducunt e ferro preparata, præcipue Martis alcohol, ſive ferrum nutritum; ejus conficiendi Modus; Formule

Πόδευπαρυσμός, Vel Externa, quæ Articulis dolore solitis post internorum usum aliquem applicata, foras Arthritidem invisent. Eorum recensio. Ichore visioso exulante, æger ad tempus aliquod immunis est. Mitior hæc crudelitas, quam per misericordiam methodus XII.

C A P U T II.

De Ventriculi Affectibus Arthriticis.

Nullam in trunco Partem magis infestat Arthritis, quam ventriculum & intestina, **I.** Ut ventriculum ingrediatur ea, duo requiruntur; primum, in sanguine Miasma fugitivum; deinde ventriculus, ei recipiendo accommodatus, **II.** Quibus ille modis sic accommodetur. Ex Causarum diversitate magna, oritur anomaliarum diversitas, **III.** Arthritidis in ventriculo agentis Descriptio, **IV.** Quibus signis innotescat natura ejus Arthritica, **V.** Senes ea plurimum urgentur. Autumno sæpe incipit, **VI.** Ejus cum Arthritide Regulari Comparatio, **VII.** Anomala hic descriptus absoluta, **VIII.** Ut ab Affectu distinguatur hypochondriaco, **IX.** Perinde est, Materia per circuitum, an recta ventriculum intret; & sive fixæ, sive erratice Arthritidos sit Materia. Qui denique huic malo procliviores, **X.** Medendi Indicatio postulat ventriculum allevari Purgatione: & in Artus Arthritidos amotione: Utriusque Purgationis instituenda ratio. Vomitus, si manet post catharsin, Laudano compescenda; **XI.** Quibus auxiliis amoveatur Arthritis; quaque Arte tum expellatur, tum evocetur. Quæ hoc tempore Dieta. Si ventriculum Arthritidis repetat, quid faciendum. Hujus Methodi Utilitas, Prophylaxis, **XII.**

Histo-

- Historia 1. In ventriculum & intestina irruens Arthritis, foras expulsa.
- Hist. 2. Arthritis idonea, Balneo Frigido in ventriculum, & ea, quæ intus sunt repulsa.
- Hist. 3. Recta Arthritis, & in ventriculo anomala, se vicissim excipientes, cum anomala Curatione.
- Hist. 4. Arthritis semel iterumque in ventriculo anomala, toties expulsa.
- Hist. 5. Arthritis iterum ac sæpius in visceribus anomala, toties in artus ablegata, cum anomala Prophylaxi.
- Hist. 6. Ex Plenitudine Arthritis, partim recta, partim in ventriculo anomala, Purgantibus & Podagragogis allevata.
- Hist. 7. Arthritidem, ex Animi perturbatione, anomalam, in Viam ducunt Podagragogis.
- Hist. 8. Arthritis vaga, primo Partibus ex contusione lesis; deinde ventriculo hærens, in Sanguinem resorbetur; in Artus emittitur.
- Hist. 9. Multum interesse, qua tempestate laboret aeger hac anomala; ad eamque removendam, tam externa, quam interna nonnunquam in Corpore validissimo requiri.
- Hist. 10. Cibi Fastidium, & Asthma, ex Arthritide ventriculum infestante; ea expulsa, sublata; ea denuo repulsa, recidiva.
- Hist. 11. Ex Arthritide, cardialgia, & alias Ανοξία, per Catharticum, & humores in artus expellentia, feliciter curata.

C A P U T III.

De Colica Arthritica.

Morbus hic gravis & frequens, una cum intestinis Ventriculum premit, ART. I. Ejus Descriptio, II. Natura Arthritica, III. Diagnos, IV. Cause remotiores externæ, quæ repellunt Arthritidem, V. Internæ, intestinorum Imbecillitas, &c. VI. Ab aliis colicæ Speciebus, ut distinguatur. VII. Ejus Differentiæ, VIII. Prognosis, IX. In curatione, de Phlebotomie, de Vomitu deliberandum; deinde Purgatio instituenda. Tum podagram expellentibus, una cum anticolicis, utendum. Eorum Formula, & sumendorum Methodus. Contra Spasmos intestinorum percinaces Fetus, Liximentum, Enema. Quæ Dietæ ratio optima. Vinum utilissimum, X.

Prophylaxis, XI. Morbus, & sic Hippocrati non incognitus, XII.

- Historia 1. Colica Arthritica male tractata, demum lethalis.
- Hist. 2. Arthritis Vaga, colicam mentita, ad Regularem Arthritida reducitur; cum ejus Prophylaxi.
- Hist. 3. Colica, ex Quietate, Arthritica, in Arthritica regularem versa.
- Hist. 4. Colica multarum Hebdomadum Arthritica, eadem methodo curata.
- Hist. 5. Colica Arthritica, Purgatione, & Πόδαγραγος, sublata.
- Hist. 6. Colica, una cum Doloze Capitis, Arthritica plus semel allevata.
- Hist. 7. Arthritis, Intestina sæpe atrocissime invadens, toties exturbata.
- Hist. 8. Colica Arthritica, cum Paralyfi superveniente.

C A P U T IV.

De Diarrhœa Arthritica.

Miasma Arthriticum nonnunquam intensius, infusum, ea stimulat, donec Ano exterminatur, ART. I. Diarrhœa ista ut dignoscatur esse Arthritida, II. Causam Continentem, & proximam, tantummodo unam habet; initium, & exitus varios. Quæ per se accidit, non raro Salutaris. Quæ Pharinacis excitatur, si modum non excedat, utilis; sin nimis pertinax fuerit, dubia, vel lethalis, III. In priori, Nature relinquendum opus, nisi nimium excurrat diarrhœa; tunc enim Astringentibus, ac Cardiacis eger; Reliquæ vero morbosæ post tempus aliquod Lenientibus exprimendæ. Diarrhœa sistenda, si a Purgantibus fiat: Si a Cruditatibus, Purgatione (altera, vel utraque) opus erit deinde Restringtonibus. In dysenterici periculo, Emulsum. Ad Prophylaxin alcohol Martis, cum aquis ferratis, IV.

- Hist. 1. Diarrhœa crebra, & Salutaris.
- Hist. 2. Diarrhœa, a Cathartico, Arthritica, opportune suppressa.
- Hist. 3. Arthritis, vaga, intestina occupans, solo externorum usu evocata, & artubus infixa.
- Hist. 4. Cruditatibus orta diarrhœa Arthritica, Medicinæ beneficio inhibita.
- Hist. 5. Diarrhœa Arthritica lethalis.
- Hist. 6. Alia ejusmodi.

C A-

CAPUT V.

De Dysenteria Arthritica.

TRansitio, I. Miasma Arthriticum aliquando intestina mordet, exeditque Vascularum exilia, Sanguinem vehementia: Unde dysenteria, II. Morbi hujus Hæres, III. Dependet is a Miasmate predicto in Sanguine renovato, idque constanti norma, IV. Insultus sæpe repetit, Paroxysmis Arthriticis, si spectemus intervalla, respondentes. Nunc in Ulcus in Abscessum degenerat, V. Curatio: Sanguine profluente conquiescat Ager: Cardiaca non nisi caute adhibenda: Lingua Laudano superillinitur. Potioni sit Decoctum album. Dysenteria hæc omnino Critica. Ad eam, si nimia fuerit, inhibendam Adstringentia. Valet interdum Enema. Vitentur acida. Quæ conveniat Dieta. A dysenteria exquisitæ Curatione, quantum hæc differat. In Prophylaxi valent aquæ ferro alteratæ.

Hist. 1. Tenesmus, & dysenteriam inferens Arthritis, omisso Externorum usu letalis.

Hist. 2. Dysenteria Arthritica in Abscessum migrans.

CAPUT VI.

De Abscessu Intestinorum Arthritico.

AD abscessum inferendum Miasma Arthriticum cum primis aptum, I. Ejus formandi ratio, II. Cause ejus binæ, quarum altera dictum Miasma e Sanguine expulsum; altera Intestinorum Imbecillitas. III. Hic abscessus sæpe magnus, in alimentari Fistula, creberrimus, sæpe recidivus. IV. Si in abscessu ani genuino; si in fistulæ superiori parte, rare ante puris Evacuationem sentitur. Dysenteria aliquando ἐπιγίνεται. Quæ, rupta Vomica, conveniat Curatura. Evacuato Pure, Balsamica, Venæ sectio interdum prodest. Aqua ferrata, cum e Ferro preparatis, & restringentibus, &c. ἀπορροήτων, V. Veteres Arthritici Vitii ani Arthriticis affliguntur, VI. Arthritis in Visceribus, a Luciano bello descripta, VII.

Hist. 1. Abscessus Intestinorum Arthriticus auspiciato sanatus, recurrendo letalis.

Hist. 2. Abscessus ani Arthriticus, feliciter curatus.

Hist. 3. De Ani Arthritica, propter Aloeticum, inflammatione, cum instante gangrena.

CAPUT VII.

De Melancholia Arthritica.

TRansitio, I. Morbi hujus Mos, II. Dyspepsia oritur. Ut ab Arthritide melancholica distinguatur. III. Curatio Purgantibus, (sed blandis) & Podagragogis peragenda: Quæ ratio Prophylaxeos, IV.

Hist. 1. Melancholia, propter Arthritidis Paroxysmos minus idoneos.

Hist. 2. Arthritis melancholico Saluti.

Hist. 3. Melancholiam, & Hydrops Arthriticum sanat, artes comparata, Arthritis idonea.

CAPUT VIII.

De Syncope Arthritica.

TRansitio, I. Morbi ratio, II. Therapia requirit Cardiaca, admodum generosa; Frictiones, interdum Vomitionem, tamque Vinum movendam, III.

Hist. 1. Syncope Arthritica, foras abacta Hoste, curata.

Hist. 2. Alia Ejusmodi.

Hist. 3. Arthritide diu ignava & inerti, generata syncope, illius Paroxysmo regulari sublata.

CAPUT IX.

De Calculo Renum Arthritico.

Raro cuiquam unquam Morborum frequentius supervenit calculus, quam Arthritidi: Estque vulgari renum calculo, Arthriticus persimilis, I. Huic male conferunt mala Consoctio, & Lacteorum Ora nimis debescencia, II. Est hic calculus, Lapidis Calcarii cum Sale suo Calcario, vel Oebæ cum Sale Vitriolico, coitio, III. Ejusdem plane Naturæ est cum toso Arthritico, IV. Ut a colica, tam Exquisita, quam Arthritica distinguatur, V. Si Paroxysmus simul Arthriticus erit, nullus hic acidorum fomentum, aut cataplasmatum usus: Præsumt interdum paregorica. Silente vero Arthritide, si quis hoc calculo egrotet, quæ Curatio. Syrupi Preparatio balsamici. In Dysuria calculo superveniente, juvant Opiata cum Diureticis juncta, Dorsû dolor judicium calculi æquivocum.

Hist. 1. Calculo & chiragræ una concurrentibus, facta simul Medicina.

Hist.

Hist. 2. *Adversus calculum Arthriticum Prophylaxis.*

Hist. 3. *Calculus Arthriticus, verrigo Arthritica, & Arthritis regularis se mutuo excipientes.*

C A P U T X.

De Asthmate Arthritico.

UNum hoc Capite tractatum, asthma, nimirum *Ἰσθαδίαις*, I. Quenam hoc Affectu Corpora maxime graventur, II. Causa Continens, Miasma Arthriticum, III. Cause remotiores, IV. Asthmatis hujus, & Arthritidis ratio inter se, naturam illius Arthriticam manifeste probat, V. Est vel siccum, vel humidum: utriusque Mor, VI. Vicius Arthriticum Pituita involutum, Sputazione ejicitur; & quidem commode, VII. In asthma sicco, quodnam morbi subjectum, VIII. Asthma interdum occurrit Arthriticum; sive previo Arthritidis Paroxysmo, IX. Quae in utroque asthma, (tam humido, quam arido) *Πρόγνους*, X. Curatio tollit Impedimentum respirandi, Vene sectione, Purgatione, Clysteribus: Quae sicco propria; quae humido Therapia; Quid in Paroxysmo faciendum; quid in Prophylaxi, XI.

Hist. 1. *Adolescens, ab Arthritide asthmaticus, Empirici Narcotico peremptus.*

Hist. 2. *Asthma sicco, Arthriticum, Vene sectione & Cardiaco sublato.*

Hist. 3. *Arthritidis in Paralyfin, & asthma Metamorphosis.*

Hist. 4. *Arthritis in asthma, & hydropa definens.*

Hist. 5. *Asthma cum Iliade Malorum, Arthritidos defectu Regularis, exortum.*

Hist. 6. *Asthmatis Vultum induens Arthritis.*

Hist. 7. *Ab Arthritide repersa pectoris externi Opressio, Spiritus impeditus.*

C A P U T XI.

De Catarrho, Tussi, & Peripneumonia Arthritica.

Hl Affectus, quoniam ab eadem Causa eundem Locum aggravante fiunt, una hoc Capite tractantur, I. Quenam si creberrime invadunt, quaeque Corpora potissime laceffunt, II. Achores, & catarrhi Puerorum, qui Arthriticis orti sunt Parentibus, haud immerito suspecti, III. Arthritidis in pulmonem *Μεταβασ* omnium certissima. De minus certis quomodo judicandum, IV. Seniores saepe invadunt haec anomaliz, & qua de Causa, V.

Sputi consideratio, VI. Si Affectus Arthritidi Regulari apponuntur, VII. Tussis eorum omnium frequentissima, aliquando Regulari Paroxysmi symptoma praenuncium, VIII. Tussim interdum excipit haemoptoe, IX. Tempus horum Affectuum Autumnus; malum ad eos confert pulmonis Imbecillitas, X. Ex Algore, vel Cardiacis peripneumonia nonnumquam accedit, XI. Medendi Indicatio communis est, ut pulmo quam citissime levetur: Ubi nihil adversatus, prodest Vene sectio; maxime vero in peripneumonia: In plerisque Purgatio, sed peculiari modo facienda: Tura *Πύργυργον*, cum anacathartics juncta. Horum Formulae proferantur. Ad prohibendam Sanguinis colliquationem valet decoctum corticis. His succedunt externa, Arthritidem evellentia; quibus severis, non nisi urgente necessitate, utendum est, XII. Ad prophylaxin, aperiantur in Dorso fonticuli. Aere aperto fruatur Ager; quibus, aliisque hac in re, idoneis, aut praetermissis, aut perperam adhibitis; Ager *ὀδισα* opprimatur, XIII. Peripneumoniz quae Arthriticae Curatio, XIV. Medicina isthaec (alia, quam Clariss. Sydenhami) defenditur, XV.

Hist. 1. *Tussis Arthritica.*

Hist. 2. *Tussis Paroxysmi Arthritici symptoma praenuncium.*

Hist. 3. *Sputatio Arthritica, in extrema etate nimia.*

Hist. 4. *Anacatharsi Arthritica Salutaris.*

Hist. 5. *Peripneumonia Arthritica.*

Hist. 6. *Catarrhus, asthma, tussis Arthritica, per Humorum in artus *Ἀντιστάσις*, & deinde Evacuationem mitigata, sublata.*

C A P U T XII.

De Phthisi Arthritica.

Transitio, I. Morbi hujus *Ἡΐος*, II. Ultimatum ejus Stadium, cum Exquisite phthiseos ultimo concordat. Homines natu proveciores (aliter, quam exquisita phthisis) aggreditur: Febris ejus *Ἡκτική*, plerunque lenta, III. Nunc ex Arthritide repersa, haec phthisis brevi tempore fit; alias non nisi spatio annorum aliquot, IV. Morbi natura patet ex ejus *Τόμας*, V. Curatio postulat, ut pulmo allevetur. In principio valere potest phlebotome, & catharsis, Postea bechicis, & *Πύργυργον* utendum; & quidem consueque, quoad siverit a Febre periculum, & postularerit Arthritidis Expulsio: Si febris exardeat, quid fieri oporteat. Hisce dies *ἐλκ* quos

quot adhibitis, extra admoveantur Arthritidem educentia. Opiata, & Incrassantia merito suspecta, VI. Prophylaxeos ergo, maxime valent aquæ serratae, & Aer, præcipue Maritimus. Profunt Artuum Fricationes, Fonticuli, Sorbitio, Chocokata, Pectoralia, obsunt Gatarrihi, VII. Galenus mentionem facit hujusmodi Πύματα (scil. Arthritici) in pulmonibus, Ægros sepe suffocantis, VIII. Hist. 1. Tussis Arthritica letalis. Hist. 2. Phthisis Arthritica, Medicamentis Calidioribus sepe levata. Hist. 3. Phthisis Arthritica, incipiens, curata.

C A P U T XIII.

De Angina Arthritica.

Feblicula ad expellendum Miasma Arthriticum, in Sanguine excitata, nonnunquam parit anginam, I. Naturæ ejus Arthritica, ut detegatur, II. Quæ illa Corpora, & quas ob oporietur invadat usitatissime, III. Diagnostis, IV. cum angina exquisita, ejus convenientia, V. Curatio vult, ut Fauces, quamprimum allevantur, & quidem Methodo privata; Prodest interdum laringotome, VI. Uti nonnunquam acida; Externa Arthritidem educentia, VII. Hist. 1. Arthritis fauces & artus simul semelque occupans. Hist. 2. Anginæ Arthriticæ, ad Abscessum tendentis, in Arthritida regularem Metamorphosis. Hist. 3. Materia Arthritica partim abscessu anginoso, partim per articulares glandulas expressa. Hist. 4. Arthritis primum fauces, deinde articulos invadens. Hist. 5. Anginæ Arthriticæ auspicio supervenit Arthritis regularis. Hist. 6. Angina & abscessus Arthriticus cum Arthritide insequenti, recta idonea. Hist. 7. De Arthritide multos annos Erratica, tunc anginam iterum, & sæpius simulante; postremo regulari, Fixa.

C A P U T XIV.

De Capitis Dolo, & Vertigine Arthritica,

Obscuri sunt in capite Partium usus, I. Quos sæpius infestet dolor hic Arthriticus, II. Ejus Mos; Signum est aliquando Paroxysmi Regularis prænuncium: Nisale fuerit, etsi in capite Materia remanserit, Sydenham Opera Med. Tom. II.

apoplexiam introducit; III. Ut de ejus prædicto constet; dolor hic interdum lenis, interdum pene ad Delirium usque gravis, IV. Paroxysmum aliquando Perfectum, aliquando intercisum excipit, V. Vertiginis Arthriticæ Comes fere individua, & tanquam Soror gemina est, VI. Vertiginis Arthriticæ subiectum est cogitandi Officina: cogitationis ratio probabilis; Videtur esse quadam Πάρεσησις, VII. In vertigine Spirituum fluctuationes interturbantur, VIII. Spirituum Είληψος a Cl. Villisio propositus, in dubium vocatur. Rerum Externarum Imagines in Capite vere, ut & in vertigine falsæ, per iis Rebus dissimilia fieri possunt, IX. Perturbantur Spiritus, vel ab alieno, a Sanguine accepto, hæc in penetrabilia se insinuante; vel Externo aliquo Tubulos coarctante, X. Vertigo hæc in plerisque, cum dolore capitis Arthritico concordat: Aut in paroxysmum regularem: aut in apoplexiam migrare solet. Miasma Arthriticum epilepsiæ generanda parum idoneum, XI. Horum Affectuum Curatio communis; tum etiam singuli propria. Balsamum Cædæ cephalicum Doctoris Vvaterhouse: Emulsa, Narcotica, Oxyrrhoidina, &c. quæ Materiam capiti infigat, omnino fugienda. Prophylaxis, XII.

Hist. 1. Ab gnava Arthritide vertigo, Sanguinis missione & Alvi ductione victa. Hist. 2. Vertigo Arthritica, Purgatione in podagram mutata. Hist. 3. Vertiginem, & in capite dolorem faciens Arthritis, idque usitate, Venæ sectione & purgatione toties in articulos acta. Hist. 4. Capitis dolor, & vertigo Arthritica sæpe revertentes, simili Methodo curati. Hist. 5. Cephalalgia Arthritica, Phlebotome & Spiritu Volatili in podagram versa. Hist. 6. Miasma Arthriticum in caput immisum, vertiginem & dolorem inferens, eo revulsum, & in artus amandatum. Hist. 7. Cephalæa, & vertigo Arthritica, Medicinæ pari, cum Phœnigmi, sublata. Hist. 8. Vertiginis Arthriticæ cum Spirituum depressione gravi, Curatio. Hist. 9. Ex Arthritide vertiginosus, Viâ nimis tenui depressus, interemptus.

C A P U T XV.

De Apoplexia Arthritica.

Transitio, I. Apoplexiæ hujus Mos, & Medicina propria, II. Morbi istius explicatio, III. Morbi ex Symptomatum Ordine

A a

dine

dine investigatio, IV. Subiectum Cerebri Cortex, V. Causa continens, Vasculorum in cerebri cortice dilatatio; vel lentor Sanguinis; vel Miasma tubulos subintrans, spiritusque cominus aggressum, VI. Cause remotæ, VII. Ex uno Miasmate pendet Arthritico, VIII. Prognosis, IX. Curatio propria. X. Prophylaxis, XI. Apoplexiæ, a Causa Arthritica, symptomaticæ Curatio, XII.

Hist. 1. Vertigo Arthritica, cum imminente apoplexia.

Hist. 2. Arthritidi percussæ superveniens apoplexia.

Hist. 3. Somnus, ab Opiato profundus; ipsa propemodum Mors.

Hist. 4. Arthritis, ex acidorum usu gravior, in apoplexiam desinens symptomaticam.

Hist. 5. Apoplexia Arthritica feliciter curata.

Hist. 6. Apoplexiæ ut occurratur Arthriticæ.

C A P U T XVI.

De Paralyfi Arthritica.

Miasma nunc in medullarum tubulis sistit; unde apoplexia idiopathica, I. Sæpe ad tubulos nervinos propellitur; unde paralyfis Arthritica. II. Fieri potest, vel a Materia viscida, vel a virulenta, III. Cause ejus remotiores, IV. Morbi eîdos, pro ratione Partis affectæ, varium, V. Ejus Differentia, VI. Typus habet aliquando paralyfis hysterica, VII. Prognosis, Therapia peculiaris, IX. Prophylaxis, X.

Hist. 1. Cephalalgia Arthritica, cum paralyfi incipiente, curata.

Hist. 2. Hemiplegia Arthritica simili modo curata.

Hist. 3. Paralyfis Arthritica, cum spasmo oris cynico, lethalis.

Hist. 4. Colica Arthritica in paralyfin degenerans Arthriticam.

Hist. 5. A Materia colicæ Biliosa, primum Arthritis & deinde paralyfis.

Hist. 6. Ob Arthritidem, in nervos inversam, Aërola.

Hist. 7. Ex Morsu Canis, Arthritidis recte Silentium, Stupiditas, paralyfis, Arthritide denuo facta Regulari, curata.

Hist. 8. Convulsiones, ex Arthritide inversa, universales arte Medica sublata.

De Doloribus in Corpore vagis, fixis; de Ophthalmia; de Erysipelate, & Acholibus Arthriticis.

Transitio, I. Horum quis Dolorum Mos: Rheumatismi nomine vulgo delitescunt vagi. Fixi nunc quasi Nephritici; nunc Oculos, Faciem, Aures occupat Miasma, & Ophthalmiam quandam, Erysipelas, Achores inducit. Achores Arthritici vices aliquando tenent Arthritidos summe Regularis, II. Affectus hi, periculo magnam partem expertes, ad regularem Arthritida propius accedunt. A Trunci Ambitu rarius, quam ab Artubus, ad ea, quæ intus sunt, transfertur Arthritis, III. Harum Anomalarum Medicina communis, propria. Nullus ob Achores excitandus Articularis Dolor: quod de una hæc anomala proponendum, IV.

Historia. Achores, ab Arthritide, in alio Corpore generati.

C A P U T XVIII.

De Epiphora, & Doloze Dentium Arthritico.

De dolore dentium exquisito scripsit Strobelbergerus, I. Ejus Arthritici Mos & Natura, II. Quæ istorum Affectuum Medicina communis; quæ eorum singulo propria, III. Historia.

Dentium Dolor Arthriticus.

C A P U T XIX.

Corollaria continet, cum Epilogo.

Dissertationis summa, I. Hujusmodi Medicine quæ necessitas; Arthritis raro occidit regularis, raro nisi prius degenerans in anomalam: ita vero creberrime, II. Siquis hæc anomalias, Partium affectarum morbos esse Vernaculos affirmaverit, nostram hæc de re Doctrinam minime convellat, III. Aliæ sunt Arthriticæ minoris Ordinis anomalix, propter obscuritatem prætermisse, IV. V. Epilogus.

**M E C H A N I C A
M O R B O R U M,
ET MEDICAMENTORUM,**

A U C T O R E

JOANNE - BAPTISTA MAZINO

B R I X I A N O,

IN GYMNASIO PATAVINO MEDICINÆ PRACTICÆ PROFESSORE.

Quibus adjecta sunt ANTONII CÆLESTINI COCCHII Epistola Physico-Medica, & BARTHOLOMÆI BOSCHETTI de Salivatione Mercuriali Dissertatio Physico-Medico-Mechanica.

Universum motus est, & aliud præter motum nihil; motus vero species dua, & multitudine quidem utraque infinita: potentia autem altera in agendo, altera in patiando versatur, ex harum congressu, compulsuque mutuo effectus eveniunt numero infiniti. Plato in Thæteteto vel de Scientia.

Quæ moventur, aut natura moveri omnia, aut vi, aut voluntate. Cicero de natura Deorum Lib. 2.

MARIÆ VIRGINI DEIPARÆ

JOANNES BAPTISTA MAZINUS

D. D. D.



Iu muleumque mihi in votis fuit *MARIA VIRGO DEIPARA* Opusculum aliquod, licet exigua, seu nulla verius arte politum tibi donare, ut si illud minus pretio, tui certe nominis splendore e tenebris vindicarem. At licet ad hoc præsidium comparandum, & ad hanc grati animi significationem præstandam voluntas studiosa compelleret: dignitas tua, & amplitudo, & majestas terris, & Cælo verenda retrahebat, quasque dabat necessitas vires, timor adimebat; serviendum tamen necessitati putavi, tuique nominis aliqua saltem ex parte augendam gloriam, quo nihil utilius, nihil jucundius, nihilque superis omnibus charius agi potest: His de causis Opus hoc meum de *Mechanica Morborum* desumpta e Motu sanguinis, tibi dedico, consecroque, vel potius adfero, quod tuum est; cum revera, quodcumque sit, tibi acceptum referam; tu enim Divina tua ope mihi scribenti semper adfuisti, tu lucem ingenio, tu intelligendi vim menti addidisti, omnibus illis difficultatibus ademptis, quæ ab hoc studio me abducere potuissent. Tuo fretus patrocinio (non enim video, cur etiam tecum loquens, non ea commemorare beneficia possim, quæ a te accepi, cum præsertim memores, gratosque homines esse velis, sintque fortasse hæc quæ scripsi lecturi nonnulli, quorum animos ad Præceptorum meorum memoriam impense studeo revocare) tuo inquam fretus patrocinio me ad Patavinam Academiam totius Italiæ nobilissimam contuli, ut a præstantissimis Magistris ad Medicinam faciendam instituerer; Atque adeo tua mihi favit clementia, ut Celeberrimos illius Lycei repererim Magistros *Dominicum Gulielminum*, & *Antonium Vallisnerium*, modo *Cesaris Archiatrum*, quorum quidem præstantia Mathematicis, Philosophicis, & Medicis, quæ ediderunt, operibus longe lateque perspecta est. In Patriam deinde reversus ad Clarissimum Virum, *Cyprianum Benaleam* Sanctissimæ Cassinensis Congregationis Monachum accessi, ab eodemque maximarum rerum scientia ornato Geometriæ principia assiduo labore didici, sed tanto viro diu mihi frui non licuit, illum enim sibi Patavinum Gymnasium tanquam jure suo poposcit, Legum Interpretem futurum: tanto hoc Præceptore, & tam subito destitutus, mœrens quærebam, quomodo incepta Geometriæ studia utiliter prosequi possem, cum tu tandem *AUGUSTISSIMA COELORUM REGINA* intra illud, quod tuum est, tuoque a nomine nuncupatur Gratianum Collegium, Discipulo Magistram, & Geometriæ

A. um.

Alumno dedisti Præceptorem Geometram *Julianum* scilicet *Bornatum* doctissimum, integerrimumque ex præclarissima *Societate Jesu* Presbyterum. Is ex Nobili *Bornatorum* familia natus omni prorsus literarum scientia fuit ornatus: nam & excellens Philosophiæ & Theologiæ Magister, & bonus Poeta, in obscuris vero & reconditis, & multiplicibus, subtilibusque Mathematicis disciplinis ita perfectus exitit, ut fere nunquam ei scientiæ studuisse videretur, quin quod voluerit consequutus sit: Modestia præterea, animi demissio, vitæ probitas in illo fuerunt semper, tum a suis, tum a cunctis nostræ Civitatis ordinibus, tum a me præsertim, qui familiariter cum illo agebam, perspecta, & cognita. Is per aliquot annos me Geometriæ præceptis imbuir, & diutius etiam imbuisset, nisi repentinò, bonisque omnibus acerbissimo fato functus sui desiderium ægerrime ferendum reliquisset; quod si ingenium mihi fuisset tanto Præceptore dignum, & in id studium incumbendi orium quotidianæ Medicæ vitæ rationes dedis-
sent, & tuis melius ulus fuisset *VIRGO* muneribus, magis præceptorum gloriam amplificavissem. Pudet me quidem, *VIRGO SANCTISSIMA*, tot a te auctum beneficiis, negligenter adeo mihi consuluisse, ut ingrati animi notam nullam ex parte valeam evitare. Cum igitur nullus alius restet tibi gratiæ referendæ modus, quam ea tibi reddere, quæ tua sunt; opusculum hoc excipe, quod pluribus nominibus tibi deberi intelligo, meque omnino felicem esse putabo, si & munus, & donantem non contempnas; hoc unum te etiam, atque etiam rogo, ut impofterum studia, animum, meque totum dirigas, ut tibi semper, & Cœlo viam; in hoc enim uno vera invenitur felicitas; cumque me jam ex magna hujus maris jactatione beatam terram attingentem aspicias, illud oro, obtestorque, *MARIA VIRGO DEIPARA*, ut & tempestatum vim superare, & prædonum impetus frangere pte possim.



BENE.

BENEVOLIS MEDICINÆ

T Y R O N I B U S.

191



Um sapientissimo hoc Sæculo mira legerim a Celeberrimis Viris elaborata, quæ Naturæ opera Geometricæ & Mechanice agerent, cumque Medicam praxin agens sæpissime observaverim plurima morborum phænomena a Sanguinis motu cruta, scienter explicari non posse, nisi Mechanicæ leges operam & manum traderent; propterea studui melioribus, ut puto, conjecturis Mechanicas plurimum morborum causas a sanguinis motu venari: præcipuum itaque hujus operis officium est, multorum morborum causas quærere tantummodo a motu sanguinis, imposterum daturus operam, ut reliquæ etiam morborum species a Mechanico solidorum motu quoad potero eruantur; Ibi tamen monendum est, me non ubique morborum causas Mechanicis legibus acturum, cum non ubique apte possint convenire; hæc siquidem non coëcte vocandæ sunt, sed solum, quas naturalis ratio loci commode postulaverit; Quamobrem laborem hunc, quamvis laconio sermone exaratum tres in partes, claritatis gratia dividendum; in quarum prima, præcipuos Massæ Sanguineæ motus indicandos aggredior; in secunda pulmonum morbos; in tertia Ægrotudines extra regionem pectoris a vitiato motu sanguinis orituras raptim ostendo: Hac Methodo sperandum credidi, me, si non vera assequi possem, saltem in tam arduis Naturæ phænomenis probabiliora affecuturum: Interim Tyrones benevoli hæc quamvis plana, & Tyronibus accommodata, patienti animo excipite; quærenda enim Veritas est.

ME.

MECHANICES

MORBORUM

PARS PRIMA,

DESUMPTA A MOTU SANGUINIS.

DISSERTATIO PRIMA.



Ulgare, ac tritum adagium est apud Philosophos, quod *ignorato motu ignorari naturam necesse est*: propterea cum mechanicam morborum Theoriam, quantum possibile est, eruer

a natura decreverim, consultum fuit primo, hanc a sanguinis motu venari: Etenim cum massa sanguinis quorumcunque humorum origo sit, ac basis, ex qua actiones omnes emergunt, sive sanæ, sive ægræ, procul dubio ex aqua, aut mala ratione motus massæ sanguinis, quoscunque pariter humores, aut æquo, aut iniquo motu moveri necesse est: junctis itaque motuum viribus, qua ratione natura aut pati, aut feliciter sustineri debeat, juvat inquirere; quare ibi visa est mihi congruere Platonis sententia in Timæo. *Oportet mentis, & scientiæ amatorem principales sapientis naturæ causas querere, eas quæ necessario ab aliis quidem moventur, alia vero movent.* De universali itaque motu massæ sanguinis per arterias, ac venas acturus, quantum rationalis conjectura docuerat, necessarium putavi sedulo studium agere, ut primo intestinus particularum, seu elementorum sanguinis motus inquiratur; hoc enim cognito quid boni, quidve mali ferendum sit, quoties, aut naturalis motus, aut præternaturalis extiterit, licebit facile invenire; intento juvabit sanguinei fluidi analysis; cum autem injuria tentaverint Philosophi texturam sanguinis vocare ad trutinam, adhuc per vasa circulantis, oportuit celeberrimum Levvenhockium, sangui-

nem mox a vena extractum curioso microscopio rimari. Sanguinis itaque duas in partes separari visus est, quarum una *fluida* est, *concreta* altera. Pars concreta duplici videtur parte componi, quarum una albescentis est, aut subflava, quæ ex fibris invicem complicatis retis in modum stringitur, & reticulare sanguinis crassamentum constituit, hoc ipsum observarunt celeberrimi viri Boileus, Bohnius, & Malpigijs: ex fibris autem reticulariter positissimis efformantur areæ, seu interstitia, per quæ serum sanguinis, & globuli rubri decurrunt. Altera pars concreti sanguinis rubicunda est, quæ tota ex minimis globulis determinato ordine commixtis componitur; hujusmodi autem rubentes globuli ex aliis globulis coagmentantur invicem superstratis, qui docente Levvenhockio a propria figura plano-ovales appellantur; isti natura sua albiculantes sunt, & diaphani; cæterum si plures invicem superponantur, quorum numerus globulorum superpositus senarius sit, tunc purpureum colorem figurant; si vero plures supra senarium numerum accumulentur globuli plano ovales, tunc ruboris saturitas, & color suboscuro exoritur; ex his planum est invenire, cur in aliquibus canceris, & nonnullis piscibus sanguis albescat; etenim cum in hisce numerus globulorum plano-ovalium superstratus a senario numero multum deficiat, opus est, colorem non purpureum, sed albicantem figurari.

2. Altera pars sanguinis, quæ *fluida* est, serum appellatur, quod, & ipsum duas in partes dividitur: una quidem concretescibilis est, & serum concretescibile a Medicis appellatur, eo quia igni expositum post integram sere evaporationem relinquit gelati-

no-

nosam substantiam, quæ continuato calore in ossas, & consimiles lamellas densatur. Hujusmodi autem seri concrecibilis portio juxta nonnullos non distinguenda videtur a fibra reticulari crassamenti sanguinei super-expositi; alia vero pars fluida est tenuissima aque simillima, quotiescunque naturali jure se habeat, aliquando vero turbida est, aliquando flavescent, cum a naturali statu recesserit, aliquando autem lactescens, quoties chylo nondum subjugato misceatur. Serum hoc sanguinis, observante Malpighio; si supra vitrum exsicceetur, donat in ejus superficie, & vitriolica, & aluminosa, & tartarea, & nitrosa; & salso-muriatica, aliorumque generum satia; præterea ex Boilei experimentis judicandum putat doctissimus Gulielmus partem serosam, seu fluidam esse ad partem consistentem sanguinis in ratione tripla, seu ut 3. ad 1. Ulterius ab instituto deficerem, si negligenter omitterem, globulos rubros elaterio donatos esse, observante enim Levvenhockio, sanguinis globuli transeuntes per quaslibet locorum angustias pressionem patiuntur, ut figuram prorsus mutent, ovales enim fiunt, & cuicunque pressioni se se eleganter accommodant, tandiu postea pristina figura restituantur, quoties separatis angustis ampliori in spatio devolvantur. Cum itaque animal aere, & chylo cujuscunque generis corpora salina, sulfurea, terrea, aquea &c. recondantur, jute oprimo credendum est, massam sanguinis ex aere, & chylo compositam, ab aere, & cibo cujuscunque generis corpora mutuari; hæc autem suas habent moles, & figuras, & unicuique concessa est peculiaris ratio motus, & situs, juxta naturalem molis, figuræ, & gravitatis specificæ exigentiam (1).

3. Hæc omnia Philosophis, & Medicis communia sunt, & proit a Boilei experimentis confirmata tuto omnes exceperunt; Verum cum particula sanguinis tribus præcipue motibus naturaliter affici mihi semper visa sunt, quibus animalis æconomia continuo, & mirum in modum volvitur, & sustinetur; quorum primus *motus pressionis est, seu impulsus*, secundus *separationis*, tertius vero *assimilationis*; propterea præcipua horum motuum, tum naturalia, cum præternaturalia phænomena inquirere prius necesse est; itaque quod ad *pressionis*, Sydenham Opera Med. Tom. II.

seu impulsus motum pertinet, quem in canalibus sanguiferis alte sustinet massa sanguinis, tria conspirant; *motus nempe cordis, arteriarum systoles seu contractio*; & *vis elastica elasticarum particularum massæ ejusdem*. Itaque apertum est omnibus, cor a fibris varii generis undeque circumseptum quacunque sistole urgere sanguinem in arterias, qua alternatim recurrente impulsus sanguinis antecedentem premit homologo imperio, dummodo omnia naturaliter se habeant; quare successiva actione sanguinis impellentis, & reactione ejusdem impulsu componitur quædam ratio motus, quæ universa elementa sanguinis quaquaversus premeas arterias conice euntes extrorsum aperit. Licet vero momentum cordis assequi posse non solum arduum sit, verum etiam pene impossibile, ut inferius (n. 15.) patebit; nihilominus certum est fore validissimum: etenim cor non solum sanguinis quantitatem certa cum velocitate debet expellere, verum etiam separare debet resistentiam, quam sanguis præcedens per omnes arterias fluens secuturo opponit; ulterius adest resistentia attritus massularum sanguinis cum internis parietibus, curvaturis, & angulosis inclinationibus vasorum, & resistentia tenacitatis massæ sanguinis, ex quibus omnibus necessario componitur ea ratio reactionis contra vim cordis, quæ nisi a validissima actione, aut validissimo momento cordis vincenda est. Impellitur itaque sanguis a validissimo motu cordis, & impulsus sanguis tot resistentias inveniens elasticas arterias necessario extrorsum urget, quoties vero arteriarum dilatatio eo devenerit, ut dilatari naturaliter arteriæ ultro non possint, cogentur lege elasticorum corporum ea ratione contrahi, qua antea fuerant dilatata; post dilatationem itaque contrahuntur arteriæ, a qua contractione novam sustinet pressionem massa sanguinis, urgenturque versus axem canalis arteriosi contenta elementa massæ ejusdem: ibi tamen animadvertendum est, quod sicuti majores arteriæ cordi viciniore, tum ratione majoris impetus, quem a proximo corde excipiunt, cum ratione majoris quantitatis sanguinis, quam cæteris paribus majores arteriarum sectiones amplectuntur, quacunque systole majori momento dilatantur: ita vicissim majori quoque momento proportionaliter

B b con-

(1) Vide Levvenhockium, & Gulielmum de natura & constitutione sanguinis.

contrahuntur; quare in hisce majoribus præcipue arteriarum sectionibus probabile putaverim, massam sanguinis non solum ex glutinosis, ac viscidis, verum etiam ex tenuibus, mobilibusque particulis permixtam a contractionis momento sanguinis massulam versus centrum canalium deferri quidem debuisse, hac tamen servata lege, ut tenuiores particule facilius, ac citius, glutinosæ vero, ac viscidæ difficilior, ac tardius versus axem deferantur. Verum in minoribus canalium sectionibus, & præcipue in minimis arteriis a corde remotioribus, in quibus actiones, & reactiones facilius accedere possunt ad rationem æqualitatis, & elastica vibratio, seu contractio adeo infirma est, ac tenuis, ut fere nulla videatur, aliter res agi videtur; etenim cum his impetus a corde exceptus multum imminutus sit, & pauca adsit quantitas sanguinis, glutinosæ propterea, ac viscidæ particule ob elasticæ contractionis inertiam a vasorum parietibus difficulter recedunt: quin imo his facillime adherent: fluentibus interea feliciori motu subtilioribus particulis per lineam axis. Quamobrem facile est credere in majoribus præcipue arteriis cordi proximioribus elementa sanguinis a majori vibratione earundem magis magisque pressionem, ac impulsu pati debuisse. Ulterius impulsus, sive impetus promoventur a momento particularum elasticarum, contentarum in massa sanguinis; etenim cum in hac præter globulos plano ovals ad sint corpora aerea, & alterius fortasse generis, quæ elasticis viribus prædita sint, cumque elastica corpora ad eam figuram se se restituant, a qua prius vi pressionis recesserant; certe solidis durisque particulis permixta tantum dilatari quamproxime debent, quantum a massularum durarum momento pressionem exceperint; deinde cum dura, & solida corpora quocunque loco tangere, ac premere possint elastici corporis superficiem, quaquaversus quoque elastica corpora compressa urgebunt, impellentque solida, quapropter duræ, & elasticæ particule invicem commixtæ prement, & prementur, urgebunt, & urgebuntur, sicque tota massa sanguinis a motu cordis; a contractione arteriarum, & ab elastica vibratione particularum sanguinis quaquaversus pressa mutis impulsibus continuo erit in arteriis agitata, ut quoque circulationis motu volvetur.

4. Hujusmodi motus pressionis valde necessarius est in arteriis, ut debita fiat cor-

porum contentorum in massa sanguinis resolutio; enim vero cum sanguis sit fluidum viscidum ex coherentibus solidis, fluidisque particulis in data (n. z.) ratione compositum, certe filamenta sanguinis, cum per minimas canalium sectiones usui naturæ trajici facile debeant, reducenda procul dubio prius erunt sub dimensionibus quodammodo infinite parvis: huic autem operi apprimè conducit iste pressionis motus; etenim massulæ corporum, aut similium, aut dissimilium undequaque impulsæ a se invicem paulatim sejungi conantur; rumpuntur enim continuo motu pressionis nexus earundem inter se, & quæ primo compositæ fuerant, minus compositas paulatim fieri necesse est; verum cum massulæ qualibet magis magisque minuantur, quam earundem superficies, & massulæ cæteris paribus sint ut pondera, colligi potest, hujusmodi solida sub minori mole reddita, & sub minori pondere a sero sanguinis circumambiente ob majores massularum relictas superficies facilius sustineri; deinde motus pressionis coalescibilibus seri filamentis utilissimus est; motu enim pressionis atterantur, & scinduntur filamenta sanguinis, minusque resistentia fiunt, ut, a cæteris particulis hinc inde agitatæ facilius trajiciantur, unde serum fluidius redditum opportuna mixtioni suspensorum corporum apte conducit; licet autem fluidiori in sero suspensa invicem misceantur, nihilominus hujusmodi mixtio non prohibet, quin data loci opportunitate a se invicem separari facilius possint, etenim solida, & viscida corpora taliter resoluta sub minori mole, ac pondere, quaquaversus prompta ad motum facile fiunt; quamobrem taliter disposita corpora non solum separationi exequenda facilius accommodantur; verum etiam una cum sero per angustissima, tum vasculorum, cum glandularum foraminula permeare liberius, commodiusque possunt; Porro talis resolutionis opere elementa sanguinis una cum sero ad quandam æquilibrii rationem acquirendam disposita fiunt. Verum cum tota naturalis æquilibrii proportio in proportionali numero, pondere, mole, ac motu corporum cum debita pariter seri quantitate, in qua libere innatare debent, experimentis ac rationibus niti videatur; ideo præstat ibi primo animadvertere, quod si sulfureæ, salinæ, aut alterius generis seu consistens portio sanguinis fuerit ad partem serosam, seu fluidam in ratione 1. ad 3. ut Illustriss. Boy-

lous.

lens, alique celebres Philosophi toties in naturali massa sanguinis experti sunt; tunc facile emerget unum naturalis æquilibræ attributum, nempe debitus corporum numerus; tali enim numero partium determinarum sustinetur non solum debita contiguitas corporum mobilium in massa sanguinis, verum etiam specificum, & naturale pondus eorundem, quo corpora quælibet debita seri quantitate velut in statera æquilibrantur: moventur siquidem undequaque massæ omnes, sed tali lege, ac proportionē contactus, mixtionis, ac ponderis cum aqueis particulis, ut aquea portio ad solidas, seu consistentes particulas sit semper in ratione tripla, aut quasi tripla; ita ut remaneat quantitatē aquæ ad quantitates solidas, aut consistentes hæc determinata ratio majoris inæqualitatis, quæ est inter 3. ad 1. Non solum autem necessaria est huiusmodi ratio inter fluida, & solida, seu consistentia corpora; verum etiam necessaria proportio esse debet inter solida corpora unius generis, & solida corpora alterius, videlicet inter salina, & sulfurea, & alterius cujuscunque generis inter se; quæ ratio licet determinari nullatenus possit, nihilominus certum est tantorum corporum proportionem inter se admitti debuisse, ut natura motus suos æquabiliter regat; sic enim inter aggregatum horum corporum fieri quodammodo proportionis æquilibrum, quo in statu naturali serum cum aliis corporibus, & hæc cum sero, & inter semetipsa solida, & consistentia corpora determinatam corporum, & momentorum numero, pondere, & mensura proportionem sustineant. Cæterum si corpora sulfurea, salina, & alterius generis tali numero excedant, ut supra serum expositam proportionem superent, tunc huiusmodi corpora serum undequaque tali amplexu nimis stringent, ut tandem quodammodo obruant: sic massa sanguinis excedenti partium numero densior facta, & cum densitates sint ponderibus proportionales, gravior quoque reddita, a debito momentorum æquilibrum recedet; tali propterea vitio correptus sanguis tardiori pede fluat, & consequenter facile deponet corpora, obstructions in glandulis, & finitimis vasorum osculis inflammationes paratura. Ulterius cor alte laborat sanguinem graviores expulsum, & muscoli inerti motu peristaltico progredientes tractu temporis innumera mala parturient; Ita etiam si huiusmodi corpora non

solum numero, verum etiam dissimili mole, ac figura peccaverint, nec per excretorias glandulas, quantum par est, a massa sanguinis separentur, tunc cum ista ad cætera corpora numero, mole, & figura naturaliter se habentia maiorem rationem habeant, necessario ex tot dissimilibus corporum momentis auferetur debita æquilibræ ratio, quæ justam sanguinis temperiem, & debitum motum constituit, unde febriles motus procul dubio emergent, chronici, ut plurimum, & intermittentes; Ita gravius fortasse vitium aliquando fuerit, si solida corpora salina præcipue numero minora fuerint, quam par est; tunc enim massa sanguinis levior, mobiliorque facta, magisque prompta ad motum, & supra modum exaltato ulterius sulfure ruet in motus citissimos, nullaque lege mota continuas febres erit allatura.

5. Quamobrem necessaria supramodum est *Proportio motus corporum*; etenim corpora contenta in sero sanguineo tali ratione, ac lege moveri debent, ut cæteris paribus motus corporum in uno spatio vasorum sit proportionalis motui corporum in alio spatio eorundem, & sic successive; quare quilibet motus corporum in uno spatio vasorum similem rationem habere debet ad quemlibet motum corporum in alio spatio, ut omnes motus corporum simul sumpti in uno spatio vasorum sint homologi omnibus motibus corporum simul sumptis in alio spatio eorundem; sicque cum particula aquæ corporibus quibuscunque circumpositæ sint, hæc proportionali impetu impulsæ proportionalibus quoque momentis movebuntur, ut tota massa sanguinis cæteris paribus homologo semper pede decurrat æquo naturæ beneficio. Ulterius ut habeatur proportionalis ratio motuum, necesse est corpora specificè leviora, eo quantitate, ac numero gravioribus minora esse, quo leviora cæteris paribus velociora sunt, magisque ad motum disposita; sic enim data tali ratione reciproca quantitatis corporum cum eorundem velocitatibus singulorum corporum momenta, ac vires debita ratione æquabuntur, quibus momentis massa sanguinis æquilibrata æquabiliter motus suos exercebit cum actionibus inter se æquabiliter proportionalibus; Verum si aliqua corpora quantitate, & motu maiorem rationem habeant ad alia, manifestum est, quam facile momentorum rationes inter se dissentire debeant, Quamobrem massa sanguinis multiplicibus momen-

torum legibus inæqualiter agitata febriliter moveri conabitur. Serum quoque non leve vitium affert, quotiescunque aut deficiat, aut excedat, sero enim deficiente, cætera corpora forti nimis contactu, ac amplexu inter se stringuntur, ut motus suos exercere libere quaquaversus inepta sint, adepto ex majori corporum contactu, majori pariter momento densitatis, & gravitatis; si vero excedat, contenta corpora majoribus in spatiis natant, nec eam legem opportuni contactus inter se servare apta sunt, quæ naturali fluido sanguineo necessaria est; laxata propterea textura sanguinis in excedenti feri copia salina corpora sub minimis dimensionibus reddita nimium exolvuntur, & sulfurea in statu inertiae reddita inepte pierescunt innumeris naturæ periculis; languescunt enim fluida omnia, & solida quolibet enervantur: super omnia lædunt naturalem proportionem motus sanguinis sulfureæ massule, quoties harum excessu momentum sulfuris momento feri majus fuerit; tunc enim sulfureæ massula sero copulatæ compositum efficiunt majori superficie circumscriptum, quam serum ipsis corporibus æquiponderans, & consequenter ex hydrostaticis tale compositum levius fiet, quam par est, quare serum & sulfur motibus facile præternaturalibus adeo movebuntur, ut communicata cæteris quoque corporibus agitatione, tota quanta, est massa sanguinis violento motu volvatur: sovet ultro impetum vis elastica globulorum plano-ovalium, quæ licet determinari vere non possit, tamen magnam esse certum est; etenim si in hac re liceat philosophari, cum calor præternaturalis in sanguine fiat utplurimum a causis quibuscunque externis particulas præcipue sulfureas sanguinis agitantibus, (1) cumque calor consistat in concitatore particularum motu, utque calor, ut impressiones particularum corporis calidi in quopiam objecto corpore cæterem excipiente; impressiones vero sint in ratione composita ex duplicata celoritate, & simpla densitate particularum cætidarum, procudubio etiam calidæ sanguinis particula concitatiore motu agitatæ ab externa causa probabiliter accedent ad talem rationem compositam ex duplicata velocitate, & simpla densitate earundem; quamobrem calidæ præcipue sulfurum mas-

sula tali ratione urgebunt objectas, & sibi proximas globulorum plano-ovalium particulas: cum autem istæ elaterio ulterius prædita sint, vi cuius compressæ conatus suos exercent, ut ad majus spatium & ipsæ extendantur; ideo clarum est, quantum extendi, & ad quanto majora volumina dilatari debeant plano-ovales particulae, quoties a sanguinis particulis alte agitatæ, & præcipue a calidis sulfurum massulis in exposita ratione urgeantur.

6. Ex hisce vitis ardentibus & acutæ febres supra modum sine frigore, utplurimum sobolescent, tandiu duraturæ, quandiu sulfureæ particulae per loca excretoria separatæ fuerint, aut transpirationis opere alio fuerint evolatæ, usque dum remaneat ea tantummodo sulfuris quantitas, quæ cæteris paribus juxta naturale æquilibrium primo fuerat proportionalis. Ex his animadvertere facile est, quod si principia, quæ primo vitiose exaltantur, non sint sulfurea, sed salina, aut alterius generis, quorum naturalis dispositio ad motum minor sit, quam velocitas particularum sulfuris; tunc cum salina corpora cæteris paribus sulfureis graviora sint, figuris, quibus circumscribuntur nitrosis præcipue, aut nitro analogis membranas cujuscunque generis taliter irritando frigoris & rigoris affectiones primo afferent, sic arteriarum & venarum membrana irritatæ spasmodicis contractionibus crispantur, ut minoris sectionis fiant; stringitur propterea massa sanguinis, ut pulsus eo tempore veluti suffocari videantur, usque dum paulatim exaltato sulfure, & salta ad statum fluoris, aut volatilitatis evecta una cum cæteris particulis immodice moveantur. Ulterius si lymphæ, aut aqua sanguinis quantitate peccaverit, ut ratio feri ad alia solida & consistentia corpora major sit quam 3. ad 1. tunc depresso-sulfure & enervatis salibus sanguinis æquilibrium tollitur sine magno impetu tumultus, inde lenis calor, tenuis frequentia pulsuum sine siti, utplurimum, sequi consuescunt, inde lymphaticæ febres exoriuntur. Ex his colligendum putaverim, quocunque loco, ac situ vasorum, aut glandularum basin, aut sedem paroxysmi febrilis locari posse; enimvero si quolibet loco vasorum, aut glandularum per aliquos canales, ut per chylicos, aut lymphaticos, aut ab aere

(1) Per prop. 85. de motu intestino fluid. Hermannii Phorono.

per pulmones transmittantur corpora in vasa sanguifera, quæ sanguini associata mutant sensibilibus proportionem corporum inter se, aut debitam rationem motus eorundem; tunc necessario vitiose moveri massam sanguinis necesse est, ut tota massa ad majus volumen extensa innumeris asymmetris motibus febriliter agitetur. Ex his quæ dicta sunt, aperte constare potest, hæc omnia facile convenire posse cum iis, quæ de motu agitationis in sanguinea massa celeberrimi Viri, Guiljelmus nempe de natura, & constitutione sanguinis, & Michelottus de separatione fluidorum in corpore animali sapientissime docuerunt.

7. Ibi redeundo aliquantisper ad motum pressionis dissimulare non possum, quæ diu suspicatus sum quærens motum sanguinis in arteriis; flet enim anceps animus, num massa sanguinis a corde impulsæ in arterias lineam quandam spiralem describeret, quærendo ulterius, cujus generis futura esset hæc curva spiralis? ad hanc meditationem nonnulla movebant animum, & primo motus cordis sese torquentis; cum enim cor præcipuo fibrarum spiraliū momento sanguinem urgeat, & motus impulsus sanguinis dirigi facile debeat juxta directiones impressas fluido ab organo impellente, certe ex corde spiralerè revoluto sanguinem quoque spiralerè movendum esse per arteriarum longitudinem suspicatus fueram; deinde cum arteriæ ipsæ a tribus fibrarum ordinibus vestiuntur, quarum primus circularis est, rectus alter, qui circulares secatur ad angulos rectos; tertius vero spiralis est, qui referente Diemerbrokio (cap. de arteriis) tum internam, tum externam tunicam obliquis fibris apte munit, qua in re Dominicus quoque Guiljelmus (1) geometrico & mechanico artificio ductus spirales fibræ amplexus est magnis operibus opportunas: itaque sanguis spirali motu a corde suscepto, videtur, eundem aut similem motum per arteriarum longitudinem sustinere: Enimvero relicto corde occurrunt fibræ spirales arteriarum, quæ spiralem motum a corde susceptum ulterius conservare aptæ sunt; deinde cum sanguis relicto corde variis motibus urgeatur eodem tempore in arteriis, quorum alter sit ab impetu cordis, quo per longitudinem arteriæ continuo im-

pellitur, alter vero sit a motu elastico arteriarum, quo sanguis præcipue in majoribus arteriis a circumferentia versus axem transversim impellitur, & cum hisce motibus accedat eodem tempore peculiaris alter motus, quem fibræ spirales earundem contento sanguini alte donant; idcirco ex hisce motibus eodem tempore sanguini impressis emergere videtur motus mixtus ex hisce compositus, qui cum nec totaliter rectus sit, nec omnimode circularis, sed utriusque simul particeps; certe massa sanguinis a spiraliibus præcipue fibris ultro mota, taliter moveri debet, ut motum mixtum, spiralem nempe, describere debeat, aut quasi spiralem, juxta quem per arterias impostum videtur ire debuisse; Borellus quoque per vertiginosus motus (2) torqueri particulas, ut recte miteantur indicare visus est; Verum cum in hac re deficient experimenta, ac necessaria data, quæ meam suspensionem tuto firmarent, reliqui meditationem, contentus, hæc tantummodo innuisse, ut futuri geometræ, ac mechanici feliciori ingenio, hujusmodi spirales curvas fortunata meditatione concernerent sedulo invenire.

8. Præcipua pressionis & impulsus, quæ massæ sanguinis accidunt; beneficia, aut damna huc usque exposita sunt; cum modo, quo sanguis ab arteriis in varias viscerum glandulas necessario tranet peculiares liquores separaturus; cumque motus corporum continentium contenta corpora tali ratione urgere debeant, homolega, quodammodo motibus corporum continentium, suspicatus sum, sanguineum laticem in glandulis peculiarem a specifica glandularum structura motum probabiliter mutuari, ut separanda corpora apte discernantur; Licet vero hanc rem celeberrimus Michelottus doctissimo opere de fluidorum separatione plena manu tractaverit: nihilominus studii gratia non verebor exponere conjecturas, quæ de motu separationis fluidorum per glandulas probabiles quoque mihi visæ sunt, præter ea, quæ summa virtute ac studio a tot celeberrimis Viris Leibnizio, Joanne Bernollio, & Bernardo Connero felicissime exposita sunt; Antequam autem ulterius prosequar, fateor me pluries studuisse, ut naturalem glandularum stru-

Motus
separa-
tionis.

(1) De natura & constitutione sanguinis.

(2) Alph. Borellus prop. 99. & Schellio Th. 2. de motu Animalium.

etiam a celeberrimorum Anatomicorum observationibus clare perciperem; verum cum horum observationes ancipiti pede ubique hæreant, alii enim vasculares, alii vesiculares, arteriarum quidem evanescentium ramulis, venulis, nervis, & excretoriis canalibus, munitas conjectura potius, quam experimento docuere; quamobrem inter conjecturas Malpighii sententiam eligendam putavi, quæ glandulas a folliculo membranoso compositam, varioque modo contextam voluit; huic autem sententiæ videtur quoque assentiri Doctissimus Morgagnus in epistola ad supra laudatum Michelottum conscripta; inquit enim: *Movent enim me ut par est gravissimi Anatomici Malpighii innumera observationes, movet ista luculenta Clarissimi Læzii confirmatio, qui glandulas sine vesiculis non invenere; has igitur in glandulis reperire necesse est.* An autem membranosi isti folliculi elaborati sint a dilata-tione arteriæ evanescentis, aut a membra-neâ quadam vesicula inter arterias evanescentes posita & vascula excretoria? ibi anceps non inquiri, cum instituto meo utraq-ue res faveant; enim vero (liceat in conjecturis conjectari,) si glandulæ istæ separatrices elaboratæ sint ab extensionibus arteriarum ultimarum evanescentium, certe sagax natura ubique provida talibus fibris munire debuerat, quæ evanescentes arterias tanto officio opportunas efficeret, a quarum viribus non pressionis tantummodo motus fieret, arteriis ubique communis, verum etiam specifica ratio motuum hisce evanescentibus arteriis donaretur, quæ specificæ separationi liquidorum apte inserviret; & sane, si natura tot viscera officio diversa, diversa quoque figura, ac structura elaboravit, cur evanescentes quoque arterias non poterit variis fibrarum ordinibus ultro vestire, quæ specificis motibus peculiarium liquorum separationi famularentur? Si vero glandulas membraneis vesiculis elaboratas velis, hæc certe a natura specificis fibrarum ordinibus armandæ probabiliter fuerant, quæ peculiaribus quoque motibus peculiarium corporum separationi operam opportune darent. Hisce præsuppositis refert Michelottus, tam celebres viros Leibnitium nempe, Bernollium, & Connorum in eam ivisse sententiam, ut crederent fluidorum separationes in quibuscunque viscerum glandulis non ea ratione fieri, ut pororum similitudo sit homologa figuris humorum, seu corporum separandorum, ut usque adhuc a

plerisque iudicatum est; sed summo consilio arbitrantur, universas corporis nostri glandulas a primo foetus exordio peculiari liquore saturatas fuisse, quæ postmodum toto vitæ cursu coguntur secernere consimiles succos illis homogeneos, quibus prima jam formatione fuerint saturatæ. Hanc separationis methodum nobilissimo, aptissimoque experimento confirmant; enim vero facta perfectissima missione aquæ & olei, si velis aquam ab oleo secernere, sufficit chartam emporeticam aqua prius madefacere, cujus una portio postmodum immittatur vasi; tunc enim aqua oleo mixta poros chartæ aqua madefactæ paulatim ascendet, & per reliquam chartæ portionem extra vas pendulam erit exterius elapsura: Verum si oleum ab aqua separare placuerit, chartam emporeticam oleo prius immergere, & per poros chartæ oleo humidos felicissime oleum separabis.

9. Præter hæc, quamvis aureo digna sint voto, peculiarem liquorum separationem in peculiaribus viscerum glandulis alia quoque methodo fieri posse suspicatus sum: Itaque certum est quæcunque animalium viscera, ut lien, hepar, renes &c. suas habere glandulas peculiari, & specifica textura ac figura donatas; alia liquidem est figura & textura glandularum hepatis, alia lienis, alia glandularum renalium figura & modus, & sic de cæteris. Ulterius hæc diversa glandularum modificatio determinatur a diverso ordine ac textura fibrarum muscularium, nervorum, & membranarum; musculares enim fibræ, nervæ, & membranosæ, quæ renales glandulas texunt, diversam habent directionem & vario excurrunt ordine, ac fibræ nervæ, musculares, & membranosæ, quæ hepaticas, & lienares glandulas construunt: Hæc omnia observante Malpighio aptissime confirmantur (pag. mibi 225.) Animadvertit enim in hepate, quod glandulosi acini, quibus lobulus componitur, cum peculiarem circumscriptionem habeant, necessario propria & ipsa figura, quæ ut plurimum hexagona est, vel plurium laterum: Idem de liene (pag. 300.) ostendit, quod minimæ hæc glandulæ figuram habent ovalem. De renibus vero (pag. 279.) clare asserit. In homine, aliisque consimilibus, levis undequaque ab omnibus licet describatur ren, attramen aliquando in adultis, & sæpe in sætibus manifesto ejusdem compositio elucescit cum exiguis portionibus altis simulis sejunctis conglobetur, & in adultis etiam

etiam perpetua interius bujus divisionis permanent indicia, diligenti etiam indagine asperam, & ulterius semidivisam observavi bujus superficiem, quod tamen ut clarius pateat, animalium nuperrime natorum renes sunt excutiendi; in his enim lobuli quidem multiplicium laterum emergunt rimulis circumscripti, quæ aucta, & provelta animalis etate, licet fere obliterari videantur, eorum tamen vestigia adhuc supersunt, varioque distinguuntur colore; nam rubedinem, vel etiam immixti liquoris per arterias, vel venas colorem referunt, & etiam contenti lobuli, sive renum exigue portiones, quæ carnis colorem remissiore retinent, ab his circumambiantur: hæc rerum subdivisiones non in sola superficie excisantur, sed intime etiam penetrantes carnis aliqualem distinctionem efficiant; in bobus enim, exaratis superius brutis, & in ipsomet homine collectiones illæ insignes conspicuis foveis in aliquibus brutis circumscriptæ tandem interius peculiarem figuram, & exactam distinctionem habent, videnturque referre plurimum laterum Pyramidem, quæ præ cæteris patet in testudinum renibus, & interius in ipsomet homine, &c. Deinde hæc diversa fibrarum directio, diversus ordo, & varius figuræ & texturæ modus necessario afferre debet glandulis diversimode elaboratis peculiarem quoque glandularum motum singulis glandulis proportionalem; peculiari itaque, & specifico motu moveri debet vi fibrarum specificæ glandulam componendum renalis glandula, peculiari quoque vibratione lienaris, & hepaticæ.

10. Hisce præhabitis, eligamus ibi glandulas hepatis, simili enim ratiocinio de cæteris quoque viscerum glandulis proportionaliter licebit philosophari. Cum hujusmodi glandulæ sint biliosarum particularum separationi destinatæ, in has biliosas particulas ferax sanguis ab evanescentibus hepaticis arteriis effunditur; ibi tamen cogitur sequi motum specificum glandularum continentium; in hisce enim hexagonis glandularum lacunis biliosæ massulæ (numero certe & momento majores cæteris ibi commixtis) inter se homogeneæ, ejusdemque superficiæ, & indolis urgentur a specifico, & naturali motu glandularum hepaticarum, ut opportune separationi accomodentur; verum cum methodus separationis ab ordine, ac lege motuum massæ sanguinæ glandu-

lam ingredientis habeatur; ideo nonnulla prænotanda sunt, quæ motuum leges aperient futuræ separationi exequendæ opportuna; Primo itaque sciendum est, quantitatem motus sanguinis exeuntis a corde una systole (natura bene se habente,) semper futuram esse proportionalem quantitati motus ejusdem per foraminulum arteriolæ egredientis, & ingredientis glandulam eadem systole, ut tali ratione semper fiat glandulæ diastoles, cordis systoli proportionalis: Ut autem hæc obtineri possint, notandum est, quantitates motus aliquorum per quævis foramina erumpentium, quæ viribus impellentibus proportionales sunt, esse in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatum, simpla densitatum, & simpla foraminum, e quibus erumpunt; (1) Itaque cum sanguis sit fluidus in statu naturali ejusdem densitatis, ejusdemque gravitatis specificæ, cujus quantitas proportionaliter a momento cordis semper impellitur; ideo simili lege futura erit quantitas motus sanguinis, quæ per unum foramen effluit quacunque systole in ratione composita ex ratione quadrati velocitatis ducti in sanguinis densitatem, seu quantitatem, & ducti in foramen, per quod dato tempore erumpit massa sanguinis; quare si quantitas motus massæ sanguinis erumpentis dato tempore e foramine trunci arteriæ vocetur q; foramen vero e quo erumpit vocetur o, quantitas vero, densitas, seu massa sanguinis vocetur m, velocitas vero vocetur u, erit $q = o \cdot m \cdot u^2$; Modo certum est truncum arteriæ plurimos in ramulos esse divisum; si igitur truncus arteriæ supponatur divisus in 20. ramulos, quorum unus in glandulam erumpens sit vigesima pars trunci arteriæ majoris; procul dubio motu cordis naturaliter se habente, futura quoque erit quantitas motus sanguinis exeuntis dato tempore e foraminulo rami arteriolæ in ratione composita ex duplicata velocitatis, simpla massæ, & simpla foraminis, e quo æquali tempore erumpit, quare erit $\frac{q}{20} = \frac{o}{20} \cdot m \cdot u^2$; & cum cæteris paribus quadrata velocitatum sint similia inter se, futura erit quantitas motus massæ sanguinis exeuntis e foramine trunci arteriæ una systole proportionalis quantitati motus massæ sanguinis exeuntis e fo-

ra-

(1) Per prop. 31. Hermanni & per demonstrata a Michelotto de separatione fluidorum.

raminulo rami arteriolæ eadem sistole ; quare facto analogismo , fiet hæc ratio

$$\frac{q}{10} : \frac{0 + m + uu}{20} :: \frac{0 + uu}{10} : \frac{uu}{20}$$

Propterea colligendum , quod cum sanguis systole cordis expulsi , ingrediens glandulam hanc proportionaliter dilatare debeat , systolem cordis , & glandularum diastolem esse inter se proportionales , quare glandulæ quælibet tanquam parvula corda haberi facile poterunt. Porro cum massa sanguinis ingrediens glandulam hanc in data ratione aperiat , ideo glandula a vi , & momento sanguinis in concava glandulæ superficie determinatam percussionem excipiet ; cum autem percussiones fluidorum sint ut quantitates morus eorundem , (1) & quantitas morus sanguinis e foraminulo arteriolæ egredientis , & glandulam ingredientis facta sit

$$\frac{q}{10} \text{ seu } \frac{0 + m + uu}{20}$$

erit quoque vis percussionis facta a sanguine ingrediente glandulam , eandemque dilatante ; ut

$$\frac{q}{20}$$

$\frac{0 + m + uu}{20}$ Verum cum dilatationi glandularum statim succedat reciproca constrictionio , eo quia glandulæ quælibet utpote arteriis & venis , nerveis , membranosis , & muscularibus fibris contextæ oscillatorio motu & quadam elastica actione , aut quasi elastica tantum constringi debeant , quantum antea fuerant dilatata , erit vis , seu momentum constrictionis glandulæ proportionale vi , aut momento dilatationis ; quare glandula in constrictione , seu systole urgebit quoque elementa sanguinis ingressi glandulam secundum rationem compositam ex duplicata velocitatis , simpla massæ , & simpla foraminis , pariter divisus per 20. Secundo opus est fluidum in glandulam delatum non celeri nimis motu agitari , sed leni , placidoque motu moveri : etenim ut in fluidis similia a dissimilibus separari possint ; requiritur ea ratio temporis tanto operi opportuna : verum fluente nimio motu sanguine , confusisque omnibus aufertur ea ratio determinati temporis , quæ proculdubio necessaria est , ut debita methodo discernantur ; sic in quibuscunque artis operibus , & in chymicis separationibus debita corporum secretio non a celeri nimis motu fluidorum , sed a lento , placidoque mo-

tu , statutoque tempore plerumque perficitur ; quare suppositis superioribus cum quadrata deorescant in ratione duplicata suarum radicum , constat quadratum velocitatis massæ sanguinis e foraminulo rami arteriosi egredientis & ingredientis glandulæ , nempe $\frac{uu}{10}$ futurum esse necessario minimum

respective ad quadratum velocitatis massæ sanguinis e majori arteria egredientis , nempe respective ad uu ; quare cum motus sanguinis in glandulis futurus sit minimus , & consequenter lentus , lenis , ac placidus , facile erit similia corpora disponenda esse , ut determinato tempore a dissimilibus separantur . Tertio præstat tanto operi separationis , massam sanguinis ingressam glandulam quacunque systole esse quoque respective minimam , nempe minimo glandulæ continentis spatio proportionalem ; enim vero si quantitate præcipue excedat , glandula nimis extenditur & talis , ac tanta fieri potest contra glandulam resistentia , ut glandulæ systoles non ea ratione fieri , ac perfici possit juxta rationem virium , & numeri vibrationum , qualem exigit tantorum corporum separatio ; Quamobrem suppositis quoque superioribus , cum massa sanguinis , quæ per ramum arteriolæ effluit in glandulam quacunque systole , sit in ratione simpla cum minimo quadrato velocitatis ; necesse est hanc quoque massam quantitate minimam futuram esse , videlicet minimo glandulæ continentis spatio proportionalem .

11. Hisce præsuppositis , cum naturales systoles seu vibratio elastica glandulæ semper eadem ratione fieri debeat quacunque cordis systole juxta eundem gradum quadrati velocitatis ; proculdubio tali quoque ratione urgebit , aut immediato , aut mediato contactu contenta elementa massæ sanguinis ; cum autem hujusmodi elementa alia similia , alia vero dissimilia : similia elementa (biliosa nempe corpuscula) utpote homologas habentia superficies excipient singula percussiones , si non semper , saltem ut plurimum supra plana homologa ; cum autem corpora similia , ejusdemque generis eadem semper lege motus percussa , superque easdem , aut similes planorum superficies semper impulsa moveri necessario debeant motibus , seu directionibus quoque , aut æqualibus , aut similibus , & juxta ex-

ce-

(1) Per coroll. secund. prop. 42. Hermannii Phoron.

ceptas percussiones proportionalibus ; proculdubio hæc juxta eandem, aut similes directiones itura erunt susceptis impressionibus proportionales : Quamobrem hæc similia corpora numero pauca, lente, ac placide mota, eademque lege homologa motuum, ac vibrationum semper mota, impulsæ, ac quassata supra homologas planorum superficies, separatis paulatim aliorum corporum dissimilium vinculis resistentiis, & occurribus, cogentur moveri omnia, aut fere omnia juxta eandem directionem, ita ut versus unam glandulæ partem ac situm convenire paulatim coacta sint : cætera vero heterogenea corpora cum mole, figura, ac pondere dissimilia sint tali, ac specifica vibratione, & fortasse tali, ac tanto vibrationum numero glandularum hepaticarum urgente proportionatas, ac dissimiles dissimilium corporum superficies inæqualiter quoque percussa, inæqualiter movebuntur per directiones pariter inæquales, ac dissimiles, quare hujusmodi corpora dissimilia necessario urgebuntur per diversas ac dissimiles vias, ac directiones per loca pariter diversa glandulæ continentis ; unde dissimiles massulæ tali mechanica methodo motuum dissimilium motæ a similibus biliosis massulis satis sejunctæ ac separatæ, nullatenus impedient, quin similia & homogenea biliosa corpora a cæteris separata, qua data porta extra glandulas paulatim eliminantur ; non dissimili ratione in Chymicis determinatus calor gradus, sive specifica ignis actio, aut determinatum ignis momentum a fluido heterogeneo unam substantiam separat ab aliis tali gradu ac momento ignis proportionalem, cum postea cæteræ substantiæ ab alia vi, aut alio ignis, & calor gradus supersint proportionaliter separandæ : Verum ibi fateor, quod licet specifici motus fibrarum glandularum multum juvent, ut specifici liquores separentur ; nihilominus si cum celeberrimo Leibnitio ultro placeat fibras has supponere probabiliter a primordio generationis specificis liquoribus saturatas, certe felicior secutura erit specifici liquoris, similium nempe a dissimilibus separatio : tali itaque mechanica glandularum structura, & tali specifico motuum artificio una cum specifica liquoris saturatione, cæteræ quæcunque glandulæ suos sibi consimiles succos a dissimilibus apte separare possunt, ut per excretorios postea ductus alibi deficiantur juxta naturæ recte operantis determinationem : Itaque ex his

Sydenham Opera Med. Tom. II.

mirum esset inspicere ordinem ac methodum, qua hexagonæ glandularum hepaticarum areæ proportionali suarum fibrarum motu succos separandos homologue urgent : Cum enim latus seu fibra unius glandulæ hexagonæ sit proportionalis lateri seu fibræ alterius glandulæ hexagonæ, & motus unius lateris sit motui alterius lateris proportionalis, erit latus unius glandulæ ad latus alterius glandulæ, ut motus unius ad motum alterius ; quare ex geometricis erunt omnia latera unius glandulæ in statu naturali ad omnia latera alterius glandulæ hexagonæ, ut totus motus unius glandulæ ad totum motum alterius, & permutando erunt omnia latera unius glandulæ ad totum motum hujus, ut omnia latera alterius glandulæ ad totum motum istius, quare omnes motus glandularum simul sumpti erunt omnibus lateribus simul sumptis eorundem proportionales : cum autem ex hisce motibus homologis glandularum fiant impulsus homologi corporum contentorum, propterea etiam impulsus simul sumpti utriusque glandulæ contra contenta corpora erunt inter se pariter proportionales, & consequenter homogenea corpora supra plana homologa excipiendo semper, aut fere semper impulsus similes, aut æquales, proportionali quoque methodo, ac ordine a cæteris dissimilibus excipientibus supra plana dissimilia impulsus, seu percussiones quoque dissimiles separati coacta erunt, ut tandem aliquando per sua excretoria vascula extra glandulas ejiciantur ; Cystici itaque canales in data ratione separatos succos excipient, & partim in cystim felleam, partim per choledocum ductum proportionaliter deponentur ; quod autem de duabus hepaticis glandulis dictum est, proportionaliter de omnibus dicendum erit, quare si glandulæ ab hac lege homologa motuum similium recedant, facile erit arguere hujusmodi glandulas succis diversæ indolis nimium saturatas esse : quoties enim spatium unius glandulæ repletum fuerit fluidis diversæ indolis, aut quantitate peccantibus, necessario etiam horum momenta ac vires cogentur esse diversæ ; cum enim fluida contenta diversa momentorum ratione resistent motibus glandularum continentium, certe cogentur quoque continentis glandulæ, non simili (ut in naturali opere separationis fieri debet,) sed dissimili motu moveri ; quamobrem fluida numero & genere heterogenea vitiosa methodo ac inæquali lege ac ordine irregu-

C c

lari

lari sepatabuntur : Ex his non uno vulnere natura lœdetur ; enimvero tot succi diversæ indolis, postea in duodenum effusi separationi corporum utilium ab inutilibus, præcipitationi & exaltationi, nec non depurationi chyli, quibus peculiariter biliosæ particulæ destinantur, male intervient ; verum ex tam impura bile sordescet chylus, & plurimum februm basis massam sanguinis gravi tumultu evertet ; imo huiusmodi bilis cum pancreatico succo copulata vitiose mota horripilationes & febriles rigores larga manu educet.

12. Neque quis credat, glandularum angustiam impedimento esse, quo minus similia corpora homologis vibrationibus semper impulsæ per unam, eandemque directionem eant, unamque partem glandulæ occupent ; dissimilia vero per alias directiones tendant, aliasque partes teneant, eo quia quælibet glandula a natura tali methodo elaboranda fuerat, ut glandulare spatium esset proportionale quantitati fluidi excipienti, vi cuius aptæ essent fluidorum massæ libere ac quaquaversus motus suos exercere feliciter : Deinde quælibet fluida credi facile debent corpora infinite parva, aut saltem apta nata acquirendi dimensiones infinite parvas ; & cum glandulæ membranis elaboratæ sint, quæ facile ad maiores superficies extendi possunt, propterea quilibet particularum motus in glandulis naturaliter se habentibus commode exequi poterit, ut homogenea ab heterogeneis corporibus satis apte separari possint ; Fateor quidem, massulas separatas non omnes eiusdem esse generis, sed aliquibus quoque dissimilibus particulis aliquantulum associari ac commisceri ; aliquando enim similes aliquibus dissimilibus adeo fortiter alligatæ sunt, ut non tam cito ac facile a similibus sejungi omnino possint ; verum cum dissimilia huiusmodi corpora numero ac momento similibus minora sint, ideo nullum evenire poterit impedimentum, vi cuius corpora debitis motibus non separentur, & separata foras non ejiciantur, quotiescunque tamen res ceteræ naturaliter se habuerint, tunc enim ruet totum opus glandularum recte separantium, si aut glandularum structura vitium fecerit, aut naturalis earum motus inepte mutetur, aut dissimilia corpora similibus unita numero, ac momento maiora fuerint, quam par est ; nam ex his lœduntur naturales homogeneorum corporum directiones, & vitiosis motibus agitata corpora alte lœdunt, tur-

babuntque opportunam corporum separationem : Sic immortalis ille Malpighius in morbo hepate (pagin. mihi 217.) vigente cachexia glandulas in ampliorem superficiem extensas non hexagonas, sed quæ vesiculas amularentur, refert observasse ; ex huiusmodi enim vitio colligendum facile est, heterogenea corpora numero maiora homogeneis extitisse, unde metastasi obstructum viscus facile est credere, ex nimis impura bile prima hydropis semina posuisse : Non mirabor itaque amplius tot mala observaturus, quæ ab obstructis visceribus pululant, etenim obstructa corpora naturalem glandularum figuram, & earum motum necessario invertunt ; quotiescunque enim vitio sanguinis extraneæ particulæ taliter uniantur, ut crescant in ratione composita basium & altitudinum, ita ut moles particularum majores fiant luminibus canaliculium discernentium, opus tunc est contentas particulas hexagona glandularum spatia in hepate dilatare, majores idcirco fient anguli & latera inæqualiter quoque elongata juxta inæquales, ac dissimiles contentorum corporum superficies cogent fibras omnes a naturali ordine ac structura recedere, succedit propterea motus & elastica vibratio a naturali dissimilis, unde inepta fiet corporum directio & separatio ; quin imo aliquando fiet nulla : Glandulæ siquidem tantis præternaturalibus corporibus aliquando adeo implentur, ut sæpissime sint coactæ motum tonicum pati ; immobiles idcirco contenta corpora nullatenus urgent, tumores ac scirrhus gravi viscerum pondere parituræ ; ex his biliosæ particulæ non apte per cysticos canales separatæ ; imò a venis ibi finitimis pluitquam deceat reassumptæ enormes aliquando icteritias facile afferent ; hæc & alia hujus farinæ mala inauspicato contingent a vitioso motu separationis.

13. A pressionis motu resoluta corpora in arteriis, & debitis motibus depurata, postmodum in glandulis juxta naturæ exigentiam mechanice utilia ab utilibus separata, eam paritatem ac perfectionem ineunt, ut motu quodam assimilationis partibus nutriendis facillime adaptentur. Nutritio itaque, cum sit præcipuum naturæ opus, quo animal sustinetur & vivit : cumque a peculiari quodam motu habeatur, quo corpora per massam sanguinis decurrentia, cum sibi acquirant locum singulis partibus accommodatum ; propterea necesse est de hoc quoque motu, (quem assimilationis dicimus) ver-

Motus
Assimila-
tionis.

verba facere, ut præcipua opera ad motum sanguinis pertinentia evolvantur, quæ ad sanitatem & ad morbum producendum, aut dignoscendum pertinere videantur. Itaque de his acturus notum est, quod *Nutritio Animalium nil aliud esse videtur, quam motus particularum, ad eum locum delatarum, quo reparantur, seu restituantur particule secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem æquales, aut similes illis, quæ motu transpirationis continuo deperduntur*. Morimur siquidem quotidie omnes, & rursus continuo aere & cibo reviviscimus; certum enim est, quod aut læsione partium, aut violento motu, aut transpiratione continua corruunt, & effluunt e corpore animalium particule, quæ solida & fluida componebant; provida ideo natura consulit animalia quolibet aere, & cibus continuo indigere, ut jacturas suas assidua reparatione redimerent; cum autem in aere & cibus varii generis corpora diversæ figuræ, molis, ponderis claudantur, & massa sanguinis ex aere & cibus continuo reparetur, opus est massam quoque sanguinis cujuscunque generis corpora continere; putaverim itaque, nutritionis materiam totam a massa sanguinis esse accipiendam; licet enim nonnulli succum nerveum, nonnulli serum, aut alios fortasse humores ament pro nutritionis materiâ; nihilominus cum serum & succus nerveus, cæterique humores a massa sanguinis separentur, probabilius crediderim totam nutritionis materiam massæ sanguineæ universaliter esse tribuendam; Universaliter itaque nutrit massa sanguinis, specificè autem nutrit succus nerveus, cæterique humores specificam nutritionem ferunt, quotiescunque in sero, aut succo nerveo, cæterisque humoribus extiterint particule nutriendis partibus aptæ, opportuneque homologæ: Quamobrem ex his probabile est, non a solo specifico humore totum nutritionis opus moliri, sed a singulis quibuscunque humoribus, quoties singuli habuerint homogeneas particulas specificis & homogeneis partibus accommodandas: hac ratione optime innotescit, cur tot partes natura indole, & substantia diversæ, singulæ tamen juxta suum genus atque temperiem opportuno tempore, aptisque succis nutriantur & crescant; Verum ex imperfecto motu pressionis, resolutionis & depurationis corporum inepta fit quoque nutritio animalium; etenim male resoluta, commixta & male separata, & depurata corpora

agere expolita fiunt, rudes idcirco, & crudæ particule salium, cum impuro nimisque aspero, aut crudo sulfure missionis aquitatem vitiantes male nutriendis partibus sese accommodant, & male asperis superficiebus aptatæ aut nutritionem minuunt, aut perdunt; Itaque cum tot, ac tanta corpora diversæ gravitatis, molis ac figuræ in massa sanguinis quaquaversus debeant excurrere, ut facile, ac prompte nutritionem exercent, manifesta est ratio, cur natura concesserit ex Boilei observationibus massæ sanguinis tantam feri cepiam, quæ triplo contenta corpora simul sumpta superet; cum enim in sero quæcunque corpora debeant libere innatare, facileque quaquaversus moveri, ac fluere, opus fuerat massam sanguinis tanto sero dotandam esse.

14. Ibi itaque nutritionis rem acturo placeat mihi animadvertere, nutritionis opus non festinanter a natura exequi, sed lento pede, ac determinato tempore particulas nutriendis partibus adaptari; opus est itaque in tam celebri opere fluida placido, leni, lentoque pede moveri; verum si fluidum celeri nimis, aut violento motu volvatur, tunc innatantes particule non eum ordinem, ac rationem situs, nec quærare possunt, nec obtinere, sed confusa, ac promiscua methodo agitatæ varios situs excurrent, quamobrem cum particule nimis impulsæ non possint opportuno tempore nutriendis partibus commode ac facile adaptari, fas est a fluido nimis agitato nutritionem impediri; sic experimur, in febribus ex fluidis celeri nimis motu revolutis omnes imminuta nutritione macrescere. Ut ergo nutritionis opus naturali methodo exequi possit, duo præcipue necessaria sunt; lentus nempe, lenis, placidusque motus, & apta corporum seu succorum puritas & congruentia; cum autem motus lenis ac placidus in minimis tantummodo canalibus cujuscunque generis haberi facilius possit, in quibus minimo motu tantummodo moventur fluida, proculdubio, colligi potest, præcipuum nutritionis opus in minimis canalibus esse exequendum: Pro minimis autem canalibus non solum intelligenda puto vasa minima sanguinem, cæterosque humores deferentia, verum etiam carnum & membranarum fistulas, sinus, ossium foramina & quascunque alias partium vias, per quas fluidi qualiscunque portio possit opportune penetrare; plerisque enim Philosophis & Anatomicis notum est, animalis machi-

nam ex minimis, minutisque canalibus esse elaboratam; quamobrem cum sui generis fluida naturaliter se habentia debeant per tot canaliculos quaquaversus effluere, credi potest, universam animalis machinam suis proportionaliter fluidis statuto tempore nutritione fore reparandam; huiusmodi enim canales aut minimi sinus cum minima quoque vibratione elastica peristaltice moveantur, fluida quoque contenta leniter ac placide urgent; sicque in tam lento ac placido motu notabiliter non turbatur ordo ac situs corporum in sero innatantium, unde facile sufficiens corporum homologorum adaptatio, nutritio nempe compleatur. Quod vero ad secundum pertinet, cum quodlibet animal peculiari & specinco humore doneatur, quo juxta suam temperiem nutriatur & vivat, necesse erit, huiusmodi succi indolem tali puritate & homogeneis ac sibi proportionalibus fluidis esse donandam, ut ab heterogeneis & dissimilibus opportune privetur; sic tota viscera humores depurantia natura providit, ut depurata fluida juxta peculiaris temperaturæ exigentiam singulis animalium operibus nutritioni præcise intervirent, ut enim unio optima fiat, debet adesse similitudo & proportio & aliqualis æqualitas corporum figuratorum cum similitudine & aliquali æqualitate partis, cui talia specifica corpora aptanda sunt; cum enim in similium & æqualium, aut quasi æqualium corporum unione centrum gravitatis coincidat plerumque cum centro magnitudinis; quotiescunque hæc determinata corporum cum parte, aut loco nutriendo proportio fuerit, unio & adhesio facile fient, & consequenter opportuna & firma nutritio; verum si plana corporum dissimilium, dissimilibus planis aut loculis adhareant, tunc cum centrum gravitatis corporum dissimilium longe absit, nec coherere possit cum centro magnitudinis eorundem; tunc non debita adaptatio seu nutritio fiet, aut facta parum aut ægre erit duratura. Celeberrimus Verheyen nutritionem examinaturus similitudini materiæ unicuique parti adaptandæ assentitur; inquit enim (1) *Generalis materia nutritionis & accretionis est massa sanguinis secundum varias sui partes, non vero tantum aliquis humor simplex & homogeneus; siquidem plurimæ corporis partes, ut sunt os, nervus, membrana, caro &c.*

inter se considerata plurimum differunt quoad substantiam, sed unaquæque pars nutritur & accrescit per materiam sibi aliquatenus conformem. Inferius vero addit: non difficulter concipitur, in ipsa massa sanguinea contineri multas admodum discrepantes particulas, quarum alie huic, alie isti, alie aliis sunt conformes, & proportionate. Ulterius huic operi perfectæ unionis necessaria est quoque æqualis aeris externi pressio, qua particule omnes æquabiliter compressæ suo in loco, suæque naturali superficie circumscriptæ detineantur: deinde necessaria est naturalis sulfuris existentia; ramositate enim sua plana planis, & plana locis nutriendis veluti a calce seruminantur; Sic patet in Chymicis, ex tam determinata miscela aquæ, salium, talisque sulfuris cum terreis particulis efformari compositum, calcis aut bituminis in modum, unioni partium aptissimum; quamobrem ex sulfuris balsamici defectu in hæcicis nutritio penitus corrumpitur, eo quia in hac massa sanguinis salia supra modum luxuriant muriatica & acia, quibus aspera & angularis inest superficies, quæ circa proprium axem rotando angulorum & planorum inæqualitate ac asperitate partes erodunt ac rumpunt, quibus applicanter; impedita ulterius debita corporum adaptatione & earundem opportuna coordinatione: Inde plurima mala ex imperfecta aut vitiata nutritione contingent; Ibi denique placet animadvertere, quod si huiusmodi particule motu assimilationis partibus adaptentur ea ratione quantitatis ac ponderis, ut nutriendis solummodo partibus apte sufficiant, tunc solum nutritur animal; cæterum si præter exigentiam nutritionis ultro succrescant, & dato tempore animalia ad majorem molem secundum trinam dimensionem longitudinis, latitudinis & profunditatis naturaliter extensa sint, oleosis præcipue ac felicioribus succis opportune pinguescent. Et hæc satis de præcipuis naturæ moribus, quibus massa sanguinis motu pressionis seu impulsus agitur, separat pura ab impuris, & nutrit animalia quælibet, a quibus præcipua animalis œconomiz phænomena sive bona, sive mala erui facile possunt & potuerunt.

DIS.

(1) Cap. de nutritione pag. 219. 220.

DISSERTATIO II.

*De Motu Sanguinis per Pulmones cum
Mechanicis Morborum causis.*

HYdraulicas machinas observaturus alte semper miratus sum, quoniam opere aut sursum elevata fluida, aut quaquaversus effusa certis legibus ambulent; quibus æqua methodo distributa, & directioni canalium & artificum magisterio obediant; aqua etenim cum naturali aeris superincumbentis pressione ad pedes 32. circiter elevari consuecat; machinæ tamen hydraulicæ beneficio naturales ultro superat altitudines, ibique data lege, datoque tempore ac loco vagatur; plura itaque admiranda Hydraulicæ artes docuere, majora tamen natura amplexa est de mirandis naturæ operibus ultro sollicita, quotiescunque vi cordis prima moventur fluida, animalibus motum & velut animam donatura; cor itaque primum animæ corporeæ visibile opus illud est, quod hydraulicæ machinæ ad instar urget sanguinem ordinato impetu, ut per universas animalis latebras quaquaversus sursum, deorsumque decurrat: ostendit Anatome, cor, ventriculosque ipsos conica figura donari; quem figuræ ordinem ex triplici fibrarum genere natura sabrefecit, quarum aliæ rectæ sunt, circulares aliæ, spirales tertiæ; cum autem rectæ eo officio destinatae sint, ut cor, ventriculosque ipsos aliquantulum contrahant; circulares vero fortiter stringant: spirales autem valide torqueant; credendum putaverim momentum virtutis motivæ cordis, simpliciter & secundum se consideratum, nullo habito respectu ad nimum contenti sanguinis, facile accedere posse ad rationem compositam ex triplici motu eodem tempore exercito & numero earundem; verum cum hoc iuste assequi arduum sit, propterea celeberrimus Joannes Alphonsus Borellus, quamvis magnus Geometra prop. 66. secundi Tom. de Motu animalium, momentum cordis investigaturus analogico ratiocinio usus est, & cum duobus musculis, temporali nempe & melleterio mandibulas stringentibus comparavit; Quamobrem prop. 67. vim motivam fibrarum cordis per se comparatam majus pondus suspendere posse, quam 3000. librarum, probabili satis conjectura docuerat; ex quibus singularia illa momenta investigari po-

terunt, quæ utrique ventriculo sigillatim pertinere videbuntur; Ab hoc tamen calculo multum dissentit celeberrimus Jacobus Keillius, verum Doctissimus Micheolottus, ut infirmatæ Borelli sententiæ, quantum possibile est, tutor esset, calculum ipsum a Keillio exaratum, a vero alienum esse apte ostendit; inquit itaque (115. de separ. fluid. in corpore animali.) Venio ad calculum, quo idem præstantissimus Scriptor (Jacobum Keillium intelligit) Jo: Alphonsum Borellum, jam olim vim absolutam cordis definire conatum, confutaturus suncit, eandem istam vim equalem esse octo unciarum pondo: Ne ista quidem Keilliana supputatio, etiam si firmo niteretur fundamento, vim absolutam cordis deterpinaret, hoc est, vis per ejusmodi calculum inventa non foret illa, qua totum cor contrahitur, sed tantum ejus pars, que respondet orificio Aortæ, utpote quam vim equalem statuit laudatus Vir ponderi cylindri sanguinei, cujus basis æquatur orificio Aortæ, & altitudo dupla illius, ex qua cadere deberet grave, ut acquirat velocitatem sanguinis ex corde in Aortam expulsi, si nullam resistantiam superandam haberet. Quamobrem si vim totam cordis computare vellemus, oporteret octo unciarum pondo toties sumere, quoties interior cordis superficies, seu potius ventriculi sinistri superat orificium Aortæ; superet si vis decies, ita ut decem Aortæ orificia occupare spatium æquale superficiei interiori sinistri cordis ventriculi, dico secundum præclarissimi Keillii principium supra memoratum, non octo, sed octoginta unciarum pondo æquare vim cordis totalem seu absolutam. Quamobrem ex his mihi visum est nil certi de momento seu vi totali cordis determinari posse, quippe præter ea a laudato Michelotto exposita (pag. 114.) diversa hominum ætas, temperies sanguinis, qualitas sexus, & ratio texturæ diversa fibrarum cordis, & plurima alia absolutam vim cordis facile mutare possunt; idcirco contentus doctissimorum virorum amica, & docta dissidia admirari, sequar conjecturas, quibus non totale momentum seu totalem vim cordis, sed utriusque ventriculi singularia momenta, aut vires instituto meo necessarias, si non geometrica, physica saltem conjectura rimari mihi satis est: Cum itaque juxta tres fibrarum rectarum, circularium & spiraliū series, tam dexter ventriculus, quam sinister sigillatim triplici, simul motu moveantur, ut contentum sanguinem foras expellant; cumque ultro ex

Cla-

Clarissimo Verbeegen (pag. 120. Anat.) Anatomica autopsia constat, sinistrum cordis sinum fibris triplo multis supra dextrum & fortioribus armari; ita ut sinister triplo crassior sit dextro, qui triplo majoribus fibris opportune munitur; cumque fibræ musculares, nervæ & tendinosæ mechanica sint instrumenta motus, quibus cordis sinus continuo motu torquentur; cumque ulterius dextri ventriculi officium sit, per solos pulmones sanguinem ejaculari, sinistri vero supra & infra per totum corpus; facile ex his conjectandum est, ex triplo majori, fortiorique numero fibrarum sinistram cordis sinum investiente, una cum motibus ipsis proportionalibus, vim motivam seu momentum sinistri momento dextri multo majus esse.

16. Licet autem ventriculus dexter momento seu vi motiva debilior sit, quam sinister; nihilominus ratio & autopsia suadere videntur, æqualem quantitatem sanguinis contineri in dextro, & a dextro expelli per arteriam pulmonarem in pulmones, ac contineatur in sinistro, ut ab hoc expellatur per arteriam magnam in totum corpus; enim vero cum ventriculus sinister sanguinem recipiat a dextro, certe sinister majorem quantitatem excipere non potest, quam dexter primo exceperat; neque minorem excipere potest sinister, quam dexter amplexus sit: quippe si totus sanguis a dextro non ejacularetur per arteriam pulmonarem in sinistram, residuum in pulmonaribus vasculis remaneret non inani stagnationis ac suffocationis periculo: Quamobrem opus est natura bene se habente, sinistram ventriculum æqualem aut quasi æqualem excipere a dextro sanguinis quantitatem, qualem dexter exceperat a vena cava, ut plura incommoda effugiantur; inde spatium conicum, aut quasi conicum dextri ventriculi sanguine repletum, aut replendum, spatio conico, aut quasi conico sinistri æquale, aut quasi æquale jure merito credendum est: cum enim certo constet, basin dextri ventriculi majorem esse basi sinistri, & altitudinem seu longitudinem hujus majorem esse altitudine seu longitudine alterius; procul dubio bases ventriculorum facile erunt in ratione reciproca cum eorundem altitudinibus, & consequenter data tali ratione reciproca quantitatum, ex geometricis, etiam

spatia ventriculorum conica aut quasi conica futura erunt æqualia, aut quasi æqualem sanguinis quantitatem susceptura: Hujusmodi autem spatia ventriculorum æqualia, aut quasi æqualia, quamvis celeberrimus Borrellus (1) a tribus unciiis sanguinis repleti suspicatus sit; nihilominus ab unica tantummodo sanguinis unica repleti multo probabilius recentiores judicant Anatomici: ibi autem supposita sanguinis uncia, cum aliquando necesse sit inquirere proportionem gravitatis specificæ non sanguinis tantummodo, verum etiam seri sanguinei & aquæ communis, istorumque voluminum proportionem, ut inter se juxta rerum exigentiam comparentur, ex quorum comparatione momenta ac vires horum studiorum facilius innotescant, quantum possibile est, ut mechanicæ morborum causæ habeantur, propterea hujusmodi fluidorum gravitates placuit experiri; Contigit itaque mihi ex sano, sed plethorico viro annorum 46. circiter gravi vertigine correpto necessitas emittendi sanguinem larga manu, ut a timendo apoplexiæ periculo liberaretur: licet autem specifica sanguinis humani gravitas difficillime erui possit, nihilominus Boylei methodum secutus (pag. mihi 278. partis secundæ Historiæ humani sanguinis) repetitis experimentis quæsito ponderi accedens pluries reperi.

Sanguinem humanum phiala inclusum ponderare grana 2853. 3. cum autem pondus phialæ fuerit granorum 967. quare ablato tali pondere simplex pondus sanguinis granorum 1886.

Serum autem sanguinis sub eodem volumine, utpote eadem phiala ad amissum contentum, ponderabat grana 2770. ablato autem pondere phialæ simplex pondus seri erat granorum 1803.

Aqua denique nostra communis eadem phiala inclusa sub eodem volumine ponderabat grana 2716. a quibus detractò phialæ pondere ponderabat grana 1749.

Cum autem, ex corollario 3. prop. 2. Lib. 1. Phronon. celeberrimi Viri semper laudandi Jacobi Hermanni gravitates specificæ corporum consistat in proportionem ponderum absolutorum corporum eorundem sub voluminibus æqualibus; cumque hujusmodi singulorum fluidorum massæ idem phialæ spatium occupantes sub eodem volumine ha-

(1) Coroll. prop. 68. secundi Tomi de motu Animalium.

habeantur, erit *gravitas specifica sanguinis ad gravitatem specificam feri sanguinei*, ut pondus granorum 188. ad pondus 1803.

Et *gravitas specifica sanguinis ad gravitatem specificam aque nostrae Brixianae erit granorum* 1886. ad 1749.

Pariterque *gravitas specifica feri sanguinei ad gravitatem specificam ejusdem aque Brixianae erit granorum* 1493. ad 1780.

Ex hisce colligendum quoque est, cum gravitates specificæ corporum sint densitatibus eorundem proportionales, massam sanguinis densiorem esse massa feri sub æquali volumine in ratione pariter 1886. ad 1803. simulque massam sanguinis sub æquali volumine cum aqua nostra communi densiorem esse eadem aqua communi in ratione 1886. ad 1749. pariterque massam feri sanguinei sub eodem volumine cum massa aque communis densiorem esse eadem aqua in ratione 1803. ad 1749. fateor quidem, ut Illustris. Boyleus quoque animadvertit, horum liquorum pondera ac densitates juxta ætatis, sexus, temperaturæ & loci differentias aequaliter inter se differre; nihilominus hac data hypothesi, qua aliqua proportio gravitatum in expositis liquoribus determinatur, facile juxta datas rationes accedere possumus ad alterius sanguinis, alterius feri aut alterius aque communis gravitates specificas & densitates reperiendas, ut inde momenta ac vires aliorum fluidorum proportionaliter assequi possimus.

17. Hisce præhabitis a ventriculo dextro expulsa sanguinis uncia pulmonarem arteriam ingreditur, quæ pericardium egressa per utrosque pulmones disseminatur; ibi autem mirari est, quantum æstimandus sit pulmo, cujus solius gratia ex duobus cordis sinibus unum, pro cæteris vero totius corporis partibus alterum tantummodo natura formavit; mirandum certe, cum ex hujus peculiari visceris opere celebré illud conjugium celebretur, quo solida cum fluidis, & cum solidis fluidisque, si non aërea, saltem luminosa & æthera in sanguine copulantur: Ut autem motus sanguinis per pulmones examinetur, suspicari placeat) ut num. 3. dictum est) sicut a sinistro, ita pariter a dextro ventriculo fibrarum ope sanguinem motu pressionis impelli, eundemque pressionis motum sequi per universas pulmonares arterias, qui in venas pulmo-

nares eadem lege traducatur: Exiens itaque sanguis a dextro cordis sinu pulmonarem arteriam ingreditur, & per hanc brevi quidem spatio horizontali quasi pede procedit; ut autem ratio transitus sanguinis per arteriam innotescat, juvat rimari talis arteriæ diametrum, quæ ex pluribus observationibus juxta lineam GH reperta est, methodo autem lineæ circini proportionum divisa est lineæ GH in 14. partes æquales, ut ex his area quoque pulmonaris arteriæ innotescere facile possit; Sit itaque diameter GH (1) circuli quæsitæ partium 14 — a; eritque quadratum diametri — aa partium 196. area ergo circuli quæsitæ supponatur — x: cum ratio quadrati ad circulum sit proxime ex Archimede de dimensione circuli ut 14. ad 11. fiatque 14 — b 11. vero — c. erit analogismus ut b. c :: a a. x; eritque per 16-6. Euclidis æquatio b x — a a c; & dividendo per b, fiet æquatio x — $\frac{aac}{b}$; cum autem quadratum a a sit — 196; & c sit — 11; erit productum a a c — 2156: quod divisum per b — 14, erit $\frac{aac}{b}$ — pariter 154. proxime, seu juxta methodum decimalium — 153. 860. pro valore quæsitæ quantitatis x, quæ plane ostendit quantitatem areæ arteriæ pulmonaris e dextro sinu mox egressæ, cujus diameter erat lineæ GH; itaque uncia sanguinis a ventriculo expulsa, & per spatium repertæ sectionis rarefacta urgebit æqualiter singula latera arteriæ; hæc autem omni parte æquabiliter dilatata restituet sanguini in constrictione eandem quantitatem impetus; unde massa sanguinis per hujusmodi truncum pulmonaris arteriæ æquali aut quasi æquali semper pede decurrenda erit: Cum autem truncus arteriæ in duos peculiare ac præcipuos ramos dividatur, quorum unus in dextrum, alter vero in sinistrum pulmonem excurrat, vis impetus impressa sanguini utrique pulmoni erit æquali ratione, aut quasi æquali tribuenda. Ibi autem aliquantisper stemus in anchoris observando motum sanguinis per truncum arteriæ pulmonaris; enim vero sæpe accidit prope basin arteriæ, per longitudinem trunci excrescentia polyposæ carnis, aut eminentia tuberculi, quo casu sectio arteriæ immi-

imminuta transeunti sanguini resistantiam feret; Verum quia ibi resistantia polypi obiecta sanguini non supponitur magna (mors enim brevi sequeretur,) sed ea tantummodo, quanta requiritur, ut polyposa materies resistantiam ferret sanguini fluenti, ac si materies ipsa polyposa in fluido ipso sanguineo ferretur; ideo cum resistantiæ corporum contra fluidum sint ut impressiones, seu ut percussiones fluidorum in obiectum corpus, percussiones vero unius ejusdemque fluidi sint in duplicata ratione celeritatum ejusdem (1); suspicari jure potest resistantiam, quam affert talis polyposa materies sanguini fluenti unius, ejusdemque texturæ & indolis, accedere quoque posse ad talem rationem duplicatam velocitatis ejusdem sanguinis: Quod si massa sanguinis adeo impura, & heterogenea fuerit; ut portio sanguinis, quæ una systole expellitur, diversa sit ab illa quoad densitatem & velocitatem expulsa altera systole ventriculi cordis; tunc cum percussiones fluidorum diversæ texturæ & indolis contra obiecta & resistantia corpora, sint in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatum & simpla densitatum eorundem; etiam percussiones massæ sanguinæ, densitate & motu variæ, facile accedent ad talem rationem compositam ex duplicata velocitatum & simpla densitatum; & consequenter etiam resistantiæ obiectæ sanguini a tali polyposa materia variæ fient, accedendo diversimode ad varias rationes compositas ex duplicata velocitatum & simpla densitatum. Itaque cum hujusmodi polyposa materies talibus rationibus probabiliter opponatur sanguini, communicata talibus rationibus resistantia, impedimentum feret proximis aut succedentibus quoque sanguinis particulis, & consequenter tota moles sanguinis ibi lentescere coacta erit; quamvis autem lentescens sanguis ultro progrediatur, nihilominus ex adepta tali lentescencia mole sua intumescit, urgetque necessario magis latera canalis ex ea parte, quæ vacat impedimento; minus vero urgentur latera illa, utpote solidiora, quibus impedimenta alte adhærent, a quibus major fit momento sanguinis resistantia. Cum itaque latera arteriarum magis dilatentur ex una parte, quam ex altera, erunt quoque motus restitutionis eorundem pariter inæquales; quare

sanguinis non versus lineam axis, sed inclinata & transversa directione motus irruet, ubi major inæqualitas dilatati canalis minorem fecerat fluenti sanguini resistantiam; Hæc arteriæ portio magis extensa, cum a continuis sanguinis vibrationibus arietetur, tandem aliquando obiectam membranam lædere poterit timendo aneurismate. Ulterius sæpe docet praxis aliunde etiam hujusmodi morbum oriri potuisse; cum enim in unica sanguinis uncia a dextro ventriculo expulsa, ratio momenti sanguinis præternaturaliter moti talis aliquando sit, ac tanta, ut naturæ legem superet, tunc si canales inertem texturam aut fibrarum tenuæ robur sortiti sint, coacti erunt cedere valido nisu sanguinis impellentis, & tandem aliquando cedente interiori tunica laxari ac rumpi; tale vitium in febribus evenire aliquando potest; etenim volumen sanguinis a dextro cordis sinu expulsum in statu naturali, & volumen ejusdem expulsum in statu præternaturali haberi possunt, ut solida similia, quæ inter se proportionem habent triplicatam laterum homologorum. Cum autem porositates seu interstitia voluminibus interspersa sint lateribus solidorum homologis proportionalia: latera vero solidorum sint in ratione subtriplicata eorundem, certe etiam pororum amplitudines, seu particularum sibi invicem proximarum distantiarum, erunt inter se in ratione subtriplicata voluminum sanguinis; Quamobrem cum in statu naturali impressio voluminis unius uncie sanguinis contra obiectas canalium membranas sit facile viribus membranarum resistantium proportionalis, proculdubio vi præternaturalis exaltationis dilatatis ultro particularum distantiiis inter se, volumen talis uncie sanguinis augendo sese in ratione triplicata amplitudinum pororum seu distantiarum, quas habent particulæ sanguinis proximæ inter se, impressionem efficiet contra canalium membranas ultra vires ac momenta membranarum resistantium; quare tandem aliquando tot violentis ac continuis percussionibus flagellatæ membranæ rumpi coactæ erunt. Ulterius hujusmodi læsiones non parum augentur, si prior unda sanguinis succedenti resistat plusquam deceat, quo casu succedentis sanguinis impressio non consumatur tota contra priorem sanguinis undam, juxta

(1) Ex corollar. prop. 42. Phoron. Herman.

juxta directionem longitudinis canalium, opus est majori ratione impetum ferri ad latera, quo major est resistentia sanguinis antecedentis; quare dilatatis ultro arteriæ lateribus fiet aneurismatis incrementum; præter hæc adeo aliquando vigent impedimenta, ut portio sanguinis gravi regressu irruens in valvulam, succedentem a dextro sinu motum sanguinis moleste impediat gravi vitæ periculo; quin imo uncia sanguinis traversis præternaturalibus directionibus itura, quoties pervenerit, ubi truncus duos in ramos partitur, facile inæqualem sanguinis quantitatem per unum pulmonem afferet, inæqualemque per alterum; summo respirationis incommodo, ob inæqualia pulmonum pondera & manifestam pulsuum inæqualitatem.

18. Præterlapso itaque majori trunco fluit sanguis per utrumque pulmonem juxta duorum ramorum directiones, cum autem unus pulmo alteri æqualis, aut quasi æqualis naturaliter esse debeat, facile quantitas sanguinis expulsa in dextrum pulmonem probabiliter futura erit cæteris paribus æqualis, aut quasi æqualis quantitati sanguinis expulsa in sinistram, & consequenter semiuncia sanguinis per unum, & semiuncia per alterum ferenda erit; pariter si vis impetus dextri ventriculi eadem sit, quæ semiunciam sanguinis per unum, & semiunciam per alterum pulmonem æquali semper momento impellat, erit spatium decursum a semiuncia sanguinis per ramum arteriæ pulmonaris in uno pulmone æquale cæteris paribus spatio decurso a semiuncia sanguinis per ramum arteriæ pulmonaris in altero pulmone; quapropter ex immortalis Galilæi demonstratis de motu æquabili, duæ semiuncie sanguinis eodem impetu cordis impulsæ decurrent cæteris paribus spatia quoque æqualia inter se; & consequenter, cum quantitates motus aut impetus fluidorum habeant (1) rationem compositam ex duplicato velocitatum, simpla densitatum & simpla foraminum, e quibus erumpunt, certe cum duæ semiuncie sanguinis sint æquales, & velocitates ipsis impressæ ab eodem momento dextri cordis sinus pariter inter se in ratione æqualitatis, foramina vero vasorum unius pulmonis supponantur naturaliter æqualia, aut quasi æqualia foraminibus vasorum alterius pulmonis; etiam

quantitates motus seu impetus unius semiuncie sanguinis æquales futuræ erunt quantitati motus alterius semiuncie sanguinis; quare etiam ascensus & descensus sanguinis transeuntis per foramina in uno æqualis probabiliter erit, cæteris paribus, ascensui & descensui sanguinis transeuntis per foramina æqualia in altero pulmone; & consequenter peripheria unius pulmonis decurratur per arterias pulmonares, ac peripheria alterius pulmonis per arterias sibi homologas; quapropter ab arteriis, in paritate circumstantiarum, æqualis aut quasi æqualis quantitas sanguinis in venarum pulmonarium orificia effundetur, & ab iis in sinistram ventriculum, æquali aut quasi æquali ratione deferenda erit. Verum si fluidi vitio (ut in pleuritide & peripneumonia ægre curatis cæterisque generibus morborum pectoris sæpe experimur) major quantitas sanguinis per unum pulmonem, minor vero per alterum excurrat, tunc cæteris paribus quantitas motus in uno, major erit quantitate motus in altero; sicque cum rationes compositæ ex duplicata velocitatum, simpla densitatum & simpla foraminum, e quibus erumpunt, multum inter se differant, gravior pulmo & fluidis ponderosior motum diaphragmatis ob costas ex ea parte minus elevatas quodammodo impediens, inspiratio fiet imminuta, & alto lateris pondere laboriosa respiratio. Ulterius sæpe ostendit Anatome unum aliquando pulmonem costas plus justo alligari, alterum vero non ita; quamobrem cum alligatus pulmo non possit ea libertate moveri, ac dilatari, qua alter solutus ac liber; manifestum est, in alligato pulmone impetum impressum sanguini refrangi debuisse, & quantitatem sanguinis non æquabili velocitate deferri; sic majus necessario in organo pondus cum inæquali ac difficili respiratione & graviore decubitu, hominem lædet; pariter quotiescunque pleuritis aut peripneumonia contingunt, pars pulmonis inflammata moram facit sanguini transeunti; sic tantum adest impedimentum sanguini adveniienti, quantum antecedens in sanguine est in parte inflammata; sic cum non perseveret ea ratio æquilibrii inter motum sanguinis antecedentis, & motum subsequentis, oportet sanguinem ratione motus, quantitatis, momenti & temporis a statu naturali

Sydenham Opera Med. Tom. II.

D d

& ra-

(1) Per prop. 31. Hermanni Phoron.

& ratione æquabilitatis recedere; unde inæqualitates pulsum, intermittentiæ & palpitantes sapissime eveniunt.

19. In hoc motu sanguinis per ramos arteriæ pulmonaris, patet observante Diemerbroekio (pag. mihi 412.) hujusmodi ramos, *per totam vesicularum substantiam instar artificiosissimi retis una cum vena pulmonari decurrere mutuis inter se anastomosis*. Hoc ipsum primo observaverat immortalis Malpighius; epistola enim secunda de pulmonibus asserit: *Tanta est horum vasculorum divaricatio, dum hinc inde a vena & arteria prodeunt, ut non amplius vasis ordo servetur, sed rete conflatum ex duorum vasorum productionibus appareat*. Quanam autem ratione hoc a natura factum sit, licebit nobis conjectari imposterum: Interim observandum est, pulmonarem substantiam jugulum versus angustiorē esse, versus vero costas spurias extensiorē & ampliorē; verum cum tam angusta portio, quam extensa suis proportionaliter vasibus doneatur, colligi potest, vasorum quoque ramificationes cæteris paribus pauciores esse versus partem superiorem, numero majores versus inferiorem; & sane cum thoracis portio versus costas spurias majori circumscribatur superficie, portio vero thoracis versus jugulum a minori superficie dimetiatur; las est quoque, contentum pulmonem versus costas spurias majoris esse superficie, minoris vero jugulum versus; cum autem pulmonum vesiculæ undequaque, tam sursum, quam deorsum effusæ sint, suspicandum est, majorem amplitudinem pulmonaris substantiæ versus partes inferiores oriri, & a quantitate majore vesicularum, & a majori ramificatione ac peripheria vasorum; huic animadversioni favet Archibaldus Pitcairnius, (1) assumit enim pectus tanquam sphaeroidem, cujus minor diameter sit digitorum 15. major vero digitorum 20.; cum autem sphaerois a minori diametro ascendendo versus majorem axem semper proportionaliter decrescat, colligendum putavi, capacitatem pectoris, (juxta supposita a celeberrimo Auctore) versus jugulum, in quo definit maior axis, esse angustiorē, versus vero costas spurias, in quibus definit minor axis, esse ampliorē; quapropter jure haberi potest, amplitudinem pulmonum versus costas spurias majorem

esse illa, quæ versus jugulum elevatur; major itaque vasorum & vesicularum numerus ac peripheria inferiorem pulmonum partem, minor vero superiorem ambit; hinc elevatio thoracis sensibilior in inferiori, in superiori vero jugulum versus debilior ac tenuior reperitur; Hinc gravi actione angitur animal, quoties in hepaticide pondus hepatis inflammati diaphragma & finitimas costarum appendices trahit inferius; costæ siquidem & diaphragma tenuissimo motu elevatæ, minusque quam par est, spatium vetant, quo pulmonares vesiculæ inferiores ad majores superficies extendantur, ut necessaria libertate moveantur, opportunum aërem suscepturæ; quapropter diinidiata respiratio & altus angor pectus opprimunt.

20. Fluit itaque sanguis sursum & deorsum ex utraque pulmonum parte, & a majoribus ramis traducitur in minores, minimasque ramificationes, usque dum minimi arteriarum rami facta cum minimis venarum luminibus deosculatione sanguis ab arteriis facillime in venas affluat; Huic autem motui ab arteriis in venas, non tantum auxilio est momentum cordis sanguinem impellentis, verum etiam clarum est, quod dilatato thorace sequatur statim oblatio resistentiæ, quam depressæ costæ & laxatum diaphragma contra superficiem extimam pulmonum exercent; ideoque cum ad fauces præsto sit aër, vel suo pondere, vel elaterio potens ingredi, quotiescunque auferuntur resistentiæ, sequitur, aërem tota vi irruere in pulmones, eosque quantum potest aperire: præterea constat ex Anatomie, intra areas reticulares vasorum, & circum vasa ipsa sanguifera adesse bronchiorum vesículas, quæ sphaericam quasi superficiem æmulantur aëre inspirato: cum enim pulmo debuerit esse viscus aëri excipiendo destinatum, certe opus fuerat, naturam vesiculis quasi sphaericis uti debuisse, ut aërem majori quantitate exciperet; cum enim sphaera sit quibuscunque figuris isoperimetris capacior, etiam vesiculæ quasi sphaericæ proportionaliter multum aëris supra ceteras figuras sibi isoperimétras erunt suscepturæ; sic in phthisi & hydrope pulmonum laxatis nimium ac flaccidis pulmonaribus vesiculis difficultas respirationis & gravis anhelitus sunt, eo quia flaccescentes

ni-

(1) Dissertatione de causis, quibus fluit sanguis per pulmones.

nimum vesiculæ, a quasi sphaerica figura, ad quasi spheroidem transeunt; cum autem hæc sphærois talis sphære isoperimetra minus capax sit, ut inferius constabit, ideo nimum laxatæ vesiculæ quasi sphaericæ pulmonum, & quasi sphæroideam figuram adeptæ minus aëris excipient, quam par est, unde tot incommoda evenient vitio respirationis: Uterius pulmo debuerat esse viscus leve & facile mobile, quare quasi sphaericis vesiculis dotari debuerat; etenim cum sphaerica corpora in punctis se tangant, etiam vesiculæ quasi sphaericæ punctualem quodammodo contactum servaturæ erunt inter se; quare interstitia & areas quamplurimas necessario relinquent, a quibus facile levitas major corporis exoriri potest, quæ certe non haberetur, si corpora illa vesicularia sub alia figura in planis se tangerent, a quibus cum multo pauciores areæ & interstitia relinquantur, certe in tam majori planorum adhæsiōe, & consequenter in tam minori interstitiorum numero gravitas & pondus visceris supra modum augetur; & sane grave esset experiri molestiam respirationis, quoties nervum illud ligamentum a Malpighio detectum (1) vesicularum parietibus alligatum convulsivo motu crisparetur; sic enim vesiculæ relicta superficie quasi sphaerica non amplius in punctis, sed quodammodo mutata figura in planis coguntur se tangere, factum inde, ut minus aëris excipiant & minora fiant interstitia vesicularum, unde visceris pondus gravius feret fastidium respirationis.

21. Cum itaque pulmo & naturali, & sæpe præternaturali motu moveatur, quo pulmonares vesiculæ figuram quasi sphaericam facile invertunt, sphæroideam quasi superficiem quodammodo acquirentes, non ineptum erit utriusque capacitates, quantum fieri potest, dimetiri, ut quantitas aëris in quasi sphaerica, & quantitas ejusdem in quasi sphæroidali vesicula proxime innotescant, ut pulmonarium morborum natura, quantum possibile est, aperiat; placeat itaque supponere vesiculam quasi sphaericam ABCD (2) cujus diametrum AB sit partium minimarum 6. certum est ex geometricis usu decimalium, hujusmodi sphæram ABCD esse proxime partium minimarum cubicarum 1130976.

modo supponatur, eandem quasi sphaericam vesiculam, aut convulsione, aut morbosa laxitate, taliter deprimi, aut contrahi, aut laxari, ut diameter AB partium minimarum 6, reducat in diametrum FG partium minimarum 4. certum est ea ratione, qua partes oppositæ diametri AB in hujusmodi sphaera ABCD invicem accedunt sub minori diametro partium minimarum 4. reliquas partes oppositas C & D æquali ratione a se invicem recedere, quare diameter EH (3) fiet partium minimarum 8. sic quasi sphaerica vesicula ABCD in quasi sphæroidem FEHG conversa erit ex geometricis proxime partium minimarum cubicarum 67. 0208. cum autem contenta corpora sint cæteris paribus in ratione corporum continentium, palam est in vesicula quasi sphaerica contentas partes minimas cubicas aëris, esse proxime ad partes minimas cubicas aëris contentas in vesicula quasi sphæroidali sphære quasi isoperimetra, in ratione numerorum decimalium 113. 0976. ad 67. 0208; quare talis sphærois continens, minus continebit particularum aëris, quam hujusmodi sphæra defectu partium minimarum cubicarum 46. 0768. proxime; Quamobrem cum defectus & vitium unius vesiculæ quasi sphaericæ transeuntis in quasi sphæroidem, omnibus vesiculis pulmonum convenire aliquando possit, quis non videt quantum aëris detrahendum sit, quoties universa pulmonum regio, aut convulsione contracta, aut pressione depressa, aut flacciditate laxata, ut in hecticis, & hæmoptoicis, tam gravi defectu laboraverit? Quamobrem cum opportunis naturæ operibus ea quantitas aëris necessaria fuerit, quæ a quasi sphaericis vesiculis contineri debuerat, manifestum est; a sola quantitate aëris in quasi sphæroidalis vesiculis collecta naturam necessario pati, & gravi asthma facili deficere debuisse. Hisce expositis, liceat tantillum supersedere nonnulla prius exposituro actionibus pulmonarium vesicularum necessaria; etenim quoniam pulmo viscus est, quo aër inspirando excipitur, & expirando expellitur, & cum ab aëris momento, tam sanitas, quam morbus foveri facile possint, opportunum est ibi nonnulla de viribus elastici aëris in pulmones conjectari, ut juxta nostrum instituerunt

D d 2

mor-

(1) Epistola prima de Pulmon. ad Borellum. (2) Figur. 2. (3) Figur. 3.

morborum pulmonarium semina inquirantur. De elasticitate seu viribus aëris & resistentia, summi viri roto orbe celeberrimi, Isaacus Nevvtonus, & Guilielmus Leibnizius mira docuerunt; postea vero Jacobus Hermannus immortalis semper laude decorandus, alique doctissimi Viri, inter quos summi nominis vir Joannes Polenus, cui multum debeo, majora de viribus aëris experti sunt; Inde Michelottus toties laudatus tantorum virorum sententias secutus refert (pag. 148. *de separatione fluid. in corpore Animalis*;) aërem esse fluidum grave atque elasticum, quod comprimi potest in spacia, quæ ponderibus comprimentibus proportionem respondent: ideoque talis nature, ut ejus densitates viribus comprimentibus, seu elasticitatibus quamproxime proportionales existant; Addit autem quamproxime, eo quia summi & incomparabiles viri Jacobus Bernollius, de gravitate aëris: & Joannes pariter Bernollius, de motu muscutorum pag. 23. analytice ostendunt, densitates aëris esse quidem elasticitatibus proportionales in aëre tamen parum denso; ceterum in aëre multum denso elasticitates in majori ratione crescere, quam densitates. Inspirato itaque aëre per tracheæ fistulas elewantur costæ, diaphragma deprimitur, & pectoris cavum necessario ampliatur; sic quæcunque vesiculæ pulmonares amplexu aëris quasi sphaerice turgent; portio itaque aëris, quæ inferiorem pulmonum partem occupat, cum necessario pressionem aëris superiores partes occupantis successivo vesicularum dilatatarum continentium contactu quodammodo pati conetur, inferior aëris quantitas superiori proculdubio aliquantulum densior fiet; quomobrem cum densitates sint elasticitatibus aëris quamproxime homologæ, cumque vesicularum inferiorum, (ut n. 19. innuimus) certe vis aëris inferiores vesiculas occupantis multo major erit vi illius, qui in superioribus vesiculis jugulum versus continetur; quare facile crederem, initium expirationis juvari non parum a vi aëris inferioris magis densi ac compressi, & consequenter magis elastici superiores vesiculas urgentis; etenim hujusmodi ratio aëris inferioris, cum ulterius, pulmonibus naturaliter se habentibus, pressionem pati non possit a superiori superincumbente ac supranitente, nec ultro densior fieri debeat, opus est, inferiorem magis compressum urgere debuisse superiorem aërem, ea videlicet ratione, qua prius superior inferiorem com-

presserat; cum autem superior aër, prout minus densus, & ratione pauciorum vesicularum quantitate minor sit, minorem propterea feret resistentiam actioni & viribus majoribus elasticis aëris inferioris; idcirco inferior aër valide urgendo, magisque dilatando contingentes vesiculas, & ab his communicato proximis tangentibus & superioribus vesiculis successivo contactu, superior aër ab inferiori valido nisu per bronchiorum foramina versus asperam arteriam aperta foras expelli debet, ut tandem aliquando inferior quoque aëris portio completa expiratione successive eliminetur; sic tali methodo aëris operantis, inspiratio & exspiratio reciproca & naturali motu exercentur; Verum si viribus aëris inferioris superiorem valide urgentis opponatur materia quædam lymphatica, aut alterius generis e glandulis tracheæ decidens, quæ bronchiorum foramina obstruat, tunc cum exitus aëris superioris expellendi ab elastica vibratione inferioris ægre fieri possit, resistentiam feret impulsui inferioris; quapropter oppositis viribus corporum contraoperantium grave asthma fiet, aliquando hæmoptysis, aliquando vero retardato motu sanguinis pulmonum inflammatio.

22. In hac re quærens actionem & momentum expirationis, altè miratus sum legens ex suppurationibus Bernollianis a Clarissimo Michelotto relatis, dilucideque explicatis, actionem & momentum fortissimæ expirationis, qua aër non solum ratione suæ elasticitatis, verum etiam opere muscutorum thoracis & diaphragmatis per laryngem expellitur, tam magni momenti esse, ut colligat Celeberrimus Auctor; *Velocitatem aëris fortissimo spiritu per laryngem expulsi absolute posse eodem ito tempore unius minuti secundi pedes 390. id est 400. pedes, id quod ita intelligi velis, nimirum aërem ex ore impulsam, nisi statim dissiparetur, sed uniformi cum velocitate, quam primo instanti habet, pergere posse singulis minutis secundis, vel singulis arteriæ pulsibus excurrere 400. pedes Parisienses*; quam sententiam ulterius confirmat Epistola, quam magnus vir Joannes Bernollius Clarissimo Auctori conscripserat; verum mirari desii, ut animadverti Bernollius & Michelottum de fortissima, non autem de placida, lenique expiratione sermonem habuisse; Ad superiora itaque redeundo, certum est, actionem inspirationis & expirationis magnum opus esse, ut natura fluidorum leges opportune regat; in-

spirato enim aëre pulmonares vesiculæ superficiem quasi sphaericam obtinent; expirato vero aliquantulum connivent, & laxatis quodammodo fibrarum ordinibus a quasi sphaerica, ad quasi sphaeroidalem superficiem leniter declinando deveniunt; hoc autem motu reciproco vesicularum, venæ & arteriæ vesiculis circumscriptæ, in inspiratione comprimuntur, in expiratione laxantur; sanguis itaque contentus inspirando magis stringitur & attritur, attritus vero succedente expiratione particulis, quibus componitur, opportune miscetur; hæc autem attritio sive resolutio necessaria est, chylus enim mox sanguini associatus, nunquam debita agitatione, missioneque opportuna perfici poterit, nisi vesicularum pulmonarium oscillatorio motu circumposita vasa elastice urgeantur; Licet vero celeberrimus Alphonsus Borellus (1) impossibile, aut saltem difficillimum censeat, partes sanguinis heterogeneas quantumvis attritas ac resolutas in pulmonibus inter se commisceri, angustissimorum canaliculorum culpa; nihilominus immortalis Malpighius totis viribus in opere posthumo pag. mihi 14. Borelli sententiam studet evertere, attritionem corporum & debitam missionem in pulmonaribus vasculis positurus; Quotiescunque autem agitatio, attritio & opportuna mixtio corporum in canalibus pulmonum satis apte exequatur opere præcipue elasticitatis aëris, vesiculas & consequenter circumsepta vascula reciproco motu dilatantis; proculdubio ex Malpighio suspicari ulterius possem, motum quoque sanguinis per pulmonaria vasa ad spiralem aut quasi spiralem inclinandum esse, (ut num. quoque 7. indicatum est;) Inquit etiam immortalis Autor eodem opere posthumo loco citato: *His accedet sanguinem in pulmonibus duplici motu agitari, a corde videlicet, & ab elatere aëris, aut adderem ego, ab elatere vesicularum, si non placeat, aërem in pulmonaria vascula sanguifera trajicere cum Malpighio; primo motu natura sentat motum rectum, in secundo fiunt ex laterali compressiones motus contrarii a circumferentia ad centrum, unde motus rectus perturbatur, quare ex his necessario sequitur mixtio, & attritio particularum sanguinis: Cum autem ex duobus hisce motibus eodem tempore exercitis,*

quorum unus rectus est, transversalis alter, necessario componatur motus quidam ex utroque motu compositus, qui necessario ex mechanicis inclinatus est & obliquus, videlicet quasi spiralis; conjectari licebit, motum sanguinis per pulmonaria vasa accedere posse ad motum quasi spiralem, vi cuius quoque felicius resolvuntur & atteruntur corpora, & attrita debite miscentur; quidquid sit tamen de hoc.

23. Conjectari liceat actionem inspirationis & expirationis non fieri tantummodo a motu musculorum intercostalium, actione diaphragmatis & opere elastico vesicularum pulmonarium; verum etiam adjuvari a motu peristaltico vasorum reticulariter positorum circa pulmonares branchiorum vesiculas; Enimvero autopsia constat, fibras omnes, & multo magis vasa quælibet ex fibris nerveis, muscularibus & membranosis elaborata peristaltico motu dotati; hujusmodi autem peristaltici motus artificio fibræ omnes post statum naturalis elongationis, intra sese contrahuntur & resipiscunt; quæ actio arteriis quoque & venis naturaliter accidit: & sane clarissimus Lyster (2) omnia prius edocuit, inquit enim: *Pulmonum vasa propter equalem connexionem cum bronchiis extendi & ampliari & similiter abbreviari & constringi.* Deinde vasorum pulmonarium abbreviatio aliunde fieri potest; vasa enim pulmonaria modo ingrediente aëre erecta sunt & extensa, postmodum egrediente aëre inflexa & inclinata laxantur & decumbunt; Vasa itaque arteriosa pulmonaria cum venosis retis in modum efformata placeat primo observare juxta naturalem longitudinem, postmodum vero intra sese contracta & abbreviata, ut exigit naturalis actio motus peristaltici: Itaque supponatur arteria ODC, (3) quæ venæ CMO retis in modum unita sit, in punctis connexionis O & C; sintque ambo vascula juxta rationem naturalis altitudinis OD & CM; naturalis vero latitudinis DC & MO describantque simul unita quadrangulum rectangulum OD CM. Postmodum opere motus peristaltici reciproca actione vascula hæc contrahantur, & abbrevientur; ita ut rectangulum ODCM contrahatur in rectangulum ED CF minoris altitudinis, ut evidenter in motu lumbricorum hujusmodi actiones facile

(1) Pag. 108. secundi Tom. de motu Animalium.

(2) Dissertatione de Humoribus pag. 20.
(3) Figur. 4.

mo; Ex his clarum est, quam facile transitus fieri possit a vera pleuritide ad peripneumoniam, eo quia quoties sanguis lentescere, aut impediri incipiat in extremis vasculorum finibus sive peripheria pulmonum, opus est, sanguinem ibi lentescentem adveniēti novo sanguini impedimentum esse allaturum, sicque communicato canalibus quoque majoribus ipso sanguinis impedimento parari quoque poterit facilis via ad peripneumoniam elaborandam; quate licet suspicari, *Spuriam Pleuritidem* vere non in pulmone, sed extra pulmonem, in musculis videlicet respirationi inservientibus, aut intra musculos & pleuram ponendam esse, ut frequentes cadaverum sectiones palam ostendere visæ sunt.

25. An autem particulæ aëris per bronchia excurrentes sanguinem ingrediantur, nondum adhuc a dimicantibus Anatomicis & Philosophis determinatum est; certum tamen est, aëreas particulas sanguini adesse, ut evidenter imposito sanguine in machina Boyleana clare innotescit, ibique elaterium suum exercet; hæc fortasse cum fuerint chylo commixtæ, facile in sanguinem traductæ fuerunt; Malpighius tamen licet ingressui aëris in pulmones assentiri videatur; nihilominus non aërem absolute, sed probabilius putat, *quid latitans in aëre & aqua etiam summe mobile & activum separari, quod fortasse luminis naturam sapit; ex urina enim, quæ est portio sanguinis luminosum corpus coruscans, famamque concipiens extrahitur, ut patet in Phosphoro Nobilissimi Boylei. Oper. Posth. pag. 16.* Sed hæc miræ non sunt; ante enim Malpighium non ab aëre & aqua tantum luminis particulas educi creditum est; verum celeberrimus Pater Grimaldus Societatis Jesu semper laudandus *prop. 47. num. 1. de Luce & Lumine*, in putrido ligno, noctiluca & vermicibus mirandam vim ad producendum lumen esse docuit; inquit enim: *Gratis & immerito suspicaretur aliquis, quod modicus ignis, aut lignum putridum & noctiluca, aliudve sive animalculum, non habeat facultatem gignendi in se lumen, illudve ad multorum milliarium distantiam ejaculandi tanto impetu, ut citissime ac per lineas semper rectas procedat, tum directe, tum reflexe, tum denique refracte.* Clarissimus quoque Vallisnerius tot meritis ubique celeberrimus,

tum in Italia, cum in Indiis aliquas cicindelas mihi indicare dignatus est, (1) quæ multum luminis ejaculantur; quare Anti præceptoris testimonio fretus facile credidi, quæ tam celeberrimi viri antea docuerunt. Sed relictis his, licet intento nostro opportunis, redeo ad Malpighium, qui in noctilucæ observationibus Angelicanæ societati traditis, notat concavitatem binis ultimis incisuris noctilucæ excitatam, succo quodam repleti, qui fons est luminis: *Malpighius in Oper. Posth. pag. 85.* Quamobrem ex his non mirabor, ab aëre etiam & aqua sanguinis animati animalis, pulmonum opere, separari quoque luminosa corpuscula & per pulmones in massam sanguinis ejaculari, ibique hanc intestinis motibus agitari; etenim cum luminosæ particulæ mobilissimæ ac tenuissimæ sint, vesicularum pulmonarium foraminula subire facile possunt, & in tangentia venarum & arteriarum vascula eadem lege penetrationis introire; verum ingressæ citissimo motu objecta fluidorum corpora valide urgent, totumque sanguinem intestina ac multiplici agitatione succutiant; ex his fortasse luminosis corporibus sanguinem ingressis, parum, aut minimum refractis alte rubescit in pulmonibus sanguis, quam ruboris indolem nitro aëreo fortasse minus recte clarissimus Mayovius adscripserat; Scio quidem in chymicis salia volatilia, si cum sulfureis spiritibus opportuna mixtione digerantur, tincturam quoque rubicundam induere, quæ præcipue in sanguine pulmonari ex similium corporum debita mixtione potest contingere; nihilominus cum hujusmodi phænomena, quæ ad colores spectant, luminosis corporibus præcipue debeantur; propterea in hac re pro particulis luminis ab aëre separatis per pulmones, & in sanguinem ingressis Malpighii sententiæ facile assentirer; Hinc suspicandum est, in cœnoso aëre & impuro sanguine minus lucis, minusque particularum luminis adesse, quarum vi particulæ sanguinis & lymphæ minus agitate coguntur imminuta agitatione, attritione & mixtione lentescere: Hinc inflammationes, hydrops pectoris, aut læsio respirationis paulatim accedunt; quidquid sit tamen de ingressu aëris in pulmones, certum est, a vitiato, aut pestilenti aëre brevi tempore sanguinem vitium trahere, innumeram timen-

(1) Epistola die secunda Decembris Anno 1722.

mendorum morborum familiam allaturum, quin imo non tenuis malorum numerus ab aëre quoque nimis elastico, aut nimis compresso fortitur. Enim vero, si forte contingat pulmonares vesiculas multatas esse materia quadam e glandulis tracheæ decidua, in bronchiis lentefcente; ut in asthmate humido; aut spasmodice contractas esse in minores areas; ut in asthmate sicco: tunc debita quantitas aëris a dilatatione naturali thoracis impulsæ in pulmones; cum non tota placide contineri, aut libere vagari possit intra pulmonares vesiculas, fas est, eam quantitatem aëris intropulsam densiorem fieri, nimisque compressam detineri in vesiculis: velut in statu violento; ibi autem cum densitates sint elasticitatibus quamproxime in ratione homologa, cumque vis elastica compressi aëris otiosa diu permanere non possit, validiori nisu, quam par est, urgebit & vim faciet contra vasa circumjacentia, vi cujus canalium sectiones imminutæ fient; unde libertate sanguinis circulantis aut impedita, aut imminuta, factoque motu sanguinis asymmetro, laboriosa & gravis succedet respiratio, & pericula inflammationis & suffocationis aliquando minabuntur.

26. Verum non istæ tantummodo sunt asthmatum & morborum pulmonarium causæ, faciliores fortasse & sæviores occurrunt; siquidem si seri particule a lymphaticis, aut e tracheæ glandulis in pulmonares vesiculas decumbant, ibique adeo colligantur, ut spatia illa glandularum impleantur, ab aëris particulis occupanda: proculdubio enorme pondus in pulmonibus emerget. Ut autem hæc magis manifesta fiant, necessarium putavimus pondera aeris & seri quamproxime indagare; cum autem pondus seri facilius haberi possit, si cum pondere aquæ communis comparari curaverimus, propterea ut intento nostro probabilior & proximior succedat eventus, nonnullas analogias præmittendas necessarium credimus inter serum & aquam communem diversi generis & regionis, ut determinatum seri pondus colligere facilius possimus. Itaque notandum est, celeberrimum Jacobum Hermannum *lib. 2. prop. 171. Phron.* ex supputationibus magni Jacobi Bernollii facile demonstrare, gravitatem aeris ad gravitatem aquæ fuisse in ratione 1. ad 800. Celeberrimus autem Taylor Anglus *pag. mibi 104. Methodo incrementorum directa & inversa* exposuit experimentum a clarissimo Haukesbejo factum,

ostendens aeris densitatem mediocrem ad densitatem aquæ esse proxime, ut 1. ad 820. cum autem densitates corporum sint ponderibus eorundem proportionales; idcirco pondus quoque mediocre aeris ad pondus aquæ communis Anglicæ erit ut 1. ad 820. proxime. Ita Archibaldus Pitcairnius Scotus, *pag. 189. de fluxu menstruo*, expertus est, gravitatem aeris ad gravitatem aquæ Scoticæ esse circiter ut 1. ad 1000. pariter nobilissima Academia Florentina *Experimento 255.* observavit, pondus aeris ad pondus aquæ communis fuisse in ratione 1. ad 1179. proxime. Ulterius acutissimus Pater Franciscus Lana in *suo Prodomo pagina mibi 53.* experimentis accuratissime institutis expertus est, pondus aeris nostri Brixiani datum vas replentis esse ad pondus particularum aquæ Brixianæ idem vas replentis quamproxime ut 1. ad 640. Hisce itaque præmissis placeat supponere, quod a Philosophis ac Medicis pro vero habitum est; serum nempe sanguinis præcise & secundum se & naturali in statu consideratum, nil aliud esse, quam ipsamet aqua communis; ut prima quoque Dissertatione numero 2. indicatum est. Omnes siquidem aqua communi vescimur & nutrimur; quare serum sanguinis secundum se erit aquæ communi quamproxime proportionale; quapropter colligi potest, aquam unius loci sub eodem volumine esse quamproxime ad aquam alterius loci sub eodem volumine: ut homologue est serum sanguinis alicujus hominis in primo loco sub eodem volumine ad serum alterius hominis in secundo loco quamproxime & sub eodem volumine; & permutando erit aqua unius loci ad serum sanguinis unius hominis in hoc loco & sub eodem volumine, ut aqua communis alterius loci ad serum sanguinis alterius hominis in hoc altero loco quamproxime; quare juxta nostrum propositum erit pondus aquæ communis Brixianæ sub eodem volumine ad pondus seri nostri sanguinis naturaliter se habentis, ut quamproxime est pondus aquæ communis Anglicæ ad pondus seri Anglici sanguinis humani; sed pondus aquæ nostræ communis est ad serum sanguinis nostri (*per numerum 16.*) in ratione granorum 1749. ad 1803. proxime; ergo etiam homologue pondus aquæ Anglicæ granorum 820. erit ad pondus seri Anglici sub eodem volumine, ut 820. ad 845. $\frac{1749}{1749}$ proxime; quare fiet analogismus ut 1749. 1803. 820. 845.

845. $\frac{555}{1749}$ Veritas autem hujus analogismi innotescit quoque usu logarithmorum; facta siquidem summa logarithmorum respondentium secundo & tertio numero proportionali & ab hac subtracto logarithmo primi numeri absoluti emerget logarithmus 2. 9271197. quamproxime indicans, quartum numerum proportionalem quæsitum esse 845. $\frac{555}{1749}$; Sed pondus aeris per experimentum relatum a celeberrimo Taylor ad pondus aquæ Anglicæ est ut 1 ad 820; ergo etiam pondus aeris ad pondus feri sub eodem volumine cum aqua Anglicana erit proxime ut 1 ad 845 $\frac{555}{1749}$.

Pariter cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri nostri sub eodem volumine sit granorum 1749 ad grana 1803 proxime erit pondus aquæ Scoticæ granorum 1000. ad pondus feri sanguinei Scotici sub eodem volumine, ut grana 1000 ad grana 1030. $\frac{702}{1749}$ proxime; sed pondus aeris ad pondus aquæ Scoticæ est per Archibaldum Pitcarium ut 1 ad 1000; quare erit quoque pondus aeris ad pondus feri sanguinei Scotici, ut 1 ad 1030 $\frac{702}{1749}$ proxime.

Ita rursus cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri nostri sub eodem volumine sit granorum 1749. ad grana 1803. pondus quoque aquæ Florentinæ granorum 1179. erit ad pondus feri sanguinis Florentini sub eodem volumine, ut grana 1179 ad grana 1215; $\frac{702}{1749}$ sed pondus aeris Florentini (per experimentum 155 Academiæ Florentinæ) ad pondus aquæ Florentinæ est proxime ut 1 ad 1179 ergo etiam pondus aeris ad pondus feri sanguinei Florentini erit proxime ut 1 ad 1215 $\frac{702}{1749}$.

Denique cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri sub eodem volumine sit proxime granorum 1749 ad grana 1803; pondus quoque granorum aquæ nostræ communis Brixianæ 640, erit ad pondus feri Brixiani sub eodem volumine, ut 640 ad pondus granorum 659 $\frac{702}{1749}$ proxime, sed pondus aeris ad pondus aquæ nostræ communis est ex Patre Lana in ratione 1 ad 640 proxime; ergo etiam pondus aeris ad pondus feri nostri sanguinis sub eodem volumine

mine cum aqua nostra communi erit proxime, ut 1 ad 659 $\frac{702}{1749}$; quare fiet ultimus analogismus sit, ut 1749. 1803 :: 640. 659 $\frac{702}{1749}$; hæc autem quarta proportionalis innotescet quoque usu logarithmorum; etenim juxta horum regulas operando emerget logarithmus 2. 8192850 proxime indicans quartum numerum proportionalem quæsitum esse 659 $\frac{702}{1749}$.

Hiscæ itaque repertis accedimus rationaliter conjecturis; enim vero si una vesicula pulmonaris contineat naturaliter particulas aeris, cujus pondus se habeat ut unum; si postea hæc eadem vesicula aqueis particulis repleatur, necessario pondus aquearum particularum erit proxime in ratione 640. ad 1; cum autem serum sanguinis gravior sit aqua communi sub eodem volumine in ratione probabiliter proxima granorum 1803 ad 1849, per regulas proportionum quoque manifestum jam est, gravitatem feri sanguinei in eandem vesiculam defluxi e glandulis tracheæ, & in eadem vesicula contenti fore proxime in ratione 659 $\frac{702}{1749}$: Quamobrem palam est, quam facile pulmo vitari possit, & in immensum alte gravari, quotiescunque non una tantum; sed plures vesiculæ pulmonares loco aeris, cui expediendo destinantur, feri particulis repleantur; Hinc constat, quam grave onus ferre debeant pulmones, quoties serosis humoribus saginantur; quamobrem fas est oriri necessario altam respirationem magnumque anhelitum fieri, & animal molestissima anxietate, ac stertore cruciari cum periculo suffocationis, aut saltem facillimæ dispositionis ad pulmonum hydropem elaborandum; quæ omnia passim contingere possent, nisi natura continuata expiratione & assiduo excreatus opere a fluenti humorum sarcina paulatim liberaretur.

DISSERTATIO III.

*De motu sanguinis per universum
Corpus cum Mechanicis mor-
borum causis.*

Pulmonum morbis brevi stylo exaratis instituti nostri ordo exigit, reliquorum morborum familiam querere, horumque causas eadem mechanica, brevique methodo, quantum rationales conjecturae serunt, invenire; sanguis itaque tum ascendens; cum descendens impulsui cordis motum debet; & quoties natura languente cor non otium fecerit, conatur impulsus sanguis ima & summa naturae loca rimari; verum quia sapissime fluidum hoc expulsa innocentia vitium trahit, propterea & naturalis hujus fluidi motus gravi naturae incommodo sequitur sanguinis culpam, & ambo funesto morborum numero animal diruunt; quae omnia ut quæram, superius conjectura nos docuit num. 15. : momentum sinistri ventriculi multo majus esse momento dextri; cum enim a ventriculo sinistro sanguis per universam animalis machinam supra & infra eodem tempore projici debeat, certe ventriculus sinister tantis momentorum gradibus donandus fuerat, utpote majoribus & robustioribus fibris munitus tanto oneri opportunus. Itaque a ventriculo sinistro ejaculatus sanguis arteriam magnam ingreditur, quae observationibus Anatomicis ad quatuor circiter digitos indivisa totum sanguinem quantitate & impetu amplectitur. In hujusmodi arteriae magnae principio animadvertit Clarissimus Bellinus amplitudinem arteriae, quae cordi affigitur, minorem esse amplitudine maxima sinistri ventriculi; sanguis idcirco a ventriculo expulsus cum non totus intra capacitatem arteriae cordi affixam per quatuor circiter digitos contineri possit, incipit urgere arteriae latera, quae extorsum quaquaversus dilatata inchoant motum pulsationis arteriarum; in hoc arteriae magnae principio hujusmodi sectionem circulem inquirendi necessitas postulat, quantitatem sanguinis dato tempore transcurrentis, quantum possibile est, investigare. Itaque licet sectiones arteriarum variae ac diversae sint juxta varias hominum moles,

etates ac figuras; nihilominus ex mediocri hominum altitudine pluries observata collegi, arteriam magnam prope basin, & per quatuor ultra digitos, ut plurimum huic diametro A B accedere (1); Methodo autem lineae circini proportionum divisa est linea diametri A B in 25. partes aequales; quare ex data diametro facile ex Geometricis reperire datum erit sectionem circulem arteriae ejusdem, sit enim diameter A B circuli quaesiti partium 25. — b, eritque quadratum diametri — b b partium 625; area itaque quaesita supponatur — y; Hisce suppositis cum ratio quadrati ad circulum inscriptum sit proxime ex Archimede, ut 14 ad 11, fiatque 14 — c; 11 vero — e; erit ergo Analogismus ut c.e : b.b. y; quare ex Geometricis erit aequatio c y — b b e, & dividendo aequationem per c, erit y — $\frac{bbe}{c}$

cum autem quadratum b b sit — 625 & e sit — 11, erit productum b b e — 6875, quod divisum per c — 14, erit $\frac{bbe}{c}$ — 491 $\frac{1}{14}$, seu juxta methodum decimalium — 490. 625. pro valore quaesito quantitatis y; quare sectio circularis A B E F, seu area quaesita arteriae magnae prope basin, cujus diameter est A B divisa in 25 partes, erit partium decimalium 490, 625. — y; Sic facto quadrato diametri M N (2) Arteriae magnae descendentes in sexdecim partes divisae superioribus aequales, erit hoc partium 256; unde reperietur area circularis M O N P arteriae magnae descendentes fore partium 200, 960 proxime: eadem methodo facto quadrato diametri Q R (3) arteriae magnae ascendentes in 12 partes divisae erit hoc partium 144, quare fiet area circularis Q S R V arteriae magnae ascendentes partium 113, 040 proxime.

28. Ex his sectionibus ascendentes & descendentes arteriae magnae aperte constat, quanta futura sit sanguinis quantitas per singulas sectiones transiens quacunque systole; cum enim a vi impetus sinistri cordis sinus impellatur ut plurimum sanguinis uncia, nempe grana sanguinis 480 (juxta *Vecheri mensuras*): ut cordatiores judicant Anatomici; cumque ratio sectionis circularis ascendentes arteriae ad sectionem circulem descendentes, sit ut 113. 040. ad 200. 960.

(1) Fig. 6. & 7. (2) Fig. 8. (3) Fig. 9.

960. juxta decimales, seu ut 12 ad 21 $\frac{1}{2}$ proxime; proculdubio juxta hanc rationem divisa quantitas sanguinis granorum 480, ibunt naturali lege & remotis impedimentis, grana sanguinis 174 $\frac{18}{11}$ per sectionem ascendentis, & grana sanguinis 305 $\frac{21}{11}$ ibunt per sectionem descendentis arteriz magnæ. Reperta autem sectione arteriz magnæ juxta rationem datæ diametri, animadvertendum est, hujusmodi sectionis peripheriam non statim conice stringi, sed per quatuor digitos productam usque ad divisionem arteriz nullam parere sanguini transeunti resistantiam; hoc autem summo consilio a natura factum videtur, ne per primum illud arteriz magnæ spatium facta sanguini resistentia, retropulsus sanguis impedimento esset successuro & motui libero sinistræ auriculæ. Cæterum hoc vitium facile accideret, si aut callo, aut tuberculo, aut polypo vestiretur arteriz principium, inæquales & inordinatas pulsationes pariturum, gravi vitio ordinatæ circulationis.

29. Modo secuturi motum sanguinis per aortam descendentem coniectamur, grana sanguinis 305 $\frac{21}{11}$ nempe drachmas quinque proxime, singula pulsatione inferius vibrari; sanguis autem, utpote grave corpus inferius descendendo variis motibus agitatur in arteria; quamobrem acturus de morbis supra & infra cor, ibi universaliter permittendum est, experimentis notum esse, eodem & æquali tempore pulsus vibrari in dextro carpo manu inferius demissa, ac in sinistro manu elevata; eodemque tempore vibrationem pulsus in utroque demisso carpo sentiri, ac in arteriis temporum, & in arteria cæliaca; quare ex chirurgicis observationibus manifestum est, eo & æquali tempore, quo cordis systoles vibrat quantitatem sanguinis, ambas cerebri meninges pulsationes suas edere cordis pulsationibus isochronas; quare ex his Celeberrimus Bellinus in suo tractatu de pulsibus pag. mibi 50. animadvertit, impetum per omnes arterias sanguini imprimi eo puncto temporis, quo cor constringitur: Præterea certum est, ut

num. quoque xi. innuimus, ramos majores arteriarum dividi in minores, & minores in minimos, & consequenter sanguinem a majoribus ramis fluere in minores, & a minoribus in minimas ramificationes; cum autem in vasculis toties divisus decrescant semper vasorum circumferentiæ, proportionaliter quoque augebuntur sanguini resistentiæ, & sic majora fient decrementa velocitatum sanguinis: idcirco ad ultimas minimarum arteriarum ramificationes delatus cum continuo & successivo decremento velocitatum, tandem aliquando deveniet ad motum quasi minimum: sic flumina quantumvis velocissima in plures, pluresque ramos divisa acquirunt singulis canalium divisionibus proportionalia semper decrementa velocitatum; inde experimur, sanguinem e capillaribus, minimisque canalibus carniū incisarum tali lento pede, quantumvis continuo, effluere, ut guttatim exstillet. Id vero præ aliis adversus celeberrimum Jacobum Jurium Societatis Regiæ Londinensis Secretarium demonstravit accuratissime Michelottus (1); Cæterum hanc rem legi quoque firmatam a doctissimo Bernardino Zenderino in celebri tractatu de China china referente, proportionem motus sanguinis a corde expulsi per magnam arteriam ad motum sanguinis in capillaribus vasculis observatum fuisse a clarissimo Jacobo Keillio in ratione 1000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 00 ad unitatem; quamvis hujusmodi proportio præcise definiri non possit, ut pluries animadvertit laudatus Michelottus de Separatione fluidorum &c.

30. Itaque arteria descendens plures ramos intercostales primo distribuit, qui per costarum musculos effusi morbos pariunt vitio respirationis; sic sanguis in arteriosis canalibus, aut ultro lentescens, aut aliquando stagnans, nec a venis facile exceptus, quantum par est, dolores laterum facile parat; sic muscoli intercostales a fixato aut lentescente sanguine obruri ægre elevant costas & deprimunt; sic diaphragma particeps vitii motus costarum parum & ipse deprimatur & elevatur respiratione aut ablata, aut imminuta. Infra intercostales musculos phrenica arteria per totum diaphragmatis spatium excurrit arteriosum sanguinem

E e 2

nem

(1) De separatione fluidorum pag. 101, 102.

nem diaphragmati donatura; proculdubio si sanguis aut nimio motu, aut densitate peccaverit, tunc diaphragmatis planum obruitur parta inflammatione; sic si nimia sanguinis copia, aut lentescens sanguis diaphragma inundet, tunc muscularia spatiola implentur, & circumferentia diaphragmatis contracta ad centrum accedere cogitur. Diaphragma autem costis alligatum costas itidem trahit ad centrum diaphragmatis, ibique arte retinet; sic costis non libere elevatis, nec expansis pulmonibus, & aere minori quantitate in ipsos ingrediente fit inspiratio imminuta, & expiratio nimium languida; præterquam quod diaphragmatis planum plus justo ponderosum, magisque iners ad motum, nec ascendenti chylo viam & manum avertit, nec pulmonibus libertatem: aliquando convulsis, contractisque nervis diaphragma excurrentibus stringuntur arteriarum sectiones impedita fluenti sanguinis libertate; musculares itidem hbræ eadem lege convulsæ manent contractæ, & nullo motu peristaltico serpentes sanguinem in otio tenent, ne ulterius in venas feratur; ex his exposita jam incommoda magis succrescunt, & concursu nervorum cerebri quoque opera diruuntur.

31. Infra diaphragma excurrit arteria cœliaca, cujus dexter ramus tribuit ventriculo gastricam dextram & omento epiploicam, pancreati dat pancreaticam, duodeno duodenam, cysticam felleæ vesicæ, & hepaticam hepatis elargitur arteriam; sinister vero ramus gastricam minorem parit, quæ per mediam ventriculi regionem effusa partitur, & coronariam stomachicam superiori ventriculi orificio donat, cingitque coronæ ad instar; & gastricam sinistram, quæ deorsum ad ventriculi superiora & ad pylorum transfertur; sinister quoque cœliacæ ramus emittit gastro-epiploicam, quæ superiore omento suffulta & omento, & sinistro fundi ventriculi lateri ramos tradit; Ulterius quosdam ramos pancreati, & lienis multos elargitur; ex tot autem arteriæ cœliacæ ramis ad tot viscera decurrentibus, manifestum est, horum viscerum labes & vitia facile invicem convenire; etenim si massa sanguinis sylvestri sale gravida vitium fecerit, ea portio, quæ per gastricas arterias & per gastro-epiploicam fluit, regionem ventriculi madefactura stomachi membranas punget acerrime; sic acriter contractæ vomitum, aliquando singultum, aliquando sto-

machi dolores, languores, anxietates & ly-pirias febres ventriculo inflammato parturient; quin imo contractis stomachi fibris contrahuntur quoque arteriæ, & spatia arteriarum fient minora; sanguis propterea succedens cum resistentias majores reperiatur, incipit lentescere, cogitque venturum sanguinem per alios vicinos, magisque apertos canales majori quantitate inferius effluere; sic cum arteriæ epiploicæ, & gastro-epiploicæ ramos quoque omento donent, fluit sanguis per inferiores omenti ramos, plusquam decet, ea videlicet ratione, ut tantum motus & quantitatis tribuatur vasculis omenti, quantum motus & quantitatis a ventriculi arteriis detrahitur; sicque vitio opportune & proportionalis distributionis massæ sanguineæ, tumefactæ magis omenti arteriæ abdomen quodammodo elevant, ut in hypochondriacis sæpissime experimur; sensibiles propterea fient arteriarum pulsationes in abdomine; eo quia cum ex angustia contractorum vasorum stomachi necesse sit sanguinem majori copia per alios vicinos canales, qui canalibus stomachi correspondent, viam querere; ab augmento quantitatis sanguinis augetur quoque ejusdem velocitas; sic cum a quantitate majori sanguinis dilatentur magis arteriæ, & ab augmento velocitatis celerius distrahantur extrorsum arteriarum latera, opus est ab utraque causa arterias in hypochondriacis affectionibus sensibili magis motu pulsare; quare non semper in hypochondriacis accusanda est nervorum convulsio, non semper flatuum contentorum impetus. Dexter autem cœliacæ ramus cum pancreati, duodeno, & vesicæ felleæ vasa ferat, jungit quoque communione vasorum & pancreatis & duodeni & vesicæ felleæ morbos & vitia; quoties enim sanguis impurus fuerit, pancreatis glandulas deposita fece facile obstruit, eademque lege arteriarum communicantium impeditis cystis felleæ vesiculis, aut non æque separant adustum sulphur, aut separatum languescit iners ac vapidum, quod per choledochum ductum in duodenum delatum inepte in officio est chylo depurando; si forte a succis præterfluentibus irritato duodeno convulsæ crispentur duodeni latera, arteriæ duodenum vestientes angustiores fiunt, mutantur arteriarum directiones, & obliquitate facta transeunti sanguini moram ferunt; cogitur idcirco succedens sanguis reterdato motu alio declinare,

re,

re, & pancreaticam & cysticam arteriam motu & copia inundare; pancreatica idcirco & cystica majorem sanguinis quantitatem excipientes, quam par est, temporibus æqualibus, & majores pancreati sales, & vesicæ felleæ adusta & acria sulfura largius donant, ambæ suum visceribus incommodum paraturæ; Hujusmodi incommoda sibi parat superius ventriculi orificium, quoties arteria coronaria convulsis nervorum fistulis, quæ per os ventriculi superius repunt, suo in officio orietur, ne sanguinem libero pede ducat.

32. Postmodum magno in officio effusæ serpunt per mesenterium meseraica arteria superior, quæ omnia intestina tenuia, & meseraica inferior, quæ crassa undaquaque circumligant; verum quia motum sanguinis per hæc vasa sæpe sæpius a contento flatuum impetu viriari facile est, non erit fortasse ineptum hac data loci opportunitate circa flatuum vires conjecturas indicare, a quibus & intestina, & vasa intestinalia pati sæpe sæpius contingit. Itaque cum flatuum materia nil aliud esse videatur, quam aggeries particularum aeris, quibus salinæ sulfureæ & aqueæ ciborum solutorum particulæ associatæ sunt, rationabiliter suspicari licet, ex natura aeris flatuum quoque indolem ac vires simili lege nos assequi posse; idcirco numerabo status inter fluida dissonanter gravia, quorum viribus tria præcipue conspirare visa sunt, *densitas nempe particularum, earundem vis elastica, & calor agens*: Itaque cum densitates aeris sint elasticitatibus quamproxime proportionales, flatuum quoque densitates elasticitatibus suis quamproxime proportionales habendæ erunt; quapropter cum flatuum particulæ aliquando densiores sint, aliquando rariores; quoties flatuum materies densior fiet, tunc horum vis elastica major erit; minor vero, quoties flatuum materies minorem densitatem exceperit, notum jam est, status in intestinis familiari & consueto cursu sursum, deorsumque decurrere, ut libere aut supra, aut infra exire possint, neque intestinalis familia pati solet nisi violenta erectione horum itus, reditusque impediuntur; sæpiissime autem accidit, aut a contracto

nimis ani sphinctere, aut ab induratis in recto fecibus, aut a coli valvula nimis tensa una cum pyloro alte contracto status non ea libertate ferri posse, ut per superiora, aut per inferiora egrediantur, quo casu intestina pati acerrime opus est. Enimvero si quantitas flatuum claudatur infra coli valvulam intra intestinum rectum, indurata vero feces, aut spasmodica contractio sphincteris ani, horum egressus impediunt; tunc cum coli valvula introitum donet versus rectum, regressum vero impediat, opus est, status contentos varios densitatis gradus esse acquisituros, juxta quos, cum horum vis elastica sit quamproxime proportionalis, necesse est flatuum vires ea ratione contra objectos intestinorum parietes elasticè arietare debuisse, quam gradus densitatis postulaverint; cum autem isti gradus densitatis aliquando summi esse possint, summa quoque vis elastica flatuum futura erit damno summo intestinorum. Præter densitatem urget vim elasticam circumjacentium viscerum calor, vi cujus flatuum particulæ rarefactæ majus spatium querere coactæ sunt; enimvero cum calor (1) sit ut impressiones particularum corporis calidi in quopiam objecto corpore calorem excipiente, hujusmodi autem impressiones sint in ratione composita ex duplicata celeritatum particularum calidarum, & simpla densitatum earundem; proculdubio colligi potest, quantum extendi & rarefieri proportionaliter debeant flatulentæ materiæ, quotiescunque præter actionem naturalis elasticitatis, gradibus densitatis homologam, a calore viscerum, aut alterius generis ultro urgentur; videlicet in ratione composita ex ratione elasticitatis flatuum restrictorum & densitatis corporis calidi ambientis, & quadrati velocitatis particularum ejusdem; quare si flatuum restrictorum elasticitas acquisitæ densitati homologæ supponatur — e; corporis vero calidi ambientis densitas — d; velocitas vero particularum corporis calidi — u; erit caloris actio seu momentum a calore circumjacentium viscerum, aut alterius generis excitatum contra status tali ratione restrictos, ut $e \div d \div u u$; Juxta quam rationem rarefieri flatulenta cor-

(1) Prop. 85. Herman. Phron.

corpuscula valde conantur, ingens magnumque spatium occupatura. Quæ hucusque dicta sunt de vi & momento flatuum contentorum, & restrictorum in recto intestino infra coli valvulam, simili ratione de flatibus contentis, & restrictis in reliquis superioribus tenuibus intestinis, aut pressione, aut convulsione spasmodice contractis philosophandum erit: sæpissime etiam in intestinis separantur a glandulis intestinalibus fluida quædam, aut aliunde efflunt hinc inde succi e choledocho ductu, aut pancreatico, qui cum particulis aeris intime commixtis tractu temporis in rugis, aut intestinorum cellulis densiores fiunt, viscosi, glutinosi, aut austeri; quapropter latentes aeris particule intus inclusæ, & violenter compressæ taliter agunt, ut ab extraneo viscerum calore tandem aliquando dissoluta horum succorum viscosorum compage, collectæ intus aeris particule elaterium suum alte exerçant; & ad majus & grande spatium rarefacta & ejaculata succorum elementa, quibus miscentur, violente in intestinorum membranas arietent, & salinis particulis, quibus uniuntur acerrime, altis lancinationibus urgeant: sic summi hominis fama Leibnitius rationem explicuit, ut refert Michelottus pag. 44. *de separat. fluid. cur aqua frigore in gelu conversa tormentum bellicum, in quo continetur, divellat, & impetuose diffringat, id enim ita fieri existimavit, aquæ fluiditate per frigus ablata particule aeris compressi latentes inter aquæ partes uniuntur, glandioresque evadunt, ideoque magis idoneæ sunt ad agendum in latera tormenti bellici*. Intestina itaque tantumvis impulsæ & salibus acutis vulnerata spasmos, tormina, & dolores parturiunt. Hic sæpe a flatibus singultus, colicæ affectiones, & inverso intestinorum motu enormi cum vomitu volvulus aliquando succedunt; fere semper ab alto flatuum elaterio extensæ fiunt intestinorum membranæ, & abdomine elevato tota quanta est abdominis regio tympani in modum, & resonat & intumescit. Deinde sæpe contingere potest, flatulentas particulas majus spatium adepturas vasorum lacteorum oscula versus cavitatem intestinorum jam aperta violentissimo motu ingredi, & per tenuissima hujusmodi vascula elastico nisu excurrentes hæc gravi ruptura divellere, inde effuso sero incurabilis hydrops a flatu absque ullo aut acris, aut copiosæ lymphæ vitio continget.

Ulterius ex his impedito diaphragmatis motu angitur animal difficili respiratione. Verum majora aliquando damna parturiunt flatus, quoties contractis in spasmos, aut nimium extensis intestinorum membranæ, vasa meseraica quæcunque per tenuia, & crassa intestina ubique vagantia arcte contrahuntur, fiuntque aut impeditæ, aut imminutæ sectionis. Sanguis enim fluxurus motu suo impeditur, ne libere circumeat; stagnat idcirco intra contractos intestinorum parietes cum acri intestinorum inflammatione; præter hæc sanguis stagnans, aut lentescens impedimento est sanguini succeduro: sic arteriæ meseraicæ impeditæ, aut lentescente sanguine turgidæ pulsant enormiter viam sibi paraturæ, & aliquando cum mesenterii inflammatione interni abscessus erumpunt; sic in affectionibus hypochondriacis alte grassantibus cum gravi intestinorum borborygmo non levis timor est, quin hujusmodi mala aliquando succedant; deinde ob hujusmodi solidorum ac fluidorum vitia peristalticus intestinorum motus, aut lentus fit, aut nullus; nullæ propterea a glandulis intestinorum; nullæ, aut paucæ extra intestina promoventur fæces; & oriantibus intestinis succi hepatici & pancreatici naturæ damno languescunt.

33. Harum arteriarum meseraicarum opere utiles particule ab inutilibus pederentim separantur a sanguine mechanica glandularum intestinalium structura, in quas arteriæ ipsæ desinunt; separationis autem artificio succurrit præcipue peristalticus intestinorum motus; unde postmodum sæculentæ particule in unam massam collectæ naturæ commodo foras ejiciuntur. Naturæ artificium observanti liceat conjectari, intestinorum figuram cylindricam esse, aut ad cylindricam accedere, & meseraicas arterias; ita & socias venas esse cylindro intestinali circumscriptas, & circum intestina ipsa describere arcus aut circulorum segmenta. Quoties itaque in motu peristaltico intestinales annuli versus axem minoris sectionis fiunt, arcus seu segmenta circumscriptarum arteriarum sibi invicem accedunt, & curvitas segmentorum necessario major fit & elevatur; e contra in eodem peristaltico motu, quoties extenduntur intestinales annuli recedendo ab axe, proportionaliter recedunt a se invicem, etiam arcus, seu segmenta arteriarum, & curvitas eorundem minor fit, & homologa ratione deprimitur. In hoc

hoc autem motu arteriarum intestinalium transeuntium a majori curvitate ad minorem, elementa sanguinis in fistulis arteriosis contenta & per has continuo permeantia, continuo quoque motu succutiuntur, & quassantur valide; rumpuntur propterea eorum nexus inter se, solutisque particulis, aut ad solutionem magis, magisque dispositis facilius per glandularum intestinalium foraminula foras erumpere datum est, ut in intestinalem cavitatem liberius continuo delabantur. Separatae faeces a vi & a momento peristaltici motus promoventur ulterius versus rectum intestinum, ut inde a corpore tanquam caput mortuum paulatim eliminentur; ceterum si ab angulorum salibus irritata intestina convulsa torqueantur, non solum intestinorum sectio minuitur, verum etiam arteriarum, & venarum intestinalia vestientes crispantur. Ab hac autem vasorum crispatura assertur sanguini fluenti resistentia, fiuntque elementa sanguinis magis unita ac densa, propterea ad motum necessarium minus apta; motuque ulterius retardato fibrarum intestinalium inflammatio supervenit, peristaltico motu inferiora versus aut enervato, aut deperdito; faeces idcirco & contenta cibaria cum inferius ferri non possint, aut ægre ferri debeant, coguntur sursum ascendere, & molesto, frequentique vomitu volvulum parant; etenim cum intestina cylindri in modum elaborata sint, quoties una pars inflammari incipit, pars hæc inflammata, aut omnino constringitur, aut saltem minoris fit sectionis; quare cum cylindri intestinalis superior portio, inflammationis expers, latior adhuc remaneat, inferior vero ob inflammationem strictior & angustior reddita sit; sectio ista intestinalis cylindrica ad quasi conicam sectionem accedet; descendentes itaque materiarum, quæ in spatio cylindrico prius continebantur, cum in spatio quasi conico contineri non possint, retropulsæ coguntur ascendere, ubi spatium majus sectionis superioris latius est, ut infelici motu superiora versus expellantur. Ibi autem agendo de motu peristaltico intestinorum prætereundum non est, probabile judicari posse, separationes fluidorum e glandulis intestinalibus fore facile in ratione composita ex rationibus densitatum liquorum, & orificiorum, e quibus effluunt, & numero motuum seu (liceat dicere) oscillationum fibrarum elasticarum, a quibus naturaliter peristalticus

motus continuo exercetur. Quamobrem, si aut a catharticiis medicamentis, aut a succis, quorum angularis inest superficies, intestina decurrentibus, fibræ intestinales continuo stimulo irritentur, ut motus peristalticus intestinorum ultra debitum naturæ modum celerior fiat ac frequentior; tunc copiosæ necessario quantitates liquorum heterogeneorum a glandulis intestinalibus, æqualibus temporibus separabuntur, in ratione nempe composita ex rationibus densitatum liquorum, & orificiorum, e quibus effluunt, & numero motuum seu oscillationum fibrarum elasticarum. Quapropter ex hisce rationibus quoque constare potest, cur serosa ac fluida corpora facilius ac copiosius excernantur, quam solida & viscida? unde tam facile serosæ purgationes & diarrhææ contingant? etenim cum serosa ac fluida corpora minus densa sint, magisque prompta ad motum, hæc minorem serent resistentiam motui elastico fibrarum, & consequenter hæc, cæteris paribus, a tam frequenti fibrarum elasticarum motu agitata per glandularum intestinalium oscula erunt facilius separanda, deinde cum sæpe accidat, massam sanguinis angulosis alias particulis plus justo repleti, hæc salium massulæ circa proprium axem rotantes, fibrosa non solum sanguinis filamenta scindunt ac lacerant, verum etiam arteriarum & venarum extremitates inauspicato erodunt; factum inde, ut filamenta sanguinis lacerta ac divulsa ex intestinalibus osculis supra modum egrediendo, molestas, gravesque dysenterias aliquando vitæ occasu parturiant; effrænes quoque motus succorum, bilis & succi pancreatici facillime abraço naturali intestinorum muco motum peristalticum acutissime stimulant heterogenea fluida sanguini permixta ab evanescentium canalium osculis gravi dolore evocant, ut inferius ano stimolata copiosis purgationibus ejiciantur.

34. Utrunque ad altus emulgentes arteriarum horizontali directione primo incedunt, deinde substantiam renum ingressæ, & superiores & inferiores renum partes tranant muriaticos ichores a sanguine glandularum renalium ministerio separaturæ; Vasa siquidem in minimos minimosque ramulos divisa, & per substantiam renum undequaque effusa, tribuunt probabiliter filamenta sanguinis in renales glandulas juxta rationem compositam ex ratione luminum & ratione visio-

velocitatum (1); cum autem orificia ultima seu lumina sint minima, eo quia vasorum circumferentia semper decrescunt in ratione diametrorum, & velocitates pariter minimae sint in tot divisionibus arteriarum; singula vasa deponent minimas quantitates sanguinis quacunque pulsatione arteriarum in glandulas renales, videlicet filamenta sanguinis guttatim effundent; cum autem talium glandularum opere sanguineus latex falsos sales praeter ceteros abunde separet, quorum figura cubum describit, facile cubici hi sales planis undequaque homologis invicem adaptantur, sicque uniti una cum ceteris crescunt enormiter, & alte in pelvim collecti arenulas, & calculos facile construunt.

35. Inter praecipuas descendunt inferius arteriae crurales externae & internae, utraque amplo foramine donatae; Interna per femur distributa mutato nomine poplitea duas in partes aequales divisa, & genu & tibiae ad pedes usque surculos ibique distribuit; Cum pes totius humanae machine pondus sustineat, necesse fuerat, hunc una cum tibia & fibula valide musculorum cingulo armari: tantum opus & onus musculorum egebat grandi vase, quod sanguinem ferret validis muneribus parem. Ibi certe cum harum partium muscoli super ceteros fortiores sint, & per diversas directiones prompti ad motum excurrentes ibi arterias continuo, forsque impetu magis exagitant; & sane talis & continua arteriarum successio necessaria supra modum fuerat; etenim cum sanguis ad has partes delatus magis a corde distet, & velocitas huius per inclinatos surculos arteriarum eo minore esse possit, quo reciproce major est distantia a corde: musculorum validorum actio necessaria fuerat, ut dato majori impetu in inclinatam arterias, enervatam quodammodo sanguinis velocitatem restitueret; cum enim muscoli arterias crurales vestientes motibus suis continuo premant arterias; circulares arteriarum sectiones aut fient minoris sectionis, aut transibunt velut in ellipticas; ex his conjectari potest, ibi posse augeri velocitatem sanguinis ratione quasi reciproca sectionum imminutarum; sic tali methodo

fluens sanguis per remotiores quoque corporis partes facilius, citiusque in venas transfertur ad cor denuo reversurus. Experimur itaque quoties otio marcescunt homines negligentia, sive inertia musculorum, infernas partes supra modum sanguine lentescere intumescere; sic fit oedematofustumor, & compressae partes soveam ponunt; fateor quidem non tantum ab imminuta velocitate sanguinis canalium, & musculorum vitio oedema fieri; verum etiam ab impura sanguinis constitutione, cujus vi sulfureae massulae in statu inertiae ceteras sanguinis particulas inutili momento urgent. Sanguis itaque beneficio motus cruralium musculorum eam velocitatem acquirens, quam tanta a corde distantia abstulerat, urgetur in finitimas venarum fistulas; addito quoque momento gravitatis sanguinis naturaliter descenditis.

36. Ut itaque transferatur sanguis ab arteriis in venas, plura conspirant; primo nempe quantitas impetus impressa sanguini; haec enim non tantum a momento cordis sanguineo fluido alte imprimitur; verum etiam a vi descensus per vasa arteriosa, & a motu peristaltico arteriarum descendit, & musculorum continua vi agentium in subjectas arterias: huiusmodi enim quantitas impetus conservata urget sanguinem, qua data porta, oscula autem venarum, cum proxima sint finibus arteriarum, & aperta remaneant opere fibrarum circularem, credi potest se habere, ut vasa communicantia, sanguinem continuo susceptura; interponitur siquidem finibus arteriarum cum venarum luminibus nexus, & numerus fibrarum, carniarum & membranarum non impedimento motus in venas, sed auxilio; enimvero cum fibrae omnes intermediae suo quoque motu peristaltico donatae sint, sanguinem ab arteriis jam effusum in motu tenent, & postquam sanguine repleta fuerint exilia illa carniarum spatiosa intermedia, facile est credere intermedias has carniarum areolas; quotiescunque extiterint fluido jam repletae, supplere vices planorum horizontalium; quae horizontalia plana, cum ex demonstratis a magno Galileo (de motu) nihil auferat impetus a sanguine

(1) Per prop. 30. Hermanni Phron.

ne jam descenso ab arteriis; immo multum adjuvant motum corporis transeuntis, seu descendens ab uno vase communicante, seu uno plano in aliud planum, per quod cogitur ascendere; & cum nulla adsint corpora recipientia præter proxima, & aperta venarum lumina; necesse est filamenta sanguinis venarum oscula introire, & ingressa ascendere; sic servato æquilibrio sanguinis descendens cum ascendente sustinetur iustus ordo, & æqua lex sanguinis circulantis, & exeuntis a corde per arterias, & in cor æquabili velut motu per venas ad eandem altitudinem ascendens. Quotiescunque itaque aut vitio fluidi, aut carniū interceptarum impedimento, ut in obesitate sapissime accidit, arteriosus sanguis aut ægre, aut inepte venas ingrediatur; tunc effusa sanguinis portio carnes aut opprimit, aut inflat; inde erysipelata, aut carniū extremarum œdematosa intumescens succrescunt. Profunt secundo ascendenti sanguini per venas valvulae, quæ frequentes in inferioribus, rariores in superioribus venas secant; hæc siquidem cum ascensu sanguinis viam donent, descensu impediunt, sustinent onus sanguinis elevati, ne momento suo inferius labatur; præterquam quod huiusmodi valvulae venis inserviunt, ac si essent vincula, seu specifi aggeres, hinc inde dispositi, ne facile a momento sanguinis laxæ venarum tunicæ frangerentur; quod si aliquando accidat, vel copia, vel impetu sanguinis ascendens venarum tunicam, aut laxari nimis, aut rumpi, aut valvulam quamlibet vitium facere, aut flaccescere; tunc laxatis venarum tunicis varicosæ fiunt venæ impedimento sanguinis ascendens, & gravi onere musculorum. Tertio succurrit ascensui sanguinis unio, & contactus arteriarum cum tota longitudine venarum; dum enim arteriæ dilatantur diastolem ferentes, juxta rationem arteriæ dilatatæ, venæ portio, quæ arteriam dilatatam tangit, in ea ratione constringitur; quare sectio venæ compressæ non amplius circularis erit, sed describet segmentum circuli; sanguis idcirco, qui per circularem venæ sectionem ducendus fuerat, cum per segmentum circuli iturus sit, necesse est hunc altergeri, & impelli majori velocitate sursum, ubi data est latior & facilius via; etenim cum venæ deorsum semper magis magisque stringantur, sursum vero magis magisque dilatentur, & ultro impetus sanguinis ad-

venientis versus superiora detrudat sanguinem, fas est fluidum in segmento circuli restrictum, ac compressum sursum esse velocius ad ascendendum. Quarto huic ascensui sanguinis manum affert venarum unio inter se, efformans majores alveos, seu in venarum ascensu componens majores truncos venarum; sicut enim trunci arteriarum in plures, pluresque ramulos dividuntur descendendo, ita plures viceversa, pluresque rami venarum cum ramulis arteriarum communicantes progressu suo ascendendo ununtur, & componunt majores alveos, seu truncos venarum, qui eo pauciores sunt ramulis venarum minimarum, quo sunt capaciores in ratione sectionum; sanguis propterea ab huiusmodi minimis venis exceptus, in ramos majores earundem transfertur; verum cum rami majores sint veluti majores alvei, quorum officium est communi amplexu excipere a minoribus varias, diversasque quantitates sanguinis; proculdubio velocitas sanguinis in ramis majoribus, & momentum ejusdem majus erit, ac fuerat in minimis venis; quomobrem collecto sanguine in trunco maximo venæ cavæ, cum proportionali augmento velocitatis dextro ventriculo tribuitur, proportionali ordine, ac homologa velocitate, qua prius expulsus fuerat e sinistro; sic motum sanguinis per venas naturali jure natura regit; cæterum si impurus sanguis ponderosior fiat, aut nervorum injuria spasmodicis motibus venæ crispentur, aut tuberculis, aut polypis stringantur venarum sectiones, statim mutatur ordinata lex motuum, non servatur opportuna velocitas, nec debita quantitas æquali tempore cordi tribuitur; hinc ortæ palpitationes, inæqualitates pulsuum, & aliquando liporhythmia animal miserime torquent; præterquam quod cum venosus sanguis aut vitio sui, aut organi resistentiam afferat sanguini subsequenti majorem, quam par est, momentum resistentiæ paulatim arterioso sanguini secuturo communicatur; sanguis propterea arteriosus cum fluere ægre debeat, nec resistentiam venosi sanguinis superare facile possit, arterias ad majores sectiones nimio sanguine turgidas violenter extendit, & quodammodo retropulso sanguine pulsant violentius hypochondria; & arteria cæliaca, ut in hypochondriacis & hysteriacis affectionibus accidit, alte quatit circumposita viscera, molestiam ventriculo, & internas ali-

Sydenham Opera Medica Tom. II.

F. I

quan-

quando inflammationes paritura.

37. Quanam autem sit methodus, aut ratio linearum motus, quam describit ascensus sanguinis per venas, nondum a nonnullis, quod sciam observata est; juxta tamen naturæ leges verisimile putaverim, sanguinem per venas pressionis seu impulsus motu valide quoque sursum urgeri, & filamenta sanguinis ascendendo describere, ut plurimum lineas ab axe venarum divergentes. Cum enim sanguis sit grave fluidum, & ratione propriæ gravitatis conetur descendere, vi autem & impetu cordis fortiter sursum impellatur, cumque major sit vis illa & validior, quæ vi cordis sursum impellit, minor vero & debilior, quæ solo momento gravitatis sanguinis deorsum sanguinem urget, sanguis sursum movendus erit juxta rationem excessus momenti cordis sursum urgentis, supra momentum sanguinis deorsum prementis. Deinde cum doctissimus Verheyen (1) venarum tunicas æquali numero, eademque fere structura esse, ac sint tunicæ arteriarum, licet primæ secundis tenuiores sint, ostendat; cumque ex Diemerbrokio arteriarum fibræ nonnullæ transversæ sint & obliquæ, etiam venarum tunicæ a fibris quoque transversis & obliquis vestiendæ erunt, ut lib. 7. de Venis contra Lindanum aperte decrevit; quare cum præter hunc fibrarum ordinem, manifestus quoque appareat ordo fibrarum circularium, proculdubio cum vasa continentia mobilia, contentis corporibus motus suos imprimant, & contenta corpora sequi etiam necessario debeant leges motuum impressas a canalibus continentibus; idcirco ex hisce moribus eodem tempore sanguini impressis evenient quidam motus pressionis, seu impulsus ex hisce compositus, qui cum non totaliter rectus sit, sequetur, naturam movere filamenta sanguinis lege motus ex hisce composita, per lineas nempe inclinatas, aut quodammodo ab axe venarum divergentes; & sane cum venosi canales a strictis in latis sectiones ascendendo semper magis magisque conice aperiantur, sanguis ascendens, dum a stricta sectione in ampliorem devenit, necessario filamenta sanguinis spatia illa conica, aut quasi conica occupatura

desistere debebunt ab axe, & describere lineas quodammodo inclinatas: cum enim pauca sint filamenta sanguinis, quæ per lineam axis, aut huic lineæ parallelam possint excurrere, in hujusmodi spatio quasi conico, certe fere omnia sanguinis filamenta per aperta magis spatia sursum decurrendo per inclinatas directiones itura sunt; hujusmodi autem ratio motus videtur præ cæteris motibus naturæ convenire; cum enim ascensus corporum per rectas naturæ asperum sit ac grave, per inclinatas vero facilius ac levior: certe massa sanguinis per venas sursum ascendenda, per inclinatas aut quasi inclinatas lineas motus commodius movenda fuerat. Ex hujusmodi autem inclinato motu particularum sanguinis ascendentis, particulæ massam sanguinis componentes necessariam sibi agitationem, ac opportunam mixtionem conservant ac sustinent, ut de motu per arterias supra expositum est.

38. Eodem autem tempore, quo sinister cordis sinus valido ictu impellit singulis pulsationibus grana sanguinis $305 \frac{25}{11}$ per suppositam sectionem descendantis arteriæ magnæ, eodem quoque tempore, ut æqua servetur ratio & ordo circulationis, projicit grana sanguinis $174 \frac{18}{11}$ ut num. 28. notatum est, per suppositam sectionem arteriæ ascendentis; talia propterea ac tanta ascendunt grana sanguinis, sursumque distributa cerebrum consueto flumine irrigant. Ascendens itaque arteria duos in ramos subclavios partitur, quidem adhuc thoracis regionem serpunt, intercostalem arteriam emittunt, quæ ex utraque parte costarum radicibus applicata tria, quatuorque costarum superiorum interstia munit, vicinisque musculos irrepit; sic exiens a subclaviis mammaria costarum plagas & mammas occupat. Cum hujusmodi arteriæ cordi multum sint proximæ, impetum sanguinis validiorem ferunt; movetur itaque sanguis per intercostales, & mammarias arterias celeris motu, & cum cæteris paribus quantitas filamentorum sanguinis effundi debeat in ratione composita ex ratione orificiorum, & ra-

(1) Cap. 4. de Arteriis, & venis.

& ratione velocitatis ejusdem, proculdubio costæ & intercostales musculi multum sanguinis qualibet pulsatione cordis excipient facilius; verum cum musculi intercostales sint corpora quadam supra cæteros musculos tenuia, cumque velociori sanguine sint irrigata, opus erit effusum ab arteriis sanguinem per musculorum interstitia facile concrefcere, nisi venæ hunc præsto sint excepturæ; prompta itaque inflammatio musculorum intercostalium, & facilis læsio thoracis. Ex hujusmodi vitiis musculares fibræ effuso sanguine saginatae nimis dilatantur; unde adjacentibus costis aut immixta, aut ablata libertate motus, costæ neque facile invicem accedunt, neque reciproco motu recedunt, quantum necesse est, quare thorax non elevatus, quantum exigit pulmonum liberris, pulmones ipsos vocat in angustias impedito spatio opportuna dilationis; ex hac pulmonum angustia sanguis per pulmonares fistulas ægre decurrit, & particulae aëris violenter elaterium sustinentes, & altam respirationem & gravem anhelitum ferunt. Ulterius parta inflammatione in musculis intercostalibus dolor lateris cruciet, & sæpe ex pulmonum angustia sanguis, quotiescunque aptus fuerit ad lentescendum, aut pleuritidis aut peripneumonix supplicio animal jugulat.

39. E subclaviis ad caput per collum scandunt duæ arteriæ carotides; quæ utrinque latera asperæ arteriæ, ipsamque tracheam aliquibus ramis excurrunt: Ibi si contentus sanguis muriaticis salibus nimis oneretur, tunc per hujusmodi fibras effusus asperam arteriam vellicat, urgetque quodammodo in spasmos, quorum vi semicircularis tracheæ sectio, aut immixta, aut in semiellipticam figuram aliquantulum conversa libertatem aëris, aut impedit, aut frangit. Refractus autem aër parta raucedine vocem lædit; præterea ex convulsivo motu fibrarum semicircularium tracheæ glandulis adjacentibus exprimitur salis humor, aut lymphaticus, aut alterius generis, qui ad subjecta bronchia delatus, hæc angustis salibus circa proprium axem rotatis alte corrodit, & sæpissime contumacem tussim, & aliquando in pulmonibus ulcus parta phthisi producit: nec ibi est finis malorum; etenim extrema carotis musculi ossis hyoidis, linguam & fauces munit; sic ob aluminosa & vitriolica quædam salia lentescendo sanguine, has partes & re-


plet, & comprimit; lentus idcirco fit partium motus, & ad majorem superficiem extensæ partes ipsæ deglutioni male obediunt. In vitio sanguinis incommoda magis timenda affert carotis interna, hæc siquidem donat ramos insignes duræ matri, glandulæ pituitariæ, oculis & auri internæ; reliquum vero carotidis duos in ramos dividitur, quorum minor duræ matri, major cerebro elargitur, & facto cum cervicalibus arteriis conjugio rete mirabile, & plexum choroideum componunt; quotiescunque itaque sanguis nimio motu peccaverit, violenta & celeri pulsatione meninges exagitat; istæ autem cerebrum, quod tenero amplexu excipiunt, alte violenterque succutiunt, damno non levi, aut hemiplegiam, aut cephalæam, aut cephalalgiam allaturæ. Sed de morbis cerebri opportuno examine agendum erit, cum de motu solidorum disputationem habebimus.

40. Interim ex duræ menyngis duplicatura plures componuntur sinus, qui tamen (observante Verheyen pag. 156. de membranis cerebri) sunt ejusdem substantiæ & usus cum venis, imo sinus isti sanguinem ab arteriis exceptum tandem aliquando in venas jugulares deponunt; cum enim meninges oscillatorio systolis & diastolis motu gaudeant, sinus isti. juxta leges oscillatorii motus movebuntur, transeuntes a sectione majori, ad sectionem minorem, sanguinem præterfluentem, & lympham continuo impulsuri; suspicandum ideo hujusmodi sinus non ejusdem omnino usus esse cum venis, sed potius communem usum cum arteriis sustinere: verum non displicebit nonnullis, credentibus tales sinus esse venarum jugularium appendices, & cum venæ portæ oscillantis usu posse comparari; sed flocci puto hæc inquirere. Certum est, menyngeum laxitatem ex copia lymphæ, aut ariditatem, ut in senibus, istque, qui adultero crine caput nimium onerant, necessarium sanguinis & lymphæ motum per sinus menyngeum aut minuere, aut impedire; unde apoplexias, aut paralyses supervenire palam est. Jugulares itaque venæ, quarum una externa est, interna altera, aliquando una, aliquando duplici valvula armantur, quæ subclaviam versus descendentem sanguini viam parant, impediunt vero regressuro; istæ susceptum a sinibus sanguinem subclaviis venis continuo elargiuntur, & hæc trunco venæ cavæ tandem aliquando

restituunt, ut in cor completo circulationis æquilibrio revertatur; Ibi autem mirandum est studium naturæ; dum enim subclaviæ inferius diriguntur, non recta seu perpendiculari via descendunt, sed quodammodo inflexæ plana inclinata describunt; cum enim sanguis præcipiti, & accelerato nimis motu ruere non debeat in cor, sed paulatim, placidoque pede ferri debeat, ne cor nimia copia ac impetu obruatur, necessarium fuerat subclaviæ venas taliter dirigere, ut plana inclinata describeret, contentum sanguinem lentiori ac placidiori mo-

tu in cor delaturæ. Hic alia superessent enodanda phænomena vasorum sanguinem deferentium; verum cum huc usque exarata, præcipua sint, a quibus colligi facile possunt mechanicæ leges pro enodandis reliquorum morbum causis; ideo hæc satis mechanicas naturæ leges a sanguinis motu desumptas in præcipuis morboſi corporis affectionibus patefacient. Imposſterum reliquam morborum familiam a *Mechanicis solidorum motibus* exaratam utiliori fortasse studio, ac labore, si Deus dederit, exponemus.





MECHANICES MORBORUM

PARS SECUNDA,

DESUMPTA A MOTU SOLIDORUM.

BENEVOLIS MEDICINÆ TYRONIBUS.



EN Tyrones Benevoli *Secunda pars Mechanices Morborum desumptæ a Motu Solidorum*. Hic horum actiones ac momenta medicæ praxis opere attentissime observata, tres in partes claritatis gratia dividenda esse censui; in quarum prima, *Distractionis*, & *Contractionis* momenta fibris omnibus tum simplicibus, cum compositis communia esse experimentis, & Mechanicis legibus satis ostensa sunt.

Ob id speraverim non tantum naturales oscillationes fibrarum omnium colligere posse, verum etiam universales, & particulares ægrotantium sensuum affectiones me esse adepturum. In secunda, pro morborum sensuum internorum affectionibus probabiliori meditatione sollicitus sum, agens obscurissima immortalis animæ officia, quæ cum soli Deo O. M. nota sint, hoc unum pro mercede Philosophi est, tantarum actionum scientiam desideravisse. Tertia denique morbosas affectiones sensuum externorum mechanice molita est. Neque miremini, me neque de succo nerveo, neque de spiritibus animalibus determinatum sermonem habere, cum lex & ordo præsentis instituti sit, morborum causas ac phænomena a mechanicis tantummodo solidorum motibus eruere voluisse; quibus si vultis actiones ac momenta succi nervei, ac spirituum superaddere, non renuam; si nolitis, arbitror vos naturæ, & morborum phænomena satis apte ab expositis solidorum motibus esse assecuturos. Liberum itaque consilium sit, succo nerveo, aut spiritibus animalibus ultro uti velle, aut nolle. Interim me *Tertiam partem Mechanices Morborum desumptam a Motu Februm*, Deo juvante, daturum esse polliceor, ut sic completa morborum omnium Mechanica Deum, & Naturam Mechanicis legibus agentes tum in sanis, cum in ægris animalium operibus, unice veneremur. *Valete.*

Es

Ex latione, motuque, & altera commixtione fiunt omnia, quæ esse dicimus &c. sensuum hæc omnia sunt visus, auditus, olfactus, gustus, tactusque frigidorum & calidorum; quos sequuntur voluptates, dolores, cupiditates, atque timores aliique affectus. Numeri quidem sine nomine, nominati quoque permultigeni, aut sensibiles sensui cuilibet est cognatum. Omnigenis visionibus colores, omnigenis auribus itidem voces, cæterisque sensibus alia sensibilia cognata similiter adjuvant. Plato in Timæto, sive de Scientia.

Quidquid aut sit, aut fiat, naturalibus fieri, aut factum esse ponderibus & motibus. Cicero 1. de Finibus.

DISSERTATIO PRIMA.

De universalibus sensuum affectionibus.

Sicut a pressione cordis fluidorum motus, ita ab actione cerebri motus solidorum habendos esse putans, tantorum motuum debendam cerebro gloriam jure sensui. Cum enim cerebrum prima sit animæ sedes, in qua amplissima officia, divina quasi dignitate fiunt, quæ & ad sensum, & ad motum pertinere videntur; cumque sensus & motus nullatenus haberi possint, quin solida corpora specificis motuum differentiis afficiantur, jure arbitrandum est, solidorum motus ab actionibus cerebri esse eruendos: cerebri dignitatem hisce motibus comparatam universæ Græciæ Plato evulgatus est: Inquit enim in Timæo, *Est Caput membrum, reliquorumque membrorum princeps, cui totum corpus Connexum Dii subesse, ac parere jusserunt; excogitaverunt enim motuum omnium quoscunque esse queant, compos id fore.* Quamobrem de generalibus ibi sensuum affectionibus acturi a specificis solidorum motibus orituris, nonnulla claritatis gratia præmittenda censuimus, quæ restam arduas clariori ratiocinio patefaciant.

1. Itaque manifestum est, a cerebro oriri nervos, & hos duplici constare substantia, quarum interior medullaris est, quæ a conditiore cerebri materia ortum habet; exterior membranacea, quæ a menyngibus proficitur; hujusmodi nervea corpora undequaque mirum in modum effusa motum animalibus & sensum donant: nervea hæc solida vertebrarum foramina egressa, & per animalis machinam distributa in nodos, ac flexus gangliiformes sese frequenter accolunt, inter quos præcipui sunt plexus cardiaci, intercostales, mesenterici &c. in quibus plurimi nervorum surculi stricte in

unum colliguntur, ut inde rursus hinc inde distributi summis naturæ ministeriis pareant. Ibi prætereundum non est, ea ratione, quæ musculi sunt instrumenta motus, ita membranas nervos investientes fore sensuum organa, cum enim musculorum textura, ac figura varia sit, ac diversa juxta varias actiones ac multiplices motus exequendos, quibus destinantur; alii enim trapezii sunt, alii rhomboidei, alii quadrati &c. Ita non dissimili ratione arbitrandum est, membranas omnes non uno fibrarum ordine, ac una methodo constructas esse, in quibuscunque partibus sensui destinatis, sed variæ ratione, directione, ac ordine elaborata fuisse cum diversis angulorum inclinationibus juxta diversas sensuum affectiones exequendas, quibus eas natura divino opere destinaverat.

3. Cum membranz nerveis solidis circumscriptæ sint, cæterisque fibris organicis arte adhæreant, motus membranarum nerveis solidis, cæterisque fibris jure communi communicabuntur; verum cum motus communicentur juxta rationes ac vires corporum imprimantium, propterea motus solidorum nerveorum, aliarumque fibrarum erunt motibus membranarum circumscriptarum proportionales.

4. Nervea solida cranium tamen egressa dotantur naturali *Motu Contractionis*, & *Distractionis*; quibus motibus conantur determinatum contractionis & distractionis gradum, sive statum sustinere naturali temperiei, constitutioni, ac viribus animalis proportionalem, ac sese ad eundem statum naturalis longitudinis restituere, quotiescunque ab opposita vi sive interna, sive externa, sive mixta, seu motu opposito distractionis (sine tamen divulsione) distracta, aut ad majorem longitudinem extensa fuerint. Hujusmodi motus contractionis, & distractionis idem acutissimo tractatu de villæ contractili celeberrimus Bellinus exposuit & demonstravit; inquit enim; *contractionis*

natu-

naturalis nomine, aut ejus oppositæ distraktionis hic intelligimus motum illum in compositis corporibus, quo fit, ut eadem composita ab aliqua facultate externa, sed adderem quoque interna, aut mixta, trabente in majorem extensionem perducta sine divulsione, naturæ vi, sive sponte, sive a seipsis sue priori longitudini se restituant, si libertati permittantur: dico autem hac super re, contractionem naturalem tam late patere, ut vix unum compositum noverim, in quo illa non vigeat, & paucissimas nature operationes pariter invenerim, ad cujus partes contractio naturalis non sit vocanda. Cum itaque Bellinus motum contractionis & distraktionis compositis corporibus communem velir, hujusmodi motus contractionis & distraktionis non solidis tantummodo nerveis tribuendus erit, verum etiam quibuscunque fibris organicis, quæ aut a nerveis filamentis oriuntur, aut quibus nervea inferuntur corpora, aut cujuscunque alterius generis. Ex his colligendum est, quamcunque fibram organicam conatum ac vim continuo exercere, ut ad naturalem longitudinem sese restituat, quotiescunque a vi aliqua ad majorem longitudinem distracta fuerit; verum cum hujusmodi contractionis & distraktionis motus, de vi elastica participes esse videantur; certe omnes, quamcunque fibram elastico quodam motu ac nisu donatam esse: a quo peristaltici motus orituri sunt, fateri debuerunt.

5. Ne autem ea desint, quæ motus distraktionis, & contractionis ideam ulterius confirmare possint, observationes & experimenta offert Bellinus, pollicitus se rem tam naturæ consonam, ac necessariam fore determinaturum; Eligit itaque celeberrimus Auctor chordam musicam, aut metallicam, aut compactam ex carnibus animalium, eamque per eandem rectam lineam, ac per longitudinem ipsius ad oppositas partes trahit, ut tendatur, sine tamen divulsione chordæ; postquam inquit ad certam quandam longitudinem priori majorem ipsam extendisti, ac tractione desistas, digitosque removeas, adeoque chordam suæ libertati permittas; chorda ex seipsa pariter coit in seipsam per eandem lineam, per quam traxeras, & fit brevior, ac brevior, quousque redeat in eandem longitudinem, cuius erat ante tractionem, in quam postquam restituta est, ulterius non coit in seipsam, sed ab omni motu cessans in sua priori longitudine quiescit. Illam longitudinem in quam venit chorda per tractio-

nem ad oppositas partes appellant distraktionem; & facultas, quæ distraktionem producit, dicitur facultas distrabens: motus quo chorda in priorem suam longitudinem restituitur, est id, quod appellatur motus contractionis, vel contractio; & facultas, a qua provenit contractio, dicitur facultas contractionis. Hæc Bellinus prop. 1. de villo contractili. Verum in hac re fateor me ultra obstupuisse legens metalla ipsa, quantumvis durissima tali motu distraktionis & contractionis donata fuisse; refert enim immortalis famæ vir Jacobus Hermannus num. 24. phoronomiæ, ex observationibus Celeberrimi Cassini constare, metalla frigori extofoa non nihil contrahi, & vice versa quodd volumen extendi in locis calidis, & ejusmodi metallorum extensiones, & contractiones; quibus non dubie durissima quæque alia corpora plus minus obnoxia sunt, absque interno partium motu fieri nequeunt. Isaacus quoque Nevvtonus summum Angliæ Lumen, (pag. 386. princip. math.) testatur & ipse D. Picartum observasse, quod virga ferrea, quæ tempore hyberno, ubi gelabant frigora, erat pedis unius longitudine, ad ignem calefacta evasit pedis unius cum quarta parte lineæ: Deinde D. de la Hire observavit, quod virga ferrea, quæ tempore consimili hyberno sex erat pedum longitudinis, ubi soli æstivo exponebatur, evasit sex pedum longitudinis cum duabus tertiis partibus lineæ. Quid plura? Nonne Academia Florentina pluribus experimentis in crystallis & mineralibus ante hos celeberrimos viros (pag. 186.) manifeste experta est, metalla & crystallos calore distrahi & extendi, frigore vero contrahi? Quamobrem si hujusmodi durissima corpora motu distraktionis & contractionis donata sunt, quid de mollibus, tenerisque animalium viventium solidis facillime mobilibus docendum erit? certe nullum fore putaverim, qui tam aperta ac manifesta de motu distraktionis seu extensionis, & contractionis phænomena in quibuscunque animalium viventium fibris, ac solidis, aut negare, aut de his audeat dubitare.

6. Cum universa corpora sive solida communi motu distraktionis & contractionis parere debeant, contrahendo sermones nostros ad specificum motum distraktionis & contractionis fibrarum animalium; quærere quis posset rationem, ac causam primo naturalem, deinde præternaturalem distraktionis & contractionis fibrarum, de quibus ibi præcipue agendi munus nostrum & officium est;

est : quamvis autem hæc ratio , ac causa difficillime erui vere possit , nihilominus ne desit actionibus naturæ ea ratio ac lex , quæ ad enodanda obscura naturæ phænomena probabiliori jure convenire videatur , putaverim præeuntibus celeberrimis Viris Joanne Alphonso Borello & Joanne Bernollio a duabus præcipue causis rem tam obscuram me fore affecuturum : Prima itaque causa est naturalis & peculiaris structura solidorum & fibrarum quarumcunque ; qualiscunque tamen structura hæc fuerit , cum verum structuræ modum , ordinem , directionem ac figuram earundem determinare nemo usque adhuc ausus sit : In hac re non me latet , summum virum Alphonsum Borellum (1) musculares fibras , ut catenas , ex observationibus musculorum , habuisse compositas ex fibris perpendicularibus & transversis , quæ inter se texturam reticularem efficere videantur ; ex hisce fibris tali ratione contextis efformantur areæ , seu machinulæ , quæ flaccidæ sunt , & lateribus suis connivent , quando musculus oriatur ; extenduntur vero , cum operatur : hujusmodi machinulæ , seu spatia fibrarum muscularium ex Borello rhomboidalem figuram describere visa sunt ; verum cum supra laudatus Joannes Bernollius (de motu musculorum n. 2. & 9. & seq.) spatia , seu machinulas fibrarum muscularium non rhomboidales figuras , sed sphæroides vere describere , analytice ostendat , quæ juxta majorem aut minorem extensionem musculorum sphæroides quoque descriptæ modo a majoribus , modo a minoribus angulorum inclinationibus metirentur , colligendum putavi , musculares fibras donatas fuisse motu distractionis & contractionis præcipuo opere , ac labore talium machinularum sphæroidalium , quam rem celeberrimus Michelottus utilissimis animadversionibus acutissime expendit . Hisce præmissis , si liceat suspicionem meam adducere , opinor , me non adeo a ratione alienum esse , si putem , *Menyngum quoque lacertos* musculis aut musculorum officio comparandos , & *Nervos ipsos* similibus fortasse areis , vesiculis , aut machinulis sphæroidalibus , aut fortasse alterius generis esse munitos ; & sane si de nerveis solidis conjectari liceat , laudatus Borellus (2) nervum esse fasciculum seu capillamentum ex

pluribus filis fibrosis compositum , atque involuero quodam membranoso colligatum , arbitratus est , quæ nerveæ fibræ fistulas esse cavas , repletas substantia quadam spongiosa , porosa ac madida simili porosæ medullæ sambuci virentis , succo quodam elastico irrigatas probabiliori ratiocinio ulterius suspicandum putavit ; itaque si lacerti menyngum analogice musculis comparantur , si spongiosæ porositates nervorum succum quandam elasticum continent , eodemque irrigantur , cur non liceat opinari , hujusmodi poros , areas & cellulas factæ cum muscularibus machinulis analogismo sphæroidales esse , aut alterius similis figuræ , quæ elaterio quodam donatæ modo extendi , modo contrahi potuissent ? Natura siquidem una est , omnibusque in operibus fere semper unitate operari consuevit . Itaque menyngum lacertis , & nerveis solidis probabiliter expensis , facile me transfero ad ea , quæ ad motum contractionis & distractionis *Membrarum & tendinum* pertinere videntur . Membranz itaque cum docente Verheven verosimiliter componantur ex fibris sibi invicem intertextis , fere sicut tela ex filis , quarum altitudo seu profunditas adeo minima est , ut areas spatia seu machinulas necessariæ altitudinis seu profunditatis non continere , aut comprehendere opportune possit , cumque membranæ præcipuo sensuum officio pareant , cui efficiendo non adeo operosum ac laboriosum est , ut nervis , musculisque contingit , qui summis motuum laboribus destinantur : propterea male existimarem , si motus membrarum contractionis , & distractionibus a machinulis ; seu vesiculis elasticis factos esse crederem ; absit itaque opinio hæc locuturo de membranis sensui præcipue , non motui destinatis . Naturalem ergo motum contractionis & distractionis membrarum primo factum putaverim a successivo motu oscillatorio menyngum , qui successive membranis correspondentibus communicatur ; secundo a motu fibrillarum nervearum , quæ per membranas hinc inde excurrunt ; tertio a continua mutatione angulorum , qui a fibris membranas componentibus efficiuntur ; etenim cum membranæ componantur ex fibris sibi invicem intertextis , jure texentes fibræ efficient angulos , aut naturaliter re-

ctos ,

(1) Prop. 94. & sequent. Primi Tom. & prop. 215. secundi Tom. de motu Animal.

(2) Prop. 23. Tom. 2. de motu Animalium .

os, aut acutos, aut obtusos; cum autem fibræ sensu & motu præditæ, motum & impulsu excipiant ab externis corporibus, aut ab interno motu corporum fibras componentium, futuræ erunt qualibet fibræ in proportionali mutatione angulorum, & figurarum inter se; fibræ itaque rectos angulos naturaliter describentes, cum ratione advenientis motus modo descripturæ sint angulos acutos, modo obtusos, modo curvos, necessario quoque fibræ inæqualibus angulis oppositæ modo distraherentur, modo contrahentur, cumque semper remaneat vis illa seu conatus naturalis fibrarum, quo fibræ nonnaturaliter contractæ, aut distractæ ad naturalem statum conantur sese restituere; opinor membranarum fibras excessiva mutatione angulorum, inter se futuras esse in proportionali mutatione figurarum, & consequenter fibras modo contrahi, modo extendi debere. Qualis modo futura erit probabilis causa, qua *Tendines*, licet densissimi sint, suo tamen naturali motu contractionis & distractionis dotari debuerunt; proculdubio tendinum motibus confert vis nervorum, qui per tendines intime serpunt; vis membranarum tendines circumscribentium; & aliquando mutatio angulorum, qui præcipue a fibris rectis & transversis, aut obliquis tendines componentibus, ex secuturis motibus musculorum continuo efficiuntur; Potissimum itaque motibus contractionis & distractionis obediunt tendines, vi & opere musculorum, qui cum diversis motibus sollicitentur tendines quoque, quatenus appendices & caudæ musculorum, successivis distractionis & contractionis motibus erunt sollicitandi. Præter cætera, quæ motum distractionis & contractionis in quibuscunque corporibus promovere consueverunt, universale principium est motus intestinus particularum quælibet solida componentium.

7 Cum animalia quælibet non eodem semper in statu virium & actionum perseverent, sed continua actionum, aut naturalium, aut præternaturalium vicissitudine rotari debeant; & cum diversæ vires & actiones a varia temperie fluidorum, ac varia solidorum structura ac motu dimetiri possint, ideo motus seu momenta distractionis & contractionis fibrarum quarumcunque claritatis gratia duplici modo erunt consideranda; Momentum itaque distractionis, & contractionis aliud est *equipollens*, aliud est *præpollens*: *Vis*, *conatus* seu *momentum distractionis equipollens*, est natura-

lis potentia, vis seu conatus solidi distrahendi semetipsum ad naturalem longitudinem quotiescunque ab opposita potentia, aut momento contractionis impeditum fuerit; aut sustinendi statum naturalis distractionis intra fines a natura determinatos. Momentum vero contractionis equipollens ejusdem solidi, est opposita potentia, vis seu conatus contrahendi semetipsum ad naturalem longitudinem, quotiescunque a vi aliqua distractum fuerit, aut sustinendi statum naturalis contractionis ejusdem solidi pariter intra fines a natura determinatos. Itaque cum hujusmodi momenta distractionis, & contractionis æquipollentia in perfectissimo naturæ statu haberi tantummodo possint, ideo talia momenta quotiescunque extiterint, semper futura erunt in statu naturali; quare ibi directiones & motus fibrarum erunt juxta naturæ leges inter se, aut homologue, aut reciproce proportionales. In hoc statu vis & robur naturæ perfectissime consistens est; cum enim vires æquales & oppositæ in idem corpus, aut homologue, aut reciproce agentes & reagentes mutuum effectum tollant, aut tollere aptæ sint, res omnes positæ in actione & reactione æquilibrata, debebunt necessario recte consistere. Hisce ergo momentis æquipollentibus solidorum felicissime uti possumus, ut accessus & recessus momentorum a perfectissimo naturæ statu quamproxime innotescant, naturales aut præternaturales actiones animalium felici methodo dimensuri; In hoc quoque perfectissimo naturæ statu supponenda jure sunt elementa, & motus fluidorum in exactissima proportionem inter se constituti; sicut autem momentum æquipollens est semper in statu naturali; ita momentum præpollens aliquando ob causam, sive externam, sive internam, sive mixtam taliter augeri potest, ut fiat præter naturam; Itaque momentum distractionis præpollens illud esse videtur, in quo talis sit hujus momenti præpollentia, ut momentum equipollens contractionis nullam, aut fere nullam rationem habeat cum momento præpollente distractionis; hoc autem semper fiet cum læsione operationum, & aliquando, cum divulsione solidorum. E contra momentum contractionis præpollens aliquam ob causam sive externam, sive internam, sive mixtam æquipollens taliter superat, ut fiat præter naturam; ita ut momentum distractionis æquipollens nullam, aut fere nullam rationem habeat cum momento præpollente contractionis, ibi fibrarum actiones læsas esse, nemo negaverit.

8. Hisce præmissis, ut generales sensuum affectiones consequi possimus, primo incumbendum est, ut in doloris examine laboremus. Unus itaque omnium sensus est, solutionem continui præcipuam doloris causam fuisse, & tantum veterum opinio præjudicata potuit, ut etiam usque adhuc veterum valeat auctoritas. Verum doctissimus Borellus (1) evulgatam hujusmodi sententiam penitus studuit evertere, simulque sprete illa doloris causa, quæ in dissolutione texture, & compositionis fibrarum nervearum præcipue firmata esse videtur, tandem aliquando a celeberrimo Auctore deliberatum est (2) immediatam doloris causam a vellicatione in nerveis membranis facta esse eruendam: Fateor me dubitanter querere immediatam doloris causam, verum cum unicuique liceat eam ferre sententiam, quæ ad enodanda naturæ phenomena probabilius conferre videatur, ausum sum probabiliori ratiocinio suspicari immediatam doloris causam, & molestiam sensuum affectionem orituram esse ab inequali, inordinato & asymmetrico motu fibrarum membrænearum solida nerveæ circumscriptentium, & consequenter, etiam fibrarum nervearum, aliarumque, quibus arte, & intime eadem membræne alligantur, quæ proportionem, ac directionem acquirant notabiliter dissimilem, ac diversam a naturali proportionem, ac directionem motus earundem, mutatis naturalibus inclinationibus angulorum inter se, quos fibre inter se contextæ necessario componunt. Hinc juxta varios gradus motuum fibrarum membrænearum solidis nerveis circumscriptarum, & juxta varios gradus motuum fibrarum quarumcunque membranæ intime alligatarum, qui magis, aut minus distent a debita proportionem, ac directionem naturalis earum motus, & juxta varias mutationes angulorum earundem, tanquam ab immediata & primitiva causa consequuntur postea effectus: videlicet aliquando solutio continui, aliquando dissolutio texture, & compositionis fibrarum, membrænearum circumscriptentium aliorumque filamentorum, quibus membranæ intime alligantur. Quamobrem qui doloris causam a solutione continui, aut a dissolutione texture fibrarum student acquirere, minus recte rem agere videntur; cum non causam doloris, sed

Immediatam doloris causam.

effectum penitus offerant; minus quidem errare consuecunt, qui a vellicatione fibrarum nervearum, membrænearumque, & aliarum, quibus membranæ intime alligantur, doloris & molestiæ causam eruendam putant. Verum cum nonnulla naturæ phenomena præternaturalia, a corporibus vellicantibus excitata sæpe quoque fiant absque ulla doloris affectione, licet dolor aliquando etiam a vellicatione haberi possit, ideo non semper vellicatio pro immediata, & primitiva causa dolorificæ affectionis erit consulto, & uno naturæ jure existimanda, sed pro mediata tantummodo, ut inferius constabit, cum de affectionibus convulsivis sermo fuerit.

9. Ne autem turbetur debitus morborum ordo, cum inter sævissimos dolores ac sensuum molestias emineant dolores capitis, congruum puto de præcipuis capitis doloribus sermonem habere: de *Cephalæa* nempe, *Cephalalgia*, & *Hemicrania*; cum autem cephalæa inveteratum, & continuum; cephalalgia recentem, & diuturnum, hemicrania vero modo unam, modo alteram capitis plagam torqueat, non difficile erit, ab universali doloris causa super exposita peculiates dolorum capitis causas aperire: Itaque sciendum est, & partes omnes nervosas; duas nempe meninges, nervorum tunicas, pericranium, periostium, musculos & panniculum carnosum esse præcipua subiecta, in quibus hujusmodi dolores firmari consuecunt; itaque cum in corticali cerebri substantia densissimi arteriarum, & venarum ramuli numerentur; si violento aut velociori, sive ob crassitiem lentiori pede liverit sanguis, conicarum arteriarum, & venarum superficies circulares, magis extensæ fient; cum autem hujusmodi superficies augeantur semper in ratione duplicata suarum diametrorum, venæ & arteriæ ad tantas superficies extensæ, distractis organorum fibris, mutatisque naturalibus directionibus fibrarum, una cum naturalibus angulis earundem inter se, urgebunt violenter non solum corticalem cerebri substantiam, verum etiam duas meninges contra calvariam; verum cum resistentia calvariæ validissima sit, coget venarum, & arteriarum superficies, repercutere semetipsas contra corticalem substantiam in ratione composita ex

(1) Prop. 205. secund. Tom. de Motu Animalium.

(2) Prop. 27. secund. Tom. de Motu Animalium.

ratione resistentiæ calvariæ, & ex ratione dilatationis & distractionis venarum, & arteriarum ad majores superficies: si itaque hujusmodi vitia continua fuerint cephalæam; si interpolata cephalalgiam; si vero hanc aut aliam cerebri partem irritaverint, hemicraniam erunt paritura. Verum præter hæc alia fortasse methodo dolores capitis quærendi sunt; etenim cum dum meninges contrahuntur, cor dilatetur, & cum hæc cerebrum circumscribant, eo tempore, quo volumen sanguinis in statu naturali a corde expellitur una systole, meninges impulsæ elevabuntur, diastole vero cordis subsequente meninges motu veluti reciproco deprimentur. Cum vero motus iste naturalis depressionis quodammodo fieri videatur non tantum a momento naturali gravitatis menyngum, verum etiam a motu seu conatu quodam lacertorum, (quos celeberrimus Pachionus in dura præcipue menynge observaverat,) quorum vi membranarum fibræ quodammodo in rugas ac plicas compositæ intra sese recipiunt; motus autem naturalis elevationis fiat motu quodam distractionis, vi cujus fibræ a momento sanguinis impulsæ distractionem pati coguntur; idcirco si accadat, aut nimio impulsu sanguinis, aut nimia feri colluvie extensas præternaturaliter fuisse lacertorum areas, aut glandulas, etiam motus depressionis, seu contractionis menyngum, & succedentes motus elevationis seu distractionis earundem futuri erunt adaucto momento gravitatis dissimiles & asymmetri. Cum autem juxta tam dissimiles & asymmetros motus distractionis & contractionis menyngum, fibræ menyngum inordinatis directionibus & asymmetris motibus distractæ componere debeant angulos a naturali inclinatione dissimiles; sic mutato naturali parallelismo fibrarum inter se natura pati conabitur, & capitis dolorem modo leviori, modo graviori molestia sustinebit. Serum ulterius aut lentiori pede procedens per innumera vasa lymphatica, aut asperis corporibus munitum moleste afferendo inordinatos, inæquales & asymmetros motus organorum & fibrarum, externas aut internas capitis plagas alte feriet vulnere, aut continuo, aut interpolato, & variæ sient dolorum capitis differentiarum. Hæc, & quæcunque alia extranea, ut vermes, fungi & sylvestres succi, si in regione capitis tyrannidem suam primo exercent, idiopathicos dolores; si vero extra regionem capitis, ut in stomacho,

utero, cæterisque visceribus consensu gravi cerebrum torqueant, sympathicos dolores moleste parturient.

10. Modo a doloribus capitis sentio, meam in arenam vocatum esse, ut cum affectionibus convulsivis medicam controversiam acturus sim: cum autem num. 6. *naturalis causa distractionis & contractionis* satis explicata fuerit; hujus opportunitati loci convenire videbitur, si prius universalem præternaturalis momenti distractionis & contractionis solidorum rationem ac causam attulerim, antequam de convulsionibus peculiarem sermonem habeam. Eligo itaque plexum nerveum mesentericum, unum nempe ex tot nerveis plexibus, in quibus facile crederem potissimum firmandam esse sedem ac basin motuum solidorum nerveorum a plexibus exeuntium, tam naturalium, quam præternaturalium, (quidquid autem de plexu mesenterico locuturus sum, proportionaliter de quocunque alio plexu, aut de quolibet alio nerveo solido intelligendum erit:) sit ergo plexus nerveus mesentericus compositus ex unione, & aggregato plurium nerveorum solidorum in statu naturali; apertum est, aut vitio succi nervei, aut feri supra modum fluentis interstitia plexus nervei repleti taliter posse, ut naturalem fluidorum copiam angulosius plus justo salibus gravem, ultro superent; sic solidum tali fluido æquabiliter repletum dilatabitur ad majus spatium, seu volumen. Cum autem nerveum solidum in statu naturali, & idem solidum in statu præternaturali habeantur, ut duo solida similia, & distantia fibrarum, seu interstitia solidum componentia sint lateribus solidorum homologiis proportionalia, solida autem similia crescant in ratione triplicata laterum homologorum; certe solidum nerveum in statu naturali, & idem solidum in statu præternaturali erunt inter se in ratione triplicata amplitudinum interstitiorum, seu distantiarum, quas fibræ solida componentes servant inter se: Quare si fluida, seu massæ tanquam cunei præcise, & secundum se consideratæ in interstitiis solidi nervei absque motu elastico communicato ab aliis corporibus sibi unitis æquabiliter contentæ in iisdem interstitiis pro statu naturali fuerint, ut unum; postmodum vero a massa corporum præternaturaliter effusa, distantia seu interstitia fibrarum solidum componentium dilatata, & extensa fuerint ut 2. erit solidum nerveum in statu naturali

ad idem solidum nerveum in statu præternaturalis extensionis ut 1. ad 8. nempe proxime in ratione cubica interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se; quare solidum nerveum præternaturaliter extensum erit octuplum solidi ejusdem nervei naturaliter extensi a corporibus, seu materia contenta, ut unum. Cum autem solida hujusmodi decurtari jure debeant in ratione proxima secundum longitudinem, quotiescunque dilatantur in aliqua ratione secundum latitudinem, licebit colligere ex præternaturali dilatatione plexus nervei, ramos nerveos a plexu hinc inde exeuntes decurtandos fore in ratione probabiliter proxima 1. ad 8. Ex his ultro res agenda est; cum enim fluida seu massæ æquabiliter contentæ tanquam cunei inter interstitia plexus nervei elasticis corporibus, & particulis quoque præternaturaliter effervescentibus unitæ sint, quarum vires, ac momenta elastica summa esse experimur ad augendos impetus, percussiones, & conatus contra fibras plexus nervei præternaturaliter extensi a materia præcise confidatata absque motu elastico, communicato ab aliis corporibus sibi unitis; quis non videt, quanta futura sit vis, conatus, & momentum plexus nervei ad nerveos ramos ab ipso exeuntes violenter trahendos versus plexum præternaturaliter dilatatum, in ratione videlicet composita proxime ex cubo, seu triplicata ratione interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se, & ex motu elastico corporum effervescentium; a quo momento validissimæ resistantiæ erunt enixe superandæ? Quamobrem cum interstitia fibrarum corporibus extraneis æquabiliter repleta, seu distantia fibrarum inter se sint lateribus homologis solidi proportionales, erunt simul sumptæ æquales, aut quasi æquales homologæ radici solidi præternaturaliter extensi; quare si talis radix fuerit — b ; erit solidum nerveum præternaturaliter extensum proxime in ratione cubica eorundem interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se ob materiam ibi ultro contentam, nempe erit proxime ut $b. 3$: quod si vis & conatus elasticitatis corporum contentorum effervescentium, aut inflando, aut impellendo magis, magisque fibras plexus nervei vocetur e momentum autem plexus ejusdem præternaturaliter extensi vocetur m , erit $m = b^3 \dagger e$. Hæc quæ dicta sunt ostendere videntur, quænam sit ratio ac

causa sive externa, sive interna, sive mixta, quarum vi momentum naturale æquipollens plexus nervei, & ramorum nerveorum transire necessario debeat ad præternaturale momentum præpollens eorundem, cujus momenti opere plexus nerveus, & rami nervorum ab ipso exeuntes apti fiunt non solum superare momentum oppositum contractionis eorundem, verum etiam validissimas resistantias musculorum, tendinum, & ossium, quibus omnibus nervæ ramificationes arcte alligantur, aliorumque ponderum oppositorum, quod certe praxin medicam agentibus mirabile est. Agendo modo de *Motibus Convulsivis* cum sanitas & naturalis solidorum motus non solum nitantur in proportionem corporum fluida componentium, verum etiam in determinato ordine, directione naturali solidorum, & determinato motu eorundem, una cum naturali inclinatione angulorum, quos fibræ inter se contextæ naturaliter componunt, & cum æquali, aut reciproca actione & reactione & momentorum distractionis earundem inter se: quotiescunque hic naturalis motuum & actionum ordo, & lex præternaturali opere mutabuntur, tunc convulsivæ affectiones contingent. Cum itaque tot morborum causæ, aut a præternaturali dilatatione, aut inflatione solidorum, aut motu oriri consuecant; si aut vitiosi succi nervei, aut a sanguiferis, aut a lymphaticis canalibus evomantur præternaturales succi asperis superficiebus donati in aliquo spatio membranoso, aut nervoso, aut quocunque alio solido sensibili contenti; ibi certe tanquam cunei ingressi spatia solidorum violenter sollicitabunt, extendent & inflabunt fibras solidum componentes; spatia autem plexus nervei (puta mesenterici jam suppositi) ab extraneis corporibus ultro repleta, impediunt facilem transitum fluidorum naturaliter prætereuntium, inde facta mora corporum ingressorum hypostasis major futura erit, quam par est. Cum autem sylvestres succi solidum supra naturæ leges ingressi dilatent præternaturaliter solidum illud proxime in ratione composita ex ratione cubica, seu ex ratione triplicata interstitiorum, distantiarumve, quas fibræ habent inter se in statu extensionis naturalis, & ex ratione corporum elasticorum plexum nerveum influentium; præcudubio cum filamenta nervea a plexu exeuntia, & hinc inde effusa tantum proxime trahi de-

debeant versus plexum præternaturaliter extensum, quantum plexus nervus a præternaturalibus succis ultro extensus fuerat; idcirco filamenta illa nervea a plexu exeuntia violenter trahentur versus partem plexus in data ratione dilatati; cum autem filamenta illa nervea musculis, tendinibus & ossibus arte sint alligata, musculi quoque, tendines & ossa, quibus tendines alligantur, in data ratione trahenda præternaturales contractiones organorum & motus convulsivi solidorum exorientur; ex his si extensio & dilatatio plexus nervei a corporibus ingressis ea ratione fiant, ut æquabiliter & omnibus in partibus æqualis, & unimoda fiat præternaturalis sollicitatio, percussio & inflatio, cum æquali & unimoda dilatatione singulorum interstitiorum, & distantiarum fibrarum plexus nervei præternaturaliter extensi, etiam filamenta nervea a plexu exeuntia æqualibus viribus, æquali, & unimodo conatu, ac momento æquabiliter & unimode trahentur versus partem plexus dilatati. Si itaque singulæ fibræ componentes solida nervea a plexu gangliiformi exeuntia, & illæ quibus solidum unitur, naturales semper directiones, ac naturales parallelismos sustineant inter se, easdemque servant naturales angulorum æqualitates ac similitudines; tunc cum fibræ singulæ solida componentes attrahantur versus plexum cum angulis, aut æqualibus aut similibus, temporibus quoque æqualibus fibræ ipsæ transeundo singulis temporibus ordinata, unimoda & æquabili lege, ab una æqualitate, aut proportionem, aut directionem motuum fibrarum & angulorum ad aliam priori aut æqualem, aut proportionalem, non afferent ullos dissensus vel ullam asymmetriam in totis motibus fibrarum solida componentium; & consequenter cum singulis temporibus naturalis fibrarum parallelismus sustineatur, attractio quidem convulsiva fiet solidorum versus partem præternaturaliter extensam, sed ordinata; unimoda, æquabilis, & isochrona; atque nulla videbitur contingere molesta organorum affectio, aut dolorifica passio solidorum sensibilium: & sane, ut habeatur ratio veritatis; si conatus, vis, momentum & quantitas motus unius fibræ in uno solido (idem intellige proportionaliter de quibuscunque aliis partibus, quibus solidum idem unitur) una differentia temporis fuerit ad quantitatem motus; seu momentum ejusdem, aut alterius fibræ homogeneæ, & æqualis magnitu-

dinis æquali tempore, & in eodem solido, ut est momentum, & quantitas motus primæ fibræ altero tempore ad momentum, seu quantitatem motus ejusdem, vel alterius fibræ homogeneæ secundo tempore, & sic proportionaliter successive erunt (per 12. 5.) singula momenta & quantitates motus unius, aut alterius fibræ homogeneæ iisdem temporibus & in eodem solido, ut sunt omnia momenta & conatus simul sumpti primæ fibræ, ad omnia momenta & conatus simul sumptos secundæ fibræ ejusdem solidi; iisdemque temporibus; sed quando conatus & momenta unius, aut alterius fibræ homogeneæ solidum componentis sunt æqualia, aut proportionalia momenti ejusdem, aut alterius fibræ homogeneæ solidum componentis temporibus æqualibus, & sic de ceteris &c. momentum quoque & quantitas motus totius solidi est semper singulis temporibus sibimetipsi æqualis, aut proportionalis, quare cum natura in hoc statu singulis temporibus justam proportionem, æquam directionem motuum fibrarum, & parallelismum naturalem earundem cum æqualitate angulorum æquabiliter, & unimode usque adhuc sustineat, certe actionibus & reactionibus proportionaliter se habentibus nullam in se molestiam ac dolorificam affectionem, (& si convulsio fuerit) pati poterit ac sustinere. Et sane, ut verum fatear, sæpe miratus sum medicam praxin agens, convulsivas affectiones absque ullo dolore ægros agitavisse, plurimas enim hystericas, & hypochondriacas affectiones, & convulsivas, pluresque spasmodicos subsultus aut motus, inter quos *Satyriasin*, sine ullo dolore partos observavi: Itaque ex his colligendum videtur, quotiescunque plexus magnus mesentericus nonnullos surculos per mesenterium & intestina; nonnullos vero ad truncum aortæ descendens; nonnullos ad ovaria sæminea emittat; & hic plexus æquabiliter, & unimode in omnibus suis partibus plexum componentibus sollicitatus, percussus & extensus fuerit a fluidis præternaturalibus plexum eundem æquabiliter & unimode instantibus & dilatantibus; tunc momentum plexus nervei æquabiliter, sed præternaturaliter dilatati trahet proxime in data æquabili ratione non solum surculos quoscunque ab illo exeuntes, sed & fibras quascunque surculos ipsos componentis versus plexum nervum præternaturaliter extensum; cum autem momentum tale plexus nervei

Convul.
No sine
dolore.

nervi proxime æquetur singularibus momentis simul sumptis tractionum fibrillarum nervearum ab ipso exeuntium; propterea singularia momenta simul sumpta (1) tractionum, quibus æqualiter, sed præternaturaliter trahuntur, non solum furculi nervi, sed singulæ fibrillæ furculos nerveos componentes per mesenterium & intestina, per truncum aortæ & ovaria a plexu exeuntes versus plexum nerveum; æqualia erunt momento totali plexus magni mesenterici præternaturaliter extensi; cum porro momentum totale plexus nervi suppositum fuerit supra $b + e$; si momentum singulare furculorum & fibrarum nervearum furculos componentium per mesenterium & intestina effusum supponatur p ; momentum vero furculorum nerveorum & fibrarum furculos componentium per aortam descendentem singulariter supponatur r ; momentum autem singulare furculorum nerveorum & fibrarum furculos componentium ad ovaria emissos supponatur f , erunt proxime singularia momenta simul sumpta $p + r + f = b + e$ & consequenter momentum singulare p erit $\frac{b+e}{r+f}$, & momentum singulare erit $\frac{b+e}{p+f}$ & momentum singulare f erit $\frac{b+e}{p+r}$; cum autem ex æquabili, sed præternaturali dilatazione plexus nervi magni mesenterici æquabili quoque ratione trahantur rami nervorum ab illo exeuntium, & singulæ fibræ ramos ipsos componentes versus eundem plexum; in hoc statu cum huiusmodi tractiones sint singulis temporibus ordinatæ, unimodæ & æquabiles inter se & isochronæ, nullam doloris molestiam (& si convulsio fuerit,) erunt allaturæ. Unde praxi medica expertum est, hystericas mulieres, hominesque hypochondriacos aliquando abdomine tumefactos, & scæminas utero quodammodo attractas sine ullo dolore extitisse, sed muta tantummodo afflictione una cum aliqua pulsuum inæqualitate, & stomachi languore vexatas fuisse. Habita inde ratio est, cur inflatis, extensis & sollicitatis æqualiter & unimode in singulis partibus nervis furculis per ovaria & uterum emissis opere præternaturalium succorum nerveos hos furculos undique, sed æqualiter dila-

tantium, aut sollicitantium, fieri aliquando possit ratione nervorum & fibrillarum eorundem ascendentium non gravis sensatio, (licet convulsiva) in abdomine, intestinis & stomacho cum pulsuum aliquali inæqualitate, sed tantummodo affectio quædam sine dolore, quam universalem corporis languorem appellare mulieres consueverunt.

11. Verum si a præternaturalibus fluidis plexus nervi, aut quælibet sensibilia organa sollicitentur & dilatentur quidem in super exposita ratione composita; sed non æqualiter & unimode in omnibus suis partibus componentibus sollicitentur & extendantur, ita ut pars una organi magis sollicitetur & extendatur, quam altera, fibris inæqualiter sollicitatis, aut extensis; tunc momenta præternaturalia præpollentia corporum extendentium fibras tali inordinato motu, & dissimili ratione, ac asymmetra proportionem inter se violenter agendo contra momenta naturalia, & æquipollentia fibrarum earundem, necessario fibras omnes nervosas, membranosas & musculares, cæterasque, quibus illæ alligantur, violenter & inæqualiter trahent versus partem inæqualiter & asymmetre dilatatam, & sollicitatam a fluidis præternaturaliter ingressis, motibus asymmetris fibrarum, & directionibus inæqualibus earundem; consequenter permutabuntur naturales anguli, & naturales parallelismi fibrarum, & organorum inter se, mutatis quoque fibrarum naturalibus directionibus: Quamobrem in hoc præternaturali statu facile crederem, affectiones convulsivas asymmetris & dissimilibus motibus fibrarum agentes, cum dolore ac spasmo esse copulandas. Itaque ex his colligendum putavi, immediatam doloris causam non a præternaturali extensione & sollicitatione habendam esse, ut *sollicitatio & extensio* est; sed quia a sollicitatione tali, ac tali extensione organorum sensibilibus sit inæqualis, dissimilis, inordinata, & asymmetra distractio, attractio & motus fibrarum & filamentorum solida componentium, a quibus mutantur naturales anguli fibrarum inter se; mutatur directio naturalis earundem; turbatur naturalis parallelismus solidorum, & gravi motu invertitur; solida idcirco sensibilia asymmetre, & præternaturali ac dissimili motu modo distracta affectionem convulsivam, sed cum dolore miserrime affe-

Convulsio cum dolore.

(1) Ex num. 13. phoron. Hermannii.

tunt; quare jure putaverim, præternaturalē extensionem, inflationem & sollicitationem solidorum sensibilium mediatam tantummodo doloris causam esse futuram, ut simplex extensio & sollicitatio est; & sane ut hæc omnia experimentis probanda sint, confessus est mihi vir animo & ira potens, qui cum ab hoste sclopeti ictu in regione tamen mintus principe femoris vulneratus esset, nullum pro ea temporis differentia dolorem sensisse a tanto ictu percutiente & sollicitante; ita ut per aliquod tempus sanum incolumeque se crederet; verum tractu temporis distractis notabiliter nonnullis fibrarum ordinibus, nonnullis vero contractis, & mutata fibrarum directione naturali parallelismo earundem cum inæqualitate, ac dissimilitudine angulorum, quas fibræ inter se contextæ componunt, dolor, & quædam convulsionis species supervenerunt. Itaque dolor non fieri videtur ab irritatione, seu sollicitatione, & violenta extensione & violenta extensione tanquam a causa immediata, ut irritatio seu sollicitatio, & præternaturalis extensio est organorum; sed quia ab irritatione, sollicitatione præternaturalis extensio est organorum; sed quia ab irritatione, sollicitatione & præternaturali extensione subsequitur postea effluxus fluidorum in partem læsam, quæ præternaturaliter dilatent eandem; hinc sequuntur momenta distractionis in aliquibus, in aliis vero fibrillis momenta inæqualia contractionis dissimilia & asymmetra, cum inæquali & dissimili & improporcionata directione, ac motu earundem; mutato ulterius naturali parallelismo filamentorum componentium membranas, nerveos, musculos, tendines &c. Deinde fateor, me in nobilissima Moniali frequenter observasse convulsivas affectiones; in qua si pollex pedis convulsus tantummodo esset, sævissimosque dolores ægra sustinebat; e contra fere nullos quotiescunque tota pedis regio æquabiliter & unimode convulsa traheretur. In hac re non ne chirurgicis experimentis manifestum est, vulnerato nervo, aut læsa membrana nervum investiente, cujus aliqua tantummodo pars fibrarum læsa sit, aut abscissa integra autem manente altera fibras nonnullas inæqualiter, inordinate & asymmetre distractas, nonnullas vero contractas motibus asymmetris, mutata fibrarum naturali directione, ordine ac parallelismo, cum mutatione angulorum a naturali inclinatione dissimilium, spasmos convulsivos

ac dolores acerrimos attulisse: qui non nisi rescisso omnimode nervo (cujus rescissionis opere omnes fibræ componentes æquabiliter contrahuntur) tuto ægri solatis doloribus quiescere consuecunt. Antequam autem de hac tabula manum avertamus, remanet animadvertendum, vim, conatum & momentum fibrarum distractionis & contractionis præpollens tantæ aliquando actionis esse supra momentum æquipollens distractionis earundem, ut fibræ tam violenter distractæ, aut contractæ, fibrarum & organorum læsionem aliquando attulerint, ut divulsionem earundem miserrime ægri passi fuerint; Id semel animadverti in nobili Juvene annorum 20. qui cum satyriasi & febris correptus esset sine dolore, post sex dies facta notabili solidorum divulsione, & secuta magna sanguinis effusione per alvum, enervato priapismo, sed versus regionem hepatis dolore superveniente adaucta ulterius febris post triduum obiit. Ibi autem præterire non licet nonnulla, quæ a chirurgis observationibus desumpta summopere & theoriæ & curationi convulsionum conferre videntur; observatum enim est sæpissime vulnera capitis ex dextra transferre convulsionem in sinistram partem, & e contra. Cum enim momenta contractionis & distractionis pericranii, menyngum & lacertorum dependentium per cerebri peripheriam in statu naturali debeant esse ex utraque parte inter se æquipollentia; nempe in ratione veluti reciproca cum opportuno æquilibrio & reactionum menyngum & lacertorum, totiusque pericranii (quod menyngum expansio est;) quotiescunque momenta distractionis & contractionis pericranii, menyngum, & lacertorum dictorum ex parte dextra, vel ob externam læsionem, vel ob internam aliquod vitium, aut infirmetur, aut omnino deficient; statim infirmatis lacertis ex parte dextra, lacerti antagonistæ ex parte sinistra acquirunt necessario ea momenta præpollentia contractionis, quæ majorem rationem habeant ad momentum oppositum enervatum contractionis ex parte dextra; sic & convulsionem ex sinistra sequi debebunt.

Quod si momenta distractionis & contractionis omnino deficient ex parte dextra, multo magis lacerti antagonistæ ex sinistra parte necessario acquirunt ea momenta præpollentia contractionis, quæ summam rationem habent ad deficientia momenta contractionis & distractionis in parte dextra; quare cum momenta contractionis ex parte dextra

dextra nullo modo reagere apta sint, deficere supponentur, atque erunt — o; & cum momentum contractionis in parte sinistra adeo præpollat, ut quodammodo viribus infinitis æquipollere videatur; ibi momentum præpollens erit multo majus, quam suppositum fuerat supra — b 3 † e; & consequenter ex parte sinistra enormes attractiones & gravissimæ convulsiones erunt orituræ. Quamobrem cum a tam validissimis convulsionibus & attractionibus in parte sinistra meninges crispata substantiam cerebri validissime stringant, & ob filamenta per suturas exeuntia, & per pericranium expansa, & validissime attracta impellatur, urgeaturque substantia cerebri contra crani soliditatem, propterea necesse est, substantiam cerebri, & vasa quoque venosa & arteriosa in parte sinistra graviter lædi, frangi aliquando, aut lacerari; Hæc quidem ex chirurgicis observationibus aperta sunt, quin imo ultro testatur celeberrimus Vallisnerius præceptor meus (1) a celeberrimo Valsalva accepisse, in hemiplexis etiam læsionem cerebri esse in parte opposita illi medietati corporis, cui gravi fato contigit sensus, & motus abolitio. Hic autem dissimulare non placet, quæ facile quis objicere posset; si enim solida nervea, muscularia &c. extendantur, & insentur proxime in ratione composita ex cubo, seu triplicata ratione distantiarum fibrarum inter se, & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum, aut effervescentium, extensio & inflatio solidorum adeo alte excresceret, ut exterius quoque animadverteretur, quod non sine magno naturæ damno contingere potuisset. Optima quidem animadversio, intelligat unusquisque, non semper omnes fibrillas solidum componentes adeo inflari & extendi, ut singulæ in data ratione dilatentur; sed extensionem & dilatationem aliquando uni, aliquando aliquibus tantummodo fibrillis solidum componentibus contingere potuisse, quibus singulariter extensis, non quidem omnibus, licet dolorifica passio & convulsio superveniret, nihilominus extensio & inflatio non adeo immodice fieret, ut exteriora versus magno naturæ damno foras quodammodo erumperet, & appareret; Cæterum si universæ solidi fibrillæ solidum componentes in data ratione dilatarentur, fateri quidem de-

buissem, extensiones & dilatationes adeo supra legem futuras esse, ut ad exteriora quoque effusæ esse viderentur, quod in magnis doloribus & convulsionibus aliquando visum; Opinor tamen membranam carnosam leniter cedendo opportune impedire, ne aliquando ingentes quoque nervorum musculorum, &c. dilatationes exterius videantur; sæpissime certe audiivi, nobilissimam monialem convulsivis doloribus affectam, per exteriora capitis & per abdomen spasmodice extensum nescio quam duritiem hinc inde persensisse, quæ durissimos quosdam nodos æmulari videbatur.

12. Convulsivas affectiones cum dolore, & sine dolore generali quodam ratiocinio usque adhuc investigavimus; modo cum plurimæ adsint convulsionum differentiarum perpendendæ, non arduum putaverim ex firmata universali convulsionum doctrina a singularibus convulsionum differentiis brevi me expedire. Itaque primo occurrit *Tetanus*; hæc enim est quædam convulsionis species, quæ totum corpus una aggreditur; in hac momentum distractionis, seu tractionis nervorum spinæ per posteriores præcipue dorsi musculos ac tendines decurrentium adeo violentum est & excedens, simulque momentum contractionis nervorum, quod præcipue per anteriores musculos seu antagonistas ac tendines pectoris & abdominis, adeo pari opposito conatu operatur, ut utraque momenta fortiter & enixe in ratione violenta æqualitatis conentur statum suum distractionis ex parte posteriore, & contractionis ex parte anteriore valida sustinere: In hoc statu deest illa naturalis facilitas ac libertas transeundi facile, ac libere a statu distractionis ad statum contractionis, aut e contra; Quamobrem cum membrana, nervi, muscoli ac tendines, quibus nervea & membranosa filamenta alligantur tonico motu distractionis, & contractionis æquali conatu ac momento consistent, rigidum videbitur stare animal, nec in utranque partem inclinare. Quamvis verum Tetanum nunquam viderim, hujusmodi tamen morbi indolem obtrigit mihi observare in muliere, quæ per diem apertis oculis adeo rigida omnino constitit, ut nullatenus flecti in utranque partem magnis licet viribus nitentibus potuerit; paulatim tamen

(1) Pag. 27. del cervello impietrito.

tamen remedium usu coepit tantillum movere palpebras, & tractu temporis a tam violento morbo febre superveniente liberata est. Frequentior causa hunc morbum miserrime allatura, feri particulis velut cuneis per membranarum nervorum, & musculorum & tendinum interstitia, aut fortasse per glandulas mucilaginosas præternaturaliter effusis videtur tribuenda. Cum enim in hujusmodi solidis massæ fluidorum seu serosa corpora undequaque distributa tanquam cunei horum solidorum interstitiis ac distantis fibrarum undique inferantur, violenter extendent solida membranosa, nervosa, muscularia & tendinosa proxime in ratione composita ex ratione cubica interstitiorum, nempe in triplicata ratione distantiarum fibrarum inter se & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum: Si itaque quantitates materiæ seu massæ serosæ in data ratione tam posteriores dorsi membranas, nervos, musculos ac tendines, aut glandulas mucilaginosas circa musculos ac tendines a celeberrimo viro Joanne Baptista Morgagno Anatomicorum facile principe indicatas, (1) quam anteriores pectoris & abdominis &c. præternaturaliter fluendo extendant, ita ut vis posteriorum solidorum præternaturaliter extensorum sit æqualis, & æquilibrata viribus solidorum anteriorum, aut antagonistarum præternaturaliter extensorum, horum vires oppositæ inter se æquipollebunt, sicque momentum præternaturale distractionis solidorum ex parte posteriori æquale erit, aut æquipollebit momento præternaturali contractionis eorundem antagonistarum in parte anteriori, unde præternaturaliter stare ac consistere animal coactum erit. Hac methodo in *Emprosthotono* massæ corporum elasticæ, quotiescunque supra legem fluendo per interstitia anteriorum fluidorum, solida dilataverint in ratione composita proxime ex cubica ratione interstitiorum, seu distantiarum inter se, & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum, minus vero extensionem fecerint in posterioribus solidis antagonistis; tunc cum momentum præpollens distractionis membranarum, nervorum, musculorum ac tendinum anteriores præcipue partes decurrentium adeo superet momentum contractionis membranarum, nervorum, musculorum antagonistarum & tendinum posteriores partes occu-

pantium, tunc animal in anteriora curvari conabitur. E contra in *Opisthotono* cum massæ corporum elasticæ cujuscunque generis præternaturaliter fluendo per glandulas mucilaginosas, & per interstitia posteriorum solidorum juxta expositam rationem compositam dilataverint, minus vero extensionem fecerint in anterioribus solidis antagonistis tunc cum momentum præpollens distractionis membranarum, nervorum, musculorum ac tendinum præcipue in partibus posterioribus colli, dorsi, &c. habeat rationem majoris inæqualitatis respectively ad momentum contractionis membranarum, nervorum, musculorum antagonistarum & tendinum in partibus anterioribus pectoris, abdominis &c. animal certe conabitur posteriora versus miserrime inflecti. Ex his colligendum, quam inepte judicent nonnulli succos tantummodo austeros & coagulantes sufficientes pro harum convulsionum causis exponendis, cum quælibet fluida cujuscunque generis hujusmodi morbosa phænomena productura sint, quotiescunque solida membranosa, nervosa, musculosa ac tendinosa cum mucilaginosi horum glandulis in datis rationibus a quibuscunque massis elasticis & non elasticis præternaturaliter extensa fuerint. Plurimæ remanent convulsionum differentiarum, quæ cum dolore & sine dolore facile occurrunt; ut *Spasmus Cinicus*, *Strabismus oculorum*, *Trismus musculorum mandibularium*; *Risus Sardonicus* labiorum; quæ cum differant inter se tantummodo ratione loci, eadem lege momentorum præpollentium distractionis & contractionis poterunt facillime & univoce explicari. Ex his, quæ num. 6., & quæ huc usque dicta sunt de motu contractionis & distractionis solidorum, tam naturaliter, quam præternaturaliter agentium, data proportione, constare potest, momenta contractionis & distractionis solidorum esse posse radices oscillationum tam naturalium, quam præternaturalium, quæ (juxta tamen naturam & rationem fibrarum) in solidis animalium jugiter eveniunt; idcirco ex his oscillationum phænomena tam naturalia, quam præternaturalia satis opportuna proportione enodari poterunt.

13. Modo acturus de morbis, quos potissimum a præternaturalibus meningum motibus oriri putaverim, me recte sentire arbitror,

H h

bitror,

(1) Animadversione VII. Advers. Anat. 11.

bitror, si prius de cerebri & cerebelli motibus probabilia quadam dixerim; fere omnes una consentiunt, cerebrum ex pluribus glandulis, cerebellum vero ex paucioribus esse compositum. Licet vero utrunque communi menyngum involucri vestiatur; attamen non eadem est cerebri & cerebelli ratio ac status. Exterior enim cerebelli superficies multis quidem gyris ac rugis inæqualis est, non tamen quantæ (1) in cerebro, ultro citroque observantur, serie quadam ordinata ab uno latere ad aliud deductæ. Non eadem pariter est directio & ordo lacertorum, qui cerebrum & cerebellum circummeunt; non eadem in utroque æqualis est fibrarum dispositio ac modus. Cum itaque a natura tam diversæ rerum, ac directionum series non frustra, sed divina quadam ratione ac consilio factæ sint, verosimilius crediderim, hæc tam diversa mole, rugis, dispositione membranarum, & directione ac figura lacertorum elaborata fuisse, ut diversis motuum differentiis fibræ cerebri & cerebelli parerent. Sicut enim (2) glandulæ diversæ fibrarum textura, directione, & ordine muniri debuerunt, ut homologis motibus proportionalia fluida separarentur; ita non dissimili methodo a natura probabiliter statutum est, ut cum naturales a cerebello, & voluntarii a cerebro motus, & dissimiles sensuum affectiones, actionesque exequendæ continuo fuerint, diversis quoque membranarum, & fibrarum cerebri & cerebelli specificis motibus agerentur. Quamobrem cum menynges, (pia præcione) cerebrum & cerebellum, fibrasque medullares, sive primas nervorum radices arte ac intime circumligent, jure sentiendum est, ex determinatis ac specificis menyngum motibus, fibras quoque cerebri & cerebelli esse æquali ratione ac motu sollicitandas; & vice versa. Cum enim fibræ medullares cerebri & cerebelli a sensuum, aut internorum affectionibus specificis motibus sollicitari ac moveri necessario debeant; istæ pariter inscriptæ membranæ, seu menyngibus, has tali determinata lege motus moturæ erunt, ut communicato quoque tali menyngum motu, sanguinis fluenti per sinus menyngum, sanguis iose ea ratione motus afficiendus erit, qua fibræ cerebri & cerebelli, & membranæ investientes prius affectæ

fuerant. Hæc, quæ generaliter dicta sunt; nos manuducere quodammodo videntur ad ea, quæ de morbis capitis, de *Epilepsia* potissimum dicenda sunt. Cum enim in hac naturales motus ægre & laboriose fieri, voluntarios vero otiosi, musculos convelli, sensus hebescere; & animæ potentias deficere quodammodo videantur; jure credendum, ex vitiosis extraneisque menyngum motibus, alteratoque fluidorum motu fibras quoque cerebri & cerebelli moleste & graviter affici. *Epilepsia* itaque alia est per essentiam, alia vero per consensum; prima quidem in cerebro sedem firmat; secundam vero inferiorum viscerum consensu fere omnes Medici voluerunt. Prima a quibuscunque humoribus oritura est, sed quibus talis ac determinatus inest motus ac præternaturalis superficies (Medicis adhuc ignota) quæ incognitam menyngibus cerebri afferat sollicitationem; hujusmodi enim fluida hinc inde per cerebrum decurrendo, membranarum & lacertorum musculis proportionalium spatiosa, aut machinulas fortasse sphaeroidilibus analogas præternaturaliter instant, & ignota momenti præternaturalis differentia sollicitant. Membranæ autem, fibrisque medullaribus tali humorum copia ac motu sollicitatis momentum attractionis membranarum majus faciendum est; quod fibrillis cerebri, & nerveis solidis intra & extra cerebri regionem serpentibus gravi consensu communicatum convulsivos motus tribuit, epilepsiam allaturos. Hoc autem momentum attractionis filamentorum nerveorum & membranarum sine dolore futurum erit; quotiescunque ordinata ac simili & unimoda lege, ac æquabili motu factum fuerit, servata naturali fibrarum directione inter se, & naturali parallelismo earundem. E contra molesta & dolorifica epilepsia erit futura, cum filamenta menyngum & nervorum inordinatis & dissimilibus directionibus & asymmetris motibus attracta fuerint, inverso naturali fibrarum parallelismo. Ex hujusmodi motibus convulsivis undequaque contractæ membranæ tam a glandulis, quam a vasorum lymphaticorum osculis serosæ saburræ spumæ in modum violenter per os exprimuntur; sed ultro ingravescent symptomata, cum accadat labiorum, manuum, palpebrarum, totiusque corporis tremor miser-

(1) Ex Verheyen pag. 169. Anat.

(2) Ut num. 9. & seq. Primæ partis Mechanicæ morborum.

ferrimus; qui sæpe adeo solida violenter quatit, ut fracta penitus videantur. Ut autem gravis tremorum methodus explicari quodammodo possit, animadvertendum est, meninges connecti fibris medullaribus cerebri, & superne leniter cranio opera aliquorum filamentorum, quæ per suturas trajecta in periossium expanduntur. Istæ pariter membranz ob plicas ac rugas facile distrahuntur a viribus cum externis, tum internis agentibus, facile ab opposito fibrarum & lacertorum conatu naturaliter contrahuntur, ea quasi ratione, qua in motibus musculorum agunt & reagent muscoli antagonistæ. Itaque momenta contractionis naturalis filamentorum per suturas exterius exeuntium, & eorum, quæ cranio hinc inde alligantur, cum nullatenus in otio sint, vim suam & conatum naturalem exercere, conantur contrahendo exterius membranas versus cranium; sed blando motu & æquabili. Quod si filamenta antagonistica præternaturaliter inflata & sollicitata fuerint, opus impendent suum, ut asymmetre retrahant membranas ipsas ad partes internas oppositas; & tunc temporis cum fibræ menyngum in curvam aliquam superficiem naturaliter inflexæ sint, describent actionibus & reactionibus præternaturaliter reciproce oppositis, eundo nempe violenter & redeundo, veluti arcus præternaturaliter quoque reciprocos. Cum autem in tam angustis ac strictissimis cerebri anfractibus itus & reditus præternaturales fibrarum membranearum sint necessario frequentissimi, ob frequentissimas corporum præternaturalium sollicitationes, pariterque sint minimi: fibræ quoque sollicitatæ & attractæ versus spatia interna cerebri, & eodem reciproco, sed opposito, conatu attractæ exterius versus suturas & cranium, describent veluti arcus præternaturaliter reciproce dissimiles, & pariter necessario minimos ac frequentissimos. Cum autem minimi arcus descripti e reciprocis penduli oscillationibus vel in circulo, vel in cycloide tremulos motus agant & afferant; rationabili analogia judicandum putaverim, convulsivos epilepticorum tremores a minimis fibrarum menyngum arcubus, descriptis a frequentissima & minima actione & reactione earundem esse orituros. Itaque cum meninges nervos undequaque circumscribant, & isti undequaque per universam musculorum familiam effusi sint, eam rationem motuum tremulorum nervis & musculis

communicaturæ erunt membranæ, qualem ipsæ in cerebro susceperunt. Ex hisce ulterius vitiis lentescit certe sanguis in sinubus menyngum, ibique acervata fluidorum quorumcumque saburra non raro timendum, quin fractis canalibus fluida undequaque effusa advehant apoplexiam; sed de hac suo loco. Placet nonnullis, epilepsiæ causas a noviluniis & pleniluniis sæpissime acceptas querere; ob majorem enim aëris pressionem, aut vim instantem facile statuere voluerunt, succos & humores talis indolis ac figuræ, aut plus justo separari a glandulis menyngum, aut certo quodam præternaturali motu moleste moveri. Verum cum epilepticos insultus extra novilunia & plenilunia sæpissime observata sint, rectius consilium cœpi de noviluniis, & pleniluniis tanquam de prima causa, (cum fatear partialiter posse conferre) esse dubitandum. Altera epilepsiæ species, quæ per consensum tam gravia affert symptomata ab inferiorum viscerum, ut hepatis lienis, ventriculi & mesentereri, potissimum vero ab uteri vitiis eruenda est; quotiescunque enim tali vitiosa ratione sollicitantur nervei illi plexus, aut quælibet nervea solida has partes decurrentia, utpote membranæ induta a menyngibus derivata, ea aliquando distractionum, & contractionum vitia transferent in membranas circumscribentes, ut fibrarum similium consensu tandem aliquando meninges ipsæ ea præternaturali ratione sollicitatæ vitiose in cerebro oscillent, qua supra expositum est, tot incommoda epileptica allaturæ; non itaque mirandum est epilepticos, aphonos, stupidos & immemores, sensuque & motu carentes semper fuisse observatos.

14. A tremoribus epilepticis facile transeundum est ad corporis & membrorum tremores. Medica autopsia non raro edocuit, hujusmodi affectiones, vel in musculis, vel in membranæ ac nervis, vel in solidis ac fluidis elastica vi enervatis sedem habuisse; opportunum itaque fuerit de singulis juxta opportunitatem brevi sermonem agere. Quod ad musculos attinet, jam evulgatum est a Borello machinulas rhomboidales, & Bernollio sphæroidales oscillatoria quadam vicissitudine, modo contrahi motibus æquitemporaneis, quæ naturalibus musculorum ordinatis actionibus parere debuissent; aliquando accidit a quacunque causa sive externa, sive interna, sive mixta machinulas illas non ordinato & æquabili oscillationis motu, sed inordinato, & asymmetro soli-

citandas fuisse. Nemo dubitaverit, fibras musculares, quæ tot machinulas sphaeroidales inæqualiter, asymmetre, & frequentissime oscillantes undequaque circumscribunt, has quoque fibras inæqualibus, asymmetris & frequentibus oscillationibus sibi continuo communicatis movendas esse, velit itaque nolit animal, tremulis motibus agitandum erit ex inordinata, & inæquali musculorum oscillatione. Quod ad membranas & nervos spectat, repetantur quæ de tremoribus epilepticis satis clare ostensa sunt; enimvero aut sollicitatione, aut inflatione menyngum lacerti in curvam superficiem inflexi, cum distrahi, & reciproca vicissitudine contrahi necessario debeant, eundo, & redeundo, describunt in tam strictissimis cerebri anfractibus arcus plus justo minimos ac frequentissimos, qui cum ex penduli phænomenis tam in circulo, quam in cycloide observatis tremulos motus producant; certe ex tam membranarum minimo motu distractarum, & minimo motu contractarum reciproca sollicitatione tremuli motus exorientur. Isti autem nerveis solidis communicantur, cum membranæ a menyngibus derivatæ nervea solida circumscribendo eas affectiones tremulas nerveis solidis afferant, quas ipsæ prius aut sollicitatione, aut inflatione in cerebro præternaturaliter susceperunt. Confert ulterius tremori elastico-rum fluidorum vis enervata, vi cujus naturalis solidorum tensio flaccescere confuefcit; dum enim corpora elastica debito virium ac momentorum numero continuo oscillant, solida circumscribentia ea tensione gaudent, qua solida ipsa tonico quodam statu naturaliter extensa aut inflata detinentur. Verum si elastica corpora debito numero deficient, tot solida, cum nec continuo, nec æquabiliter opportunis viribus extensa, & inflata, naturali ac debita ratione possint consistere, hæc prout elasticis fibris prædita frequenti vicissitudine transibunt ab una parte minimæ dilatationis ad partem oppositam minimæ contractionis. Quare cum huiusmodi reciprocatio motuum minorum oppositorum præternaturalium tremulos motus afferat, necesse erit, ut enervato solidorum & fluidorum elastico conatu ac momento, solida quoque nervea, & muscularia in tremores itura sint; & consequenter labia, manus, palpebræ, & reliquæ corporis partes continua oscillationum reciprocatatione a tremoribus sollicitentur. Ita quoque si elastica corpora inertibus aut ex-

traneis corporibus unita fuerint, producentur membrorum actiones mixtæ ex conatu corporum agentium, & impredientium; cum enim causæ aliquem effectum adjuvent in ea ratione, qua ipse augentur, aliæ vero impedian, aut minuant, erunt effectus semper directe ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut causæ impedientes, aut minuentes. Quamobrem cum momenta ac vires corporum elasticorum in nerveis, ac muscularibus spatiolis naturaliter agere conentur, impedian vero, aut minuant elasticas actiones corpora præternaturalia, quibus elastica commiscuntur; actiones, musculorum & membrorum seu motus eorundem erunt directe, ut vires adjuvantes corporum elasticorum contentorum in nerveis, & muscularibus spatiolis; reciproce vero, ut vires corporum præternaturalium impredientium, aut minuentium actiones, ac motus eorundem. Itaque vel causæ modo effectum adjuvent, vel modo simul impedian, utraq; tamen & adjuvando & impediendo, nisum & conatum suum exercent; qui nisus ac conatus cum sint præternaturales, nunquam eam inter se proportionem adipiscuntur, qualem natura exigit, ut inter se nisus ac conatus isti æquilibrentur; oportet itaque huiusmodi conatus ac momenta præternaturalia inæqualiter agendo, & inæqualiter reagendo taliter sollicitare membra, ut tremulis & asymmetris motibus & oscillationibus agitentur. Si ergo momenta aliquarum membranarum, aliquorumque nervorum ac musculorum, opere præternaturalis causæ, habeant rationem majoris inæqualitatis respective ad opposita momenta musculorum antagonistarum, aliorumque nervorum, membranarum, tendinum & ossium; cum ex momentorum inæqualitate non possint æquilibratæ potentiz æqua ratione consistere, erunt facile ex frequentissima actione, & reactione corporum momentorum inæqualium tremulis motibus agitandæ; verum deficientibus hisce musculorum tendinum & ossium momentis facile reparandum erit, si pondus aliquod proportionale tremulis manibus sustinendum adderetur; hoc siquidem ponderis externi augmento actiones, & reactiones præternaturales corporum agentium & reagentium ad naturale æquilibrium restitutæ, felicissime, ablato tremore, conquiescere debuerunt.

15. Et jam ad eam morbi speciem deventum est supra ceteros morbos timendam, *Apoplexiam* videlicet, quarum una fortis est.

Apoplexia.

est, quæ subito animal interficit; altera vero levior, quæ morbum & mortem protrahit. Ut autem de utraque opportunum sermonem habeam, juvat repetere, quæ celeberrimi viri Joannes Fontanus & Antonius Pachionus de motu systolis, & diastolis menyngum apertissime docuerunt. Studio itaque naturæ bene se habentis decretum est, motum cordis esse motui talium membranarum proportionalem; cumque isochronus esse debeat naturalis motus cordis & articularum, isochronus quoque menyngum motus futurus erit. Magnis autem usibus moveri meninges supra statutum, potissimum vero uni inservit homologo, nempe impulsui sanguinis per universa cerebri vascula; præcipue vero per sinus menyngum, ut ab his sanguis per venas in cor proportionali quoque motu circumeat restitutus. Si itaque inauspicato accidat, aut a glandulis menyngum a supra laudatis viris Fantono & Pachiono feliciter observatis, aut ex nimis effuso sero a canalibus lymphaticis, aut ex nimis violento sanguinis impetu, aut ex quacunque alia præternaturali causa, naturalem menyngum texturam, rugas aut plicas vel in tota peripheria, vel aliqua in parte ejusdem gravi fato præternaturaliter laxari, extendi aut rumpi, ita ut omnino deficient, vel in universa menyngum peripheria, vel in aliquo spatio ejusdem reciproca momenta distractionis & contractionis fibrarum, & vis diastolis & systolis earundem; tunc cum in hisce solidis præternaturalis status inertiae praviter fiat, sanguis & quæcunque alia fluida elastica & non elastica enervato, aut deperdito motu variam apoplexiæ speciem erunt allatura. Non eadem tamen futura erit morbi indoles: etenim si spatia menyngum aut laxata, aut inertia, aut fracta eas amplectantur ac vestiant nervorum origines, aut ductus eorundem, qui per musculos dextri aut sinistri brachii, dextri aut sinistri pedis excurrunt, sensum & motum hisce partibus donaturi; tunc vel dextrum brachium, vel sinistrum, sive dextrum pedem, sive sinistrum infirmari, aut impediri necesse est. Caterum si graviore fato, aut tota menyngum regio, aut ea menyngum portio, quæ cardiacos nervos ab origine, & toto progressu investit, aut laxetur, aut iners fiat, quodammodo frangatur, tunc statim impedito sanguinis circuitu, cessante motu cordis, fortè apoplexia erit animal moriturum. Hinc sæpe in apoplecticis laxatis potissimum

cerebri & cerebelli menyngibus, quæ fibris medullaribus undequaque alligantur, fibrarum medullarium series, seu progressiones ordinatæ earundem a porportionali ordine ac situ naturali declinare coactæ erunt; fiet itaque motus fibrarum primo iners ac languidus, simulque fibris acquirentibus directiones, positiones ac situs a naturali statu dissimiles, seu inclinationes præternaturales, inversa ratione naturalis proportionis earundem exorietur gravis phantasmatum confusio, & ex potentia memoriæ enervata oblivio. Sed de memoria, & de reliquis animæ affectionibus præternaturalibus secunda dissertatione agendum erit. Interim cum apoplectico insultu correptos, aphonos quoque sæpiissime viderim, non erit magni negotii opus rem ac causam aperire; laxata enim menyngis portio, quæ recurrentibus nervis responderet, iisque per laryngis musculos decurrunt, non eam rationem motus datura erit vocis edendæ proportionalem. Verum non a laxitate menyngum & fibrarum cerebri oriri apoplexiam tantummodo judicandum est; verum etiam ab ariditate, aut convulsiva crispatura earundem facillime orituram esse credimus; hominibus enim ultinio senio correptis adeo meninges arefcunt; ut moveri inepte debeant, & urgere sanguinem opportuno impulsu non possint enervato momento distractionis: pari methodo augeri inertiam motus credendum, si convulsivæ affectiones prohibeant ea momenta distractionis, quæ a natura statuta sunt, sanguis enim & fluida quælibet, cum non æquabili motu, nec ordinato, neque continuo urgeri possint, facillime tam in senibus, quam in convulsis motus cordis & vita ipsa auferenda est. Nonnulli *Apoplexiam per consensum* facile nominant; verum cum quælibet apoplexia semper opus suum funeste in cerebri regione exerceat & compleat, supervacuum putaverim de apoplexia per consensum ulterius dicere.

16. Apoplexia superveniente aut statim moriendum, aut membrorum stupore, una cum abolito motu sæpe paralytice vivendum est: grave tamen onus est, sensus & motus deperditi, aut enervati causam reddere; licet enim celebres Philosophi ac Medici plurima de sensu & motu alte disputaverint, curandum tamen, antequam de paralyti loquamur, de sensu & motu quædam dicere, paralyti necessaria affecuturis. Cum itaque similitudine quæri debeant, quæ vere a natura rerum obtineri non possunt, cre-

Paraly-
sis.

crediderim primo, rationalem animam adeo intrinsece, arte & intime uniri, applicari & compenetrari viventibus organis, ac sensoriiis, ut minori penetratione lumen purissimo, purgatissimoque vitro ac crystallo applicetur, idemque crystalum penetret, quam anima sensoriiis, organisque compenetratur. Hæc organorum opera duas actiones divinitus exercet; quarum prima & eminens in cerebri fibrillarum motibus se ipsam eximie ostendit, per imaginationem, discursum & memoriam, de quibus suo loco; secunda vero humilior est, quæ membranarum nervis, musculis, &c. indiget pro sensu & motu exequendis, quam hic brevi probabilique ratiocinio inquirendam curamus. Itaque pro sensus organo membranas undequaque construxit, varias textura, ordine, directione, ac modificatione dissimiles, variis sensuum differentiis proportionales; pro motu vero duabus indiget natura musculorum speciebus præter nervos, quarum altera naturalibus actionibus famulatur; hæcque continenter moveri debet opera fibrarum taliter modificatarum, & fluidorum continue impellentium; altera vero imperio animæ movenda est, ut voluntariis motibus pareat: utraq; tamen, ut apte summis naturæ operibus faveant, æque, perfecte, ordinateque dispositæ, & elaboratæ, purisque fluidis irrigatæ esse debuerunt. Sicut itaque lumen alteratur & afficitur a quocunque latere, angulo, superficie ac motu corporis illuminati; ita similiter anima solidis intime unita ac compenetrata, juxta quoscunque motus solidorum diversas patitur affectiones solidorum affectionibus homologas; anima etenim divino quasi lumine donata cum specificis motuum differentias habitudine & usu sentiat ac cognoscat; & cum universæ organorum affectiones a specificis, determinatisque motibus determinantur, non dubitandum, rationalem animam a specificis motuum organorum differentiis, specificas eorundem organorum affectiones taliter sentire ac cognoscere debuisse. Sentit itaque anima, quæ sensus ipsi sentiunt; & qua ratione afficiantur sensus, ea animam ipsam affici necesse est; hinc ex tam intimo animæ cum organis vinculo reciproce judicandum, affectiones ejusdem necessario sensibus ipsis communicari, ut quantum ipsa patiatur anima, tantum data proportionem sensoriiis naturaliter se habentibus affectione communicata, opera compenetrationis, sensoria pati re-

neantur. Cæterum si organa sensibilia, aut enervata fuerint, aut vitiose modificata, impedita, aut læsa, sensus quoque aut enervati sent, aut torpidi, aut ægri, aut aboliti. Hinc anima ipsa ex enervatis, aut impeditis, aut abolitis organorum sollicitationibus, aut languide, aut vitiose, aut nulla penitus ratione sentire poterit, sensuumque differentias opportune cognoscere. Licet vero sensationes ubique fiant, & animam juxta leges specifici motus organorum undequaque afficiant; nihilominus animæ judicium de motuum natura, ratione, ac sensibilibus qualitate non nisi in cerebro, ut regia animæ sede faciendum est; ibi siquidem communicatis organorum motibus, aut sollicitationibus specificis, ac determinatis *Pia Menynge* (quæ sensus communis organum suspicari jure potest) & consequenter fibris ipsis medullaribus, quæ a pia matre immediate vestiuntur, anima habitu, usuque exercita, adeo recolligit eas affectiones ac motus, quæ sensoria sua, animamque ipsam antea sollicitaverant, ut juxta determinatas rationes motuum, qui sensibus proportionaliter communicantur, hos acutissime, virtute, usu ac habitu acquisitos cognoscere ac judicare teneatur; sed de animæ actionibus suo loco.

17. Hæc breviter de sensu dicta sufficiant. Res paulo obscurior mihi visa est, de motu animalium disputare; cogitanti tamen mihi sæpenumero, & in hac re meditati occurrunt potissimum duæ sententiæ, quæ naturalis & voluntarii motus phænomenis probabiliter satisfacere videbuntur. Utranque hypotheticè asseram; unusquisque autem eam amplecti poterit, quæ probabilior fuerit, & quam ad enodanda naturæ phænomena aptiorem fuisse judicaverit, eam imitatus *Astronomorum methodum*, qua nonnulli per circulos, nonnulli per ellipsim, nonnulli per alias curvarum rationes phænomenis & motibus planetarum apte satisfaciunt (ut de vorticibus cælestibus ostendit celeberrimus vir Joannes Pölenus omni laude meritissimus) eundem finem divisa licet methodo adepturi. Itaque juxta veritatem querendam me facturum puto, si audeam ad modum hypothesis utranque sententiam probabiliter ratiocinio patefacere. Magnum apud omnes, qui recte & graviter judicant, pondus habet sententia illa celeberrimorum virorum Borelli ac Bernoulli, voluntarios motus musculorum fieri imperio animæ, quæ per nervos ob subitanam effervescentiam spirituum ani-

malium, seu succi nervei & nerveis tubulis effusi sanguini & lymphæ commixti, cujus effervescentiæ impetu extenduntur machinula illæ rhomboidales musculorum cum Borello, aut sphæroidales cum Bernollio, contractionem musculorum exercet: ut autem huius hypothesi idea facilius ac clarius doceatur, putabo rem fore necessariam, si Bernollii ipsamet verba methodo Borelliana elaborata aperuerim. Inquit itaque num. 4. Doctissimus Bernollius: *Iis itaque generaliter assentimur, & statuimus cum Borello, nervos esse congeriem tubulorum substantia quadam spongiosa repletorum, quæ substantia semper turget, & plena est fluido summe volatili a cerebro supposito ejus nature, ut si cum sanguine commisceatur, subitanæ effervescentiæ pariat. Et hoc fluidum illud ipsum est, quod vulgo spirituum animalium nomen habet: Si anima imperat aut vult, hoc fieri non potest, quin ex necessitate mirabilis unionis, quam Omnipotens Deus inter animam nostram & corpus constituit, & quæ nos hætenus & usque latebit, quin, inquam, fiat in cerebro localis quadam agitatio spirituum animalium, qui vellicando principium alicujus nervi concutiant per totam longitudinem spiritus intra contentos; non secus, ac fit in baculo, cujus extremitate una vel tantillum commota, altera pariter ob contiguitatem partium commovebitur; Sic itaque ab irritatione principii nervei guttula extrema fluidi ad nervos spectantis ex altero osculo levi vibratione ejicitur, & hoc modo ex omnibus aliis nervulorum per muscolum dispersorum osculis simul ad nutum voluntatis totidem guttula evomuntur; quemadmodum autem spongia turgida guttulas pendulas effluere non sinit, sic etiam si oscula ista extrema nervorum semper sint patula, guttula tamen fluidi modo memorati sponte, & sine quadam concussione non excidunt, quia substantia spongiosa nervorum eis loco valvularum inservit. Sequenti vero num. 5. addit: Quando igitur ab imperio voluntatis, vel a consuetudine nature (quod fit in motibus involuntariis) eo, quo dixi modo innumere guttulae per totam musculi molem, quæ instar spongiæ semper sanguine humectata est: simul ejiciuntur ex orificiis nervulorum, tunc eadem particule tenuissimæ spiculis suis subtilissimis impactæ in particulas sanguineas tenuiores easdem distinguunt, & insito aëri condensato exitum præbent (ut docui in mea dissertatione de effervescencia, & fermentatione) ebullitionem, & subsequens mu-*

sculorum inflationem producit; unde contractionem earundem subsequi necesse est. Videatur ulterius Borellus cap. 3. 2. tom. de motu animalium; de causis probabilibus vitalis contractionis musculorum prop. 22. & sequentibus, ex quibus manifesto constabit tantæ hypothesi ratio, ordo, & methodus, enodatis ultro difficultatibus illis, quæ hanc hypothesin evertere potuissent.

18. Licet tantorum virorum doctrinæ & auctoritates eo pretio sint apud nonnullos, ut fateantur, id semper summæ gloriæ ipsis fuisse, cum Borellianas, aut Bernollianas hypotheses sequi potuissent; attamen philosophandi gratia sperant se veniam fore consecuturos, si aliquando alteri sententiæ assentiri videantur. Hisce itaque plurima non arrident; primo siquidem, licet probabilem putent succi nervei & spirituum animalium existentiam, tamen non eo officio credunt comparatos, ut sensum & motum primum tribuant: etenim non putant glandulas corticales cerebri tale, tantumque fluidum separare posse, cum Malpigijs capite de liene pag. 305. nervum natura sua succum sero & parce vehere ingenue expertus sit, nec fibras medullares, & nerveas solida separatum succum tanto officio sensuum, & motuum undequaque vehere. Inde non facile credunt, voluntatis imperio fieri posse localem in cerebro agitationem spirituum, qui vellicando principia alicujus nervi concutiant per totam longitudinem spiritus intra contentos, ut guttula extrema sui li ad nervos spectantis ex altero osculo levi vibratione tam cito, tam prompte ejiciatur, & ut cum sanguineo & lymphatico fluido mixta statim fermentescens subitanæ distentionem machinularum, & contractionem musculorum efficiat; si enim frequentissimo & continuo voluntatis imperio in continuis motibus musculorum guttulae semper succi nervei continuo tribuendæ essent, ut cum sanguineo & lymphatico latice effervescent; laboriosum quidem naturæ opus futurum esset, & summum onus glandularum cerebri tantum succum suppeditare nerveis canaliculis, tantis continuisque motibus parem. Arduum ulterius putant, credere tam citum, tam facilem gressum, & regressum spirituum per nerveos canaliculos imperio animæ, & quomodo spirituum particulæ infinite parvæ & elasticæ intra teneras nervorum fistulas, etiam adjuvante vinculo succi nervei, contineri possint. Hæc & plurima alia, quæ, ne tædio essent, relinquere

voluerunt, adeo aliquorum Philosophorum ingenia turbaverunt, ut de tanto spiritu & succi nervei usu, & officio quod ad sensum & motum pertinet, dubitaverint, asserentes facilius esse, de adversariorum suppositis dubitare, quam eorum suppositis acquiescere. Licet autem spiritibus & succo nerveo officia sensus & motus primario non tribuant; nihilominus de succi nervei existentia dubitare non ausi sunt; existimant enim, a sanguineis & lymphaticis vasculis undequaque nervea solida circumscribentibus tribuendum esse nervis fluidum quoddam, quod peculiarem naturam, ac indolem nactum (ut in ossium medulla accidit; sine qua brevi ossa arescerent) *nervus solida nutrit, mollia tenet, & aliquod tensionis momentum tribuit*; ut hæc solida taliter disposita animæ organis ipsis compenetratæ & naturæ magnis in operibus prompte ac facile pro sensu & motu ab anima exequendis parerent. Quamobrem non de succi nervei existentia, sed de officio sensus & motus juxta Borelli & Bernollii sententias dubitare voluerunt.

19. Probabilius itaque consilium putant, eam amplecti sententiam, quam nuper celeberrimus Steno adumbraverat; nimirum per solam mutationem figuræ musculorum contractiones & distractiones seu elongationes in motibus eorundem fieri potuisse. Id tamen animadvertendum voluerunt, non omnino eam sequendam Stenonis ideam, qua docuerat, musculos contrahi & elongari sola mutatione figuræ simplicis musculorum simplicium, qui unicum rhombum constituunt; sed scienter judicaverunt, contractionem & distractionem seu elongationem musculorum habendam quidem esse per mutationem figuræ musculorum, sed compositorum componentium plura spatiola seu machinulas, quarum non planarum, sed solidarum figurarum muscularium mutatione necessaria, sine spirituum & succi nervei auxilio, modo contractiones, modo elongationes eorundem in motibus exequendis habendæ sunt; sola itaque mutatio figuræ non simplicis, sed solidæ musculorum compositorum id operis sine spiritibus & succo nerveo præstare felicius potest, quod minus apte spiritibus & succo nerveo tribuere plerique voluerunt. Cur enim in voluntariis motibus, (de quibus hic potissimum sermonem habemus) hac de re dubitandum? Cur enim anima intime unita ac compenetrata sensorii non poterit virtute sua,

suoque impetu, usu potissimum ac consuetudine acquisito, (usu enim & ipsa paulatim acquirit, aut fortasse repetit scientiam) cito ac facile juxta opportunitatem actionum, quas ipsa exigit, movere taliter organa, naturali tamen statu se habentia, hos potius nervos, quam illos, a quibus hi vel illi musculorum motus consequi necessario debuerunt? Cur quæso tam eminens anima, quæ in consuetis musculorum motibus machinarum sphaeroidalium oscillatorio motu uti consuevit, non poterit in validiorum motuum necessitate usu paulatim experta & edocta tali ratione ipsamet dirigere, disponere & modificare fibras machinularum, ut aliquando non amplius sphaeroidalia, sed octaedrica, & in summis, violentissimisque motibus exequendis, intra tamen limites naturæ humanæ isoedrica, aut etiam sphaerica spatia componat? quæ cum ex sola mutatione figurarum solidarum, (ut ex isoperimetris notum est) majores ac majores acquirant areas ac superficies, jure optimo eam dilatationem, & contractionem citissime asserre musculis ac solidis debuerunt necessariis motibus opportunam, quam fortasse temere elastico & fermentativo fluidorum motui fere omnes Philosophi veterum auctoritate præjudicati tribuere voluerunt; Qui negaret, a tam eminente anima usu ac habitu edocta hæc fieri cito ac facile non potuisse, certe tantum potentia animæ organis compenetratæ detrahendum vellet, quantum temere spiritibus aut elasticis succis non immediate unitis tribuendum voluit. Si enim anima, ut nonnulli credunt, imperio suo movet spiritus & succos elasticos a seipsa sejunctos, cur multo magis non poterit movere ac modificare organa sua juxta figuras illas, quas habitu & usu perceperat iis, vel illis actionibus exequendis opportunas, cum immediate organis unita sit ac compenetrata? Si natura ex sola figurarum mutatione in naturalibus & artefactis tot actiones felicius ac citius naturales & præternaturales exequitur; cur multo magis anima organicis compenetrata cito ac facile tam necessaria motibus & actionibus suis exequendis hac methodo persequi non poterit; cum anima tanto natura perfectior habeatur? Itaque si anima intime unita & compenetrata sensorii organa ipsa immediate dirigere, modificare, componere ac movere virtute sua, usu & habitu acquisita cito ac facile potest, quæ mediate tantum per spiritus, aut succos elasticos

Alcos agere ac movere tardius debuisset, probabilius creditum a nonnullis est, animam in motibus voluntariis virtute sua & usu agere voluisse & debuisset, ut sola mutatione figurarum & organorum ea beneficia contractionis & elongationis musculorum facile ac cito ab ipsamet anima sibi compararet, quæ tardius ac difficilior per spiritus, per succos elasticos fermentescentes fortasse minus apte obtinere potuissent. Arguunt tamen valide Borelli sectatores, cum impedito aut ligato nervo sensus obstupescere, & motum partium, ad quas nervæ illæ ramificationes excurrunt, interire penitus experiantur. Si itaque vis, consuetudo & potentia animæ habitu & usu acquisita ea esset, quæ figurarum solidarum mutatione dirigeret, modificaret, moveret, ac componeret varia configuratione machinulas illas sphaeroidales musculorum juxta necessitatem occurrentem motuum exequendorum, certe, etsi nervi impediti, aut ligati essent, posset tamen taliter organa sua movere, modificare ac dirigere, ut motus suos opportune exequi concederetur. Verum si tam celebris dubitatio jure optimo expendatur, non dubitandum, hanc facile fore exolvendam. Licet enim anima sit intime unita ac compenetrata organis, ut apta fiat movere, modificare, dirigere & agere sensoria ipsa juxta suorum motuum exigentiam, intra tamen limites naturæ humanæ; nihilominus semper ipsamet prout organis compenetrata tenetur agere, suasque actiones exercere dependenter ab organis. Si itaque organa naturalia, sana & apta actionibus obeundis constiterint, ipsamet anima recte, opportune & naturali modo operabitur; cæterum si organa vitiosa fuerint, impedita, aut fracta, ut frustra esse videantur, cogetur anima ipsa suorum organorum vitia, impedimenta ac labes pati, & sustinere, exequendo dependenter ab organis vitiosas actiones, aut impeditas, aut nullas. Ex his arbitraturum est facilius ac clarius demonstrari obscurissima phenomena; cur nempe sensus aliquando obstupescant illaeso motu? & cur deperdito aliquando motu sensus adhuc superstites habeantur? Sensus enim fiunt specificis motibus membranarum; motus vere voluntarii imperio, actione & usu animæ organis compenetratæ dirigentis naturales machinulas sphaeroidales solidorum musculorum juxta rationem figurarum exequendis mo-

tibus proportionalium. Difficilius siquidem & obscurius semper fuit, gressus & regressus spirituum per eosdem nervos modo ad sensum, modo ad motum, modo ad utrumque eodem tempore per totam animalis machinam supponere voluisse, quin facile consequatur actio & reactio corporum, & inde confusa sensuum & motuum momenta, cum animæ & naturæ vitio & actionum aberratione. Hæc satis breviter dicta sufficiant de motibus voluntariis organorum imperio animæ exequendis, cum de naturalibus organorum actionibus ac motibus in sequenti dissertatione dicendum sit. Itaque quidquid sit de his, quæ dicta sunt de tam eminentibus animæ actionibus & de motibus voluntariis organorum, unusquisque eam sibi eligat sententiam, quæ animæ & naturæ actionibus enodandis probabilior futura fuerit, cum utraque opinio opportuna Philosopho, probabilis Medico, licita Catholico videatur.

20. Redeuntes modo unde digressi sumus, innotescunt facilius causæ illæ quæ paralytici erunt allaturæ. Hujusmodi itaque morbus, qui aliquando deficientiam motus, & sensus, sapius vero imminutionem utrique asserre consuevit, fieri potest vitio membranarum nerveis solidis, cæterisque organis circumscriptarum; vel vitio fluidorum elasticorum, aut præternaturalium intra spatiola muscularia & fortasse etiam nervea contentarum, vel vitio utrorumque; quod si hujusmodi vitiosæ affectiones totum fere corpus opprimant, *Paraplegiam*; si vero vel dextram, vel sinistram partem una cum capitis medietate afficiant, *Hemiplegiam* communis vocabulo appellare Medici voluerunt. Quamobrem quod ad vitia membranarum spectat, cum meninges universam nervorum familiam undequaque investiant, si meninges enervatæ fuerint ac languidæ, membranæ quoque consentientes, quæ nervos investiunt, necessario flaccescent, & filamenta nervea solidum nerveum compo-nentia non eam inter se unionem adipiscuntur naturali soliditati nerveæ proportionalem. Verum cum ex majori unionem filamentorum nerveorum inter se massa nervea densior fiat, hæc majorem rationem habebit ad nervorum volumen; e contra cum ex minori unionem filamentorum nerveorum inter se massa nervea rarior futura sit, hæc minorem rationem habebit ad idem nerveum volumen. Cum autem ex densitate massarum fiant corpora consistentia ac va-

Para-
plegia.
Hemi-
plegia.

lida, ex raritate vero fiant cæteris paribus minus consistentia sive debilia, arbitrandum erit ex majori laxitate membranarum nerveis solidis circumscriptarum nervea solida minus consistentia, minusque valida fieri, ex minori vero laxitate membranarum nervea solida magis consistentia futura esse. Quapropter si ex una parte momenta membranarum, nervorum, musculorum & tendinum habeant rationem minoris inæqualitatis respective ad momenta membranarum, nervorum, musculorum & tendinum antagonistarum ex alia parte; cum vires & actiones ex illa parte nervorum, musculorum, tendinum & ossium, quibus tendines alligantur, aut deficere possint, aut saltem imminui, motus quoque membrorum in hac, aut omnino deficiet, aut si aliquis remaneat, ex tam inæquali, & irregulari actione, & reactione momentorum inæqualium tam ex una, quam ex alia parte, motus quosdam infirmos & enervatos, aliquando quoque tremulos supervenire necessum est. Non solum autem a laxitate membranarum nervea solida inscripta minus consistentia fiunt, ac debilia cum motus imminutione, aut abolitione; verum etiam facillime impleri possunt materia quadam lymphatica, quæ membranas ac nervea solida non tantum ultro opprimat, verum etiam elastica corpora impediatur, ne naturales conatus elasticitatis exerceantur; quippe, cum solida nervea rariora reddita massam habeant, quæ minorem rationem habet ad suum volumen; volumen vero sit spatium, quod corporis massam cum interspersis poris occupat, certe tot pori acquisiti a volumine solidorum nerveorum rariorum implendi facile erunt a fluido lymphatico undequaque effluente; ibi autem firmato sero cum pondera corporum sint quantitibus materiæ, seu massis eorum proportionalia, nervorum pondera, ac momenta enervata augebuntur in ratione composita ex ratione corporum elasticorum enervatorum, (quæ probabiliter etiam in nerveis solidis continentur,) & ratione quantitatis seri derivati in poros voluminum nerveorum. Quamobrem nervea solida ultra naturæ leges onerosa facta inepta fient ad motum; deinde huiusmodi solida tot seri particulis præternaturaliter repleta, cum minus expedita ad motum fiant, minusque disposita ad elasticas vibrationes, sive motus naturales oscillationum obeundos, non solum motus musculorum,

verum etiam sensibilibus affectionibus, aut languide, aut nullatenus poterunt exercere; cum enim enervata membrana, & filamenta nervea laxata, non eam solidorum tensionem, vim ac consistentiam afferant, quæ naturali constitutioni, seu naturali momento contractionis organorum sensibilibus convenire videatur; jure corpora quælibet sensibilia, cum nullatenus, aut opportuna ratione motus sensoria afficere possint, sensationes non producent; aut si æqualiter sint productura, sensoria obstupescere videbuntur. Ex his aliæ consequuntur paralysis causæ; enimvero nervea solida laxata ob laxitatem membranarum investientium non eam densitatem tribuere possunt corporibus elasticis intus contentis, quæ necessaria esse videatur, ut vires sibi naturales exerceantur; enim vero cum densitates corporum elasticorum quamproxime elasticitatibus suis proportionales fiant, a quibus vis & robur solidorum dimetiuntur, & ordinata corporum elasticorum vi & conatu oscillatorio, nervea quoque solida opportuna vim tensionem, & robur sustinere naturaliter aptæ erunt; hinc colligendum ex membranarum laxitate, nervei quoque solidi aliquando & sensus, aut omnino, aut aliqua ratione deficere debere. Præter hæc fluida elastica juxta nonnullos intra nervorum spatiola, potissimum vero intra spatiola sphaeroidalia musculorum contenta, si aut quantitate naturali deficient, aut extraneis corporibus unita opportuna momento careant, non ea in nervis ac musculis vi aut momento tensionis donata erunt, quod & ad membra movenda & ad sustinenda pondera pertinere videbatur. Quare aut nullus fieri poterit membrorum, organorumque motus, aut si aliquis supersit, enervatus ac languidus futurus erit. Hæ sunt præcipue paralysis causæ, quæ aut motum impedire, aut sensum enervare aptæ sunt. Cæterum si expositæ huiusmodi causæ supra modum graviores extiterint, ita ut summa fuerit laxitas membranarum meningum, & consequenter earum, quæ opportuno consensu nervea solida circumscribunt, aut nimius fuerit defectus corporum elasticorum in nerveis fortasse, & muscularibus spatiolis sphaeroidalibus, aut nimia & excedens seri copia, aliorumque fluidorum præternaturalium, quæ hæc vel solida graviter opprimat; tunc non paralitice affectiones organorum, sed apoplectice denuo orientur.

21. Ab his, quæ dicta sunt, facile datum

Lethargus.

Coma

Carus

tum erit proficisci ad affectiones illas, quibus gravi sopore, ac somno animalia gravari consueverunt. Harum affectionum præternaturalium licet varix sint species, attamen non causis, sed gradu differunt; *Lethargus* enim gravem, profundumque somnum cum oblivione, & læsione operationum animalium una cum lenta, sed continua febris sibi comparat; *Coma* vero propensionem ad somnum gravem affert & invincibilem; *Carus* autem longum profundumque soporem ostendere visus est; verum comatis & cari essentia ac natura hoc exigit, ut febris careant, aut fortasse melius ægri febris carere videantur. Itaque licet aliquando laxitas præternaturalis menyngum pro somni præternaturalis causa haberi aliquando possit; nihilominus probabilius opinor, præternaturales laxitates fibrarum medullarum cerebri peculiari modo præternaturalem soporis indolem asferre; cum enim supra ex præternaturali laxitate menyngum, aut tota, aut fere tota nervorum familia, quæ a menyngibus productis undequaque vestitur, aut paraplegiam, aut hemiplegiam asferre debeat, laudabilius censeo somni præternaturalis causam ac fontem, quæ cerebro præcipue insidet, medullarium quoque fibrarum laxitati esse rationabilius tribuendam; sæpissime enim effuso, aut e glandulis menyngum, aut e lymphaticis sero fibræ medullares copiosiori fluido madefactæ a naturali, licet tenui tensione, declinant; Cum vero aut nullo modo, aut languide debitum sibi tensionis conatum sustinere possit, otiantibus aut enervatis sensoriis aliquando gravem, aliquando gravissimum soporem erunt allatura. Nerveum succum si credimus, certum est aliquando hunc austeris, aut viscidis, aliquando opiatiss, venenatisque particulis adeo associari posse, ut corpora præternaturalia vim tensivam naturalem fibrarum magis impedian, cum autem effectus semper sint directe ut causæ adjuvantes; reciproce vero ut impediētes; enervato elaterio succi nervi a præternaturalibus particulis fibræ medullares, aut ægre, aut nullo modo tendi debuerunt; sensoria itaque aut negligenter, aut nullatenus sollicitata & deperdita, aut enervata oscillatione sopore gravi, aut graviore otiantur. In febribus autem gravi inedia, vel lassitudine

corporis elasticis corporibus aut evolutis, aut exili momento agentibus non ea vis tensionis in medullaribus fibris acquirenda erit, quæ sensoriis naturaliter & opportune exercendis necessaria videatur. Fibris itaque medullaribus enervatis, aut languidis sensoria varia soporis indole ingravescent. In lethargicis affectionibus inflammari meninges facile credendum: Ibi autem inflammatione parva sanguis lentescit in sinibus menyngum, & pondere earundem inflammatarum, & sanguinis lentescitis, compressa nimis cerebri substantia profundissimum somnum cum oblivione, & læsione operationum erit allatura.

22. Remanet inter comatosas affectiones *Coma Vigil*, qua ægrotantes conniventibus oculis dormire videntur, cum fortasse non tam gravi somno obruantur. Crediderim, eos surculos nervorum opticorum, qui ad musculos deprimentes & attolentes palpebras opportune serpunt, morbose laxatos quodammodo fuisse, ut attolli difficulter possint, quinimo debeant necessario deprimi; sic enim depressis morbose seu paralytice enervatis palpebris ægri dormire videntur; verum cum in reliquis fibrarum medullarum ordinibus aliqualis remaneat motus sollicitationis, distractionis & contractionis, & aliqualis elasticitas succi nervi, ea ratione media tenenda fuerat cerebri regio, ut inter somnum & vigiliam consistere debuisset.

Coma Vigil.

23. Superest *Vertigo*, quarum una idiopathica est, symptomatica altera. Prima causam ac sedem a regione cerebri; secunda a stomachi, uteri, aliorumque viscerum consensu cognovit; utraque tamen mala ominatur. Cum vertiginis phænomena a Physicis non satis apte enodari possint, ab Opticis querenda sunt; ea siquidem est rotationis explicandæ causa, ut nisi Optica præsto sit, difficilis admodum & obscura futura erit tanti operis divinatio. Ex celeberrimis Viris Hayr & Vvolffio *Retinam* pro primario visionis organo judicandam opinamus; hæc enim tunica cum choroidi contigua sit, & a filamentis nervi optici perfectissime elaborata; ibi quidem firmanda erit præcipua vertiginis causa; ut autem hæc manifesta fiant, prænotandum est, radios (1) ab objecti puncto egressos per refractionem in humore crystallino factam

Vertigo

I i 2 in

(1) Ex Coroll. 2. pag. 11. Optic. Vvolffii.

in uno iterum puncto, ut visio debita fiat, uniri debere. Hi autem radii cum secum afferant integram & perfectissimam imaginem puncti radiantis (ex eodem corollario) cum eo in loco, quo radii uniuntur, ibi immediate adesse naturaliter debeat Retina: hæc a radiorum punctis opportune tacta, & affecta specifico quodam motu excipiet naturales objectorum imagines. Itaque si accadat aut timore, aut ira, aut quacunque animæ præternaturali affectione, aut corpore quodam extraneo sollicitari taliter nervos opticos, ut præternaturali quodam contactu ac motu nervorum opticorum fibræ Retinæ, quæ superficiem quodammodo circularem describunt, in orbem aliquamqualiter torqueantur; opus erit radios, fibrillas Retinæ quodammodo circulariter euntes successive sollicitare. Cum autem radii hac ratione successiva tangentes & sollicitantes fibras Retinæ, quantumvis minimi sint, externorum objectorum imagines secum afferant, ab aliis successivis motibus radiorum & contactibus transeuntibus circulariter ab uno contactu fibræ, ad contactum alterius fibræ, circulariter successive sollicitanda erit Retina. Cum vero objectorum imagines sint juxta rationem affectionum Retinæ, necessario objecta externa successive in orbem mota, in orbem moveri videbuntur. Hac ratione membranæ opticorum a menyngibus derivatæ spiralibus fibris probabili menyngum analogismo munitæ, hæc a quacunque præternaturali causa sollicitatæ spiraliter opticorum nervorum fibras moturæ erunt; cum autem nervorum opticorum filamenta desinentia in Retinam, hanc mirabili artificio construant, hæc quoque motu successivo partium quodammodo spiræ in morem movenda erit, quamobrem cum puncta radiorum, quæ imagines objectorum externorum figurant, successivis temporibus tangant, & afficiant motibus suis successivas partes fibrillarum Retinæ, in spiras, aut in orbem moras; hæc necessario representabunt objecta externa, ac si continuis motibus rotarentur. Hæ sunt præcipuæ causæ, quæ vertiginis phænomena enodare videntur, & a quibus plurima visus accidentia Opticorum methodo explicari facile possunt.

DISSERTATIO II.

De Morbosis Sensuum Internorum Affectionibus.

24. **N**udi nascimur privati vitiis, & virtutibus; anima solidis compenetrata paulatim labore & usu acquirit virtutes & vitia. Primo itaque loquendo de motibus voluntariis, qui cerebro omnium fere Medicorum consensu adscribuntur, sicuti naturales cerebello; verisimile est, tantas res acquiri motu fibrarum cerebri, quæ ab objectis cum internis, tum externis sollicitatæ animam excitant: hujusmodi fibrarum motus non obscuri fuerunt Platoni, cum in Timæo docuerit: *Excogitaverunt enim Dii caput motuum omnium compos id fore*. Itaque si caput motuum omnium compos: ergo in capite radices & principia motuum esse debuerunt; quæ motuum radices cum fibris cerebri primo adscribi debeant, eo quia iis anima pro perfectioribus suis actionibus primo compenetrata est; hoc unum innuere voluit Philosophus, fibrillas cerebri prout motuum omnium radices, ac principia primo moveri debuisse, ut inde correspondentibus organis necessarii motus undequaque communicarentur; hi itaque motus fibrarum cerebri animam ipsis compenetratam sollicitantes, & excitantes *Phantasmata* a Medicis appellari consueverunt. Cum vero hi motus fibrarum cerebri juxta diversas sensationes & affectiones animæ, quantumvis minimi fuerint, accipiant magis & minus, jure amplecti poterunt sub idea generali quantitatis. Hæc itaque phantasmata, seu hi motus fibrarum, cum quanti esse debeant, non tantum majores aut minores esse poterunt; verum etiam juxta varias animæ affectiones ac potentias peculiari numero circumscribentur. Anima itaque excitatur, & sollicitatur a motu modo majori, modo minori fibrarum & peculiari numero motuum eorundem. Hinc Pythagoras hosce motus modo majores, modo minores animadvertens, & numerum eorundem pro eminentibus animæ operationibus exercendis sæpissime confessus est, eum plus hominem esse, qui plus numerorum scientiam habuisset. Cum autem scientia numerorum, & quantitatum quarumcunque nitatur in compositione, divisione, permutatione, & æquatione earundem &c. ideo

de eo docere simili sermone voluit Pythagoras, animam in homine eminentius sentire & operari, cum usu & habitu facto melius facilius ac perfectius componeret, divideret, permutaret quantitates, numeros motuum, differentias & rationes eorundem pro actionibus animæ rite exequendis. Ab hisce sensibus non videtur dissentire Divus Augustinus, qui ex sacris scripturis locutus est; *Circumvi ego ut scirem, & considerarem, & quærerem sapientiam, & numerum, lib. vi. Musica*. Ut itaque hanc rem difficillimam soli Deo vere notam, & ab anima tantummodo dignoscendam (cum hæc spoliata corpore a fortunata visione Dei Optimi Maximi veram rerum omnium scientiam funditus sibi comparatura sit,) si non re, saltem similitudine agitare facilius, ac clarius possim, puto rem fore necessariam, si prius considerata *sede sensus communis in tota membrana Pia Mater dicta*; cum hæc nervos, cerebrum & cerebellum, fibrasque arctissime, immediate & undequaque investiat, transeam pro voluntariis animæ operibus probabiliter enodandis ad examinandos motus fibrarum cerebri. Hoc itaque motus fibrarum duas in classes dividendos esse censeo; quorum alter est *Motus absolutus*; alter vero *relativus*. *Motus absolutus* est motus ille primus, quo fibræ cerebri a causis quibuscunque, tum internis, tum externis primo excitantur ac sollicitantur; Hinc anima primo excitata ac stimolata confuse & abstracte res sentit, & concipit absque ulla tamen affirmatione, aut negatione; & hanc primam actionem animæ *Imaginationem* appello. *Motus autem relativus* fibrarum cerebri est actio illa animæ fibris compenetrata medullaribus; qua durante motu fibrarum per aliquod tempus anima prius excitata, ac sollicitata a primis moribus fibrarum hosce motus animadvertens, animadversione usu acquisita comparata motus unius fibræ cum altero motu alterius, unam differentiam, aut rationem motus istius cum altera differentia, aut ratione motus illius, & sic successive; hinc anima fibris compenetrata cum motus específicos, differentias, & rationes motuum acutissime sentiat, comparando hos motus inter se, & horum differentias ac rationes, componit has rationes motuum, aut dividit, permutat, aut invertit, aut æquat; quibus actionibus anima usu & habitu facto exercitata ab obscuris ad clara, ab ignotis ad nota paulatim ascendit; & hæc

actio *Discursus & Ratiocinatio* dicenda erit, vi cuius res primo conceptas anima percipiens & intelligens, de iis affirmat, aut negat, cum totali assensus, aut dissensus libertate. Liberum inde est animæ velle, aut nolle, ut electione facta præmium, aut pœnam mereri potuisset. Hæc tam miranda actio animæ cum revera explicari nullo modo possit, attamen similitudine quadam & analogia poterit quodammodo adumbrari. Quæram itaque similitudines & analogias ab Analystis; hi enim, ut ab ignotis nota erunt, ignotas res cum notis comparant, rerumque differentias notas cum ignotis, & modo componendo, modo dividendo, modo invertendo & permutando &c. tandem aliquando ignota cum notis æquando ea clare percipiunt & intelligunt, quæ prius ignota penitus videbantur; non dissimili itaque ratione, sed multo perfectiori anima melior & eminentior Analysta a motibus & proportionibus motuum fibrarum cerebri, & a differentiis eorundem sollicitata, utpote iisdem fibrillis compenetrata, hos acutissime sentire cogitur; illosque animadvertens componendo, dividendo, invertendo & æquando ea clare sentire, percipere, intelligere tenetur, quæ prius ignoraverat. Hæc omnia indicare quoque videtur Divus Augustinus, qui Tomo primo cap. 33. de quantitate animæ, inquit: *Anima ea, quæ secundum naturam sui corporis sunt, adsciscit, atque appetit, rejicit, fugitque contraria, removel se ab his sensibus certo intervallo temporum, & eorum motus quasi per quasdam ferias reparans, imagines rerum, quas per eos hausit secum catervatim, & multipliciter versat*. Cæterum si hi motus fibrarum cerebri, aut continui fuerint & diuturni, aut per aliquam notabilem temporis differentiam perduraverint opera objectorum aut internorum, aut externorum continuo, vel per aliquod notabile tempus sollicitantium; tunc anima cum diutius, & frequentius, excitata, ac sollicitata fuerit, detineatur usu & habitu facto diu in actu exercito circa hæc objecta tales fibras moventia, anima in tali statu perdurans exercere dicetur potentiam illam, quam *Memoriam* appellamus. Quod si tractu temporis deficientibus motibus & proportionibus motuum fibrarum cerebri, aut novis motibus accedentibus aliquando volente anima, aut opera etiam ejusdem, aut alterius causæ homologue agentis, vel internæ, vel externæ, rursus sollicitentur fibræ cerebri ea disse

differentia specifica motuum & rationum, qua prius a prioribus objectis sollicitata fuerant, iidemque specifici motus, & eadem motuum specificarum differentiarum, ac proportionum eorundem repetuntur, tunc anima ab hisce motibus rursus excitata ac sollicitata, & hosce animadvertens, repetet & renovabit illa affectiones, quibus antea sollicitabatur, quæ actio animæ *Reminiscencia* appellanda erit. Remanet animadvertendum, has præcipuas animæ actiones imaginationis, discursus & memoriæ suam habere latitudinem; singulæ enim ab initio languidiores sunt, progressu vero activiores, ac validiores fiunt, ita ut a minori ad maiorem vim progredi videatur. Num autem tot at tantæ eminentes actiones ac motus cerebri ab homologis motibus spirituum animalium adjuvantur? Affirmantibus non renuam.

25. Ut autem istæ actiones animæ ac potentiæ, & tam mirandi motus fibrarum cerebri facile ac feliciter exerceri possint, plura conspirant 1. nempe *apta fibrarum cerebri directio & ordo*; qua in re opportunum puto animadvertere ea, quæ pluries in cerebro canum, ovium & aliquorum hominum attentissime observasse mihi visa sunt; occurrerunt enim variis in locis cerebri variæ fibrarum series, quarum aliz uno loco mihi visæ sunt series fibrarum rectarum, in alio loco series fibrarum obliquarum, in altero vero loco fibrarum curvarum series. Putaverim itaque, pro actionibus animæ æqua ratione exercendis series fibrarum rectarum ea ratione, lege ac ordine fuisse naturaliter dispositas, ut aptissimum inter se servent parallelismum; sic obliquas ea ratione directas naturaliter fore, ut juxta rationem naturalem serierum obliquarum debito quadeant parallelismo; similique methodo series fibrarum curvarum ea gaudere debuissent directione, ut juxta rationem ac naturam serierum curvarum, singulæ inter se parallelæ dirigantur. Hac ratione singulæ series fibrarum apta directione, regula & ordine locatæ ac dispositæ, ordinatæ fient & regulares inter se, & concinne, naturaliterque compositæ. Tali ratione, ordine ac directione dispositæ series singulæ fibrarum edere debebunt ordinatos, regulares & homologos motus, & sibi homologas motuum differentias; inde anima ipsis compenetrata ordinate & regulariter sentiens motus, tremores & motuum differentias ac proportionum eorundem, clare, ordinate & æqua ratione concipiet res, in-

telliget, & recordabitur. *Secundo necessaria est opportuna tenuitas, & conveniens subtilitas fibrarum cerebri*; ea enim esse debet harum fibrarum tenuitas & subtilitas, ut facillime aptæ fiant ad motum suscipiendum; cum enim promptæ sint ad motum, facillime tremunt, motumque sibi vicinis apte communicant, & hunc proxime fibræ tangentes facile excipiunt, ut animæ imperio & actionibus facillime obediant. *Tertio necessaria est apta & conveniens cohesio, approximatio, & facilis contactus fibrarum inter se*; hisce enim sese opportune tangentibus, motus unius fibræ facile communicatur motui alterius, & sic successive; in qua apta & facili communicatione motuum fibrarum inter se, putaverim, potissimam actionem & rationem memoriæ esse statuendam. Fibræ itaque cerebri neque nimis strictæ esse debent, neque nimis laxæ inter se: si enim nimis ac violenter strictæ fuerint, vel nimis laxæ & distantes, utroque modo cum non tam prompte, nec motum excipiant, nec exceptum cæteris communicare facile possint, vitium cerebri & potentiæ memoriæ potissimum parere poterunt. Hic autem dissimulare non possum errorem illorum, qui putant, homines minori intellectu posse, quo majori memoria donati sunt; suspicor enim, memoria præditos æquivalenti quoque imaginatione, & proportionali quoque intellectu præditos fuisse; cum enim potentia memoriæ exerceri excellenter non possit, nisi fibrillæ cerebri ordinatæ fuerint, opportune subriles ac tenues, cum apto ac facili contactu earundem inter se; jure suspicatus sum eos, qui memoria feliciores sunt, proportionali quoque imaginatione & intellectu donatos esse. Fateor quidem memoria feliciores minus laborare & exercere intellectum, non quia minori intellectu polleant, sed quia cum fortuna memoriæ multum suppleat laboribus & actionibus intellectus, propterea hunc minus exercent & excitant; hunc enim diutius exercere laboris & tædii est. Ex his ergo, quæ dicta sunt, clare constat, cur puncta pedis extremitate statim molesta illa sensatio in cerebro concipiatur, & judicetur ab anima, num videlicet punctura illa gravis sit, an levis &c.; etenim cum anima sit sensoriis compenetrata, cumque indivisibilis anima tota sit in tota, & tota in qualibet parte, eo momento temporis, quo anima sentit molestiam in pede, eadem ipsa in cerebro dignioribus organis tam gran-

grandi officio destinatis, & ad hoc specificè elaboratis concipere, & judicare debet (dummodo organa cerebri tam summis operibus destinata naturaliter se habuerint) rationem doloris, levitatem, aut gravitatem ejusdem &c. & cæteras sensationum anomalias. Hac lege compenetrationis animæ in suis sensoriis solvi possunt obscura, & innumera sensationum & potentiarum animæ phænomena; cur videlicet tam facile, tam prompte, tam jussu sensoria sollicitent potentias animæ? & vicissim anima tam facile, tam prompte, tam jussu sensoria ipsa excitet ac sollicitet, imperio suo obtemperatura? Hisce itaque breviter adumbratis, arbitror non re, sed potius rudi similitudine exposuisse, qua methodo tam eminens anima rationalis sentiat, concipiat, intelligat & recordetur? cum sciam multo perfectiore methodo ac lege animam immortalem & æternam fore operaturam. Non dissimili tamen ratione, sed multo imperfectiori puto bruta ipsa sentire, & operari, non ut automata, sed ut animalia quidem imperfectiora, quadam tamen potentia donata, animæ analogæ, qua specificis & determinatis motibus fibrarum cerebri suo modo sentiant, suo modo concipiant, suo modo intelligant, suoque modo recordentur.

26. Non arduum modo fuerit juxta nostrum institutum morborum cerebri phænomena assequi; cum alteratis, aut inversis, aut mutatis fibrarum ordinibus, directionibus, subtilitatibus, parallelismis & motibus earundem præternaturales animæ actiones fieri debeant. Ibi itaque delirium primo occurrit *perfectum unum, imperfectum alterum*. Delirium *perfectum* illud esse arbitrandum est, cum omnes fibrarum rectarum series cerebri opera causarum modo internarum, modo externarum agentium, potissimum vero vitio sanguinis, aut lymphæ irritantium inflexæ fiant & obliquæ; sic cum omnes naturales fibrarum obliquarum series, aut rectæ fiant, aut curvæ, similique ratione cum omnes naturales fibrarum curvarum series, aut rectæ quodammodo fiant, aut obliquæ; hoc enim statu præternaturali fibrarum omnium mutatur earum naturalis parallelismus, necessarius earum motus; cum vero a motibus fibrarum cerebri determinentur ratione phantasmatum, mehercle a præternaturalibus hisce motibus præternaturalia evenire phantasmata necesse est; anima autem fibris compe-

netrata cum concipere, intelligere ac memorari debeat, quæ sentiuntur, a sensibus, videlicet, quæ tum ab æquis, cum a vitiosis fibrarum motibus excitantur, jure anima vitiose undequaque sollicitata errore concipiet, errore intelliget, errore recordabitur, confusisque omnibus æger gravissime delirabit. Huic autem morbo præstat quoque nimia obliquitas, nimia curvitas fibrarum cerebri, una cum directione mutata fibrarum rectarum; cum enim fibræ omnes medullares, quamvis minimo motu moveri videntur, tamen necessario moveri suo modo debeant, quotiescunque nimis obliquæ fiant, nimis curvæ & præternaturaliter directæ, violenter consistere, aut violenter moveri conabuntur opera materiæ alicujus aut externæ, aut internæ præternaturaliter, & violenter sollicitantis; cum vero fibris taliter se habentibus naturale centrum gravitatis singularum mutari facile debeat una cum earum centro motus; propterea harum motiones cum componantur ex ratione fibrarum singularum, & momento massarum heterogenearum sollicitantium, aut momento potentiæ excitantis, nullatenus isochronæ, ordinate, & regulares esse poterunt, & naturalibus motibus proportionales, sed præternaturaliter asymmetræ; anima autem confusa, ordinate & asymmetre sollicitata falso concipiet, falso ratiocinabitur, & falso recordabitur. *Delirium imperfectum* illud esse arbitrandum, cum vel solæ fibræ rectæ, vel solæ obliquæ, vel solæ curvæ a naturali ordine, directione & parallelismo declinaverint, pariter cum nonnullæ ex rectis, aut nonnullæ ex obliquis, aut nonnullæ ex curvis vitium fecerint, cæteris naturali in statu permanentibus; fibræ enim cum non omnes vitiose & præternaturaliter moveantur, animam non omnino vitiose & præternaturaliter sollicitabunt; unde imperfecto & partiali, non totali errore concipiet, intelliget & recordabitur; quin imo cum effectus semper sint directæ, ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut impediens, quotiescunque aliquæ fibræ naturaliter moveantur, nonnullæ vero præternaturaliter motus suos exerceant, animæ actiones erunt directæ ut fibræ naturaliter motæ: & reciproce, ut motæ præternaturaliter; inde futurum erit delirium imperfectum, seu, ut Medici nuncupant, pseudodelirium; quoniam aliquando continget ægrum bene concipere, sed male ratiocinari, aliquando recordari alicujus, cæteris oblitis, aliquando

do per aliquod tempus ratiocinari, sed confusum vera cum falsis permiscendo &c. ut praxim medicam agentibus manifestum est.

27. Hæc omnia vitio fibrarum, sed membranis cerebri nullatenus offensis aut inflammatis, contingere probabiliter creditum est; verum si per meninges effuso sero, aut violentissimo motu sanguinis per arterias meningum, arteriæ plus deferant sanguinis per arterias meningum, quam vene æqualibus temporibus referant, ut effuso sanguine meninges inflammantur gravi vitio *Sensus communis*; tunc *Phrenitis* oritura erit, quæ a delirio nullo modo differt, nisi meningum vitio, & majoribus viribus & momentis causarum sollicitantium. Cum itaque meninges inflammatae cum fibris cerebri necessaria adhæsione communicentur, fibras has continuo, inæqualiter, inordinate & asymmetre, violentissimo motu trahere ac stimulare conabuntur; hinc continua, inordinata & violenta fiet fibrarum sollicitatio ac stimulus; etenim cum mutatio motus sit semper proportionalis vi motivæ impressæ (per legem secundam Nevvtoni), cum causæ tum externæ, cum internæ sollicitantes continuæ fuerint, violentæ ac inordinatæ, futura quoque erit mutatio motus fibrarum continua, violenta, inordinata & asymmetra; hinc anima tam vitiosis motibus sollicitata inepte comparando motum unius fibræ cum motu alterius, & differentiam & proportionem unius motus cum differentia & proportionem alterius, falso componet ac dividet motus, falso permutabit & æquabit eosdem, & sic violentissimis motibus fibrarum agitata operabitur confusa imaginatione, discursu erroribus pleno, & memoria penitus perturbata. Hic autem morbus alter *Idiopathicus* est, *Sympathicus* alter. *Idiopathicus* sedem habet in vitio meningum. *Sympathicus* vero, qui ab inflammatione diaphragmatis, aliquumque fortasse viscerum inferiorum ortum habet; uterque autem morbus, delirium nempe & phrenitis, febri unitur, qua deficiente cum causæ stimulantes plerumque deficere & ipse consuescant, deficiente inordinato & asymmetro motu causarum sollicitantium in meninges, & fibras medullares cerebri statu suo naturali, suoque naturali parallelismo recuperato, imaginatio, ratiocinatio & memoria paulatim restituentur.

28. Verum sine febri major aliquando supervenit morbus, qui homines ipsos red-

dit belluis peiores, & morbi contumacia inter omnia animalia miserrimos. Hic morbus *Mania* dicitur, in qua ægri furore quodam insaniant; hic quoque morbus alter *Idiopathicus* est, *Sympathicus* alter. *Idiopathicus* sedem habere suspicor in internis fibrillis medullaribus cerebri; *Sympathicus* vero ab inferiorum consensu ab utero potissimum oritur. Plerique crediderunt, a violentissimo motu sanguinis hanc effrænem morbi indolem esse orituram; verum cum nonnullos maniacos accurate tractaverim, pulsamque non effrænem & violentum, sed juxta naturalem legem, aut leviter agitatam omnibus fere temporibus stupore summo observaverim, jure suspicatus sum, non semper ab impetu fluidorum, sed potissimum a nimis agitato, & concitato motu internarum fibrarum medullarium maniam esse generatam: Enimvero si serum asperis, inæqualibusque superficiebus circumscriptum, aut corpora alterius generis per internas fibrarum medullarium latebras continuas, concitatis ac violentis motibus fluentia agitent, ac majori velocitate sollicitent internas fibras medullares; hæc medullares fibræ cum a corporibus præternaturalibus diversorum mementorum, diversarumque superficierum frequenter, ac violenter stimulatæ describant motus frequentissime minimos, continuo violentas, & inæquales oscillationes, naturales earum series ac directiones violentas invertent, & alterato earum naturali parallelismo non tantum asymmetre, sed concitato & frequentissimo motu movebuntur. Ex hisce asymmetris & concitatis motibus fibrillarum interiora perturbata fiunt, violenta & concitata phantasmata; unde animal facultatibus animæ perturbatis impetu & furore bacchabitur. In hoc furore & impetu vires nervorum & muscutorum supra modum augentur, ut ægri vix a pluribus domari aliquando possint. In hac re probabiliter putaverim, indivisibilem animam tot internis, frequentibus & concitatis motibus fibrillarum sollicitatam & agitatam, cum fibris quoque nerveis & muscularibus, cæterisque motuum organis compenetrata sit (quoties necessitas & violenta ratio fuerit,) ipsa quoque frequenter, concitate & violenter universa motuum organa, fibrillis illis cerebri correspondentia movere coacta est; inde vires summæ, & summa momenta organorum succrescere necessario debuerunt; sicut

Mania

sicut enim sano jam homine volente anima movere summo impetu manum, ac pedem, aut voluntaria organa, hæc summo impetu, aut manum movet, aut pedem: ita cum anima frequenter & concitate sollicitata ac stimulata fuerit a motibus concitatis fibrillarum, poterit ipsamet indivisibilis anima correspondentibus organis motuum compenetrata, frequenter ac concitate organa motuum taliter sollicitare ac stimulare, ut momento virium adaucto validissimos motus exerceat; neque de hac violenta, ac concitata animæ actione dubitandum. Hic enim morbus, vel fiat ab irritatione internarum fibrillarum continua & concitata, unde anima similiter sollicitetur; vel fiat ab ipsomet violento continuo & concitato animæ sollicitantis imperio (ut in amore infano, cæterisque passionibus sæpissime accidit) quo anima violenter, continuo & concitate movente, ac sollicitante fibrillas internas cerebri, tam gravia, tam violenta, tam furibunda viribus supra modum adauctis afferuntur symptomata; utroque modo vires supra modum intumescere necesse est; enimvero cum probabiliter fibrillæ cerebri simplices sint, aut saltem nervis simpliciores, nec subdivisæ sint in plurimos, plurimosque ramulos, ut sunt singuli nervi per totum corpus effusi fibrillis cerebri proportionales, & correspondentes, qui undequaque singuli subdividuntur in plurimos, plurimosque, ac pene ramulos innumeros; propterea si ab aliqua materia extranea, vel ab imperio animæ violenter sollicitentur continuo & concitate aliquæ internæ fibrillæ medullares, hæc cum simpliciores sint, impetum quidem violentum excipient; sed cum vires, impetus & momenta talis motus sint facta ex massa stimulante ducta in celeritates fibrillarum simplicium, & consequenter cæteris paribus in sua radice minima. Verum cum hæc fibræ cerebri suis proportionaliter donentur nervis, qui sint hisce fibris correspondentes, & hi nervi per universam fere animalis machinam effusi innumeris furculis distribuuntur, necessario singuli & tam innumeri furculi suo saltem celeritatis gradu erunt sollicitandi, qui gradus celeritatis simul sumpti in tam innumeris nervorum ramulis futuri erunt proculdubio pene infiniti; hi ergo tot celeritatis gradus communicati machinulis sphaeroidalibus musculorum in ratione composita ex tanto numero & motu eorundem merito vires, & mo-

menta nervorum & musculorum validissimi futuri erunt, quamvis radices motuum fibrillarum cerebri minimæ futuræ fuerint: Si ergo tot, ac tanta virium momenta eveniant ab aliquibus tantummodo & simplicioribus fibris in cerebro sollicitantibus, quibus sui proportionales nervi correspondent; quid dicendum erit, si plurimæ fibrillæ cerebri concitate & violenter sollicitentur ac stimulentur? quibus tot innumeri nervorum surculi proportionales sunt & sibi aptissime undequaque respondent? Utique vis & momentum pene incredibile maniaci erit futurum. Mirum ulterius est audire maniacos, qui raro se miseros, sed plerunque se magnos esse militum Tribunos, se Reges, se Cæsares, se quoque Deos esse gloriuntur. Censeo, tantam rerum gloriam ab eminenti animæ essentia (animæ ipsi nota) esse genitam; anima enim altissimi sui generis conscia, & quasi sui juris reddita ea ratione movet in maniacis, sollicitat fibrillas cerebri, quæ in Tribunis militum, in Regibus, in Imperatoribus moveri similiter potuisset: hæc autem morbi indoles præter cæteras maniacæ species curatu difficillima est. Præter hæc maniaci frigidam aëris intemperiem sine læsione facile sustinent, non tantum quia perturbatis internis motibus naturalibus fibrillarum cerebri, nullatenus molestis sensuum externorum affectionibus, aut desidiolo animadvertunt; verum quia cum momenta nervorum ac musculorum motibus voluntariis inservientium supra modum aucta sint, motum sanguinis quoque sollicitant, ut impetu continuo ad externas usque superficies corporis deferatur; cum itaque sanguis continuo sollicitatus nullo modo piger, in externa carniū & cutis superficie lentescat, jure vigente licet frigore sine læsione maniacus sustinetur.

29. Sicut autem maniacos a motu violento & concitato fibrillarum internarum cerebri probabiliter factos esse credimus; ita melancholicos a lentiori & tardiori motu fibrillarum earundem fieri suspicandum est; hinc timidos & mæstos, cogitabundos, tacitos & solitarios esse vidimus; cum vero delirent sine febris, jure credendum, medullares fibrillas cerebri, quantumvis lento motu donatas, perturbatas tamen & inordinatas habere fibrarum aut rectarum, aut obliquarum, aut curvarum series; ita ut inter se naturali careant parallelismo: hæc morbi indoles tractu temporis facilius curatur,

Melancholia

K k

tur, cum vitio sanguinis, aut seri austeri & lentescantis ut plurimum habeatur, cujus opera etiam fibrillæ medullares quodammodo stare ac consistere coguntur; cum autem fluida vitriolicis, aut aluminosis corporibus supra modum repleta sint, quæ violentum & celerem motum fluidorum aut minuunt, aut impediunt, propterea febrili motu in melancholicis fermentescere non tam facile consuecunt. Porro si pia mater & fibrillæ medullares cerebri solidiores fuerint, & crassiores supra legem naturalis soliditatis & crassitie, aut vitio morbi, aut ætatis rigidiores factæ fuerint, sine opportuno contactu earundem inter se; sive cum ineptæ fiant ad motum facile suscipiendum, & tarde, aut ægre moveri possint, necesse est, aut fibras inepte & languide sollicitare animam, aut reciprocè animam fibrillis crassioribus, aut rigidis compenetratam languide & pigre (etiam si voluerint) has fibrillas excitare ac movere. Quamobrem negligentia, & inertia fibrarum medullarum negligens, & iners anima potentias imaginationis, discursus & memoriæ tarde & negligenter exercens, immemores, & insensatos homines reddet ac stolidos.

30. Breviter expeditus ab iis, quæ ad motus voluntarios cerebri pertinere videntur, instituti nostri lex & ordo est, de motibus naturalibus cerebelli brevi quoque oratione dissereret: Claritatis tamen gratia liceat mihi prius distinguere organa animalis in *Voluntaria*, *Naturalia*, & *Mixta*; *Voluntaria* ea dici possunt, quæ moventur quidem motu absoluto, sed primario apta nata sunt moveri imperio animæ; hujus generis sunt nervi & musculi &c. liberis & voluntariis motibus inservientes, qui cerebri fibris immediate correspondent, de quibus supra innuimus; *Naturalia* vero, quæ apta nata sunt absque animæ imperio, & anima non advertente moveri impetu sanguinis, aut alterius corporis impellentis; istius generis sunt cor, stomachus, intestina, vasa omnia sanguifera & lymphatica &c.; *Mixta* denique ea credimus, quæ licet a motu fluidorum, aut aëris, aut alterius corporis impellentis non advertente anima necessario moveantur; attamen imperio animæ per aliquam saltem temporis differentiam eorum motus suspendi, ac impediri aliquando potest; hujus indolis sunt pulmones, diaphragma, sphincteres ani & vesicæ, quorum motus licet primario natura-

les sint, attamen cum imperio animæ suspendi aliquando per aliquam temporis differentiam facile possint, de motu quoque voluntario participes judicari poterunt, unde mixta organa jure vocabuntur. Hisce præmissis sicuti fere omnes Anatomici & Medici cerebrum primario voluntariis motibus, ita cerebellum naturalibus primario dictum voluerunt. Hinc celeberrimus Fracasatus in Epistola de cerebro ad immortalē Malpighium conscripta hanc sententiam amplexus, cerebellum a medulla oblongata non differre, experimentis præeuntibus (pag. 124) acutissime observavit; quamobrem probabiliter judicandum est, opera eorum nervorum spinalis medullæ, qui cerebelli fibrillis unice & immediate correspondet, naturales motus, & actiones naturæ exerceri necessario animæ concursu debere; cum enim anima compenetrata sensorii teneatur concurrere conservationi animalis; cum hujus conservatio opportuno & ordinato fluidorum, & organorum naturalium motui debeatur, durante fluidorum cursu, & organis frustra non existentibus necessitate concursus operari animam in naturalibus organis, necesse est. Verum quia adstant ulterius, & profunt conservationi animalium actiones mixtæ organorum, quæ & de voluntario, & de naturali motu participant, jure merito credendum est hæc organa & a cerebro & a cerebello nervea filamenta esse susceptura, quæ fibrillis cerebri & cerebelli correspondentia & proportionalia, mixtos motus & actiones exerceant. Licet itaque primaria actio cerebri sit animæ libera, actio vero cerebelli sit animæ necessaria; nihilominus sapissime vitia cerebri & cerebelli communicantibus fibris, & membranis mutuas manus præbent, mutatis nempe a cerebri vitiis naturali directione, subtilitate, apto contactu & cohesionē fibrarum cerebelli inter se; sic cum læsione cerebri organa voluntaria nervorum cerebro respondentium, & musculorum paralytica fuerint, praxi edocemur tractu temporis communicata ulterius paralyti fibrillis cerebri, non solum organa mixta sphincteris vesicæ inertia fieri, & negligenter urinæ moribus inservire; verum etiam organa naturalia pylori, & intestinorum obstupescere, ut enervato aut abolito peristaltico motu a medicamentis licet irritantibus vix, aut desidiose sollicitentur, & moveantur; sic aliquando contigit observare, post contumax delirium non solum agrum sic

asthma-

Albmate correptum esse; verum etiam post longas mentis aberrationes frequenti cordis palpitatione agros miserrime afflictos fuisse; non rarum enim est, vitia cerebri, quibus animæ actiones voluntariæ primo ledebantur, facta morbificæ causæ transpositione, naturalibus quoque organis nocuisse, ut enervatis naturalium organorum motibus & actionibus innumeræ morborum familiæ (injuria fere semper accusato sanguine) supervenerint. Neque dubitandum, has morbosas affectiones cerebelli vitiis esse adscribendas, cum imaginatione, discursu & memoria penitus relictis, cerebro videlicet melius se habente, præternaturales tamen viscerum affectiones, & organorum naturalium depravati, aut aboliti motus contumaci duratione consistent; non dispari ratione communicationis, cerebelli vitia in cerebrum translata morbosas cerebri affectiones asserre consuecunt. Præter hæc suspicatus probabiliter sum, vasa sanguifera & lymphatica, quæ inter organa naturalia numerari facile possunt, quotiescunque exceperint nervea filamenta cerebelli fibrillis correspondentia, si aut convulsa fuerint, aut paralytica; iners quidem & negligens futurus erit elasticus vasorum motus, ut fluida lentiori motu circumventia in glandulis viscerum latescere peiori naturæ damno conentur. Hæ breves de tam eminentibus animæ potentiis, & de tam obscuris cerebri & cerebelli morbis meditationes, quantumvis potius philosophicæ sint, quam mechanicæ; nihilominus si cum naturæ & morborum cerebri & cerebelli phænomenis accuratissime comparentur, fortasse non levi probabilitate donatæ esse videbuntur. Fateor quidem, me plurima a mechanicis eruere potuisse; verum cum deficiant necessaria data, & suppositiones admodum lubricæ sint in tam obscuris animæ phænomenis, consultius putavi, me potius meliora desiderare, quam aut inutilia, aut absurda proponere. Remanet advertendum, morborum capitis curationi non raro conferre aquas nostras Hiermentes, de quibus clarissimus Franciscus Roncallus eruditissimo opere locutus est.

DISSERTATIO III.

De Morbosis Sensuum externorum Affectionibus.

31. **E**A est animæ lex sensorii competrata, ut anima sine his nec sentire, nec imaginari, nec intelligere, neque recordari ullo modo possit: Sensoria idcirco sentientis animæ operibus destinata variis perfectissimisque fibrarum præcipue membranarum & nervearum ordinibus elaborata sunt; alia siquidem est textura fibrarum auditus, alia visus, alia odoratus, &c. compositio, ordo ac modus alius; Sicut autem varia est organorum textura; ita varia subtilitas, diversa flexibilitas & elasticitas earundem; fibras enim hujus generis elastico quodam nisi donatas esse satis superque ab experimentis edocti sumus. Cum itaque vires & momenta corporum externorum organa, minimasque eorum fibrillas sollicitant, videntur inflectere & incurvare organa ipsa, minimasque fibrillas componentes, & curvam quandam ex elasticarum genere lineam describere ut plurimum videntur; hæc curva prout ex minimarum fibrillarum flexibilitate elaborata adeo minima est, ut fere insensibilis sit differentia inter arcum minimæ curvæ & tangentem ejusdem. Cum ergo fibræ ab objectorum externorum viribus sollicitatæ a rectis in curvas quasdam lineas transire teneantur, nemo dubitaverit has fibrillas elasticè incurvatas distrahendas esse: cum autem distractiones elasticæ fibrillarum sensationibus quam proxime proportionales habeantur, juxta mensuras distractionum, sensationes modo majores, modo minores proportionaliter erunt dimetiendæ. Placeat ergo supponere cum doctissimo Riccato, (1) minimam sensationem futuram esse, cum fibra distracta tantum creverit supra suam naturalem longitudinem, quantum exigit centesima pars suæ longitudinis; inde colligendum, majorem futuram esse sensationem, cum distractio fuerit una $\frac{10}{100}$ aut $\frac{11}{100}$ suæ longitudinis &c. e contra nullam, aut fere nullam futuram fuisse, cum fibræ distractio minor fuerit parte centesima suæ lon-

K k 2

(1) Pag. 131. suppl. al Giornale Tom. 1.

longitudinis ; hæc quidem attendenda sunt, ut sensatio aut major , aut minor , aut nulla habeatur . Cæterum ultra res petenda est , cum in statu naturali distractiones fibrarum , seu sensationes obtinere voluerimus ; enimvero si minimæ curvæ fibræ distractiones ab externis objectorum momentis oblique impulsæ rationem naturalis æqualitatis , aut quasi æqualitatis habuerint inter se , servata quodammodo simili ratione parallelismi earundem æqualibus temporibus , nec non æqualitate , aut similitudine angulorum , quos fibræ inter se contextæ naturali dispositione componunt ; nunc minimæ curvæ distractiones fibrarum , & consequenter earundem minimæ reciproce contractiones seu restitutiones erunt naturales ; & sensationes naturali ordine , dispositione , lege ac motu futuræ erunt æquo animæ sentientis ministerio . Verum si vitio objectorum modo perpendiculariter , modo oblique fibras impellentium , aut vitio fibrarum , ea ratione inflexæ fibræ distrahantur , ut una fibrilla magis distracta incurvetur , quam altera ; hæc vero minus tertia &c. & sic successive in ratione omnimodæ inæqualitatis , temporibus quoque inæqualibus ; utique mutato earundem naturali parallelismo , mutatisque naturalibus angulis earundem , distractiones fibrarum fient asymmetræ ; unde sensationes inæquales , inordinatæ & præternaturales necessario exorientur ; quinimo si violentissimo momento objectorum perpendiculariter aliquando impellentium , aut vitio fluidorum fibras irritantium violenter distrahantur fibræ , ut curvæ distractiones ipsarum habeant inæqualiter majorem , & præternaturalem rationem minores inæqualitatis respective ad naturalem fibræ longitudinem , nec facilis ad libera subiequi possit reciproca contractio seu restitutio earundem ; mehercle tam violenter distractæ fibræ sensationes afferent inverfas , confusas , vitiosas , & aliquando dolorificas . Hæc de generalibus sensuum externorum affectionibus intento nostro necessaria satis præmissa esse arbitror .

32. De externis sensibus agendo ; Etsi sensus omnes externos utiles ac necessarios plerique hominum judicaverint , præstantior tamen , & utilior visio habita est , non eo tantum mirabili opere , quo natura solo oculi usu Creatoris operibus cælo ter-

raque præstantissimis mirum in modum delectari possit . Verum quia ea sunt oculorum beneficia , ut sine his cæteri quoque externi sensus vilesceant , oriarique viderentur ; studiose itaque curandum est , tam mirabilem potentiam aliorum quoque sensuum commodo , utilitati ac dignitati conservare . Ad tam altum opus præstat primo morborum causas querere , quibus acquisitis , visio conservari facilius , aut ægra commodius sanari possit . Ut autem hæc suo ordine ac claritate digeri possint , nonnulla præmittenda esse debuerunt . Primo , ex opticis certum est , quodcunque corpus visibile aut luminosum esse , aut illuminatum , & a luminoso proprium lumen , ab illuminato alienum undequaque citissime effundendum ; ea autem est immensa velocitas luminis , ut celeberrima Academia Florentina experimento 265. testata sit , lucem per duo miliaria effusam absque ulla temporis differentia fuisse observatam ; porro immortalis Nevvtonus deff. 2. de coloribus , tam citissime propagari lumen affirmavit ex observationibus temporum eclipsium Jovis Statellitum , ut lumen a Sole in terram septem circiter minutorum spatio deferri animadvertit . Secundo , cum aer , aqua & vitrum sint diversæ gravitatis specificæ , adeoque pariter diversæ densitatis (1) transiens radius ab uno medio in aliud diversæ densitatis refringendus erit ; itaque cum radii a corpore luminoso , aut illuminato transeant ab aëre in humores oculorum , aqueum , crystallinum , & vitreum , jure merito refrangi debent ; tanto autem opere refractionis radii ab eodem objecti aut luminosi , aut illuminati puncto egressi per refractionem in aqueo , crystallino & vitreo factam in uno iterum puncto uniri necessario debent . Tertio , in hoc unionis puncto ut visio perfectissima habeatur , adest debet Retina , quæ a celeberrimis viris , potissimum vero ab Hayr & Vvolffio pro primario visionis organo determinata est ; cum vero quilibet radius a puncto radiante objecti modificatus secum afferat integram imaginem puncti radiantis , eo unionis puncto , quo in perfectissima visione adest Retina , in hac objectorum imagines depingi debuerunt . Quarto , licet radii quilibet refracti eo in puncto collecti visionem perfectissimam non parum juvent , radios ta-

men

(1) Ex num. 54. Optices Vvolffi.

men directos, & pupillæ perpendiculares visioni melius ac fortius prodesse demonstratum est. Si itaque radii perpendiculares una cum refractis eo oculi loco uniantur, ut immediate non adsit Retina, utique unionis facta radorum aut infra, aut extra Retinam, visio aut imperfecta, aut obscura, aut nulla erit futura. Cum ergo Retina sit præstantius visionis organum, arbitror rem fore necessariam, si de hac nonnulla dixerim, quæ perfectissimo visionis operi convenire videantur. Cum hæc sit nervi optici mira extensio, cujus officium est a radiis perpendiculis, & refractis objectorum in puncto collectis excipere depictas imagines, jure determinatum est, hanc in tam angusto animalis spatio tam immensa ac vasta colligere non potuisse, nisi summam filamentorum Retinæ tenuitatem ac subtilitatem miraremur. Geminianus Montanarius in Epistola quadam ad nobilissimum virum familiariter conscripta hanc rem curiose agitaverat, & calculis & experimentis accuratissime, ut credidit, institutis invenit minimum sensibilem angulum, sub quo partes objecti sunt sano oculo distinguibiles, subtendere proxime in Retina chordam seu subtensam unius minuti; sed subtensa unius minuti continetur in radio sui circuli vicibus 3437. ergo verisimile putavit, spatium Retinæ figuratum ab objecto visibili subtendente chordam unius minuti fore proxime $\frac{1}{3437}$ sui radii: inde colligit, quod quotiescunque minimus angulus a radiis refractis, & perpendiculis elaboratus effecerit in Retina basin seu chordam uno minuto minorem, objectorum partes nullo modo apte ac distincte videri posse. Simili fortasse methodo ac ratiocinio arbitror celeberrimum virum Philippum de Hayr (1) affectum fuisse, Retinæ filamentum esse proxime $\frac{1}{8000}$ unius uncie Pariensis, quæ quantitas cum proxime ex calculis fiat æqualis octavæ parti latitudinis unius filii serici bombycis, collegit celeberrimus Auctor, latitudinem unius filamentum Retinæ fore proxime æqualem octavæ parti latitudinis filii serici bombycis. Denique doctissimus Joannes Ricettus in Epistola dioptrica

ad nobilissimum virum fama, literis & genere celeberrimum Cristinum Martinellum conscripta (2) calculis & experimentis opportune institutis in hac re probabiliora docuisse mihi visus est, crassitiem nempe capilli lucente Sole visi ad distantiam unius pedis Veneti eam habere rationem ad crassitiem imaginis ejusdem capilli in fundo oculi depictæ ut 25. ad 1.; sed diameter pupillæ ad diametrum capilli est in ratione 24. ad unum; ergo facta multiplicatione 25. \times 24. constabit, diametrum pupillæ ad crassitiem imaginis capilli in fundo oculi, seu in Retina depicti fore proxime ut 600. ad unum. Ex his luce meridiana colligendum erit, quantum imagines objectorum in filamentis Retinæ depictæ minimæ futuræ sint, cum in subtilissimo Retinæ filamento tot, ac tanta objectorum depingi facile possint. Mira certe filamentorum Retinæ subtilitas. Non mirabor amplius, cum Optici demonstraverint, ab oculo fere hemisphærium videri posse, cum tanta hemisphærii extensio in tam minimo Retinæ spatio depingi, ac in oculo figurari possint. Hinc tam facile oculorum & Retinæ affectiones occurrunt, ut uno licet Retinæ filamento aut vitiato, aut impedito, aut læso visio quoque aut vitiata, aut impedita, aut læsa jure merito habeatur.

33. Nunc si ea, quæ res postulat, dixerimus, non ibi sollicitus fuero de presbytiæ & de myopis visione dissimili, cum hujusmodi visiones naturales causas naturæ sint. In presbytiis enim humor crystallinus cum non satis convexus sit; sitque majoris sphaeræ segmentum; & si nimis exigua fuerit distantia Retinæ ab humore crystallino, (3) in Retina quidem distincte delineari nequeunt objectorum vicinorum imagines, remotorum tantummodo imaginibus clare delineatis, ut vicina objecta confuse, remota distincte videantur. In myope vero, si a natura elaborata fuerit Retina ab humore crystallino nimis remota, objectorum imagines collectæ fient, antequam ad Retinam opportune perveniant; cumque ultro humor crystallinus fuerit nimis convexus (4), sitque segmentum sphaeræ minoris, remota objecta confuse, vicina distincte a myope videbuntur. Hisce vitiis reparandis consul-

(1) Memoires de Mathematique.

(2) Supplementi al. Giornale Tom. se-
condo.

(3) Per prop. 100. & 101. Vvolvi

Optices.

(4) Per prop. 102. & 103. Vvolvi.

tum fuit in presbyta lente, aut specillo convexo; in myope vero planiori, aut concavo, aut saltem minus convexa lente uti debere. Hisce itaque relictis, primo sollicitus fuero de *Maculis seu Muscis volantibus*, quæ ægrotantibus eo radio esse solent, ut molesto errore continuo hallucinentur; nonnullæ itaque *permanentes* sunt, cum contumaci loco, eaque semper ratione distant ab axe optico, eundem semper objecti locum ac situm occupaturæ, hæ ut plurimum albo objecto firmatæ rotunda imagine delineari consuecunt. Nonnullæ vero *fluctuantes*, sunt nigris quibusdam filamentis distinctæ, ea ferme ratione, qua nodos ligneos abietis figurari experimur. Primæ in Retina locum & vitium habent; etenim cum membrana hæc sanguineis vasculis donata sit, si forte accidat, aut motu violentissimo sanguinis, aut vulnere &c. aliquam sanguinis, aut lymphæ impuræ guttulam aliquod Retinæ spatium esse occupaturam, futurum certe erit spatium illud Retinæ excipiendis opportune imaginibus ineptum; ut objecta quælibet maculam quamdam rotundam, juxta rotundam sanguinis, aut lymphæ impuræ effusionem observari videantur; tandiu autem macula ista erit duratura, quandiu effusio sanguinis, aut impuræ lymphæ perduraverit, evanescente postmodum macula, cum effuso sanguinis, aut lymphæ tractu temporis evanuerit; aliquando Retinæ filamentum, aut spatiolum, aut durius, rigidiusque, ut in senibus redditur, aut materia quadam tenaci ac viscida; aut callo quodam obruitur, aut paralyti afficitur, ut ab unione radiorum hæc minima Retinæ portio neque moveri, neque opportune inflecti possit, idcirco neque pingi, neque delineari ullo modo poterit: hæc Retinæ portio privata motu & imagine, cum talia appareant objecta, qualia in oculo figurata representantur, in objecto exteriori nigra quædam macula erit fere semper, aut diutissime apparitura, cum materia illa partem minimam Retinæ afficiens, neque evanescere, neque curari facile possit; aliquando tamen huiusmodi muscæ ac maculæ nigræ, etsi in Retina sedem habeant, nutare aliquantulum visæ sunt, non quia in Retina situm mutant, verum quia aliquando Retina ipsa aliquali motu movetur, aut trahitur ad eundem postea locum reversura.

Sæpiissime tamen cum muscæ aut maculæ fluctuantes non eam semper ab axe optico distantiam habuerint, poterentim hinc inde nutare videbuntur; quo casu has in humore vitreo, sed potissimum in aqueo sedem posuisse credendum est; cum enim aqueus humor non ea semper donatus fuerit puritate, ut granula quædam, aut filamenta impuri humoris aliquando, exceperit, hæc aut radios impediendo, aut eosdem aliunde refrangendo (cum hi non in puncto Retinæ, cum cæteris radiorum ordinibus uniri opportune possint) muscas seu maculas illas in objecto parere videbuntur; Hæ autem facilius curari poterunt, si remediis humorem aqueum depurari opportune contigerit; non differenda itaque aquei humoris depuratio, cum adaucta paulatim humorum saburra timeri facile posset, ne impuræ humorum particulæ sibi invicem adhærendo nebulam quandam texerent, suffusionem seu cataractam impedito luminis ingressu parituræ. Nonnulli non ab aquei humoris impuritate, ac densitate cataractam orituram crediderunt, sed opinati sunt, humorem crystallinum ex plurimis lamellis diaphanis elaboratum fuisse, quæ aliquando versus aqueum humorem adeo densiores fiunt, ut supra naturæ legem indurescant, densiores autem factæ, non tantum crystallinum humorem opacum reddunt luminis impedimento; verum cum densitates sint ponderibus proportionales, humorem hunc reddunt ponderosiores; adaucto autem crystallini pondere processibus ciliariis violenter distractis lens crystallina aliquantulum a naturali loco distrahitur, aut deprimitur, & lentis focus non opportune Retinam afficiens visionem aliquando, cataracta temere accusata, aut impedit, aut turbat. Inter præternaturales oculorum affectiones eam ulterius arbitror, qua icterici afficiuntur, cum omnia flava videantur. Immortalis Nevvtonus doctrinam colorum acturus per solam refractionem lumen in colores mutari (1) experimentis, rationibus in aureo optices opere edocuerat. Cum vero radii, qui varios colores efficiunt ac afferunt, differant variis gradibus refrangibilitatis (2) arbitrandum est, ab aqueo humore biliosis, flavisque particulis permixto transeuntes radios peculiarem, ac specificum refrangibilitatis gradum pati debere, ut hi juxta hunc gradum, flavum

(1) Num. 183. Vvolffii.

(2) Num. 196.

flavum objectis colorem vitiose communi-
cent: hujusmodi autem gradum refrangibi-
litarum radorum flavorum in prifinate vi-
treo observari poffe fatis evulgatum est, ut
nullatenus dubitandum fit, ex tali determi-
nato gradu refrangibilitatis radorum a cor-
poribus flavis aqueo humori, aut vitreo
permixtis elaborato flavum objectorum co-
lorem oriri poffe. Sed inter morbosa vifio-
nis phaenomena objectorum duplicatio mi-
randa fapiffime est. In hac re non me la-
tet, objecta vifibilia extra horoptorem con-
fiftura geminata apparere (1); verum cum
objecta etiam in horoptere confiftura du-
plicari aliquando poffint, licet ac opticis
& dioptricis ea, quae tanta res postulat,
haberi facile poffint, vehementer tamen ad
hanc rem explicandam polyedrae lentis ex-
perimenta conferre videbuntur: cum enim
lens polyedra fit corpus ex fuperficiebus pla-
nis in convexas fuperficies difpofitis (2), fi
oculus ita confiftatur ubi radii paralleli
decuffantur a fingulis planis polyedris, ra-
dii paralleli ab eodem objecto prodeuntes
in oculum propagari debuerunt: cum vero
humor cryftallinus, utpote lenticula con-
vexa radios parallelos unire debeat, in to-
tidem diverfis Retinae punctis uniendi erunt
radii, quot funt lentis polyedrae plana con-
vexa, confequenter oculus per lentem po-
lyedram toties videre poterit objectum,
quot funt facies, feu plana convexe len-
tem polyedram componentia. Experimentum
hoc affabre oftendere videtur, cur ali-
quando objecta duplicari videantur; cum
enim ob aetatem arefcentibus membranis
humores continentibus, aut vitio aquei,
& vitrei humoris inaequaliter cryftallinum
humorem prementis, aut ejusdem cryftalli-
ni culpa aliqua minima lentis cryftallinae
portio a naturali convexitate aliquantulum
declinet, ut aliquod in data minima parte
planum fiat; tunc radii ab hoc praeterna-
turali minimo plano uniendi erunt in pun-
cto aliquo Retinae; & cum talis unio ra-
diorum differre debeat, & aliquantulum difta-
re ab eo puncto, in quo naturaliter colli-
guntur, & uniuntur radii illi, qui per axem
cryftallinae lentis una cum iis, qui natu-
rali ratione refracti in eodem puncto Re-

tinae colliguntur; non dubitandum, Reti-
nam duplici loco, ac puncto movendam &
afficiendam effe, quare objectorum imagi-
nes erunt geminae. Verum frequentiora
vifionis incommoda ab uvea membrana,
quae pupillam confiftit, confequi experi-
mur. Tritum enim opticis axioma est,
crescente lumine pupillam coarctari, ut fu-
perfluum lumen expellatur; decrefciente di-
latari, ut excipiat neceffarium. Cum au-
tem quodlibet punctum vifibile radiat in
pupillam per conum, cujus vertex in ipfa
puncto radiante locatur, basis vero pupilla
fit (3), cum praeter naturae legem dilatata
fuerit pupilla, basis coni luminofi major
futura erit, quae cum plures radios exci-
piat, quam fieri debeat, a tanto radorum
numero, & confequenter intenfione ac den-
fitate Retina violenter afficienda erit, &
quodammodo vulneranda; ut autem haec
tam neceffaria, tam violenta naturae, in-
ftituto nostro opportuna magis confent:
Sit basis pupillae, aut basis circularis cry-
ftallinae lentis fpatium circulare $AMBN$;
radii vero perpendiculares tranfeuntes per
axem fint CGD ; radii vero convergentes,
& refracti fint AED , BFD , qui concu-
rant cum perpendicularibus radiis in Reti-
na in puncto D ; Ducaturque alter circu-
lus EGF parallelus circulo basis cryftalli-
nae $AMBN$; ex optico theoremate tertio
Vvolffii, cum lumen propagetur per radios
aequalium virium in medio non refiftente,
intenfitas luminis crefcit in ratione duplica-
ta diftantiarum a puncto concursus recipro-
ce; num autem intenfitates luminis fint
caeteris paribus ut denfitates ejusdem, erit
denfitas luminis in C , ad denfitatem in
 G in ratione reciproca circulorum EGF ,
ad $AMBN$; & confequenter in ratione
duplicata reciproce ipsius OF ad CB , fed
 OF est parallela CB , ergo erit OF ad
 CB , ut OD ad CD , quare intenfitas, Prop. 4.
6. Eucl.
feu denfitas luminis in C ad denfitatem
in G erit quoque in ratione duplicata re-
ciproce diftantiae OD ad diftantiam CD a
puncto D Retinae; quare cum in OD fiat
major denfitas radorum, fiet quoque major
intenfitas eorum concurrentium in D . Hinc
Retina violenter affecta & vulnerata rema-
nebit

(1) Per Theorem. 80. Vvolffii.
(2) Per def. 23. Dioptrices.

(3) Per Theorem. 78. Vvolffii.

nebit visione aut laesa, aut impedita. Processus quoque ciliares aut laxati, aut contracti humorem crystallinum, aut planiorem fortasse reddunt, aut magis convexum, ut nonnulli opinati sunt; inde radorum unio, aut a crystallino distantior in planiore, aut eidem proximior in magis convexa, erit futura. Visio propterea aliquo tempore ob opportunum concursum radorum in Retina distincta & clara; alio tempore ob aliqualem tantummodo contactum eorundem in Retina exequendum imperfecta & obscura; alio tempore ob nullum in Retina radorum unitorum concursum ac contactum deperdita visio, aut nulla erit futura. Superessent reliquæ morborum oculi differentix, *Ophthalmia* videlicet, *Hebetudo* & *Illacrimatio*, a quibus facile declinavimus; cum non ab organorum, sed ab humorum vitio fieri consuecant. *Guttam* quidem *Serenam* cum a nervi optici & Retinæ paralyti, aut callo, aut quocunque alio opticorum errore plerique Medicorum factam velint, ab iis, quæ de paralyti supra diximus, causæ erunt opportune postulandæ. Pro appendice addo rem animadversione dignissimam, cæcos nempe ut plurimum longævos esse; num autem longior vita a majori fibrarum cerebri otio comparatur, quod ab otiantibus nervis opticis facile assequimur; cum hi cæteris nervis grandiores sint, & supra cæteros continuo operosiores? num quia cæci minus libere vivere consuecant, reliquis sensoriis magis otiantibus? anceps non judico.

34. Oculorum morbis satis, expensis ad morbos auditus progredimur; ineptum autem esset, de his disputationem agere, ni prius innotescat methodus, qua ær agitatæ sonum ferat; itaque celeberrimus Jacobus Hermannus (1) suscepta ab immortalis Nevvtono sonorum doctrina hanc explicare aggressus est; docet enim sonum fieri, cum ex vibratione seu tremulo motu corporis sonori circumjectus ær elasticus undequaque propellitur, propulsus autem densatur non nihil; particulae autem æris inter se densatae comprimuntur, compressæ vero, cum elasticitates sunt quamproxime densitatibus

proportionales, coguntur denuo relaxari, & in partes contrarias, seu unde venerant, regredi: nam addit Hermannus, ita partium corporis tremuli contigue æris partes propulsæ densabuntur, regressu vero, atque adeo amota vi comprimente densatus ær iterum sese in omnes partes, quantum potest, elatere suo expandet; ita ut ita partium corporis tremuli ær condensetur, & in reditu, atque iterum rareseat; quod partes corporis tremuli in ære ipsis contiguo efficiunt, idem etiam præstabunt æris partes jam propulsæ in ære ipsis contiguo, & hic in sibi proximo, atque sic deinceps; sed non eadem ubique harmonia, ita ut, si quedam æris partes propulsæ sint, propellantur & omnes reliquæ, atque progrediantur; sed cum una propellantur, atque densentur, aliæ redeant, atque posteaquam densatae erant, iterum rarefiant & regrediantur, idque vicibus permutatis; hac ratione sonum fieri, & tali ratione ab aure humana audiri credendum est. Notat deinde Hermannus, quod ejusmodi motus partium æris propulsarum atque iterum unde venerant regredientium, seu intervalla progressus atque regressus vocentur pulsus æris, quæ intervalla ob equalia temporis intervalla præterpropter equalia existent. Porro naturæ & essentia auditus præstat inquirere soni velocitatem, Hanc rem celeberrimi viri accuratissime dimensum sunt, & primo celeberrima Academia Florentina experimento 245. experta est, sonum spatio quinque minutorum secundorum unius militaris Veneti spatium peragere. Doctissimus Merfennus pag. 35. suæ Balysticæ expertus est, sonnum minutis quinque secundis confecisse pedes Gallicos 6900. inde ex proportionum regulis innotescet, spatio unius minuti secundi pedes Gallicos 1380. conficiendos fuisse. Celeberrimus Vvistonius (2) experimentis edoctus exposuit, spatio unius minuti secundi velocitatem soni fuisse pedum Anglicorum 1060. denique immortalis Nevvtonus (3) considerata crassitie particularum æris & vaporum diversi generis densitate, constat inquit per experimenta, quod soni tempore minuti unius secundi cundo conficiunt pedes Londinenses plus minus

(1) Cap. 23. Phoron.

(2) Lectione 29. prop. 62. Coroll. 7. sua-

rum Praelectionum.

(3) Scholio prop. 50. princ. Mathem.

minus 1142. *Parisienses vero* 1070. qui in pedes Venetos converſi efficiunt ſummam pedum 1144. $\frac{144}{1440}$ proxime. Modo ex determinata ſoni velocitate tempore unius minuti ſecundi mirum in modum colligit laudatus Vviſtonus (1) data ſonorum ubique locorum velocitate, ea videlicet, qua 1060. pedes Anglici, ſeu pedes Veneti 1209. $\frac{310}{1110}$ unius minuti ſpatio conſiciuntur, datoque quocunque intervallo temporis, quo eadem ſoni velocitas datum ſpatium peragrat, corporis ſonori a noſtris auribus diſtantiā facile innotefcere potuiſſe; ſi enim inter bombardæ ignem viſum, & ſonum auditum decem minuta ſecunda partranſire obſervata fuerit, conſtabit bombardæ locum ab auditoribus ſpatio 10600 pedum Anglicorum, proxime diſtare debuiſſe, ut ex regulis proportionum conſtabit; eſt enim 1. 1060 :: 10. 10600. Ita ſi inter fulgur viſum, & tonitru auditum intercedant quinque minuta ſecunda patebit, nubes iſtas, unde fulmina eruperunt a ſpectatoribus proxime 5300. pedes Anglicos, ſeu pedes Venetos proxime 6045. $\frac{1350}{330}$ fuiſſe diſtantes.

Cognita itaque ex immortalis Nevvtono ſonorum velocitate progreditur celeberrimus Auctor calculorum opere intervalla pulſuum dimetiri; monitos itaque nos reddit. *D. Savverum inveniffe factis a ſe experimentis, quod fiſtula aperta, cujus longitudo erat pedum Pariſienſium plus minus quinque, ſonum edit ejuſdem ſoni cum ſono chordæ, quæ tempore minuti unius ſecundi centies recurrit; ſunt igitur pulſus plus minus centum in ſpatio pedum Pariſienſium 1070, ſeu pedum*

Venetorum 1144 $\frac{440}{1440}$ quos ſonus tempore unius minuti ſecundi percurrit; adeoque pulſus unus occupat ſpatium pedum Pariſienſium

10 $\frac{7}{10}$ ſeu pedum Venetorum 11 $\frac{618}{1440}$

proxime, id eſt duplam circiter longitudinem fiſtulæ; unde veriſimile eſt, quod latitudines pulſuum in omnium apertarum fiſtularum ſo-
Sydenham Opera Med. Tom. II.

vis æquantur duplis longitudinibus fiſtularum. Mirabile poſtmodum eruitur ab iis, quæ dicta ſunt, & ab experimentis 241. & ſequentibus celeberrimæ Academiæ Florentinæ, & juxta demonſtrata a celeberrimo Taylor (2) ſonos, vel magnos, vel parvos ſemper æque veloces & æquabiles eſſe futuros. Hæc quantumvis extra inſtitutum noſtrum dicta videantur, attamen eo collimant, ut cognita prius ſonorum natura, velocitate & pulſuum proportionem, & conſequenter tanti ſenſus dignitate, præſtantia ac neceſſitate, facilius ac commodius a nobis morboſa auditus incommoda inquirantur & cognoscantur.

35. Ex ſoni doctrina ſuper expoſita generalis quidem ſoni idea innotefcit, ſpecifica vero & peculiaris ſoni ratio, qua diverſi ſoni fieri diverſimode poſſint, adhuc ulteriora petere videtur: deſideratam peculiaris & ſpecifici ſoni efficiendæ rationem experimentis opportune factis celeberrimus Franciſcus Lana (3) reperire acriter ſtudit, prop. enim 6. libri 9. de tremore corporum, oſtendit, chordam tenſam (idem intellige proportionaliter de quocunque corpore ſonoro) & percuffam vibrari & reſonare; hanc autem non vibrari & reſonare, per modum unius, ſed ejus plurimas, minimasque particulas, ex quibus chorda componitur peculiareſ efficere, ut puto, curvas elafiicas ſeu diſtractiones, quæ poſtmodum tranſeundo a curvis in rectas efformant minutas, minimasque vibrationes, ex quibus reſultat ſeu componitur talis ſoni diſſerentia; etenim a pluribus experimentis colligit, quod dum chorda tenſa in ſingulis ſuis ſimplicibus undationibus removeretur a ſuo ſitu recto, quoties tendit, aut ad dextram, aut ad ſiniſtram, toties quodammodo incurvata elongatur, & conſequenter novam tenſionem patitur; quoties vero iterum redit ad ſitum medium: in linea recta, toties remittitur nova illa tenſio prius acquiſita; conſtat autem ex dictis a celeberrimo Auctore de tenſione chordarum per tenſionem partes chordæ comprimi, & ipſam cordam ſubtiliorem fieri, per reductionem rurfus dilatari, & priorem craſſitiem recuperare.

L I

Igi-

(1) Coroll. 13. prop. 62.

(2) Prop. 12. methodo incremeorom di-

recta, & inverſa.

(3) Tom. 2. Magiſt. Naturæ, & Artis.

Igitur præter motum simplicem undulatorium, hinc inde per motum unius, seu toti chordæ communem, qua chorda agitur, est & alius motus constrictionis & dilatationis particularum, seu partium minimarum chordam componentium, qui operatur in singulis filaminibus, ex quibus chorda coagmentatur. Immo in partibus unius & ejusdem filaminis. Cum enim hujusmodi filamina & illorum particulae non sint singulae singulis omnino similes, nec similes arcus describant, sed aliquæ magis, aliæ minus resistent tensioni, compressioni, constrictioni & dilatationi, dissimiles quidem, cum post tensionem se reducant, vibrationes efficient singulas suæ naturæ, ac suis viribus ac conatibus, seu arcubus proxime proportionales, quamobrem ex his peculiaribus minimarum partium similium, & dissimilium chordam componentium arcubus, seu distractionibus, & contractionibus componuntur minimæ vibrationes, ex quibus efformatur motus ille tremulus, peculiaris & specificus, qui talem ac specificam soni differentiam opportune parit. Simplex itaque & generalis soni idea undulationes totius corporis sonori ea ratione postulare videtur, qua aer simili quoque methodo vibratus, modo ita densetur, modo reditu rareseat; specifica vero & peculiaris soni ratio hoc ulterius postulat, ut particulae minimæ corporis sonori similes & dissimiles, quarum aliæ magis, aliæ vero minus ex dissimilibus earum arcubus tensioni, compressioni, constrictioni & dilatationi resistunt, componant peculiare vibrationes ex motu partium minimarum similium, & dissimilium compositas; ex quibus fit quidam specificus partium minimarum tremor, qui talem ac specificam soni differentiam sit producturus: inde cum tam variæ fieri possint minimarum partium, seu arcuum distractiones, & contractiones, & consequenter tam variæ vibrationes, seu tremores aëri communicandæ, tot soni differentiarum ab auribus humanis erunt diversimode percipiendæ. Ex his itaque querendum est, a quam causa sonus *gravis* & *acutus* habeantur. In hac re non pigeat prius experimentorum meminisci, vibrationes chordarum esse in ratione longitudinum earundem. Ita doctissimus Hayr expertus est chordam tensam longitudinis pedum decem, si tempore unius minuti centum vibrationes absolvat; hujus dimidiam eadem ratione tensam eodem minuto secun-

do 200. vibrationes fuisse absoluturam. Acutus itaque sonus ille esse videtur, qui parvo tempore frequentiores vibrationes absolvit, non solum juxta rationem totius organi; verum etiam juxta rationem minimorum arcuum fibrillarum, quæ dum impelluntur, frequentius vibrantur; exigui propterea & brevissimi minimique arcus fibrillarum organi auditorii facto opportuno dum iis, quæ dicta sunt, analogismo, dum parvo tempore frequentissimas distractiones & contractiones edunt, a quibus frequentissime emergunt vibrationes ac tremores, majorique conatu recedunt a situ suo naturali magis violentam tensionem parientur, acutum sonum edere debuerunt. E contra sonum gravem datura erit auris humana cum majori tempore ac longiori pauciores fiant vibrationes organi & partium minimarum, seu arcuum earundem, ob tardiores distractiones, & contractiones elasticas, earum, minoremque tensionem fibrillarum omnium.

36. Hisce præmissis contrahendo sermones nostros ad aurem humanam juxta anatomicum aurium ordinem placeat ratiocinari; præter enim externum, & flexuosum aurium apparatus occurrit *Meatus auditorius*; cavitas videlicet cylindrico elliptica; hac obliquo suo ductu glandulis undequaque donata est, a quibus cerumen continuo separatur; cum vero e glandulis ea ratione separatam fuerit, ut ceruminis corpus naturalem meatus auditorii obliquitatem mutaverit, undulationes aëris ultro reflexæ, & quodammodo a lege naturalium undulationum declinantes, auditum si non invertent, saltem poterunt imminuere. Clauditur autem internus hic meatus auditorius obliqua sectione a *Membrana Tympani* anulo osseo affixa, cujus peripheria elliptica est, & ex duplici membranacea expansione duræ matris & cutis meatus auditorii coagmentata est; auditorii autem nervorum paris dura portio tympano impertitur; hoc autem tenditur & laxatur a nerveis filamentis, & musculis, & ab ossiculorum determinatis motibus, quorum primus *Malleus* est; secundus *incus*; tertius *Os orbiculare*, & *Stapes* quartus, qui immediate membranæ tympani succedunt. Opera itaque musculorum & talium ossiculorum ea ratione ac lege tendi debet membrana, non solum quoad totum sui spatium, verum etiam quoad singula sui filamenta, ut æquabilis & homogeneus

motona fiat undequaque membranæ tensio; hac autem lege æquabilis tensionis statum a natura est, oscillatione externi aeris, específicos impetus membranæ tympani communicare, a quibus cum distractæ fuerint, & in minimas curvas inflexæ, postmodum vero succedente motu contractionis específicos tremores, ac vibrationes parituræ erunt, primam naturalis auditus elaborationem opportuno principio donaturæ. Quid autem de auditu timendum esset, si muscoli membranarum tympani, & ossicula tendentes, aut nimio sero madefacti, aut paralyti affecti fuerint? quid timendum? si humida aeris temperies, si feri copia membranam laxaverint. Nemo ignorat, hisce vitiis membranam, missa naturali tensione æquabili, naturalique fibrarum parallelismo, non eas æquabiles distractiones, & contractiones, & consequenter non eas vibrationes & oscillationes, non eos tremores excipere posse, qui specificis sonorum differentiis exequendis opportuni essent? quid ergo? obtusus mehercule fiet auditus, confusus & hebes: pejus fortasse malum irruet, si convulsis hisce musculis membrana tympani supramodum crispata ac tensa consisterit: a vibrationibus enim, & oscillationibus frequentissimis exasperata membrana feret soni acutiem, rigiditatem, & asperitatem ex quocunque levi aeris momento & piæ matris consensu dolorificam sensationem erit allatura. Redeunti ad naturalem auditum animadvertendum est, naturam, initio auditus, adeo de hoc recte exequendo fuisse sollicitam, ut opera musculorum & ossiculorum interiorum adeo disponere, ac naturaliter tendere voluerit membranam tympani, ut non solum membrana tota, verum etiam singulæ minimæ componentes fibrillæ homotone & unisone tendendæ ac disponendæ similiter essent: tanti porro operis perfectioni juvat suspicari, fibras membranæ tympani adeo naturaliter singulas esse similiter, homotone & unisone tendendas ac disponendas, ut si aeris externi oscillationes totum membranæ spatium tangere, verberare ac inflectere aliquando non possint; auditui tamen exequendo satis opportune sufficiet, si unum tantummodo membranæ tympani filamentum ab aëre oscillante verberaretur; ea ferme methodo, qua experimur, chordas in eodem instrumento unisone tensas, tremere tamen ac oscillare omnes unisonas debere, quantumvis

una tantummodo ex unisonis chorda tacta fuerit ac verberata.

37. Membranæ tympani sua cavitas correspondet; hæc sphærica est. In tympani supernis partibus duæ occurrunt fenestræ, quæ in tympani cavitatem sese aperiunt; *Ovalis una, Rotunda altera. Ovalis fenestra* illa est, quæ a basi stapedis clauditur, eidem configuratione respondens, situm obtinet tympani membranæ parallelum; per hanc videtur aditus ad labyrinthi vestibulum. *Fenestra rotunda* incertam habet figuram, ut plurimum tamen ad circulem tendit, videturque membranæ tympani verticalis; a parte autem inferiore tympani proficiscitur *Tuba Eustachiana* transiens ad latera interiorum nasi foraminum supra uvulæ basin terminata. Utræque fenestræ *Ovalis & Rotunda* transitum donant interiori auris cavitati, quæ cavitas in osse petroso locata est, quæ *Labyrinthus* appellatur; hæc autem labyrinthi cavitas tres in partes dividitur; in *Vestibulum* nempe, in *Canales semicirculares & Cochleam*. *Vestibulum* est cavitas irregulari configuratione constructa, parietes undequaque ostendens concavos. In hac cavitate vestibuli plura aperiuntur orificia, nempe orificium fenestræ ovalis, & quinque orificia canalium semicircularium, orificium cochleæ, & quinque orificia nervis aditum præbentia, atque ideo ab istis occulta, secunda vero labyrinthi pars, nempe canales semicirculares, hi in semicirculi modum incurvantur, numero autem sunt tres, quorum primus est canalis semicircularis major, secundus minor, tertius minimus; cochlea autem tertia labyrinthi pars eleganter limacem cochleam repræsentat sub specie conii elaborata. Hujus cavitatis superficies non ex eadem substantia componitur, ac superficies cavitatis canalium semicircularium, quæ nempe durissimum os est; sed ex substantia ita friabili, ut in exsiccatis saltem auribus calcinatum os referat; canalis iste ope ejusdem septi in duos canales ita dividitur, ut canalis alter cum altero nullo pacto communicet: hoc septum, quod septum cochleæ dici poterit, duplici constat substantia, solidiori una, molliori altera. Duo canales, in quos cochleæ cavitatem ab exposito septo parti indicavimus, *Scale* nominantur, quarum una per fenestram rotundam respicit tympanum, & tympani scala appellatur; altera vero cum

vestibulo communicat per orificium quasi ellipticum ad latus fenestræ ovalis situm inter hanc, & orificium proprium canalis majoris (hæc vero vestibuli scala appellatur). Scala tympani superiorem situm obtinuit; scala vero vestibuli inferiorem &c. Ad æstuandas autem & ditandas labyrinthi cavitates portio mollis auditorii nervorum paris descendit; in osse enim temporali, & petroso excavatur nervorum auditorium canal, quem non sine ratione in duplicem partitur, nempe in communem & particularem. Quinque ulterius nervi furculi in vestibulo per membranam dilatati peculiari incessu membranaceo progrediuntur. Etenim a membrana vestibuli quadam aliæ membranæ procedunt, quarum singulæ diversum canalium semicircularium orificium ingrediuntur; ubi vero membrana per unum canal, orificium ingressa, membranæ per alterum ejusdem canal, orificium intranti percurrente occurrit, unam continuatam membranam ambæ componunt; tales cum strictioris tæniolæ sive parvæ zonæ figuram habeant, sintque motibus sonoris excipientis tanquam proprio sensorio destinata; hinc a celeberrimo Valsalva *Zone sonore* nuncupantur; hæc sunt numero tres nempe totidem ac canales, eandemque cum istis obtinent longitudinem &c. Alibi autem docet doctissimus Auctor, zonas has esse mollis auditorii nervi expansiones &c. Observat ulterius, labyrinthum humore aqueo copiose madefactum fuisse, & ab hoc patere aditum in palatum, ut aperto ore tribuendus sit aer, imminuta aurium officia reparaturus. Hæc omnia a doctissimo Valsalva hinc inde colligenda, ac describenda esse opportuno censui, ut accuratius ea innotescerent, quæ auris humanæ organo, ac officio intelligendo necessaria esse viderentur. Hisce præmissis liceat arbitrari, externum aërem a sono taliter motum undulationes ac tremores specificè contrahere, quæ membranam tympani tali ratione obliqui impulsus urgeat, ut non solum membrana, verum etiam minimæ illius componentis fibrillæ inflecti, ac distrahi adeo teneantur, ut minimas curvas describant; filamenta autem membranæ tympani taliter inflexa ac distracta, cum elastica sint, conantur sese opere elastico momenti contractionis sese reciproce restituere; quæ distractiones & reciproce contractiones, cum specificos fibrillarum motus ac tremo-

res efficient, urgent, impelluntque simili impulsus lege tria illa officula, quæ immediate membranam tympani subsequuntur; hæc autem officula similiter mota & impulsu motu quodam composito ex motu membranæ tympani & ossiculorum, movent ac sollicitant similiter filamenta nervea nervi auditorii per membranam tympani decurrentia; pariterque filamenta membranosa ejusdem paris vagi labyrinthum investientia, & consequenter zonas sonoras naturali lege unisonè tensas, ex quarum specifica ratione motus ac sollicitatione auditus sensatio opportune perficitur. Prodest ulterius actioni auditus undulatio, oscillatio & tremor aëris illius, qui probabiliter per foraminulum membranæ tympani ingreditur cavitatem ejusdem, & ab hac per labyrinthum excurrit; hæc enim aëris portio specificè mota a ratione motus compositi ex motu membranæ tympani & trium ossiculorum, undulationes excipit illis motibus proportionales ac unisonas; aer autem inclusus taliter motus, cum & ipse urgeat, ac sollicitationem adjuvet membranæ nervi auditorii, & zonarum, jure auditus operi auxiliaturus est. Itaque & ab his, quæ in organo auditus observata sunt, & ab experimento chordarum unisonè tensarum, quæ, etsi non pulsata, tamen isochrone, & unisonè respondent illi chordæ unisonæ, quæ sola pulsata fuerat, probabilis credendum est membranam quoque elasticam nervi auditorii una cum zonis sonoris donatam esse fibris ordine, textura & tensione similibus, & homologis fibrillis membranæ tympani, non solum juxta rationem totius, verum etiam juxta rationem minimarum fibrillarum singulorum filamentorum componentium; sic enim supposita simili & æquabili membranæ tympani compositione, textura & tensione cum fibrillis membranæ nervi auditorii, & zonarum curvæ distractiones & contractiones membranæ nervi auditorii & zonarum, cum in statu naturali similes & æquales fuerint curvis distractionibus & contractionibus membranæ tympani, opera etiam adjuvante similis motus aëris in labyrintho inclusi, naturalem auditus actionem ordinatam, consonantem & harmonicam efficient. Quamobrem ut naturalis auditus actio exerceatur, jure credenda est necessaria proportio æqualitatis, & similitudinis inter undulationes & tremores aëris externi, & undulationem & tremo-

tremorem interni aëris in labyrintho inclusi, & motum seu tremorem membranæ tympani, cum motu seu tremore membranæ nervi auditorii & zonarum; ita ut esse debeat motus seu tremor aëris externi, ad motum seu tremorem aëris interni, ut motus seu tremor membranæ tympani una cum ossiculis ad motum seu tremorem membranæ nervi auditorii & zonarum; verum cum motus membranæ tympani & ossiculorum determinetur a momento, & sollicitatione ac tremore aëris externi; ideo motus membranæ tympani & ossiculorum erit motui aëris externi proportionalis; pariterque cum motus seu tremor membranæ nervi auditorii & zonarum determinetur a motu aut tremore membranæ tympani, & trium ossiculorum una cum aëre in labyrintho incluso, propterea licebit arguere permutando, quod motus seu tremor aëris externi sit ad motum seu tremorem membranæ tympani & ossiculorum, ut motus seu tremor aëris interni & inclusi ad motum seu tremorem membranæ nervi auditorii & zonarum; hæc quidem in statu naturali probabiliter sunt judicanda. Verum si minimæ fibrillæ membranæ elasticæ nervi auditorii & zonarum, aut vitio sui, aut meningum, aut fluidorum per cacos aurium canaliculos fluentium, aut vitio interni, aut externi aëris non fuerint ordine, textura & tensione similiter positæ; ita ut tales curvæ distractiones & reciprocarum contractiones seu tremores fibrillarum earundem non ea ratione ac proportionem fuerint similes & æquales, aut quasi æquales tensionibus, tremoribus, aut curvis distensionibus, & reciprocis contractionibus minimarum fibrillarum membranæ tympani, & trium ossiculorum; cumque fibrillæ componentes non eum servent naturalem parallelismum inter se cum naturali positione angulorum earundem; tunc mehercule cum membrana tympani & tria ossicula non debita proportionem, motu ac positionem membranæ nervi auditorii & zonarum respondeant: nec vibrationes ac tremores similes & isochronæ, aut fortasse nec in opportuna proportionem harmonica fuerint inter se: sonus & auditus confusi, indistincti, & dissonantes erunt futuri. Quamobrem cum membrana nervi auditorii & zonarum pia matre undequaque induantur, & hæc cum fibrillis cerebri, a qua vestiuntur, eminentem communionem habeat, teneat sensationem in anima ineptam, indi-

stinctam & dissonantem ut anima ipsa sonos inepte & dissonanter percipiat & iudicet. Arteriæ carotides, & jugulares venæ, & lymphatica vascula aures undequaque irrigant; cum autem hi meatus sanguine, aut sero irrigati, & membranæ fluidis extraneis madefactæ fuerint, filamenta illa inæquali succorum pondere ac mole repleta, erunt, ut aliquando convulsa fiant, mutatoque earum parallelismo longitudine & crassitie inæqualia, & ab inæqualibus aëris, aut fluidorum heterogeneorum dissimilibus conatibus inæqualiter tensa ac distensa consistent; cum autem fibrarum curvæ distensiones sint proxime in ratione composita ex directa potentiarum tendentium, directa longitudinum & reciproca crassitierum earundem; nemo dubitaverit membranarum, aliarumque partium fibras mole, pondere, crassitie ac longitudine, & consequenter distensione & contractione inæquales & asymmetras esse futuras; non ergo sparandum est, harum curvas distractiones & contractiones reciprocas fore inter se isochronas, similes & homologas, sed absque ulla proportionem harmonica dissimiles, inordinatas & asymmetras. En ergo confusus, hebes & dissonans auditus! en ex inæquali aëris motu, impetu asymmetrico, tremore & reflexione sibilus & tintinnus! en gravis & molesta sensatio!

38. Delectationi animalium præstat potissimum odoratus; hic a membrana quadam narium cavernulas investientes in officio est; hæc ex nervis primi paris olfactoriis per os cribrosum, & narium cavernulas opportune expansis composita odoratus organum determinare videtur. Verum cum quodres sunt subjecta odoratus, & odores a corporibus undequaque citissime effluant, natura rei postulare videtur, nos prius de horum corporum effluviis acturos esse. Itaque, qui Boylei experimenta e limine salutaverint, non ignorabunt, quælibet corpora composita cujuscunque regni vegetabilis, animalis, & mineralis continua effluvia quaquaversus emittere, quæ juxta vires ac momenta propriæ atmosphæræ odoratus organum modo suaviter, modo moleste sollicitant. Ut autem commodius ac clarius hæc res agitata opportune elucescat, consultum fuit a melioris notæ Philosophis præsupponere, corpora quælibet respectu sui suum totale centrum continere, quod tamen centrum pariale esse debuit respectu terræ. Uniusque itaque corpori,

ut planetis omnibus evenit, sua circumjacet atmosphæra viribus ac momento corporis proportionalis, quæ ab effluviis quaquaversus a corpore effusis composita sphericam superficiem describere credita est; hujusmodi effluvia per peculiarem atmosphæram effusa viribus ac momento differunt juxta rationes homologas densitatum eorundem; verum cum densitates effluviarum per varias superficies circulares atmosphære sint reciproce, ut spatia, quæ ab ipsis effluviis occupantur in superficiebus circularibus ejusdem, spatia autem ab ipsis occupata sint reciproce ex geometricis in ratione duplicata, seu ut reciproce quadrata distantiarum a centro corporis; utique vires, momenta ac densitates effluviarum per superficies circulares atmosphæricas eorundem erunt reciproce in ratione duplicata, seu reciproce ut quadrata distantiarum a centro corporis. Quamobrem ex his manifestum videbitur, in distantia effluvi linearis ut 2. a centro corporis ad distantiam effluvi linearis ut 3. a centro ejusdem, vires, momenta ac densitates atmosphære effluviarum futuras esse reciproce ut 9. ad 4. Itaque vis, momentum & densitas effluviarum distantium ut 2. a centro corporis erit ut 9. & vis, momentum & densitas effluviarum distantium ut 3. a centro ejusdem futura erit ut 4. nempe ut reciproce quadratum distantie 2. ad quadratum distantie 3. Si itaque a quibuscunque punctis distantiarum a centro corporis crescentium in ratione arithmetica, quæ accipiantur ut asymptoton, ducantur lineæ perpendiculares inter se parallelæ; sed ea ratione geometrica decrecentes, quæ vires ac momenta effluviarum decrescunt in ratione duplicata distantiarum a centro reciproce, seu in ratione reciproca quadrati distantiarum ab eodem centro; & ab eodem centro; & ab extremitatibus linearum parallelarum ductarum ducatur linea; hæc linea ducta erit logarithmica, seu curva hyperbolica aut saltem generis hyperbolici futura erit. Juxta has motuum proportionēs a centro corporis, unde citissime exeunt, moveri & agere effluvia contra sensoria videbuntur; num vero, & qua ratione effluvia a corpore eminus delata, ad corpus unde effluerant, tanquam ad suum totale centrum opportune (ut nonnulli Philosophi putant) restitui possint! hoc quidem tam anceps, tam lubricum est, ut nostrum præcurrat ingenium. Multi tamen opinati sunt,

effluvia corporis, cum eminus delata fuerint, quorum momenta, vires ac densitates ea ratione notabiliter decreverint, qua supra proxime determinatum est, necessario occurrere & incidere in atmosphæram æream, seu ambientem ærem, cujus cum vis, momentum & densitas multo major sit vi, momento ac densitate effluviarum corporis eminus delatorum, mehercle vis; momentum & densitas æris ambientis eo fortior & validior futura erit ad impellendum, quo atmosphæra corporis debilior, iners, minusque densa facta fuerit ad resistendum, quotiescunque notabiliter a corpore distaverit. Itaque cum vis, densitas & momentum æris ambientis majus fuerit momento atmosphære corporis, momentum æris ambientis magis urgebit effluvia corporis versus plagam, unde decesserant, propter effluviarum resistantiam minorem æris ambientis atmosphære; cum ergo momentum æris ambientis habeat rationem majoris inæqualitatis respectu ad momentum atmosphære corporis, & vicissim momentum atmosphære corporis, in notabili distantia ab eodem corpore habeat rationem minoris inæqualitatis respectu ad momentum æris ambientis, cogetur atmosphæra corporis in notabili distantia ab eodem cedere vi & momento æris ambientis. Quamobrem cum effluvia corporis impedita ultro progredi non possint, inclinatis directionibus vorticoso, aut spirali quodam motu revertere sere omnia conabuntur, unde primo decesserant, ut iisdem, similibusque corporis porulis restituta corpus quodlibet pro data lege Universi conservarent; sed non vacat hæc tam incerta, tam obscura meditari. Certum quidem est, juxta vires, densitates ac momenta effluviarum e corpore in datis rationibus proxime exeuntium fibras membranæas & nerveas odoratus variis rationibus esse sollicitandas. Membrana itaque & fibræ nerveæ organi odoratus tali, determinataque textura elaborata, non solum ratione totius, verum etiam ratione minimarum partium membranæ, fibrasque nerveas componentium sollicitatæ determinatam quandam lineam curvam describunt, vi cujus peculiaris & specifica non tantum totius membranæ elasticæ, totiusque fibræ nerveæ, verum etiam quarumcunque minimarum fibrillarum elasticarum talis curva distractio & talis reciproca contractio exerceri debet; suspicari ergo si licet, hanc quoque curvam distractio-

nem

nem logarithmicæ, aut hyperbolicæ, aut generis hyperbolici esse futuram. Cum enim (ut supra indicatum est) variaz distantiaz a centro corporis odorati accepta ut asymptoton crescentes in ratione arithmetica habeant vires, momenta ac densitates effluviarum reciproce decrescen-tes in ratione geometrica; nempe reciproce, ut quadrata distantiarum a centro corporis, quæ designantur a transversis paral-lelis ductis a quibuscunque punctis distan-tiarum a centro corporis odoriferi, & ab extremitatibus omnibus harum linearum in-telligatur ducta quædam linea; hæc linea futura erit curva, quæ ad logarithmicam, aut ad hyperbolicam lineam pertinere vide-bitur; sic probabiliter concipi ac fieri po-est, membranam nervi olfactorii oblique tactam ac impulsam a viribus, momentis ac densitatibus effluviarum geometricè de-crescentibus, juxta rationes reciprocas di-stantiarum a centro corporis odoriferi ari-thmetice crescentium incurvari ac inflecti taliter debere, ut membrana sese disponat ad lineam quandam curvam logarithmicæ, aut hyperbolicæ, aut generi hyperbolico similem describendam; verum cum hu-jusmodi curvæ adeo minimæ sint, ut a tan-gentibus sere non differant, si a nobis vi-deri potuissent, facis mihi est hæc probabi-li-ter inquisisse, ut tantummodo innotescat, a quantis minimis membranarum ac ner-veorum filamentorum motuum differentiis tot eminentes animæ sensationes, (tam minimas motuum, ac figurarum differen-tias usu ac habitu facto sentientis, & per-cipientis) continuo exercentur. Membra-na itaque nervea oblique impulsæ ac den-sitatibus geometricè decrescen-ibus, determi-natam curvam distractionem patitur; post-modum vero naturali nisu elastico contra-ctionis restituitur. Cum autem tales mo-tus elastici distractionis & contractionis com-ponantur ex rationibus momentorum cor-poris odori impellentis, longitudine fibril-larum & reciproca crassitierum earundem; hi motus cum tali determinata curva agen-tes, taliter sollicitando piam matrem, qua fibræ nerveæ odoratus undequaque vestiun-tur, & ab hoc eminenti consensu commu-nicata sollicitatione correspondentibus fibris cerebri ab eadem membrana circumseptis specificam rationem, actionem, sensationem videlicet organi odoratus componere proba-biliter videbuntur, a quibus motuum diffe-rentiis anima excitata rationes odorum sen-

tire ac judicare teneatur. Quotiescunque autem filamenta membranosa ac nervea or-gani odoratus, aut paralytica fuerint, aut convulsa, aut gravata succis heterogeneis, tunc eum horum tensiones præternaturales, aut nimium laxæ fuerint in paralyticis, aut nimium contractæ in convulsis, aut inæqualis magnitudinis, & crassitiei; ut in gravedine seu coryza ob succorum depo-sitorum impuritates, mehercle vitio organi effluvia corporis odorati cum non ea lege ac momento motus ac percussione, ut su-pra exposuimus, proportionali, apte urge-re possint ac sollicitare odoratus organum; cumque fibræ organicæ præternaturales non eum naturalem parallelismum servant inter se, nec non naturalem angulorum æquali-tatem, odoratus actio aut depravata fiet, aut immiuta, aut nulla; sic aliquando etiam hæc vitia contingere consuecunt, cum aut glandularum obstructione, aut cum os cribriforme fluente nimis muco læsione, aut obstructione correptum fuerit, aut cum a materia quadam polyposa narium cavi-tates fuerint impeditæ.

39. Sensui odoratus affinis est jucunda sensatio gustus, quæ ea, quæ aut cum ci-bis, aut potionibus in stomachum ingerun-tur; aut amica, aut inimica, naturæ & stomacho ab anima judicantur. Sensationi autem gustus potissimum inservit lingua, cui quoque tota & palati & œsophagi pe-ripheria auxilio est; num autem lingua sit musculus, ut putavit Vvarthonus, ibi non quero, nec disputo; certum tamen est; sex musculorum paria linguam quaquaversus movere, ut multiplicibus linguæ motibus, innumerisque vocum ordinibus opportune inservirent. Philippus autem Verheyen cap. 17. suæ Anatomies nuper edocuit: *Superius lingue planum in plurimas areolas esse divisum a quibusdam sulcis seu fossulis valde inæqualibus, & in diversis subjectis admodum diversis. In dictis areolis seu fra-ctis, quæ sulcis istis circumscribuntur, notare licet potissimum tres colliculorum species, quarum primam constituunt glandule, quæ in parte antica lingue, semen sinapis magnitudine vix superant, & posteriora versus sensim augentur: in vivis pellucida sunt, humoreque salivali referta, quem pro lingue humectatione in ejus superficiem deponunt; secundo glandulis copiose interspersa sunt cor-pora quædam dura extremitatibus unguium avicularum non multum absimilia, quæ in lingue planum eminent, & modice incur-*

vata versus partem posteriorem sese inclinant; hæc corpora plerunque desinunt in simplicem cuspidem; nonnulla tamen reperiuntur bifida; tertio in superiori linguae plano etiam notantur corpora pene rotunda majoris ambitus, quam præcedentia, & non ita in cuspidem elevata; cedunt quoque illis tam numero, quam duritie; videntur autem hæc corpora facere ad sensationem gustus. Sed ante Verheyen celeberrimi viri Malpighius & Fracassatus in Epistolis ad immortalem Alphonsum Borrellum conscriptis prius ostenderant, linguam humanam suis papillulis, aut pyramidalibus, aut conicis esse elaboratam, quæ numerosiores in vivente, ac spiritu turgidæ observantur, racemoso invicem coalitu sese prodentes, potissimum facto agmine versus apicem linguae, minus vero cum ad inferiorem linguae partem declinaverint. Has autem papillulas, nerveas esse appendices anatomica autopsia satis evincit; hæc nerveæ papillæ cum ciborum masticatione, pressione, & affricu, adjuvante saliva e glandulis linguae & palati undequaque naturaliter expressa diversis motuum rationibus tangantur ac sollicitentur, affectionem gustus probabiliter excitant; gustus itaque affectio a ratione tactus nullo modo dissentire videtur. Hæc quamvis in genere veritati assentiri videantur, nihilominus apud plerosque constat, specificas gustus affectiones seu determinatos sapes a determinatis salium figuris papillas nerveas taliter sollicitantibus habendos esse; variaz sicquidem saporum species a variis salium configurationibus a plerisque Philosophis habitæ sunt; ut autem hanc rem experimento potius, quam ratione acquireret celeberrimus Gassendus e Democriti cineribus atomorum doctrinam excitaverat. Itaque hæc philosophatus est. (1) *Is non incongrue definiat, qui rotundas esse, congruæque mole atomos, quæ dulcem faciunt saporem; magna figura, quæ acerbum; multangula, minimeque orbiculari, quæ asperum; acuta conica incurva non tenui, non rotunda, quæ acutum; orbiculata, tenui angulata, incurva, quæ acrem; angulata, distorta, rurumque equalium, quæ salsum; rotunda, levi, distorta, pauca, quæ amarum; tenui, rotunda, parva, quæ pinguem &c.* Verum cum hujusmodi experimenta & figurarum salinarum observationes non ideo

certi referant, quo salina corpora tantummodo sapes referre judicentur; cum hi etiam a sulfure & varia miscela salium, sulfurum, aliorumque corporum haberi plerunque possint, propterea in tam ancipiti re contentus fuero generali ratiocinio suspicari, sapes promiscue a salium, sulfurum, aliorumque corporum superficiebus papillas nerveas sollicitantibus esse orituros. Ex hac generali idea, cur non liceat specificos sapes quærere a determinata salium, sulfurum, aliorumque corporum commixtione? Fateor quidem usque adhuc ignotum esse, qualis futura sit horum corporum specifica mixtio, ut specifici sapes vere habeantur; verisimilitudini tamen accedit, *Dulcem saporem* a ratione æqualitatis inter miscelam salis & bene concocli seu depurati sulfuris, aut ab aliquali sulfuris prædominio supra salis, aliorumque corporum momenta posse dimetiri; sic *Amarum* fortasse fiet, cum nullum sulfur; aut si sulfur adustum & acre cum majori ratione salis, aliorumque corporum, quibus omnibus inest inæqualis & aspera superficies, mixtionem effecerit; *Insiduum* vero, cum crudo sale & sulfure compositum fuerit compositum fuerit corpus; aut si cum majori aquæ portione minima salis & sulfuris quantitas miscelam fecerit; *Acerbum verum aut Austrium* a crudo sulfur & sale cujus octaedrica, aut parallepipeda rhomboidea fuerit superficies, videtur esse elaborandum. Ex varia itaque mixtione corporum inter se varii, ceterique emergent sapes, ea videlicet ratione homologa: qua ex diversis linearum luminis densitatibus, una cum variis refractionum gradibus varios colores oriri experimur; hæc enim corpora invicem commixta, & salivali humore opportune dissoluta papillas nerveas sollicitando in ratione composita ex numero salium, sulfurum, aliorumque corporum, momento eorundem, & ratione salivæ, qua universa hæc corpora penetrantur, & madefiunt, papillis taliter inflexis, aut incurvatis diversas in lingua saporum rationes asferre consuecunt. Ab hisce papillarum motibus communicata sensui communi seu piz matri, quæ & linguae papillas & fibras medullares cerebri consentientibus fibris investit, opportuna & specifica fibrarum medullarium sollicitatione varii

Vicia
gustus.

(1) Fracassatus pag. 194. de lingua.

Varij saporēs animæ offeruntur sentiendi, & judicandi.

40. Impuro itaque sanguine, si plurima corpora in glandulis linguæ deponantur, quæ excretoria harum oscula obstruat, mercede saliva impedita arescent linguæ filamenta, & nervæ papillæ arescentes non ea facilitate moveri, inflecti & incurvari poterunt, qua in naturalibus saporibus opportune deserendis fieri debuisset; saporibus itaque aut imminutis, aut oblitteratis ægri de nausea, cibi fastidio, consentiente etiam stomachi membrana, ut in febribus familiare est, molestissime conqueruntur: sæpissime biliosis particulis lympham, & sanguinem plus justo decurrentibus, si in hæc vascula & glandulas salivales hæc biliosæ particulæ evomantur, ab acri, & aspera biliosorum corporum superficie sollicitatis moleste nerveis papillis sapor amarus ingravescit; sæpe ab acri, & caustico sale salivæ irritata & paulatim erosa linguæ filamenta, fistulæ, ulcera & scissuræ superveniunt, & aliquando a venefica vitriolici corporis metastasi canceri linguam horride lacerant. Notum jam est, saliva muriaticis salibus repleta ob papillarum nervearum peculiarem sollicitationem, aut ariditatem earundem sitire animalia graviter debere; probat autopsia, plurimas sordes humorum per linguæ glandulas separari; cum pluribus in morbis crustæ diversæ indolis, ex varia humorum præternaturalium hypostasi supervenire videantur. Mira quidem linguæ indoles, quæ non tantum conceptus animi voce & sono exprimit; verum etiam bonas, & malas corporis affectiones affabre indicare apta est; unde Hippocrates in quibuscunque morbis acquirendis, aut judicandis jure merito observandam esse docuerat.

41. Immortalis animæ dignitas hoc exigere supra modum visa est, ut quatuor sensoris in capitis regione prout digniori animæ sede exercendis dotaretur; uno tantum sensu tactus superfluit, qui tot animali communis undequaque exerceri posset. Immortalis Malpigijs, qui hanc rem de externo tactus organo anatomice agitaverat, certiores nos fecerat, pyramidales papillas e nervoso ac reticulari corpori progenitas per universam cutim effusas, & e cuticula erumpentes tactus organum esse futuras. Hisce autem pyramidalibus papillis adstant undequaque per totam cutis superficiem glandulæ miliares, a quibus lym-

pha & sudor erumpere consuevit, non tantum communi utilitati naturæ, verum etiam ne papillæ pyramidales vitio tactus arescerent. Monendum autem, affectionem tactus aliquibus in partibus acutiorem esse, aliquibus vero obtusiorē fuisse, determinata lege sensus a majori, aut minori numero papillarum pyramidalium e cuticula erumpentium, quarum opera corpora calida & frigida; solida & fluida: dura & mollia &c. dignosci potuissent; ex vario siquidem objectorum momento varia exercetur papillarum curvitas, varia flexio, variusque inclinationis gradus, quæ rationes motuum per membranas papillas invadentes communicatæ consensu fibrarum medullaribus cerebri fibrillis, motibus æqualibus, aut proportionalibus sollicitant animam, ipsique compenetratam homologue urgent & excitant, quibus objecta sollicitantiæ sentire & judicare anima teneatur. Non diu itaque laborandum esse, cum vitia tactus habere voluerimus, offusis enim in miliares cutis glandulas fluidis, aut acri, aut muriatico sale & adusto sulfure repletis, molestie irritantur extimæ cutis & cuticulæ fibrillæ. Hinc ex balsamici sulfuris defectu graves pruritus, cutis asperitates, turpes pustulæ, & guttæ rosaceæ emergunt. Ulterius ex vitriolici, aut aluminosi salis additamento, & juxta majorem salis falsi, acris & acidi ubertatem lepræ, & varicæ veneficæ serpigines ingravescunt; ex his a stagnatis humoribus obstructæ glandulæ miliares innumera cutis vitia generari videntur, inter quæ cutis nigredines & porrigines, ephelides & leutigines varii generis &c. Sed pejus omen esset, si paralyti afficiantur nervea illa filamenta, quæ ad extimam cutis superficiem delata papillas pyramidales mire texunt; enim vero nervæ hæc papillæ communicata sibi affectione paralytica cutim sine sensu reddunt; aut saltem stupidum, obtusum, & hebetem, quod majoris semper morbi omen esse plerunque experti sumus.

42. Cum plurima cutis vitia a fluidis non satis opportune, aut nimium transpiratis oriri frequentissime possint, ibi data loci opportunitate breviter de transpiratione nonnulla dicere æquum erit. Per poros itaque cutis transpirare animalia quælibet satis superque notum est; excernuntur enim per poros cutis continuo motu corpora cujuscunque generis, quæ per innumeram glandularum internarum familiam separari oppor-

tunc non potuerunt. Tanto operi præstat potissimum *Motus internus fluidorum*; secundo *aëris ambientis caliditas & rarefactio*; tertio *uberrima salium dissolventium quantitas, a qua fluida animalium sæpissime dissolvuntur*. Hac tria si opportuna ac debita ratione fiant, apte ac naturaliter transpirabit animal; cæterum iniqua transpiratio fiet, si hæc aut minus, aut magis operentur. Ad primum ergo quod attinet; *Motus internus fluidorum* a causis internis, sed potissimum externis excitatus calorem afferens transpirationem ultro promoveri consuevit. Cum enim calor sit ut impressiones particularum corporis calidi in quopiam objecto corpore calorem excipiente, quotiescunque sulfureæ particulæ ad statum volatilitatis evectæ fuerint, salinas quoque & fibrosa sanguinis filamenta violentissime agitant; cum vero agitationes seu impressiones particularum sulfurearum in cætera fluidorum corpora sint proxime in ratione composita ex duplicata velocitatum, & simpla densitatum particularum sulfurearum, manifestum est quantum exaltato supra modum sulfure universæ fluidorum particulæ agitari violentissime teneantur; ex violentissimo autem motu particularum omnium atteruntur corpora inter se, & fibrosa fluidorum filamenta scinduntur, & soliditas eorundem enervatur; sic rupta, attenuata & enervata corpora & citissimo motu agitata miliares glandulas quantitate majori undequaque replent, ut momento motus continuata, & adaucta proportionaliter velocitate fluidorum, uberrima transpiratione per poros seu per excretoria glandularum miliarium vasa, ut in febribus sæpissime evenit inauspicato egredi teneantur. Hac methodo plus justo transpirat animal; a qua violenta & uberrima transpiratione aliquando boni effectus, sæpissime mali enervata natura superveniunt: Si hæc ab excessu transpirationis quid a defectu timendum erit. Mehercule ex deficiente transpirationis opera ob densitates & vitriolicas, aut aluminosas corporum configurationes, aut ob cutis constipationem ictericiæ flavæ, aliquando nigrae, podagrae & innumerae cutis affectiones elaboratae vitia cutis parturient. Secundo prodest vehementer transpirationi *Calor externus*, quo aer rarefit, rarefactus enim non illud momentum pressionis exercet supra extrinsecam superficiem animalis; unde cutis animalium minus pressa ad majorem superficiem dilatata &

extensa sinit quoque miliares glandulas magis dilatari & extendi; cum autem miliares glandulae in eo statu minoris dilatationis, quo aer minus rarefactus majori momento premit, ad eum statum majoris dilatationis, quo aer magis rarefactus minori momento pressionem efficit, sint ut solida similia; hæc autem crescant in ratione triplicata suarum diametrorum; utique in glandulis dilatatis ab aëre magis rarefacto id spatium futurum erit continendis fluidis aprissimum in proxime triplicata ratione suarum diametrorum; quamobrem si diameter glandulae miliaris in statu minoris dilatationis fuerit ut 1. diameter vero ejusdem in statu majoris dilatationis fuerit ut 2. erit quantitas fluidi contenti in glandula minus dilatata, ad quantitatem fluidi contenti in glandula magis dilatata proxime ut 1. ad 8. Octupla itaque quantitas fluidi continenda proxime erit in glandula miliari, cum aëre magis rarefacto hæc futura fuerit in statu majoris dilatationis. Præter hæc cum sectiones excretoriæ pororum glandularum miliarum curis dilatentur & extendantur, & ipsæ in ratione duplicata suarum diametrorum, erit sectio pori, seu canalis excretorii glandulae dilatatae ut unum in aëre minus rarefacto, ad sectionem ejusdem pori dilatati ut 2. in aëre magis rarefacto ut 1. ad 4. quare quantitas fluidi lymphatici ut 8. contenta in glandula miliari in statu majori dilatationis transitura erit e sectione ut 4. canalis excretorii, seu pori ejusdem glandulae. En itaque cæteris paribus ab aëre vi caloris rarefacto, cujus opere proportionaliter rarefacta extenditur cutis superficies, major fluidi quantitas in glandulis miliaribus, & major fluidi exitus per magis apertas sectiones pororum seu analiculorum glandularum earundem; videlicet, en necessitas majoris transpirationis; sic æstivo tempore & in hypocaustis major sudor & transpiratio; hinc ex nimia lymphæ exeuntis, & transpirantis copia debilitas & languor; hæc tamen si cum consentia, & tolerantia animalium opportune fiant, secundæ res erunt; cæterum gravi naturæ fato futurum erit, si excessu transpirationis animalia deficere videantur; hæc quantumvis gravia sint, graviora tamen aliquando contingent, si excedens externi aeris frigiditas, aut nimia cutis densitas, transpirationis impeditæ vitium fecerint: etenim in adultis potissimum cutis densior facta & aeris frigiditas, variolas, morbillos

ios & peticulas facillime prohibent, ne liberiori transpirationis motu egrediantur; hinc stagnatis in cute humoribus sit prava particularum mixtio, quæ veneficos effectus afferens, ea trahit secum damna, quæ mortis periculo ut plurimum exolvuntur. Tertio transpirationis vitia affert *uberrima salium quantitas*; etenim in pluribus morbis, sed potissimum in hecticis fluidorum filamenta cum salinis plus justo particulis associata fuerint, deficiente balsamico sulfure, ab his in motu fluidorum circa proprium axem continuo rotantibus, asperis, inæqualibusque superficiebus, ægerrime lacerantur. Dissoluta autem & rupta filamenta sanguinis naturalis mixtionis vitio nullo aggere, nullo

vinculo serum frænant ac muniunt, quin summa libertate, tenuitate ac motu fluens copiosius & velocius in miliares glandulas, ab iis uberrima transpiratione per cutim exeat, sudores ægerrimos & molestissimos allaturum; hinc macies & tabes, languor & deliquia superveniunt. Hæc & plurima alia tum a defectu, cum ab excessu transpirationis cutis vitio evenire possunt incommoda, quæ toti animali communicata, fluida solida summo naturæ damno evertere poterunt. Hæc breviter de morborum solidorum motibus sufficiant, Mechanici tamen morborum Operis complemento proderit, si denique Mechanicam morborum desumptam a motu febrium, Deo juvante, ageremus.



MECHANICES
MORBORUM
PARS TERTIA,
DESUMPTA A MOTU FEBRIUM.

BENEVOLIS MEDICINÆ
TYRONIBUS.



Raxis Medica, quam quotidie profiteor, & febrium phenomena attentissime observata expositam febrium Theoriam, Lectores Benevoli, me docuerunt; ut autem facilius innotescant, quæ hic dicturi sumus, Tyrones primo monitos volui. Cum corpora elastica, & non elastica sint numero, pondere, superficie, motu, &c. seu momentis omnino diversa, hæcque in actione & reactione pro minima, & æquabili mixtione obtinenda inter se esse debeant, ut naturale æquilibrium massæ sanguinæ habeatur, & conservetur, placuit pro hypothesei arbitrari, summam momentorum corporum elasticorum æqualem esse summæ momentorum corporum non elasticorum; quia vero sanguinis constitutio non sinit eandem, ac præcisam servari diversorum elementorum componentium quantitatem; propterea (quantum in re tam obscura conjectari potest) jure arbitratum est, naturam ea lege hacque methodo partiri summam momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum, ut si momentum alicujus corporis elastici sit in aliqua ratione inæqualitatis ad momentum alterius corporis non elastici; ita reciproce tertium quoddam momentum corporis non elastici sit in eadem ratione specifica inæqualitatis ad quartum momentum corporis elastici alterius generis, & sic successive, &c. tali semper servato ordine, quo summæ momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum sint æquales inter se, quacunque proportionem momenta ipsa sint distributa in massa sanguinis. Secundo, ut aliter explicetur hypothesis, supponamus ex singulis massis elasticis simul sumptis fieri massam A, ex singulis vero massis non elasticis simul sumptis fieri massam B, quia ex hypothesei summa momentorum corporum elasticorum æqualis esse debet summæ momentorum corporum non elasticorum, erit ut massa A ad massam B, ita reciproce celeritas massæ B ad celeritatem massæ A; ex qua proportionem colligitur æqualitas præsupposita

posita momentorum elasticorum, & non elasticorum inter se. Tyrones itaque vel primo conceptu intelligant momenta corporum, vel secundo; semper momenta corporum elasticorum, & non elasticorum erunt in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis, quorum necessario opere nexus, unio æquabilis, & minima mixtio elementorum omnium in naturali statu haberi debuerunt. Hisce prænotatis, hanc *Februm Mechanicam* tres in partes dividendam esse censui; prima quidem *universales Februm anomalias*; secunda *intermittentium Februm causas, symptomata, legem & ordinem frigoris & caloris*; tertia vero *continuas Febres agit & querit*. En itaque completa *Mechanices Morborum desumptæ a Motu fluidorum, solidorum, & Februm Theoria*; superest, ut consilio potissimum celeberrimi professoris Alexandri Maccope, ne praxis quoque medica mechanico ratiocinio fraudetur, quartam partem *Mechanices Remediorum* superaddere curemus, quam totis viribus, Deo dante, exequi conabimur. *Valete.*

Cum quatuor illa sint, ex quibus compositum est, corpus, terra, ignis, aqua, aer, horum naturalis excessus defectusque, & ex proprio loco in alienum translatio, per quam, quod sibi conveniens est, non tenent, intestinam quandam seditionem, & morbos inferunt; quando enim præter naturam unumquodque sit, aut transfertur, calescunt utique, que non frigeant, arida madent, gravescunt levia, & cætera omnia similiter permutantur; solummodo vero idem aliquid sibi met secundum idem, atque similiter, & debita proportionem servatâ accedens, vel decedens, permittit se idem sibi ipsi sospes, integrumque manere, quod autem aberrat, sive decedendo mutationes varias, morbos, corruptiones infinitas inducit. Plato in Timæo.

DISSERTATIO PRIMA.

De Febris in genere.

TAndiu vivimus, quandiu movemur; tunc morimur, cum fluida & solida deficiente motu desinunt; tum sani vivimus, cum fluidorum & solidorum motus ordinati sunt, æquales & isochroni; tum maxime ægotamus, cum utrorumque motus inordinati sunt, inæquales & asymmetri; Hæc est idea sanitatis & ægritudinis; hæc vitæ & mortis origo, ac principium est. Cum num. 3. & seq. *Partis primæ Mechanices Morborum*, motum pressionis, ejusque phænomena satis consideravimus, a quo filamenta sanguinis continuo lasseruntur, minimatque in particulas quodammodo infinite parvas dividuntur, ut intimior, faciliior ac perfectior fiat earundem particulæ mixtio; æquum est, ex perfecta, ordinata & æquabili mixtione earundem naturalem temperiem, ac statum sanguinis; ex imperfecta vero, inordinata & inæqua-

bili earum mixtione præternaturalem intemperiem, febrilemque indolem massæ sanguinis habendam esse: ex variis nimirum mixtionum gradibus, ordinibus ac legibus emergere ex practicis phænomenis mihi visæ sunt universæ februm anomalie. Omissa itaque communi februm definitione, quam tot celeberrimi viri undequaque docuerunt aliter placuit definire, & definitione quidem, quæ mechanicæ legibus commodius satisfacere videatur.

2. *Febris ergo universaliter morbus, est motus asymmetr mixtionis elementorum massæ sanguinis cum inæquali aut dissimili excessu, vel defectu proportionalis velocitatis fluidorum & solidorum.* Cum in corporibus quibuscunque tum naturalibus, cum artificialibus ex determinata proportionem mixtionum elementorum componentium diversæ fiant superficies, diversæ figuræ, diversi colores, diversi motus, & diversæ vires naturæ componentium proportionales; divini enim Platonis testimonio in Thæreto enunciatum est *ex latione, motuque, & alterna commixtione fiunt omnia, que esse dicimus*; ita quidem æqua temperies & naturalis

Febris definitio.

ralis constitutio sanguinis ab ordine, & determinata lege mixtionem corporum componentium unitate naturæ habenda erit. Verum quamvis manifesta videatur lex determinatæ mixtionis in naturali massa sanguinis, adhuc tamen querenda esset specifica proportio corporum miscibilium, ut naturalis temperies & naturalis constitutio sanguinis habeatur, & conservetur. Enimvero cum elementa massam sanguinis componentia sint inter se diversa mole, figura, superficie, pondere, motu ac numero, certe horum momenta inæqualia actiones & reactiones semper ederent inæquales & asymmetras cum directionibus eorundem inæqualibus & inordinatis, quæ non nexum & unionem sanguinei compositi tantis naturæ actionibus necessarium conciliarent, & sustinerent, sed laxitatem, & dissolutionem. Hinc pro æqua unitate compositi ex geometricis & mechanicis legibus statuendum, corpora, quæ *elastica sunt & actiosa, motuque velociore prædita*, numero, mole ac pondere proportionaliter minora esse; corpora vero, quæ *inertia sunt & non elastica, motuque tardiore donata*, mole, pondere ac numero proportionaliter esse majora. Ita sane *facta ratione reciproca, aut quasi reciproca* momentorum corporum componentium velociora & elastica cohibentur & frænantur ab inertibus, tardioribus & gravioribus; & vicissim inertia, graviora & tardiora a velocioribus & elasticis communicatione massarum & virtutum *reciproca, aut quasi reciproca* adjuvantur. Id sane juvabit unice, ut in æqualitate momentorum actiones & reactiones corporum sint ordinatæ, æquabiles & unimodæ cum regulari lege, ac ordine directionum unitatem ac complexum sanguinei compositi unitate naturæ sustententium & conservantium; consilio autem addidi, aut *quasi reciproca*, cum fatear, momenta corporum miscibilium non semper perfectissime in ratione reciproca futura esse inter se, ut omnino inter se æquipollerant; tunc enim geometrica & perfectissima sanguinis temperies & constitutio haberetur; verum cum aliqualis excessus, aut defectus momenti alicujus corporis supra momenta aliorum non id vitii parere possit unitati compositi, ut compositum notabiliter evertat, ideo momenta corporum in statu æqualitatis, aut æquipollentiæ consideranda erunt inter se, quamvis ratio reciproca momentorum non tam rigorosa habeatur; ob aliqualem itaque ex-

cessum, aut defectum momenti alicujus corporis supra rationem reciprocam reliquorum momentorum dici potest in aliquibus servata unitate compositi sanguinei temperies serosa, in aliquibus temperies ac constitutio &c. sed de hac re satis. Certum est, hanc necessariam rationem reciprocam momentorum particularum sanguinis pro necessaria, ac naturali unitate compositi haberi perfecte nullo modo posse, nisi prius perfectissime elementa inter se misceantur; tantæ enim mixtionis opera sunt intimi contactus, intimi occurfus, intimæ & æquabiles actiones, & reactiones eorundem, quorum magisterio particulæ componentes ad dimensiones inter se homologas paulatim redactæ momenta elementorum reddunt inter se reciproce, aut quasi reciproce proportionalia. Cæterum si vitio perfectissimæ mixtionis hæc deficient, contactus & occurfus corporum erunt inter se inordinati, inæquales & asymmetri, actiones & reactiones inordinatæ, inæquales & asymmetræ, & momenta elementorum componentium enervata naturali unitate compositi sanguinei, inordinata fient, inæqualia & asymmetra, quæ omnia evenire in febribus verisimile est. Quamvis autem in febribus particulæ sanguinis plerumque præter legem velocires esse soleant, attamen cum aliquando accidat etiam præter legem tardiores esse, consultum fuit *excessum, aut defectum proportionalis velocitatis* accuratissime adnotare. Sanguis enim in febribus non semper peccat velocitate, sed etiam tarditate; proinde cum velocitas & tarditas supra aut infra naturæ leges extiterint, semper febrile vitium consequi necesse erit. Denique cum perfectissimæ mixtionis elementorum, & æqualitati momentorum massæ sanguinis pro sit necessario *æquabilis motus, & oscillatio organorum*, idcirco cum inæqualis fuerit, inordinatus & asymmetrius motus solidorum, jure mixtionem corporum, actiones & reactiones, & momenta eorundem elementorum massæ sanguinis inæqualia erunt, inordinata & asymmetra febres factura. Ex his brevitatis & claritatis gratia prænotandum est, nos *intimam, minutissimam, perfectissimamque mixtionem elementorum massæ sanguinis, quorum beneficio sunt actiones & reactiones æquabiles corporum inter se, eorumque momenta existentia in ratione reciproca debito æquilibrio, aut quasi æquilibrio inter se æquipollent, apta unitate compositi sanguinei, æquilibrio mixtionis*

nis masse sanguineae imposterum esse appellaturos,

3. Definitione febrium breviter exposita, decursu enim orationis ultro constabit; ordo exigit febres dividere, divisione tamen simplici in *Intermittentes* & *Continuas*. De *Intermittentibus* autem in secunda; de *continuis* in tertia dissertatione agendum erit: interim ut generales febrium affectiones, & anomalias accuratiori examine inquira-
mus, juvat hic primo expendere *momenta* & *vires corporum elasticorum*, & *non elasticorum inter se*; secundo *proportiones eorundem respectu feri, in quo innatant*; tertio *proportiones feri, reliquorumque elementorum respective ad vasa continentia*, & *nervos vasa circumscribentes*. Elementa itaque *actuosa seu elastica* massam sanguinis componentia jure dici possunt *particulae sulfureae*, quas elasticas pluribus in locis de principio sulfureo ostendit celeberrimus Gulielmus; *particulae aeree*, quas in sanguine observaverat Boyleus; & *globuli plano ovals* Levvenhockio observante; & quaecunque alia elastica, si quae sint, minoris tamen momenti. Elementa vero *inertia seu non elastica* massam sanguinis componentia numeramus *salia cujuscuque generis*; particulas *aqueas*, seu *serosas*, cum tam aqua, quam serum ejusdem sint indolis; cum vero aqua communis ab experimentis celeberrimae Academiae Florentinae nullatenus elastica experta sit, ob id *serosas* sanguinis particulas non elasticas esse firmiter putandum est: *terreae quoque damnatae*, si quae sint in massa sanguinis, *inertia* & non elastica elementa habendae erunt. Cum superius indicatum sit, momenta corporum elasticorum in naturali temperie massae sanguinis futura esse in ratione reciproca, aut quasi reciproca cum momentis corporum non elasticorum; cumque momenta corporum sint ut rectangula composita ex massis horum ductis in suas velocitates, erunt massae corporum elasticorum ad massas corporum non elasticorum ut reciproce sunt velocitates horum ad velocitates illorum. Hec quidem proportio unionem & nexum fluidorum sustinet: haec aequabilem solidorum oscillationem promovet; praeter cetera beneficia vires vitae corporum elasticorum, & solidorum oscillationes id praestant, ut minimi canales ab aqua elasticitate fluidorum circulantium, & ab aequabili oscillatione solidorum aperti consistant: hinc sanguis ab arteriis in venas, & cetera fluida

ab uno canali in alium facile transeunt. Ob id in senibus facile solida impedita arescunt & pigrescunt, & fluida lentescunt, cum in his vires elasticae fluidorum inertes sint, & solida aegre oscillent. Itaque vel externi, vel interni, vel mixti agentis vitio corpora primo astuosa & elastica non eam rationem habeant reciprocam cum corporibus inertibus; sed elastica corpora habeant rationem majoris inaequalitatis respectu ad corpora inertia seu non elastica. Cum corpora elastica in hoc statu suos habeant gradus velocitatis numero eorundem proportionales, erunt quoque velocitates corporum elasticorum in multo majori ratione majoris inaequalitatis respectu corporum non elasticorum: cum vero momenta corporum elasticorum, ceteris paribus multo majora supponantur momentis corporum non elasticorum, haec multo majorem impetum efficient in corpora inertia, quam ut opportuna ratione ista illis possint resistere; cum ergo nulla fieri possit aequa & opportuna actio & reactio corporum elasticorum & non elasticorum, nulla quidem fiet naturalis & aequabilis mixtio eorundem in sero sanguinis; deperdito autem mixtionis aequilibrio excessu corporum elasticorum febres continuae erunt oriturae, Quod si corpora elastica minorem rationem habeant respectu corporum inertium, multo minor quoque in data ratione futura erit velocitas corporum elasticorum, quid ergo? ex defectu velocitatis horum gravior eveniet inertia corporum non elasticorum, major sequetur contactus corporum inertium inter se, & gravius horum pondus ac momentum erit futurum. Verum cum ex majori contactu corporum inertium, horum superficies augeantur in ratione duplicata, & horum moles ac pondera in ratione triplicata laterum homologorum; haec inertia corpora & superficie & mole tam adaucta impediunt viam, transitumque liberum serosis potissimum, elasticisque corporibus, ut aegre, aut imperfecte misceri inter se possint: taliter affecta massa sanguinis lentior jure fiet, densior ac ponderosior; quinimo adauctis hoc gravi onere salium momentis, falsa corpora angulis, quibus circumscribuntur, membranas vasorum, ceterasque membranosas superficies, per quas undequaque excurrunt, sollicitabunt, molestoque stimulo rigores, horripilationes, ceteraque frigoris sensationis phaenomena efficient, ut in febribus inter-

mit-

mittentibus passim experimur, de quibus suo loco dicemus.

4. Non tantum necessaria est proportio reciproca momentorum corporum elasticorum & non elasticorum inter se; verum cum in naturali temperie massa sanguinis observante Boyleo serum ad partes consistentes esse debeat in ratione tripla, aut quasi tripla, videlicet ut 3. ad unum, hæc semper ratio majoris inæqualitatis partis fluidæ ad partes consistentes reliquorum corporum admittenda erit, quæ est inter 3. ad 1. Si itaque solida, & consistentia corpora excedant excessu $\frac{1}{2}$, tunc ratio feri ad consistentia corpora erit 3. tu ad $1 + \frac{1}{2}$; si vero deficient defectu $\frac{1}{2}$ erit quoque ratio feri ad corpora consistentia ut 3 ad $\frac{1}{2}$: Cum autem ratio feri ad elementa quælibet consistentia ac solida esse naturaliter debeat, quam proxime ut 3. ad 1. certe tam in supposito excessu, quam in defectu mutabitur determinata & naturalis ratio majoris inæqualitatis, quæ est inter 3. ad 1. quod sane grave vitium erit, si diu perduraverit. Vitio enim excessus corporum solidorum seu consistentium in fluido sanguineo majori numero permiscetur solida corpora cum fluido, quam exigunt vires fluidi sustentis: Cum enim corpora innatantia in fluido sustineantur suspensa opera suarum superficierum; quæ augmento corporum similium cum crescant in ratione duplicata laterum homologorum, horum autem moles crescant in ratione triplicata laterum eorundem; & hæc sint ponderibus proportionales, manifestum est, ex majori contactu solidorum corporum inter se in fluido sanguineo plus augeri moles & pondera, quam superficies, a quibus superficiibus tantummodo sustineri commodius possunt; adauctis ergo molibus & ponderibus corporum solidorum supra eorundem superficies non apte ac facile sustineri, moveri ac trajici undequaque possunt in sero sanguineo, ut solida cum liquidis perfectissima ratione misceantur. Si vero plus deficient solida corpora, quam par est, hæc nimis sejuncta inter se excessu fluidi interpositi directiones motuum acquirunt naturalibus directionibus asymmetras: & sane cum massa sint ponderibus proportionales, erit massa feri cum quantitate corporum soli-

dorum $\frac{1}{2}$ specificè levior massa illa feri cum quantitate naturali corporum solidorum ut 1. hinc massa feri cum quantitate corporum solidorum $\frac{1}{2}$ rarior erit massa illa feri cum quantitate corporum solidorum ut unum; ideo massa feri continens corpora solida ut $\frac{1}{2}$ cum sit rarior altera, transibunt contenta solida per grandiores areas seu porositates feri sanguinei absque occurso debitarum resistentiarum; cum vero rarius, leviusque serum non ea virium proportionè resistat momentis corporum elasticorum, & non elasticorum, quantumvis numero minorum, elastica quidem corpora & non elastica per vias ac directiones itura erunt non sibi naturaliter homologas velocitatibus, nullatenus æquilibrium massæ sanguinis proportionalibus. Pariformiter vitia mixtionis in sanguine facile occurrunt ab excessu feri, aut defectu ejusdem: cum serum naturaliter esse debeat in ratione tripla, aut quasi tripla respectivè ad solida & consistentia corpora; si serum excedat, aut deficiat, æquilibrium mixtionis everti necesse est; sero enim adaucto, cum hoc sit notabiliter gravius aqua communi, ut *num. 16. primæ Partis* dimensi sumus, non legem pressioem affert vasis continentibus; hæc autem nimis undequaque distracta, ac violenter ad majorem superficiem extensa ab adaucto momento distractionis fibrarum impediunt æquali tempore homologum momentum contractionis earundem; cum autem ex momento distractionis fibrarum canales investientium, & ex homologo momento contractionis earum temporibus æqualibus adjuvetur magnopere necessarium opus æquabilis mixtionis solidorum corporum cum fluidis, sero quidem nimis adaucto, & adauctis pariter feri viribus in reliqua corpora debitum mixtionis opus impediri necesse erit. Si autem deficiat serum infra leges naturalis quantitatis, fluido quidem imminuto, minor fiet velocitas sanguinis, & solida corpora lentiori pede mota, majorique contactu adaucta, ut supra quoque demonstravimus, lentiori pede movebuntur; ex fluido itaque imminuto, & ex corporum solidorum lentescencia iners quidem fiet, & imperfecta mixtio corporum inter se, ut male fluida cum solidis permixta æquibrentur. Videantur quæ numeris 4.

5. & 14. primæ Patris adumbravimus, ne jam dicta hic inepte repetantur.

5. Elementorum sanguinis elasticorum & non elasticorum proportionibus ac momentis satis expensis, modo necessarium est pro febrium phaenomenis explicandis, rationes crassamenti sanguinei, sive filamentorum seri concretescibilis (filamenta enim seri concretescibilis, & crassamenti sanguinei sub eodem nomine usurpamus) paucis ultero expendere: Itaque præsupposita filamenti seu crassamenti sanguinei existentia, quam Boyleus & Levvenhockius satis superque experimentis docuerunt, & confirmarunt, juvat instituto nostro usurpare, quæ celeberrimus & immortalis famæ Jacobus Hermannus (1) paucis edocuit; fluida nempe alia esse *Homogenea*, alia vero *Heterogenea*. *Fluida Homogenea* seu uniformiter gravia ea dici possunt, quorum densitas, crassities & motus per universam massam uniformes sunt, & pondera ipsorum absoluta massis eorum proportionalia sunt. *Fluida vero Heterogenea*, seu disformiter gravia ea dici poterunt, quorum densitas, crassities & motus per universam fluidi massam non uniformes sunt, nec pondera fluidi massis proportionantur. In statu itaque naturali massa sanguinis, quod ad densitatem attinet, crassitiem, pondus & motum talis esse debet, ut densitas, crassities & pondus corporum componentium, & filamentorum, neque nimis comprimantur inter se, neque filamenta adeo tenuia sint, ut a necessaria pressione, ac pondere deficiant; sed talis mediæ densitatis, ac talis mediæ crassitiei, talisque mediæ ponderis esse debent elementa, & filamenta crassamenti sanguinei, ut pressionem efficiant momentis vasorum continentium, & momentis corporum contentorum proportionalem; ita enim servata opportuna unione, servatoque debito nexu ac contactu corporum fluidorum inter se, reciproca eorundem mixtio seu mixtionis æquilibrium sustinebitur. Deinde elementa & filamenta massæ sanguinis, cæteris paribus, uniformiter densa, uniformiter crassa ac gravia per universam sanguinis massam esse debuerunt, ne varia eorum pondera in diversis vasorum locis inæqualia vasorum momenta afferant, non levi vitio æquilibrii mixtionum. Ulterius si filamenta retis in modum probabiliter elaborata judicentur, angulos necessario

Sydenham Opera Med. Tom. II.

describent modo majores, modo minores, dum a majoribus sectionibus vasorum transeunt in minores, & vicissim dum a minoribus in majores restituuntur. Hæ quidem angulorum mutationes esse debent sectionibus continentium vasorum, & momentis corporum contentorum proportionales. E contra ut inferioribus, nec non in sanguine arterioso ac venoso, sicut & in succo nervæ & lymphatico præternaturalibus evenit, si massa sanguinis quod ad densitatem pertinet, pondus & crassitiem elementorum & filamentorum fuerit heterogenea, inæqualis nempe, & dissimilis texturæ; tunc ratione majoris, aut minoris inæqualitatis, inæquales fient pressiones corporum elasticorum & non elasticorum, diversæ & inæquales pressiones in vasis continentibus, & inæqualia fient pondera cæteris paribus in diversis vasorum ramificationibus; variz proinde ac dissimiles fient in areis reticularibus angulorum inclinationes, dissimiles motus ac directiones eorundem; inæquales propterea ac dissimiles corporum elasticorum motus, ac mixtiones cum notabili ac continuo separandorum corporum vitio exorirentur.

6. Præstat modo ulteriora prosequi expendendo rationes seri, aliorumque corporum respective ad vasa continentia, ad fibras cujuscunque generis, musculares, nerveas & membranosas &c. quæ necessariae proportionales cum a Medicis plerumque negligi soleant, non leves in Theoria, & Medica praxi errores asserunt. Ut vero hæc tam necessaria facilius ac clarius ostendantur, nonnulla advertenda sunt, eo quia a solidis præternaturaliter motis, aut se moventibus sustineri potest ratio semper inæqualitatis inter momenta elementorum sanguinis & vasa continentia, aut inservientia, usque dum deperdita ratione reciproca elementorum elasticorum, & non elasticorum inter se, nec non ratione homologa fluidorum cum solidis, elementa sanguinis imperfecte aut ægre misceantur; a quibus consequuntur febres, aut hæc longiori tempore duraturæ sunt, cum pulsum inæqualitate & frequenti cordis palpitatione. Duas itaque ab immortalis famæ viro Nevvotono naturæ leges instituto meo opportunas amplector, quarum una est: *Corpus omne perdurare in statu suo quiescendi, vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a*

N n

viri

(1) Pag. 127. Phoronom.

viribus impressis cogitur statum suum mutare. Altera vero est: Mutationem motus semper esse proportionalem vi motivæ impressæ, ac fieri semper secundum rectam lineam, quæ vis illa imprimatur. Impellantur itaque a momento sinistri ventriculi cordis grana sanguinis $\frac{15}{11}$ quacunq[ue] systole per aortam descendentem (ut num. 28. primæ Partis indicavimus) hæc quidem sanguinis massa expulsa ire debuisset per legem primam uniformiter in directum per lineas tangentes circulem arteriam, nempe (in Figura 1.) per tangentem A D motu quodam seu vi centrifuga, aut centrifugæ analogæ; verum cum sectiones majores arteriæ paulatim minores fiant, sanguini per tangentem eunti in statu naturali resistantiam ferent in ratione perpendicularis B C ad perpendicularem D E &c. Cum autem vis centrifuga sanguinis impulsu continuo per circulares peripherias vasorum circumeat, & contra has continuo agat, nec vis deperdatur; hæc urgebit superficiem canalis versus quascunq[ue] tangentes seu versus tangentem A D. Cum vero canales compositi sint ex membranis, musculis & nerveis filamentis elastica seu oscillatoria vi donatis, cogentur post passam dilatationem sese ad priorem statum restituere. Itaque cum in statu naturali momenta dilatationis vasorum a vi sanguinis impellentis æqualia esse debeant momento restitutionis eorundem, futura erit vis dilatationis vasorum & vis centrifuga sanguinis impellentis æqualis restitutioni vasorum, seu vi centripetæ sanguinis restituti versus axem canalium; proinde cum momenta dilatationis vasorum & momenta constrictionis eorundem, viresque fluidorum centrifugæ & centripetæ, quæ a Mechanicis Centrales appellantur, esse naturaliter debeant in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis, constabit veritas secundæ legis, mutationem nempe motus fluidorum & vasorum versus centrum, seu versus axem restitutorum debere esse proportionalem vi motivæ antea impressæ a fluido canalem dilatante & canali dilatato. Porro cum motus massæ sanguinis fiat vi cordis impellentis, & vi seu momento constrictionis arteriarum, quarum vires non sunt oppositæ, sed tantummodo diversæ a motibus seu viribus massæ sanguinæ, hujusmodi

Vires conspirantes determinatum semper. & æqualem directionis angulum comprehendunt in statu naturali, cum versus axem canalium fluida impellantur. (1) Quamobrem ex motu cordis, vasorum & fluidorum æquabili, seu ex viribus centralibus æqualibus cum æqualibus pariter angulis directionum virium conspirantium, elementa sanguinis per superficies circulares vasorum continuo euntia undequaque similibus, & æqualibus impulsibus versus axem ejecta, in hoc quidem axe æqualitates angulorum occurrunt inter se, similibusque occursibus similiter fracta, & in partes infinite parvas quodammodo similiter comminuta proportionali semper velocitate, motu ac tempore movebuntur, momentisque minimarum particularum reciproce agentibus, hæc particulæ juxta opportunum mixtionis æquilibrium miscebuntur.

7. Modo ut ab universalibus naturæ legibus ad singularia descendamus, apertum est, vasa quælibet sanguifera ad conicam superficiem accedere membranis, musculis, nervisque undequaque munita, quorum fibræ aliæ rectæ sunt, aliæ quodammodo spirales, & circulares alteræ. Horum organorum opere vasa ex elasticorum corporum genere esse constat, quorum vi in statu naturali a momento distractionis & homologo momento contractionis æqualibus conatibus extendunt, & æqualibus viribus contrahunt sanguinem æqualiter expulsura: æqualitatem momentorum oriri putamus & velut spirales & circularibus fibris æquali ratione decrescenibus: cum enim singulæ fibræ rectæ mole, figura ac directione fuerint inter se æquales & parallelæ, cum effectus omnes sint causis suis adequatis proportionales, harum momenta distractionis, & contractionis elasticis suis viribus homologa, erunt inter se oscillationibus æqualibus æqualia. Similiter si hujusmodi spirales & circulares fibræ conice decrescenles fuerint mole, figura & directione similiter positæ, cum arcus quilibet sint facti ex angulis, aut similibus, aut æqualibus ductis in radios similes, aut æquales, harum fibrarum elasticarum seu oscillantium momenta distractionis, & contractionis in eadem ratione similitudinis aut æqualitatis erunt futura; si ergo fibræ rectæ non unimoda lege operentur, sed aliquæ tantummodo

(1) Ex Vvolho pag. 359.

modo agant, reliquæ vero aut inertes sint, aut læsæ, ineptæ quidem erunt actionibus naturalibus; cum vero motus vasorum sint directe ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut impediētes, erunt momenta distractionis & contractionis vasorum omnimode inæqualia; cumque anguli directionum particularum sanguinis inæquales fiant ac dissimiles ob vires conspirantes dissimiles, & inæquales, opus proinde mixtionis inæquale erit, inordinatum & asymmetrum. Ita si spirales fibræ vasorum non ea lege describant spatia proportionalia circulis ab ipsis spirarum numeris denominatis (ex Archimede de Spiralibus, sed dissimilia fuerint inter se inepte multum vasa contrahentur, & inepte distraherentur; ita læso mixtionis æquilibrio elementa sanguinis vitiose miscebuntur. Verum ad pejora rueret æquilibrium mixtionis, si circulares fibræ fuerint mole, figura & directione dissimiliter positæ, aut vitio naturæ, aut asymmetro motu nervorum vasa ambientium; aut muscutorum, aliorumque viscerum inæqualiter prementium; cum enim arcus circulorum sint facti ex angulis ductis in radios eorundem, quoties arcus fuerint dissimiles inter se, futuri quoque erunt aut anguli, aut radii eorundem, aut anguli simul & radii inter se dissimiles & inæquales; cum autem momentum contractionis vasorum fiat ex motu peripheriæ vasis versus axem, cum inæquales anguli fuerint uniti inæqualibus semidiamentris, momenta contractionis eorundem inæqualia & dissimilia futura jure erunt: inæquales inde fient impulsus in massam sanguinis cum inæqualibus directionum angulis, & elementa ejusdem massæ inæqualiter impulsæ inæquali mixtione deficient. Ulterius naturalia momenta distractionis, & homologa momenta contractionis temporibus æqualibus fieri necessario debent; proinde si tempora quibus fiunt momenta distractionis vasorum, fuerint æqualia temporibus, quibus fiunt momenta contractionis eorundem, cum tempus sit æquale spatio diviso per celeritatem, erunt spatia peripheriæ vasorum decursis in motu contractionis; hinc cum spatia decursa peripheriæ vasorum in motibus contractionis & distractionis fuerint æqualia, & spatia sint ex mechanicis proportionalia rectangulis sub celeritatibus, & temporibus, spatia quidem æqualia temporibus quoque æqualibus decurrentibus velocitatibus æqualibus;

quamobrem momenta contractionis peripheriæ vasorum æqualia urgebunt sanguinis massam versus axem canalium velocitatibus quoque æqualibus eo ferme gradu velocitatis, quo eadem massa sanguinis a corpore impulsæ vasa dilataverat: ex hisce motibus peripheriæ vasorum distractionis & contractionis æqualibus, quorum opera æqualiter impellitur massa sanguinis versus axem canalium, elementa sanguinis apte, opportune & æqualiter misceri conabuntur; hac in statu naturali evenient. Quod si momenta distractionis peripheriæ vasorum, & homologa momenta contractionis inæqualibus fiant temporibus, cum tempus sit æquale spatio per celeritatem diviso, erunt jure merito ex inæqualibus temporibus spatia decursa inæqualia, & celeritates pariter in motibus distractionis peripheriæ vasorum, & in motibus contractionis peripheriæ vasorum, & in motibus contractionis eorundem inæquales inter se: peripheriis itaque vasorum inæqualiter distractis, & inæqualiter contractis, inæquales fient istorum oscillationes, pulsus erunt inæquales, inordinati & asymmetri, pariterque impulsus in elementa sanguinis erunt inæquales, & miscela elementorum sanguinis inordinata erit, inæqualis & asymmetra.

8. Confert quoque naturali & æquabili mixtioni æqualitas texturæ internæ vasorum per universam istorum longitudinem; etenim si interni parietes vasorum fuerint unimode æquabiles, singulæ sectiones circulares habebunt æquales similesque semidiamentros, qui singuli cum convenient in puncto axis canalium, ibi æquabiliter urgebuntur homogenea elementa sanguinis ab æquabili momento contractionis vasorum per totam canalium longitudinem. Jam tandem in punctis axis excurrendo æqualibus temporibus æquabiliter impulsæ elementa sanguinis æquabiliter quoque misceri poterunt. E contra eveniet, si nimirum interni parietes vasorum alicubi fuerint aut callo, aut tuberculo, aut polypo aut ex convulsiva nervorum ambientium pressione inæquales; proinde radii vasorum inæquales erunt ac dissimiles circumferentiis eorundem, & sectiones decrescendo in ratione duplicata diametrorum inæqualium, elementa sanguinis contenta in naturali sectione non erunt æqualia elementis ejusdem contentis in eadem sectione præternaturaliter posita; quinimo cum radii vasorum sint ut peripheriæ eorundem, ex inæquali-

tate radiorum inæquales fient impulsus peripheriarum versus axem cum inæqualibus angulis directionum; elementa ergo sanguinis contenta in sectionibus naturalibus diversa ratione impulsus movebuntur, ac in sectionibus eisdem præternaturalibus cum diversa mixtionum proportionem; saltem per aliquam temporis differentiam. Verum dices, cum in aneurismate, varicibus, polypo, tuberculo &c. sectiones & motus oscillatorii vasorum sint inæquales in locis præternaturalibus, inordinati videlicet & asymmetri; ergo ibi semper fient imperfectæ, aut ægræ mixtiones elementorum, consequenter semper febres erunt futuræ. Verum placeat animadvertere, ut veræ & humorales febres fiant: imperfecta aut ægra mixtio elementorum sanguinis oriri potissimum debet ab improportionem præcipua elementorum sanguinis, vitio densitatis, crassitiei, ponderis & motus elementorum elasticorum & non elasticorum cum eversa naturali ratione reciproca eorundem inter se: deinde hæc vitia fieri debent per universam massam non in unico tantum, vel singulari loco, sed in omnibus eodemque fere tempore, ut supra adnotavimus, & inferius semper magis magisque constabit. Verum in aneurismate, in polypo, varicibus &c. quantumvis in singularibus hisce locis præternaturalibus fiant mixtiones imperfectæ & ægræ, tamen cum hæc contingant tantummodo in solis ubicationibus ac locis aneurismatis, polypi, aut tuberculi, non vero per universum vasorum & massæ sanguineæ spatium; proinde in massa sanguinis transacto loco læso rursus naturales restituentur mixtiones elementorum, & restituta ratione reciproca elementorum sanguini naturalis ejusdem temperies redimetur. Fateor quidem, vitia organica solidorum non parum conferre ut febres vitio elementorum sanguinis generatæ, diuturniores & contumaciores fiant; verum non id præstare possunt sola organorum vitia, ut febres veræ efficiantur (quamvis aliquando possit contingere) sed tantummodo apparentes; quid simile plerumque evenit primo ingressu chyli in sanguinem, quo tempore in sanis quoque corporibus fit celeritas pulsus major, gravedo quædam capitis, calor, quidam levis virium languor &c. cum enim primo ingressu chyli in massam sanguinis elementa heterogenea chyli non statim apte cum elementis sanguinis associari, uniri ac misceri in ratione reciproca elementorum

opportune possint, oriuntur plerumque exposita levia symptomata, quæ præternaturalem statum simulare videntur; verum tractu temporis chyli elementis opportune associatis, & commixtis, heterogeneisque corporibus per excretoria vascula separatis prima & naturalis sanguinis velocitas, virium robur, & capitis quies &c. faciliter restituantur; verum quia aliquando non tam facile restitui possunt, ideo redeundo ad vitia solidorum, cum frequentissime accidat in hypochondriacis, hystericis, convulsivis & paralyticis affectionibus filamenta nervea arteriis, & venis circumscripta variis in locis inæqualiter arteriarum, venarumque directiones incurvare & inflectere; nulli certe praxim medicam agenti dubium est, ex huiusmodi curvaturis, ex tot flexibus contrariis arteriarum & venarum, nervorum, vasorumque lymphaticorum auferri, aut saltem turbari naturale æquilibrium mixtionis; hoc autem ablato, aut turbato, sæpe sæpius arbitratus sum medicam praxim agens, non tantum vitio elementorum sanguinis, verum etiam vitio organorum febres lentissimas fieri, hæc diutissime perdurare; quandoquidem cum fluidum per rectas canalium directiones C D E F (Fig. 2.) ire naturaliter debeat, cum fibræ nerveæ convulsæ arterias, venasque & cætera vasa adeo inflecterent, ut a rectis directionibus transire cogerentur in directionibus transire cogerentur in directiones inflexas G A I H B K (Fig. 3.) constat plura incommoda transeunti sanguini evenire. Primo siquidem in punctis flexus contrarii A & B vasis potissimum stringunt, sectionem necessario efficient cæteris punctis minorem; cum vero massa sanguinis composita ex corporibus elasticis, & non elasticis transiens per sectionem minorem magis comprimatur ac densior jure fiat, & densitates corporum elasticorum viribus comprimentibus seu elasticitatibus eorum quamproxime proportionales, sint elatere corporum elasticorum magis compressorum in sectione præternaturali flexus contrarii A B fortior ac validior fiet elatere corporum elasticorum minus compressorum in sectione naturali L M: Hinc elementa sanguinis transientia per sectionem A B valde urgebunt canalem in punctis A & B flexus contrarii; cum vero nerveæ fistula contracta & convulsæ valide resistat dilatationi vasorum eorundem, ibi certe ob momentum nerveæ fistulæ comprimentis vas,

& mo-

& momentum corporum elasticorum sanguinis impellentium orietur in sectione A B, violenta actio & reactio solidi cum fluido; verum cum fluidi elementa violenter impulsæ directiones motuum acquirant præternaturales, inordinata quidem & asymmetra futura erit elementorum miscela. Secundo ex flexibus contrariis arteriarum, venarumque cum corpora elastica magis compressa fiant & densiora in punctis flexus contrarii, hinc ob adauctas vires violentæ compressionis, horum momenta majora reddentur, quam par est; quid ergo? ibi quidem moles corporum elasticorum & non elasticorum non reciproca ratione proportionales esse poterunt velocitatibus eorundem, proinde turbabitur in massa sanguinis mixtionis æquilibrium. Tercio, cum in statu naturali motus corporum in uno spatio vasorum esse debeat in ratione homologa cum motu corporum in alio spatio eorundem, & sic successive in ratione æqualitatis, cumque in quibuscunque punctis flexus contrarii moles corporum elasticorum, & non elasticorum fiant densiores, & horum momenta fortiora, non hæc fieri poterunt homologa cum cæteris corporibus decurrentibus per alia vasorum loca; turbabitur propterea homologa proportio motuum naturalium non levi damno æquilibrii mixtionis. Quarto, cum in punctis flexus contrarii sectiones vasorum fiant minores, cumque hic major fiat resistentia sanguini transeunti, hujus resistentia adveniienti sanguini impedimento erit; moles itaque massæ sanguinis magis magisque retro intumescens urgebit vasorum latera extrorsum supranaturales vasorum sectiones, mutatis naturalibus fibrarum angulis, mutatoque earundem naturali parallelismo. Cum vero contractiones naturales fibrarum elasticarum sint proportionales dilatationibus earum, cum dilatationes majores eveniant a mole majori massæ sanguineæ, moles autem major momentum proportionalis contractionis impediat, major quidem futura erit dilatatio vasorum, quam eorundem homologa contractio; si ergo in naturali mixtione elementorum sanguinis non solum esse debent reciproca actio momentorum elasticorum corporum & non elasticorum inter se; verum etiam esse debeat homologa actio momenti distractionis & momenti contractionis vasorum; oportebit opera nervorum convulsorum vasa stringentium in punctis flexus contrarii mixtionis natu-

ralis æquilibrium enervari, aut perdi. Hæc sunt potissima organorum vitia, quæ naturalem mixtionis legem evertere apta sunt, aut saltem gravi opere inserviunt, ut elementa sanguinis asymmetro motu mixta difficiliter ac tardius restituuntur ad eum mixtionis naturalis gradum, quo momenta elementorum sanguinis reciproca inter se mixtione æquibrentur. Ex his ineptum videtur, tam facile accusare sanguinem lentore, visciditate, densitate correptum; cum sæpissime hæc vitia ab inertia motus vasorum continentium, reliquorumque solidorum motui sanguinis inservientium habeantur; ab hisce quidem vitiis solidorum se moventium motibus asymmetris, inordinatis, inæqualibus, aut inertibus ac lentescentibus asymmetra fient mixtiones elementorum sanguinis; proinde ex lenta, densiori & crassiori reddita massa sanguinis *Febres ortas Organicas* appellabimus, quæ nisi a restituto solidorum æquilibrio constanti ratione redimuntur, & quas in *Hypochondriacis*, in *Hystericis*, in *Paralyticis*, cæterisque nervorum & solidorum affectionibus ac vitiis frequentissime experimur.

9. Ex his quæ usque adhuc exposita sunt colligendum est, sanitatem id petere, ut momenta elasticorum corporum & non elasticorum sint composita ex ratione reciproca mixtionis eorundem inter se, & momenta distractionis & contractionis arteriarum, venarum, reliquorumque vasorum & solidorum sint inter se in ratione homologa, ut actionibus & reactionibus solidorum cum fluidis inter se proportionalibus æquabiles, isochronæ & ordinatæ fiant mixtiones elementorum massam sanguinis componentium. Fateor quidem, hunc perfectissimum fluidorum, & solidorum statum, hanc perfectissimam elementorum mixtionem non tam facile ac prompte acquiri posse, sed paulatim & pedetentim; chylo enim, ut supra etiam indicavimus, ingresso sanguinem heterogeneis corporibus repleto, quorum momenta primo inæqualia, sunt & asymmetra, hæc tamen paulatim multiplici circulationum numero prius agitanda ac movenda sunt; per idem quoque tempus æquo & continuo motu separationis glandularum, apta ac opportuna corporum heterogeneorum attritione, & separatione per idonea loca, rursus depuranda sunt; ita quidem restituta æqualitate momentorum, hacque rursus æquilibrata, æquabili & isochrona mixtio-

mixtione necessarium mixtionis æquilibrium restituitur, & restitutum conservatur.

DISSERTATIO II.

De Febris Intermittentibus.

10 **E**Nervato ac abolito mixtionis elementorum sanguinis æquilibrium, vel accusari facile potest præpollentia corporum elasticorum, vel corporum non elasticorum, Salium potissimum vis præpollens: si corpora inertia mole, numero & motu præpollent, *Intermittentes* facile febres orituras putandum, de quibus in præsentī tractare aggredimur. Verum cum frigoris sensationes oriri primo soleant, quæ postquam desiverint, statutis temporibus redire consuecant, claritati rei agendæ consultum est; primo *ratione ac causa frigoris*; secundo *cur statutis temporibus redeant febriles accessus* probabiliore *ratione investigare*. Ad primum quod attinet, Verulamius de *Historia vite, & mortis* experimentis edoctus est, Nitrum esse tanquam *Aroma frigidum*; idque indicat sensus ipse; inter ea quæ novimus unicum est & solum, quod ea præstet. Verum cum Academia Florentina non a nitro tantum, sed potissimum a sale armoniaco, a sale muriatico fluida frigescere, in glaciem mutari pluries experta sit; quinimmo ab ipso spiritu vini multum fluida densari in glaciem, si alia superaddantur; jure credendum est a quibuscunque salium particulis; aut corporibus quibuscunque hisce analogis præpollentibus frigoris affectionem habendam esse; & sane cum salia quæcunque, aut his analogia corpora inertia & non elastica variis angulis rectis, aut acutis; aut obtusis, aut superficiebus hisce analogis terminata sint, quoties in massa sanguinis momenta salium fluentium habuerint rationem majoris inæqualitatis respective ad elastica corpora, & non apte inter se commixta sint, hæc in glandulas continuo deferuntur, & ab hisce ea vitiose methodo separabuntur (ut num. 11. primæ Partis innuimus.) Cum vero infinitus sit glandularum in membranis, musculis, carnibus tam externis, quam internis numerus, hic excedens salium separatorum numerus, tot

ac tanta partium filamenta, angulis, quibus circumscribuntur circa proprios axes continuo rotantibus stimulat, ea ratione motus, qua nitrosa potissimum, aut his analogia corpora sollicitare sensoria, aut frigoris sensationem inducerent, docuerat Verulamius. Membrarum itaque, musculorum ac carniū filamenta undequaque taliter sollicitata ac stimolata frigoris affectionem afferent. Hic tamen anxius non quero quinam sit *rigor*? quinam *horror*? quænam *refrigeratio*? cum hæc frigoris differentie non re, sed tantum gradu differant; hæc enim disputantibus Medicis libenter relinquimus.

11. Id tamen si arbitramur, commodum est credere, phænomena frigoris non tantum a determinata corporum non elasticorum, salium præcipue stimulantium, aut sollicitantium actione generari, verum etiam adjuvari potissimum ab imminutis momentis distractionum & contractionum fibrarum omnium: etenim cum salia corpora seu his analogæ superficies, ac plana seu anguli sollicitantes fibrarum poros undequaque occupent, aut repleant, filamenta membrarum, muscularum & carniū &c. fient densiora; cumque densitates sint ponderibus proportionales (1), eadem filamenta solidiorum fient graviora, minus proinde expedita ad distractionis & contractionis motum exequendum; oscillationes idcirco fibrarum fient lentæ, languidæ, aut nullæ. Ex his cum naturales fluidorum velocitates a fibris negligenter aut pigre oscillantibus non opportune promoveri possint, hæc fluida lentiora facta non eum circulationum numerum, non eum mixtionis motum absolvent necessario coloris gradui, æquisque naturæ operibus ac temporibus destinatum; ob id cum lentescunt fluidorum consuetudo, ac lex videtur, graviora corpora undequaque deponere, jure in glandulis viscerum impuritates, in pulmonum glandulis sæculenta corpora deponentur, ut inde ex fibrarum teutidiorum oscillantium interna, & ex lentescencia fluidorum, sæculumque hypostasi obstructions, interni tumores, anxietates, difficiles anhelitus, suffocationes, pulsus duri ac lenti, contracti sæpissime cum molestia tussis durante frigoris paroxysmo evenire consuecant. Hinc cum innumera eveniant in tota glandularum familia separatio-

(1) Ex Vvolvo pag. 363. Mechan.

zationis vitia, consulendum putavi studium operis celeberrimi Petri Antonii Michelotti *de separatione fluidorum in corpore animalium*; hoc enim duce adepta æquæ separationis methodo, vitiosæ glandularum separationes clarius innotescunt.

12. Quid plura? Exposuimus num. 6. massam naturalem sanguinis præter mediam crassitiem, densitatem ac pondus filamentorum hanc in arteriis a majori sectione in minores transire, & a continuo momento distractionis & contractionis canalium continentium continuos impetus excipere, quorum opera reticulares areæ filamentorum conantur esse in continua mutatione angulorum, sicut propterea reticulares anguli modo majores, cum arteria dilatatur, modo minores, cum arteria constringitur: similiter corpora quæcunque elastica contenta in massa sanguinis, nec non in lymphatico, nerveoque succo stringentur magis inter se & comprimuntur, cum arteriæ a momento contractionis contrahuntur, & a majoribus sectionibus in minores transeunt, e contra vero rarefient & dilatabuntur hæc, cum a minoribus sectionibus in majores transeunt; & a momento distractionis dilatantur & extenduntur arteriæ. Itaque si momentum constrictionis arteriarum ita fuerit proportionale compressioni corporum elasticorum, ut ita sit contractio arteriarum ad compressionem corporum elasticorum; ut momentum dilatationis arteriarum est ad dilatationem corporum elasticorum, & permutando ita sit momentum constrictionis arteriarum ad momentum dilatationis earundem, ut est contractio seu compressio corporum elasticorum ad dilatationem seu rarefactionem eorundem; tunc cum filamenta massæ sanguineæ sint semper in proportionali aut simili mutatione angulorum, utique filamenta massæ sanguinis eundem gradum, eandemque mensuram densitatis, crassitiei, ponderis ac motus naturali temperiei sanguinis homologam sustinebunt; hoc in statu motus systolis & diastolis cordis & arteriarum erunt motibus massæ sanguineæ æquabiliter proportionales; pulsus erunt æquabiles, ordinati & isochroni ab elasticis hisce viribus corporum elasticorum, proportionalibus elasticis oscillationibus canalium, minima horum oscula aperta, & ætiosa conservantur, & filamenta sanguinis & reliqua corpora inertia prompte ac facile ab arteriis in venas regulari communicatione trajiciun-

tur. Cæterum si momentum contractionis arteriarum non fuerit proportionale, ac simile contractioni corporum elasticorum, & vicissim momentum dilatationis arteriarum non fuerit simile dilatationi corporum elasticorum, & permutando momentum constrictionis arteriarum non sit proportionale momento dilatationis eorundem: pariterque contractio, seu compressio corporum elasticorum non sit homologa dilatationi seu rarefactioni corporum elasticorum eorundem; tunc cum effectus semper sint suis causis adæquatis proportionales, arguendum erit, filamenta & reliqua corpora inertia seu non elastica, componentia temperiem ac constitutionem massæ sanguinis inæqualibus ac dissimilibus densitatis, crassitiei, ponderis & motus gradibus esse affecta, ut quæcunque temporis differentia fieri semper debeant inæquales ac dissimiles motus, & mutationes angulorum in areis reticularibus; quo in statu filamenta sanguinis, & reliqua corpora inertia, quod attinet ad densitatem, crassitiem, pondus ac motum efficient motus systolis, & diastolis cordis & arteriarum motibus massæ sanguineæ dissimiles & improporcionales; dissimiles pariter sicut pulsuum distractiones & contractiones, quinimmo aliquando sicut pulsus duri, contracti ac lenti. Ulterius si obstructis potissimum mesenterii & omenti glandulis sanguini per meseraicas venas ab intestinis ad hepar ascendenti (ut scienter animadvertit immortalis famæ Professor Morgagnus pag. 3. *Advers. Anat.* 3.) non opportuna ac debita ratione ac numero misceantur oleosæ & balsamicæ particule, procul dubio hæc impedita bilis separatione aut enervata in hepate, massam sanguinis & lympham densiorem, crassioremque reddent; a densitatibus itaque & crassitiebus elementorum feri & crassamenti sanguinei minima canalium oscula, nec non glandularum omenti & mesenterii obstruentur, & impedita ab arteriis in venas circulatione obstructions, & reliquæ præternaturales hypostases enascentur. Ex his fibrosum sanguinis crassamentum, quod continuo ex chyli elementis ac filamentis enutritur, elaboratur & crescit, si ex chyli densioris consortio densius fiat, crassius ac ponderosius, areæ reticulares crassamenti sanguinei minora certe spatia circumscribent, juxta rationem adauctam crassitiei ac densitatum filamentorum circumscribentium, & rationem adauctam corporum inertium, quo-

quorum omnium momenta habent hic rationem majoris inaequalitatis respective ad momenta corporum elasticorum per aliquam saltem temporis differentiam. Proinde elastica corpora contenta stringentur nimis ac comprimuntur: immo cum serum & seri portio concretescibilis circumscribant undequaque elementa sanguinis, hæc & a sero parte concretescibili stringentur & comprimuntur magis magisque elastica corpora; itaque cum aræ reticulares in statu naturalis dilatationis, & alia quælibet spatia, per quæ globuli plano-ovales, & alio corpora elastica observantibus Boyleo & Leewenhockio excurrunt, ad eadem spatia & areas in statu præternaturalis constrictionis sint, ut figuræ similes inter se, hæc autem decreascent in ratione duplicata suorum diametrorum; utique si spatium aræ in statu naturalis dilatationis fuerit ut 1. decreascent spatium aræ ejusdem in statu præternaturalis constrictionis futurum erit $\frac{1}{4}$; Si ergo in spatio naturalis dilatationis aræ reticularis ut 1. contineantur 8. corpora elastica, in spatio ejusdem aræ præternaturaliter constricte contineri tantum poterunt elastica corpora ut 2. & sic proportionaliter successive in totis areis reticularibus massæ sanguinis. In statu itaque præternaturalis constrictionis arearum omnium elastica corpora contenta stringentur, & comprimuntur in ratione ut 6. Quis non videat, ex tam forti filamentorum massæ sanguineæ, reliquorumque corporum inertium densitate, crassitie ac pondere, ex tam determinata arearum, aut aliorum componentium elementorum unione nimis stricta ac angusta comprimenda ac stringenda esse valide elastica corpora, ut non eum naturalem motum ac velocitatem in tali statu possint acquirere? Imminuto propterea elasticorum corporum spatio, aliarumque particularum tangentium motu ac velocitate, tantum caloris detrahendum erit a massa sanguinis, quantum motus & elasticitatis a particulis elasticis, & non elasticis se tangentibus subtractum est; quamobrem cum calor consistat in concitatore motu quarumcunque particularum elasticarum, & non elasticarum, imminuto quidem spatio, motu & elasticitate naturali earundem, calorem quoque sensibilibiter imminui necessarium est, hinc data proportionem *affectio frigoris* superveniet major, vel minor juxta majorem, aut mino-

rem compressionem corporum elasticorum vi majoris, aut minoris crassitie, densitatis & ponderis corporum non elasticorum, quorum inertia magis, vel minus imminuitur elasticitas, motus, actio & reactio quarumcunque particularum elasticarum, & non elasticarum inter se.

13. Sed non diu elastica corpora in statu violento compressionis præternaturalis detineri possunt, sed tantummodo per temporis differentias, modo majores, modo minores juxta majorem, aut minorem crassienti sanguinei, & seri compressibilis ambientis densitatem, crassitiem, pondus, & motus inertiam in particulis elasticis & non elasticis; propterea frigoris sensationes non continuæ, sed per tempus erunt duraturæ; & sanæ elasticorum corporum massæ violenter in minora volumina compressæ conantur tandem aliquando sese dilatare quaquaversus ad majora volumina viribus comprimantibus reciproce proportionalia; postquam ergo hæc violenter determinatum seu ultimum compressionis gradum sustinerint, sese validissime undequaque dilatare conabuntur; corpora itaque elastica, cum particulas non elasticas ipsis commixtas quaquaversus tangant, undequaque impetus & impulsus efficient in tangentia quæcunque corpora non elastica. Cum vero hæc resistant in ratione suarum soliditatum restituent elasticis corporibus impetus ac impulsus motibus jam impressis proportionales; sic communicata vicissim actione & reactione corporum elasticorum cum corporibus non elasticis, singula corpora moventur & moventur, urgent & urgebuntur; verum cum impetus corporum elasticorum sese dilatantium ad majora volumina objecta, & tangentia corpora non elastica sint ratione composita ex numero corporum elasticorum, & summa motuum dilatationum eorum, manifestum est, quam magna futura sit actio & reactio, expansio, rarefactio & dilatatio quaquaversus elementorum cujuscunque generis corporis elastici & non elastici massæ sanguinis. Ut autem hæc accuratiori examine expendantur, placeat eligere ex corporibus elasticis solas aëris particulas contentas in massa sanguinis, ut experimenta Boylei docuerunt. Cum vis elastica aëris elevet aquam ad pedes 32. circiter, & ratio ponderis seu gravitatis specificæ aquæ nostræ communis (quam invenimus pag. 54. primæ Partis) ad pondus seu gravitatem specificam sanguinis sit ut

ut 1749. ad 1886. seu proxime ut 1. ad 1. $\frac{75}{117}$ innotescet, quantum elevanda fuerit massa sanguinis vi elastica ejusdem quantitatis aëris; etenim cum vires elevent pondera diversa ad altitudines ipsius ponderibus reciproce proportionales (1) vis elastica aëris elevans aquam ad pedes 32. circiter, elevatura erit massam sanguinis, cæteris paribus, ad pedes 31. $\frac{75}{119}$ proxime; si enim fiat analogismus ut pondus, seu gravitas specifica sanguinis 2. $\frac{1}{117}$ ad pondus, seu gravitatem specificam aquæ communis, ita fiant reciproce pedes 32 circiter ad quartum terminum proportionalem, utique constabit pro quarta proportionali pedes 31 $\frac{75}{119}$ massæ sanguineæ fore respondentes, utenim 1 $\frac{2}{117}$:: 1. :: 32.

31. $\frac{75}{119}$ proxime. Cum vero eadem sit proportio pedis ad pedem, ac lineæ ad lineam, & particulæ lineæ ad particulam lineæ, vis elastica aëris proportionalis vi motivæ aëris contenti in sanguine proportionaliter, cæteris paribus, elevare poterit sanguinem ad particulas lineæ 31 $\frac{75}{119}$ in canalibus ascendentibus, in quorum ascensu magna adest resistentia ad motum; quod si canales fuerint descendentes, aut inclinati, aut horizontales, in quibus nulla est ad motum resistentia, quinimmo facilitas & propensio ad motum juxta rationes a mechanicis jam determinatas, quas non vacat hic repetere, apertum est, quantum vis proportionalis elastica aëris massam sanguineam urgere poterit ac movere. Porro si a solo momento particularum aëris in sanguine contenti tantum moveri ac urgeri poterit massa sanguinis, quid sentiendum erit, si viribus elasticis aëris ultro addantur momenta sulfurum, & elastica momenta globulorum plano ovalium &c. certe quam maxima futura erit massæ sanguineæ rarefactio, extensio & motus in ratione nempe composita ex momento cordis sanguinem impellentis, momento elastico aëris, sulfurum, & globulorum plano ovalium &c. quæ ratio composita momen-

Sydenhami Opera Med. Tom. II.

torum cum calculis æqua ratione assequi non possit, proinde velocitas, quantitas motus, & momentum massæ sanguinis in statu præternaturali febrium prout summum erit indeterminabile. Ex hisce momentis corporum elasticorum salia, & reliqua solida corpora, fibrosum sanguinis crassamentum, & filamenta seri concrescibiles ultro atteruntur; hæc autem in quantitates infinite parvas attrita, per serum liberiori motu decurrunt, ut sæpissime per sudores, & urinas erumpant. In hoc violento fluidorum impetu momentum distractionis arteriarum, glandularum, aliorumque solidorum adeo præpollens sit, ut momentum contractionis eorundem paucam, ac minimam rationem habeat cum momento præpollente distractionis, non mirandum ergo, cur in tam violentis fluidorum motibus, & tam distractis solidorum filamentis sæpissime eveniant aneurismata in arteriis, varices in venis, & hydatides in lymphaticis canalibus vomitæ aliquando, & sinus præternaturales in glandulis, cæterisque visceribus, pulsus fiant nimis elastici, nimis vibrati, inordinati & asymmetri, separationes fluidorum irregulares, heterogeneæ & vitiosæ, sensoria confusa fiant & languida, totumque corpus præternaturali calore excandescat; tot autem vitia duratura sunt, usque dum transpiratis, aut per excretoria natura loca eliminatis heterogeneis corporibus fibrosum sanguinis crassamentum, & aliqua corpora inertia præternaturales densitates, crassities, pondera, moles, & motus amiserint, & acquisita naturali, sive homogenea subtilitate, æquabili densitate, debito pondere, motuque proportionali, massa sanguinis ad naturalem mixtionem reciprocam elementorum elasticorum, & non elasticorum inter se, naturalemque temperiem restituatur: tali methodo ex mechanicis legibus arbitrandum est, a frigoris affectione ad præternaturalem caloris statum massam sanguinis erumpere in febribus, talique ordine fieri calorem præternaturalem in massa sanguinis, talique lege fluida universa in febribus violenter inter se, & in solida erumpere.

24. Alterum phenomenon, quod expendendum occurrit in febribus intermittentibus est ratio, cur febrilis accessio frigoris & caloris statutis temporibus redeat? Cum in febri-

O o

(1) Ex Vvolfo Cod. 4. pag. 564. Mechan.

febris intermittenibus massa sanguinis post accessionem frigoris & caloris ad naturalem statum pene restituta videatur, erunt reciproca mixtio elementorum sanguinis, densitas, crassities, pondus & motus seu momenta eorundem juxta isochronas naturæ leges quasi restituta; verum ut clare exponatur, quomodo determinatis temporibus redeant febriles insultus frigoris & caloris, tria præmittenda esse arbitror. 1. Quamvis massa sanguinis in febrium intermittenantium remissione quoad densitatem, crassitiem, pondus, & motum, seu quoad momenta elementorum reciproca ratione mixtorum per aliquam temporis differentiam in canalibus quibuscunque sanguiferis uniformis seu homogenea esse videatur; attamen vitio chyli, succorum hepatis, pancreatis, lienis, nec non glandularum omenti & mesenterii, nonnulla tamen seu filamenta corporum præternaturalium seu heterogeneorum in massa sanguinis existentium in hanc ingrediuntur, & circumeunt, quæ quantumvis numero, pondere, mensura ac momento multo minora sint corporibus homogeneis adhuc dominantibus, nihilominus continuo chyli, aliorumque humorum heterogeneorum ingressu statutis temporibus febrilem motum restituere apta sunt. Quamobrem secundo loco advertendum est, quod quamvis massa sanguinis per aliquod tempus cum reciproca mixtione elementorum componentium juxta densitatem, crassitiem ac motum &c. videatur esse in naturali proportionem uniformis, & cæteris paribus, æquabilis; attamen sæpe, ac sæpius portio massæ non omnino æquabilis, non omnino uniformis esse potest in spatiis minimis arteriarum & venarum in glandulas desinentium ob asymmetros motus ipsarum glandularum succos heterogeneos, diverforumque momentorum præternaturaliter separantium. Cum autem (num. 10. *primæ partis*) ostensum sit, in statu naturali systolem & diastolem cordis cum systole, & diastole arteriarum, glandularumque desinentium debere esse proportionales, cumque in tali febrium intermittenantium remissione sæpissime non conservetur hæc totalis ratio æqualitatis, aut quasi æqualitatis inter systolem & diastolem cordis cum systole & diastole arteriarum potissimum minimarum, & glandularum desinentium, succos diversæ & præternaturalis indolis separantium, non poterit diutius massa sanguinis in continentibus vasis in

æquo mixtionis æquilibrio sustineri: hinc alte occurrit considerandus motus asymmetre glandularum separantium, & vasorum minimorum in glandulis evanescentium; quis enim praxin medicam agens in febribus intermittenibus impeditas, aut inertes glandulas pancreatis, hepatis, lienis, aut mesenterii & omenti non sensit, aut non cognovit, aut saltem jure optimo non suspicatus est? 2. Certum est, in naturali motu massæ sanguineæ ob isochronas pulsationes cordis, arteriarum, & glandularum, quarum opera una hora sæpe 3000. pulsationes; ex Cardano 4000. juxta Bartholinum 4400. ex calculis vero celeberrimi Lyster cap. 2. de humoribus 4500. enumerantur; determinatis temporibus necessario haberi determinatum circulationum numerum; æquabilis ergo futura erit lex & ordo motus elementorum massæ ejusdem, & homologa statutis, determinatisque temporibus eorundem in glandulis separatio.

15. Hisce præmissis cum succi quantumvis heterogenei primo ingressu in massam sanguinis non semper esse possint numero, pondere ac mensura adeo densi, adeo crassi cum ponderibus & motibus, seu momentis notabiliter inæqualibus respectu ad ordinatum adhuc motum totius massæ sanguineæ homogeneæ supra cætera corpora heterogenea adhuc prædominantis, nondum alterari poterit notabiliter ordo ac lex, & reciproca naturalis mixtio elementorum sanguinis; verum si paulatim, & crescentibus, determinatisque temporibus creverint ingressus corporum heterogeneorum in massam sanguinis, ut post tantum numerum circulationum, qui determinatis temporibus fieri semper debuit numero, pondere ac mensura, momenta corporum heterogeneorum superare incipiant corporum homogeneorum momenta, eo primo tempore in minimis vasis evanescentibus in glandulas, magis magisque asymmetre motas, utpote minimorum diametrorum respectu ad majores diametros canalium, tunc opere corporum densiorum & crassiorum heterogeneorum lentescere incipiet sanguis, & cum ultro sequatur & subsequatur determinatis circulationum numeris, crescens numerus corporum heterogeneorum, sectiones vasorum primo minimorum cum decrescant semper in ratione geometrica respectu ad majores, primus frustra solida minima vasorum in glandulas asymmetre motas evanescentium a quantitate filamentorum sanguinis circulan-

lantium in ratione geometrica aut quasi geometrica replebuntur, & repleta obstruentur, & quodammodo sspissime solidescunt. Ut autem hæc clariora fiant, eligamus frustum conicum canalisi minimi in glandulam evanescentis; sit nempe frustum conicum C D c d arteriæ desinentis in glandulam, cujus diameter internæ majoris peripheriæ C D sit — 1; diameter vero internæ peripheriæ minoris c d sit —

$\frac{1}{3}$; altitudo vero frusti sit — 6. (Vide

Fig. 4.) Ut proxime habeamus quantitatem sanguinis replentem, & contentum in frusto hoc conico, quæ quantitas componat frustum hoc conicum, ex celeberrimi Ozanam Geometrica præctica operando, constabit contentas partes in tali frusto conico fore — 3 $\frac{23}{100}$ Quamobrem si partes

istæ contentæ, & componentes frustum hoc conicum arteriæ supponantur esse scrupuli, hæ contentæ partes in frusto conico arteriæ minimæ evanescentis proxime æquales erunt scrupulis 4. Advertendum proinde elementa sanguinis heterogenea vitio chyli, aliorumque humorum, vel ingredi in massam sanguinis quocunque circulationum numero in ratione Arithmetica continua æquali, vel discreta inæquali. Supponatur primo, elementa heterogenea ingredi in massam sanguinis in ratione arithmetica æquali, videlicet prima hora ingrediantur in massam sanguinis 10. grana corporum heterogeneorum; secunda hora 20. tertia hora 30. & sic successive in tali ratione arithmetica, hoc certe spatio horarum 24. ingrediantur in massam sanguinis grana 3000. seu scrupuli 150. nempe drachmæ 50. seu

unicæ 6. $\frac{2}{3}$; Quamobrem si canalium, reliquorumque organorum robur, & vis elastica glandularum separantium, actiones & reactiones libera fuerint & expeditæ, separandiisque corporibus heterogeneis proportionales, utique separatis corporibus heterogeneis ab homogeneis in ratione æqualitatis fluidorum massa adhuc sana conservabitur, & quamvis impura, prima tamen puritati opportuno tempore restituetur. Cæterum si organorum vis elastica, & canalium robur infirmum fuerit, aut in statu inertiae, aut nimis tensum, contractumque fuerit, & glandulae separatrices obstructæ, aut saltem non habuerint momenta sepa-

randis corporibus proportionalia, mehercle cum corporum heterogeneorum gravitates non sint voluminibus suis proportionales, horum centra gravitatis non erunt eadem cum eorum centris magnitudinum, consequenter mutabitur naturalis reciproca proportio momentorum corporum componentium massam sanguineam. Porro cum impetus corporum heterogeneorum habeant rationem compositam ex ratione velocitatum & voluminum, & horum pondera velocitates & volumina sint inæqualia, inæqualiter movebuntur corpora heterogenea, & hæc inæqualiter movebunt & percutient ea, quibus undequaque occurrunt: sic ultro inæqualiter urgebunt latera cordis, & vasorum continentium, & ab horum nisu elastico inæquali inæqualiter urgebunt. Præterea ab hisce vitiis corporum heterogeneorum, vasorum continentium, & glandularum inepte aut ægre separantium corpora heterogenea asymmetre mota, nec a glandulis opportune separata in glandulis, & finitimis vasorum frustis lentiora fient; quamobrem juxta superiores calculos, gratia exempli, expositos (etenim juxta majorem aut minorem numerum, & gradum densitatis, crassitie, ponderis, & motus præternaturalis elementorum præternaturalium massa sanguinis, proportionaliter quoque impediuntur, & obstruuntur citius aut tardius, magis aut minus majora aut minus majora aut minora frustra vasorum evanescentium & glandularum;) Cum scrupuli 150. sanguinis ingressi in massam ejusdem spatio horarum 24. divisi per scrupulos 4. jam contentos in frusto conico canalisi minimi in glandulam evanescentis, apti sint obstruere, & impedire proxime frustra 37. canalium minimorum similium, & æqualium canali super exposito; proculdubio si frustra vasorum fuerint numero 37. proxime, æquali ordine ac tempore impedita & obstructa a scrupulis 150. corporum heterogeneorum, tunc si tantus vasorum minimorum, & glandularum numerus fuerit naturæ gravis ac molestus, ex abolito, aut saltem ex imminuto motu augebuntur contactus inter se, proinde densiora fient, crassiora & graviora elementa heterogenea sanguinis, & per numerum 12. frigoris affectio supervenire incipiet. Ulterius delatis semper continuo circulationum numero filamentis heterogeneis ad extrema vasorum, & retardata in minimis canalium frustis &

glandularum areolis naturali velocitate sanguinis, filamenta seri & crassamenti sanguinei cum gradum densitatis, crassitiei & ponderis magis magisque acquirant, qui gradus resistantiam asserat adveniēti sanguini, & determinata temporis mensura pressionem violentam efficiat contra contenta quæcunque corpora elastica & non elastica, proinde frigoris sensationes sustineri & augeri videbuntur. Hæc autem pressio corporum elasticorum & non elasticorum ultro augetur a vi & impetu sanguinis continuo supervenientis, & in minimis canalibus filamenta heterogenea resistantia percutientis; ex hisce autem impulsibus magis densantur, uniuntur & constringuntur corpora cujuscunque generis, usque dum, cum eum gradum densitatis acquisitum corpora elastica amplius pati ac sustinere non possint (quod determinato semper tempore, ordine ac mensura accidit,) conentur tandem aliquando objectas resistantias naturæ molestas undequaque evertere ac superare; hinc dato tempore (per numerum 13.) quaquaversus facto impetu, restituitoque (ut loquuntur) elaterio, massam sanguinis urgent & violenter succutiunt; & sane cum corpora elastica & nonelastica violenter & diversimode determinatis temporibus compressa diversorum sint momentorum, urgebunt quidem, & tangentia quæcunque corpora urgebunt in ratione composita ex massis & velocitatibus seu momentis dissimilibus & inæqualibus eorundem; corpora idcirco cujuscunque generis sine lege ac ordine, determinatis solum temporibus, mota cum præternaturali actione & reactione inter se, naturalem pro eo tempore mixtionem invertent, & juxta varias ac dissimiles rationes momentorum corporum remissiori, aut intensiori agitatione, calore ac æstu hac data temporis mensura per numerum 13. movebuntur; hinc calor summus & febrilis incallescencia ægros miserrime occupant, statutisque temporibus redeunt, ex præternaturalis materia restitutione per numerum 14. talique ordine, ac successiva methodo denuo retardantur.

16. Itaque si tantus corporum heterogenorum numerus, si tanta densitas, si tanta crassities, ac pondus eorundem in ratione arithmetica continua æquali crescentium, gravi natura molestia cumulentur in sanguine, lymphæ & succo nerveo, ut spatium horarum 24. semper retardentur veloci-

tates sanguinis in tot ac tantis vasorum minimorum frustis, in tot ac tantis glandularum spatiis, ita ut etiam in majoribus frustis data ratione, ac tempore imminutæ reddantur velocitates massæ sanguinis cum determinata pressione corporum elasticorum & non elasticorum, cum inæquali omnibus in locis actione & reactione vasorum, & fluidorum, ex quibus vitiosa & ineptæ mixtiones superveniunt; tunc cum affectione frigoris per num. 12. subsequente postea calore per num. 13. *Quotidiana febris homotona & regularis* orientur; Quod si heterogenea elementa vitio chyli, aliorumque corporum ingrediantur in massam sanguinis in ratione arithmetica continua æquali quidem, sed augeantur hæc dato tempore in tali ratione, ut prima hora ingrediantur, gratia exempli, 40. grana corporum heterogeneorum, secunda hora 80. tertia hora 120. ingressa sint in massam sanguinis, & sic successive gravi naturæ molestia, minimorumque vasorum, ac glandularum impedimento, æqualibusque temporibus cum retardatis proportionaliter fluidorum velocitatibus, iisdem quoque temporibus, talique compressione corporum elasticorum, cum præternaturalibus actionibus & reactionibus organorum, & fluidorum, & præternaturali mixtione eorundem, tunc spatium horarum 12. (grana enim 3102. corporum heterogenorum ingressa erunt in massam sanguinis) *duplex quotidiana febris regularis & homotona* cum frigore per numerum 12. postmodum vero cum calore per numerum 13. exorietur. Ex his clarum est, vitio chyli, aliorumque humorum, si tantus corporum heterogeneorum numerus, si tanta crassities, si tanta densitas, tantumque pondus naturæ grave ac molestum cumulentur in sanguine ratione arithmetica discreta inæquali crescendo, cum velocitatibus sanguinis sine ordine, loco ac tempore retardatis in minimis vasorum frustis, ac spatiis glandularum, & cum inæqualibus loco ac tempore compressionibus corporum elasticorum, fiant actiones & reactiones præternaturales solidorum & fluidorum, cum præternaturali miscela eorundem loco ac tempore inæquali; tunc cum asymmetris, irregularibus, inordinatisque frigoris accessionibus (per numerum 12.) postmodum vero cum calore (per numerum 13.) emergent *febres quotidianæ simplices, aut duplices &c. alteriusque generis, sed inæquales*,

Febris
quotidia-
na.

Febris
quoti-
diana
duplex.

Febris
quoti-
diana
inæqua-
les.

Febres
lymphaticæ.

let, inordinata & asymmetre. Advertendum hic ob vitium lymphæ quantitate, densitate, crassitie, pondere ac motu asymmetro peccantis supra æquas naturæ leges cum glandularum & minimorum vasorum, omenti & mesenterii potissimum impedimento, *lymphaticas ac lentas febres continuæ* *maci duratione*, noctu potissimum ob gravio- rem atmosphæram ingravescere cum aliqua- li per dorum refrigeratione & inertia ad motum; cum enim lymphaticus humor crassior, densior & ponderosior sic redditur, lentiori quoque motu progreditur; immi- nuto autem motu augentur fluidi altitudi- nes; & lymphatica vascula continentia ad majorem superficiem extendi debuerunt; proinde & adaucto pondere, & adaucta su- perficie impediuntur spatia, & naturales oscillationes, seu motus distractionis & contractionis fibrarum muscularium, car- nium, nervorum & tendinum adjacentium, ut aliquantulum refrigerari & iners fieri ad- motum animal debeat.

Febres
tertianæ
legiti-
mæ.

Febres
tertianæ
illegiti-
mæ.

17. Quod si tantus numerus corporum heterogeneorum chyli & bilis potissimum pondere ac motu naturæ molestus transfe- ratur in massam sanguinis in ratione arithme- tica continua æquali, pariterque præterna- turales actiones & reactiones solidorum po- tissimum glandularum hepatis, omenti & mesenterii, & fluidorum, nec non præter- naturalia momenta eodem, aut simili loco vasorum minimorum producantur semper spatio horarum 48. & sic successive, & a principio unius accessionis ad principium alterius semper intercedat talis, determi- natulque numerus horarum 48. utique *le- gitime Febres Tertianæ, homotone, & re- gulares*, cum frigore per numerum 12. postmodum vero cum calore per numerum 13. violentissime irruerent. Ulterius si ea, quæ supra diximus, ingrediantur in mas- sam sanguinis in ratione arithmetica di- creta inæquali, hæc numero, pondere ac motu seu momentis inæqualibus, agendo & reagendo, inæquali, varioque loco ac tempore retardando velocitates sanguinis cum frigore per numerum 12. postea nifu ac conatu corporum elasticorum cum calore per numerum 13. *Tertianas Febres aliquan- do simplices, aliquando duplices, alteriusque generis, sed inæquales, inordinatas, asym- metras* præternaturali mixtionis motu pro- ducent. Hic & ibi plerumque primus pa- roxysmus tertio, secundus, quarto respon-

dent; & sic successive alterna, seu permu- tata ratione paroxysmi progredi consuecunt per numerum 14.

18. Simili methodo, ordine ac lege, re- missioribus tamen symptomatibus, si tan- tus corporum heterogeneorum numerus, si tanta crassities, si tanta densitas, tan- tumque pondus naturæ grave & molestum, (quod potissimum evenire putandum ex prægressa æstivi temporis minima particu- larum sulfurearum, balsamicarumque tran- spiratione) crescant in ratione arithmetica continua æquali, tali ordine, loco ac tem- pore, ut spatio horarum 72. velocitates na- turales fluidorum æqualibus locis ac tem- poribus æquabiliter retardata sint in mini- mis vasorum frustis spariisque glandula- rum, & cum æqualibus loco ac tempore compressionibus corporum elasticorum fiant actiones & reactiones solidorum & fluido- rum præternaturales, cum præternaturali mixtione eorundem; & sic successive a principio unius paroxysmi ad principium al- terius spatio semper horarum 72. progressio fiat, tunc cum frigore (per numerum 12.) deinde cum calore (per numerum 13.) *Febres quartanæ simplices & homotone* erunt producendæ. Verum si hæc ac tanta ingre- dian- tur in massam sanguinis in ratione arithmetica discreta inæquali, & subsequen- tur actiones & reactiones præternaturales inæquali ordine, variis in locis, variisque temporibus fiant paroxysmi horis 72. re- spondentes, cum retardatis velocitatibus fluidorum in frustis minimis canalium & glandularum &c. utique cum frigore (per numerum 12.) accessiones quartanarum orientur; deinde ob vires & conatus elasti- cos corporum elasticorum cum calore (per numerum 13.) febriles supervenient. Hinc quartanæ febres evenient aut simplices, aut duplices, alteriusque generis, sed inæqua- les, inordinatæ & asymmetræ, talique or- dine ac methodo per numerum 14. erunt reddituræ.

Febres
quarta-
næ sim-
plices.

Febres
quarta-
næ com-
positæ.

19. Denique si hæc omnia accidant spa- tio horarum 12, aut 18. aut 24. &c. ita tamen, ut non amplius sit paroxysmorum alterna, aut successiva progressio, nec ul- tro redeat ingressus corporum heterogeneo- rum in massam sanguinis, cum totali & omnimoda libertate sanguinis, & restitu- tionum & reactionum naturalium &c. tunc cum frigore (per numerum 13.) *Febres Ephemeræ* modo leviores, modo graviores

Febres
Epho-
meræ.

juxta

juxta quantitates ac vires corporum heterogeneorum majori, aut minori momento incallescunt, quæ aut sudore, aut opportuna corporum heterogeneorum separatione redimentur.

20. Simili ratione quascunque ex intermittentium genere febres fieri judicandum probabiliter est; verum cum hujusmodi morborum genera pluribus symptomatibus gravari soleant, hinc raptim de his, quæ frequentius accidunt, nonnulla dicere consultum putavi. Dum itaque corpora elastica massæ sanguineæ antea violenter compressa in glandulis, minimisque canalium frustis, suos conatus elasticitatis compressionibus suis proportionales quaquaversus exercent, agendo & reagendo contra quascunque componentes particulas præternaturali elementorum componentium mixtione, & contra solida quælibet nervea lymphatica, venosa & arteriosa cum æstu & calore ac motu violentissimo massæ sanguineæ universa diruendo; jure in tam violentis, continuisque particularum percussionibus ac motibus corpora quælibet massæ sanguineæ atteri, & in minimas partes, ac fortasse infinite parvas dividi debebunt: cum enim in calore ac febrili æstu agitationes seu impressiones particularum sulfurearum, aliarumque elasticarum in cætera fluidorum corpora sint proxime in ratione composita velocitatum & simpla densitatem particularum sulfurearum, aliorumque corporum elasticorum, constar, quantum corpora quælibet componentia violentissimis actionibus agitari, & in minima dividi debeant; etenim cum solida similia sanguinem componentia decrecant semper in ratione triplicata laterum homologorum, horum superficies in duplicata tantummodo; cumque solida similia ejusdem generis sint ut pondera, non dubitandum, ex tam diminutis solidis pondere, soliditate & superficie ad miliares & cutaneas glandulas deferri debere quantitate ac velocitate seu momento multo majori, quam par est; proinde hæc plusjusto transpirare uberrimis sudoribus conabuntur (de qua re num. 42. secundæ partis satis actum est.) Hisce autem transpiratis, velocitas fluidorum moderatur, & densitates mediæ fluidorum antea præternaturalium restituuntur; redit inde opportuna mixtio, & solidorum cum fluidis æquilibrium: tempore autem tanti motus ac caloris, tantarumque actionum & reactionum præternatura-

lium massæ sanguinis frequentissimæ succedunt jaclationes, inquietudines, difficilesque respirationes, sed potissimum ægri acerrime sciunt; Id sane evenit, cum nimirum portio non levis seri per sudores transpirati fluere debuisset per spatia glandularum linguæ, œsophagi & palati hæc undequaque madefaciens; verum tantæ transpirationis incommodo tot fluidis privata spatia linguæ & palati & fibræ glandularum opportuno liquido fraudatæ arefcere conantur, aridæ vero factæ contrahuntur, quo statu angustiora fiunt glandularum foramina, quinimo ablatis, aut imminutis momentis distractionum & contractionum glandularum, aliarumque fibrarum inservientium aut non adjuvant fibræ motum fluidorum, ut necessariam fluidi portionem excipiant, aut exceptam non promovent, novam opportunitatem partium irrigationi accommodam susceperunt. Ulterius a filamentis heterogeneis massæ sanguinis sæpissime obstruuntur glandularum salivarium spatia, impeditoque, aut saltem imminuto seri fluxu determinata fibrarum & glandularum corrugatione *stipim* afferunt.

21. Præter hæc a febrili sanguinis motu dilatata inæqualiter vasa quælibet, potissimum venæ & arteriæ menynghum, has inæqualibus percussionibus violenter extendunt, extensæ inæquali diastole calvariam arietant *Dolorem Capitis* afferentes: Porro cum curvæ menynghum fibræ ex nimio sanguinis motu violenter dilatatæ fiant segmenta majorum arcuum, momentum distractionis menynghum non erit æquale, aut proportionale momento constrictionis earundem, sed præpollens, proinde ex asymmetra fluidorum velocitate per vasa menynghum naturales fibrarum anguli fient inæquales ac dissimiles. Ob id mutabitur earum naturalis directio & parallelismus cum asymmetra distractione & contractione earum, a quibus omnibus dolorem fieri, num. 8. Mechanicæ solidorum ostensum est; præterea cum a glandulis menynghum in præternaturali motu ac mixtione sanguinis separetur serum, peccans quantitate, superficie salium contentorum ac motu eorum; ab his gravantur, percutiuntur & stimulantur menynghes cum graviori capitis dolore; quinimo cum a continuis menynghum stimulis fibræ quoque medullares cerebri a menynghibus circumdatæ inæquales, continuasque sollicitationes ac stimulos mo-

molesta communicatione excipiant, hæ medullares fibræ tantis tantisque motibus sollicitatæ sensoria actuosa reddunt frequentissimis, minimisque oscillationibus, ut ægri continuo *Vigiles* esse teneantur.

22. Nec dispar molestia occurrit stomacho, cum frequentissime ab asymmetris menyngum motibus communicata per nervos membranis stomachi motuum asymmetri ægri a frequenti vomitu succutiuntur: præterquam quod impura corpora, asperarumque superficialium a glandulis stomachi separata, vel ex duodeno bilis ramenta sursum pulsa in ventriculum repetitis vellitationibus stomachi membranas sollicitando, mox stimulando, & momenta contractionis augendo vomitum afferunt.

23. Quia vero in febrium potissimum intermittentium declinatione excernuntur urinarum copiarum aliquando cum levamine, si hæ fuerint ægri viribus & naturæ morbi proportionales; aliquando vero periculosa, si supra vires morbi & naturæ constiterint: hinc visum est rei nostræ opportunum, brevi *Urinarum separationes* expendere. Certum est, in febrium augmento ac statu, in quo sanguinis velocitas major est, aliquando summa elementa heterogenea nimis confusa esse, & glandularum actiones atque elasticitates asymmetris momentorum gradibus oscillare, quo tempore nullatenus æqua ratione separari possunt a glandulis viscerum similia corpora a dissimilibus; æquæ nimirum separationes corporum similia a dissimilibus cum statutis temporibus & æqualibus, placidisque motibus fluidorum & glandularum fieri naturaliter debeant, ut (pag. 29. primæ Partis indicatum est,) nulla quidem actio separationis opportuna naturæ fieri poterit, nisi declinationis tempore, quo velocitas sanguinis & oscillatio solidorum naturali motuum momento accedunt. Verum quia aliquando accidit etiam declinationis tempore a renalibus glandulis tantam urinarum copiam separari, quæ viribus gravis ac molesta naturæ *Diabetem* afferat, proinde juvat hic de tam gravi symptomate brevi differere. Ab adaucta velocitate sanguinis in febribus, a concitata actione & reactione

particularum massæ sanguinis, hujus filamenta, & reliqua componentia attrita nimis fiunt, & in partes infinite parvas divisa, serum cum non æqua & opportuna mixtione cum reliquis massæ sanguineæ particulis reciproce misceatur liberiori motu fluit: serum hoc copiosius delatum in renales glandulas impetu summo urget internos parietes glandularum; cum vero impetus sit factus ex massa talis fluidi ducta in velocitatem, qua fluidum temporibus æquabilibus defertur, erit impetus tanti fluidi erumpentis per foramina arteriarum evanescentium in glandulas in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatum, simpla densitatum seu gravitatum specificarum, & simpla foraminum (1), e quibus erumpunt in glandulas desinentes. Quamobrem si cæteris paribus velocitas seri fluentis ab uno orificio vasis desinentis in renalem glandulam in statu naturali fuerit $u = 2$ — 4 nempe in ratione duplicata radices $u = 2$; densitas vero, seu gravitas specifica seri fuerit $= d$; foramen vero e quo erumpit serum in glandulam sit $= o$; erit quantitas motus seu impetus seri fluentis e glandula renali proxime ut $u^2 \div d \div o$. Ita si supponatur in statu febrili radicem velocitatis massæ sanguinis augeri tantum iu ratione tripla, ita ut etiam radix velocitatis seri separandi in glandula renali sit $u = 6$; densitas vero $= d$, seu gravitas specifica seri supponatur eadem in eodem sanguine, idemque pariter sit foramen, e quo erumpit æqualibus temporibus $= o$, erit impetus seri fluentis in statu febrili proxime ut $u^2 = 36 \div d \div o$, tali ergo ratione fluens præternaturaliter serum ab orificiis singularibus vasorum evanescentium in vasa glandularum urgere debet singulos internos parietes glandularum singularibus momentis $= 36$. En ergo gravis & molesta extensio & dilatatio renalium glandularum. Cum vero quantitas, seu filamenta seri fluentis (2) æqualibus temporibus per orificia vasorum in glandulas sint in ratione composita proxime ex rationibus orificiorum vasorum, & velocitatum seri fluentis, cumque impetus velocitatis naturalis

sup.

(1) Per Prop. 31. pag. 214. Hermannii.

(2) Per Prop. 30. Hermannii pag. 214.

suppositus fuerit — 4 erunt cæteris paribus quantitates feri æqualibus temporibus delatæ momento velocitatis præternaturalis, ut 36 proxime in ratione nonculpa ac fuerant in statu naturali. Glandulæ itaque taliter extensæ excipere proxime debebunt noncuplam quantitatem feri; verum cum hæ sint ex elasticis vasorum fibris & ex elasticis membranarum filamentis elaboratæ, eorumque opera constrictæ, si accadat ea ratione qua fuerant dilatatæ, urgebunt momento adaucto constrictionis per glandularum foramina noncuplam, aut quasi noncuplam quantitatem feri iisdem temporibus; En ergo excedens feri copia, & magna urinarum effusio, quinimo adeo aliquando excedens est, ut sæpissime miratus sim, naturalem feri quantitatem & potiones ingestas longe fuisse superatas.

24. Tam grave, mirandumque phenomenon aëri potissimum deberi arbitratus sum, qui per pulmones, per ventriculum, per cibos, potiones continuo exceptus, & inde effusus in massam sanguinis tam gravia phenomena parit ac sustinet: & sane tantam aquarum copiam ab aëre potissimum cumulari posse assabre docet experimentum a celeberrimo P. Lana expositum cap. 15. *sui Prodromi*. Accipit enim vas vitreum excavatum, & in formam coni elaboratum, talique lege suspendit, ut vertex coni vitrei pendulus, deorsum tendens sustineatur: Hoc vas nive, aut glacie repleatur, & Soli, aut quocunque loco calido exponatur; aer continuo ambiens externam coni vitrei superficiem continuo densabitur, & paulatim in pendulo vertice coni undequaque collectus continuam aquam erit stillaturus, inclusa quidem nive, aut glacie parum, aut nihil imminuta: Hac methodo perennem fontem generari posse, hancque aquam sanandis heclicis utilissimam celeberrimus Auctor testatus est: Ab huiusmodi experimento necesse est colligere, particulas quoque aëris in sanguinea massa undequaque exceptas, collectasque aliquando uniri, ac densari taliter posse, ut hæ continuam in aquam collectæ stillare coactæ sint; tam mirandum opus fortasse futurum erit in sanguine, cum filamenta fluidorum massam sanguineam componentia enervato mixtionis naturalis vinculo laxa, attrita ac resoluta nimis fuerint; ut opportuna ac necessaria vi intimam mixtionem aëris cum reliquis particulis sustinere ac conservare apte non possint; hæ nimirum aëris moles

cum non intime unitæ, nec ad minima cum singulis, ac reliquis massæ sanguineæ componentibus permixtæ esse possint, hæ necessario unitæ sero supra cætera elementa naturaliter frigidiori, majori ac multiplici, quam par est, inter se contactu grandiores & activiores fiunt, simulque supra naturalem numerum agglomeratæ ac collectæ, proinde inter se nimis tangentes serum, cui miscentur, numero, pondere ac motu urgent & augent, & per laxatas, extensæque renales glandulas uberrima urinarum separatione excernuntur; cum vero semper continua aëris quantitas numero, pondere ac motu excipiat in massa sanguinis, hæc quoque continuo una cum sero per renales glandulas fluxura erit. Non rarum ultro est a *longa Diarrhœa* torqueri ægros, ut excretiones longe superent quantitatem ac pondus cibi & potus, quibus vesci solent. Huiusmodi diarrhœæ non semper ab asymmetria humorum, sed potissimum ab aëris particulis non intime, non perfecte commixtis cum reliquis, ac singulis massæ sanguineæ componentibus elementis generari solent; hæ nimirum aëris moles cum inter se uniri, colligi ac tangentes iuter se fieri nimis possint ac densari, momento suo elastico intestina undequaque sollicitant ac stimulant, quæ stimolata frequentissimis distractionis & contractionis motibus oscillando, copiosius serum ab intestinalibus glandulis exprimunt, sicque unione facta cum separatæ corporibus numero, pondere ac motu longas diarrhœas sustinent ac promonent. Hac, quæ de aëre & de momento ejusdem exposuimus non nova, neque improbabilia iis videbuntur, qui aëris momenta & actiones in fluidis, quibus miscentur, mechanica ratione cognoverint, cum apertum sit sedulo cogitantibus, plurima morborum & actionum phenomena animali evenire ob incomprehensibile elastici aëris ministerium. Interim hoc unum addo, me Lectoribus tædio esse futurum, si universa febrium intermittentium genera, si singula horum symptomata expenderem, cum ab iis, quæ huc usque dicta sunt, omnia, quæ supersunt, exsolvi & explicari facile possint.

DISSERTATIO III.

De Febris Continuis.

Sæpiissime intermittentes febres ablata, aut enervata densitate, crassitie ac momento filamentorum massæ sanguinis, nec non corporum inertium cum excessu momentorum corporum elasticorum habentium rationem majoris inæqualitatis respective ad momenta corporum inertium in *Continuas Febres* & aliquando in *Malignas* mutari facillime poterunt. Sæpe tamen primo insultu febrium irrunt continuæ, & graviori aliquando culpa malignæ febres ægros eneant; Quotiescunque aliquam ob causam, vel externam, vel internam, sive mixtam quantitates & vires elasticæ corporum elasticorum numero ac motu seu momento reliquas particulas inertes, seu non elasticas superaverint, ut non solo nisu elastico inter se, sed concepto impetu agant. vi, aut momento cujuscunque causæ externæ, aut internæ, aut mixtæ contra inertes particulas, & contra momenta distractionis & contractionis vasorum, aliorumque solidorum conspirantium, tunc febres continuæ sine frigore erunt orituræ; cum enim hic filamenta sanguinis & reliqua corpora inertia nullatenus sint, quod attinet ad densitatem, crassitiem & motum reliquis particulis actuosis seu elasticis proportionalia, cumque inertia corpora habeant numero, pondere ac motu rationem minoris inæqualitatis respective ad momenta corporum elasticorum; præternaturales etenim vires elasticæ corporum elasticorum nullo modo cohiberi possunt, franari ac vinci per aliquam temporis differentiam a densitate, crassitie ac momento corporum inertium; proinde sine frigore, sed solo cum calore irruent febres continuæ: Et sane cum vires vivæ corporum elasticorum in statu naturali inertibus quoque corporibus momenta sua continua actione & reactione elastici contractus communicent, & horum corporum elasticorum vires vivæ sint in ratione composita ex ratione simpla massarum, & ra-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

tionem duplicata velocitatum (1), pariterque cum calor sit ut impressiones particularum corporis calidi in corpore calorem excipientes; istæ autem impressiones sint pariter (per prop. 85. Hermannii) in ratione composita ex duplicata velocitatum, & simpla densitatum seu massarum: manifestum est ex harum rationum æqualitate, aut quasi æqualitate, inter calorem, & vires vivas corporum elasticorum, has quoque cum calore esse copulandas, caloremque naturaliter esse producturas. Verum cum vires vivæ elementorum sanguinis in febribus sint præternaturales, nempe cum gravi excessu velocitatum crescentium in ratione duplicata earundem, futura erit aliquando velocitas sanguinis adeo excedens, ut articularum officia plus evomant temporibus æqualibus quantitatem sanguinis, quam officia venarum temporibus quoque æqualibus excipere apta sint: proinde quantitates liquorum numero, pondere ac motu nimis effusæ in carniū, membranarum, reliquorumque solidorum spatia, nec opportuno tempore ac proportionali motu a venis exceptæ momento suo auferent, aut saltem enervabunt momenta distractionis & contractionis fibrarum conspirantium motui sanguinis in finitima officia venarum: retardato motu sanguinis lentescent elementa ejusdem, & paulatim statua inflammatione *Febres Inflammatorias* erunt productura. Porro hæc vitia ultro emergent, si consideraverimus volumina sanguinis in statu naturali, eademque in statu præternaturalis dilatationis: hæc enim duo volumina cum haberi possint ut solida similia, quæ inter se proportionem habent triplicatam laterum homologorum, erunt porositates, seu interstitia voluminibus interspersa lateribus solidorum homologorum proportionalia, quæ latera cum sint in ratione subtriplicata solidorum, erunt pororum amplitudines, seu particularum sibi invicem proximarum distantiarum inter se in ratione subtriplicata, seu ut radices cubicæ voluminum sanguinis. Si ergo in statu naturalis dilatationis massæ sanguinis pororum amplitudines fuerint ut unum, in statu vero præternaturalis rarefactionis ejusdem voluminis sangui-

P. p. nis

(1) Per Theorema 42. Vvolfii Mechan. pag. 594.

nis fuerint ut 3. erit volumen sanguinis in statu naturalis dilatationis ad volumen ejusdem in statu præternaturalis dilatationis ut 1. ad 27, seu ut cubus ad cubum; Idem ergo volumen sanguinis, quod in statu naturalis rarefactionis occupaverat spatium cubicum ut unum, in statu præternaturalis dilatationis in febribus erit proxime in arteriis ac venis, cæterisque carniū spatiis 27 spatia cubica occupaturum: cum itaque tot ac tanta volumina cubica præternaturalia sanguinis nimia spatia repleant, nec tam prompte ac facile ab orificiis venarum communicantium excipi possint temporibus æqualibus, quibus volumina hæc tam copiose, ac violenter ab arteriarum orificiis evomuntur, plurima quidem solida cubica sanguinis inter spatia arteriarum evanescentium, & venarum incipientium remanere debebunt numero, pondere ac motu nutritioni partium inepta, nec motui per venas secuturo opportuna: plurima ergo solida cubica in tot spatiis otiose lentescunt firmabunt inflammationis exordia, febres inflammatorias productura.

Febres
inflam-
mato-
rias.

26. Hæc vitiosa & lentescencia sanguinis volumina per poros carniū, membranarum, aliorumque spatiorum effusa, si per substantiam hepatis effluunt *Hepatitis*; si per lienem, per mesenterium, per capitis membranas irruant, harum partium erysipelata: & *Febres Erysipelatosas* graviter afferent; si vero per stomachi substantiam, *Lypirias* febres gravissimo fato trahent. Inflammatoriis autem febribus, lypiriis potissimum, commune est, nervos, membranas, & cætera solida crispare ac convellere; vitium enim hoc esse debuit ex succo nerveo impuro, salisque particulis nimis affecto, ex laxata mixtione naturali reciproca elementorum sanguinis salsa corpora moleste agere, & solidorum spatia, quibus aut firmiter, aut lento motu adherent, vasorumque circumferentias, quas undequaque gravi sollicitatione tangunt, moleste sollicitare ac stimulare; crispatis ergo, convulsisque solidorum filamentis momentum contractionis solidorum præpollens sit, supra momentum distractionis eorundem; ex tanta momenti contractionis præpollentia solida coguntur topico velut motu consistere; ex his fluida quælibet per vasa decurrentia, cum non ab æquabili motu homologo distractionis & contractionis vasorum, aliarumque fibrarum conspirantium non op-

portune adjuventur, lentescere, & tardo quantumvis continuo febrili motu moveri conabuntur: ibi potissimum in externa, videlicet corporis superficie, ubi vasa minima sunt, in quibus fluidorum motus naturaliter minor esse debet: cum vero in canalibus, quorum diametri sunt majores & cordi proximiores, non ea acervari ac cumulari possint filamentorum densitas & crassities, quæ motum sanguinis ea lege tardiores reddant, sensationi frigoris interni producendæ proportionalem, cumque ulterius elastica corpora soluto jam mixtionis naturalis vinculo ob proximi cordis impetum motum continuo semper agant & reagant, hinc in lypiriis exteriora frigere, interiora uri experimur. Cavendum hic, ne a duritie & consistentia pulsum sanis similibus decepti, ægros putemus minima aut nulla febre laborantes, cum febres non tantum a præternaturali velocitate pulsum; verum etiam a præternaturali tarditate fieri possint; affectiones enim cardiacæ, singultus, vomitus, jactationes continuæ, suspiria, anxietates, respirationes angustæ, & aliquando lachrymæ involuntariæ, molesta membranarum & nervorum sollicitatione ac consensu majora prædicunt mala, quam convulsi pulsus indicare videantur.

27. Inflammatoriis febribus affines sunt febres illæ, quæ a Medicis *Malignæ* appellari solent, ita ut hæc ab illis non natura, sed gradu differre mihi visæ sint; communiter a *Dissolutione* & *Coagulatione* generatas Medici putaverunt; ex Chymicis enim edocti sunt, spiritum nitri & spiritum vitrioli, quorum singuli cum per se innocui sint, si tamen invicem misceantur, tertiam quandam substantiam, quam aquam stygiam dicunt, eminenter ac graviter dissolutivam componere ultro experti sunt; Ita sulfuream particulæ cum nitrosis, aut vitriolicis corporibus mixtæ tertium quoddam dissolvens compositum arsenicale elaborant, quamvis sejunctim sine culpa operentur. E contra eminenter coagulant aluminosa & vitriolica opere prismatum octaedricorum, aut parallelepipedorum romboideorum, si supra numerum, pondus ac motum sanguineo fluido misceantur. Cum itaque in massa sanguinis corpora fluant diversæ superficiæ, molis, ponderis & figuræ: hæc cum per se actionibus naturæ proficere apta sint, si tamen accadat, misceri aliquando inter se & uniri particulis, quarum unio ac

Febres
mali-
gnae.

com-

complexus tertiam quandam substantiam elaborat, quæ superficie ac figura venefici corporis figuram ac superficiem construat, non dubitandum, a gravi horum magisterio massam sanguinis aut dissolvi posse, aut coagulari. Cum enim horum momenta, ac vires sint nimis inæqualiter, ac nimis dissimiliter actuosæ contra naturalia momenta, ac vires corporum reciproca ratione miscibilium, efficiunt hæc præternaturalia corpora contactus & percussiones semper nimium inæquales, dissimiles & asymmetras, usque dum dissolutione facta, aut coagulatione, juxta naturas ac momenta corporum seu elementorum agentium (effectus enim semper suis causis adæquatis proportionales sunt) massa sanguinis maligna febris, aut dissoluta corruat, aut coagulata. Hæc tamen febres, quantumvis a dissolutione & coagulatione partiri soleant, nihilominus si harum phenomena & anomalix attentissime expendantur, pro potissima causa offerunt plerumque *dissolutionem texture sanguinis graviolem, quam in cæteris febrium generibus*, pro effectu vero *coagulationem*; enim vero præter ea, quæ de causis febrium inflammatoriarum mox a nobis relata sunt, si aliquam ob causam sive internam, sive externam, sive mixtam scindantur nimis, rumpantur, ac lacerentur filamenta massæ sanguineæ, ut omnino corruat unio & nexus ille, quo componitur reciproca mixtio elementorum: quo nexu pariter elaboratur proportionalis status mixtionis feri cum cæteris quibuscunque elementis elasticis & non elasticis; tunc *Febres malignæ ex dissolutione* fieri arbitrandum est. Verum cum taliter dissoluta textura sanguinis corpora elastica & non elastica esse non possint inter se opportune tangencia ac mixta, corpora quidem elastica non satis, non apte movere poterunt ac urgere inertia corpora, seu non elastica; proinde corpora inertia nullo modo teagere opportune poterunt contra corpora elastica, ut exigit naturalis & æquabilis actio & reactio corporum inter se reciproce miscibilium; ob id ex omnimoda inæqualitate corporum inter se incidentium quocumque tempore semper inæquales ac dissimiles fient anguli incidentiæ cum angulis reflexionum eorundem; proinde cum corpora elastica nimis præpollentia corporibus non elasticis misceri nullo modo reciproca ratione possint, elastica corpora a non elasticis præ-

pollentia momentorum separari continuo conabuntur: inertia inde corpora ab elasticis paulatim sejuncta nimis inter se unientur, hoc autem amplexu graviora reddita lentescunt, majoremque elasticis corporibus resistentiam ferent, aut ex nimio inter se contactu corporum, fient minimi, aut nulli anguli incidentiæ & reflexionis, quapropter aut inæquales & dissimiles semper evenient corporum impactorum & retropulsorum velocitates, aut pene nullæ; proinde diversa & dissimilia semper momenta, aut nulla contingere necesse erit: inertia ergo corpora, aut non opportune, aut lente mora, & omnimoda inæqualitate percussa, nec cum elasticis apte mixta, retardare motum, ac lentescere coacta erunt. Id si eveniat in sinibus menyngeum, aut in præcipuis spatiis membranarum, carinum, aliarumque intercapedinum gravi naturæ damno erit futurum: En ergo a *Causa dissolutionis*, sequens *effectus coagulationis* in aliqua parte. Opera igitur dissolutionis texture sanguinis pulsus fiunt languidi & enerves, ex nervorum sæpissime, vasorumque paralyti, vigiliæ, stilla sanguinis e naribus, diarrhææ, dysenterix; cum vero tam gravis sanguinis dissolutio id fecerit, ut hinc inde coagulationem sanguinis produxerit, eo tempore fient quidem pulsus duri & convulsi, phrenitides, affectiones lethargicæ, linguæ aridæ & siccæ, aliquorum membrorum convulsionem &c. & in utraque morbi differentia periculæ, urinæ confusæ ac turbidæ in conspectum se offerent. Fatemur tamen, aliquando ex paralyti vasorum, ex imminutis nimium viribus corporum elasticorum cum aduicta supra modum inertia, densitate, crassitie ac pondere filamentorum, & corporum non elasticorum malignas febres ex coagulatione, non tanquam ab effectu antecedentis dissolutionis, sed tanquam a primaria causa ob numerum particularum vitriolicarum, aut aluminosarum, præter ea quæ modo diximus, dominantium, esse pariter orituræ; denique advertendum, malignas febres cujuscunque generis, aut debiliores, aut fortiores futuras esse juxta vires ac momenta causarum (aëris potissimum arsenicalibus particulis permixti) diversimode agentium in massa sanguinis.

28. Remanet hæctica febris inter continuas deterior, licet mitior cæteris esse videatur. Hæc plerumque ab intermittensibus febribus

febris, vel a continuis, vel a male curatis, vel nimium productis: pariterque ab obstructionibus viscerum, inertia, aut pravitate succi nervei cum naturali potissimum pulmonarium solidorum laxitate & tenuitate oriri solet; nimius enim sudor in febris continuis & intermittentibus, nimia urinarum copia, aut diarrhoea, aut dysenteria &c. filamenta crassamenti sanguinei enervant, quibus laxatis & enervatis evolvant & deperduntur elastica corpora sulfurea precipue, cum activiora & mobilia sint ceteris, ut oleosa urinarum guttulae indicant: hisce ergo corporibus balsamicis depauperata massa sanguinis cogitur cum pulsu debili ac celeri inepte, lente & ægre misceri, minutoque febrili motu agitari: porro falsa corpora numero, pondere ac momento activiora, nec ab oleosis sulfurum superficiebus juxta reciproca mixtionis rationem opportune involuta, ac lenita, circa proprios axes continuo rotando angulosis superficiebus filamentum crassamenti sanguinei alte erodunt ac lacerant: Serum ulterius tor salibus ferax ab asperæ arteriæ glandulis, & a lymphaticis continuo fluens in pulmonaria spatia, hæc continue sollicitando ac stimulando molestam rursus producit; quinimo sæpe, ac sæpius a numero, pondere ac momento serositatum falsarum continuo fluentium in pulmones, erosa pulmonum filamenta cum respiratione difficili insanabile ulcus asserunt; Seri quoque falsi copia, & attrita jam filamenta sanguinis, utraque opportune mixtioni inepta, nec aptæ nutritioni accommoda immodicis sudoribus exeunt, usque dum deficientibus balsamico sulfure, ac dulci sero medullæ ipsæ ossium, muscoli, carnes, & cutis ipsa vitæ resolutione arefiant.

29. Cum in febris molestissima sitis ægros fere semper torquere soleat, hac data loci opportunitate non spernendum consilium est, rationem & qualitatem potus expendere, ne ægri qualitate & quantitate decepti ingravescant: hoc ultro necessarium putavi, cum nonnulli celeberrimi viri copiosæ & frigidissimæ aquæ potum consulere audacter voluerint, quibus celeberrimus Vallisnerius præceptor meus tanta ratione, doctrina & præcisis experimentis obstitit, ut nil melius, nil fortius dici possit; Cum tanto itaque præceptore pauca, sed opportuna dicere animus est, ut copiosæ frigidissimæ potionis damna, nec non beneficia potus calidi innotescant. Primo itaque flui-

da frigidissima & copiosa vi ponderis alte premunt stomachi fundum; vi autem frigoris fibræ stomachi contrahuntur ac crispantur, ut num. 6. Mechan. Solidor. satis ostensum est, & ultro stomachi spatium minori superficie circumscribi tenetur: cum vero subitanæ pressiones & contractiones fibrarum, seu momenta contractionum præpollentia auferant aut saltem imminuant momenta distractionum earundem, nulla quidem, aut iners fiet actio oscillatoria filamentorum stomachi, quæ ultro communicata sanguini per venas & arterias stomachicas motum hujus vel imminuet, aut tollet, & sæpe, ac sæpius ab imminuto, aut ablato motu parta inflammatione lypiria elaboratur. Secundo, a pressione & frigore ingestarum potionum succi dissolventes a glandulis ventriculi separandi, parta glandularum inertia, quodammodo stagnant, immo impediunt, ne novi dissolventes succi opportune separati necessariam ciborum solutionem promoveant, quinimo peristaltico motu ventriculi, aut imminuto, aut læso non ultro promoventur ingesta, sed diutius retenta acescent, & corrumpuntur dolore stomachi molestissimo. Tertio, in frigidissimis potionibus particulæ aeris contentæ, nec non in cibis & potionibus, & hæc in ventriculo contracto collectæ, durante frigoris momento, ab hoc compressæ fiunt, & contrahuntur in minora volumina; paulatim vero a calore viscerum circumscribentium coguntur expulso frigore quamproxime rarefieri in ratione composita densitatum aeris, densitate corporum calidorum agentium, & ex duplicata ratione agitationis corporum eorundem; cum vero vires elasticæ aeris quaquaversus expandi debeant, manifestum est ex tam adauctis rarefactionum viribus, summo nisu ac momento membranosos ventriculi parietes, jamjam contractos per quamcunque directionem arctandos ac percutiendos fuisse, ut dolores ac tormina, & convulsiones aliquando acerrimæ superveniant: ab hisce doloribus ac torminibus ultro augetur fibrarum contractio, impeditoque, aut imminuto per gastricas venas ac arterias sanguinis circulo facillime supervenire lypiriam necesse est. Quarto, contractis stomachi fibrillis, & nimis refrigerata ventriculi superficie, hepatis quoque superficies partim contactu, partim consensu contrahitur & frigescit, ob id glandulæ hepaticæ lentiori motu agentes separationi corporum ægre obediunt, & obstru-

obstructæ tumores, scirrhus, inflammationes facile generant; proinde praxi medica experti sumus in febrili frigoris accessione, aquam quantumvis non frigidissimam incaute nimis epotam obstructions in visceribus stomacho adjacentibus, aut consentientibus facillime attrulisse; ex similibus enim portionibus contractis ventriculi membranis, & consensu fibrarum, membranarumque conspirantium communicata contractione glandulis viscerum adjacentium, hepatis videlicet, lienis, omenti & mesenterii &c., hæ pari lege contractæ, crispataque non ea momenta distractionis & contractionis naturalia exercere possunt opportuna æquis motibus, justisque separationibus fluidorum; quamobrem homogeneæ fluidorum particulæ cum heterogeneis commixtæ, ac confusæ in glandulis viscerum, aut lente separabuntur, aut consistent, ut gravissimis tumoribus indurescant.

30. Hisce itaque vitiis fluidorum & solidorum reparandis celeberrimus Vallisnerius moderate calidorum aut tepescentium fluidorum usum sapienter consuluit, quorum opera momenta distractionis & contractionis fibrarum omnium in ratione homologa agunt & reagent, promoventur separationes corporum, sanguinis circulus sustinetur, & universale stomachi magisterium roboratur. Fatetur tamen immortalis famæ præceptor, aliquando frigidissimas potiones concedi posse, dummodo ætas, temperies & calidissima temporis & morbi constitutio permittant; sed caute, opportunis temporibus morbi, & debita quantitate, ac pondere tam grave suspectumque negotium agendum esse, utilissimo tractatu edocuit. Imposterum *Mechanices Remediorum* studio ac labore exaratæ, Deo juvante, viam aperiemus.

FINIS MECHANICES MORBORUM.

DE MECHANICA

MEDICAMENTORUM.

CUM de *Mechanica Medicamentorum* verba facere diu animus esset, dicendarum rerum gravitate perterritus, quasi ab hac salebrosa provincia declinare decreveram: Verum in hac re cogitanti occurrit me exercitii, ac studii gratia *Mechanicam Morborum* adumbravisse, quæ cum necessariam etiam remediõrum mechanicam postularet, tandem aliquando studii pariter, ac exercitii gratia coactus esse debueram hanc quoque *Medicamentorum Mechanicam* adumbrare.

Scio quidem medicamenta præeuntibus ratione, & experientia eligenda esse morborum indicationibus proportionalia; electa autem cum fuerint, & applicata agrotantibus, arduum quidem esse intelligere, quomodo agant, & reagant in organa machinæ animalis: Quamvis autem negotium hoc plenum ambagibus esse videam, nihilominus juxta virium tenuitatem conabor de actionibus, & reactionibus, seu viribus medicamentorum disputare, si non vera, saltem probabiliora assecuturus: Pro hoc itaque argumento claritas materiæ postulat, ut nonnullæ suppositiones præmittantur, quæ aut veræ, aut verisimiles a Philosophis, ac Medicis ratione, & experientia utentibus haberi solent.

SUPPOSITIO I.

OMNIA principia fluidorum animalis potissimum in massa sanguinis, quæ lato modo elementa etiam dici possunt, alia sunt *actuosa*, & *elastica*, alia vero sunt *inertia*, & *non elastica*; inter actuosa, & elastica numeramus particulas aëreas, sulphureas, & globulos plano-ovales; inter vero non elastica, & inertia numeramus aquam, salia cujuscumque generis, & terras damnatas (si quæ fuerint,) ut in tertia parte *Mechanices Morborum* num. 3. indicavimus.

EX datis Anatomicis certi sumus, fibras animalium esse partes primo simplicissimas instar fili tenuissimi; ex hisce autem simplicissimis fibris efformari alias magis compositas, quarum alie sunt carneæ, alie membranose, alie tendinose, alie nerveæ &c., quæ varia figura donatæ sunt; alie enim sunt rectæ, alie oblique, alie curvæ, alie spirales &c.

SUPPOSITIO III.

CUM fibræ compositæ ab effectis cognoscantur elaboratæ, aut undequaque permixtæ ex canaliculis varii generis venosis, arteriosis, lymphaticis, & nerveis; vel ex unione, & contactu fibrarum inter se tangentium elaborentur canales varii generis; cumque ulterius constet varia esse fluida sanguinea, lymphatica, & nervea; ideo supponimus hujusmodi fibras esse repletas fluidis variz indolis, a quibus fibræ irrigantur, nutriuntur, crescunt, conservantur, & moventur.

SUPPOSITIO IV.

CUM fibra compositæ efformentur ex multiplici unione, contactu, & aggregato aliarum textura, mole, figura similia, & dissimilia, quæ tamen omnes una conveniunt in formatione unius compositi fibrosi; ideo tale compositum fibrosum considerabimus cum Philosophis, Medicis, Anatomicis, ac Mechanicis, ut solidum cylindricum, aut quasi cylindricum suis fluidis opportune repletum. Ita assumit celeberrimus Joannes Alphonfus Borellus prop. 71. secundi tomi *de motu animalium*, arterias & venas consideratis excessu, & defectu earundem esse cylindricas. Hisce præmissis dicendarum rerum gratia liceat sequentes propositiones physico-mechanicas addere, ut istarum beneficio dicenda probabiliori ratiocinio statuatur.

PROPOSITIO I.

SI fibra percussa, aut impulsæ a potentia distrahatur, & elongetur; distractio seu elongatio fibræ erit ut potentia percussiva, aut impellens.

Etenim distractio, seu elongatio fibræ est physice proportionalis numeris molecularum

larum ductis in motum distractionis, seu elongationis ejusdem: sed fibra percussa, aut impulsæ a potentia est physice æqualis, & proportionalis numero particularum ducto in summam motuum distractionis, seu elongationis fibra ipsius, quæ a potentia ipsi imprimitur; ergo si fibra percussa, aut impulsæ a potentia distrahatur; & elongetur; distractio, seu elongatio fibra erit ut potentia percutiens, aut impellens.

Corollarium.

Cum in statu naturali distractioni, seu elongationi fibra factæ a potentia percutiente, aut impellente æqualis, & proportionalis esse debeat contractio, seu abbreviatio subsequens ejusdem: ideo contractio, seu abbreviatio fibra, & restitutio ad suum statum naturalem post distractionem erit quoque ut potentia, quæ antea fibram distraxerat: natura enim cum velit perfectionem suarum actionum, & reactionum; ideo jure suo semper amat æquilibrium suorum motuum distractionis, & contractionis fibrarum earundem.

PROPOSITIO II.

SI fibra fuerint crassitie æquales, sed longitudine inæquales, istæ autem percussæ a potentiis æqualibus distrahantur, seu elongentur, distractiones fibrarum erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Etenim distractiones, seu elongationes sunt physice proportionales numeris particularum ductis in motus distentionum, seu elongationum earundem: sed fibra crassitie æquales, sed longitudine inæquales motæ, aut percussæ ab æqualibus potentiis impellentibus sunt physice, ut numeri particularum fibras componentium ducti in summam motuum distentionum, seu elongationum inæqualium fibrarum ipsarum; ergo fibra crassitie æquales, sed inæquales longitudine motæ, aut percussæ ab æqualibus potentiis erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Aliter. Fibra crassitie æquales, sed inæquales longitudine sunt ut cylindri (per Suppositionem quart.) æqualium basium, inæqualium vero altitudinum; seu elongationum percussæ a potentiis æqualibus: sed cylindri æqualium basium, longitudinum vero inæqualium sunt (per 14. 12. Eucl.) ut

altitudines, seu longitudines, & elongationes eorundem; ergo fibra crassitie æquales, sed longitudine inæquales motæ, aut impulsæ a potentiis æqualibus, erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Corollarium.

Cum in statu naturali, per corollarium primæ propositionis, distractioni, elongationi, seu longitudini fibrarum esse debeat admissim æqualis, & proportionalis contractio, seu abbreviatio ipsarum; ideo si fibra distractæ a potentiis æqualibus fuerint crassitie æquales, sed longitudine inæquales, contractiones, seu abbreviationes ipsarum post distractiones erunt in ratione longitudinum, seu elongationum fibrarum earundem.

PROPOSITIO III.

SI fibra fuerint crassitie inæquales, longitudine vero æquales, istæ autem distrahantur, & elongentur æqualiter a potentiis æqualibus, distractiones, seu elongationes erunt in ratione crassitierum, seu basium fibrarum, seu in duplicata ratione diametrorum crassitierum, seu basium earundem.

Fibra enim crassitie inæquales, longitudine vero æquales, si elongentur, & distrahantur æqualiter quoad longitudinem a potentiis æqualibus, sunt ut solida cylindrica (per Suppositionem quartam) longitudine æqualia, crassitiibus vero, seu basibus inæqualia: sed cylindri longitudine æquales, crassitiibus vero, seu basibus inæquales se habent ut bases (per corollarium prop. XI. 12. Eucl. Tacquet;) ergo fibra, quæ motæ, ac percussæ a potentiis æqualibus distrahantur, & elongentur æqualiter quoad longitudinem, erunt inter se ut crassities, sed bases cylindrorum sunt circuli, & hi per secund. prop. 12. Euclidis, sunt in ratione duplicata diametrorum; ergo bases, seu crassities fibrarum cylindricarum æqualiter distractarum, seu elongatarum a potentiis æqualibus, quæ fuerint longitudine æquales, crassitiibus vero, seu basibus inæquales habebunt distractiones, seu elongationes earum in ratione duplicata diametrorum crassitierum, seu basium earundem.

Co.

Corollarium.

Si fibra crassitie inæquales æquales vero fuerint longitudine, distracta autem, & elongata fuerint a potentiis æqualibus; contractiones ipsarum post distractiones erunt quoque in statu naturali in ratione crassitierum, seu basium, seu in ratione duplicata diametro- rum crassitierum, seu basium earundem.

PROPOSITIO IV.

Fibra distracta & elongata a potentia impellente, aut percutiente ad eandem fibram non distractam, est in ratione composita ex ratione directa potentie impellentis, aut percutientis, directa longitudinis fibra distractæ ad eandem fibram non distractam, & reciproca ratione crassitiei ejusdem fibra non distracta ad fibram eandem distractam.

Sit enim fibra cylindrica KCM in statu naturalis longitudinis, cujus crassities, seu basis sit KCO, longitudo KM; hæc autem fibra a potentia A impellente impellatur, aut percutiatur, ita ut distracta elongetur, & efficiat fibram cylindricam VGN, cujus basis, seu crassities sit VGS, longitudo VN, dico quod distractio, seu elongatio fibra VGN facta a potentia A impellente ad eandem fibram KCM non distractam, est in ratione composita ex ratione directa potentie A impellentis, seu percutientis, directa longitudinis VN fibra distracta VGN ad longitudinem KM non distracta, & ex ratione reciproca crassitiei, seu basis KCO fibra non distracta KCM, ad crassitiem, seu basim VGS fibra VGN distracta.

Etenim cum fibra cylindrica KCM in statu naturalis longitudinis sit ipsamet ex hypothesi, quæ a potentia A impellente, aut percutiente elongatur, & distrahitur in fibram cylindricam VGN, erunt istæ duæ fibra cylindricæ KCN, VGN ut duo cylindri æquales, sed cylindri æquales (per 15. 12. Eucli.) reciprocant bases, & altitudines; ergo ita erit longitudo MK cylindri KCM non distracti, ad longitudinem VN cylindri distracti VGN a potentia A, ut reciproce est basis, seu crassities VGS ejusdem fibra cylindricæ VGN distracta ad basim, seu crassitiem KCO fibra cylindricæ non distracta KCM: sed longitudo VN fibra elongatæ, & distracta VGN est ut potentia A impellens (per primam prop. hujus)

Sydenham Opera Med. Tom. II.

Cilindri autem KCM, & VGN æquales componuntur reciproce ex his, ex quibus per multiplicationem efficiuntur perexpositam xv. prop. 12. Euclidis; ergo fibra cylindrica VGN distracta, & elongata a potentia A impellente, aut percutiente ad eandem fibram cylindricam KCM non distractam, sed in naturali statu constitutam est ratione composita ex ratione directa potentie A impellentis, aut percutientis, directa longitudinis VN fibra distracta VGN ad longitudinem KM fibra non distracta KCM, & reciproca ratione basis, seu crassitiei KCO fibra non distracta ad basim, seu crassitiem VGS fibra distracta, & elongatæ a potentia A. Q. E. D.

DISSERTATIO PRIMA.

De Motu elastico, seu oscillatorio Fibrarum in genere.

Cum fibra compositæ sint elaboratæ ex multiplici unione, & aggregato fibrillarum, & vasorum cujusunque generis, in quibus continentur, & fluunt fluida sanguinea, lymphatica, & nervea, cumque hæc donata sint particulis elasticis, & non elasticis, (per primam Supposit.), ergo necessario hæc fluida elatere prædita communicare debebunt motum elasticum, aut quasi elasticum fibris ipsis circumscribentibus fluida ipsa: Etenim ex mechanicis effectus sunt causis suis adæquatis proportionales: sed fluida contenta fluentia per fibras elasticæ sunt causæ, quæ agunt, & reagent in fibris, & in fibras circumscriptas, seu continentibus: ergo effectus, seu impetus communicati fibris continentibus elasticis, aut quasi elastici erunt futuri. Cum autem motus elasticus, aut quasi elasticus possulet jure suo motum compressionis, seu contractionis, cui vicissim respondet proportionalis motus dilatationis, seu distractionis, per definitionem 48. Vvolffii *de motu corporum ex percussione*; ergo motus elasticus fibrarum erit motui compressionis, seu contractionis, & vicissim motui dilatationis, seu distractionis earundem proportionalis, seu sub alio nomine aquipolens erit, & similis motui oscillatorio earundem, ut colligitur ex definitione 34. Vvolffii *de motu pendulorum*.

2. Tanto itaque operi elastico, aut quasi elastico.

Q q

elastico, sive oscillatorio, aut quasi oscillatorio fibrarum conspirat ipsamet naturalis structura, & organica constitutio ipsarum; fibra enim compositæ elaborantur ex fibrillis, quarum alie sunt circulares, alie rectæ, & inter se parallelæ, quæ circulares secant ad angulos rectos (per secundam Suppositionem;) nonnullæ alie oblique, quæ priores ad angulos obliquos intersecant, denique alie sunt spirales, quæ fortitudinis gratia fibras omnes circumligant. Cum itaque fibra universæ tam a motibus internis, quam ab externis objectorum, nec non a progressivis viventium animalium impelli, ac moveri, & diversimode inflecti necessario debeant; ideo fibra universæ juxta varias directiones, flexiones, & inflexiones, cum multiplices efficiant angulos, variasque curvaturas acquirant, futuræ erunt in continua mutatione angulorum, & curvaturarum, acquirendo modo majores, modo minores, modo æquales angulorum, & curvaturarum mensuras. Verum cum majoribus angulis fibra oppositæ, quæ se habent, ut opposita latera angulorum magis distractæ, & elongatæ fiant, ideo cum ad ultimum terminum suæ naturalis distractionis pervenerint, conabuntur in statu naturali constitutæ ad naturalem contractionis statum, seu ad naturales suos angulos sese restituere. Istæ autem distractiones, & proportionales contractiones fibrarum cum successiva vicissitudine angulorum modo majorum, modo minorum fieri debeant, profecto exercere debent successive actiones, & reactiones similes, & æquales actionibus distractionum, & reactionibus contractionum fibrarum simili lege corporum elasticorum, & oscillantium methodo pendulorum.

3. Similiter si anguli fuerint minores, tunc fibra eadem oppositæ, quæ se habent ut latera opposita angulorum, contractæ reddentur, & abbreviatæ; etenim fibra universæ suis donantur porositatibus, spatiolis, sive areis intermediis, quæ cum stringi, ac claudi possint; ideo opportunum contractioni locum dabunt, quotiescunque fibra minoribus angulis oppositæ contrahi teneantur. Cum autem momentum contractionis tale fuerit, ut clausis porulis, ac spatiis fibrarum fibra contractæ devenerint ad ultimum suæ contractionis, tunc cum amplius contrahi non possint fibra elasticæ, coactæ erunt in statu naturali constitutæ ad naturalem suæ distractionis statum, seu ad majores angulos rursus se se restituere; quæ

contractiones fibrarum & proportionales distractiones ipsarum cum successiva vicissitudine motuum fieri debeant; ideo sequi debent successive reactiones contractionum proportionales actionibus distractionum fibrarum simili lege corporum elasticorum, & oscillantium methodo pendulorum.

4. Quod autem fibra contracta restrictis, & clausis porulis, ac spatiis fibrarum cum pervenerint ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, coactæ sint ad naturalem suæ elasticæ distractionis statum se se restituere; pariterque fibra eadem distracta cum pervenerint ad ultimum terminum suæ elasticæ distractionis, coactæ sint naturalem statum suæ elasticæ constrictionis repetere, constare videtur primo a natura ac lege corporum elasticorum, quæ quanto compressionem patiuntur, tanto acquirunt dilatationis, & distractionis; deinde certum est quod fibra contracta ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, & eadem fibra cum distracta fuerit ad ultimum terminum suæ elasticæ distractionis, se habent ut duo cylindri æquales: sed cylindri æquales reciprocant bases, & altitudines (per 15. 12. Euclidis); ergo fibra elasticæ contracta quanto erit minor longitudine, seu altitudine, eo mole, & crassitie erit major; & eadem fibra cum elasticæ distracta fuerit, quanto fiet mole, & crassitie minor, tanto fiet major longitudine; quare ita erit major moles fibra contracta ad minorem molem ejusdem fibra distracta, ut reciproce est major longitudo hujus fibra distracta, ad minorem longitudinem ejusdem fibra contracta, consequenter patebit elasticæ contractam oppositam angulis minoribus, sed mole majori redditam, hanc mole & crassitie adauctam elatere suo comprimere debere fibras sibi proximas, tangentes, & e directo oppositas, & ab iisdem proportionaliter urgeri, & elasticæ comprimi; quamobrem cum hæc fibra contracta perventa fuerit ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, & majorem molem, ac crassitiem acquisiverit, tunc hæc coacta erit ab ultimo termino suæ elasticæ contractionis transire postmodum ad naturalem statum suæ elasticæ distractionis, non solum beneficio elateris sui, verum etiam opere, & vi externa fibrarum adjacentium, tangentium, & e directo oppositarum adauctas moles, & crassities fibrarum elasticæ comprimantium.

5. Similiter cum fibra hæc elongata, &

oppe.

opposita majoribus angulis elastice pervenerit ad ultimum terminum suæ naturalis longitudinis, tunc cum hæc elasticum conatum, & impulsus secerit in fibras sibi proximas, tangentes, & oppositas basibus cylindrorum, & ab iisdem proportionaliter elastice urgeatur, & comprimatur, coacta erit non solum beneficio elateris sui, verum etiam opere, & vi externa fibrarum tangentium, & oppositarum basibus cylindrorum transire ab ultimo termino suæ elastica distractionis ad naturalem statum suæ elastica contractionis.

6. Favet ulterius motui elastico, & oscillatorio fibrarum animadversio Borelli prop. 70. de vi percussionis, in qua demonstratur, quod in fibris universis quanto in inflexionibus, & curvitatibus fibrarum superficies convexæ augentur, & crescunt, tanto superficies in parte concava stringuntur, contrahuntur, & clauduntur; quomobrem cum fibra interna in parte concava redditæ fuerint adeo strictæ, & angustæ, ut ad ultimum terminum suæ contractionis, & compressionis devenerint, cogentur & opere elateris, & fibrarum constrictarum ad naturalem statum suæ elastice distractionis sese restituere; hinc hac successiva vicissitudine motuum constrictionis, & dilatationis superficierum in parte convexa, & concava, eadem sequi debebunt phænomena, quæ exposuimus opere majorum, aut minorum angulorum.

7. Hæc ultro ostenduntur ab elasticis machinulis rhomboidalibus, cum celeberrimo Borello; aut sphaeroidalibus, cum immortalis famæ Bernoullio, quibus compositæ fibra in flexionibus, & inflexionibus, in curvitatibus, & reliquis motibus animalium machinulæ istæ elastica comprimantur, & elastico nisu proportionaliter debeant dilatari, profecto hæc elasticum, & oscillatorium fibrarum motum omnino patefacient.

8. Denique satis superque hunc elasticum, & oscillatorium fibrarum motum ab experimentis ipsis edocuit Bellinus prop. 1. de villo contractili scribens, per totum tempus quo animalia vivunt sive in aquis, sive in aëre, sive in solo degant, vi contractionis, & distractionis aguntur ipsorum musculi, ipsorumque partes sentientes. Et sane fateor me summa cum admiratione observavisse in bove, cui recenter abscissum fuerat collum, universas colli fibrillas continuo & successivo motu contractionis, & distractionis oscillavisse, ita ut hujusmodi

elastica oscillationes secundum distractionem, & successivam contractionem per horam circiter manifestissime perduraverint.

9. Ab his ergo quæ hic dicta sunt, & quæ secunda parte *Mechanices Morborum* à num. 4. usque ad num. 8. enunciata fuerunt, colligere jure ac merito possumus modum elasticum, seu oscillatorium fibrarum esse radicem, ac causam motus peristaltici intestinorum. Animadvertendum inde est, hunc motum oscillatorium in aliquibus fibris esse majorem, ut in fibris intestinalibus, in aliquibus minorem; in aliquibus vero minimum juxta majores, aut minores, aut minimas angulorum, aut superficierum mensuras, & impetum majorem, aut minorem fluidorum, & corporum impellentium. Quomobrem scitote ex naturæ legibus amanti æquabilitatem, & proportionem motuum tam in fluidis, quam in solidis, in statu naturali singulas fibrarum oscillationes aut majores, aut minores, aut minimas, semper juxta suam naturam, evenire isochronas, & æquabiles; hinc si diaphana essemus corpora, profecto admirando, & jucundo spectaculo videremus fibras universas vario oscillationum gradu abbreviari, & elongari magis, aut minus juxta majorem, aut minorem quantitatem fluidorum agentium, & reagentium, & juxta majorem, aut minorem vim, & sollicitationem corporum internorum, aut externorum, aut utrorumque contra fibras; servata semper juxta suos gradus motuum æquabilitate.

10. Ultimo colligere possumus fibras cujuscunque generis, quæ vel vasa componunt, vel se habent ut vasa æquabilibus, & isochronis suis oscillationibus semper promovere & impellere æqualia fluida, temporibus quoque æqualibus per has fibras transeuntia, ita ut in statu naturali nulla fluidi transeuntis portio detineri debeat, præter illam minimam, quæ nutritioni inservit, sed tota transiens æqualiter, & isochrone promoveatur ulterius temporibus æqualibus operibus natura famulatura.

DISSERTATIO II.

In quo consistat Sanitas, & Aegritudo.

11. **C**um natura sit sapientissima geometra omnia disponens numero, pondere, mole, figura, motu, & tempore, necessarium erat ipsam quoque amare voluisse proportionem in quibuscunque physicis operibus machinæ animalium secundum numerum, pondus, molem, figuram, motum, & tempus. Fateor hic me a rigore geometricæ proportionis præscindere, eam tantummodo proportionem intelligens, quæ cum aliqua latitudine servet tamen unitatem compositi; cum ergo in proportionem nitatur unitas, & ordo naturalis compositionis tam in fluidis, quam in solidis, cumque proportio æqualitatis, aut quasi æqualitatis momentorum corporum componentium potissimum sit illa, quæ primario inserviat, & conferat majori, & perfectiori nexui, unitati, & ordini pro acquirendo æquilibrio, aut quasi æquilibrio corporum inter se gratia valitudinis obtinendæ, & conservandæ; ideo in præsentem opera pretium erit, ut Physico licet, considerare quomodo obtineri possit his necessarius nexus, hæc necessaria unitas, hic necessarius ordo, seu hoc æquilibrio, aut quasi æquilibrio tam in fluidis, quam in solidis inter se, ut in machina animali opportuna sanitas habeatur, & conservetur. Cum itaque natura geometra totis viribus amet, ac velit sustinere, ac conservare animalia in perfecto sanitatis statu constituta, ideo æquilibrio, aut quasi æquilibrio fluidorum primo firmare decrevit; Quamobrem non tædeat primo expendere fluidum sanguineum, cum hoc sit basis, fons, & origo reliquorum fluidorum, a quibus omnibus universæ actiones vel sanæ, vel ægræ cognoscendæ potissimum sunt, nec non solidorum omnium nutritiones, vires, motus, ac momenta.

12. Apertum est itaque ab experimentis fluidum sanguineum compositum esse ex corporibus similibus, & dissimilibus numero, mole, pondere, & figura, & ex corporibus fibrosis retis in modum dispositis; hoc ergo in limine liceat colligere admirandum naturæ artificium in naturali massæ sanguineæ compositione. Cum natura indigeat in hoc fluido sustinere, & conservare quan-

tum possibile est unionem, & nexum particularum componentium, multiplici artificio, ac opere uri voluit, ac debuit; quorum primum externum est, quod desumitur a canalibus; secundum colligitur a fibrosa, & reticulari compage ejusdem crassamenti sanguinei; tertium a geometrica mixtione, ac dispositione particularum sanguinis in ratione reciproca, aut quasi reciproca ipsarum; quartum denique ab universalis aeris circumambientis pressione.

13. Ad primum quod attinet: canales arteriosi cum conicam figuram describere videantur transeundo successive a sectione majori ad minorem, sunt ipsi, qui sanguineum fluidum excipiunt a corde; sanguis itaque a corde impulsus momento quidem maximo, & ratione musculi cordis impellentis, & ratione elastica particularum sanguinis impulsu non unionem, & nexum, sed dissolutionem acquireret summo naturæ periculo, nisi arteria conica sub figura elaboratæ unioni, & nexui sanguinis primo succurrerent; & sane cum conicæ arteria a basi successive decrescant quoad diametros, & peripherias in ratione arithmetica, sectiones autem sive areæ ipsis diametris respondentes successive decrescant in ratione quadrata suorum diametrorum, manifestum erit, quod si diameter basis arteria fuerit ut 10, successive autem decrescant diametri fuerint ut 9, ut 8, ut 7, ut 6, ut 5, ut 4, &c.; sectiones istis diametris successive decrescantibus respondentes futuras esse ex geometricis in ratione quadrata decrescanti videlicet ut 100, ut 81, ut 64, ut 49, ut 36, ut 25, ut 16, &c.; Ex tot autem sectionum, sive arearum decrementis unusquisque intelliget quantum moles sanguinis coacta transire a sectione majori ut 100. ad sectiones successive minores, & decrescantibus in ratione, ut indicavimus, quadrata diametrorum ipsis respondentium densari, ac stringi debeat, & in unionem, ac nexu detineri, ita ut massa sanguinis successive densior, strictior, & collectior reddenda sit.

14. Neque obstat transitus sanguinis ab arteriis conice decrescantibus in venas, quæ sunt conica spatia successive crescentia in ratione similiter quadrata suorum diametrorum: etenim sanguis ab arteriis delatus in venas in exposita ratione crescentes deferatur absque notabili unionis, & naturalis nexus detrimento: omnia enim experimenta in hoc convenire videntur venosum sangu-

guinem multas particulas actuosas, volatiles, & elasticas deperdere in multiplici circulatione, in nutritione partium, & transpiratione, propterea ceteris paribus venosum sanguinem multo minoris momenti esse sanguine arterioso; Hinc natura geometra utens proportionem quantum potest, tantum majoris spatii tribuere debuerat sanguini per venas effluxuro, quantum proxime amiserat virium, & momentorum in circulatione, in nutritione, & transpiratione; jure itaque, ac merito natura consulit augere in venis tantum spatii, quantum reciproce, aut quasi reciproce deperdiderat sanguinis motus, & elateris, ut sanguis in venis, & beneficio majoris spatii, & valvularum per venas effusarum æquabili cursu, aut quasi æquabili, ac in arteriis, cesset circulatorius: Cum ergo æquabilitas motus sanguinis in venis sustineatur, & conservetur, ac in arteriis, colligere justo possumus unionem, & nexum massæ sanguinis in venis pariter esse conservandum, ac in arteriis pro universali unionem, & nexu fluidi sanguinei in machina animali.

15. Verum si juxta Boëllum considerare voluerimus tam arterias, quam venas, ut canales, qui, consideratis excessu, & defectu inter se proportionalibus, apti sunt constituere ordinem, ac legem motuum cylindricis canalibus proportionalem, juxta quartam Suppositionem; profecto cum in tali suppositione æquabilitas, & proportio motuum, & momentum compositi sanguinei tam in arteriis, quam in venis sustineri debeat, & conservari, nullum certe vitium dissolutionis, sed proportionale quaquaversus beneficium unitatis, nexus, & ordinis sanguinei compositi tam in arteriis, quam in venis erit oriturum.

16. Deinde tantum cordi fuit natura sustinere, ac conservare expositam unionem, & nexum particularum sanguinis inter se, ita ut texturam sanguinis amaverit, munitam fibrosis, & reticularibus filamentis: ocularia enim sanguinis experimenta satis superque ostendunt adesse hujusmodi reticulares fibrillas, præter ea quæ attentissime observaverunt celeberrimi viri Boileus, Levenochius, & Malpighius; Isti itaque fibrarum ordines effusi per longitudinem, & latitudinem compositi sanguinei, & parallelis positionibus dispositi, reticulares figuras describunt unionem, & nexum sanguineis particulis donaturi: Cum vero fibrosum hoc sanguinis crassamentum varias subeat

canalium pressiones, varios impetus corporum elasticorum, & non elasticorum, & multiplices vasorum inflexiones, & curvitates, per quas fluere debet, ideo fibrosa reticulares areæ esse necessario debebunt in continua mutatione angulorum: Quamobrem si istæ areæ fuerint quadratæ ex mutatione angulorum oppositorum rhombos describent, ut inde in figuras quadratas restituantur; quod si areæ fuerint quadrilateræ ex mutationibus pariter angulorum oppositorum evenient rhomboideæ in quadrilateras postmodum restituendæ.

17. Neque credendum est, has continuas angulorum mutationes in fibris crassamenti sanguinei parere posse divisiones, & dissolutiones corporum componentium, etenim potius unionem, & nexum alie donant; areæ enim reticulares positæ in continua mutatione angulorum ex legibus hyposupermetris successive majores, & minores fiunt; cum vero in transitu majoris areæ ad minorem sequi debeant in particulis elasticis, & non elasticis modo magis, modo minus contentis majores contactus, pressiones, & miscellæ corporum contentorum inter se, ideo non leve beneficium ab hisce mutationibus angulorum erit secutum; & sane natura, cum recte operetur, tali proportionem permiscere debet particulas elasticas, & non elasticas inter se, ita ut evenire debeant momenta corporum massæ sanguinis in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis: sed hæc æqualitas, aut quasi æqualitas momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum inter se similem, & dissimilem neque haberi, neque concipi possunt, nisi elementa componentia ex geometricis tali ordine, ac proportionem misceantur, ita ut hæc proportio sit reciproca, aut quasi reciproca corporum inter se; ergo colligere poterimus, naturam geometram amantem unionem, & nexum elementorum sanguinem componentium in motibus sanguinei compositi tali proportionem reciproca, aut quasi reciproca miscere voluisse ac debuisse elementa elastica, & non elastica massæ sanguinis, ut ab hac reciproca mixtionis methodo momenta corporum elasticorum, & non elasticorum inter se evenirent æqualia, aut quasi æqualia, æquiponderantia, aut quasi æquiponderantia inter se.

18. Quod exposuimus usque adhuc de mixtione elementorum sanguinis in ratione reciproca, aut quasi reciproca; simile dicendum erit de elementis componentibus lym-

lympham fluentem per canales lymphaticos & de componentibus succum nerveum fluentem per nervos, quæ duo fluida cum fecerantur a fluido sanguineo tanquam basi fluidorum omnium machinæ animalis, ideo sub iisdem, aut similibus legibus proportionum debent considerari, ut perfecta sanitas habeatur, & conservetur.

19. Denique tanto operi unionis, & nexus elementorum sanguinis alte succurrit universalis; & æquabilis pressio atmospheræ, quæ universa non solum fluida, sed etiam solida quaquaversus, & æquabiliter circumscribens, & comprimens, determinatum pressionis momentum producit, unde determinata unio, & nexus tam in fluidis, quam in solidis opportune consequatur.

20. Descendamus modo ad solida organica; solida enim omnia cum in statu naturali constituta conspirare unice debeant ad unitatem, & nexum omnium componentium machinæ animalis sustinendum, & conservandum; idcirco vel mole, vel numero, vel momentis &c. suas vires exercere debent, quæ sint æquipollentes, aut quasi æquipollentes moli, numero, & momentis &c. aliarum partium, quæ sint prioribus partibus similibus respondentes: Cum itaque hæc fuerint, tunc solida inter se æquabilem, aut quasi æquabilem proportionem momentorum habebunt inter se. Ulterius contractiones, & distractiones solidorum ipsorum fient æquabiles, & isochronæ, propterea huiusmodi solida tali proportionem æquabili, aut quasi æquabili constituta communicando impetus, & pressionem canalibus cujuscunque generis æquabiles, & isochronas communicare, & conservare debebunt æquabilem, & isochronum motum fluidis quibuscunque in machina animali; Vicissim cum fluida cujuscunque generis fuerint in naturali statu, ac proportionem æquabili, aut quasi æquabili constituta, hæc proportionales impetus communicare, & ipsa debebunt solidis ipsis continentibus; idcirco cum juxta talem ordinem, ac proportionem sequantur actiones, & reactiones tam fluidorum in solida, quam solidorum in liquida cujuscunque generis; hinc in statu naturali perfectissimæ sanitatis tam proportio reciproca, aut quasi reciproca momentorum particularum sanguinis, & fluidorum inter se, quam homologa ratio fluidorum, & solidorum pariter inter se, itemque solidorum unius generis, & solidorum alte-

rius homologa proportio habenda erunt pro actionum, & reactionum tam in fluidis, quam in solidis æquilibrio, aut quasi æquilibrio acquirendo, & conservando, ut sanitas habeatur, & conservetur. Similes proportionum leges tam in fluidis, quam in solidis putaverim intellexisse Hippocratem, cum libro de alimento docuerit, *consonantiam, & dissonantiam esse sanitatis, & morbi signa*.

21. Quamobrem hiis legibus statuta ratio sanitatis facile hæc alterabitur, aut perdetur, cum vel momenta elementorum sanguinis, aliorumque fluidorum notabiliter declinaverit a proportionem reciproca, aut quasi reciproca ob vitium numeri, aut molis, aut ponderis, aut figuræ elementorum fluida componentium, aut ob vitium densitatis, laxitatis, & asperitatis ipsorum, vel cum homologa proportio inter fluida, & solida notabile vitium fecerit, tunc enim ægritudines, & morbi necessario sequi debent: hoc enim in statu elementa fluidi sanguinei non perfecte inter se permiscuntur, non sunt intimi contactus, non intimi occurfus particularum, neque intimæ, & æquabiles actiones, & reactiones earundem inter se; quamobrem in contactibus, & occurribus corporum inordinatis, inæqualibus, & assymetris actiones, & reactiones evenient inordinatæ, inæquales, & assymetræ, everseque unitate, ac perditio nexu, & æquilibrio corporum omnia ad divisionem, & dissolutionem sanguinei compositi inclinare videbuntur; ab hisce autem consequentur alterationes, & paulatim vitiosæ miscellæ, ac vitiosi status in reliquis fluidis lymphaticis, & nervosis, quæ a vitioso sanguine continuo secernuntur.

22. Pariter si organica solida vel numero, vel mole, vel pondere; vel superficie, vel situ, vel motu &c. peccaverint, tunc solida vel nimis laxa, vel nimis rigida, vel nimis densa, vel vitiose conformata organicas ægritudines erunt productura, quæ ut plurimum ob improprietatem solidorum cum fluidis parere quoque potuerunt plurimos morbos fluidorum graviore animalium detrimento.

23. Ex hisce omnibus primo necesse est colligere, quod cum in vero sanitatis statu momenta fluidorum debeant esse in æquilibrio, aut quasi æquilibrio constituta, pariterque solida esse debeant inter se, & cum fluidis proportionalia; ideo corpus in vero sanitatis statu constitutum sentire debet se in omnibus suis partibus æquabiliter leve,

ve, æquabiliter forte, æquabiliter constans, æquabiliter mobile.

24. Similiter cum in statu ægritudinis momento fluidorum agent, & reagant sine æquilibrio, neque proportionalia sint motibus solidorum, neque solida inter se aptam proportionem habeant; ergo animal statu ægritudinis sentire debet, aut pati vel in toto, vel in parte nescio quid vel gravioris, vel præternaturaliter levioris, vel laxioris, vel durioris, vel calidioris, vel frigidioris &c.

DISSERTATIO III.

De Actione Medicamentorum in genere.

25. FLUIDA, & solida esse composita ex particulis, seu elementis inertibus, & non elasticis, & ex particulis actuosis, & elasticis ab experimentalis Philosophia manifestum est. Cum vero singula corpora agent in alia, quibus occurrunt, per contactum, idcirco istæ inertes, & non elasticæ particulæ mole, pondere, ac superficie agent in corpora, quibus contactu uniuntur. Particulæ vero actuosæ, & elasticæ præter molem, pondus, & superficiem, motu etiam, & elatere suas vires, ac momenta exercent contra corpora illa, cum quibus contactum, vel mediatum, vel immediatum efficient. Ulterius cum corpora quælibet juxta experimenta Boilei de effluviis corporum dividi possint in partes infinite parvas, & divisæ effundi debeant quaquaversus facile, prompte, & expedite per universam fluidorum massam non solum ex se, verum etiam auxilio circulationis, ideo juxta hæc evenient nonnulla in præsentia a nobis consideranda pro opportunitate eorum, quæ de actione medicamentorum erimus exposituri.

26. Boileus itaque libro de effluviis expertus est, universa corpora sua effluvia quaquaversus emittere, ut singula circum semetipsa peculiarem atmosphæram describant, singulorum tamen corporum viribus proportionatam. Cum autem vires, seu momenta corporum effluentium eo majores, & validiores numero, ac momento habeantur, quo minus, ex Mechanicis, distant a centro corporis illius, a quo effluvia emanant, & vicissim vires, ac momenta effluvi-
viorum ea minora sint, quo magis effluvia

distant a centro corporis illius, e quo effluvia illa procedunt; idcirco demonstratum est a Mechanicis has vires, seu momenta effluviiorum esse in ratione reciproca quadrati distantiarum a centro corporum illorum, a quibus effluvia illa effluxerunt. Cum ergo vires ac momenta effluviiorum tali proportionem agent in corpora, quibus aut immediato, aut mediato contactu impetum secum communicant; ideo corpora mota, impulsæ, aut percussæ a momentis corporum effluentium excipient motus, impetus, seu percussiones in ratione reciproca quadrati distantiarum a centro corporum illorum; hinc mensuræ motuum, seu percussionum communicatarum corporibus, seu fibris excipientibus vires, ac momenta effluviiorum jure ac merito desumenda erunt a ratione reciproca quadratorum distantiarum a centro corporum illorum, a quibus effluvia illa promanarunt.

27. Ab his constat corpora medicamentorum, a quibus emanant effluvia in puncto contactus agere, & reagere contra fibras majori vi ac potentia; in puncto enim contactus eorum corporum, a quibus effluvia emanant, nulla adest distantia corporis, a quo effluvia exeunt a fibris tangentibus, sed totalis præsentia contactus; hinc nulla effluvia deperduntur in illo contactus puncto, sed tota agunt, & reagunt in fibras tangentes; propterea in puncto contactus corporis corpora, & effluvia agentia, & reagentia majori vi ac potentia agent, & reagent quam in quacunque alia positione, ac distantia: Et sane in quacunque alia positione, ac distantia semper effluviiorum vires imminuuntur, & decrescunt in ratione reciproca quadrati distantiarum a corpore, a quo effluvia ipsa emanant. Ut hæc exemplo innotescant, sit corpus medicamenti A, quod emittat effluvia per distantiam ut unum, in qua distantia ut unum habeatur contactus corporis emittentis effluvia cum fibris, pariter idem medicamentum A emittat effluvia ad alias fibras animalis per distantiam ut duo: manifestum est quod cum effluviiorum vires decrescant in ratione reciproca quadratorum distantiarum a centro corporis A emittentis effluvia, manifestum inquam est vires medicamenti A in puncto contactus cum fibris, seu in suppositâ distantia ut unum, relate ad vires medicamenti ejusdem A in distantia ut duo, se habere, seu agere in ratione reciproca ut 4: in distantia vero ut 2 a fibris

vires effluviarum medicamenti A agere in ratione reciproca ut unum. Similiter si corpus medicamenti A emittat effluvia per distantiam ut duo ad fibras, & idem corpus emittat effluvia per distantiam ut ter ad alias fibras, apertum erit vires medicamenti A in distantia ut duo se habere ut 9, relate ad vires medicamenti A in distantia ut ter; in distantia vero ut ter a fibris vires agentes effluviarum ejusdem medicamenti A se habere, & agere in reciproca ratione ut quatuor proxime, cum in physicis præcisæ, & geometricæ proportionnes servari non soleant supposita in omnibus æqualitate effluviarum.

28. Hisce præmissis, ad ulteriora progrediamur. Istæ vires seu momenta corporum, aut effluviarum emissorum a corporibus, vel habentur ab opere *superficierum corporum*, aut *superficierum effluviarum* contra fluida, aut solida, cum quibus corpora, aut effluvia uniuntur, & facto contactu alligantur.

Vel habentur opere *figure corporum* emittentium effluvia, aut effluviarum emissorum, quam habent, aut quam acquirunt in miscella cum reliquis corporibus aut fluidis, aut solidis.

Vel habentur opere *motus*, & *elateris* corporum emittentium effluvia, aut effluviarum emissorum, qui motus, & elateres communicantur aut fluidis, aut solidis, cum quibus unionem, contactum, aut alligationem acquirunt, ac sustinent.

Denique habentur ab opere *ex hisce omnibus composito*; de quibus sigillatim hie erimus locuturi, in genere tamen, cum inferius ad singularia, & specifica effecta descenderimus, de singularibus medicamentorum viribus necessaria exposituri.

29. Primo itaque medicamentorum corpora agent vel in fluidis, vel in solidis, vel in utriusque opere *superficierum corporum*, aut *superficierum effluviarum* contra fluida, aut solida, aut contra utraque, cum quibus corpora, aut effluvia uniuntur, & facto contactu alligantur; Ergo superficies istæ, quæ sunt quantitates extensæ ex geometricis quoad longitudinem, & latitudinem vel erunt *ramosæ*, aut *hamatæ*. Sint ergo superficies corporum, aut effluviarum primo *ramosæ*, aut *hamatæ*, tunc corpora, aut effluvia ista communicata fluidis, vel solidis, vel utrisque apta erunt *ramosis*, aut *hamatis* suis superficiebus circumscribere quaquevis, & quodammodo amplecti

particulas tam fluidas, quam fibrosas sanguinis, lymphæ, & succi nervei, pariterque circumscribere, & amplecti solidas fibras organorum, cum quibus unionem, & contactum habent; quare circumscriptis, & amplexis vel fluidis, vel solidis, vel utrisque, statim acquirunt corpora inscripta una cum circumscriptis majores moles, & superficies, cum autem superficies corporum, si similes fuerint, augeantur, & crescant in ratione quadrata, ex geometricis, moles vero in ratione cubica suorum diametrorum, aut suorum laterum homologorum; si vero in superficiebus corporum moles fuerint dissimiles, augeantur, & crescant in ratione composita ex rationibus basium, & altitudinum corporum ipsorum, patebit quam facile, quam prompte, quam necessario augeri debeant densitates corporum ipsorum inscriptorum, & circumscribentium; cum autem densitates ex Mechanicis sint ponderibus proportionales, constabit ulterius quantum augeri debeant, & gravitates corporum istorum: Hinc fluida, & solida, vel utraque tali methodo circumscripta a superficiebus ramosis, aut hamatis corporum, aut effluviarum corporum ipsorum irretire, ac ligare debebunt magis, aut minus fluida, & solida, cum quibus uniuntur juxta majores, aut minores numeros ramorum, hamorum corporum, aut effluviarum, & juxta majores, aut minores densitates, & superficies ipsorum &c., aut saltem notabiliter fluidorum, & solidorum motum retardare, talia effecta multo probabiliter sunt a corporibus opiatis, aut opio analogis, cum similia corpora, aut istorum corporum effluvia ab effectis judicanda sint superficiei ramosæ, aut hamatæ. Quamobrem medicamenta talis indolis, ac naturæ aut opiata, aut adstringentia, aut hisce analogis dicenda erunt.

30. Ita si superficies corporum, aut effluviarum corporum ipsarum fuerint *texuræ*, *levis*, *mollis*, & *laxe*, quæ tantummodo idoneæ sint levibus mollibus, & laxis suis superficiebus, aut lenire blando, & molli contactu asperas fluidorum superficies, aut emollire fluida, & solida nimis stricta, & densa, aut penetrare poros corporum, & nimias angustias istorum dilatate, laxare, & aperire blande, & suaviter, aut impedire majores corporum adhesiones inter se &c., tunc tales superficies corporum, aut effluviarum emissorum leves, molles, & *laxe* statuent medicamenta, quæ *laxantia* appel-

appellantur; talis ergo indolis erunt oleum olivarum, amigdalorum dulcium, leves pinguedines, lac, mel, terebinthina, serum lactis, & aqua ipsa &c., aut his similia, aut his analoga.

31. Verum si superficies corporum, aut effluviis emissorum fuerint inæquales, asperæ, & angulares, tunc aptissimæ erunt inæquali, aspero, & angulari contactu penetrando poros solidorum, & areas fluidorum, texturas, ac compages diruere, scindere, rumpere, & evertere: Quamobrem huiusmodi corpora, & corporum istorum effluvia *dissolventia* dicenda erunt majoris, aut minoris roboris, ac momenti juxta majores, aut minores inæqualitatum, asperitatum, & angulorum numeros. Itaque primi generis, seu majoris momenti *dissolventia corrosiva* dicuntur, ut est aqua fortis, arsenicum, as, flammula Jovis, gumma hederæ arboreæ, & alia hisce similia, & analoga. Dissolventia secundi generis seu minoris momenti dicuntur illa, quæ *Aperiencia*, seu *Deobstruentia* appellantur, qualia sunt ea, quæ obstructions tollunt, urinas movent, ut fumaria, cicorea, absinthium, marrubium, capparis, aristolochia, asparagus &c. ammoniacum, pravera brava, agaricus, rhabbarbarum, & his similia, aut analoga.

32. Ut plurimum autem medicamenta agere solent, & reagere, suasque vires exercere contra fluida, & solida *ope figurarum* corporum tangentium fibras, aut opere figurarum effluviis a corporibus emissorum; effluvia enim corporum verè sunt seminales particule ipsorum, elaboratæ ex minimis dimensionibus, ac figuris proportionalibus majoribus figuris corporum, a quibus effluvia ipsa emanarunt, ut satis superque de primigeniis salium figuris demonstraverat celeberrimus Gulielmus; effluvia itaque ipsa donata similibus figuris, quibus majora corpora præstita sunt, apta erunt penetrare fluida & solida, quæ penetranda essent sub similibus figuris a majoribus corporibus effluvia ipsa emittentibus. Neque de specificis talium corporum, & talium effluviis figuris licet dubitare; peculiare enim specificæque figuras observaverunt Philosophi in quocunque regno animali, vegetabili, & minerali; ad animale ergo regnum quod spectat, Boileus in analysi sanguinis humani fateretur se vidisse multiplices salium figuras, cubicas nimirum, parallelepipedas, pyramidales, Sydenham Opera Med. Tom. II.

octaedricas, sphaericas, & prismaticas variæ indolis; easdem quoque detexerunt celeberrimi Viri Levenochius, Malpighius, & Boninus. In vegetabilibus vero adeo manifestæ sunt essentielles componentium salium figuræ, ut de his dubitare absolum sit; sufficiat legere (cum vitiosum sit hic jam enunciata repetere) quæ a celeberrimo Carolo Fracassato dissertatione *de organo lingue* indicata fuerunt, quæ omnia ab experimentis immortalis Academiæ Florentinæ colligere opportunum censuit; ut literariam Rempublicam de vegetabilium salium figuris erudiret. In mineralibus denique specificæ pariter constant, ac naturales eorum configurationes; sic in granatis figuræ octaedricæ, in antimonio prismaticæ, & sphaericæ, in mercurio satis superque detectæ sunt; & nos in libello italice conscripto *de ferri figuris* a ferreis mineris ad nos missis ab immortalis famæ Vallisnerio satis ut puto indicavimus particulas ferreas esse probabiliter pyramidales in basi quadrata, aut quadrilatera, a quarum pyramidum lateribus exeunt a basi usque ad verticem plurimæ aliæ pyramides minimæ, similes pyramidi majori, quæ tamen omnes hamatæ sunt, uncinatæ, & aduncæ. Itaque cum effluvia corporum nil aliud sint quam particule veluti seminales componentes majora corpora, colligendum jure erit etiam effluvia a corporibus emissæ eas habere minimas figuras, figuris majorum corporum omnino similes, & proportionales.

33. Figura itaque corporum emittentium effluvia, aut figura effluviis emissorum, tangentium, impellentium, aut percutientium fibras animalium varios parient effectus juxta varias molium, ponderum, figurarum, & motuum rationes. Inter corpora, quæ agunt pondere, figura, & motu, eminent mercurius, qui sphaerica donatur figura: hæc autem in punctis tangit corpora qualibet, a quo punctuali contactu emergit necessitas continui motus mercurii, punctum enim nunquam potest esse firma basis corporum; mercurius ergo in minimas quoque sphaerulas divisus aptus redditur penetrare poros solidorum, & areas fluidorum quaquaversus, cumque pondere suo reliquis corporibus, cæteris paribus, alte præpolleat, potenter premit solida, quibus unitur, hæc intesit, & variis impulsibus urget, varias curvaturas parat, consequenter ob sphaericam figuram faciles penetrationes mercurii, & ob pondus ejusdem

multiplices fibrarum inclinationes, & fluidorum dissolutiones eveniunt. Simili lege agere, & reagere debent elementa reliquorum mineralium, quotiescunque mole, pondere, figura, & motu fibris machinæ animalis applicata fuerint, penetrando fluida, & solida undequaque; enim vero nonnulla mole, pondere, figura angulari, & motu dissolvunt, & frangunt corpora, quæ ab his fuerint penetrata; hinc mineralia nonnulla in numero *Medicamentorum deobstruentium* posita sunt, ut sunt illa, quæ ex ferro, chalibe, aut antimonio parantur. &c. Hic statim sentio querentes, & dubitantes; Quomodo enim ponitur hic ferrum in numero corporum deobstruentium, cum antea ostenderimus ferri figuras esse uncinatas pyramides, munitas ulterius minimis pyramidibus similiter hamatis, & uncinatis; profecto hamata, & uncinata figuræ unioni, & firmitati corporum conducunt non dissolutioni, ut num. 29. indicavimus. Aptissime dubitatis: Verum scitote hęc, & similia corpora diverso in statu esse consideranda, vel in statu quietis, & fixitantis, vel in statu motus, & agitationis. In primo statu ferrum, chalibis &c. hamatis suis figuris firmant aptissime fluida, & solida, quæ naturalibus suis angulis fuerant penetrata. In secundo statu facta unione cum particulis sulphureis penetrant facilius, & in motu, & agitatione constituta corpora rotando circa proprios axes in tali rotatione aperiunt, dissolvunt, & scindunt fluida, & solida, quæ penetraverint acumine suorum angulorum.

34. Alia existunt corpora, quæ pondere, mole, & figura non efformata ab angulis acutis, quorum anguli sint minores gradibus 90, sed ab angulis obtusis, quorum anguli semper sint majores gradibus 90, suas vires exercent occupando, & replendo, si non perfecte, saltem quasi perfecte fluidorum, & solidorum spatia, quibus uniuntur, & adhærent; talis ordinis sunt *aluminosa corpora*, quæ figuras octaedricas, aut quasi octaedricas sustinent; talia sunt *Vitriolica*, quæ figuram parallelepido-rhomboideam sibi comparant: aut his similia, & analoga. Ab hisce ergo, aut similibus corporibus occupatis spatiis fluidorum, & solidorum opere obtusorum angulorum elementa fluidorum nimis stringuntur inter se imminuto, aut ablato ipsorum motu, & fibra solidorum circumscriptæ obtusis corporibus, spatia illa replentibus in statu veluti tonico

derinentur, hinc neque moveri, neque oscillare commode, ac facile poterunt; propterea tarditas motus in fluidis, & tarditas oscillationum in solidis generabuntur, ex quibus ostenditur quæ ratione suum opus constrictionis exercentur medicamenta illa, quæ pariter *Adstringentia* appellantur. Similis ergo figuræ cum alumine, aut vitriolo ab effectis esse possunt balaustria, galla, lysimachia, consolidida, bursa pastoris, myrtus, malicoreum, mala cotonea, mala punica &c., quæ tamen aliquando magis, aliquando minus stringunt, ac ligant juxta majores, aut minores numeros particularum aluminosis, aut vitriolicis figuris analogarum, aut juxta majores, aut minores numeros angulorum obtusorum spatia fluidorum, & solidorum magis, aut minus replentium. Hic autem monendum est mechanicas res agentem inservisse corpora purgantia stimulantia, & aperientia agere, & ac si unicuique planum haberent efformatum ab angulis acutis, eo quia corpora hæc cum sint divisa, ac subdivisa in partes minimas, taliter figurantur, ac si quoad sensum unico plano donata essent, licet revera solidos angulos obtineant, quorum plani anguli per Prop. 21. 11. Eucl. quatuor rectis sunt minores. Hic quoque considerata sunt corpora *Adstringentia* esse composita ex figuris octaedricis, aut quasi octaedricis, aliisque non in rigore geometrico, sed solum analogice, & quoad sensum, cum hæ figuræ ab effectis replent spatia quælibet fluidorum, & solidorum non solum regularia, sed ut plurimum irregularia, idcirco diximus has obtinere angulos ut plurimum irregulariter obtusos.

35. Hic magnopere animadvertendum est figuras corporum effluvia emittentium, aut effluviis emissorum jure suo supramodum conferre ad varias actiones, & reactiones exequendas tam in fluidis, quam in solidis; verum hæ actiones, & reactiones naturales, & proportionales specificis corporum figuris sæpe ac sæpius mutantur, & invertuntur ab unione, & adhæensione aliorum corporum, quæ figuras corporum emittentium, aut effluviis emissorum undequaque circumscribunt; proinde cum in tali casu corpora circumscripta sint illa, quæ primario agant, & reagant contactu, & quæ primario emittunt effluvia; ideo actiones, & reactiones, contra fluida, & solida animalis non producuntur, & sunt a figuris corporum inscriptorum, aut ab

ab effluviis ipsorum: sed potissimum sunt, & producuntur a figuris corporum circumscriptibentium, aut a figuris effluviiorum emissorum a corporibus circumscriptibentibus, quæ actiones, & reactiones corporum cum plerunque esse soleant diversæ, aut oppositæ illis, quæ sunt a figuris internis corporum inscriptorum, & effluviiorum ipsorum; ideo oritur ratio, cur in medica praxi sapissime a medicamentis unius generis experiamur sequi effectus diversos, aut oppositos. Ob hanc causam præstantiores Practici abhorrent ab elaborandis medicamentis magis compositis, sed amant componere medicamenta, quantum possibile est simpliciora (ut leges naturæ postulant) cum ab his effecta medicamentorum simplicium evenire soleant, ac debeant morborum indicationibus magis proportionalia. Pro hoc argumento exponam exemplum, quo etiam in similibus possemus ratiocinari: Certum est aqueas particulas esse mobilissimas opere suarum minimarum molium sub figuris aut sphericis, aut spheroidis, aut hisce analogis, a quibus aquæ particulæ cum figuris curvilineis semper in motu sunt, & esse debent. Verum si tempore hyemis, spirantibus præcipue ventis aquilonaribus, qui prismatibus nitrosis supramodum abundant, ista nitrosa prismata, quorum figura est cylindrico pyramidalis in basi exagona, circumscribant curvilineas aquarum figuras, tunc curvilineæ illæ figuræ aquæ a nitrosis, aut nitro analogis particulis circumscriptæ reddentur solidæ polygonæ, aut quasi polygonæ: sed figuræ solidæ polygonæ relate ad figuras curvilineas aqueas inclusas, & inscriptas ex mechanicis supramodum tardiores sunt ad motum, ita ut aliquando motum omnino deperdant; hinc aquæ particulæ curvilineæ quantumvis natura sua mobilissimæ, nihilominus opere aliarum figurarum circumscriptarum solidæ polygonæ, aut quasi polygonæ redditæ coactæ erunt, aut motum imminuere, aut aliquando deperdere, ita ut fortissimam in glaciem densari, firmari, & stagnare debuerint. Ex his, & similibus, quæ dici possunt colligere possumus, quam facile etiam medicamenta simplicia, quæ opere suarum simplicium figurarum diuretica, aperientia, & deobstruentia esse deberent fieri sæpe ac sæpius possint, aut coagulantia, styptica, & adstringentia, quotiescunque facta mixtione cum aliis corporibus in machina animali sortuito tales acquirant compositiones, ut

solidas polygonas cum angulis obtusis, aut parallelepipedo-rhomboideas, aut octaedricas, aut prismaticas elaborent configurationes alumini, aut vitriolo proportionales.

36. Deinde corpora, aut effluvia emissæ a corporibus agere possunt, & reagere in solida, & fluida machinæ animalis opere *motus*, & *elateris*; Itaque quæ operantur motu, & elatere sunt ea omnia, quæ a Medicis volatilia, & spirituosæ dictæ sunt, ut sunt omnia sulphurea, & omnia salino-sulphurea, quæ si blando, & medio quodam motu, & elatere juxta naturæ leges agant, & reagant viribus fluidorum, & solidorum, & nutritioni earundem proportionalibus, jure ac merito aut alimenta, aut medicamenta *Cordialia* a Medicis poterunt appellari. Verum si hæc corpora, aut emissæ effluvia sub minima mole multo polleant elatere, ac motu, & istorum elater ultro augeatur, & crescat, juxta ea, quæ demonstrantur a Mechanicis de corporibus elasticis, tunc elastica hæc, & spirituosæ corpora aut alimenta, aut medicamenta *exaltantia*, & *diaphoretica* dicenda erunt. Quotiescunque itaque vel sulphurea vel salino sulphurea, vel utraque corpora alicui solido, aut fluido applicentur, si hæc numero, motu, & elatere medium statum teneant, qui sit fluidis, & solidis homogeneus, & proportionalis, tunc aptissima mixtio elementorum in fluidis, æqua separatio puri ab impuro, & opportuna nutritio corporis facienda erunt; Similiter æquabiles, & isochronæ solidorum omnium oscillationes cum æquabilibus viribus, & æquilibrio inter fluida, & solida erunt secuturæ; & medicamenta, aut alimenta, quæ tales fluidorum, & solidorum actiones, & reactiones cum expositis proportionibus paraverint cordialia aut nutrientia, aut roborantia erunt appellanda. Verum si hæc principia sulphurea, aut salino-sulphurea, aut utraque numero, motu, & elatere a medio statu deficient, aut excedant, tunc in defectu *Refrigerantia*, aut quasi *Refrigerantia* vel alimenta, vel medicamenta dici poterunt; e contra in excessu, aut alimenta *Calefacientia*, aut quasi *Calefacientia* poterunt appellari.

37. Hic addendum est etiam causam caloris vel in statu excessus, vel in statu medio, vel in statu defectus oriri a lege, & ratione affricus, qui sequitur in particulis elasticis inter se, & in particulis elasticis, & non elasticis pariter inter se; & sane a Geo-

metris edocti sumus moles corporum quorumcunque dividi, & subdividi in partes minores, & minores & in divisione, & subdivisione decrefcere femper moles in ratione cubica fuorum diametrorum, fuperficies vero eorundem tantummodo imminui in ratione quadrata: Quamobrem cum ex Geometris multo plus decrefcant moles corporum, quam eorundem fuperficies, & cum a maioribus fuperficiebus eveniant majores contactus, & confequenter majores affricus corporum inter fe; ergo ab hisce majoribus contactibus, & affricibus inter fe majores quoque calores, & incalefcen- tiae fequi debuerunt, quanto moles corporum divifae, & subdivifae minores faciendae erunt. Oſtendit enim magnus Galilaeus pluribus in locis motum ex fe non calorem producere, ſed hunc primario oriri a majori, & concitatori affricu corporum, quae ad calorem tamen excipiendum, communicandumque inſtituta ſunt: ſed corpora volatilia, & ſpirituofa numero, motu, & elatere praepollentia facta ſunt ſub minoribus molibus: minores autem moles majores ceteris paribus obtinent fuperficies, & a maioribus fuperficiebus majores confequuntur affricus; ergo corpora volatilia, & ſpirituofa numero, motu, elatere, & fuperficiebus praepollentia majores quoque calores, & majores incaleſcentias erunt productura. Verum ſi corpora volatilia, & ſpirituofa fuerint numero, motu & elatere in ſtatu medio conſtituta, tunc affricus fuperficierum corporum inter fe mediam quandam proportionem motus obtinentes aequabilem caloris rationem oſtendent; e contra imminutum, & deficientem calorem, ſi elementa volatilia, & ſpirituofa numero, motu, & elatere notabili defectu peccaverint; quamobrem variae affectiones in fluidis, & ſolidis erunt ſecuturae, ut antecedenti numero indicavimus.

38. Ab his quae uſque adhuc enunciata ſunt colligere poſſumus facilius, promptius, & potentius ſanguinem incaleſcere, quam lympham, non ſolum quia maſſa ſanguinis multo pluribus abundat particulis elafiicis, quam lympham, non ſolum quia velociori motu impellitur ſanguis quam lympham per capſas ſuos, verum etiam quia obſervante Galilaeo (de Cometis ea corpora tantummodo conſtrictione incaleſcunt, quae ab affricu ipſo continuo atteruntur, & in minores, minoresque particulas reſolvuntur, ſic experitur Galilaeus, levigatiſſimas vi-

treas particulas, aut perfectiſſime chlibeas nunquam conſtrictione incaleſcere, aut ſaltem leviſſime, eo quia neutrae in minimas minimasque particulas atteruntur, comminuantur, & reſolvuntur. Cum itaque lympham aqueis ut plurimum particulis indiviſibilibus, & ex leviſſima quantitate ſulphurum conſtet, pariterque cum ſalina corpufcula, quibus lympham ſcatet, a lentiori lympham motu non poſſint facta conſtrictione in minores, minoresque moles prompte, facile, & expedite atteri, & reſolvi, ſed tarde, ac lente; ideo experimur ab effectis naturae, & februm ſanguinem facilius, & vehementius, lympham vero difficilius, tardius, & remiſſius incaleſcere. Hinc ſummum beneficium tribuitur fluido ſanguineo a lympham ipſi permixta, eo quia a particulis aqueis indiviſibilibus, quae in ſanguine triplae ſunt, aut quali triplae ſupra reliqua ſanguinem componentia, ut Boilei experimenta oſtendunt, imminuitur, frenatur, & moderatur excedens illa attritio, & diſſolutio reliquarum particularum maſſam ſanguinis componentium, vi cujus excedentis attritionis, & reſolutionis compositum maſſae ſanguinis, unio, & nexus ejuſdem facillime diſſolvendum eſſet totali periculo machinae animalis: Itaque non leviter peccant illi, qui in morborum curationibus phlebotomiae nimis indulgent; extracto enim ſanguine plus aquae tollitur, quam auferatur reliquorum elementorum numerus: propterea reliqua elementa opportuno ſero deſtituta magis, magisque inter ſe atteruntur, & adaucto iſtorum affricu in minores, minoresque particulas reſolvuntur, adaucto imposterum caloris incremento: Verum ſi in fluido ſanguineo extiterint gravia coagulationis argumenta, tunc liberalis phlebotomia non erit accuſanda, ſed imperanda, & ſecuto imposterum majori, & majori affricu corporum inter ſe, coagulationis ſanguinis aut imminuatur, aut diſſolvatur.

39. Denique frequentiſſima ſunt illa medicamenta, quae ſuas vires, ac ſua momenta exercent agendo, & reagendo contra fluida, & ſolida machinae animalis in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elafiicitatum corporum emittentium eſſuvia, aut eſſuviorum emiſſorum: Etenim univerſa corpora ex phyſicis experimentis, quae agunt, & reagent in fibras organicas, & fluida noſtri corporis, vel agent contactu, vel opere eſſuviorum emiſſorum a corporibus in ratione

tione simul molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum eorundem; Quare ut aptæ actionum, & reactionum istorum corporum emittentium effluvia, aut effluviis emissorum mensuræ habeantur, oportebit considerare, & expendere si non exacte, saltem proxime, actiones, & reactiones istorum in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, aut elasticitatum istorum, de quibus specificè acturi erimus, cum singularia medicamentorum singulorum opera erimus inferius consideraturi.

40. Consideravimus usque adhuc in genere qua ratione medicamenta agere, & reagere possint contra fluida, & solida machinæ animalis; Modo cum pleraque medicamenta a succis salivæ, esophagi, ventriculi, & a succis pancreaticis, & biliosis in intestino duodeno, & a continua attritione inter se, & cum reliquis corporibus dividantur, & subdividantur in partes minimas, & minimas, & partes istæ minimæ deferantur minus circulationis beneficio brevi temporis spatio per totam fluidorum massam; idcirco remanet hic quoque considerandum in genere, quomodo partes istæ corporum, aut medicamentorum divisæ & subdivisæ in partes veluti infinite parvas aptæ esse possint delatæ eminus per totam fluidorum massam tam varios, & tam dissimiles effectus producere in massa humorum.

41. Quod autem primo corpora, aut medicamenta dividi possint in partes minimas, & minimas (ut antea diximus) constare videtur ab infinitis pene dicam experimentis, inter quæ eligam nonnulla. Expertus est celeberrimus Hallerius in aëlis Philosophicis num. 194. unum auri granum in 10000 visibiles partes posse secari; celeberrimus P. Franciscus Lana, observatione 8. tractatu primo Magist. naturæ & artis notat se a Boileo accepisse, quod unicum granum cupri in spiritu salis armoniaci dissolutum potuit tantam aquæ copiam colore viridi inficere, ut illa aqua sic colorata constaret partibus 156806, quarum singule sua magnitudine æquarent molem ipsius grani cuprei. Refert pariter observatione 8. unum granum ligni nephritici posse taliter dividi, & subdividi in partes minimas, & minimas, ita ut tinctura occuparet grana aquæ 57723. In observatione 4. ejusdem libri narrat experimentum de unico grano thuris quantum spatii occupare potuerit in cubili illo, in quo experimentum effecerat, & reperit in

illo cubiculo exiguas particulas fumi illius thuris ascendisse ad numerum 75000000000000, idest ad septingentos quinquaginta milliones millionum. Plurima habentur in Boileo de effluviis, plurima in actis Angliæ, ita ut inutile sit de hac re dubitare: Ergo ultro constat corpora, aut medicamenta posse facile, & prompte opere tantorum succorum salivæ, esophagi, ventriculi, intestinorum, & glandularum machinæ animalis, & opere attritionis cum reliquis corporibus dividi, & subdividi in partes minimas, & minimas, sicque eminus deferri per totam fluidorum massam, cum opera naturæ in animalibus multo sint reliquis operibus præstantiora, & validiora, maxime quia hisce actionibus naturæ in animalibus magnopere succurrit ingens beneficium circulationis sanguinis, quo dividi, & subdividi ultro possint, & eminus deferri.

42. Et sane beneficium circulationis sanguinis omnino apertum est; si enim supponamus cum Bartolino pulsationes cordis singula hora adscendere ad numerum 4400 proxime; & cor impellere singula pulsatione unicam sanguinis unciam, pariterque totam sanguinis massam multo probabiliter ascendere ad libras 24 proxime, constabit ex regulis proportionum 24 libras sanguinis circulationes suas exequi vicibus 17 proxime unius horæ spatio; dixi autem proxime, eo quia fateor sanguinem fluentem per minimos partium extremarum canales non has leges circulationum subire tam facile, neque tam præcisè posse: sed facta animadversione in complexu motuum sanguinis per majores canales juxta majorem sanguinis quantitatem, constabit proxime juxta datas hypoteses assumpta, ut probabiliores sanguinei fluidi circulationes ad tantum numerum singula hora posse ascendere: Si itaque singula hora compleri possunt circulationes sanguinis vicibus 17 proxime, ultro manifestum esse poterit quam facile, quam prompte moles corporum, aut medicamentorum in tam continuis motibus, & motuum attritionibus divisæ, & subdivisæ in partes minores, & minores possint, immo debeant deferri per universam machinam animalis, & per universam massam fluidorum brevibus temporum differentiis; Si itaque corpora, aut medicamenta tantarum circulationum auxilio, & opere attritionum per motus dividi, & subdividi possint in partes minimas, & si brevi temporis spatio possint hæc beneficio circulationis uni-

universam massam humorum, & animalis machinam occupare, facile colligere possumus, cur etiam ex hoc capite sequi debeant tam varia phenomena, tam varii effectus, tam variae actiones, & reactiones in solidis, & fluidis animalium opere medicamentorum, de quibus sigillatim inferius.

43. Hic actiones medicamentorum rectius exposituri nullatenus præterire debemus summam esse relationem partium principum cum quibuscumque partibus machinæ animalis, immo minimas quascunque fibrillas cum reliquis omnibus majoris, minoris, minimique ordinis, ac usus admirandum consensum obtinere; Sic experimur a levissimo succo aspero, & acri irritante fibrillas uteri totam mulieris machinam violentissime convulsam reddi; immo a levissima muscæ supra faciem, supra cilia, aut frontem ambulantis titillatione universas corporis partes moleste sentire, sic a chirurgicis habemus levissima quantumvis vulnera aliquando universales tremores, & convulsionnes attulisse, denique autopsia constat levissimum vulnus in remotiore partis pede statutum statim ægre se habere, majoremque saniem asferre, quotiescumque ager aut cibo, aut potione aliquo excessu peccaverit. Præter hæc quamvis nulla adsit proportio inter actiones animæ sejunctæ a corpore, & inter actiones, & passionēs sensuum; nihilominus cum anima in viventibus fuerit compenetrata sensoris, statim manifestum erit, quantus consensus necessario futurus sit inter animam, & sensorium, quam necessaria relatio inter animam, & universa organa corporis; ergo si tot ac tantæ habentur relationes inter animam immortalem, & æternam, & mortalia, ac caduca corporis organa in animali vivente, profecto multo magis futurus erit altissimus consensus inter fibras, & fibras, inter organa, & organa, consequenter etiam inter organa, & fluida organis necessario respondentia machinæ animalis: tam admirandæ, tam necessariae organorum relationes inter se, & inter fluida omnia animalis debentur potissimum nerveis, membraneis, & muscularibus fibris una cum succo nerveo, cum ab hisce sensus, & motus primario, juxta anathomica, & physica experimenta in animali cognoscendi sint.

DISSERTATIO IV.

De Medicamentis in particulari, & primo de purgantibus opere Solidorum.

44. CUM in secunda Dissertatione expositum fuerit sanitatem basim habere in æquilibrio fluidorum, & solidorum, & in opportuna proportionē utrorumque inter se; pariterque ægritudinem niti in everso æquilibrio, & in everfa proportionē fluidorum, & solidorum, ideo mederi animalia ægrotantia, docente Hippocrate libro de Arte, nil aliud erit quam *tollere de corpore animalium ægrotantium ea omnia, quæ æquilibria fluidorum, & solidorum notabiliter auferunt*. Hinc Medicamenta omnium medicorum consensu appellata sunt *Instrumenta*, quorum beneficio opportuno tempore, loco, ac statu morbi exercitia auferre apta sunt, supervacanea, aut addere ea quæ deficiunt, ut sic restituto, aut conservato æquilibrio fluidorum, & solidorum sanitas vel deperdita restituatur, vel restituta conservetur. Quia vero medicamenta sive hæc medicinæ instrumenta alia primario agunt in solida machinæ animalis, alia in liquida simul & solida; ideo in præsentī sermo erit *de Medicamentis purgantibus opere solidorum machinæ animalis*.

45. Cum itaque ab effectis experiamur medicamenta purgantia, & alvum moventia sollicitare, ac stimulare primo esophagum, deinde ventriculum, ultimo intestina, & per consensum fibras quascunque ægrotantis, ut plurimum cum majori, aut minori pressionis, & doloris affectione; hinc colligendum est omnia alvum moventia munita esse asperis superficiebus circumscriptis a multiplicibus angulorum prominentiis, a quorum aspero, & angulari contactu fibræ impulsæ, sollicitatæ, ac stimulatæ recedunt a naturali sua positione, ac directione acquirendo aliquas inflexiones, aut arcus; Ob hanc causam aliquantulum evertuntur naturales fibrarum inter se contextarum anguli, & aliquantulum mutantur naturales earundem fibrarum parallelismi. Verum cum asperæ, & angulares corporum superficies statuunt bases suas in soliditate, mole, & pondere corporum agentium, ideo moles medicamentorum applicatæ fibris agere, & reagere debebunt ponderibus, & angularibus

bus figuris. Ulterius cum medicamenta determinatis gravitatibus donata varios pariter excipere motus apta sint suis gravitatibus proportionales, pariterque cum a dissolventibus succis esophagi, ventriculi, intestini duodeni, reliquorumque intestinorum medicamenta atteri, & dissolvi debeant in partes veluti infinite parvas, quæ aut motu, aut elatere sollicitare, ac stimulare fibras aptissime possunt; ideo medicamenta attrita, & dissoluta cum fuerint, suas vires ac momenta exercebunt contra fibras tangentes, & percussas in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum medicamentorum eorundem, quæ ratio composita virium, & momentorum non levis, sed magni, aliquando summi momenti erit futura. Hinc facta sollicitatione, ac impulsu quaquaversus ob multiplicia momenta particularum, aut effluviarum earundem contra fibras consequi debent in fibris ipsis frequentes, & multiplices contractiones fibrarum potentiis sollicitantibus, aut impellentibus proportionales, per 1. Prop. hujus. Cum ergo multiplices fibræ distractæ devenerint ad ultimum quasi gradum suæ distractionis, conentur ipsæmet sese restituere ad naturalem suam contractionem, ut prima Dissertatione ostendimus. Ideo cum distractiones fibrarum & homologæ contractiones earum nil aliud sint quam oscillationes earundem, ut eadem Dissertatione aperuimus, & hæc fieri debeant juxta vires, ac momenta particularum, aut effluviarum earum sollicitantium, ac stimulantium fibras; propterea a facta sollicitatione, ac impetu secuturæ erunt determinatæ oscillationes fibrarum sollicitationibus, ac impulsibus communicatis proportionales.

46. Cum ergo fibræ multipliciter sollicitatæ, ac impulsæ multipliciter pariter edere debeant oscillationes, istæ autem sint radices ac primæ causæ motus peristaltici fibrarum ventriculi, intestinorum, aliarumque partium; ideo motus peristalticus fibrarum ventriculi, intestinorum, aliarumque partium frequentior, celerior, ac fortior erit secuturus ad materierum excretiones celeriter, & copiose promovendas. Ut autem vires ac momenta distractionum, & contractionum glandularum magis manifesta reddantur, non tædeat considerare fibras membranæ villosæ intestinorum, seu papillaris esse circumscriptas a fibris membranæ nervæ, & fibras nervæ membranæ esse simi-

liter circumscriptas a fibris membranæ muscularis: Modo manifestum est, quod cum distractiones fibrarum membranæ villosæ ad ultimum terminum suæ distractionis, & inflexionis devenerint, tunc cogentur ad suam naturalem contractionem se se restituere, consequenter etiam reliquæ fibræ membranæ nervæ, & reliquæ fibræ membranæ muscularis inter se communicantes ad suas naturales contractiones reddentur restitutæ. In tantis autem moribus contractionum fibrarum membranæ nervæ, & membranæ muscularis longitudine, & crassitie dissimilium, & inæqualium cum fibris membranæ villosæ, constabit quot, & quanta momenta impulsuum communicanda ulterius sint glandulis per nerveam, muscularem, & per alias membranas distributis, nimirum in ratione composita ex ratione directæ potentie antea impellentis directæ longitudinum singularum fibrarum inæqualium, & reciproca ratione crassitierum earundem, per 4. Prop. hujus. Facta autem tam valida, tam potenti compressione, & contractione glandularum omnium quaquaversus ab opere tantarum membranarum intestinalium, profecto cum areæ, & capacitates illarum glandularum decrescant ex geometricis in ratione quadrata suorum diametrorum, materie contentæ in glandulis membranarum intestinalium tanta vi expellentur ab imminutis areis contractis, compressis, & decrescantibus in tali ratione quadrata diametrorum glandularum, quanta est vis contractionis communicata fibris arearum glandularum a ratione composita virium fibrarum membranæ nervæ, muscularis, & villosæ contractarum; Quamobrem cum copiosissimæ sint glandulæ intestinales quaquaversus copiosas pariter expellere debebunt materias per excretorios poros in cavitatem intestinorum, & sic successive.

47. Expulsioni materierum partæ a proxima, & immediata sollicitatione, ac stimulo villosæ, seu papillaris membranæ, succurrit ulterius altera remotior, & mediata actio contra fibras nervæ, & muscularis tunicæ intestinorum: purgantia enim corpora a calore viscerum, a succis dissolventibus ventriculi, pancreatis, & hepatis atteruntur, & dissolvuntur in partes minimas, quæ porositates intestinorum penetrando effluviarum ad modum, tandem accedunt ad contactum nervæ, & muscularis membranæ, aliarumque membranarum in-

testi-

testinalium : Hic ergo suos contactus , impulsus , ac vires exercendo sollicitant , & irritant fibras membranæ potissimum nerveæ , & muscularis : Vel ergo effluvia hæc opportune sollicitant , & irritant fibras , vel leviter . Si leviter , nullæ , aut quasi nullæ secretionis erunt e glandulis secretionis materierum , nullæque , aut quasi nullæ purgationes : Si vero opportune sollicitant , ac stimulant , tunc sequi debent a potentiis effluviis tangentium impetus , & impulsus , a quibus impulsibus fibræ primario distractæ sunt , mox successive , ut diximus , redduntur contractæ . Cum autem effluvia successive exeunt a corporibus purgantibus agant in fibras nerveas , & musculares &c. in ratione reciproca quadratorum , distantiarum a centro corporis , a quo effluvia illa emanant ; ideo si hæc pervenerint ad contactum fibrarum nervearum , postea ad contactum fibrarum muscularium , & contra has fibras in tali ratione reciproca impetum , & nitum fecerint , necessario fibra membranæ nerveæ majorem distentionem , fibra vero membranæ muscularis minorem distentionem , seu curvam quandam inflexionem minorem pati , ac sustinere debent , sed per 4. Prop. hujus , quælibet distractio fibræ facta a potentia impellente est proxime in ratione composita ex ratione directæ potentie impellentis , directæ longitudinum singularum fibrarum , & reciproca ratione crassitierum , seu basium earundem : ergo constabit quam varia futura sint momenta distractionum singularum istarum fibrarum nervearum , & muscularium : Cum autem post curvas distractiones fibrarum superveniant , & succedant similes , & æquales contractiones , & restitutiones earundem , & sic successive similiter , & æqualiter agere , & reagere debeant distractiones , & contractiones fibrarum ; ergo patebit quot , & quanta successiva momenta percussorum ferre , ac sustinere debeant glandulæ adjacentes per totam nerveæ membranæ , aliarumque membranarum superficiem distributæ a fibris membranæ nerveæ , & muscularis aliarumque membranarum impellentibus , & percutientibus . Hinc consequuntur simili ratione impulsuum , & contractionum glandularum intestinalium successive excretiones materierum contentarum in glandulis ipsis , ut antea satis exposuimus : Cum ergo excretiones materierum e glandulis intestinalibus , fiant ab immediato opere medicamentorum agentium , & reagentium

in villos membranæ villosæ , seu papillaris , & a remotiori , seu mediata actione ipsorum corporum purgantium agentium , & reagentium per effluvia , seu per minimas particulas ipsorum contra fibras membranæ nerveæ , & muscularis &c. , patebit excretiones , & separationes materierum e glandulis intestinalibus consequi a ratione composita virium , & momentorum corporum stimulantium , aut sollicitantium opportune villos opere immediato , & opere mediato per effluvia corporum eorundem contra fibras omnes intestinalium .

48. Hic placeat animadvertere nos pro excretionibus opportune exequendis e glandulis intestinalibus semper supposuisse sollicitationem , seu stimulum contra villos membranæ villosæ , vel contra fibras membranæ nerveæ , & muscularis esse opportune validam ; ita ut sequatur distractio fibrarum membranarum , & deinde consequatur contractio æqualis , & proportionalis earundem , ita ut ab actione , & reactione istorum organorum eveniat oscillatio fibrarum , & glandularum cum sollicito motu peristaltico intestinalium . Cæterum si vires , ac momenta purgantium medicamentorum validissima , ac fortissima fuerint , ut sustineant semper statum tonicum , statum convulsivæ contractionis in fibris membranæ papillaris , ita ut non sequantur inde homologæ , & æquales distractiones , & contractiones reliquarum membranarum ; Vel si effluvia medicamentorum tam fortia , tam valida sint , ut violenter agant in fibras omnium membranarum , ut fibræ coactæ sint sustinere statum tonicum distractionis , aut contractionis , tunc statuto vel tonico statu distractionis , vel convulsivæ contractionis in fibris intestinalibus parum , aut nihil oscillantibus inertia fiet motus peristaltici , aut ablatio ejusdem , cum parvitate , ac nullitate excretionum e glandulis intestinalium ; Experimur idcirco validissima , & fortissima medicamenta purgantia supra vires talium fibrarum intestinalium patere dolores intestinalium , & abdominis , non autem separationes , aut excretiones materierum majori periculo agrotantium . Summo itaque studio fugienda sunt medicamenta hæc purgantia ut elaterium , gutta gummarum , scammonæ , & magistrea , &c. variæ indolis , ac altæ dosis , pariterque nonnulla antimonialia , & mercurialia , potissimum si hæc exercere velimus in languidis , & inertibus fluidorum , & solidorum constitutionibus , in

In teneris, & senilibus ætatibus, aut in morbo fractis: Aliquando tamen permittenda sunt, immo consulenda quotiescunque fuerit densa admodum, & viscida in ventriculo, & intestinis humorum tenacitas, si temperies ægrotantium fuerit valida, ac fortis, si ætas virescens, aut consistens, si solida fibrosa intestinorum fuerint veluti paralytica reddita, & cum morbus sollicitam purgationem postulaverit; tunc enim similia purgantia esse poterunt fluidis densioribus, & solidis proportionalia. Quamobrem praxis, & prudentia Medici semper vocanda est in iudicium pro necessaria, opportuna, ac prudenti electione medicamentorum.

DISSERTATIO V.

De purgantibus opere Fluidorum, & Solidorum, & cur aliqua Medicamenta electivè operari videantur.

49. Satis, ut puto, ostendimus purgantia medicamenta immediatis, & mediatis viribus agere, & reagere contra solida intestinorum, aut materierum excretiones sequi debeant e glandulis intestinalibus: Modo ordo postulat, ut ultro consideremus tales separationes non solum haberi ab opere solidorum, verum etiam simul & semel ab opere medicamentorum agentium, & reagentium contra solida, & liquida animalium: Minimè itaque purgantium medicamentorum particulæ, sive effluvia per orificia vasorum lacteorum chylum, lympham, sanguinem, aliosque succos ulterius ingrediuntur, aut ingredi conantur: Ingressa autem cum fuerint factio intimo contactu cum particulis fluidorum rotando circa proprios axes asperis suis superficiebus dividunt particulas fluida componentes, partes filamentosas scindunt, & compagem crassarum particularum, & unionem nimis arctam cum tenuibus, ac fluidis aut minuunt, aut laxant, aut tollunt, laxata compage, aut imminuta, aut ablata particularum humoralium inter se majori, & celeriori motu circulationes suas ineunt una cum particulis purgantium medicamentorum, & ad glandulas intestinales facilius, & promptius simul deferuntur: facta enim suppositione totam massam sanguinis esse proxime æqualem libris 24. & cor singula

Sydenham Opera Med. Tom. II.

systole expellere unicam sanguinis unciam, pariterque pulsationes cordis juxta Bartolinum singula hora ascendere proxime ad numerum 4400 facile ostendimus num. 42. totam sanguinis massam purgantibus particulis permixtam per cor 17 vicibus singula hora proxime esse circulandam, consequenter totidem vicibus singula hora per intestina esse proxime deferendam. Si itaque tam facile, tam prompte tota, aut quasi tota massa sanguinis ad intestina deferatur, constabit cur a medicamentis purgantibus agentibus, & reagentibus contra fibras intestinales tot ac tantæ separationes materierum evenire debeant; evacuatis enim prima vice glandulis intestinalibus facile a repetitis circulationibus denuo replentur, & denuo sollicitantur, irritanturque glandulæ ipsæ a permixtis particulis medicamentorum, sicque novam parant, & paratam sollicitant excernendæ materiæ quantitatem.

50. Tanto autem parandæ, & excernendæ materiæ instituto juvat ulterius frequentia oscillationum, quæ a purgantium particulis vasibus continentibus communicatur: Vasa enim continentia continuo sollicitata a particulis medicamentorum, quæ fluidis permiscuntur, celeriori motu oscillationum oscillant; transeunt itaque frequenter a sectionibus majoribus ad minores, & rursus solcite ad majores sectiones restituntur, communicando frequentiores impetus fluidis contentis: cum autem fluida celeriori velocitate mota excerni debeant, ac separari, ex mechanicis, ab orificiis vasorum, aut glandularum in ratione composita quantitatibus, & velocitatibus fluidorum, (aut juxta nonnullos quadrati velocitatis ipsorum), & orificiorum vasorum, ideo in frequentiori motu oscillatorio vasorum cum æqualibus temporibus majores promoveantur humorum quantitates, majoresque pariter velocitates ipsorum, certe copiosiores humorum quantitates abisdem, similibusque glandularum orificiis eunt excernendæ.

51. Quod si argumentum hoc sedulo expendere velimus, patebit aliam præstantissimam supra modum conferre ad feliciter humorum separationem: ut autem hanc causam aliori methodo exponamus, necesse est præmittere nonnulla desumpta ab experimentalibus Philosophia: Corpora videlicet aquea, sive, ut Chemicis vocibus utar, menstrua aquosa apta esse non solum ad salium dissolutionem, verum etiam ad dissolvendas substantias resinosas, ut gummi

S 1 Ara-

Arabicum, Tragacanthum, Bdellium, Ammoniacum, & similia; corpora vero sulphurea ad penetrandas, dissolvendasque sulphureas pariter materias esse disposita; sic oleum terebinthinæ penetrat sulphur commune, aperit, & solvit: ita corpora salino-sulphurea opportuna esse ad omnia quoque salino-sulphurea composita dividenda, & dissolvenda, omnia denique corpora salina tantummodo valere ad salinas potissimum massas penetrandas, ac divellendas, ut universa Philosophorum, & Chemicorum experimenta ultro confirmant; deinde apertum est singula viscera machinæ animalis eo esse instituta, ut peculiares succos secernant e glandulis viscerum mole, figura, & motu dissimilibus, sed proportionalibus pro diversi generis succorum separatione a massa sanguinis, ut prima parte Mechanices Morborum num. 8. & sequentibus satis exposuimus, & ut universa naturæ phænomena satis superque ostendunt.

52. Hisce præmissis, ingrediatur gratia exempli rhabarbarum ventriculi capacitatem, hoc quidem dissolutum a salinis ventriculi cuneis, & a reliquis componentibus succum biliosum, & pancreaticum, & in minimas particulas redactum chylum, lympham, & sanguinem penetrat: certe quaquaversus in solida, & fluida agens separationes quidem in genere potens est exercere; verum eo tempore quo opere circulationis hepaticas glandulas penetrat, hic potissimum statuere experimus specifica, & præstantiora sua momenta, ac validiores suas vires: constat enim ab effectis opere rhabarbari biliosas potissimum particulas sollicitè, & copiose eliminari supra reliquos succos animalis: cum autem ex chimica analysi bilis multo abundet sale, & sulphure, ergo cum salino sulphurea composita facilius, & promptius dissolutionem patiantur a corporibus pariter salino-sulphureis, colligere jure possumus elementa rhabarbarum componentia potissimum esse salino-sulphurea, & ab homogeneis succis biliosis facilem, ac majorem pati posse dissolutionem. Cum itaque rhabarbari particula hepaticam substantiam fuerint ingressa, hic potissimum facta mixtione istorum corporum homologorum inter se vires, ac momenta istorum majora reddenda erunt, & primo succus biliosus in hepate facile esse potest ad modum mensuræ dissolventis rhabarbarum, bilis enim solvens, & rhabarba-

rum solvendum sunt, ut diximus, ambo homologa, & homogenea corpora inter se, videlicet salino-sulphurea; Hinc rhabarbarum a particulis biliosis magis magisque in hepaticis glandulis fractum, ac dissolutum, & copiosiores successive particulas emittens, aptum erit tali specifico nisu, ac impetu sollicitare fibras glandularum hepaticarum, itaut a talibus specificis oscillationibus fibrarum sequi debeant majores, & copiosiores secretiones corporum biliosorum, quæ sint talibus fibrarum motibus, seu oscillationibus proportionalia. Secunda methodus specificæ actionis, & reactionis inter rhabarbarum, & succum biliosum talis quoque esse poterit: sulphureæ enim bilis particula suo pollet elatere; ergo facta mixtione, & unionem particularum elasticarum bilis cum elasticis particulis rhabarbari & facto ulterius nexu salium unius cum salibus alterius vires augeri debebunt proxime in ratione composita ex ratione numeri particularum elasticarum, & salinarum compositi biliosi, & particularum elasticarum, & salinarum rhabarbari, & ratione motuum utrorumque; quare facta mixtione, & unionem particularum bilis cum particulis rhabarbari, vires ac momenta hujus specifici compositi in tali ratione composita augenda erunt. Quamobrem ab hisce specificis viribus, ac momentis facto frequentiori, ac potentiori stimulo contra glandulas hepaticas frequentiores pariter, & potentiores oscillationes specificæ glandularum hepaticarum erunt secuturæ ad ulteriorem bilis ab hepate separationem, ut num. 10. primæ Partis Mechanices Morborum indicavimus: hisce probabiliter legibus inmixta fuit veterum Medicorum opinio, quæ medicamenta electivè purgantia decreverat; ab hac enim duplici methodo agendi, & reagendi medicamenta electivè purgantia vires suas ostendere videbantur.

53. Neque dicas a rhabarbari particulis excitari posse actionem separationis in aliis quoque visceribus, ut in pancreate, mesenterio, renibus, ac in hepate promota fuerat; eo quia quamvis aliqua excretio aliarum materierum in aliis visceribus excitari possit ab opere particularum rhabarbari; nihilominus secretio aliarum particularum in cæteris visceribus multo minor, ac levior futura erit secretionem biliosarum particularum faciendâ in hepate a specifico opere rhabarbari; numeri enim particularum biliosarum specifico sale, ac specifico sul-

pho-

phure prædictarum homogenearum salis, & sulphuri rhabarbari multo majores sunt in hepate, quam in reliquis visceribus, consequenter corpora biliosa agentia, & reagentia contra homologas rhabarbari particulas in ratione composita majori numeri salis, & sulphuris biliosis, & ratione elateris sulphuris ejusdem majoribus quoque viribus, ac momentis in hepate erant operatura: vicissim cum a phaenomenis medicis habeamus rhabarbarum facilius, & potentius agere, & reagere figura, motu, & elatere pro majori secretionem bilis ab hepate, quam reliquorum humorum a reliquis quoque visceribus; ergo colligere jure ac merito possumus specificas actiones, & reactiones rhabarbari contra biliosas particulas, & specificas actiones, & reactiones particularum biliosarum contra rhabarbarum se haberet ut menstrua inter se vicissim proportionalia, ad mutuam inter se dissolutionem exequendam. Ex mechanicis enim edocti sumus effectus semper esse causis suis adæquate proportionales; hinc opere rhabarbari per omnia licet viscera circulantis majores quidem quantitates biliosæ materiæ, quam reliquorum humorum (quarum aliquid concedimus separari posse) erunt majori numero in hepate secernendæ, ob majorem rhabarbari cum fibrosis particulis proportionem, & homogeneitatem.

54. Similiter ratiocinari poterimus, si considerare voluerimus actiones, & reactiones eorum purgantium, quæ a Medicis *Phlegmagoga* dicuntur, in quorum classe sunt mechoacanna, jalappa, agaricum, turbit, hermodactilus, ireos, esula, colocynthis, &c. Hæc primario serum solvunt, & promovent duplici pariter methodo, quarum prima respicit phlegmagoga, hæc medicamenta relate ad serum secernendum; secunda respicit serum ipsum relate ad exposita medicamenta. Primo itaque medicamenta phlegmagoga apta sunt asperis fuorum salium superficiibus circa proprios axes rotantibus fibrosam sanguinis, & feri concrescibilis texturam penetrare, laxare, aut scindere, qua magis aperta ac dissoluta fluidior feri portio copiosior fluenda erit, & facilius per intestinales glandulas secernenda: deinde probabile est phlegmagoga elementa cum ad intestinales cellulas delata fuerint opere circulationis, hic juxta fuorum angulorum, ac motuum differentias specificis motibus sollicitare fibras glandularum intestinalium, qua facta sollicitatione,

specificæ, ac determinatæ in fibris eveniunt oscillationes feri molibus, figuris, ac motibus proportionales; etenim, per primam propositionem hujus, motus fibrarum semper sequi debent in statu naturali juxta impressiones corporum impellentium: cum autem a specificis oscillationibus fibrarum glandularum secernenda sint a sanguine illa porissimum elementa, quæ specificis oscillationibus fibrarum mole, figura, & motu proportionalia sint (ut prima Parte Mechanices Morborum numero 8. ostendimus); ergo patebit a phlegmagogis specifica actione, & reactione sollicitantibus fibras glandularum intestinalium secuturas esse copiosiores feri a sanguine separationes determinatis illis glandularum intestinalium oscillationibus proportionales; quare materiæ serosæ copiosius separatæ in cavitatibus intestinalium evomendæ erunt. Ulterius judicari probabiliter potest elementa corporis phlegmagogi facilius, & promptius adhærere, & uniri sero, & corporibus feri, quam reliquis componentibus massam sanguinis, ea videlicet ratione, qua experimur mercurium facilius, & promptius uniri auro, quam reliquis mineralibus, & solas auri particulas potentissime penetrare, ac scindere. Ita edocemur plantas, & plantarum radices enutrirî singulas, & crescere ex determinatis succorum a terra extractorum corporibus ipsis adhærentibus, utpote ipsismet plantis proportionalibus, & homogeneis, rejecto ut plurimum aliorum corporum consortio. Quamobrem elementa corporis phlegmagogi facilius alligata, & unita sero, & feri particulis, factoque augmento molliam, & virium inter se efficiunt faciliorem penetrationem glandularum, ut qua data porta exeant majori numero serositates cum paucis aliorum corporum consortio; hinc a phlegmagogo corpore plus fluidi feri, plus feri concrescibilis promoventur, & feruntur extorsum, quam reliqua elementa massam sanguinis componentia promoveantur. Juxta tales fortasse naturæ leges veteres Medici phlegmagoga hæc medicamenta elective purgare serum, & aquas arbitrati sunt.

55. Modo expendere debemus serum ipsum relate ad exposita medicamenta. Serum enim ex Chemicis haberi potest ut aqueum menstruum non solum ad penetranda, & dissolvenda ea corpora talini generis, quæ feri particulis proportionem respondent, verum etiam ad penetrandas, &

dissolvendas illas resinofas texturas, quæ mole, figura, & porositatibus aptæ sunt excipere subtiles lymphæ sphæricas, & volatiliores lymphatici salis particulas dissolutioni specificarum resinarum resinarum institutas: hinc ab hoc aqueo menstruo specificis salibus composito penetratur, & rumpitur non solum mechoacanna, jalappa, agaricum &c. verum etiam penetrantur, & divelluntur resinofæ quædam substantiæ, ut scerebinthina, gummi arabicum, ammoniacum, sagapenum, sacrocolla, & his similia, quibus penetratis, ac dissolutis a salino hoc aqueo fluido elementa sanguinis, aliorumque corporum quoad molem immittuntur in ratione cubica, quo vero ad superficies in ratione quadrata; quamobrem quoad molem multo leviora, & mobilia redduntur, quo vero ad superficies hæc remanent majores, quæ sustinendo majores contactus cum particulis aqueis, necessario majorem adhesionem, & unionem efficiendo cum aqueis particulis, ab hisce aqueis sphæculis, aut quasi sphæculis facilitatem motus excipiunt, ut glandulæ, aut renales, aut utraq; a majori motu corporum transeuntium laxatæ, dilatatæ, & apertæ serosis potissimum fluidis viani parent.

56. Hæc data opportunitate discendi de medicamentis, quæ elective operari videntur, nolo dissimulare exponere probabilem rationem, propter quam experimur nonnulla vegetabilia, ut hellenium mures enecare, nucem vomicam canes occidere, reliquis animalibus illæsis; nonnulla vero ab animalibus desumpta, ut cantharides vesicam humanam specificè lacerare, & urinas promoveri, reliquis visceribus sine noxa remanentibus; denique nonnulla mineralia, ut mercurium, fauces irritare, & erodere, & salivationem ut plurimum promoveri. Hæc phænomena clare ostendunt variam esse texturam, & compositionem principiorum sanguineas massas componentium juxta varias animalium species; quamobrem particulae componentes hellenium permixtæ cum sanguine murium facile elaborant moles, quæ in hisce animalibus sunt pondere, superficie, figura, & motu quodammodo veneficæ; & solummodo fluidis per mures circulantibus inimicæ: Nux vomica permixta cum sanguine canum, & felium componere facile possunt particulas, quæ se habent mole, pondere, superficie, figura, motu; & elatere veneni ad modum pro solis canibus, & felibus enecandis; simili-

ter cantharides sine noxa mixtionem inire possunt cum sanguine humano; cum vero istæ aut in renibus, aut in vesica unionem fecerint cum tali determinato numero salis armonicalis urinam componentis, tunc tales moles componi possunt, quæ pondere, superficie ac figura, stygiam veluti indolem acquirant, aptam renales glandulas, aut vesicam potentissime lacerare, urinarum mucus dissolvere, & urinas validissime promoveri. Sphæculæ pariter mercurii cum ex natura figurarum sphæricarum semper in motu esse debeant, ideo sine noxa cum fluidis possunt permisceri, & circulare: cum autem mercurius experietur ab effectis a saliva præsertim hominis jejuni aliquantulum detineri, ac firmari, propterea mercurius cum ad loca salivaria, aut ad loca salivæ analogæ pervenerit, hic mora, & quiete acquisita, & hac data occasione quietis a salivæ salibus undequaque circumscriptus, relicta figura sphærica polygonam figuram acquirit, propter quam in hisce locis majorem moram faciens, & firmitatem acquirens, majores vires, ac momenta exerceri pondere, & aspera superficie, quam a corporibus circumscribentibus sibi comparaverat, parta faucium, oris, aliarumque partium erosionem, & copiosa salivæ separationem: Similia quoque phænomena in chemicis manifesta esse videntur, sulphureæ enim particula unitæ particulis nitrosis, aut vitriolicis tali numero ac mole inter se arsenicale compositum elaborant, quod veneni ad modum operatur contra fluida, & solida, quamvis, componentes particulae sejunctim sumptæ omnino sint innocuæ; similiter ex miscella spiritus nitri cum spiritu vitrioli tertia quadam substantia emergit, quam aquam stygiam appellamus validissime erodentem, quantumvis componentia sejunctim accepta beneficia non lethalia esse experiantur. Ex his colligere possumus specifica phænomena purgationum in animalibus, ut plurimum contingere, quotiescunque determinata fluida cum determinatis, ac specificis corporibus, ut fluidis alterius generis copulentur determinatis in locis machinæ animalis: hisce enim in locis specifica fieri possunt ex determinata mixtione, & unione corporum composita quadam, quæ ob nova pondera, novas superficies, figuras, ac motus peculiare actiones, & reactiones exercent, a quibus determinatæ separationes humorum sive bonæ, sive malæ consequi debeant, aut be-

nefi-

nesicio, aut detrimento animalium; quomobrem quæ diximus de rhabarbaro, ut plurimum expellente biliosas materias, quæ de jalappa, mechoacanna, hermodactilis &c. seu de phlegmagogis expellentibus ut plurimum a glandulis intestinalibus serositates, simili lege, ratione, ac methodo de quibuscunque aliis medicamentis dicendum erit specificas actiones, & reactiones contra peculiaris fluida, & solida corporis exercentia, specificas materierum separationes promotura.

57. Quærendum denique est, cur post purgationes alvus styptica soleat remanere; facile autem quæsito satisfacere poterimus, si considerabimus ab opere medicamentorum sollicitantium, & stimulantium fibras, & glandulas intestinorum, has coactas esse frequentissime, & celerrime oscillare, consequenter motum peristalticum intestinorum factum fuisse celerrimum, ac frequentissimum: quare cum a celeriori, & frequentiori motu sequantur necessario majores effusiones fluidorum non solum præternaturalium, & elasticorum succi nervei, ideo hisce majori numero effusis, ac deperditis fibræ omnes, & glandulæ intestinales laxatæ, enervatæ, & in statu inertiae reddendæ erunt; quomobrem post purgationes glandulæ, & fibræ lentescendo in suis oscillationibus tarde, ac lente separationes, & excretiones materierum imposterum erunt paraturæ, ita ut post purgationes alvus styptica reddenda sit. Accedit quod in purgatione major seri copia excernitur, quam necessitas postulat, hinc multo minor copia remanet post purgationes, fibræ, & glandulæ intestinorum magis exsiccantur, & aridæ redduntur, hinc minus aptæ sunt ad opportunos, ac validos motus oscillatorios, seu peristalticos exercendos pro materierum separatione, proinde alvus styptica erit secutura.

DISSERTATIO VI.

De Medicamentis Vomitum excitantibus.

58. **C**orporis purgationes potissimum sunt; aut per medicamenta alvum moventia, aut per medicamenta vomitum excitantia. Cum vero de purgantibus per alvum in antecedentibus dissertationibus

actum fuerit, ideo ordo rei agendæ postulat, ut in præsentis de medicamentis vomitum excitantibus acturi simus. Hic autem de vomitoriis acturi, solummodo considerabimus illas causas vomitus, quæ a medicamentorum stimulo cognoscendæ sunt: negligimus itaque vomitum illum, qui a vertigine, a vulneribus, a motu insueto corporis, ut in rheda, in navi &c. quæ causæ vomitus facile referri possunt ad illas causas, quas a medicamentorum irritatione partas esse inferius ostendemus. Cum ergo actiones medicamentorum per vomitum nullo modo explicari jussu possint, nisi præmittamus ea, quæ ab Anatomicis necessaria esse indicantur, ideo juxta celeberrimum Heisterum considerabimus: *Ventriculum sub figura utriculi luforii, quia quadruplici numero membranarum munitus est. Prima itaque istarum membranacea est, cujus fibræ transverse procedunt. Secunda musciosa, in qua fibrarum ordo varius est, & quasi inextricabilis; quedam enim quasi circulares a parte superiori ad inferiorem descendunt, alie in superiori ventriculi parte inter utrumque crificium, alie a sinistro latere ad dexterum oblique excurrunt, quedam orificia ambiunt. Tertia nervea rugas efficiens multis vasis sanguiferis, & parvis liquidum gastricum secernentibus instructa. Quarta villosa, tenuis, porosa præcedenti nerveæ arte adherens; Per hanc tunicam etiam quandoque oscula excretoria hiare glandularum ventriculi prope antrum pylori celeberrimus Morganius adnotavit. Adversa. Anatom. 3. pag. 6. Præterea acciunt arterie gastricae ad venam portæ tendentes: ubi notanda sunt vasa brevia ad rami splenicum abeuntia, & vena coronaria ventriculum ambiens. Nervi deinde circa sinistram orificium intrantes a pari vago admodum insignes sunt, hinc adeo sensibile redditur sinistram ventriculi orificium, denique vasa lymphatica ad receptaculum chyli abeunt. Ventriculus duo obtinet orificia, sinistram unum cum gula continuum, multisque rugis instructum, quod longe altius est dextero, dexterum vero, qui pylorus appellatur cum intestinis alligatur, quo in loco adest singularis valvula ventriculi, qui anteriora spectat.*

59. Prudentissimus itaque Clinicus vel naturæ, vel morbi necessitate imperet ægrotantibus assumere vomitoria, brevi tempore particular vomitorii vel pondere vel aspera superficie, vel motu, vel vi ex hisce omnibus composita, unita etiam succis facile salinis

linis, qui a nervea membrana ventriculi continuo separantur pro penetratione, & dissolutione ciborum, elaborant potentissimas vires in ratione composita ponderum, superficierum, & motuum corporum permixtorum inter se; quamobrem tali ratione agentia, & reagentia vomitoria primo stimulant membranam villosam, quæ cum membranz nerveæ arte adhaereat, statim nervea membrana consensu facto stimulat. Cum verò stimulus vomitorii fiat a continuo contactu ejusdem supra membranam villosam; ideo & nervea membrana continuos stimulos excipiens, & sustinens multo majores exercet contractiones, quam distractiones: hic animadvertendum est nerveam membranam emittere fibrillas nerveas quaquaversus per spatia proximæ membranz musculosæ pro necessario motu ejusdem; quamobrem cum muscularis membrana duplici fibrarum ordine donata sit, quorum alter circularis est a parte superiori ad inferiorem descendens, altera vero oblique sive spiraliter varias directiones motus describens; ideo ambo isti fibrarum ordines primario statuent convulsivas ventriculi anomalias.

60. Et primo cum membrana nervea continuos stimulos sustinens a villosa communicatos coacta sit multo majores pati contractionis gradus, quam moveri motibus distractionis; ideo & membrana subsequens muscularis omnimodam relationem habens cum nervea crispationem, & contractionem ferre debet; hinc statim circularium fibrarum ordo membranz muscularis statum contractionis acquirens parat sectionem minorem ventriculo, cum autem iste transitus ventriculi a sectione majori ad minorem fieri non possit sine necessaria fundi elevatione versus sinistrum ventriculi orificium; ergo contenta omnia in ventriculo versus gulam primo elevari coacta erunt. Etenim cum fibræ circulares versus pylorum multo sint minoris diametri, quam sint fibræ circulares fundi ventriculi, idcirco cum circulares sectiones ex geometricis decrescant semper in ratione quadrata suorum diametrorum, profecto cum sectio pylori, seu dexteri orificii sub minori, aut minimo diametro contenta stricta fuerit, ac clausa, adhuc sectio fundi ventriculi sub multo majori diametro remanebit satis aperta, ac dilatata, quare dexterum ventriculi orificium arctissime constrictum, & clausum impediet, ne contenta in ventriculo obsun-

dum elevatum, & proportionaliter constrictum per intestina transmittantur, quia immo materiæ contentæ versus fundum, & sinistrum ventriculi orificium expulsa, & hisce in locis suas irritationes ultro exercentes tandem aliquando fundum ventriculi fortiter, & convulsive contrahunt, & adaucla fundi angustia cogunt materias contentas violenter impelli sursum parto vomitu. Ulterius tanto operi constrictionis pylori, & fundi ventriculi conspirat proportionalis contractio fibrarum pariter obliquarum, seu spiraliū, a quarum viribus fortissime constrictionem circularium sustineri, & conservari necesse erit. Cum itaque totus ventriculi fundus ab assidua irritatione contractus, & crispatus convulsive sursum elevatur, & pylorus, seu dexterum orificium fortissime constrictum, & omnino clausum reddatur; ergo impedito motu materierum per intestina, opus erit contentas materias, & fortiter compressas a capacitate ventriculi jam decrescente in ratione quadrata diametrorum fibrarum circularium per dexterum ventriculi orificium sursum violenter esse expellendas.

61. Verum sentio in hac re arguentes, si a stimulo vomitorii irritantur continuo fibræ ventriculi, cujus irritationis opere stringitur, & contrahitur pylorus; ergo ab eadem causa irritante stringendum quoque erit orificium sinistrum ipsi gulæ continuum: quapropter materiæ contentæ neque sursum per vomitum, neque deorsum per intestina erunt expellendæ. Optima quidem dubitatio; & sane si ea proportionem fibræ sinistri orificii plurimis nervis separata redderentur contractæ, ac reddantur strictæ & clausæ fibræ dexteri orificii, seu pylori, proculdubio materiæ contentæ lethali vitæ periculo neque sursum per vomitum, neque deorsum per intestina moveri potuissent: sed violenter in ventriculo detentæ gravissima ventriculi tormina, convulsiones, aliquando inflammationes cum lypiria febri producerent. Verum debemus animadvertere sinistrum ventriculi orificium cum gula continuum multo altius esse dextero, sive pyloro, quare contentæ materiæ pondere suo occupant primo fundum ventriculi, deinde facilius, & promptius pylorum, non solum quia hic est sinistro humilior, verum etiam quia motus peristalticus fibrarum ventriculi a gula ad pylorum successive dirigitur; cum itaque a pondere materierum potissimum pylorus, & pars fundi versus pylorum teneantur,
ideo

ideo facta in hisce locis majori densitate, pondere, & asperiori graviorique contactu corporum ingestorum, multo magis contentæ materiæ stimulantur pylorum & partem fundi pylorum versus, quam reliquas partes a pyloro remotiores; hinc in dextero orificio, & partibus huic proximis major contractio, majorque convulsio erunt secuturæ; effectus enim sunt causis suis adæquatis proportionales, quare effectus contractionis, & convulsionis in partibus pylori majores, & validiores ac continui esse debebunt, in quibus causæ irritantes, ac stimulantes fuerint pondere, densitate, & asperiori contactu majores, validiores, & continuæ; quamobrem in spatiis pylori validiori excitato motu convulsionis molestæ istæ materies sursum, seu gulam versus erunt impellendæ, versus quam sola major porta aperta remanet, seu minor resistentia concessa est parto vomitu, ut etiam antecedenti numero indicavimus.

62. Talis elevationis necessitas gulam versus materierum molestarum ventriculo ultro consequitur a motu pressionis sursum totius abdominis opere nervorum paris vagi, qui cum membrana nervea communionem habent; isti enim effusi per abdomen totum convulsiva contractione acquisita sursum elevant viscera abdominis, intestina, musculos &c. quæ omnia simul impetu facto in ventriculum contentas materias sursum per gulam validissime ulterius urgent ad majorem vomitus generationem.

63. Præter hæc Mechanicæ leges supramodum favent tam necessariæ elevationi materierum gulam versus, & per gulam ipsam. Cum enim pultacea materies sit quid compositum ex corporibus solidis, & fluidis, elasticis, & non elasticis, & compressio massæ chylaceæ in minus volumen per pressionem factam ab elevatione, & constrictione fundi ventriculi, & dexteri orificii: pariterque cum elasticitates corporum elasticorum sint viribus comprimentibus quam proxime proportionales; ergo cum in elevato fundo ventriculi, & in spatio præcipue dexteri orificii fiat, cæteris paribus, major pressio, & coarctatio chylaceæ materiæ, necessario elementa elastica sulphurum aëris, & flatuum componentia hanc pultaceam substantiam majorem, cæteris paribus, elaterem acquirere debebunt pylorum versus, & in parte fundi ventriculi pyloro proxima. Quamobrem cum elasticæ particule pervenerint ad ultimum

terminum suæ compressionis in hisce partibus pylori, & pyloro proximis, cogentur talem violentum dilatationis usum sibi comparare, passis compressionibus proportionalem: cum vero nullum majus spatium occupandum remaneat, nisi versus sinistrum orificium, seu gulam versus, versus quam majus spatium apertum est, minorque occurrit resistentia; ergo major dilatatio, & potentior rarefactio ejusdem massæ chylaceæ vi caloris interni, & externi acquisita facienda jure erit gulam versus; principio autem gulæ occupato ultro augetur necessitas expediti motus materiæ ascendendæ, aut ascendente per œsophagum. Etenim œsophagus est canalis membranofus multo angustior ventriculo; quare ex mechanicis cum velocitates corporum fluentium sint in ratione reciproca sectionum canalium; ergo facta pressione fluidi chylacei a compressionem communicata ventriculo, motus materiæ chylaceæ in latiore spatio ventriculi ad motum ejusdem materiæ chylaceæ jam occupantis minorem gulæ capacitatem, ac sectionem, erit reciproce, aut quasi reciproce ut major motus per minorem capacitatem gulæ, ad minorem motum per latius spatium ventriculi; propterea manifestum erit quanto majori motu, & quanta majori velocitate chylacea materies, quantumvis leviter mota in ventriculo coacta sit majori velocitate moveri per œsophagum, quotiescunque ob passam pressionem in ventriculo, & versus sinistrum orificium impulsæ, gulæ principium ingressa fuerit: motus itaque chylaceæ materiæ per œsophagum, seu vomitus expeditus, & promptus necessario erit futurus.

64. Modo arduum phenomenon explicandum remanet, quod medicam praxim agens aliquando vidi mirabundus. Aderat monialis, quæ pisces talis speciei nullatenus in ventriculo detinere poterat, coacta erat post aliquod tempus cum vomitu solos pisces sine reliquis ut plurimum cibariis emittere: cognovi Medicum qui carnem suillam quantumvis plurimis cibis permixtam, attamen hanc tantummodo evomebat; quamvis argumentum hoc fallaciosum esse videatur, nihilominus probabilia cogitanti occurrunt mihi considerare naturam præstantissimam sui ipsius conservatricem separare a glandulis nerveæ membranæ ventriculi succos variæ indolis compositos ex particulis aqueis, sulphureis, & salinis diversæ molis, ponderis, & figuræ, quæ salium particula

culæ se habeant ut cunei multiplicium superficierum, & angulorum, ut juxta multiplices ciborum dissolvendorum differentias Angularia, & specifica veluti menstrua penetrantia, & dissolventia cibos haberentur: sicut enim in Chemicis, ut num. 51. innuimus, singula corpora penetrantur, & dissolvuntur a similibus, & homogeneis, sicut aqua fortis argentum, reggia vero aurum, & acetum plumbum penetrant, ac solvunt; ita cum præcipua actio ventriculi sit penetratio, & dissolutio ciborum opere potissimum succorum, qui a glandulis nervæ membranæ ventriculi continuo seceruntur, facile erit judicare naturam artis magistræ tam admirandum opus penetrationis, & dissolutionis ciborum obtinere posse beneficio, & opere specificæ differentię corporum agentium, & reagentium contra cibos in ventriculo contentos, ita ut similia, & homogenea a similibus, & homogeneis præcipue penetrentur, & scindantur; a dissimilibus vero, & heterogeneis aut imperfectam, aut ægram, aut nullam penetrationem, & dissolutionem acquirant: hinc juxta leges naturæ amanti proportionis corporum, figurarum, porositarum, & motuum eorundem inter se manifestum erit multiplicia corpora, dissolventia, quæ promiscue separantur a glandulis ventriculi quoad potentiam apta esse cibos penetrare, ac solvere, sed imperfecte, & languide; quo vero ad actum, seu ad usum specificum, & determinatum penetrationis, & dissolutionis eorum certum erit similia & homogenea solum a similibus pariter, & homogeneis quoad figuras, poros, & motus facilius, citius, & perfectius penetrari posse, ac dissolvi, ut physica experimenta a legibus naturæ petita omnino declarant.

65. Deinde considerandum est; quod ut specifica cibi differentia apte, & perfecte penetretur, & scindatur a specifica actione, & reactione particularum, sive caneorum dissolventium, debet cibus iste aptus esse, ac dispositus ad intime se permiscendum cum reliquis ciborum particulis; a perfecta enim & intima miscella istius cum reliquis cogitur excipere quaquaversus percussiones particularum dissolventium, seu cuneorum, quorum auxilio penetratur & frangitur hæc specifica cibi differentia potissimum ab illis corporibus, aut cuneis salinis dissolventibus ipsi cibo dissolvendo similibus, & proportionalibus. Hisce præmissis, si aliqua cibi species extiterit in

ventriculo, quæ non sit apta ad perfectam, ac necessariam mixtionem sibi comparandam cum reliquis ciborum particulis, & ulterius in ventriculo aut minora sint, aut languida, aut nulla existant corpora illa dissolventia, homogenea, & proportionalia specificæ illi speciei cibi dissolvendi; tunc illa cibi species non perfecte permixta cum reliquis, neque opportune poterit penetrari, frangi, ac dissolvi; Quamobrem hæc cibi species imperfecte, aut nullo modo mixta cum reliquis, neque dissoluta, & fracta, cæteris gravior, ac ponderosior remanere debebit, consequenter ventriculo molestior; gravior autem & ponderosior reddita cum fuerit, non poterit facile ac prompte moveri versus pylorum, versus quem tota materies chylola naturali motu jam dissoluta, fluidior, & levior reddita paulatim movetur, & dirigitur, sed tali motui versus pylorum resistantiam feret gravitate ac pondere. Cum vero talis cibi species pondere, superficie, & præternaturali tarditate affecta, eveniat quoque supra modum molesta nerveis, & muscularibus fibris ventriculi, ideo facto eo potissimum in loco, cui materies illa adereat, ulterius stimulo, & excitata quadam affectione convulsiva ea lege contractionis promovebitur vomitus solius materiæ molestæ, & gravis, quam antea exposuimus evenire opere medicamentorum irritantium. Tali ulterius actioni vomitus solius materiæ molestæ ac gravis conspirat ipsamet actio, & passio animæ (quantum ex se est, & organa ipsi apte pareant); hæc enim intime compenetrata sensoris suis cogitur moleste sentire, & graviter pati molestas, & graves suorum sensuum, & organorum affectiones; quare anima primario suas actiones exercens in cerebro & cerebello hic moleste, & graviter sollicitata cogitur violenter sollicitare, & proportionaliter impellere potissimum eas specificas fibrillas cerebri, & cerebelli, quæ relationem, & consensum habeat cum illis fibris ventriculi moleste, & graviter affectis a corpore illo molesto, & heterogeneo; quamobrem ultro promoventur, & augentur motus illi contractionis fibrarum nervearum, & muscularium ventriculi, qui sunt ad specificam illam materiam naturæ gravem, ac molestam, volente anima, per vomitum expellendam proportionales. Quod si una cum corpore illo extraneo aliquid etiam materiæ pultaceæ per vomitum emittatur; profecto, vel erit hoc quantitate paucum, vel

vel extraneo corpori arte adhaerens, vel quid agra dissolutum, & reliquis particulis gravius aptum evertere ut antea aequilibrium mixtionis materię pulcrę, ideoque exposita methodo erit hoc quoque per vomitum expellendum. Hac simili ratione eveniunt, qua experimur a sibi particula dolo immissa everfo aequilibrio mixtionis universas vini particulas excitari in violentissimos motus usque dum tota sibi extranei expulsio secuta fuerit.

66. Quamvis vomitoria saepe ac saepius necessaria, & utilia esse videantur; nihilominus aliquando aut caute, aut nunquam erunt exercenda; si itaque aegrotantes non fuerint ad vomendum prompti, neque vomitionibus assueti, tunc vomitus vel caute tentandus erit, vel omittendus; verum si fuerit hæmoptisis, aut scapularum, aut thoracis naturalis angustia, tunc a vomitoriis abstinere oportet. In pariter si ætas tenera, si constitutio ventriculi languida, si inedia precedens fuerint, & vires fuerint enervatæ, & fractæ, tunc penitus debemus a vomitoriis recedere; denique in Pletoricis caute vomitus promovendus erit, nisi prius opportuna sanguinis missio fuerit instituta, facile enim ab impetu evomendi vasa sanguine turgida miserrime rumpeantur.

DISSERTATIO VII.

De Medicamentis Diureticis.

67. **N**emo est qui non intelligat medicamenta diuretica illa esse, quæ serum a sanguineo fluido continuo promoven-
 t fecernendum specifico motu fibrarum renalium, quod inde in ureteres exceptum per vesicam, & per uretram expellitur, quod fluidum expulsum *Urinofum* a Medicis appellatur. Cum itaque renes sint primaria organa talis separationis fluidi serosi, placebit considerare ex datis Anatomicis substantiam renum aliam esse exterio-
 rem, seu corticalem, interiorē alteram. Exterior juxta Malpighium glandulosa creditur, juxta Ruischium vasculosa habita est. Interior vero tubulosa, nempe ex plurimorum tubulorum aggerie composita est: hæc definit aliquando in 10. aliquando in 12. papillas, quæ plurimis foraminulis pervi-
 hant in pelvim: hæc autem pelvis est
Sydenham Opera Med. Tom. II.

cavitas membranosa, quæ inde extra renes collecta, & unita ureteres construit, qui tandem obliquo ductu in vesica terminantur; ab arteriis itaque emulgentibus delatus sanguis ad externam vel glandulosam, vel vasculosam substantiam opere determinatarum oscillationum organis renalibus proportionalium continua sit separatio fluidi seroli a massa sanguinis, quod a tubulis internæ membranæ exceptum & in papillis ultro depuratum in pelvi excipitur, & paulatim per ureteres in vesicam transmittitur. In statu naturalis compositionis renum facile est judicare glandulosa, vel vasculosa illa organa renum esse similia & æqualia inter se, ut apto ordine, & æquabili proportionē æquales quantitates humorum determinatis temporibus secernerentur. Cum enim serum hoc a sanguine separandum leniter, tarde, & isochronis legibus moveatur in glandulosa, aut vasculosa renum substantia, pariterque capacitates glandularum similes, & æquales in naturali renum constitutione haberi debeant; ideo similes, & æquales quoque contentæ quantitates humorum exercendæ jure erant ex mechanicis in ratione luminum, seu sectionum corporum glandularium, vel vascularium; hinc fluida serosa æquabiliter suscepta ab interna tubulorum aggerie, æquabili quoque ordine, motu, & tempore transmittenda erunt in papillas, & ab his in pelvim, a pelvi in ureteres, & ab ureteribus in vesicam, ut determinata quantitate, statutoque tempore per uretram expellantur.

68. Hæc in statu naturali: sæpissime autem experimur primo a medicamentis aqueis, aut quorum basis est aquea, ut sunt aqua communis, serum lactis, & aquæ minerales &c. promoveri urinarum quantitates. Secundo a laxantibus, & emollientibus medicamentis easdem sequi urinarum copias, ut sunt oleum amigdalorum dulcium, terebinthina, & succi herbarum emollientium ut malvarum, betarum, parietariæ, violarum fragariæ, alteæ, &c. tertio a salinis medicamentis variæ indoli, quorum vis est aperire, ac solvere texturas fibrosas humorum, aut sollicitare, aut stimulare organa renalia, ut sunt nigella, allium, pastinaca sylvestris, raphanus, ita sal fabarum, tartari, ammoniaci &c. pariter plurimi sunt succi essentiales herbarum, ut petrosellini, feniculi, asparagi, dauci, dictami, rapæ, persicariæ, acerosæ, anagallidis, irionis, praveræ, bravæ, &c. quorum

rum decoctiones, nec non istarum pulveres urinas copiose educunt, quibus addere poterimus millipedes, mel, & plurima alia hisce similia, quorum vis salina primario est, sed aliquo principio sulphureo permixta.

69. Medicamenta ergo diuretica quæ aquea sunt, aut basim habent aqueam, agere potissimum videntur quantitate, mole, pondere, figura: primo enim agunt quantitate, mole, ac pondere, quando etenim quantitates aquarum ingrediuntur vasa animalium, tunc massæ humorum eleuantur ad maiorem altitudinem quaquaversus supra, infra, & ad latera; & successive per longitudinem canalīs repletis canalibus; quamobrem juxta Borellum Prop. 71. secundū Tomi *dē motu animalium*, considerando vasa ut cilindros, haberi possunt vasa in statu naturalis positionis, & eadem vasa in statu majoris extensionis ob aquas contentas, ut duo cilindri similes: sed per Proposit. 11. 12. Eucl. cilindri similes sunt in ratione triplicata, seu cubica diametrorum, quæ sunt in basibus; ergo diameter basis cilindri in statu naturalis positionis fuerit ut 2. & post aquas assumptas extensio diametri basis facta fuerit ut 3. tunc primus cylindrus in statu naturalis positionis & extensionis ad secundum cylindrum in statu majoris dilatationis factæ ab aquis contentis erit in ratione 8. ad 27. Cum tanto itaque augmento valorum ingreditur massa sanguinis externam renum substantiam renales autem cellule vel glandulose, vel vasculose dilatandæ, & ipsæ erunt in ratione majoris quantitatis aquarum effusarum in cellulas ipsas; cum autem istæ ad ultimum terminum dilationis devenierint naturali suo nisu elastice contrahuntur, & contenta fluida per internam tubulorum aggeriem in papillas, & ab his in ureteres valide impellunt: hinc juxta frequentes aquarum successivas transmissiones ad renes urinarum copię per vesicam, & successive per uretram efficiendæ erunt; tanto operi etiam conspirat spherica, aut quasi spherica aquearum particularum figura, quæ cum aptissima sit facillime moveri quaquaversus, & tangentibus corporibus motum tribuere; ideo aqueæ particulæ facillime movendæ erunt, & exterius promovendæ.

70. Hic nolo præterire gravissime peccare illos, qui audacter aquas minerales enormi copia bibere amant, & se has enormiter bibisse gloriantur; primo enim a pondere aquarum dilatatur nimis ventriculus,

& laxatur, ut nervea membrana ejusdem enervata, & iners redditas lenissime oscillare coacta sit, & succos, seu cuneos dissolventes tarde, ac parce secernat; propterea & ob solidorum ventriculi inertiam, & ob succorum dissolventium inopiam, & debilitatem iners imposterum, & languida ciborum dissolutio consequitur; deinde excedens aquarum copia ad renes violenter effusa mole, pondere, ac numero nimis aperit cellulas illas, quibus nimis apertis, nimis quoque laxetur naturalis textura eorum, & inepta imposterum redditur ad específicos fibrarum motus facile, prompte, & valide exequendos, ut in statu naturali exigit æquabilis, & isochrona distractio, & contractio renum eorundem; quamobrem nimis laxatis sinibus, & naturalibus fibrarum angulis paulatim colliguntur in renibus corpora extranea mole, superficie, & numero dissimilia, & heterogenea, quæ asperis superficiebus stimulando, ardores urinarum, dysurias, & strangurias, ut bis & ter vidi, aliquando etiam renum labe, calculos, aut ulcera parturiunt: Nolint ergo gaudere aquarum potatores se ad 180. aut ad 200. & amplius uncias ascendisse, cum tantæ aquarum copię facillime non levia ferre possint pericula a nullis imposterum vincenda remediis; profecto 80. aut 90. ad summum 100. uncia Italica sufficere videntur, ut aquæ sine periculo, sed utilitate bibantur: quod autem aquæ minerales, & his similes tam facile, tam prompte transire, & expelli soleant per urinas, nolite admirari, cum ostensum sit sanguinis circulationem singula hora vicibus 17. proxime esse efficiendam; quibus motibus si addamus quantitatem aquarum, pondus, & salinas particulas, quibus minerales aquæ donatæ sunt, & a quibus viæ renum magis magisque aperiuntur, ultro constabit, quod facta ex hisce omnibus ratione composita virium, & momentorum, constabit, inquam, quam necessario aquæ minerales, & hisce similes prompte a sanguinea massa sperandæ sint, & citissime excernendæ.

71. Sicut autem excedens laxitas organorum renalium plena est periculis, ita apta & conveniens laxitas eorundem ad urinas promovendas opportune conspirat; huic operi favent succi, & potiones laxantes ut violarum, parietariæ, malvarum, altæ, &c. talis ordinis sunt terebinthinata, oleum amygdal. dulcium, oleum lini, & emulsiones laxantes, & similia balneis

non

non relictis; fibræ enim organorum renalium aliquando rigidiores fiunt, ut in senibus, in hystericis, in convulsivis, & hypochondriacis affectionibus facile evenit; firmiores aliquando redduntur magisque consistentes aut præternaturali fibrarum suarum constitutione, aut opere fluidorum viscidorum, & tenacium organis adherentium; fibræ enim renales sæpe, ac sæpius vestiuntur, & mulstantur materia quadam densa, viscida, ac filamentosa, quæ adhzrendo, & circumscribendo fibras, has reddunt mole, & soliditate majores; cum autem moles, & soliditates corporum, cæteris paribus, sint ut pondera, profecto fibræ istæ mole, & soliditate adauctæ, graviores pariter reddendæ erunt, graviores autem redditæ resistunt motui sanguinis advenientis. impulsui succi nervei communicato renibus renalium nervorum auxilio, quare tunc specifici motus renalium fibrarum minores, magisque lenti, ac tardi faciendi erunt pro lenta pariter ac tarda, consequenter minori fluidi serosi separatione; tali autem in statu opportune succurrunt mox exposita laxantia, & oleosa medicamenta, quæ leni, ac molli humectatione, ac penetratione emolliant rigidas illas fibras, & paulatim laxant mucosam illam superficiem fibris circumscriptam, qua emollita paulatim decidunt, & collabescunt viscida illa involucria fibris obvoluta, sic fibræ aut flexiles redditæ, aut spoliatæ, ac denudatæ mucosæ leviores, & mobiliiores fiunt, & ad naturales suas oscillationes exequendas expeditæ redduntur, quibus facile, ac prompte oscillantibus major, & uberius feri copia secernitur, & promovetur ad majorem urinarum ubertatem; cum itaque hæc necessariæ urinarum separationi sufficiant, hisce contentus esse debet Medicus, neque validiora medicamenta tentare debebit; cæterum si adhuc renes non obediunt, ad majora progredi licebit; aperient idcirco contumaces solidorum areas, & mucos, aut extraneas materias fibris, & glandulis renalibus adherentes dissolvent balnea tepida, & exposita illa diuretica quæ salinis spiculis donata sunt, quatenus angulis suis penetrant, & appriunt porositates renales, & viscidas quasunque saburras divellunt, ac rumpunt; diuretica itaque altioris ordinis exercenda erunt desumpta ab animalibus, vegetabilibus, & mineralibus. Inter remedia ab animalibus petita præstant illa quæ parantur a cancriis, millepedibus, a formicis, a ster-

core palumbi, & cantharidibus &c. Inter vegetabilia eminet saxifragia, semina irionis, radix praverabravæ, & salia quælibet a vegetabilibus collecta cum laude poterunt exerceri &c. Inter mineralia adest mercurius, nonnulla ab antimonio desumpta, & ea quæ parantur ex tartaro nitro, calce, & sale armoniaco urgente necessitate postulantur. In hac pariter classe numerari quoque poterunt spiritus salis dulcis, sal urinæ, & nonnullæ aquæ minerales fortes, ac validis salibus potentes; ut Sancti Mauriti, ex valle Solis &c. hujusmodi enim remedia non solum motu, & elatere vim faciunt in solida renum, & magis oscillantia reddunt; verum etiam salinis suis superficiebus fibrosum sanguinis, & feri concretescibilis crassamentum scindunt, ac frangunt, magisque renum poros aperiant, hinc uberius feri contenti copia effluens valide, & potenter renum actiones, & reactiones exercet, ut serum per urinas copiosius educatur; & sane cum ab hisce omnibus agentibus, & reagentibus motu, & elatere augeatur feri velocitas, & a salina, & angulari eorum superficie scindantur filamenta nimis fixa feri concretescibilis, & magis extensi, fiant meatus solidorum renalium necessario fluida serosa secernenda erunt in ratione composita ex numero corporum agentium, ex velocitate, & elatere ipsorum, & ex ratione orificiorum canalium, seu glandularum, quæ ratio composita virium cum potens sit ad serositates promovendas opere renum, & vesicæ, idcirco copiosissimæ effusiones urinarum erunt securæ.

72. Quamvis autem urgente necessitate valida diuretica necessaria esse videantur, nihilominus prudentissime, & semper vocato aliorum consilio adhibenda sunt; scrupulose enim animadvertere debemus a validioribus diureticis sequi quidem posse uberrimas urinarum copias, sed pejori periculo, non beneficio; sæpe enim ac sæpius tantæ humorum viscidorum saburræ deferri possunt ad renes, ut facta primum copiosissima secretionem tenuioris feri, crassior, inde, & concretescibilior feri portio una cum reliquis particulis viscidis, ac filamentosis alterius generis adauctis enormiter molibus impediatur renum acinos, & adeo obstruat tubulos, & papillas urinarias, ut in renibus gravissimæ firmentur urinarum suppressiones totali vitæ periculo. Quod si hæc non eveniant saltem sanguinis effusiones,

& sanguineæ urinæ cum grumis, aliquando etiam hemorrhoidum, aut narium hemorrhagiæ facile poterunt effluere; quamobrem in omnibus medicamentis potissimum diureticis habenda semper erit aqua, & attentata ratio, quantitatis, temporis, & ætatis, ita ut in omnibus sit prudens usus, ne amica remedia in hostilia venena permutentur.

73. Hic sedulo notandum est, nos gravissime incidere in renum morbos, quotiescunque fluida sanguinea, & lymphatica præpollenti austeritate peccaverint; cum enim hæc vitia fuerint, tunc indoles fluidorum aut aluminosa erit, aut vitriolica. In indole aluminosa peccat numerus salium sub figuris octaedricis, aut quasi octaedricis; in indole vitriolica culpantur salinæ illæ particulæ, quarum figura est parallelepipedæ rhomboidea, aut ad has figuras inclinant. Hæc autem corpora cum naturali austeritate polleant, organa primum, quibus applicantur, potentissime ligant, quotiescunque præpollentia hæc corpora extiterint, & veluti materia tartarea circumscribunt; facile est ergo judicare horum salinum figuras occupare, & implere sinus, & spatia fibrarum, quibus repletis, redduntur fibræ nimia firmitate, ac soliditate, constantes, ita ut inflecti, incurvari, & oscillare difficulter possint. In tali autem difficultate oscillationem fibrarum firmatur corporum fluidorum unio, & nexus inter se; Verum hæc ultro augentur, & crescunt vitio fluidorum ipsorum; fluida enim, & ipsa repleta salibus talis naturæ, ac indolis graviora fiunt, ac lentiora; in tali autem lentescencia, ac tarditate factæ majori nexu augentur moles, & pondera partis arenulis, calculis, & lapidibus tam in substantia renum, quam in cavitate vesicæ seri urinosi impedimento. Cum hæc vitia fuerint tam in fluidis, quam in solidis, tunc a radice morbi aquæ potiones, oleosa pharmaca, & blanda emollientia curationem instituunt, aquea enim diluendo, & laxando, & oleosa molli sua superficie emolliendo, & infirmando constantem salium texturam, horumque angulos investiendo stimulos salinos aut frangunt, aut saltem imminuunt, sic arctæ salium uniones dissolvuntur, & in minores minoresque particulas dividuntur, & laxata tali methodo fluidorum, & solidorum compage fibrarum renalium oscillationes, & secretiones seri faciliores, & promptiores consequuntur majori urinarum fluentium

facilitate; tanto beneficio conspirant opportuna æquitas, conveniens motus, balnea tepida aquarum, & balneum olei communis, & vina mollia, tenuia, & facilis transitus. Cæterum si morbus vel in renibus, vel in vesica calculis, arenulis, aut lapidibus statutus fuerit impossibilis, ut plurimum solet esse curationis, quamvis curari soleat ille, quia a lapide vesicæ paratus est facta sectione vesicæ ad lapidis contenti extraktionem; verum tractu temporis similia pericula redire consuecunt.

74. Denique pro hoc argumento non omittendum est non solum a vi morbi, ut in febribus ardentibus, in marasmo, & in emaciatione, verum etiam a violentioribus diureticis sequi aliquando urinas, quæ a Medicis oleosæ dicuntur. Istæ autem raro ostendunt in sua superficie oleosas quasdam guttulas ad instar olei super aquam effusi, ut nonnulli perperam arbitrati sunt, sed ostendunt paulo post excretionem quandam veluti superficiem telis aranearum similem, quæ si diligenter tangatur, edocti erunt Medici a sensu tactus hanc urinæ superficiem esse mollem, & oleosam, oleosæ substantiæ ad instar. Omnibus enim manifestum est urinam esse quid compositum ex oleosis, & filamentosis chyli, & sanguinis particulis sero sanguinis, & lymphæ dissolutis, & inter se commixtis, in quibus tamen excedens salium copia præpollens; quamobrem si facta fuerit sanguinis dissolutio, aut si violenta diureticorum potentia deferat ad renes majora elementa chyli; & sanguinis nutritia, balsamica, & oleosa, quam naturalis seri quantitas postulat, & pori renales magis dilatati fuerint, necessario a renibus separari debent corpora nutritia sanguinis, & chyli plurimis salinis retentis, consequenter oleosæ superficies apparentes, & conspicuæ fiunt in urinis gravissimo agrotantium periculo, & cum tali ipsorum emaciatione.

DISSERTATIO VIII.

De Medicamentis Diaphoreticis.

75. CUM summa, & continua sint beneficia, quæ ab opere transpirationis per universam cutis superficiem eveniunt machinæ animalis; ideo *Diaphoretica Medicamenta*, quæ aut transpirationem pro-

movent, aut augent, judicanda erunt tanquam præstantiora naturæ subsidia: Transpirationis ergo operi tria conspirant organa; *Cuticula*, quæ firmiter adhæret cuti interveniente corpore reticulari Malpighii infinitis foraminulis aperta pro exitu sudoris, & materiæ transpirabilis. Secundo *Corpus reticulare*; quod pariter est ex tenuissima membranula cuticulæ proxime adhærens innumeris quoque foraminibus reticuli ad instar perforata, per quæ foraminula exeunt papillæ cutaneæ, & ductus excretorii cutis, qui habentur, ut universalis cutis emunctoria. Tertio præstantius organum transpirationis habenda est *Cutis*, quæ est valida membrana totum corpus investiens, cujus structura componitur ex fibris tendineis mirum in modum implexis, ex copiosissimis venis, arteriis, & nervis, a quibus papillæ pyramidales per rete Malpighii extensæ prominent; infinitæ ulterius adsunt glandulæ milliares pro secretionem materiæ transpirandæ, & per sudores promovendæ, ita ut cutis universale naturæ emunctorium jure, ac merito æstimandum sit.

76. Modo diaphoretica medicamenta duplici in classe partiiri possunt, alia enim interne per os assumuntur, alia vero externe exercentur. Illa quæ interne per os assumuntur, nonnulla solam habent basim aqueam, nonnulla sulphuream, ut plurimum vero salino-sulphuream. Itaque diaphoretica habentia basim aqueam statuuntur ab aquis calidis, aquæ enim calidæ epotæ sudorem promovent, tales sunt decocta etiam millii, & lentis &c. Diaphoretica quæ basim habent sulphuream, colliguntur a spiritibus, seu aquis ardentibus &c. denique quæ obtinent basim salino sulphuream ostenduntur in regno animali a cornu cervi, a viperis, a busonibus, a lapide histricis, aut infuso, aut decocto in aquis cordialibus &c. in regno vegetabili ab angelica scordeo, centaurea, carduo sancto, saponaria, contrajerva, & ab herbis illis, ac vegetabilibus, quorum sapor amarus est; in regno minerali ab antimonio, a mercurio, a jovalibus, e bezoatricis, & sulphuratis &c. Externa autem diaphoretica colliguntur ab aëre calido, a motu corporis, a balneis, & frictionibus, a cucurbitulis &c.

77. Itaque, de his omnibus necessaria loquamur, primo occurrunt diaphoretica aqueam basim habentia, ut aqua calida, decoctum millii, & lentis &c. Aquam calidam reddi opere particularum ignearum

latentur omnes; nisi enim igneæ particulæ aqueis permixtæ violentissime agitent aqueas, profecto aqueæ particulæ nunquam possent incallescere. In tali autem incallescencia aquea ista elementa adeo attenuantur, ut vaporum naturam acquirant summa levitate, ac raritate acquisitis; cum autem igneis particulis associata fuerint aquea elementa celerrime moveri debebunt in ratione composita ex numero particularum ignearum, & vaporosarum, & motu utrarumque. Ulterius cum aqua igneis particulis in tali ratione alligata e ventriculo penetraverit lactea vasa, & lympham, & sanguinem postmodum occupaverint, hæc rursus alligata particulis aëreis, & sulphureis lymphæ, & sanguinis, alteram componit rationem priori multo validiorem, compositam nimirum ex numero particularum ignearum, sulphurearum, aërearum, & aquearum ex motu singulatum, & elatere ignearum, aërearum, & sulphurearum, quæ ratio composita cum multo validioris momenti esse debeat, fateri poterimus quam necessario communicata universis fluidis maxima velocitate transpirationes, & sudores consequantur. Et sane a tanto momento corporum motu, & elatere prædictorum fluida universa velociori motu ducta, & calore ulterius acquisito attenuari, & rare fieri coacta sunt; attenuata autem, & rarefacta minimas acquirunt moles, & spatia majora occupant in vasis ipsis, majoribus quoque velocitatibus acquisitis; hæc itaque attrita, & rarefacta tandem aliquando deferuntur ad externam cutis superficiem, seu ad glandulas cutaneas, & sic sub transpirationis, vel sudoris indole exterius transmittuntur.

78. Majori quidem momento motus sanguinem, lympham, & succum venæm agitant spiritus ardentis cujuscunque generis, quorum basis sulphurea; sulphur enim ad statum volatilitatis erectum summo pollet motu, & elatere. Animadvertendum autem est sulphureas particulas in velocissima motus, & elateris actione præpollentes supermodum agitas, & attritas quoad gravitatem, & molem decreverit, consequenter semper, magis, magisque leviores fieri, & cæteris paribus velociore, in tali statu potentissimum conatum exercere debent contra objecta corpora non solum in ratione concepti motus, & elateris, verum etiam ratione superheiei sulphureæ etenim superficies corporum multo minus decreverit

EX

ex geometricis, quam ipsorum moles, & pondera: sed resistentiæ, quæ objectis corporibus opponuntur, sunt in ratione superficierum corporum objectorum; ergo cum sulphureæ particulæ plus habeant superficiei, quam molis, & ponderis, necessario cæteris paribus urgere, & impellere debebunt opere suarum majorum superficierum majores quoque quantitates corporum: Quamobrem sulphureæ particulæ agentes, & reagentes summo motu, & elatere, & majori magnitudine suarum superficierum contra objecta corpora validiorem vim exercebunt contra objectas, & numerosiores humorum particulas; sicque cæteris particulas; sicque cæteris paribus particulæ humorum numero majores a sulphureis superficibus impulsæ, vel per sudorem, vel per transpirationem effugient, cum juxta ordinem, ac legem circulationis ad cutaneas glandulas delatæ fuerint: Et quidem hæc minoribus temporum differentiis facienda erunt, eo quia ex mechanicis velocitates corporum sunt in ratione inversa, seu reciproca temporum; ergo quanto ardentissima sulphura velociora sunt, eo suas vires, suosque conatus exercere debebunt minoribus semper temporum differentiis.

79. Ab his progrediendum erit ad illa diaphoretica medicamenta, quæ basim habent salino-sulphuream compositam videlicet ex sale, & sulphure, qualia superius enuntiavimus. Sicut autem quoad motum, & elasticitatem elementa illa potissimum sulphurea antea exposita apta sunt celeritæ, & brevi tempore moveri, & cæteris paribus beneficio suarum majorum superficierum numerosiora objecta corpora impellere: ita elementa salino-sulphurea potentiora sunt sulphureis quoad corporum penetrationem, minus vero quoad motum. Minori quidem momento motus, & elatere valent particulæ salino-sulphureæ, quam possint sulphureæ; quo vero ad penetranda, & divellenda in minimas particulas objecta corpora multo salino-sulphureæ sulphureis potentiores sunt. Ut tanti phenomenon rationem exponamus, placeat animadvertere particulas potissimum sulphureas summo, ut diximus, pollere motu, & elatere; hinc brevissimo tempore multum spatii decurritur a sulphure; cum vero sulphur fuerit sali associatum, tunc cum corpora salina graviora sint sulphureis, supposita molium æqualitate; ergo corpora salino-sulphurea, utpote graviora sulphureis, futura quidem

erunt sulphureis multo tardiora, magisque inertia motu, & elatere, cum sulphurum elater, & motus a pondere salium non parum frangentur. Verum hæc quanto tardiora motu, & elatere inertia sunt, eo ad penetrandum, & divellendum eveniunt aptissima. Etenim ex natura sulphuris specificæ levioris sale habemus impulsu, seu motum sursum per rectas lineas, aut quasi rectas; ex lege autem salis specificæ gravioris sulphure habemus impulsu, nism, & motum deorsum per rectas pariter lineas, aut quasi rectas; ergo in particula salino-sulphurea cum adsit tendentia sursum opere sulphuris specificæ levioris sale, & simul tendentia deorsum opere salis specificæ gravioris sulphure, profecto cum naturæ potentia destruantur, sed utræque, quantum jure suo possunt, agant, & reagant, componetur momentum ex utroque momento compositum: sed tale momentum motus compositum ex motu corporis levioris sursum, & simul corporis gravioris deorsum ex mechanicis legibus describit motum medium inter rectum sursum, & rectum deorsum; hic autem motus medius necessario describit lineam motus ex recta, & circulariter inclinata, quæ spiralis est, aut quasi spiralis, ergo particula salino-sulphurea jure suo cum moveri debeat, ac possit spirali motu, aut quasi spirali in fluidis machinæ animalis, spiralem, aut quasi spiralem lineam motus erit descriptura; Talis autem motus per lineam spiralem, aut quasi spiralem assidue indicatur exemplo lineæ motus, quam sumus ascendens describit: Cum enim sumus sit quid compositum ex particulis aëreis, & igneis respective levibus & ex particulis terreis, aqueis, & salinis respective gravibus, cumque particulæ graves alicui impedimento sint particulis levioribus, necessario cum moveri debeant, mediam certe viam lineæ motus tenere debent inter motum rectum sursum, & motum rectum, aut quasi rectum deorsum: sed hæc media via lineæ motus facile componit motum rectum, aut quasi rectum, & simul circulariter inclinatum, qui ex Mechanicis spiralis est, aut quasi spiralis, ergo necessario sumus compositus ex particulis levibus, & gravibus spirali motu, aut quasi spirali sursum movendus erit, aliquando etiam spiraliter deorsum erit impellendus. Ab hoc experimento sumi, præter ea, quæ prima parte *Mechanices Morborum* n. 7. dicta sunt, arbitratus sum fluida universa-

ma-

machinæ animalis, utpote composita ex elementis, seu particulis gravitate, mole, motu, & elatere similibus, & dissimilibus spirali motu, aut quasi spirali multo probabilius esse movenda.

80. Huiusmodi autem ratio motus, mirum! quantum conspiret ad faciliorem corporum, fluidorum penetrationem; Ut enim facillima habeatur penetratio, debet corpus penetrans anteire per rectam lineam, aut quasi rectam, & simul quasi rotando rumpere impedimenta corporis, & superficiei lineæ rectæ circumscriptæ: sed per motum spiralem corporum, qui ex geometricis compositus est ex recto, & circulari, corpus penetrans ante progreditur per rectam lineam, & simul rotando rumpit impedimenta lineæ rectæ circumscriptæ; ergo facilior penetratio solidorum, & fluidorum a motu spirali, aut quasi spirali tenebræ ad modum suas vires exercendis habenda erit. Ulterius cum fluida componantur ex particulis diversæ gravitatis, molis, motus, & elateris, ideo in perfectissima fluidorum compositione debent pariter perfectissime inter se permisceri. Ostendit enim celeberrimus Borellus prop. 99. & Scholio secundi Tomi de motu animalium, aptissimam, perfectissimamque mixtionem nullo modo a naturâ obtineri posse, nisi per motus vertiginosos, seu spirales; ergo jure, ac merito judicare possumus corpora salino-sulphurea spiraliibus motibus, aut quasi spiraliibus rota, ac necessario auxilio esse naturæ ad corporum, & fluidorum mixtionem, & ad eorundem penetrationem, & divisionem perfectissime exequendas.

81. Cum itaque tali lege motus terebræ ad modum utilissimæ moveantur particulæ salino-sulphureæ, profecto istæ ad diaphoresim supra cæteras validissime pertinebunt. Cum enim fluida quælibet potissimum sanguineæ beneficio circulationis ad externam cutis superficiem delata fuerint, hinc statim occurrit resistentia superanda cutis densæ, & crassæ, hic tenacitas materiæ sebo similis a glandulis sebaceis parata, hic resistentia aliqualis cuticulæ, & potens externi aeris pressio; quamobrem cum motus particularum salino-sulphurearum terebræ ad modum euntium aptissimus sit ad penetranda & ad vincenda impedimenta, ad dissolvendas texturas humorum crassas, lentas, ac viscidas, & in minores moles beneficio terebrationis reducendas; idcirco constare poterit quanta utilitas secutura sit a motu

spirali fluidorum, & particularum salino-sulphurearum ipsorum ad superandas resistentias solidorum objectorum, ad attenuandas materias, dissolvendas, & in minimas moles reducendas, ut facilius, & promptius beneficio sudoris, & transpirationis per cutis superficiem, facillime educantur. Ob hanc causam multo probabiliter judicandum est, medicamenta diuretica sudores, & transpirationes promovere aliquando posse, quotiescunque in ventriculo, aut in intestinis dissoluta unionem fecerint, cum æqualibus partibus sulphurum, & salium, quorum auxilio spiralem lineam motus, aut quasi spiralem, vel valide acquisiverint, aut adauxerint. Cum enim similia diuretica actiones suas exercuerint per spirales lineas motus valide, & potenter magis magisque penetrabunt, & dissolvent in minores, minoresque moles objectas materias, quoties istæ paulatim ex sulphurum consortio statum volatilitatis, aut quasi volatilitatis acquisiverint; propterea magis attenuantur cum fuerint, cæteris leviores reddunt, opere circulationis ad cutim delatæ facile transpirare coactæ erunt.

82. Remanent auxilia transpirationis, & sudoris considerata ab externis auxiliis, ut ab aëre calido, a motu corporis, a balneis, a frictionibus, a cucurbitulis, a suffumigiis &c. Hæc enim omnia adaugent motum, & elaterem particularum fluida componentium; ab hoc enim motu, & elatere adauxilis attenuantur particulæ ipsæ, & ad transpirationem exequendam disponuntur. Hic animadvertendum est a frictionibus, & cucurbitulis agitatam cutis superficiem incallescere, & calefactam rarefieri. Ex Mechanicis enim erudimur in spatiis calefactis dilatari sectiones, & areas cutis; ubi autem sectiones glandularum, & arearum, & areæ cutis dilatatæ fuerint, hic cæteris paribus majores effluunt humorum quantitates in ratione sectionum, & arearum dilatatarum; quamobrem cum opere frictionum, & cucurbitularum major humorum quantitas fuerit ad cutim vocata, & hæc ex legibus motus, & externæ frictionis magis fuerint attenuata, & rarefacta, opus erit hanc vel per sudorem, vel per transpirationem uberiori pariter quantitate esse eliminandam.

83. Cum in transpiratione subtilior, tenuior ut plurimum humorum portio evolet, & deperdatur, crassior vero, & gravior sudori, & transpirationi resistat; ideo cavendum est, ne diaphoreticis abutamur, quo-

tie.

rescunque aut inflammatio fuerit, aut timeri possit, aut cronici, ac longi morbi extiterint. Etenim magis aperta diaphoresi, & deperditis balsamicis, & spirituosis, volatilibusque substantiis, remanentibus particulis crassioribus, tartareis, viscidioribus, & gravioribus, facile inflammationes aut augebuntur, aut denuo emergent, viscerum obstructions fient, morborum, & febrium gravitates augebuntur. Hinc principio morborum, & febrium sudores ut plurimum suspecti sunt, & ob detentorum humorum crassitiem morborum longitudines ominantur, salutare enim sudores nisi concocta materia evenire juxta solent, quæ ab initio morborum obtineri nusquam possunt; Ulterius in uberrima transpiratione, & excedenti sudore leviores, balsamicæ, & homogeneæ copię particularum elasticarum & non elasticarum deperduntur, quæ actionibus animalibus, & naturalibus exequendis inservire debuissent; propterea post graves sudores, & transpirationes ægrotantes admodum enervati, ac languidi reddituri deficere quasi videbuntur; pariter a diaphoreticis abstinendum facile erit, aut caute diaphoretica exercenda erunt, cum natura sudoribus, & transpirationibus non fuerit assuefacta; etenim si violento nisu diaphoreticorum urgeatur, ut plurimum caput periclitabitur, translata ad meninges, & ad vasa torcularis herophili majori sanguinis pondere, ac numero gravissimo capitis detrimento.

DISSERTATIO IX.

De Medicamentis Adstringentibus.

84. **M**edicamenta adstringentia aut imminuere, ac retardare, aut omnino auferre motum a fluidis, & oscillationem a solidis ab experimentis medicis ultro certi sumus; nonnulla enim magis aut minus adstringunt, ut sunt acida, austera, & acerba, alteriusque indolis ramosæ, & filamentosæ mediocri quantitate accepta; nonnulla penitus ligant, ac firmant fluida, ac solida, cum acida, austera, & acerba, alteriusque indolis ramosæ, ac filamentosæ excedenti quantitate peccaverint. Verum in hoc limine Dissertationis statim occurrit gravissima difficultas pro explicanda actione corporum adstringentium; habemus enim ab experimentis parvam molem coaguli ma-

gnam lactis quantitatem densare, & coagulare; habemus spiritum nitri sanguinem, & potissimum lympham supramodum figere, certi sumus decoctum corticis granatorum, bistortæ; & tormentillæ serum sanguinis potissimum ligare, & irretire, pariterque opium fluida animalium alte firmare; quomodo autem hæc effecta fixitatis, & coagulationis sequi poterunt in magna humorum copia a paucis, & tenuibus corporum istorum particulis per exposita fluida effusis, & permixtis? quamvis hæc phænomena explicatu ardua esse videantur; nihilominus experimenta Boilei de effluviis corporum nos edocent hæc necessario esse secutura. A Boileo enim eruditi sumus, minimas moles corporum esse divisibiles in partes quasi infinite parvas (ut antea indicavimus) quæ effundi possunt cutissime per magnas fluidorum quantitates, & sic facta mixtione tot, ac tantas fluidorum copias posse firmare, ac figere: & sane nonne ex Boileo in historia *sanguinis humani* manifestum est unam guttam spiritus humani sanguinis occupare posse colore, & motu 2000. guttas aquæ, per quas gutta illa spiritus humani sanguinis effusa sit? ergo non erit mirandum, nonnulla corpora effusa per universa fluida machinæ animalis posse quoque facta mixtione facile breviter ipsamet fluida irretire.

85. Verum audio nonnullos rursus quærentes, & dubitantes; Certi quidem sumus (inquiunt) de Boilei experimentis, de subtilitate effluviis, de corporum divisibilitate in partes minimas, & de istorum tam prompta effusione per fluida quaquaversus, potissimum auxilio circulationis, ut num. 48. & alibi satis ostendimus: verum adhuc obscurum est, quomodo corpora divisa, & subdivisa in partes infinite parvas possint occupando celeriter tot, ac tanta spatia humorum per quæ effusa sunt, humorum ipsorum particulas taliter densare, ac figere, ut notabilem densitatem, unionem, firmitatem, & consistentiam acquirant: etenim dum corpora dividuntur, & subdividuntur in partes infinite parvas, ut tot ac tanta spatia humorum occupent, certe istæ particule minimæ erunt tenuissimæ, ac mobilissimæ; sed partes tenuissimæ, ac mobilissimæ potius aptæ sunt agitare, rarefacere, & dissolvere humores, quibus miscentur, quam eos densare, ligare, & irretire; ergo videtur obscurum intelligite, quomodo corpora divisa, & subdivisa in partes

tes infinite parvas apta sint magnas humorum copias, quibus permiscantur, densare, unire, & irretire.

86. Optimæ quidem ab istis quæritur, & dubitatur; verum sciant primo ab experimentis nonnulla corpora quantumvis mole minima, & mobilissima effusa quaquaversus celeriter auxilio tenuitatis, & velocitatis suæ, & beneficio circulationis sanguinis per magna spatia humorum, quibus permiscantur, & contactum habent, posse humorum ipsorum particulas irretire, aut saltem retardare; Enim vero ab experimentis ipsis edocti sumus sp. vini, & sp. urinæ humanæ (Boileo observante) inter se mixtos densari, & concreescere, summam firmitatem, ac consistentiam acquirere inter se alba sub imagine: & tamen spiritus isti nonne tenuissimi, & velocissimi sunt? Imo quo magis rectificatissimi sunt, eo promptius, & firmitus coagulationem assumunt. Idem Boileus, & P. Lana tom. 2. lib. 4. Exper. 15. *Magisterii natura, & artis*, experti sunt oleum terebintinæ chimice destillatum, quamvis maxime fluidum, omnino coagulari, & firmitate absque ulla alterius corporis admixtione, & tamen oleum hoc chimice destillatum supramodum attenuatur suis in partibus, maximeque fluidum redditur: Hetmullerus, & Joannes Freind ambo celeberrimi viri experti & ipsi sunt sp. nitri, & sp. nitri bezoardicum sanguinem, & potissimum lympham cito, & fortiter firmare, & coagulare: & tamen spiritus isti tenuissimi sunt, & mobilissimi; ergo ab his & a plurimis brevitatis gratia omissis colligere jure possumus corpora plurima quantumvis tenuissima, & mobilissima, effusa quaquaversus motu suo, & auxilio circulationis per massam humorum aptissima esse humores figere, coagulare, aut saltem retardare, quibus permiscantur, & uniuntur: Quænam ergo erunt causæ assignandæ talis firmitatis, & consistentiæ, ut tot experimenta ostendunt?

87. Causæ itaque assignandæ, & ab hisce experimentis multo probabiliter colligendæ desumuntur partim ab iis, quæ de actione medicamentorum in genere indicavimus, & partim in præsentis dicendis, causæ ergo talis firmitatis, & consistentiæ desumuntur a determinatis corporum miscibilium superficiebus. Secundo a specificis salium figuris. Tertio ab emissionem, privationem, seu exulationem partium, quæ vel motu suo, vel ratione suæ figuræ impedi-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

bant aliarum partium cohesionem, & coagulationem. Modo expendamus primam causam; Cum itaque corpora miscibilia fuerint aut singula, aut alterutra cum superficiebus ramosis, hamatis, seu filamentosis, tunc inter se mixta, & tangentiali facto inter se flexu, & inflexu cum superficiebus suis ramosis, aut hamatis arctam inter se adhesionem elaborare facile possunt, ac debent firmitate, & consistentia corporum mixtorum constituta: quantumvis autem corpora miscibilia fuerint divisa, & subdivisa in partes infinite parvas tenuissimas, & mobilissimas, nihilominus cum ex geometricis moles, & pondera corporum decrescant in ratione cubica, superficies vero ipsorum solum in ratione quadrata; ergo majores remanebunt superficies corporum, quam pondera, & moles ipsorum; sed corpora quælibet sunt inter se tangentiali primario opere suarum superficierum; ergo si superficies corporum fuerint ponderibus, & molibus suis majores, & ulterius superficies, aut singulæ, aut alterutra fuerint filamentosæ, ramosæ, aut hamatæ, profecto facto nexu inter se aut majori, aut minori, & in data ratione imminutis ponderibus corporum, etiam aut majores, aut minores firmitatis consistentiæ, & coagulationis gradus producentur necessario; tali aut simili methodo verisimile est, opiata, & similia medicamenta suas vires exercere in fluidis machinæ animalis opere superficierum ramosarum, crassorumque sulphurum, quibus abundant; tali methodo arbitratus sum omnia lactea, gelatinosa eboris, & cor. cervi, ita gummata, & resinosa quælibet, ita etiam sortia hordeacea, & avenacea extracta, terras pingues, ut sigillatas, succos plantaginis, papaveris, portulacæ, & lactucæ, consolidæ, amigdalorum, tormentillæ, bistortæ, semina istorum &c. consistentiam, & firmitatem aut majorem, aut minorem producere, non solum inter se, verum etiam cum fluidis fibrosis, ferri, sanguinis, & aliquando succi nervei, & cum solidis etiam, quibus amplexu, aut contactu facto uniuntur, & adherent.

88. Secunda causa firmitatis, & consistentiæ tam in fluidis, quam in solidis desumitur a specificis salium figuris fluidorum, & solidorum porositates adamussim, aut quasi adamussim replentibus: etenim si salium figuræ aptæ sint occupare spatia intermedia fluidorum sanguinis feri, & succi nervei, si aptæ fiant complere spatia mu-

V u

scu.

sculorum, carniū, aliorumque solidorum machinæ animalis profecto, adaucto salium pondere in spatiis fluidorum, & solidorum, mobiles fluidorum particule, cum ad motum promovendum, conservandum, & reliquis communicandum exigant opportuna spatia, quibus moveri possint; si hæc spatia fuerint a particulis salium occupata, necesse erit mobiles fluidorum particulas, & oscillantes solidorum fibras in quiete constitutas reddi, & paulatim lentescere, aut aliquando penitus immorari: hinc lentescentibus, aut firmitatis fluidis & imminuta, aut ablata solidorum oscillatione, fluidorum & solidorum inertia, aut graviore fato firmitas, & coagulatio emergunt; talis ordinis secundum tamen magis, & minus agunt in fluidis, & solidis alumen, vitriolum, acacia, balaustrum, labrutca, malum punicum, & granatum, ita mespilla, plurima acida, austera, & acerba &c.

89. Huic loco conveniunt etiam corpora illa, quæ permixta cum fluido seroto, aut sanguineo, aut nerveo particulas sanguinis arcto contactu facto circumscribunt. Ita si circa particulas aqueas feri, aut sanguinis circumoscillantes talia prismata, aut alterius generis, quæ ex talibus circumscriptionibus figuras solidas polygonas elaborant, ut in formatione nebulae, seu potius pruinae problemate 6. observaverat Galileus; tunc cum figuræ solidæ polygonæ circumscriptæ aqueis particulis, aut alterius generis multo tardiores fiant, & lentiores redantur aqueis particulis inscriptis; ut dialogo primo idem immortalis famæ Auctor demonstraverat, certe retardabitur motus naturalis fluidorum, & solidorum, quibus corpora ista polygonæ stollarum more composita applicabuntur: ex tali autem motuum imminutione effecta resistentiarum, vel in fluidis, vel in solidis, vel in utrisque erunt secutura facta majori, aut minori fluidorum, & solidorum firmitate, & consistentia; talis aut similis ordinis esse possunt nonnulla vina acerba, & austera, succi immaturi, aquæ acidulæ, martiales, nonnullæ aquæ vitriolicæ, aut aluminosæ, quæ permixtæ cum fluidis, & unitæ solidis nostri corporis effecta firmarum producant.

90. Tertia denique causa consistentiæ, & coagulationis fluidorum, & causa firmitatis, aut saltem inertie solidorum oritur ab emissionem seu exhalationem earum partium, quæ vel motu suo, vel ratione suarum figurarum impediunt aliarum partium cohesio-

nem, & alligationem; Ita albumen, & ovi vitellum igni opposita, aut coctioni subacta evaporatis plurimis particulis aqueis albuminis, & vitelli fibrosæ partes alte concrescunt, & adherent inter se, ovo indurato; similiter serum sanguinis, & sanguis ipse extractus, si igni, & calori exponantur, evaporatis, ac deperditis particulis tenuioribus feri, sulphuris, & salium, & remanentibus crassioribus, fixis, & filamentosis alte concrescunt, & coagulationem acquirunt, ut in oleo terebinthinæ destillato, & similibus indicavimus; Ita si ab opere ignis, aut caloris interni, aut externi balsamicæ, ac oleosæ solidorum particule attenuatæ supramodum evaporent per transpirationem, aut deperdantur, aliunde tunc arescent solida, & arida, & veluti exsiccata consistent absque ulla, aut saltem minima eorum oscillatione; medicamenta autem quæ tali methodo privativa adstringunt fluida, & solida, sunt illa, quæ a Medicis *Exsiccantia* dicuntur. Hujusmodi indolis dici poterunt omnia aromatica, omnia composita ex castoreo, omnia vina nimis sulphurea, aquæ pariter sulphureæ, balnea, & luta sulphurea, & ea omnia quæ potenter calesciunt, dummodo immoderate abutantur. Ab hisce enim omnibus, & similibus attenuantur aquosæ, oleosæ, & balsamicæ humorum particule, quibus attenuatis, & a compage, nexu, & contactu aliarum dissolutis evaporant, & exhalant, remanentibus partibus fibrosis, & filamentosis humorum, & partibus fibrosis, & filamentosis solidorum sine debita, naturali, ac necessaria humectatione, & madefactione partium fluidorum; propterea densari, & concrelescere solida, & tandem veluti arescere necesse erit, imminuto, aut deperdito motu fluidorum, imminuta, aut deperdita oscillatione organorum. Ob hanc causam in febribus ardentibus, in magnis sudoribus, in immoderatis hamoragiis diarræis, & dysenterii deperditis particulis tenuibus, & balsamicis fluidorum, & solidorum ægrotantes, aut in inflammationes incident, aut in emaciationes, quæ ad phthisim terminari consuecunt. Gravissime itaque errant Medici illi, qui validioribus purgantibus aliisque remediis calescentibus, & exsiccantibus abutuntur, & frequentissimis phlebotomiis indulgent; ab utrisque enim fluida, & solida spoliantur necessaria feri, oleosi, & balsamici sulphuris quantitate, hinc lentescere humores, & minus oscil-

oscillare fibras necesse erit, adaucta tarditate, & aliquando parta humorum, & organorum consistentia. Non mirandum ergo si post valida purgantia, & calefacientia, post repetitas incaute phlebotomias videamus agros incidere in pleuritides, in febres inflammatorias, in malignas ex coagulatione, aliquando etiam in paralytes, & ptypos; etenim ab incauta medendi methodo fluida, & solida redduntur in statu talis inertiae, & siccitatis, ut utraque coacta sint lentescere; & aliquando consistere summo vitae periculo; totis itaque viribus curandum erit, ut medicamenta tam externa, quam interna, tam caute exhibeantur, ut humores superflui expellantur, conserventur vero necessarii, tali enim proportionem actionum, & reactionum debita, & naturalis firmitas fluidorum, & solidorum summo naturae beneficio sustinebitur. Ab his ergo quae exposita sunt possemus colligere rationem, propter quam medicamenta divisa in partes veluti infinite parvas, & effusa quaquaversus facile, & breviter per magnas humorum copias apta esse possint facile pariter, & breviter irretire, & firmare, aut saltem notabiliter retardare particulas fluidorum, & fibrosas texturas solidorum, quibus permiscantur, uniuntur, & opportune adherent pro explicandis actionibus *Adstringentium* medicamentorum.

DISSERTATIO X.

De Medicamentis Opiatis.

91. **O**piata Medicamenta veteribus ipsis non ignota existunt. Hippocrates libr. 6. Epimiorum narrat Hegesippo soporiferum fuisse imperatum. Galenus, & Arabes plurima de opiatis locuti sunt, & opiata medicamenta data occasione exercuerunt. A plerisque judicatum est praeventibus experimentis opiata fluida, & solida aliquando minus irretire juxta majorem, aut minorem opiatorum praesentiam, & quantitatem; hinc hujusmodi medicamenta semper caute ab omnibus fuerunt imperata. Nonnulli alii arbitrati sunt opium humores dissolvere, sudores excitare, & inflammabile esse judicaverunt; Ne autem in alienis diu versate videar, dicam brevibus, opiata opere naturalis suae constitutionis apta esse primario densare, irretire, & firmare humo-

res, consequenter etiam solidorum oscillationes, aut imminuere, aut impedire; secundario vero posse opiata humores dissolvere, sudores promovere, sollicitare solida, calorem, & siccitatem inducere, cum vere opiata sint corpora, quae specifico abundant sulphure inflammabili.

92. Primo itaque expendamus in opiatis causas firmitatis, & fixitatis, a quibus opiatorum medicamentorum effecta possint probabiliter declarari. Indicavimus numero 29. ramosas, filamentosas, aut hamatas superficies crassorum sulphurum posse valide, & prompte adherere corporibus fluidorum, & solidorum, & remediis, filamentosis, & hamatis suis superficiebus facto nexu ligare, & irretire corpora, quibus uniuntur, & cum quibus opportunum contactum habent. Modo manifestum est, ab observationibus Nicolai Lemerii in *curso chimico*, opium esse sulphureum compositum resinofum, quod lacrymae ad instar paulatim extrillat ab inciso corpore papaverum; cum ergo a solventibus cuneis ventriculi, ab actione, & reactione duorum succurum pancreatici, & bilioli fuerit sulphurea, & resinosa moles opii divisa in partes infinite parvas, & haec brevi tempore effusae sint quaquaversus auxilio etiam sanguineae circulationis; tunc cum istae minimae particulae nullatenus mutant naturam, indolem, ac superficiem ipsimet opio debitam, ideo resinosis, filamentosis, aut hamatis suis superficiebus particulas fluidorum feri, sanguinis, & succi nervei potissimum in cerebro, & cerebello, & fibrosa ipsorum filamenta nexu facto quasi irretient, ac ligabunt ipsasmet solidorum fibrillas enervata, aut quasi abolita ipsorum oscillatione; ob hanc causam imminuto opportuno motu fluidorum, & solidorum, somnus, & quies evenient, assymetriae motuum solidorum distractorum conquiescent, & quiete, ac naturali unione restitutis convulsivae, ac dolorificae affectiones cedabuntur. Ulterius imminuto motu, minuitur quoque collisio, & affricus corporum mixtorum inter se frenato calore partium. Ceterum si fortiori opii opere solidorum, & fluidorum motus & affricus praeternaturali retardentur; tunc praeternaturales somni fient, praeternaturales emergent quoties, & praeternaturalia frigora evenient, quae saepe ac saepius plena particulis esse solent, cum ab his flagrationes inflammatoriae, paralytes, apoplexiae, & aliae hujus generis incommoda

consequi facile possint timendo vitæ periculo.

93. Similia pericula fixitatum ultro augentur, si ramosæ, ac filamentosæ opiatorum superficies particulis salinis, quibus non solum jure suo donantur, verum etiam salinis fluidorum adhiereant, & has nexu factò circumligent: etenim unione instituta crassorum sulphurum cum salinis particulis elaborantur moles, & pondera corporum, quæ proxime augentur, & crescunt in ratione cubica suorum diametrorum, si moles tamen istæ similes fuerint inter se; verum si fuerint dissimiles, augentur, & crescunt proxime in ratione ex rationibus basium, & altitudinum earundem; cum vero ab hisce molibus, & ponderibus adauctis minima canalium præcipue cerebri, & cerebelli, carniū, & glandularum oscula impedita reddantur, fluida, & solida graviora fiant, & graviter augeantur densitates utrorumque, constabit quot, & quantæ resistantiæ debeant fluidis, & solidis supervenire, a quibus aut magis, aut minus adauctis cognoscendæ erunt majores, aut minores consistentiæ, & firmitates in machina animali.

94. Hisce probabiliter consideratis, transeundum est ad ea, quæ secundo ostendunt, cur intelligere possimus humorum dissolutiones, sudores, calores, siccitates, & vigilias opere opiatorum. Celeberrimus Volphangus Vvedelius libr. 1. cap. 12. pag. 45. de opio a praxi, & observatione testatus est, *Opium non operari, nisi serum sit in sanguine proportionatum*. In debito itaque sero opiata somnum, & quietem, convulsionibus, & doloribus pacem ferunt; cum vero temperies hominum fuerit servida, ac sulphurea, aut ratione temperamenti biliosi, aut ratione febrium, aut serum fuerit minus, quam necessitas postulat, & salinis biliosisque particulis nimis serax, tunc resinosa, ramosa opii, sulphurumque crassorum ejusdem particula in tali temperie corporum cum opio permixtorum statum quodammodo volatilitatis acquirunt; quidquid enim recipitur per modum recipientis recipitur. Et sane ab experimentis chemicis edocti sumus sulphurea composita facilius, & promptius dissoluta reddi a sulphureis quoque corporibus ipsis permixtis. Ita sulphur si bulliat in aqua, aut in tenuissimo vino, aliove liquore, nunquam liquescet nisi in oleo ipso ebullierit; similiter sulphur ipsam in oleo terebinthinæ dissolutionem facillime patitur, quam in re-

liquis liquoribus pœnitens respuit; cum ergo sulphurea determinatis sulphureis addita divisionem & dissolutionem alte patiantur, neque fixitatem, neque coagulationem acquirant, ideo aliquando potest contingere composita opiata reddi posse facile, ac prompte divisa, & dissoluta, a specificis aliorum sulphurum particulis, quæ vel a temperie, vel ab aliis causis humorum locum, ac sedem habent in machina animali sero immixto; propterea statu volatilitatis, acquisito, opiata illa non nexum, non firmitatem producent, sed divisionem, dissolutionem, motumque communicant fluidis, & solidis, hinc calores, sudores, & vigilias evenire necesse erit.

95. Probabile ulterius est, quod cum sulphurea elementa elatere prædita sint, hæc sulphurea mixta sulphureis, fortique nexu factò inter se necessario parere debent maximam pressionem internis particulis sulphureis elasticis; cum vero ex Mechanicis elasticitates corporum elasticorum sint compressionibus eorundem quamproxime proportionales, idcirco elastica illa elementa sulphurea inter se perfectissima mixta, cum ad ultimum terminum compressionis devenierint, nec ulteriorem compressionem pati possint cogentur violentissime expandere semetipsa, & ad naturalem suæ dilatationis statum se se restituere; hinc nisu factò, fractisque paulatim resistentiis quaquaversus sequitur dissolutio, divisio, & motus corporum internorum, & externorum, a quibus calores, sudores, & vigilias consequi necesse erit; hac methodo crediderim explicari multo probabiliter posse phenomena rarefactionum, motuum, sudorum, vigiliarum, quæ aliquando contingere experimur ab usu opiatorum. Ex his ergo colligere poterimus, quod si in servida humorum temperie, in febribus ardentibus, aut in continuis voluerimus ab opiatibus levissima etiam dosi acceptis necessariam, ac quæsitam quietem, ac somnum parere; utilis consilium erit madesacere prius corpora illa copiosis potionibus aquarum, aut emulsionum, deinde opiata exhibere; experiemur enim a levissimis etiam opiatibus opportunum somnum sine noxa esse securum. Opiata enim magnæ dosis semper sunt plena periculis, quamobrem semper fugienda erunt.

96. Verum quidem est, quod post mortis sudores, & vigilias partas ab hujusmodi opere opiatorum dividendum, & dissolvendum fluidorum texturas, cum augmen-

to oscillationum solidorum, tandem aliquando supervenire solent novæ laxitates, novæ quietes, ac novi somni, sed cum maxima virium inertia; etenim facta divisione, & dissolutione texturæ fluidorum, cum augmento oscillationum in solidis, sudores, & transpirationes augentur, quibus adauctis, plurima elastica, sulphurea, & actiosa corpora alio transpirant, & evolvant, plurima aquea, & lymphatica elementa vaporant, & exhalant; remanent ergo in fluidis, & solidis copia inertium particularum, quæ cum actionibus, & reactionibus valide, ac continuo exequendis ineptæ sint, tarditatem, lentescentiam, ac inertiam donant fluidis, & solidis ipsis quiete, ac somno restitutis; ea videlicet ratione, qua nos a laboribus, ab exercitio, ab itineribus laxati, ac fracti facile in quietem, ac somnum incidimus. Similiter animadvertit Volphangus Vvedelius, infantes, ac pueros post diarrhæas, vel post serofas purgationes a jalappa institutas facillime in placidissimum somnum promoveri *de opiat. pag. 38*. Verum fatebuntur Clinici quam gravi, ac longo virium dispendio. Hæc ergo quæ de actione tam primaria, quam secundaria opiatorum exposita sunt, & accepta a phænomenis naturæ probabilia nobis visa sunt, quare hanc sententiam utpote probabiliorē accipiendam putamus; aliam quidem opinionem libenter amplectamur, cum probabiliora, aut legerimus, aut audiverimus.

97. Interim nolo præterire post partam ab opiat. quietem, ac somnum, ut plurimum graviores redire morborum convulsivorum, & hystericorum &c. insultus; etenim tempore quietis fluida, & solida sunt in statu inertiae reddita, hinc fluidorum, & solidorum motus languidi, & imminuti fiunt, secretiones glandularum potissimum capitis, & renum paucae, & mancae supramodum transpiratio imminuta est: hoc itaque tempore violentiæ quietis major, & major cumulat aggeries impurarum, & acrium materierum in massa humorum, cum vero post plurimas, & plurimas circulationes sanguinis, & miscellas cum reliquis humoribus opiata medicamenta paulatim delata e corpore fuerint, aut per urinas, aut per secessum, aut per transpirationem, ita ut paulatim enervata fuerint quantitate & viribus, tunc fluida, & solida incipient denuo suos motus, ac oscillationes præternaturales restituere; quam ob causam congestas præternaturales materias

majoribus motibus agitare, & asperis suis superficiebus majori impetu sollicitare & irritare sensibilia organa necesse erit, dolorum, & convulsionum inclemento, hæc in hypocondriacis, ac in hystericis manifesta sunt.

DISSERTATIO XI.

De Medicamentis Cordialibus.

98. **V**eteres Medicæ Praxis Scriptores de *Cordialium* elaboratione, & usu semper sollicitos animos habuerunt, rati a cordialibus medicamentis sustineri potentias, & vires cordis, a quibus animalis machina conservaretur, & viveret. Et sane conservandæ, ac sustinendæ naturæ leges id postulant, ut totis viribus quarantur, & adhibeantur ea medicamenta, a quibus aut a nativitate, aut fortuita lassitudine, aut a morbis fracta, aut enervata, naturæ organa sustineantur; cui officio potissimum cordis machinam inservire arbitrati sunt Clinici, cum cor primum vivens, & ultimum moriens altissime habeatur. Verum talis generis medicamenta, quæ *Cordialia* appellantur, si recte eorum compositio, actio, & usus expendantur, ultro ostendunt, non solum cordis, seu potentiæ vitalis beneficio futura esse, verum etiam operibus cerebri, & cerebelli promiscue famulari, cum ab his potentiæ animales opere cerebri, & naturales opere cerebelli cum robore, ac motu perfectissime consequantur.

99. Cum ergo dicendarum rerum magnitudo, & dignitas postulent, ut de cordialibus sine confusione agere velimus, ideo necesse est primo exponere mutuam adesse relationem inter potentias vitales, animales, & naturales, ut iusto intelligamus, medicamenta cordialia non ad cor tantum, sed ad cerebrum, & ad cerebellum jure, ac merito pertinere: Quamvis celeberrimus Joannes Alphonsus Borellus prop. 67. secundi Tomi *de motu animalium*, vim motivam fibrarum cordis in statu naturali probabiliter arbitretur æquipollere posse viribus librarum 3000. nihilominus varia hominum temperies, varia ratio temporum, ætatum, motuum, & ciborum aperte ostendere poterunt momenta cordis varias subire leges, neque posse adamussim determinari: Ceterum

rum quidem est hæc varia momenta cordis in statu naturali debere esse proportionalia momentis membranarum cerebri, & cerebelli; Ab Anatomicis enim edocti sumus systoles, & dyastoles cordis homologue respondere systoli, & dyastoli meningum, & vice versa; cum enim membranæ cerebri, & cerebelli, cerebrum, & cerebellum, & spinalem medullam circumscribant, profecto hæc a motu cordis impulsus sanguinem excipientes, erunt systoli, & dyastoli cordis proportionales; hinc etiam motus succi nervei secreti ab organis cerebri cerebelli, & spinalis medullæ futurus erit impulsus sanguini æquabilis, & proportionalis; quare actiones, & reactiones animales sensui, & motui voluntario institutæ a cerebro dependentes, & actiones, & reactiones, seu oscillationes naturales a cerebello, & a spinali medulla emanantes opere motus, & elateris succi nervei non solum aptam, & continuam relationem habere debebunt inter se; verum etiam cum actionibus, & reactionibus cordis, motibus cerebri, & cerebelli proportionalibus; quomobrem potentiæ vitales, animales, & naturales profecto veluti in æquilibrio actionum, & reactionum erunt inter se constituendæ in animalibus; cordialia itaque non uni, sed omnibus potentiis data proportionem respondent, atque succurrunt; hæc quidem majoris dignitatis gratia cordialia appellata sunt, cum veteres cor dignitate, structura, & officio cæteris visceribus præstantius esse judicaverint.

100. In cordialium itaque classe considerari primo possunt ea, quæ volatiles, spirituosas, & elasticas particulas tribuunt sanguini lymphæ, & succo nerveo, quarum auxilio motus cordi, cerebro, & cerebello apte tribuitur, augetur, & conservatur. Secundo illa, quæ opportune nutriunt, & communicant fluidis oleosas, & balsamicas moles, quarum beneficio sequatur conveniens partibus nutriendis unio, adhæsiō, seu, uno verbo, nutritio. Tertio, quæ simul & semel motum, & elaterem, & nutritionem donant machinæ animali.

101. Primi ordinis judicari possunt illa, quæ aromatica sunt, ut cinnamomum, cariophilus, nux moscata, radices Angelicæ, Imperatoricæ, zedonariæ, calami aromatici; talis spheræ sunt etiam omnia spirituosas, & volatilia, ut sp. melissæ, rosmarini, lavendulæ, sp. succini, cornu cervi, & alia hujus farinae elementa spirituosas, & elasti-

ca, quæ ab animalibus, vegetabilibus, & mineralibus colligi possunt: hic autem animadvertendum est hæc medicamenta spiritu volatili, & elatere repleta sanguinem, lympham, & succum nerveum quantitate, motu, & elatere nimis violenter agitare, & impellere; curaverunt idcirco Clinici medicamenta ex hisce composita pluribus opportune corrigere, ac moderari permiscendo potissimum frigida, & alchalyca, aliquando sub adstringentia variæ indolis, ut frenato impetu corporum volatiliū, & oleosorum naturales medii motus, & elateres in sanguine, lymphæ, & succo nerveo restituerentur, & conservarentur; hinc elaboratæ fuerunt confectiones cordiales alchermes, & hyacinthina, aliquando in aliquibus permixta fuerunt opiata, & resinosa, ut observamus in diascordeo Fracastorei, in mitridato, theriaca, & orvietano &c. Verum utinam hæc tam composita cordialia fuissent simpliciora medium motum fluidis, & solidis excitantia, & conservantia, fortasse feliciori opere naturæ actionibus inservirent, natura siquidem cum summa sit geometra, simplex est, plura respuit, cum pauca sufficiant.

102. In secundo classe habenda sunt illa, quæ lactea sunt, ut lac asinum, humanum, vaccinum, &c. succi pariter extracti ab amygdalis dulcibus, aut a cachao, aut a gelatinosis, aut ab Hordeaceis, ab avenaceis, & a succis pullorum, caponum, ranarum, testudinum, nec ova ipsa hac in tabula numerantur: *Nutrientia* enim omnia vim, & robur naturæ altissime tribuunt, augent enim fluida, & solida naturali mole sustinent, a quibus vires, & facultates vitales, animales, & naturales felicissime exercentur, & exercitæ conservantur.

103. Tertiæ ordinis sunt illa fluida, quæ colliguntur a succolata, a jure viperino, a succis pineorum, pistachiorum, ab avibus, a pardicibus &c. a vinis pariter ereticis, antiquis, & balsamicis, & hisce similibus; hæc enim omnia unusquisque intelliget, quam facile, quam prompte, quam necessario motum, elaterem, & simul nutritionem ferant machinæ animalis.

104. Modo cum in hoc triplici ordine cordialium status medius quoad motum, elaterem, densitatem, & nutritionem fluidorum, & solidorum naturæ proportionalis esse experiatur, & hac via media possit natura acquirere æquilibrio particularum humores componentium, & æquilibrio oscil-

oscillationum in solidis, ideo in morbis, in quibus aut peccat excessus, aut defectus velocitatis, elateris, densitatis, & nutritionis tam in fluidis, quam in solidis, curandum enixe erit a Medico (quod tamen fateor difficillimum esse) ut cordialium beneficio hic status medius, quantum possibile est, acquiratur, et acquisitus conservetur cum unitate, et æquilibrio elementorum inter se tam fluida, quam solida componentium.

105. Hisce autem indicationibus ut obtemperemus, sedulo attendendum est, ut ea primum eligantur cordialia, quæ aut excessum opportune imminuant, cui operi cordialia temperat succurrunt: aut defectum motus elateris, et nutritionis æqua proportionem adaugeant, cui officio validiora cordialia, et nutrientia præsto erunt. Hic animadvertendum cordialia quælibet, et si temperata fuerint, apta esse violenter agitare humore, quotiescunque servida extiterit ægrotantium temperies, fuerint longæ febres, deliria, et æstivæ summi caloris constitutiones, tunc enim medicamenta cordialia nimis agitantur, nimis attenuantur, magis volatilia, et elastica redduntur; hæc enim exhibita porissimum augmento, vel statu morbi, et associata particulis sulphureis, et elasticis massæ humorum adaugent impetum istorum in ratione composita ex numero particularum elasticarum, motu, et elatere earundem; Hinc gravissimas comparant in fluidis, et solidis motuum improprietates, morborum, et febrium inclemento: curandum itaque erit cordialia quælibet exhibere ægrotantibus, aut ante accessiones, aut in accessuum declinatione, eo enim tempore cordialia minus agitata, ac dissoluta a vi, ac impetu particularum sulphurearum minus volatilia, minusque elastica fiunt, minori humorum agitatione; sic facilius, & commodius morboſis particulis paulatim resistunt, & naturæ succurrunt. Cæterum citra has temporum differentias cordialia dissolventes vires, facile poterant exercere contra fluida, & solida gravi vitæ periculo, quo casu non cordialia, sed venena dicenda essent. Uterius in quibuscunque cordialibus primæ, secundæ, & tertiæ classis id unice curandum est, ut mediocris, sed conveniens quantitas servetur in quibuscunque ægrotantibus temperie potissimum servidis, & continui febribus correptis, ut facilius accedere possimus ad statum illum medium, aut ipsum paulatim

acquirere, a natura geometra postulatum. Denique remanet, ut inter cordialia eligam damnum non usum, sed abusum succulatæ Indæ, quæ quanto præstantior, & utilior est cordi, cerebro, & cerebello præcipue in senibus, emaciatis, & febri carentibus, cum moderata quantitate, qualitate, ac debito tempore assumatur; ita paulatim pernicioſa esse poterit, quotiescunque citra senectutem hac abutamur qualitate, ac tempore. Quod de hac, ita de cordiali quolibet dicendum erit.

106. Videbitur nonnullis me ab argumento cordialium medicamentorum declinare, si in præſenti brevibus agere velim de aliquibus remediorum speciebus, quæ specifico velut opere agere videntur in machina animali: verum ab his quæ probabiliter dicturus sum, plane intelligent, quod sicuti cordialia specifica sunt medicamenta cordi, cerebro, & cerebello, ita nonnulla alia merentur haberi, ut *specificæ remedia*, quæ cordialium more specificis aliquorum viscerum differentiis opportune succurrunt. Inter tot, ac tanta eligam tantummodo duo consideranda, quod autem de his, ita proportionaliter de reliquis specificis medicamentis dicendum erit. Eligo itaque *radicem hypecacuanne* specificam in dysenteriiis, & *Chinam-Chinam* in intermittentibus potissimum febribus specificè admirandam: Ut ergo debito ordine progrediar, istorum medicamentorum actiones, & reactiones expendam ab effectis, quæ observantur tam in fluidis, quam in solidis machinæ animalis. Primo itaque vocetur ad examen *Hypæcuanne*; hæc quidem sollicitat ventriculum, & intestina vomitu promoto; ergo hæc ager in solida ventriculi, & intestinorum. Modo considerandum est in fluxu dysenterico acres, asperasque superficies humorum illas esse, quæ continuo, & immoderate secernuntur a glandulis intestinorum cum erosione extremitatum vasorum; cum vero in tali acrimie materierum separatione continuo irritentur fibræ intestinales augmento motus peristaltici versus intestinum rectum; hinc si hæc incommoda diu perduraverint, aliquid in intestinis vitium erit secuturum, videlicet a continua irritatione, & erosione fibrarum tandem aliquando laxatur, aut etiam rumpitur naturalis textura fibrarum intestinalium, quare fibræ læsæ, & enervatæ coguntur postmodum majorem pati distractionem, quam contractionem; propterea in præternaturali irritatione intestino-

rum

tum motus peristalticus non æquabiliter, & isochronus exercetur (ut ostendunt expositæ propositiones) sed asymmetre, & inordinate imminuto momento contractionis, & adaucto momento distractionis fibrarum.

107. Hisce præmissis, exhibeatur dysenterico radix hyppecacuannæ ad drachmam unam, aut ad drachmam unam cum dimidia, profecto verisimile est a vi, & opere talis quantitatis, ac modi agentis contra fibras ventriculi, & intestinorum talem specificum vomitum excitari, & oriri talem specificam contractionem in vomitum excitato in fibris ventriculi, & intestinorum, quæ facile sufficiens sit ad restituendum imminutum statum contractionis, & ad comparandum in fibris intestinalibus nimium laxatis talem motum contractionis, qui sit omnino oppositus præternaturali laxitati, aut adauctæ distractioni fibrarum ipsarum: quare paulatim restituto eo contractionis gradu, & acquisita paulatim fibrarum collectione, & unione inter se, paulatim quoque acquiritur robor, seu quidam tonus fibrarum naturali, aut quasi naturali proportionalis; Quamobrem paulatim comparato motu peristaltico intestinorum naturali, isχροno, & æquabili remittitur dysenteria, & paulatim sanitas restituitur: In tali dysentericæ remissione sequamur hunc specificum vomitum naturæ amicum, ac salubrem. Cum in vomitu ab hyppecacuanna producto fiat specifica contractio fibrarum intestinalium versus ventriculum, & ventriculi versus gulam, certe in tali contractione fibræ contractæ intra se se rescipiunt, concava intestinorum superficie restricta, consequenter oscula vasorum intestinalium jam aperta, vel ob erosionem, vel ob laxitatem, stricta, ac clausa reddenda erunt sanguineo fluxu, aut impedito, aut imminuto. Deinde a tali specifica fibrarum intestinalium contractione alterum supervenit in dysentericis beneficium, videlicet ab opere vomitus contractis fibris sectiones intestinorum imminuuntur in ratione quadrata diametrorum, seu peripheriarum intestinalium, idcirco glandulæ intestinales & ipsæ magis collectæ, & unitæ reddentur inter se, quo in statu robor, & vim acquirunt, ut juxta leges naturæ oscillationes suas exercent; hinc naturali motu acquisito aptissimæ paulatim redduntur glandulæ transmittere in venas desinentes materias contentas, & venæ desinentes & glandulas coactæ sunt materias excipere, &

per consuetam circulationis viam alio transmittere, & liberare intestina a præternaturali excretionis sanitate paulatim restituta.

108. Hic sentio arguentes, plurima sunt medicamenta quæ vomitum pariunt, attamen dysenterias non sanant; cur ego vomitus ab hyppecacuanna productus dysenterias solum sanare aptus est? Ratio ex dictis constare videtur; etenim verisimile est talia vomitoria non apta esse talem specificam vomitus differentiationem, & talem gradum specificæ contractionis excitare in intestinis, & ventriculo, quæ sit omnino opposita specifica illi præternaturali, laxitati, & distractioni fibrarum intestinalium, ut antea satis exposuimus: sed multo majorem, ac violentiorem, aut multo dissimilem; cum autem verisimile sit solum actionem hyppecacuannæ aptam esse talem specificum vomitum, ac talem specificum contractionem fibrarum parere, quæ sit a diametro opposita præternaturali laxitati, & distractioni earundem in dysenteria; ideo radix hyppecacuannæ tali vomitu excitato dysenterias sanare specificè potens erit, quas reliqua vomitoria curare non poterunt.

109. Ulterius verisimile est, alterum beneficium oriri ab opere hyppecacuannæ; sicut enim moles, ac quantitas ad drachmam unam, aut ad drachmam unam cum dimidia exhibita dysenterico vomitum parat, & determinatum contractionis gradum oppositum præternaturali laxitati, & distractioni fibrarum intestinalium producit; ita verisimile pariter erit aliquam molem, & quantitatem hyppecacuannæ divisam, & subdivisam in partes minimas ingressam oscula vasorum lacteorum, & ab his delatam in massam sanguinis posse non dissolvere, ac frangere texturas, & nexum humorum, quibus applicantur particulæ illæ hyppecacuannæ (ut gravissime operantur aliorum vomitorum corpuscula,) sed tantummodo aptam esse debita mixtione, amplexu, & figuris huic officio proportionalibus unionem, & nexum parere humoribus, & hos, horumque fibrosas texturas opportune densare, constringere, ac sustinere ablata, aut imminuta dysenteria, quæ beneficia a reliquis vomitoriis nullo modo haberi possunt, immo contrariæ actiones timendæ erunt dysentericæ augmento. Utinam in plurimis morbis, ut in moniacis, hypocondriacis, hysteriacis affectionibus, & febribus ipsis ars medica ita valeret, ut specifico remediorum opere communicare posset in
orga-

organis, ac fluidis taliter laxis, aut taliter enervatis, aut præternaturaliter inflexis, directis, ac motis illos específicos motus, flexiones, directiones, ac status oppositos, aut quasi oppositos tali præternaturali laxitati, inertiz, aut præternaturali inflexioni, curvitati, directioni, ac motui solidorum, ac fluidorum, profecto restituto paulatim tam in solidis, quam in fluidis cerebri, cerebelli, uteri aliorumque viscerum motuum æquilibrium, separarem maniacas, hypocondrias, histericas affectiones, nec non febres facilius esse curandas.

110. Simili methodo specifica actio chinæ chinæ poterit multo probabiliter explicari. Cum china-chinæ in febribus intermittentibus potissimum valeat, & radices febrium intermittentium in pravitate, succorum ventriculis, bilis, pancreatis in duodeno, & intestinorum cognoscendæ primario sint; idcirco colligendum erit chinæ-chinæ particulas taliter agere, & reagere contra præternaturales motus succorum primarum viarum mixtione, unione, amplexu, figuris, & motibus suis, ita ut impediant, & auferant, aut saltem imminuant præternaturales, & asymmetras pravorum humorum miscellas, & motiones; ita ut ulterius chinæ-chinæ particulæ communicent illis succis mixtiones, & motus præternaturalibus mixtionibus, ac motibus oppositos, sed legibus naturæ proportionales, aut quasi proportionales. Deinde elementa chinæ-chinæ, & effluvia ejusdem communicata chylo, lymphæ, & sanguini similiter aptissima redduntur mixtione debita, unione, amplexu, figuris, ac opportunis motibus oppositis impedire, aut auferre, aut saltem imminuere præternaturales, impuratum particularum a primis viis acceptarum miscellas, ac motus, sicque communicare massæ humorum novas mixtiones: novos motus mediis mixtionibus, aut mediis motibus homologos præternaturalibus mixtionibus, ac motibus, aut omnino dissimiles, aut oppositos; propterea hac lege communicato etiam solidis æquabili medio, ac naturali motu oscillatorio, acquiritur paulatim fluidorum, & solidorum æquilibrium pace, unione, ac quiete naturali humorum restituta, febribus expulsi, usque dum tamen actio chinæ-chinæ, seu momentum ejusdem in primis viis, & massa humorum perduraverit. Hæc quæ usque adhuc exposita sunt ex legibus mechanicis manifesta esse videntur; ex mechanicis enim edocti

Sydenham Opera Med. Tom. II.

sumus, quod si fuerint potentiz agentes, et reagentes molibus, ponderibus, figuris, numero, et motibus, seu momentis, ac viribus inter se æqualiter oppositis, has in hoc statu mutuas inter se actiones, et reactiones, seu mutuos inter se effectus tollere, et in æqualitate actionum, et reactionum oppositarum, necessario unionem, quietem, ac medium statum corporum consequi necesse erit. Si itaque momenta, et vires chinæ-chinæ agant, et reagant in primis viis, et in massa humorum contra momenta, ac vires pravorum succorum ventriculi, bilis, pancreatis, intestinorum, et massæ humorum in ratione opposita æqualitatis; tunc factæ æquilibrium inter actiones, et reactiones oppositas chinæ-chinæ cum reliquis viribus, ac momentis pravorum humorum mutui effectus oppositi auferentur, et in æqualitate actionum, et reactionum oppositarum potentiarum quies, et pax, ac status medius tam in primis viis, quam in humoribus erunt orituræ, victa febris: In hoc statu semper febres intermittentes vincentur, aut vinci poterunt.

111. Multo autem magis superabuntur præternaturalia febrium elementa, quotiescunque vires, ac momenta chinæ-chinæ opposita viribus, ac momentis præternaturalibus pravorum humorum in febribus supramodum præpollent; etenim omnino everfis, atque omnino mutatis motibus humorum præternaturalium inæqualibus, inordinatis, et asymmetris a viribus, ac momentis, motibus, ac directionibus præpollentibus chinæ-chinæ, et in æquilibrium fortiter, ac valide restitutis, tunc rursus victa febris sanitas restitueretur; in hoc secundo statu actionis præpollentis chinæ-chinæ febres intermittentes semper victæ remanebunt, nonnullæ etiam continuæ vinci poterunt, aut saltem moderari: cum autem hæc beneficia tam in primo, quam in secundo casu habeantur ab opere, ac viribus chinæ-chinæ, cumque hæc beneficia obtineri non possint sine restitutione æquilibrii mixtionis particularum massas humorum componentium, colligendum jure erit vires, ac momenta chinæ-chinæ agentis, et reagentis contra fluida tam externa in primis viis, quam interna in canalibus mihi in modum inservire, ut obtineatur status medius, seu æquilibrium mixtionis humorum; deinde cum tale æquilibrium mixtionis humorum supramodum consulat concoctioni ipsorum; ideo aptissime a celeberrimo

mo Francisco Torri in suo utilissimo Tra-
tatu de China-China indicatur chinam-chi-
na altissimo operi concoctionis humorum
opem ferre.

112. Verum si vires, ac momenta par-
ticularum china-chinae minora fuerint præ-
pollentibus viribus, ac momentis pravorum
humorum, vel in febribus intermittentibus,
vel in continuis, tunc a china-chinae neque
febres intermittentes, neque ullæ continuæ
vincendæ erunt, sed remanebunt tam in
moribus fluidorum, quam in moribus so-
lidorum status medii, aut æquilibri asym-
metriæ. Ab his ergo quæ usque adhuc
exposita sunt, verisimile est potissimam
actionem china-chinae pro febrium victoria
cognoscendum esse a specificis viribus, ac
momentis particularum china-chinae æqua-
biliter oppositis asymmetris, et inordinatis
moribus particularum humoralium aut exter-
narum, aut internarum, aut utrarumque,
quæ ratio motus particularum china-chinae
specificè opposita præternaturalibus moribus
humorum apta est communicare, ac statue-
re medium motum, et directionem isochro-
nam, ordinatam, et æquabilem in particu-
lis humorum, et in solidis asymmetre, et
inordinate motis in febrium agitationibus,
ut facto paulatim mixtionis æquilibrio in
fluidis, fluida moveantur, et oscillent soli-
da juxta leges naturalis æquilibrii, victis
febribus, et sanitate restituta.

DISSERTATIO XII.

De Concoctione Humorum.

113. Inter præstantissima, et utilissima
Medicæ Praxis opera primum lo-
cum obtinet *Humorum Concoctio*: Hæc tam
necessaria naturæ actio illa est, qua natu-
ralis fluidorum, et solidorum temperies apte
sustinetur, pura ab impuris secernuntur, et
impura corpora per excretorias vias elimi-
nantur, determinatis temporum differentiis,
tam admirabili secretionum beneficio hu-
mores optimo in æquilibrio constituti id
ferunt, ut sanitas perfectissime conservetur,
et amissa, felicissime restituatur. Hoc autem
æquilibrio humorum in concoctione ipso-
rum aperte docuit Hippocrates, cum de
veteri medicina enuntiaverit, *Concoctionem
fieri a permixtione, & temperatura mutua
humorum*. A qua mutua temperie, et per-

mixtione humorum æquilibrio ipsorum sta-
tui necessarium erit: tanto operi obtinen-
do tota Medicorum sollicitudo fuit, moniti
a naturæ legibus frustra in operibus artis
esse elebraturos, cum methodum concoctio-
nis ordinem, ac tempora, aut neglexerint,
aut non obtinuerint. Scientia quidem con-
coctionis humorum longam praxim postu-
lat, pro qua obtinenda nolit Medicus ne-
que nimius esse in Philosophicis et in Chi-
micis, neque nimius in Mechanicis, et Bota-
nicis, neque nimius in minimis Anatomicis,
sed in his contentus necessariis amet
potissimum esse in practicis morborum obser-
vationibus, ut eruditissime, utilissime osten-
dit Celeberrimus Bartholomæus Lavagnolus,
Professor, Patavinus, *de usu Chimie*.
Utinam mihi esset ingenium tam necessario
argumento dignum, sperarem me brevibus
universa medicæ artis præcepta feliciter ef-
fesse assecuturum; quamvis autem huic mu-
neri me imparem esse fatear; nihilominus
exercitii gratia ea tradam consideranda,
quæ magis necessaria esse judicaverim.

114. Ut itaque opportuno ordine progre-
di possim, notandum sedulo est concoctionem
humorum præferre *ipsorum preparationem*.
Preparatio autem humorum nil aliud vere
est, quam apta dispositio eorum inter se
mixtorum quoad molem, gravitatem, figu-
ram, et motum, quoad tenuitatem, laxi-
tatem, et densitatem, ut dato tempore op-
portuna, et utilis subsequatur separatio cor-
porum a se invicem: Hæc autem humo-
rum preparatio alia a natura fit, alia ab
arte; preparatio humorum, quæ a natura
perficitur, habetur ab æquabili oscillatione
fibrarum, et glandularum, ab ordinato hu-
morum motu, ac circulo, a debita miscel-
la succorum pancreatici, et biliosi, alte-
riusque indolis, et a convenienti somno;
Quæ ab arte exequitur, comparatur ab
exercitio, a quiete opportuna, a cibo, a
potu temperiei, et ætati hominum propor-
tionalibus; acquiritur a salubri aëre; expe-
rimur enim in puro aëre, in quo elater est
mediæ densitati proportionalis, ab actione
succorum ventriculi cibos facilius preparari
dissolvi in ventriculo, promptius fieri chyli-
ficationem, et hanc feliciter disponi ad san-
guificationem obtinendam. Hinc ab Hippo-
crate de aëre, aquis, et locis habemus magno-
pere observandas esse aëris, et temporum mu-
tationes, ut opera naturæ vel perfecta, vel
imperfecta esse intelligantur. Denique præ-
paratio humorum cognoscitur a recto usu
medi-

medicamentorum, videlicet decoctionum alterantium, quæ medicamenta vel habentur a bolis, vel a pulveribus, vel a fluidis; Itaque juxta varias humorum præparationum indoles exhibentur syrupi, et decoctiones ex variis herbarum differentiis compositæ, aut pulveres variæ speciei incrasantes in tenuitate fluidorum, incidentes, ac dissolventes in densitate, ac crassitie, et ut medico utat vocabulo dulcificantes in aspera, et acri humorum superficie, aliquando calefacientes in frigida ipsorum temperie, aliquando refrigerantes in fervido humorum statu, aliquando compescentes humorum impetum, ac elaterem, quotiescunque solida, et fluida enormiter agitata motu, et elatere præpolleant. Necessitatem, et ideam medicamentorum præparationum significare voluit Hippocrates sectione 7. aph. 70. edocuit enim. *Corpora cum quis purgare voluerit, oportet fluida facere; videlicet oportet prius apta ratione medicamentorum disponere corpora ad purgationem, ut hæc facile, tuto, et utiliter purgata reddantur.*

115. Difficultas quidem non levis oritur pro cognoscendo, ac statuendo tempore, quo præparatio humorum jam instituta est, ut præparatis humoribus æqua ratione proximam concoctionem expectare, ac statutam intelligere possimus. Crediderim autem tempora completarum præparationum judicanda esse a mutationibus, quas paulatim acquirunt excreta a statu morbofo ad salubrem; quamobrem excreta, quæ morbofo crassiora fuerant, quo tempore incipiunt fieri tenuiora; quæ lentiora, quo tempore fluidiora eveniant; quæ prius aspera extiterant, quo tempore sensui incipiant leniora, et benigniora reddi, tunc illa erunt facile tempora præparationis humorum, aut completæ, aut proximæ perfectæ præparationi obtinendæ; pariterque si videamus somnum, appetitum, et vires paulatim ad statum naturalem inclinare, tunc conjectari quoque poterimus humores desideratam subire præparationem; Cum vero expositæ excretorum mutationes a statu morbofo ad salubrem non æqualibus, et similibus fieri possint temporibus, sed dissimilibus, et inæqualibus juxta majorem, aut minorem præternaturalis materiæ copiam, densitatem, et motum, juxta varias temperierum, temporum, et ætatum constitutiones; ideo semper a Medicis laborandum erit, ut hæc specificas temporum differentias, si non veras, sal-

tem vero proximas assequi possint; Quamobrem maxima egemus præxi, attentæ observatione effectuum, signorum, et excretorum cum Hippocraticæ disciplinæ studio, ut apto medicamentorum usu, ac tempore præparationibus naturæ succurramus, et completas præparationes aptissime cognoscamus. Pro hisce autem obtinendis consulendus erit Celeberrimus Prosper Alpinus, qui, duce Hippocrate, hanc materiam perfectissime compler.

116. Interim cum hisce gradibus præparationum progredimur ad concoctionum materierum, seu ad illum statum, quo materiæ vel morbificæ, vel heterogeneæ, mole, pondere, figura, et motu ab homogeneis dissimiles dispositæ redduntur, ut opportuna ratione per loca excretoria, et naturæ congrua separentur, quarum beneficio morbi judicationem consequi experimur. Quamvis autem, docente, Prospero Alpino, concoctionis signa a pluribus haberi possint, nihilominus præstantiora, et certiora ex Hippocrate ab excrementis alvi, et urinæ colligenda erunt. Quotiescunque itaque alvi excrementa, quæ prius præternaturalia fuerant aut quantitate, colore, odore, aut mole, figura, et tempore excretivnis incipiant mutari taliter, ut acquirant quantitatem ingestis proportionalem, colorem subflavum, neque gravissime, et molestissime oleant, et moles istorum sint apte molles, opportuna figura coherentes, et consistentes, & consueto tempore sine dolore, & irritatione exeant, tunc poterimus judicare aut adesse, aut proxime futuram esse humorum concoctionem. Eligam inter Hippocratis experimenta tantummodo illa, quæ libro 4. Epidemiorum significaverat in ægrotis illis, qui habitabant juxta ardes Medosadæ: In hisce statuto tempore apparuerunt fæces quantitate ingestis proportionales, molles, coherentes, quas, ut monet Martianus, viscosas Hippocrates appellat, & subflavas, simili quidem ratione flavedinis, quam observamus, cum albus natrium mucus vigente statu cruditatis mutatur in subflavum tempore concoctionis, postmodum addit Hippocrates morbi judicationem libro 1. de morbis esse securam.

117. Deinde concoctionis argumentum ab urina desumendum erit; cum enim urina antea in statu morbofo fuerit tenuis, aut confusa, cum encoremate disparato, & divulso, postea incipiat elaborare albam subsidentiam, levem, & æqualem, & acqui-

siverint colorem subrufum cum nubecula subrubra, pyramidalem quasi figuram ostendens, tunc; docente Hippocrate, concoctio humorum habebitur, aut expectabitur: hæc satis superque indicantur lib. 1. Epidemiorum ab historiis Herophontis, Cleantidis, & Melidæ; hæc ostenduntur lib. 3. Epidemiorum in Cherione, Pericle, & Nicodemio; cum autem hæc felicia coctionis signa extiterint, & perduraverint, tunc fere semper absque ullo medicamentorum auxilio morborum judicationes secuturæ erunt, parta expulsionem impurarum materierum per ea loca, quæ fuerint providæ naturæ faciliora, & commodiora, videlicet vel per sudorem, vel per urinas, vel per secessum; vel per hemorrhoides, vel per narium hemoragias, vel per sputum, vel per insensibilem transpirationem, quò tempore Medicus debet otiari, ut docuit Hippocrates aphor. 20. sectio 1. *quæ judicantur, & judicata sunt integre &c.* Verum si adhuc inertia naturæ, & morbificæ materiæ ratio, ac quantitas per spontaneas expulsiones judicationem morbi non fecerint, aut elaboraverint imperfectam, tunc Medicus debet esse sollicitus de opportuno medicamentorum usu, ut inertis, aut oppressæ naturæ prudenter, ac provide opituletur, sollicitando ea loca, quibus natura inclinaverit juxta aphorismum 21. Hippocratis sectionis 1. *quæ educere oportet per loca conferentia, eo ducere convenit.* Propterea aliquando dejectoria per alvum, aliquando diaphoretica, aliquando specifica deobstruentia, vel diuretica, aut alia impellentia exercere oportebit. Animadvertendum ultro est in concoctione humorum observanda esse determinata tempora, quibus concoctiones haberi solent, videlicet considerandi sunt dies critici, neglecta die sexta, quam Hippocrates in Epidemiis, ut infidelem accusavit; hisce itaque diebus criticis ut plurimum concoctiones humorum separare poterimus.

118. Cæterum si nulla signa concoctionis humorum, superveniant, tunc Hippocrates lib. 1. de morbis popularibus ob cruditates, & confusiones humorum minatur longitudinem morborum, aut recidivas, & aliquando mortem; Quamobrem a Medico tunc temporis res prudenter agenda erunt apta ratione victus, opportuno exercitio, debito somno, salubri aere, & aptissimo medicamentorum usu non irritando naturam, sed sustinendo.

119. Statuta præparazione, & concoctio-

ne humorum, movendum est, nonnulla medicamenta alte postulari a morbo, & causa morbi, verum penitus impediri a languida temperie agrotantium, vel ab inertia organorum, vel ab ætate; Itaque, gratia exempli, chalybeata quærentur quidem unice ab obstructionibus viscerum; verum si agrotantes fuerint temperiei languidæ, inertis ventriculi, & ætas fuerit tenera, aut senilis, aut a præcedenti longitudine morbi nimis fracta, tunc ab hisce recedere oportebit; fortis enim chalybeatorum actio, ac stimulus non obstructiones auferet, sed parta crispatura quodammodo convulsiva in fibrilis viscerum obstructiones augebit, imminuta, aut impedita solidorum oscillatione, imminuto, aut impedito motu, & elatere fluidorum; cur ergo in pueris, in senibus, aut morbo fractis chalybeata, aut boli medicamentorum gummosi, duri, ac tenaces offeruntur? profecto hæc, & similia inutilia erunt, cum ab inertia ventriculi, dissolvi, ac frangi non possint; immo hostilia experiuntur, cum ventriculo pondus, & naturæ laborem augere videantur, propterea qualia excipiuntur per os, talia per secessum solent eliminari.

120. Deinde remanent ut doleam, medicinam usque ad hæc tempora in remediorum inventionem non multum profecisse; præter enim nonnullas remediorum species a chemicis, a mineralibus ut mercurio, ferro, & antimonio, china chinæ desumptas, quibus veteres caruisse certi sumus, profecto cogimur confiteri nos pro medicamentis parum, aut nihil acquisivisse. Verum chinæ-chinæ medicamentum adeo egregium est, ac summum, ut plurimis certe æquipolleat; hoc enim prudenter, opportune, debita quantitate, ac tempore exhibitum, & repetitum febres fugat, morborum fere omnium socias, & quod magis pro argumento præsentis Dissertationis æstimandum est, præparationes, & coactiones humorum paulatim, & feliciter parat, ut Celebrerrimus Franciscus Torti ratione, & praxi tractatu de *China Chine* nervose statuere conatus est, ut antea indicavimus.

121. Tandem video me in hac Mechanica Medicamentorum expendenda, & in hac concoctione humorum opportune comparanda, non parum defecisse, cum leges emittendi sanguinem omnino neglexerim; fateor enim a sanguinis emissionem recte, aut prave instituta præparationes, & coactiones humorum aut feliciter haberi, aut mi-

ser,




Fig I Partis Me






Fig. III Partis



ferrime destrui. Verum intelligant Lectores benevoli, me ab hoc argumento data opera declinavisse, cum sciam, phlebotomiam leges suas accipere a majori, aut minori plenitudine vaforum, a majori aut minori densitate, ac pondere humorum, a temperie, ab ætate, a virilibus, a regionibus, aliquando a consuetudine, & fere semper a morbis inflammatoriis, quæ omnia cum hoc suo nullis Medicis obscuro, postulent solam medicorum prudentiam quoad quantitatem, modum, & tempus extrahendi sanguinem; ideo pro hoc argumento animadvertendum esse arbitror, sanguinis emissionem vere, & necessario postulari cum massa sanguinis peccaverit quantitate, densitate, & crassitie & motu partis a principiis intrinsicis componentibus ipsam massam sanguinis. Cæterum si densitas, & crassities humorum partæ fuerint a principiis extrinsecis, ut transpiratione impedita, aut imminuta, a succis ventriculi viscidis, & austeris, a

viscido, & austero chylo, a pancreaticis, & biliosis succis tenacibus, & impuris, a labore, ab aëre &c. tunc raro, & semper caute sanguinis missio vere postulabitur. Etenim vitia hæc a causis externis producta facile, & sine periculo auferri possunt ab opportunis purgantibus, ab alterantibus, & depurantibus massam humorum, a dieta, ab exercitio, a frictionibus, a mutatione aëris &c. Etenim a phlebotomia hæc incommoda supramodum augentur, & crescunt, spoliato sanguine elementis serosis, elasticis, spirituosus, & balsamicis, hinc oscillationes solidorum, & glandularum in statu inertie redditæ nullatenus interservient secretionis, & depurationi humorum peccantium majori morborum inclemento; Quamobrem phlebotomiz leges in concoctione humorum, & curatione morborum nonnisi Medicorum prudentiæ, virtuti, ac praxi remittendas esse putamus cum verbis, ac præceptis determinati nullo modo possint.

Pines Mechanices Medicamentorum.

ANTONII COELESTINI
C O C C H I I
EPISTOLÆ PHYSICO-MEDICÆ
AD CLARISSIMOS VIROS
LANCISIUM ET MORGAGNUM.

BREVIS CASTRENSIUM FEBRIUM HISTORIA,
QUÆ FERENTINI, ANAGNIÆ, FINITI-
MISQUE LOGIS ANNO MDCCIX.
GRASSATÆ SUNT.

CAPUT PRIMUM.

*Clarissimo Amplissimoque Viro Jo. Ma-
ria Lancisio Innocentii VI. olim,
nunc Clementis XI. Archiatro
& a secretori cubiculo
Antonius Cocchi-
us S. P.*



N magnis morbis ad te Lancisi Clarissime recurrimus tanquam ad Romanum Hippocratem & mundi parvi reparatorem. Crudelis apud nos viget epidemia castrensiū februm ab acri & pene realgarina aeris diathesi oriunda, ipsum quo vivimus, quod die nocteque trahimus, in publicam perniciem & calamitatem conversum est elementum. Scias itaque oportet, diligens naturæ scrutator, ut per consilia tua nobis opportune succurras, Ferentinum inter & Frusinonem palustres & musco virentes aquas jacere: sunt vero sulphureæ præsertim atque enormiter foetidæ, quæ hoc potissimum anno circa æstivum solstitium erumpere cœperunt, & mox supra modum auctæ agros & segetes pene omnes inundarunt;

minerales sane particulae, quæ hisce aquis per abditos terræ sinus evectæ atque indiscussæ retinentur, perpendiculari ac servido solis radio in atmosphæram claræ tanto quidem deterius ad morbos parantur & cladem, quanto pervicacius in desidum aquarum foveis linum & cannabis macerantur. Adeo *stagna loquacia* seu potius inquinamenta ranarum, bulborum atque amphibiorum consimilium, quæ nunc humi degunt, tunc aliis cum vermibus viles aquas inhabitant. Ex quibus omnibus, Syrio ardente pestiferi vapores prodeunt & veluti alas acquirunt, qui ubi per aera discurrunt, non possunt non machinam nostram hydraulico-pneumaticam perturbare, alte feriunt hominem respitantem: *plerunque enim*, ut Æsculapii successor inquit, *hominis natura Universi potestatem non su- perat*. Et quemadmodum gubernatores optimi vim tempestatis, sic medici tunc morbi impetum superare non possunt. *Divinum illud in morbis ex cælo, aere scilicet vitiato, Causa senex deducit, authoremque & dominum in cunctis, quæ corpori accidunt, aerem appellat*. Vix op-
pida in montium verticibus sita a
labe

Virg. 11.
Æn.

Lib. de
dieb. ju-
dic.

Lib. de
nat.

labe secuta sunt; eorum nanque plebecula susceptas in Ferentinensi planitie febres convehit ad montana. Verum Frusino, Ferentinum, & summorum Pontificum olim Sedes Anagnia temperati aeris damna maxime sentiunt.

Harum
februm
epidemiarum
symptomata.

II. Febres sunt veræ malignæ, & epidemicæ, quippe in omnibus similes, rigore, qui membra quatit, exacerbantur: nempe simplicis, aut duplicis tertianæ typum initio ut plurimum servant, perniciosam indolem suis mox phaenomenis detecturæ. Torva occurrit ægrorum facies, & quasi vipereo veneno *ictorefcens*, scintillant oculi intuitu contumaces, & proprium laticem, quem lacrymas dicimus, invite fundunt; infelix, porrectis artubus, & tota spina decubitus. Pulsus, qui est reciproca cordis echo, parvus, creber, & inæqualis, *Ulcerosa* lassitudo, & sitis, & sonus aurium intra se ipsas, & capitis dolor ante delirium acerbitate contendunt; aures, quæ *filie carminis* ab Ecclesiaste vocatæ sunt, tinnitum, sibilum, bombum, vel pluviam decidentem mentiuntur: internus enim carotidum ramus foramen ossis petrosi juxta meatum auditorium ingreditur, mox oblique ephippium versus sub nervo optico ascendit, & in rete mirabile, & plexum choroidem disperditur; si propter febrilem æstum solito audentius pulset, membranas, & ossicula dimovet, & in tremorem aliquem agit, quo hic, vel ille sonus exprimitur, pro impulsu scilicet, pressionumque varietate. Lingua ad oris præfecturam nata, cum magna fides debetur in morbis, ob nullam, aut insinceram salivæ separationem arida, scabra, squalida evadit, saporemque perversum renuntiat: dehiscere, & caligare solet, ubi papillæ nervæ a scorris salino-acribus divulsæ, corrosæ, & eschara, qualis a caustico iniuritur, obductæ sunt. Anorexis quoque se morbi comitem præbet. Pessimum, & fere rabiosum vermium genus nunc tormina, & alvi profluvium, nunc peristalticum motum invertens cardialgiam, & vomitum, & sibi egressum molitur, imo dolorem pseudo-

pleuroticum, syncopen, vertiginem creat: mordicatis enim ventriculo, & intestinis, per nervos octavi paris utrobique desinentes intercostales musculi, cor, cerebrum, & nervi optici in afflictionem trahuntur. Incurtat anhelitus, faucibus hæret vox, & est pro voce suspirium. Nec desunt anxietatis plenæ vigiliæ, vigilantium somnia deliria, subsultus tendinum præcipue in carpis, venatrix manuum palpitatio, jactatus convulsivi, & tumultuariæ assurgendi colluctationes. Tandem fatiscen-
vitta aurea, irritata, plus æquo contracta, & inflammatorie affecta supra duos renixus movetur cerebri, & cordis; in falcato tendine, & laceriosis hemisphæriis vectis momentum prævalet, hinc violenta, nec regularis succi nervei expressio: strangulato demum in alveis suis refluio sanguine ita cerebrum comprimit, ut liquidi animalis secretio, aut iter impediatur, & delirium in lethargum degeneret. Corruptum lixivium repræsentant urinæ, parotides interdum extuberant, & urinæ protinus defæcantur. Purpureæ maculæ, quæ postea vibicis instar livescunt, effulgent in cute; nam *malignus ichor* per miliares glandulas secretus nec tantæ molis est, ut in pustulas tumeat, nec tantæ subtilitatis, ut perspirare possit; vel quod *ipse sanguis, integer in ductus glandularum excretiores extrusus, corruptusque sit*.

Sanctorius
de static.
medic.
l. aph. cv.

III. En tristis apud nos grassantium febrium aspectus; hinc vero earum facinora expendam. Septimo, nono, undecimo solent occidere, raro decimum quartum attingunt, ut Ferentini præsertim observamus; cum illuc sæpe ad Optimates curandum accersar: & siquæ medicinæ obtemperant, nunquam absolute judicantur, (ipsa enim cæli impuritas criticos naturæ motus distrahit perpetuo, ac turbat) sed enervato sanguinis robore, volatili, oleoso, & balsamico sulphure absumpto in quartanam, cachexiam, immortalesque vi-

Lister in
commentario e-
iusdem
aph. Har.
februm maligni-
tas variis
incola-
rum in-
commo-
dis, atque
interitu
demon-
stratur.
Design.
& caus.
diut.
morb. l.
2. de aqua
inter
cutem
c. 1.

viscerum obstructions abscedunt. *Majora enim omnia vitia* (loquitur Aretaeus Cappadox) *soli Dii medicantur*; nam aut in viscere primario morbus delitescens totum in malum habitum convertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum viscera permutavit; quando sibi utraque vicissim ad perniciem suffragantur. Vidimus plures rusticos montium incolas, qui ob annonae caritatem ad secandam maturam jam segetem in Ferentini agro morati fuerant: Hi vero, cum non aërem solum venenatum, sed aestiva siti adigente aquas etiam sane ipsa siti nocentiores, veneni fontem bibissent; colore turpes se intus uri, simulque caput in partes quasi dissilire conquesti sunt; tanta erat gravitas, pondus, & dolor: circa quartum morbi diem ad penates suos reducti rei angustioris domesticæ homines brevi a tam funesto malo, & alii parotide præcedente jugulari sunt; quo spectat illud in Coacis *quæ dolenter ad aurem assurgunt, pestifera*; alii lethargo stertentes, alii dysenterico ulcere occubuerunt; alii contra iisdem fere symptomatibus confecti cum opportunum per reditum tempestivæ medelæ locum dederint, pristinae valetudini ope nostra sunt restituti: & novimus, quantum contulerit montanus aër ob tenue, ac purgatissimum nitrum, vegetumque elaterem.

Horat.
Serm. I.
7. Cat. 6.

*Ergo ubi me in montes, & in
arcem ex urbe removi,
Nec mala me ambitio perdit,
nec plumbeus ausler,
Autumnusque gravis, Libitina
quaestus acerba.*

IV. Non est hic, ut te, vir amplissime, detineam inutili causarum, symptomatumque explicatione, cum te non fugiat, sales summe volatiles, & alcalino acres ipsos aëre ceu menstruo dilutos, atque inspiratione haustos, per pneumonicas vesiculas cribrari; saliva quoque ad ventriculum ablegatos una cum chylo sanguinem petere; quo cum pervenerint primo duntaxat Cartesi elemento circumdati & febrilem mo-

tum excitant, & tragicas agunt metamorphoses; fuso enim sanguine, & velut a sui foedere sejuncta parte lymphatica, quæ est cruoris vehiculum, reticulata concrevit, ut caseosa pars lactis injecto liquores coaguli a fero dividitur & condensatur. Insunt sanguini fibrillæ elasticæ, quæ ad perennem contractionem nituntur; inest latex, qui massam divulsam & fluidam reddit. Tunc autem pessima (bilem intelliget Plato) quando puro sanguini mista & villorum ligaminumque fila suo ex ordine dimovet, quæ ideo in sanguinem diducta & sparsa sunt, ut mediocrem tenuitatis & crassitudinis habitum consequantur, neque propter caliditatem, cum ipse sit lubricus, raro ex corpore defluat, neque si crassior sit, ad motum fiat inopior, atque ægre per venas fluat & refluat. Scissis ab acuto fermento iis quasi habenulis, fugitivum serum elabatur seu decantatur, & scissæ fibrillæ mutuo amplexu & globuli rubicundi a Leevuenhœckio per dioptricum vitrum detecti mutua oppositione se se coercent & remorantur. Hinc ea sanguinis constitutio, quam stricto laxam sectæ methodicæ dux Asclepiades & mutato nomine lento liquidam Bellinus appellavit.

V. Therapeuticen nostram exponimus, ut quidquid est minus sapienter a me provisum, sapientia corrigatur. Initio, si cogit vomitus aut vomendi proclivitas, unicas binas alibi temeti, in quo metallorum crocus ad usque drachmam horas XII. infusus extiterit (in quo scilicet per emporeticam papyrum trajecto sulphura natent emetica subtiliora) præscribo admonens, ut, quoties vomuerit æger, diluentem prisanam bibat; nam ea, propter quæ vomit, perinde ac in cholera diluentur. Fertilis in montes aëris labes salivæ impressa & ad ventriculum detrusa prius quam lacteas venas tota subeat & ob valvularum repagula irrevocabilis per viam omnium brevissimam eliminanda est, quam innuit natura, & naturæ orator Hippocrates purgare oportet æstate superius, hyeme vero inferius. Sin minus, diarrhœa supervenit valde contumax & non raro

Id. Tit.
mæo.

Curandi
methodus
exponitur.

Hipp. de
loc. in
hom.

IV. Aph.
IV.

raro in dysenteriam faciens, quæ sudorem impedit seu generalem & pene regiam sanguinis despumationem. Unde nil mirum, si hæc eadem in lateris dolore impedit anacatharsim, & ideo ab Hippocrate damnata est (in metastasi tamen pleuritica aut peripneumonica dextra præcipue & cacochema post sanguinis missionem *Scomphi* interitu non obstante alvum audacter ciemus v. uncii olei lini recens expressi cum drachma spermatis cetis non rancidi in jure servido permisti: & qui Pythagorica tenacius colunt mysteria, die non impari id agunt sexto, octavo, decimo; & duodecimo, ut pectus a lymphæ quasi piceis crassamentis extricetur, ut sine ulla irritatione præcipitentur nova glutina, quæ facile possent in parte affecta ipso cum sanguine cumulari, ut tandem laxatis solidis non solum sputa, sed etiam sudores promoventur; viscerum enim tensio velut quibusdam uncis instar retis piscatorii, quod nominatur griphos, cutem circumplectitur, & coarctat) *ventrem autem compactum vomitus solvit, & egerentem magis, quam oportet, sistit, illum quidem humectans, hunc vero siccans*; præsentem diarrhœam vomitus sistit; ergo vetat futuram: paregoricum sub noctem exhibeo, ut inductum ab emetico tumultum sedet. Si progressi jam morbi curationem aggredi contingat, tum a purgando expedit vacare; nam ubi febrile fermentum cum massa humorali confusum est, vi cathartica separari non potest, & quæ potius eidem resistunt, & sana sunt, dissipantur. Militat pro re nostra chirurgicum argumentum: Obediunt (Hippocrates) luxationes, non tarde reponuntur, si quis antea quam inflammantur, reponat: Nam ubi ossis caput ex acetabulo excidit; ita nervos, & vehementia vasa comprimit, ac distorquet, ut contenti humores restagnent, & ob moram acescant, & vellicantem naturam acquirant; hinc dolor, febris, & inflammatio: brachium retrorsum luxatum inferius memorat. Si igitur statim adfueris, externo cubiti gibbo cogere oportet, & Sydenham Opera Med. Tom. II.

2. de
diata.

Lib. de
fractur.

sponte incidit. Si vero febris prævenit, non amplius reponere oportet: dolor enim in cogendo augetur. Ut autem in summa dicam, neque alium articulum febrienti reponere oportet. Sic medicus, qui ægritudinem internarum chirurgus est, ingravescente febre fodicare non debet, quæ centrum vocitat, intestina. Græcus Magister initio acutorum, & non nisi materia turgente dejectoriis utebatur: Hoc namque refermentantium genus interdum crustam, & lateris assuetam materiam subdita quasi face provocat, & febres vel exacerbat, vel duplicat. Nos certe sequi volumus dictatorem: post secundum morbi diem vix præmisso enemate ad vesicantia, ad bezoartica, & diaphoretica, ad Peruvianum corticem convolvamus.

VI. Et vesicantia quidem inter generosa Arabum præidia recensemus: ubi enim cantharidum, ac euphorbii sales in rete cutaneum, excretoriis discissis tubulis sese insinuant, solida vehementer, & longe, lateque crispantur, quæ motu dein reflexo ad aream stimuli circumpellunt, & ideo in ampullosam vesicam epidermis attollitur; liquida vero intra canales pelliceo-conicos veluti *cobobata*, & novis motibus exaltata tam parvo spatio capi cum nequeant, refluunt ad interiora, & ex unda in undam *cobobatis* liquidis, exaltatisque id, quod concretum est, & quiescens solvitur, quod vero iners, ac torpidum excitatur. Acriores cantharidum partes sanguinem, & inde renes pervadere arguit dysuria, quæ a spasmodica totius fistulæ urinariæ contractione dependet; venenum veneno domamus. Aperto emissario deleteria corpuscula sero commissa, quæ ordinariis cribris consentanea non sunt, commodius, & citius emunguntur. In peste Noviomagensi Diemerbroek incolumes eos narrat, quibus cauteria, aut aliqua ulcera insculpta erant. Neque *fontanelle* (subdit Vvaldschmidt) laude sua defraudande, quæ grassantibus morbis malignis ab omnibus gestari debent.

Mechanica
vesicantium.

VII. Ad alexipharmaca, & diapho-

Y y

Opera
medico-
pract.
tom. 2.
disp. 32.
de feb.
malig.
Bezoar-
tica, &
diaphore-
tica sele-
diora.

phoretica quod pertinet, sæpe a nobis usurpantur contrayervæ radix (quæ certius potest, quod posse videtur aut lapis bezoar, teste Riverio, aut etiam lapis de Coa) viperæ jecur sale rectificante ditissimum, cornu cervi philosophice calcinatum, stibium diaphoreticum, nitrum stibiatum, bezoardicum minerale, ac joviale, electrum album, & camphora, ut exoticas, fermentativas, ipsique cruori penitus impermiscibiles moleculas præcordiis potissimum, ac cerebro hærentes cicurent, solvant, & ad extrema vasorum urgeant, expellantque: oleum scorp. Matthioli, a quo pingues, & balsamico volatiles guttas emendicamus, & alia hujusmodi gregi Helmontico insensa: diascordium Fracastorii, quod est brevis theriacæ, seu nobile remedium compendium, gelu epice-rasticum de cornu cervi juxta Hareï normam peractum, quod in oris vestibulo colliquescentis tabe sua sitim temperat, & maligni fermenti aciem rerundit, aqua prophylactica Deleboe Sylvii utpote acido-volatilis: emulsa demum ex amygdalis dulcibus, & melonum, cardui benedicti, papaveris albi seminibus cum aqua sonchi, ut butyrosam lympham dissipatam resarciant. Decoctum hordei *tristi succo, rardoque sapore felicitis mali* acuendum, vel crudus sons in assiduam, largamque portionem sufficitur: *princeps ingeni & doctrina Plato* figuram aquæ icosædram tribuit in Timæo; *habens viginti* (sunt ejus verba) *aquilateres bases nascitur*, idest facies viginti, ut exponit fidissimus Platonis interpres Marsilius Ficinus: porro, cum aquæ corpuscula ob angulos summe flexibiles contigua sint, minimæ salium coagulantium pyramides inter ipsos deprehensæ, redimere se nequeunt, & tanquam vortice rapiuntur: *malo cum Platone errare, quam cum cæteris recte sentire*. Corporis peripheria iterum, atque iterum cucurbitulis stimulatur, in remissione tamen & ante cibum: ubi sicca linamento ardens imprimitur, nisu aëris, & pondere, quod circumpositæ partes totum sustinent, cutis intra siccam as-

surgit, & in superficiem majorem extenditur; fit enim ex plana curva: discluduntur, & ampliantur pori, & quicquid est perspirabile, eliditur: conniventia vasa, vel arcuatim per extensionem compressa vix abstractis cucurbitulis suæ se figuræ restituant, adeoque a contactu materiæ, cui prius hærebant, recedunt, & quasi spatium relinquunt affinenti sanguini, unde facilius asportatur. Novos etiam motus inspirant frictiones, inunctis manibus vel Ætiana mistura, vel oleo amygdalarum dulcium, & aqua Hungarica, seu spiritu Reginæ Hungaricæ: cutis enim revera est, ut Glissonus Anglus asseruit, *universale quoddam spiraculum, sive emunctorium corporis, per quod omnes ejus exhalationes commode effluant*: & suam cuique corpori adesse atmosphæram, Boyliana experimenta confirmant. Ut autem felicius, & optatius emergat sudor, præsertim cum anxie vigilat, & delirat æger, ad ipsa diaphoretica etiam opiatum adjungimus duce Vvedelio, tincturam scilicet Thomæ Sydenham, quæ ceu pharmacum Helenæ *nepenthe* Homero dictum sollicitudinum obliviam inducit: quippe hypnotica non modo somni tranquillitatem conciliant, sed & salum, & acidum, & acre blandis ramusculis, figente sulphure involvunt, atque hebetant; duræ matris etiam in subditis organis tensionem relaxant, qua flaccescente, sudoris viz liberius patent. Imitamur naturæ ritum: natura, quæ non est, nisi *ars æstypa Divinitatis*, seu *ars Dei in materia*, mortalibus somnum instituit ad perspirationem explendam; expleta perspiratione somni quoque necessitas expleta est. *Duplo magis dormiens perspirat vigilante*, ut probatur e statera Sanctorii: est enim vigiliæ proprium, omnes corporis musculos contractos, meatusque adeo glandularum duplo, angustiores reddere. Sic diaphoretica cum hypnotico propinamus. *℞. stib. diaph. scr. 1. bezoart. jovial. scr. ℥. hepat. viperin. præp. gr. v. ol. scorp. Math. gust. III. confect. hyacinthin. alb. inod. diascord. Fracast. ana drach. ℥. coq. in bolos v. quos degla-*

Tract. de
partib.
contin.
C. 4.

lib. 4.
Odiss.

Georg.
l. 2.

Marcus
ad Q.
Frat.

IV. Aph.
18.

deglutiat hora somni, & superpoter
aq. card. benedict. unc. vi. & tot
citr. unc. i. laudan. liquid. Sydenham
guet. xii. Hoc autem (sudore nimi-
rum) excreto, & sanguis in natura-
lem statum restituitur, & febris re-
mittit, & lassitudo sedatur. Si cun-
ctari patitur morbus post expulsum
sudore portionem fermenti, reliquum
curz est, ut Peruviani corticis usum
auspicemur: Neque *ulla alia spes in*
magnis est, quam ut impetum morbi
trahendo aliquis effugiat, porrigatur-
que in id tempus, quod curationi lo-
cum præstet.

Hipp. 2.
de diagn.

Celf.
lib. 2.
cap. 1.

Peruvia-
nus cor-
tex.

VIII. Dolatum lignum, quo traji-
cimus mare, ærio seu quondam in
Vulture pinus immani steterit trunco,
seu frondibus Alpes vestierit, qua-
tuor, aut septem digitos a morte
nos arcet. Peruvianus vero cortex
naturæ lapsæ subsidium, sacra veluti
anchora, naufragam, atque fluctuan-
tem vitæ naviculam tuetur & fun-
dat: hic est contra periodicas, per-
niciosasque febres Alcides, qui alcali
suo amaro, austeroque obvios in
ventriculo, & intestinis heterogeneos
succos a labe vindicat, & repentes
feras interimit: vi peristaltici motus
in vascula Aselliana traducitur, &
quæ in chyli, & lymphæ reducli-
vis adenibus glutinosa ad tempus
quiescunt, futuræ febris semina inci-
dit, absorbet, eliminat: ecce quo-
modo novas invasiones febribus

Phrasis,
qua con-
tentus est
Morton.

catbolicon anteverit: immo sangui-
nis contextum, & ejusdem canales
in habituali hæmoptoe adstringit, &
blanda astringitione corroborat, liqui-
dis æque, ac laxis solidis tonum lar-
gitur, & sulphureo acres, seditio-
sasque particulas, quas captivas, &
inermes fecit, per reiteratas sangui-
nis circulationes in cutem, in renes,
in intestina secum præcipitat: evi-
dens tamen, quam promovet, eva-
cuatio nec insueta nec multa: igitur
insensibilem, quæ præstantissima est,
redintegrat perspirationem. *Curatio-*
num vero animæ sunt temporum op-
portunitates: longe a paroxysmo,
inclinata scilicet febre, corticem exhi-
bemus, & statis horis repetimus;
nam sanguis puncto reservescentiæ
per elasticas suas fibrillas majori or-

Hippa-
crates
Cratev.

gismo distractas expanditur, turge-
scit, & in ostiolo ductus thoracici
subclaviæ sinistræ inserto valvulam
premit, & quæ ingredi, & quæ
ascendere coguntur, repellit: tho-
racicus ductus febrili succo distentus,
aortæ, quæ super ipsum pulsatur, obni-
tatur, & ab ea validius repercussus
in motum convulsivum vibratur, &
præcordia, plexum nerveum mesen-
tericum, stomachum, peritonæum
lege consensus laceffit; hinc horror,
aut rigor universalis, lumbago, vo-
mitus, angores, & alia symptoma-
ta, quæ in accessione cumulantur:
tunc cortex Americæ, tunc cibus ipse,
aut ipse etiam potus non aliud qui-
dem, nisi turbas adjungeret. *Ubi id*
(frigus) expectatur, omni potione
prohibendus æger est: hæc enim paulo
ante data multum malo adjicit: sic
largior calidæ potus qui juxta Zec-
chium præservat a calculo, dum ta-
men calculus, affinis sepulcro mate-
ria in renum pelvi existit, vetari
debet; tunc enim aqua transire non
posset, & pelvi magis distenta ne-
phriticum dolorem acueret.

Celf.
lib. 2.
cap. 11.

IX. Hernicus quidam viridis æta-
tis, salino terrei temperamenti, cra-
pula simul, & Veneri indulgens,
nec aëris pravitate, nec tot acerbo-
rum funerum exemplis deterritus Fe-
rentinum concessit, ubi plures duxit
dies, noctesque: nondum erat rever-
sus, cum cepit ægrotare: incidit enim
in popularem febrem cum rigore,
verminoso vomitu, cephalalgia, &
vigili oculorum conniventia. Secun-
do morbi die, qui apyretos videba-
tur, ne vires morbo accederent pro-
crastinatione remedii, anthelmonti-
cum dejectorium iussimus, quo bi-
liosæ tincturæ, insecta non pauca
sursum deorsum expulsa sunt: dein-
de jura subtilia vitulina, vervecina,
gallinacea, in quibus limatura cor-
nu cervi nodata, radices graminis,
scorzoneræ, & contrayervæ, folia
sonchi, oxalidis, & chamedryos le-
niter incocta essent, non parvis pa-
teris propinabantur. Die tertio fe-
bris rigore præludens adeo exacerba-
ta est, ut æger deliro comate, syn-
cope, & luctuosis suspiriis (quæ san-
guinem per venam pulmonicam tar-
dius

Hernici
ægroti
historia.

Cell.
lib. 3.
cap. 4.

dus progredi, & profundo, ac pleniori aëris cylindrio indigere significant) æstualet: ego Philonis filix memor cœnam inhibui: optimum vero medicamentum est opportune cibus datus: cervici, & infernis artibus vesicantia destinavi, & emulsa pro sitis levamento. Quarto palliata intermissio: linguam asperam, obscuram, & pulsum, qui licet non admodum debilis, celerrimus tamen erat ex febris recrudescencia, tunc pene fornicantem, atque inharmenicum reperi: lotium primo tenue, lateritio colore saturatum apparuit; nam tunc cessavit ea sanguinis velocitas, quæ non finit in adnosa renum superficie nisi merum laticem separari. Quinto sub auroram tres uncias aquæ prophylacticæ Sylvii, & devexo jam die bolos, & haustum, qui sequuntur obtulimus. ℞. nitr. stibiat., bez. Jov. ana scrup. ss. cortic. Peruvian. ver. in subtil. pulv. redact. atque oleo scorp. Matth. irrorat. drach. 1. diascord. Fracast. confect. hyacinthin. alb. inod. ana q. s. coque in bolos numero impares; item aq. card. bened. unc. iv. & flor. actes unc. iiii. tinctur. paregor. Syden. gutt. xii. emerit quidem sudor, sed frustra emerit: novo enim paroxysmo ea, quæ aderant, efferata sunt, & quæ non aderant, supervenerunt, nempe sanguinis e naribus stillæ, surditas, & citra faucium tumorem difficultas deglutiendi: cogitabam interea gelu de cornu cervi chinatum, quod bis, terve in die cochlearim assumeret. ℞. scob. corn. cerv. drach. v. aq. font. q. s. eoque lento igne, vase clauso ad libram unam, decoctum filtra; & prius, quam in gelu concreseat, adde aq. prophylact. Sylv. unc. iiii. diascord. Fracast. sibi. diaph. ana drach. 2. Cortic. Peruvian. ver. in subtil. pulv. redact. atque oleo scorp. Matth. irrorat. unc. 1. Sed ne jus quidem deglutire poterat miserandus æger: cecidimus spe tam iusta Corticem Arboris Vitæ repetendi: cucurbitulæ iterum, atque, iterum affixæ sunt, concisa demum scalpello in homoplatis cute, ut sanguis a capite derivatur, & quidquid intra cranium hærebat, per systalticas a tot vul-

nusculis excitatas canalium oscillationes revocaretur ad cursum: tritoi fucum dolosa febris prope statum deposuit: undecimo convulsus interiit.

X. Sudor itaque per universam cutem eiectus prodesse nequivit: miramur acerrimum febrile fermentum nec despumatum esse, nec fractum, sed inter suas ipsius scorias invaluisse. Porro cum sanguis textura jam lacer per duram meningem reflueret, & spicula corrosiva e sanguinis consortio se passim proriperent, atque in tendineo musculares fibras veluti immissi cunei meningeos sinus convellerent, eorundem angustatis diametris pars sanguinis crassior & fere polyposa resedit, & auctus meningis elater quasi arcus tensus resiliens oscillatorio potius solidorum collisu quam parca & minus celeri animalis liquidi irradiatione nervos omnes in motu tonico detinebat; hinc vigiliæ: debilior tamen erat quævis fibrarum undulatio in sensoriis & vix percepta; hinc stupor & alienatio mentis, ut multa simul æger apprehenderet; sed incomposita & cæco impetu in nervos motores linguæ appulsu satua balbutiret, en coma vigil seu mon-

Descripti
ægroti
corollarium.

Duratus
in Coma.

Anthrop.
l. 3. c. 12.

Phthisiol.
l. 3. cap. 1.

strum biceps phrenitidis & lorbargi. Jugulares venæ, quibus sinus duræ meningis laterales continuati sunt, una eademque contractione laborabant; hinc sanguis quem exhaurire minime poterant, per arteriarum fines e naribus extortus est. Adevenit surditas, membrana tympani aut zonis acusticis sideratis. Adempta sine faucium & colli meteorismo deglutiendi libertas, vel quia musculares œsophagi fibræ convulsæ ac inflexibiles erant, vel quia (ut ex Riolani observatione coniecimus) febrilia recrementa per carotidum surculos in thymum præsertim evecta glandulam illam parotidis instar distendere, anginaque occulta œsophagi pariter ac tracheæ tubum coarctare valuerunt: liquidi enim mora & stagnatio major quam alibi fit in glandulis, ubi vasculis, ceu Morton refert, non procedunt rectis lineis ut in musculis, verum spiratim. Tandem metastasis intra cranium subsistens epileptico modo

Tract. de
Aur.
Hum. c.
2. 2. 21.

modo interfecit. Cucurbitulam autem occipiti alte inciso admoveri iussissem, si tum venæ occipitalis, quam nuper solertissimus Valsalva descripsit, existentiam, originem, & suos truncos; & quo intra cranium tendunt, non ignorassem; nam per ea venarum occipitalium vulnuscula sanguis, quem in laterales meningis sinus convecluræ sunt, avertitur, & reliqui sanguinis per eosdem sinus fluentis copia quidem minuitur & motus augetur: remedium porro non contemnendum cum *ferreus urget somnus*, sed Aretæus olim de curatione apoplexiæ agens sic monuit: *Cum morbus autem diu trahitur & caput in causa est, cucurbitula occipiti affigenda & sanguis largiter hauriendus: plus enim quam venæ sectio proficit & vires nequaquam labefactat.*

Ætæol.
lib. 10.

Vermes
hujus
epidem.
consti-
tutionis
concau-
sa.

XI. Unum superest, quod silentio celari non debet. Vermes epidemicæ hujus constitutionis animata potius concausa, quam organicum symptoma esse videntur: lumbricorum ovula bombycum ovulis ferme analogæ cum mille aliis morbofis corpusculis aëri, cibo, potui commissa ingeruntur: sed quia tunc acidum volatile gastricum, & bilis alcali oleosum lixivo-acre vel refracta sunt vel plane deficiunt, suo solent putamine vermes excludi & animalcula intra animal repunt, vescuntur, adolescunt & propagantur: *nec tutus spatio est elephas*. Horum regio sunt intestina, chylumque nostrum, qua absumunt, qua corrumpunt & vitiant: hæc tanquam in concavo ergastulo glomerata febrili hominis æstu succorum acre dine & minutis quæ devorant paludum insectis in rabiolam feritatem adiguntur; *omnis autem fere morsus habet quoddam virus*. Initio, cum febris præsertim intermittit, vel saltem remittit, certe in truces stomachi atque intestinorum indigenas dirigenda sunt tela, quæ ipsos interimant simul & educant. An tunc mercurium dulcem, vel æthiopem mineralem, diagrydium sulphuratum, & optimum rhabbarum subtiliter trita oleoque scorpionum Marthioli irrotata & cum syrupo persico auri- que folio in pilulas coacta, & po-

Plat. 2.

Celf.
lib. 1.
c. 24.

stea jus tenue recenti oleo lini ad-
patum exhibere fas sit, authoritati
tuæ decernendum relinquimus. Por-
ro sublimatum dulce vel æthiops mi-
neralis, ut cinnabaris nativa, quam
epilepsiæ magnetem Crato Archiater
Cæsareus vocat, in ventriculo disso-
lutionem non patitur: nec febrilis
ignis mercurium in sphaerulas adeo
penetrantes vindicat, ut cerebrum
nervos etsi cathartico ligatus aggre-
di possit: quin Ballonio, Fernelio,
Poterio, atque Etmullero febris an-
tidotum in mercurio latitare suboluit:
corpuscula metallica, quæ a nexu
suo & chymica temperie non desle-
stunt, eodem gravitatis momento,
quo vermes suffocant, & peristaltico
motu accelerato simul cum vermibus
dejciuntur: quare mercurius dulcis
solet esse remedium epidemicæ dysen-
terix, quæ integros quandoque de-
bellat exercitus, hæc scilicet a viru-
lento vermium morfu originem ca-
pit, est ille vermium domitor: &
plus quam radix Brasiliensis, quæ
Ipecacuanha nominatur, ulcus intesti-
nis inflictum abstergit consolidatque.
Rhabbarum præterea & oleum Mat-
thioli in vermium necem conspiran-
tia amara & balsamica rugis &
mucosâ refertam, quæ villosa vulgo
dicitur, intestinorum tunicam robo-
rant, & dysenteriam arcent.

Apud
Fallop-
pium ad
Scutella-
rium.

XII. Non amplius te moror Vir
Amplissime veritus ne tibi sim ta-
dio: cultus tamen erga te meus &
devotio illud exigat, precor, ab ora-
culis tuis, ut mihi adversus febres
malignas verminosas ab aëre oriun-
das methodum aliquam peculiarem
aperias tu, qui Principis valetudinem
moderaris. Scio utique ex Græco
Patre, quod *impossibile est, statam*,
ac certam doctrinam in ipsa (in Ar-
te Medica) fieri: tua tamen, quam
mittes, consultrix epistola erit mihi
instar pyxidis nauticæ in hac tem-
pestate morborum. Nunc occasum
plejadum, nunc pluvias, glaciem,
boream, & quidquid anno hyeman-
te circumstrepit, anhelamus: *Nam*
æstivos morbos hyems succedens solvit,
& hyemales æstas succedens transmu-
tat. Asperrimam hyemis naturam
noxia paludum effluvia, quæ sur-
gunt

De loc.
in hom.

1. Epide-
mior. sect.
2. ætæol.
XVI. In
Paneg.
Traian.

punt ætate, commendant: *Habes has vices* (Plinius junior conditio mortalium, ut adversa ex secundis, ex adversis secunda nascantur. Paludem Maro descripsit, dum cecinit.

Æneid.
l. 7.

*Hic specus horrendum, & sevi
spiracula Ditis
Monstrantur, ruptoque ingens A-
cheronte vorago
Pestiferas aperit fauces.*

Vvedel.
exercit. 1.

*Hydra Lerna a Leone Baptista Alber-
to Architecto Florentino scribitur, nil
aliud fuisse, quam aquam stagnantem,
quam Hercules perruptis aggeribus par-
sim alio derivavit, partim soli expo-
suit desiccandam. Patrocínio tuo fo-
vere me perge, & vale, atque ite-
rum vale Pontifici Clementissimo.*

XIII. Kal. Septemb. 1709. apud
inclytos Carceres Cœlestini Papæ V.

**ERUDITISSIMO VIRO ANTO-
NIO COCCHIO de Medi-
cina apud Hernicos opti-
me merito Jo. Maria
Lancisus S. P.**

PEtis a me, Studiosissime Cocchi,
ut tibi rescribam, ecquid de pa-
lustribus isthic hærentibus aquis, de-
que inde ortis, frequentius hoc anno
per æstatem grassantibus malignis,
ut ajunt, febribus sentiam. Quid
rursus agendum, ne libitina adeo
immaniter tuos in ægros deserviat,
mihi videatur.

Agri La-
tini pers
antiqui-
tus etiam
ob palu-
dres aquas
infamia
labora-
bat.

II. Antiquissimam forte putavit
aliquis querelam, quam apud me
habet, & in qua vehementer doles,
Ornatissime Vir, partem nempe Pro-
vinciæ, quam incolis, Ferentinum
inter, & Anagninam palustribus aquis
plus solito identidem inquinari. Ete-
nim Strabo diligentissimus ille Ro-
mani agri descriptor, postquam lib.
v. Geographiæ omne Latium a sa-
lubritate commendavit, loca excipit,
quæ palustria sunt, atque morbosa,
qualis, inquit, est ager inter Antium
& Lavinium usque ad Pometiam, &
Setini agri quedam, & circa Terra-
cinam, & Circejum; quo sane loco-

rum circuitu isthæc etiam finitima
tellus comprehendi posse videtur.

III. Sed non omnia, quæ dole-
mus, eodem jure queri possumus: vel
enim regio ista ob jugem aquarum
scaturiginem, nullaue hominum in-
dustria vincendam telluris humilita-
tem olim etiam cænosa fuit, & cul-
pa in eos conferenda est, qui primi
coluerunt; vel propter temporum
injurias (ut arbitror) non corrivatis
sedulo aquis, in hujusmodi statum
pervenit, & excusanda minus est po-
sterorum, præsentiumque negligentia,
quæ eisdem latices torpere sinit, qui
apertis tum veteribus, tum novis
scordibus, & canalibus in amnes,
ac mare tempestive derivari potuis-
sent.

Vel fug-
pre as-
tura pa-
lustris est
regio vel
incola-
rum ne-
gligentia,
quæ po-
tissimum
accusanda est.

IV. Quid quod multiindustria pau-
latim exaggeratione, desertis palu-
stribus locis prudentissime succurre-
runt? Alterum excitandis lacunis,
ac stagnis semper subservisse comper-
tum est, scilicet alicubi vel non in-
venta circumstantis declivitas soli,
per quam nascens, aut influens aqua
libere possit excurrere; vel importu-
ne occurrens major altitudo proximi
fluminis, aut pelagi: unde pigrum
fluentum repellitur, quod illorum
admiscei undis ad integrum paludis
exhaustum oportet.

Inertium
aquarum
causa
vel regio-
nis hu-
militas,
vel pelagi,
&
fluminis
altitudo.

V. Cæterum mirati defines, mi
Cocchi, cur isthic hoc anno affluen-
tior aqua tam dulcis, quam mine-
ralis suis ex scatebris effluerit, &
vicinos campos inundaverit: etenim
dum algidissima (*) hyems aqueos
vapores e terra excitari prohibuit,
recens, exterumque nitrum abunde
nimis infusum est. Ver autem plu-
vium subterraneas venas latice ma-
gis implevit; exinde sub æstatis ini-
tium utraque de causa potuit ube-
rior lymphæ manare. Vidit phæno-
menon hoc ante mensem ipsa etiam
Roma, timuitque, cum in valle
juxta mœnia montis Cælii exigua
cæteroqui scaturigo tantam aquæ
copiam ocysime reddidit, ut bre-
vi locum illum impleverit, & infe-
storum, amphibiorumque multitu-
dinem admiserit, certo certius cir-
cumfusæ etiam atmosphæræ plurimum
necitura, nisi summa Clementis XI.

Quibus
de causis
abundan-
tior hoc
anno tam
dulcis
quam mi-
neralis
aqua fue-
rit.
(*) Con-
sule hi-
storiæ
epidemie
ortam ex
constitu-
tione al-
gidissima
hyemis
anni
1709. a
nobis de-
scriptam,
& in cal-
ce operis
de Rom.
Cælii
qualita-
tib. ad-
nexam.

provi-

providentia vdam, sinuosamque vallem citissime aggesta terra oppleri iussisset.

Ex vario-
rum, ac
minuto-
rum cor-
porum
mixtione
infectis a-
quis solis
æstu pe-
stiferi va-
pores ar-
ralluatur.

VI. Inertes vero latices ideo tanto putore humiliora circa Anagninam, & Ferentinum loca infecerunt, quia iisdem ex enormi diversorum qua vegetabilium, sensilium, & insensilium, qua etiam mineralium corporum mixtione inquinati, agitante solis æstu, corruptivum fervorem cum innumerabilium vermium exortu subire coacti fuerunt: quam sane fermentationem suis, quos desert, igneis salibus ipse quoque per æstatem sæpe flans auster adauxit, qui cum semper ex imis ad sublimia enitatur, ex palustribus, verminosisque aquis lethifera effluvia & abripit, & attollit, facile etiam ad montana Oppida evekturus, nisi eadem effluvia in altum sublata multum dispertirentur, ac partim ipso in volatu caderent, partim evanescerent. Unde fit, ut Patria tua, quæ situ eminet, innoxio cælo fruatur.

VII. Qua vero ratione huiusmodi labis semina, sive animata, sive inanimata castrenses, ac pestilentes febres gignant, & tu innuis, & nos latius in opere de noxiis paludum effluviis brevi edendo demonstrabimus. Nunc autem satis fuerit M. Varronis (a) sententiam, huiusmodi infortuniis polchre accomodatam referre: *Advertendum, inquit, etiam, siqua erunt loca palustria, & propter easdem causas, & quod ardescunt, animalia quædam minuta, quæ non possunt oculi consequi, & per aëra intus in corpus per os, ac nares perveniunt, atque efficiunt difficiles morbor, quos deinceps Columella (b) cæcos appellavit: quoniam subdit, eorum causas, nequidem medici (nempe suæ ætatis) perspicere queunt: non enim per ea tempora vermium ex seminio, ovulisque propagatio tam clare patuit, sicuti nostro ævo, quo vulgi etiam sermonibus trita est.*

Quo pacto
vermes
huma-
num cor-
pus infi-
ciant.

VIII. Nec deest probabilis conjectura, exoricum liquidum nostris fluidis incongruum a vermibus, dum stomachum, atque intestina corro-
dunt, suas per tenues proboscides veluti per totidem syphunculos in

albas, rubrasque venas, immo in nervos etiam magno cum ægrotantium discrimine infundi. Accedit denique, quod per eadem ulcuscula multis aliis ab aëre derivatis particulis suapte natura nobis insens, latius (præter pneumonicum) iter aperitur in sanguinem.

IX. Triste sane experimentum consimilis epidemice Roma cœpit. Superioribus annis, cum ad duo circiter millia hominum in Leonina Civitate propter stagnantes, corruptasque in fossis Hadrianicæ Arcis aquas verminosa, & pestilenti febre trimestri spatio perierunt. Sed quemadmodum tunc temporis nobis accidit, ut funestis læta successerint: nimirum ingruentibus prope autumnale æquinoctium pluviis, ventisque in contrarium versis, ita vobis, de fervescantibus posthac æstibus, arbitror eventurum, & in antecessum gratulor. Cæterum cum furit ex paludibus morbus, initio præsertim æstatis, vix ullis remediis aut arceri penitus potest, aut reprimi; ne si Esculapius quidem ipse, & Machaon propulsatores, & curatores adessent. Unde ingenua, magnoque viro digna confessione scriptum nobis reliquit Hippocrates (c) in æstiva quadam constitutione, *nihil memorabile suis ægrotantibus profuisse, scilicet non ventris turbationem, non venæ sectionem, neque quæcunque alia, quæ ipse tentavit, quem omnia cum ratione tentasse putandum est: habent enim effluvia ista certum incrementi tempus, quod plerunque tota æstate finitur, cujus decursu affatim irrupentia in hominum corpora, quæ magis propensa sunt (sunt autem valæ tudinaria, aut quæ minus congrua vitæ ratione utuntur) duplici potissimum via (præter minus conspicuas) respirationis nempe, ac cibi penetrant, pariterque in fluidas, atque in solidas humani corporis partes debacchantur, sed cum pluiere incipit, æstusque temperatur, tunc certe palustribus humor, imbris dilutus, ut docuit Columella (d) citius mitigat, & flantibus ventis a septentrione non solum lethifera sublevent in paludibus exhalationes, sed quæ jam*

Epidemia Ro-
mana in
Urbe
Leonina.

Æstatis
initio
morbus
curato
difficilis.

(c) Hipp.
lib. 7.

(d) Loc.
cit.
pag. 21.

in aërem sublata fuerant, alio converti solent, ac dissipari.

Qua ratione curatio instituitur.

(a) 1. Ep. scilicet.

(b) De ver. Medic. n. 17. medicus gubernatori navis ab Hipp. comparatur.

Purgantia in hisce febribus nisi ab initio, raro proficiunt.

Specificum harum febrium pulvis Chinæ cum oleo Matth.

X. Ad curationem porro grassantis morbi, quod spectat, illam tu quidem sua duxisti via, partim insusum venenum detrahendo, partim corrigendo, partim etiam volatilizando, ac dissolvendo. Sed quoniam mala sæpe sapius artis vim eludunt; propterea illud Hippocratis (a) ob oculos perpetuo a nobis habendum est, si non *prosis, saltem ne noceas*.

Ac rite quidem divinus Senex (b) Medicum gubernatori navis comparavit: quemadmodum enim ille magnis in tempestatibus ita gubernaculum, & vela moderatur, ut ventorum impetus, secundos quidem excipiat, adversos vero declinet, vel ne illidatur scopulis, vel mergatur undis: Sic profecto solers Medicus nunquam nimia cupidine celerioris curationis, multiplicandis cum temeritate, vel confusione remediis, adduci debet: sed ita diligenter naturæ motus observare, ut salubribus faveat, noxiis obsistat, ægrumque translatione saltem in chronicum morbum (quod est hac in re, ut admodum frequens, ita summopere utile) ad salutis portum utcumque perducatur.

Exinde fit, ut hujusmodi in febribus, raro purgantia, nisi ab initio, & quidem cum absente diarrhæa, quotidie remiserint, aut alternis diebus rigore, aut saltem frigore exacerbentur, juvare solent: tunc enim, quoniam non levis febrilis fermenti portio hypocondriorum glandulis, quæ in primas vias hiant, hæreere solet, non ægre illinc blandis subito emeticis, aut dejectoriis evelitur, ut inde locus fiat usui chinæ chinæ guttulis olei Matthioli irrorata, tamquam specifico hujus pestilentiae alexipharmaca, quod experimento quoque utilissimum comperitum est apud illos, qui continuis quanquam febribus, gelido tamen artuum frigore laborant. Sed hæc purgatio non nisi prima, aut secunda die laudatur; postea vero quoniam sæpe (excitata diarrhæa, vel dysenteria) ad alvum constituit malignus humor, ab omnibus purgantibus pene cum superstitione abstinendum est,

solisque diaphoreticis, & alexipharmacis utendum.

XI. At vero si febris servaverit ideam continentis, stupeturque delirio, lethargo, & convulsionibus, nulumque urgeat extremorum frigus, quoniam significat acre, malignumque fermentum majori ex parte intra sanguifera vasa furere, atque in præcordia, cerebrum, & nervos impingere, purgantibus exasperari solet, etiamsi nausea, ac vomitu æger vexetur, exigitque tantummodo blanda, crebraque enemata, stillatitias aquas, vel simplicia, quæ longa vocant jura acido volatilia, ex decoctione rad. scorzonæ, pimpinellæ, gramin. contrayer. acetosæ, ac foliis contusis sonchi: postulat pariter emulsionem ex semine melon. cardui sancti, & amygdalis, additis temperatis diaphoreticis, & cardiacis, modo ex sibiio diaph. succino, & camph. modo ex cornu cervi, ac lapide bezoar. vel guttulis spiritus sal volatil. sal armon., modo ex confectioe hyacinth. de Alcher. ac potissimum diascordio Fracastorii: quinimo cum primum coacti alicubi sanguinis indicia apparuerint, auri etiam tinctura rite præparata, vel spiritus mannæ, quem vitæ appellant, agris exhiberi potest. Sed vesicantia præcipue non solum artubus, verum etiam cervici tempestive, atque utroque in casu, modo absit dysenteria, admovenda erunt.

XII. Hoc forte tibi mirum videbitur, quod quanquam in maligna ista febre viperei dentis instar censeatur phlebotomi lanceola; nihilominus tamen ægrotantes plethorici, qui eadem febre cum dolore capitis, pulsusque magno, & æquali corripuntur, secta vena frontis, vel jugulari, tunc maxime cum majore mentis motione, soporeque, immo parotide premerentur, quandoque levati fuerint: sectiones enim istæ (modo extremorum frigus absit, & vires consent) accensentur illis, quas laudat Hippocrates (c) & proximi ventris appellat; evacuant nanque, & revocant in præcordia, ac subinde in vitalem circulum multas cruoris partes, quæ piceam, & quasi nor-

Quibus in casibus abstinendum sit catharticis.

Remedia præscribuntur.

Vesicantia proficiunt, & quando.

Quibusnam, & quando vena seclio utilissima fuerit.

(c) 6. Ep. scilicet.

dixerim, polypeam consistentiam natæ, sinubus duræ meningis, atque universæ propemodum cerebri superficiei; perinde quasi supremi, mortalesque decubitus pertinaciter adhererant, atque illinc deturbari naturæ opera non solent, nisi magno, ac plerumque irritò parotidum conatu.

Alia remedia traduntur.

XIII. In eundem pariter scopum collimant non solum viscera recens mactatorum animalium cranii futuris adhibita, utpote quæ proprio sale oleoso-volatili illas sanguinis particulas diluunt, leniunt, ac submovent, quæ summo capiti erant defixæ; verum etiam cucurbitulæ siccæ, atque adhuc semel sacrificatæ, si opus fuerit, ac præ cæteris frictions per totum morbi cursum, inunctis manibus oleo amygd. & Matth. cum camphora identidem repetitæ torpescuntibus liquidis naturales motus inspirant.

Remedia necandis vermibus ex china & acidis, cardiacis paranda.

XIV. Sed vereor, ne tu arguas, mea ex memoria discessisse remedium maximopere necessarium pellendis, necandisque vermibus, quod forte primas in hoc morbo tenere debuerat. Porro illius non sum oblitus, sed valde dubito, ne, dum pharmacum, (præterquam ex amaris vegetabilibus, china præsertim atque ex acidiusculis cardiacis) quærimus, venenum inveniamus, quod ægros citius quam vermes perdat: mercurialia enim in tanta naturalis œconomiae confusione nervorumque potissimum oppressione quid quæso alium, nisi mortifera in cerebrum inducta epigenesi novas turbas facere possunt? Igitur in alexipharmacis, ipso in tempore, denique in naturæ præsertim solertia, quæ docta est sine magistro, spem omnem collocare oportet, ut filii Patris simus, qui nos admonuit, ut saltem non noceamus. Nanque medicina est quoddam experimentalis prudentiæ genus, quæ vix doceri ab ullo potest, tota fere sedulo peritoque ab Artifice in arena ipsa invenienda ac tractanda est. Maeste igitur animo, mi Cocchi: sed dum aliorum valetudini incumbis, fac ut tuæ quam diligentissime servias. Romæ prid. Kal. Sept. MDCCIX.

Sydenham Opera Med. Tom. II.

NONNULLA DE TERRÆ MOTU.

CAPUT II.

Illustrissimo Domino Jo. Maria Lancisio Sanctissimi Patris Clementis

XI. Archiatro & intimo
Cubiculario Antonius
Cocchi S. P.

PLane deerat quid ad te scriberem, nec habebam a te quid expectarem Vir Amplissime. Sed terræ tremor copiosum & triste attulit argumentum. Festo die Seraphici Patris nempe IV. Nonas Octobris secunda noctis hora vehementius consueto mota est terra, & parum absuit quin nova Cassia solo iterum aquaretur; cælo interdiu sereno signum a Plinio commemoratum tenuis linea nubis in longum porrectæ præcesserat. Motus ille non fuit subsultus, idest deorsum sursum concussio, nec lateralis hinc inde vibratio, sed unam tantum partem sine vibratione propellens ruinam superstructis ædificiis minatus est, & pestinacior sane fecisset pessimus omnium motus & demolitor, utpote per quem non restituitur centrum gravitatis ædificiorum ut immineat suæ basi; horrenda tamen reliquit vestigia, altas rimas, immanesque parietum hiatus, & alia ruinarum initia: prægnantis arenæ scætus, seu potius vegetabilia monstra nullo caule, nullisque radiculis firmata, nempe tubera inter gulæ delicias habita, non rostrante suo, sola mongium concussione detecta sunt. Si epistola est quedam longinqui hominis representatio, pallentem me, squalidumque trepidare jam vides. Sextum Hippocratis librum de morbis popularibus legebam, cum cæco velut mugitu oborto, crepitante domo parietem in me nutare animadverti, & saxa veterem libertatem, pene dixerim, affectare, ut me adhuc vivum absconderent, tumularent, obtererent. Addidit fuga periculum periculoso jam malo, scalas enim non pedibus, at strato per lapsum trunco decurrimus. Viri, & puel-

Z z

Turcæ
tunc
tempo-
ris Cor-
cyram
obfidione
infesta-
bant.

puellæ extra domos, & se ipsas promiscue vagabantur, & passim matres, quo se, & infantulos e cunis ereptos reciperent, ambigebant. Beatæ Ritæ Vestales, & alia aliorum Ordinum vittata capita, sicut rescivimus, a male tutis claustris recedere cogitabant. Fugientes secuti sunt ægri ægritudinis suæ obliti, cum malum impenderet atrocius, cui nec Principis providentia, nec Medicorum solertia, nec ipsa natura, quæ nobiscum cohabitatur, potest opitulari. Voces ad Deum sanctum, sortem, atque immortalem emissæ, lacrymis, & suspiriis intercisæ undique resonabant. Non externæ gentes, non Asia in nos sævit, nunc magna pars nostræ metus est domus ipsa, quam colimus. Sic afficit timor, ut neque diurna negotia, neque nocturna silentia cum securitate permittat; Gravior propterea somni vis ad lectum nos, tanquam ad patibulum trahit. Crebras terræ commotiones in hac Reipublicæ Sede (titulum duntaxat reliquit Roma,) & brevibus pagis ex consensu continentis cum ignivomo Italiæ monte Vesuvio accidere Patritii Cassiani opinantur, quasi inde minerales particulae sulphureæ, ac nitrosæ igneo vortice per subterraneos cuniculos deriventur. Travaginus Nobilis Venerus, ut ex Nicolao Cyrillo strenuo Carthesii sectatore, & Medico solertissimo Neapoli accepimus, asserit, & veri non citra similitudinem, nimirum quando terra deorsum sursum concutitur, ibi terræmotus fieri per essentiam, ibique magnam effluviis copiam reperiri. Ego testari possum, quod in Cassiano solo mitior est, & frequentior talis concussio. Porro aer intra specus, & cavernas inclusus volatili ætheroque veluti agmine occupatus, ac rarefactus, dum ejus spirulae se se angustiis expedire nituntur, majorem hic, quam alibi renixum offendit, seriem videlicet, & solidissimam, imperviamque compagem montium, quorum alpina jura tangere cælum videntur. Unde nec mirum, si elastico, prævalidoque impetu solum elatus ædes quatit, prosternat, disjiciat; nam juxta egregiam Plinii ana-

logiam, nil aliud fere est in terra tremor, quam in nube fulmen, & tonitruum. Et quidem fulminis primordia esse nitrum, sulphur, &amenta terrestria, ostendit Carthesius: cavae nubes, qua exhalatio sulphurea, & nitrosa includitur, instar bellici tormenti, exhalatio vero ut pyrius pulvis se gerit, quæ dum nubis claustra dirumpit, aerem circumjectum valide commovens, fragorem edit non illico interiturum, nempe tonitruum, & coruscationem, seu fulgur explicat, eo quod materia primi elementi, quæ celeri, & largo confluxu nubem inferiorem pervadit, ex angusto sinu, & tortuosis anfractibus vi refluere in liberiores aërem cogitur: explosum fulmen sive recta, sive oblique in terras ruit, impetu secum ferente lapidem pene metallicum ex accensa mistura concretum; telum nempe, quod non Cyclosum incute, sed naturæ magisterio tornatum est. Pari omnino mechanica accidit & terræ tremor, & subterranea fermentatio, vi cujus terra concutitur: ignis tam in atmosphæra, quam intra terram eliditur ex violento partium motu, quem libera excitat primi elementi materia. Sic ubi sænum pluviis humefactum, & sole non bene siccatum reponitur, sponte solet accendi, non sulphure, oleo, nitro, quo abundant plurima herbarum cadavera: aqua ansam præbet accensione; nam ejus moleculæ tanquam parvi cunei sæni poros ita constringunt, ut expulsis globulis sola, & effrænis remaneat materia primi elementi, quæ eo usque perniciosissimum motum exercet, ut demum tumultus oculis pateat sub forma ignis. Insimulare non possum occulta ignis semina in sæno, quæ ob præsentiam aquæ interius simul confugiunt, & cumulantur, licet ad antiperistasis, seu circumobsessionem contrarii recurrat antiquitas: pulvis enim pyrius, qui ex carbonibus, nitro, ac sulphure confectus est, quamvis madescat, accendi nequit. Non sufficit itaque si cuneus in asseris rimam indatur, ad asseris discissionem; requiritur malleus cuneum ipsum percutiens, impellensque, ut scilicet asseris

Dissert.
7. Meteorol.

seris partes ex motu dividantur. Sed ut ad rem meam redeam, aër in terræ sinu coacervatus, pressusque, ac tensus quadam stagnatione con-crefcit; si vero igneis salibus impetit, tunc adeo tumet, & æstuat, ut veteris loci veluti carceris impatiens quæ magis resistunt, vehementius dimovens, & non raro etiam effringens, viam vi moliatur. Dicere supersedeo, quæ redolent meteoristam, ne dissertationem de terræ motu, quam fervidus, & dubiæ lanuginis adolescens exaravi, importune retexam: pagellis istis augurari poterat Cenfor, quæ libro suo olim cecinit Venufinus.

Epist. lib.
II.

Contrectatus ubi manibus sordescere Vulgi

Caperis, aut sineas pasces taciturnus inertes,

Aut fugies Uticam, aut unctus mitteris Ilerdam.

Illud autem omittendum non est, quod nos alienæ valetudinis custodes ac vindices quotidie periclitamur; tonat enim assidue terra, & quod habet præcipuum perdidit, stare. Huc venimus ut tibi Protector optime pareremus, & paruisse tibi nonne est quoddam efficax orandi genus, ut nos in occupationis exilium missos plenum discrimine quamprimum liberet? Ignosce quod curas doloremque animi tibi sæpe narramus, nam ipsa narratione dividimus. Omnem spem in gremio potestatis tuæ ponimus, & tua summum apud Principem potestas non aliud desiderat nisi vellem. Me dilige ut te diligo. Vale. Ibid. Octobr. 1717. Cassiæ.

S. Gregorius cum ad Petri Sedem evectus fuit ita de se ipso plorans scripsit l. II. ep. 6.

Jo. Maria Lancisius Antonio Cocchio suo S.

NE me putes, Cocchi suavissime, ideo tuis literis ab Idibus Octobris ad me scriptis nondum dedisse responsum, quod vel te ex memoria deposuerim, vel propter curarum vim, quibus plerunque gravor atque interpellor, causas responsioni neclere mo-


rasque injicere velim: non enim unquam quoad vixero aut amicorum, tui præsertim similibus obliviscar, aut ullis occupationibus impediatur, quominus successiva saltem tempora ad rescribendum subripiam. Porro diuturna primum ad Castrum Gandulphium apud inclytum Abbatem Alexandrum, Albanum rusticatio mea effecit, ut tuas nisi post secundam hebdomadam acceperim. Deinde quoniam in reditu ad Urbem inveni pluteum obrutum atque onustum sexcentis serine qua epistolis, qua dissertationibus, quæ ab eo die, quo hinc discesseram, fuerant aggestæ, non parum certe laborandum mihi fuit, ut ocyus ab ejusmodi negotiis me dissolverem. Nunc itaque ut potui, expeditus, totum me tibi trado.

Molestissime fero, te isthic mutante solo dies, noctesque cum timore, vitæque discrimine penitus vigiles transigisse. Quis enim hujusmodi casus, in quibus sæpe propter ædium ruinam vivi homines sepe- liuntur, suisque membris contulis, ac laceris diu supervivunt, aut dissimulare possit, aut non dolere?

Sed quanquam hoc inter dira, maximæque infortunia referendum est; ubi tamen autumnus abeunte firmatam isthic tellurem jam videris, quod contigisse speraverim, gratulandum tibi potius, quam indolendum arbitror, non tantum quod sospes divino favente Numine evaseris, sed potissimum quia & oculis, & animo, quæ olim de terræmotu eleganter scripsisti, lustrare secundis curis, & quidem sapientioribus, ut scite Eurypides; causasque omnes, ac discrimina diligentius exquirere, rimari- que poteris, quas nemo absens, nisi fallacibus conjecturis assequi valet. Ut enim cum Plinio minime dubitandum reor, quin ipso in terræmotu idem eveniat, ac inter nubium tonitrua fulmen erumpit *incluso spiritu luctante, & ad libertatem exire nitente*: ita sedulo animadvertendum, investigandumque adhuc superesse censeo, quomodo in terræ cuniculis pyrius veluti pulvis cumuletur, & quare data occasione incendatur, perque certa solum loca, ca-

Clem. XL.
Nepos
meritissi-
mus ho-
die S. R.
E. Car-
dinalis.

que interdum montana illico erumpat, atque profiliat. Loquor autem hic de vero motu terræ, non de solo tremore, qui ex consensu illius telluris, quæ urgetur, truditur, ac dehiscit, fieri consuevit. Accedit vero non leve gratulationis argumentum, quod omnia, quæ nobis adversa contingunt, a christianis præceptis ad nostram vel animi, vel corporis utilitatem referenda esse doceamur, scilicet ut magis persuncti periculis tales, hoc est probi, justique perseveremus, quales in ipsis discriminibus sumus, nosque futuros pollicemur. Cæterum curabo, atque enitar, ne de spe, quam jure in mea erga te existimatione, ac benevolentia habens, unquam depellaris. Vale. Romæ Idib. Novembris 1718.



DE IMMANI HYSTERICO AFFECTU.

C A P U T III.

Illustrissimo Domino Jo. Mariae Lancisio Clementis XI. Archiatro & intimo Cubiculario Antonius Cocchius S.

SACRA Vestalis in Cœnobio B. Ritz annor. xx. quadrati habitus & biliosi, ut ajunt, temperamenti Idibus Maii post insuetum quendam laborem correpta est repentina faucium angustia, crebro altoque suspirio, & cordis & arteriarum palpitazione, cui quælibet pulsus differentia conjungitur: obmutescens ac pene exanimis humi procubuit. Attigit orthopnoæ gradum difficultas spirandi: persistunt adhuc præcordiorum angor, suspirium, abolitio vocis, sicca tussis, capitis dolor & interdum vertigo: & *cor vibratur*, & vibratione cordis costæ videntur extrudi, cum reapse cor in epileptico motu sit, & *feriat pectus*, eo quod supra suam basim assurgens cuspidæ ad costas pertingit. Agra circa septum transversum, quod est microcosmi horizon, se fascia muniri velle, ut satius spiritum ducere possit, frustra

Hipp. l. 3.
de morb.
Molieb.
Bellin. de
mor. Ped.

nititur exclamare: modo pallet, modo rubet, corde scilicet *astringente venas ac laxante*, quod intelligo etiam de arteriis, & addo Cappadocis verba: *Sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color.* Inter deglutiendum torpescit œsophagi circumpulsio, & non raro cibus medio in itinere interceptus cogitur eo redire unde discesserat. Assumpto cibo tenduntur & murmurant hypochondria & coacervantur suspiria; auctos tum nec regulares pulsus filemus. Prima hora somni somnum excurit & experrecta surgit pectore anhelato, palpitante corde, & quasi injecto laqueo suffocari se putat, ut iis solet accidere, qui pectoris hydrope laborant: artus frigidi sunt: sanguinis per extremas arterias præpedita circulatione: pigra est alvi dejectio, urina parca & tenuis: catamenia jam pridem substiterant, & siquid effluat, fluor est albus: convulsis enim lacertis Malpigio nostro descriptis, qui vasorum oscula in concavum uteri fundum hiantia sphinctericum quasi rete amplectuntur & stringunt, non cruor, sed pars ejusdem serosa delabitur. Secta est vena cubiti, secta est & saphena. Quæ autem tensis crispatisque solidis blandiuntur, quæ succos hysterico-acres retundunt & diluunt, quæ tandem lunare tributum exigunt, non prætermisi. Sed nullum hætenus vel parvum levamen. Vereor ne ob spasmodica diuturna, quæ intra thoracem præsertim vigent, laxentur tandem *sanguiferi tendines seu arteriosa suspensoria* quæ cordis prolapsui reniti debent. Tuam igitur, Lancisi Clarissime, opem imploramus: simulator enim hic morbus sæpe sæpius prodit in publicum vultu non suo. Reticere nolo quod Ludovicus Mercatus duorum Hispaniæ Regum Philippi Secundi & Tertii Archiater sapientissimus innuit, quibus si adhuc *adderis sexus differentiam, clarius procul dubio cernes tam esse difficile in feminis curationem optime moliri, quam esse Medicum.*

Hipp. l. 1.
de off.
nat. De
caus.
diatur.
morb. l.
8. c. 2.

Dissert.
ad Spon.

De Gy.
naciis.
l. 1. c. 8.

Singulare interim gaudium, quod ex valetudine Clementissimi Principis a te iterum restituta percepimus, me-

metum temperavit, quem crebrior atque immanior tonantis terræ concussio, & quem precipue duplex hesternæ una, mane sero altera, intulit nobis, quique iustissime extorres domo nos fecit. Omnes lymphatorum ritu excurrerant, cum ædes undique titubarent tecta obstreperent & humus discedere sub pedibus videretur. Plorantes mulieres ad preces, ad vota conversæ sunt. In plateis & agris tentoria passim offendimus, sed quæ composuit tumultus & timor illi, similia quod Lucanus describit.

Phraf.
l. 4.

*Rectorem dominumque vatis secura tenebat;
Haud procul inde domus, non ullo robore sulca,
Sed sterili junce cannaque intexta palustri.
Es latus inversa nudum munita phaselo.*

Thren.
c. 1. n. 8.

Porro, ut Jeremias loquitur, cogitavit Dominus dissipare murum &c. retendit funiculum suum & non avvertit manum suam a perditione. Tum Cassia, tum Nursia ejusdem calamitatis consortes, quæ hoc nato recens sæculo ceciderunt, jam nunc in novis ædificiis alte dehiscunt: imo aliquot Oppida Nursinæ ditioni subiecta, nempe Abbatia Sancti Eutitii, famosa Lithotomorum Patria vulgo *le Preci*, Tutturum, Saccovesium, Villa Crucis, Castrum Vetus & alia, si non prostrata sunt, fere in ruinam propendent. Vale 17. Kal. Jul. ann. a Virginis Partu 1719. Cassiæ in tentorio.

LANCISIUS COCCHIO SUO S.

Miror profecto, amicissime Cocchi, te inter nutantis terræ metus artubus, ut arbitror, tremulis stylum tam firmiter stringere potuisse, ut morbosam istius Sanctimonialis historiam quam diligentissime ad nos scriberes. Ego enim in urbe eodem, quo vos die, ante XII. horam ex terræmotu tanto quidem terrore

perculsus fui, ut nisi Sanctissimus Princeps ex gravi morbo nondum satis reconvalefcens animum meum valide retinisset, ab Aula statim ad tentoria confugissem. Itaque cum repentina formido & tibi, & mihi communis fuerit, neutri certe dolendum erit, præsertim ubi cogitaverimus, nihil nobis, aut aliis solidi mali contigisse. Agamus itaque singulares Deo Opt. Max. gratias, & læti posthac in Domino vivamus.

Ut vero ad casum a te propositum descendam, non dubito quin duobus abhinc mensibus Sacra Vestalis propriis jam destituta catamentis, per eum, quem narras, corporis laborem, uteri, ac proximorum ovariorum recrementa ad præcordia, atque ad cerebrum magnam partem repentino cum impetu traduxerit, locumque fecerit Hippocratis effato in lib. de Virg. morbis. *Sanguis non habens effluxum præ multitudine resilit ad cor, & ad septum transversum*, addimus nos, ad cerebrum: cum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum fit, deinde ex fatuitate torpedit; & quæ sequuntur. Omnia itaque symptomata, quibus angitur isthæc Virgo, suboriuntur partim ex acri sanguine per ipsa præcordia circumvecto, ac musculares valorum membranas, diaphragma, cor, & pulmones pungente, & fodicante, partim ex stygiis pene ichoribus, qui cum liquido animali fluunt per nervos splanchnicos, illosque præsertim, qui ex gangliis a me nuper detectis ad interiora pectoris divaricantur. Nota hic obiter, ganglia esse olivares plexus in truncis nervorum, ut nodi in arundine, seu quædam esse veluti cerebella extra cranium locata, ipso tamen cerebro robustiora, pia, crassaque meninge involuta ad musculos, qui libero motui magis resistunt, superandos constructa: en ratio, cur nervi, qui ad motus organa feruntur, partim cum, partim sine gangliis occurrant. Stygiis pene ichores liquido animali permixti non possunt non villos nerveos, retiaque villosa irritare, & in convulsionem adducere: quamobrem immanis hysterica affectio nascitur, & perennat; neque porro spes est, fore,

Differt.
anod
Morgagnum in
Adversariis Anatomis.

re, ut remittat, & cedat, nisi tollatur causa, & ad causæ principium, nempe ad uteri vias tum convulsas laxandas, tum obstructas aperiendas perveniat. Quoniam vero effecta plerunque ante ipsam causam in morbis saltem moderanda sunt; idcirco, cum certissimum sit, viscera omnia tam thoracis, quam abdominis convulsionibus tentari, summamque acedinem fluidis omnibus esse communicatam, omnium primum a laxantibus, ac retundentibus curatio inchoanda erit, ut tuto postmodum ad deobstruentia, atque ad emmenagoga recurratur.

Quod autem attinet ad emollientia, nihil est opportunius oleo amygdalarum dulcium recens ex decorticatis amygdalis sine igne expresso, quod ad uncias duas, addita uncia una olei pariter recens ex melonum seminibus extracti, exhibetur in jure anzelucanis horis per xv. vel xx. dies: propinaturque ante cenam drachma una optimi spermatis ceti; atque interim singulis vespertinis horis injiciendam putarem per alvum decoctionem omenti vervecini in jure paratam ad uncias tantummodo viii. vel x. ut nimirum contractum tam colon, quam uterus molliatur. Abstineat interea temporis ægra a vino, & abstemia saltem in annum persistat, caveatque ab omnibus acidis, acris, frixis, caseo, leguminibus, omnique sapido alimento; sumat jura subtilia ex hœdinis, vitulinis, aut vervecinis adenis deprompta, saltem ad libras duas, hoc est post duas horas ab hausto oleo amygdalino: oleum siquidem, ac jura contractas partes emolliunt simul, & exoticos sales cicurant. Post hæc locus erit infusioni drachmarum vi. cortic. myrobalanorum paratæ in libra una seri caprilli, vel juris subtilis: mire enim valet infusum hoc ad extrahendas tincturas salium acrium austeriorum, seu convulsiones inducentium.

Ab hac deinceps leni purgatione tutissime aliquot anthysterica præstidia adhiberi poterunt, inter quæ præstare semper mihi visa est, præter chinam chin. & bezoarticum joviale, sequens mistura.

℞. Aq. tot. Citr.

Meliss.

Nuc. virid.

Ceras. nigr.

Et Theriacal. ana unc. x.

In his ignita camphora sæpius extinguatur; additur vero vigoris gratia parum aquæ hysterice Quercetani, & nonnihil laudani liquidi: exhibenda est cochlearim bis aut ter in die, sed præcipue cum prælocativus paroxysmus recurrit.

Cæterum ad mensium reditum promovendum assabre conducunt jura ex radicibus temperatis, parumque amarificantibus cum nodulo chalybis, nec non hemicupium aquæ dulcis, in qua radices altheæ, folia malvæ; violar., & parum artemisiæ floresque sambuci, incocta fuerint. Quod si vero aut convulsiones minime cedant, aut catamenia adhuc subsistant, vesicantiæ femoribus admovenda & pediluvia, frictiones & cucurbitulæ sæpius infernis partibus adhibenda erunt. Tu interim, mi Antoni, memineris moniti Hippocratici, in mulierum nempe curationibus *Numen semper esse implorandum*, & cum eadem fuerint virgines aut viduæ, procurandum, ut se Sanctorum meritis voveant: ita enim per summam confidentiam earum cor cum arteriosis tendinibus undique laxatur; quo fit, ut interdum etiam citra miraculum, Deo adjuvante, ocyssime convalescant. Vale.

Romæ 3. Nonas Jul. 1719.



DE SEPULTO INTRA PECTUS ANEURYSMATE.

C A P U T IV.

*Illustrissimo ac Sapientissimo Viro
Jo. Maria Lancisio Clemensis Xl. Archiatro & intimi Cubiculario Antonius Cocceius S.*

Cassianus juvenis ad quintum ætatis lustrum pertingens salino sulphureæ constitutionis minuta & sicca sca-

scabie infestabatur, quæ cum morderet acerrime & ungui operoso importune imperaret, urticam hanc pertæsus æger adipato malagmate intra corporis pomæria repellere non dubitavit: mense Augusti anno 1717. in febrem incidit lentam sterili cum tussi, dyspnœa & macie; porro ea quæ comedebat, invito ventriculo ingerebantur, & non longe a pastu crescere febrilis motus sine ullo artuum frigore deprehensus est: pulsus celeres, duros, & contra quam fieri solent, magnos exploravimus, & veluti miniatis in ipso vultus pallore genis manuum pedumque volæ æstuebant: exul erat instaurator somnus, ipsum namque obrepentem tussis ut hostis ad excubias posita undulatorio tremore nerveas cerebri fibras concutiens depellebat. in urina licet naturalis color exhiberetur, rotunda tamen seu oleosa corpuscula natæ, & divulsam hypostasim subsidere non semel aspexi. Nescio quæ dejectoria & postea non Haly Abbatis pulverem, sed species aromaticorofatas natu major collega præceperat; quinto Idus Septembris ad trutinam revocatae sunt curativæ indicationes. Prima, convulsivum & strepens symptoma, quod tussis est, ac faucium ariditatem compescendi; & ideo eclegmata ex recenti oleo amygdalarum dulcium syrupo violaceo & paregorica Sydenhamii tinctura lambebat æger, & amico gelu de cornu cervi identidem se recreabat (venæ autem in cubiti flexura incisio convulsis intra thoracem canalibus diametrum celerius reddere potuisset, imo & pulmonici infartus administram tussim levare teste Junghenio.) Altera, tuendi & sanguinis ligamina & pulmonum quoque compagem, ne in tenebro & ampuloso parenchymate eadem ulcuscula suborirentur, quæ sal acre psoricum modico sero dilutum in extima superficie tubulorum cutaneorum fines excedens insculperat, & ideo bolos istos deglutiit.

24 *Sperm. Cet. non rancid.*
Antihæst. Poter. a scrup. ff.
Cortic. Peruvian. ver. & in subtil.
pulv. redact. scrup. 2.

Bals. sulph. misat. gutt. 3.
Syr. hed. terrestr. q. f.
Coge in bolos tres & inaura.

Tertia demum, reificandi renutriendique; & ideo jus Septali viperina carne animatum adhibuit, ut nempe salino-acres particulae sale volatili pingui & balsamico ad peripheriam reducerentur vel transpirarent, ut effœta liquida exaltarentur, ac in solidis elastica virtus resurgeret; pulmenta ex farre præsertim & rapis Curii quondam cupediis usurpat, in porum vero aquam cum redolentium malorum frustulis & sandalo citrino decoctam substituit. Hac sane methodo strigosus homo & jam *lensis colorem referens* convaluisset propemodum videbatur.

II. Sinat, vir amplissime, coniventia tua me breve scholium de morbosa epigenesi ejusque symptomatibus adjicere. Hæctica fermentatio succensa est ob interceptionem in sanguine rabidi salis, quod novas sibi vias aperiebat; sanguinis ipsius contextus lento ulcere dissolvi & alcalino-acre fermentum in pulmones devolvi cœpit: distentis ac turgidis pulmonum vesiculis & adenosa tracheæ tunica suctionis ritu compressa irritantis naturæ serum exprimi consueverat; hinc tussis: cylindrus aeris cartilagineam seu dialecticam tubam ingressus cum minus spatii & non parum renixus, in pulmonibus offenderet, sanguinem per venam pulmonicam refluxum satis premere non poterat, nec promovere, ut ad sinistram cordis alveum perveniret: hinc difficilis respiratio, seu dyspnœa, imo & asthma: anorexis aderat tum ob atonas ventriculi rugas, tum quia gastricus succus non acidovolatilis, sed acer, & iners e viriato sanguine manabat: sitis, nam asperæ cum saliva particulae tale quiddam nerveis œsophagi, ac faucium villis inurere aptæ secernebantur: auctus non longe a pastu febrilis motus, subrēsus, & crebrior pulsus, *malatum rubor bilavis*, extremorumque æstuatio forsitan acciderant, quia novus chylus adhuc rudis in subclavia sinistra vena turbæ salium fundentium occurrens

Hipp. 2.
 Epid. lib. 1.

Aretæi
 verba c.
 de pleu-
 rit.

rens per densiores suas moleculas aliquandiu renitebatur; fusus tandem, nec sanguini assimilatus in aëris, & urinæ fistularum afflatim ruebat; subdit Bellinus similitudinem: *Quemadmodum autem candentia ferramenta demersa frigidis aquis easdem in fervorem concitant, vel aqua eadem frigida inspersa prunis ardentibus fervorem pariter concipit; sic chylus ab assumpto cibo genitus statim ac in fervidum sanguinem derivabitur, quaquaversum agitur per minimas suas particulas &c. hinc motus organa, quæ musculos dicimus, butyroso nectare defraudata sunt, & aruerunt. Scabies, impetigo, & aliz hujusmodi crustaceæ affectiones sunt* (ait Hippocrates) *turpitudine magis, quam morbi, imo nos a morbis majoribus vindicant; si vero empirice repellantur, mutato situ, mutant & nomen, & morbi nomen acquirunt: id, quod male cautus Atheniensis propria calamitate confirmat transgressus autem*

Lib. de
affection.

V. Epid.

ad Melum, ubi sunt calide balineæ, a pruritu quidem, & cutis crassitudine liberatus est, verum hydropicus factus occubuit. Ad historiam, quam reliquimus, revertamur.

III. Dum febrilis ignis, qui simul ignave, & atrociter extinguere vitam solet, extinctus esse putaretur, sinistrum latus micare non desinit (cum Cicerone dicam) *quasi quodam igneo motu, & pulsus adeo est violentus, ut costas, & sternum, admotamque manum arietet: ad externas usque carotides pulsus jactationes conspicuæ fiunt: cubare in faciem, mox deinde supinus potest æger, cum tamen cibum assumpsit, aut petit acclivia & pulsus intenditur, & respiratio. Facile est, conjectare aneurysma prope aortæ arcum, aut extra recurrentium nervorum munimen. Sciscitanti mihi de aneurysmatis principio, & occasione retulit, jam se ante scabiem hoc affectu laborare, vino non parum indulgisse, & in ludicra luctationum arena sæpe sæpius decertasse: & sane tam vini potus, quam gymnastica exercitatio interni canalis diloricationem inducere valuerunt. Suavem vitæ humorem & solidum alimentum, & timoris pharmacum*

2. de nat.
Deor.

vulgus appellat, sed Plato noster ad id potissimum conferre judicat, ut secundo calice naturæ, & habitus animorum in conviviis detegantur: quippe cum (Marfilus Ficinus in dialogum secundum de legibus, vel de legum latione) *sacras Palladis arces, quæ ante omnia colende sunt, impudentissime pulset. Sed liberiori usu meri sanguis in tartareo sulphuream diathesim vertitur, qui dum per canales pelliceo-conicos it, reditque, si unus, aut alter languidæ texturæ fuerit, illum partim orgalimo, partim vi erosiva labefactat, sere ut muros discutiunt sterilis mala roboraficus: & Dolæus inter potatorum flagella hydropem quoque, seri videlicet ex tubulorum scissura colluviem nunquam siccandam numeravit. Si vero luctam examinemus, constituentia nos stamina mille modis agitat, flectit, contorquet; audire fas est Hippocratem: *Fiunt etiam convulsiones ex laboribus, ex casibus, ex plaga, & si quis onus majus tollat, & ex cursibus, & lucta, & omnibus id genus: tanta enim, De immortales (sit modo loquendi venia) ad supplantandum adversarium exigitur in musculis tensio, & crispatura, & quanta inde vasis distractio, & liquidis strangulatio contingit: bella sunt ista nullus habitura triumphos.**

Joven.
sat. 2.

1. de
morb.

Pharsal.
l. 2.

Post repulsam scabiem erodentes sales creverunt in sanguine, & sanguifer truncus præaffectus ulteriorem ab iis labem contraxit.

IV, Aneurysmatis implicatio coegit, experientissime Lancisi, ad te recurrere. Tu enim aureum de Cordè, & Anourysmatibus tractatum præfatione in Metallothecam Vaticanam (idest a Michaelè Mercato Gregorii XIII. & Clementis VIII. familiari, & Medico descriptam) innuisti, & jam secundis curis aggredieris. Nova, & solida ex diuturna cadaverum sectione comparata doctrina prodibit in lucem, quæ temporis tui, tuæque experientiæ filia, summum jus erit in Medicina: laudabit & hanc olim ventura posteritas, & medicæ rei gloriam, quam per tot egregios labores quaesisti, non fortunæ, non aulicæ dexteritati, sed tuis meritis sine odio,

odio, & gratia fatebitur adscribendam.

V. Kal. Augusti 1719. Cassia.

Eruditissimo, Clarissimoque Viro

ANTONIO COCCHIO

Lancisus S. P.

Quamquam per hos dies nimio urgente æstu, qui nullo æthesiarum flatu temperatur, omnis fere ad philosophandum mihi facultas erepta est, atque a scribendo plane deterreor; nihilominus accepta abs te, Eruditissime Cocchi, accuratissima narratione symptomatum, quibus Cassianus juvenis post depulsam asthmaticam, hecticamque affectionem ex cohibita olim scabie subortam nunc divexatur, veluti admotis calcaribus excitor, atque ad respondendum commoveor. Ut autem paucis multa complectar, non dubito, quin acris ille humor, qui in cute primum, deinde in thorace miliarem, quasi dixerim, labem induxerat, ac tuis quidem auxiliis utcumque cicuratus, a glandulari solum trachearum membrana sensim sine sensu discussus, ac dissipatus fuerat, adhuc non levi ex parte internam tendineam, adiposamque tunicam ipsius aortæ, atque adeo ejusdemmet cordis eadem militari prurigne efficiat. Neque vero existimes conjectura duntaxat me ad hoc asserendum perducere; nam plures habui hoc mali genere laborantes, qui subsistente paulatim intra cordis substantiam sanguine, auctaque inde hujus visceris mole, in ejusdem prolapsum inciderunt, tandemque qua distractis, qua compressis, erosus ac disruptis sanguiferis, lymphaticisque in pectore vasis decesserunt, in quorum mox cadaveribus comperi non solum cor ad bovili magnitudinem auctum, ac super diaphragma decumbens, sed arteriam quoque magnam forcice per longum apertam cum minuta, eaque manifesta interioris tunice scabie (quod non sine admiratione doctissimi Viris, qui mecum aderant, &

Sydenham Opera Med. Tom. II.

quibus id mali genus prædixeram) ostendi. De cætero tecum sentio, Vir Clarissime, præcipuam superstitis hujus ægrotationis causam a luctatione repetendam, in qua præterquam quod fere omnes thoracis, atque abdominis musculi maxime intenduntur, eaque ratione anhelitum valide, diuque cohibent, sanguinique circuitum per cordis vasa violenter interceptiunt, fortasse accidit, ut juvenis iste non magis in arena, quam in ænopolio egregius athleta repente improvidusque, quod sæpe contingit, ab adversario in terram dejectus fuerit, lævumque dorsi latus vehementer contunderit, ac propterea arteria magna, imo & cor ipsum alicubi distractum, laxatumque sit. Quo sane factum esset, ut fibræ, ac vascula ex fibris pariter, villisque contexta relicta fuerint adeo imbecillia, ut præterlabenti postea sanguini, ejusque potissimum crassescens ichoribus moram facillime injecerint, locumque dederint celebri Hippocratis estato: *Siqua pars ante morbum laboraverit, in ea firmatur morbus.*

Lib. de
humorib.

Verum enim vero, quo luculentius ejusmodi ægrotationis causam ex palestra retexisse videmur, eo certe minori cum boni exitus fiducia novam curationem poterimus instituere. Etenim in morbis, in quibus structuræ vitium latet, nullum, vel si ab Æsculapio arcessatur, pharmacum solet opitulari. Sed ne citra medellam relinquamus ægrotum, operæ pretium arbitror, novas indicationes ex ipsius mali visceribus elicere: scilicet primo sales, ut tu optime conjicis, tartareo-sulphureos in universa liquidorum massa redundantes ablueri, temperandique. II. irritatam, convulsamque fibrosam cordis & aortæ texturam molliendi, lavigandique. III. impactos, interceptosque in præcordiorum cuniculis viscidos humores solvendi, abstergeri, dissipandique. IV. demum laxas alicubi, ac peno diloricas easdem partes firmandi, interditiis iis omnibus, quæ tum fluidam, tum solidam causam augere, deterioremq; facere possunt. Tamen si vero longe facilius est in casu nostro scopos curationis meditari,

A a a

quam

quam explere; adhuc tamen ea tentanda sunt, quæ ratione, atque experientia duce in consimilibus affectionibus ad producendam saltem vitam comperta sunt profuisse. Quod itaque spectat ad diluendos sales per universum corpus exuberantes, opportunissimus esset decursu serventis adeo æstatis tum internus, tum externus usus aquæ Nucerianæ: valet enim mirum in modum ad liquidorum acredinem diluendam, simul etiam ad nativum extorum tonum a sulphureis, salinisque particulis labefactatum firmandum, roborandumque. Ad eundem quoque finem conspirat serum, & lac asinum vitreis organis in B. M. destillatum cum succis recentibus plantaginis, urticæ, bedæ terrestris, & pomorum redolentium, additis canceris fluviatilibus contusis. Ad molliendas deinde convulsas cordis, aortæque fibras nihil est aptius oleo amygdalarum dulcium, & seminum melonum sine igne recens expresso, quod cochleatim ante prandium, ac cœnam, cumque etiam jure matutino exhiberi potest. Ad id pariter summo opere confert sperma ceti non rancidum propinatum cum conserva violarum.

Ut vero solvantur impactæ salinæ phlegmatis massulæ, quibus miliaria veluti tubercula in arteriarum tuni-
cis elevantur, equidem præsentissimum remedium comperi in temperatis anni constitutionibus sublimatum dulce leni admistum dejectorio, cujusmodi esset.

℞. Sublimat. dulc. gr. vi.

Resin. Jalap. gr. vii.

Ocul. cancror. præp. g. xii.

Electuar. lenitiv. sesquidrach.

M. & mistura oleo amygdalarum, in mortario vitreo malassetur. Quod utique medicamentum semel, aut bis in mense repetendum videretur: hoc enim pharmacum non modo fluidorum vitia corrigit, sed eorundem crassitiem hic illic vasculorum fines obsidentem, obstruentemque sic incidit, attenuatque, ut ad refluendum reddat idoneam; ne quid dicamus de vi, quæ hydrargyro inest, vulnusculorum absteriva, ac fere epulotica, quippe neminem latente.

Denique quassatam in minimis, ac forte diloricatam alicubi per lætationum nisus, casusque præcordiorum texturam pro virili parte restituunt balsamica, & vulneraria, hujusmodi præ cæteris sunt (novissimo tamen curationis loco ponenda) extractum florum hyperici, & sambuci cum tantillo balsami Copaivæ.

Sed omni longe melior in hoc morbi genere medicina paratur ex congrua, semperque parca victus ratione: cum enim vasa per diætam servantur depleta, invicem non premuntur, neque oppilationes contrahunt. Vinum ex toto circumcidendum est; nam merum non tantum vasorum fibras corrugat, & coarctat, sed copiam quoque salinarum, sulphurearum particularum intra corpus infundit, quibus fieri non potest, quin malum ex utraque causa ortum augeatur: vino autem sufficerem infusionem nunc soliorum melissæ, nunc decoctionem pomorum redolentium. Caveat propterea a violentis corporis, animique motibus, a quibus sui morbi duxit initia. Etenim athletæ generosam quandam in contentione ipsa vim exercent, & tanguntur gloria, cum publice decertant. Vale.

Romæ VIII. Idus Augusti MDCCXIX.

Corpus humanum definiti posset Epistola (nempe ab Apostolo mutatis verbis) scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi. ad Corinth. 2. cap. 3.

Nemo novit horologii impedimenta, nisi qui rotas, fusos distinguere, & quomodo ab elatere, seu primo mobili motus concitentur, optime sciat. Adeo oportet, eum, qui medicinam facere vult, subjectum suum, seu corporis humani texturam rite rimari. Steph. Blancardus Anat. reformat. cap. 1.



DE VENÆ CAVÆ DILATATIONE.

CAPUT V.

Clarissimo, Doctissimoque Viro Jo.
Baptiste Morgagno in Patavi-
no Lyceo primario, Anato-
mes Professori & Pre-
sidi Antonius Coc-
chiuss S. P.

Qum universus terrarum orbis tuo jam nomine plenus sit, & famam ipsam superent virtutes tuæ, me quædam tetigit ambitio, ut ad te scriberem Vir Clarissime: tu enim in perscrutandis arcanis humani corporis, quod est immortalis animi hospitium, omnes curas implevisti. Adversaria anatomica tua communi edita plausu, quantum tibi sit ingenium, quanta doctrinæ profunditas, satis ostendunt; hæc mihi probaverat utique nostrum dum viveret amicissimus Lancisius, cujus nomen alte posterorum animis insidens & fama rerum immortalitati traditum arentibus oculis commemorare non possum. Illud etiam accedit, quod si tu mecum-epistolare commercium iniveris, non solum dolorem, qui vivit adhuc, retundens, & recrudescens itidem vulnus suavissimis verbis tuis lenies, sed etiam quidquid commodi ex familiari illius consuetudine in me ipsum derivabam, abunde satis præstabis: is eris, a quo artis oracula petere non verebor, & mihi Lancisius in te reviviscet; nam, ut de se ipso inquit Cicero, *reperire ex magna turba neminem possumus, quo cum aut joculari libere aut suspirare familiariter possumus*: quare ad te recurrimus, te solum expetimus, te imploramus, ut persona licet absens, consilio tamen præsens me consoles & recrees. Venæ cavæ dilatatio, quam nuper mihi contigit observare, meam ad te scribendi ambitionem lacecessit.

II. Venæ cavæ dilatationem exposita utriusque ex anatome deprompta, quæ nempe ad machinam hanc no-

stram statico-pneumatico-hydraulicam spectant, te humaniter indulgente præmittimus. Unam venæ tunicam & arteriæ duas tendineas veteres nostri crediderunt. *Arteria dicitur vena pulsabilis, ab Avicenna vocatur vena audax*; quinque tunicis constat: prima exterior retis instar intextitur innumeris sanguineis vasculis nerveis fibris implicitis; unde vasculosa nuncupatur: secunda Ruyschio inventa dicitur cellulosa, cum sit cellularum congeries adiposamque membranam imitetur; pinguem succum ex arterioliis secretum hæc cellulæ asservant, quo arteriarum tunicæ perlinuntur, ut motui fiant aptiores: tertia, teste Villisio, minimis glandulis albicantibus compingitur, quæ laticem separant ad arteriarum fibras emolliendas, ne motu exarescant: quarta muscularis est, siquidem fibras carneas induit, quarum tensione vel remissione constringuntur vel laxantur arteriæ: quinta & ultima interior tunica musculari subjecta nervosa vocatur, utpote quæ nerveis fibris contextitur. Vena iisdem tunc tunicis constat atque arteria, sed longe tenuioribus ac infirmioribus: præterquam quod inter carneum ordinem, qui extimam venæ tunicam constituit, & ordinem annularem vasculosa tunica cellulosaque interponuntur. Qualiscunque sit arteriæ & venæ fabrica, contractiles sane potentie videntur esse fibræ annulares seu annuli carnosii pace Clarissimi Bellini, qui dicit *exemplo glomeris contineri quidquid est spirarum in arteriis, quidquid in venis, quidquid in œsophago & intestinis*; tu vero Morgagne doctissime, omisso tunicarum numero, id contra celeberrimum Regis Prussiæ Archiatrum affirmas, *denique in arteriis nullas alias carneas fibras nisi annulares observo*. Conus arteriæ a corde oriens ex lato in acutam definit; venæ conus ex acuto incipit, & in basim semper majorem expanditur usque ad cor, in cujus dextro ventriculo maximus diameter, & finis venarum est. Venæ, ut detexit Realdus Columbus, valvulis instructæ sunt, secus arteriæ; diversa canalium structura in se continet pro-

Zacut.
Lustam.
in Spi-
cilegio
Anato-
mico.

De motu
cordis
propos.
xx.

Advert.
anat. II.
animadv.
16.

Lib. I.
Ep. ad
Artic.

II. 135. videntis Dei mysteria, qui divisit mare rubrum in divisiones; nam liquidum ex lato in angustum currens duos subit motus, directum a corde, & reflexum ab angustis tubi lateribus, ita ut angustia loci motus celeritate compenletur; ex angusto cono in latam basin progrediens directi motus multum amittit, motuque caret reflexo, & ob mechanicam inversi conii, & quia longe distat ab embolo pulsante, tarde ac tacite movetur; ideo cicatricula, obducti vulneris vestigium, citissime in vena firmatur: quæ tamen impetus inæqualitas sive reflexus placiditas necessaria est, ut nutritiones, cribrationes aliæque animati corporis munera peragantur: sed ne sanguis ad majora vasa promotus retrocederet, aut subsequenter suo pondere moraretur, Æternus Artifex venas, interjectis valvulis, quæ sanguinis ascendens cylindrum sustinerent, præmunivit: id, quo non opus erat arteriis: in ipsa cava, cum scilicet dextrum cordis ventriculum ingreditur, tres valvulæ tendinosæ columnis adhaerentes, quas tricuspides vocant, erectæ sunt ut sanguinis impetum frangerent, & reversuras undas aggeris instar reprimerent. Venæ arteriis duplo numerosiores sunt, quia lymphas & alios succos e visceribus reducere in corde debent, atque eandem ob causam sunt ampliores. Num arteriæ singulæ singulis cum venis in mutuum occultum uniantur, tanquam unum ubique continuum, etsi venæ non faciunt, adhuc sub iudice lis est: assertiva opinio, forsitan ut accuratior suboluit Celsus: *Juncta enim est* (ait consularis Vir) *vena arteriis, his nervi*: & Bellinus, *continua enim inter se sunt venæ, & arteriæ: etsi non sunt continuæ, ipsarum sane oscula semper patent*. Insignis vena est porta, quæ sanguinem a circulatione per plura viscera abdominis refluxum absorbet, & in jecur officinam bilis arteriæ ritu conduit, ut a ramulis suis, qui ad cavæ ramulos biant, amarum illud, & balsamicum duodeni fermentum per glandulas hepaticas separetur, crassiusculis tunicis donata est, seu media indole arterias

inter, & venas. Vena pariter insignis est azyga, idest sine pari, quæ dextro duntaxat in latere (loquor de homine) solet inveniri, forsitan ob spatii libertatem, cum ibi neque arteriam magnam, neque Pecqueti ductum natura locaverit: hæc est velut diverticulum cavæ, de hac princeps Anatomicorum Eustachius opusculum nobis reliquit, & de hac dudum ad te scripsit Lancisius nonnulla phænomena, & præsertim pleuritica exponens. Venarum maxima ea est, quam Praxagoras nobilis Medicus *cavam* appellavit, ut Rufus Ephesius refert: dividitur in truncum descendentem, qui a capite, aliisque partibus superioribus, & ascendentem, qui ab inferioribus initium capit; amboque in dextrum cordis sinum terminantur. Videmus igitur, quod non lapidei, non anei sunt canales nostri, sed tuniceis, qui distrahi, crispari, exedi, ac rumpi solent, contextuntur. Felix, qui liquidi crasum, ac solidi robur constanti morum temperie tuetur, & in rebus non naturalibus *auream*, ut Flaccus cecinit, *quisquis medicritatem diligit*, nempe Hippocratici præcepti, *tenax, labor, cibus, somnus, venus, omnia meliocria*. Id autem, quod dicitur aneurysma, seu pulsans tumor in arteria, est hydatidis in vase lymphatico, & varix, seu dilatio in vena, cum aut valvulæ rumpuntur, aut tunice diloricantur: quacunque enim vi scindatur durior arteriæ tunica, sanguis percussione momento in mollem impingens eam magis, magisque dilatat, & velut in sacco coacervatus tumorem extollit, in quo manifesta, imo sæpe permollella pulsatio perſentitur: si vero tumor rumpatur, ager per immensam hæmorrhagiam properaret ad mortem. Non secus de altero fistularum genere seu de cava, cum dilatata est, licet asserere, quamvis systolesque ac diastoles reciprocatione non perspiret tumor.

III. Dilatio cavæ morbus est, qui vulgo facile imponit, occurrunt enim symptomata hydropis, hydropem pectoris primo, mox ascitem, & denique anasarcam æmulatur: est tamen cavæ dilatio, quæ si palpitent

Ad Ly.
cin. Od.
10. 6. E.
pid. 108.
6.

L. 2. c. 1.
de morbi.
Pect. tit.
Pneumo.
pat.

Part. 7.
Pathol.
gen. sed.
iv.
memb.
Lib. 2.
C. 2.

3. de
morb. 14.
1. traß.
c. 8.

Lib. de
dicat.

De fe-
bril. 11.
prop.

jugulates venæ, jam in dextræ cordis auriculæ aneurysma transiit, ut monebat Lancisius priusquam decederet, nimium æqua morte interceptus: nomen ab aqueo humore tamquam a materia, sive a symptomate mutuatur, sed citra febrem. Solent contra hydropici febre lenta detineri, ut testatur divus Hippocrates: Si hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tener, & acervatim respiras, & pedes tument; & ungues contrahuntur omnes, & patitur talia qualia is suppuratus sit; ut testatur quoque Arabum maximus Avicenna, qui de hydropicis in genere inquit, & accidunt eis plurimum febres sepius: diathesis enim mucido-viscida, & fere aquosus humor est cachexia, seu juxta Hippocratis definitionem pituita albæ occupatio, nempe mollis, pallidus, & eminenter phlegmaticus corporis habitus, nec ex uno vitio nec ex uno vitioso viscere prodiens, ut omnium in deterius conversio, hoc est strictum in liquidis & laxum in solidis; quoniam itaque, explicat Bellinus, heret ad arteriolas quicquid est siccius, compactius seu robustius in sanguine, abundat copia aqueorum humorum, qui ab eodem sicco subsistente exprimentur & per corpus distribuuntur, nihil igitur alimenti ducitur ad partes, quod sit naturali simile & alendo aptum, sed quicquid ad partes ducitur, erit aquosum quod plane diffuens, & tantum non diffuere partes faciens; nulli igitur aletur, seu cachexia continget cum suis conjunctis omnibus; hinc fit, ut partes ad maximam imbecillitatem redigantur & fluere quaquaversum permittant humores aqueos, qui in cavitatibus majoribus vel inter cutem colliguntur, & fiet hydrops. Cum lympham inter & sanguinem eversus est cohesionis ordo, uterque humor tali motu agitur, qualis est febris lenta: jugiter enim sed mitius provocat cor ad movendum se, pellendumque inordinate liquida; serum interea lixivioso corrosivum redundans vasa distendit, scinditque, novas sibi vias aperit, & hydropem machinatur. Potest autem canalium truncos extendere ac dilatare plethorica moles seu mera sanguinis plenitudo

& orgasmus, ut innuit Stahl: Cum enim hæc (abundantia sanguinis) non solum utiberrimum sanguinis progressum spatii proportionati intuitu varie alterare possit, sed etiam ipsi energie motus certissime plus negotii facessat cum pondere ipso tum mole etiam ad capacitatem spatii comparata: concludat disertissimus Celsus; ergo si plenior aliquis & speciosior & coloratior factus est, suscepta habere bona sua debet, quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro quasi ruina quadam revolvuntur: scio multis olim fluminibus impositos pontes, & a magnis Imperatoribus aquarum calcatam esse superbiam: sed hi omnes statim in opere, aut brevi ab opere corruerunt; purpureum flumen, seu potius mare rubrum, quod intra nos circumvehitur, ubi arteriæ aut venæ parietes dilatavit, sicut alvei ita & trani cujusvis evadit impatiens: sanguinis missio, sanguinis momentum, imperum, stimulum demit, & a strangulatu canales redimit; nempe auxilium, quod parca victus ratione mendicatur, præsentaneum missione sanguinis obtinetur: detracto enim sanguine, vatorum tunicae concidunt, sublato, pondere cessante pressione musculares fibræ expeditius contrahuntur: aer in missi sanguinis locum succedit, & vi elastica sanguinis motum accelerat, & quicquid intra canales residet atque hareret torrente suo secum rapit; sic in pleuritide materia, quæ pleuram & pulmonem occupat, inflammatorie febris seu acutæ fisionis quoddam veluti precipitatum & brevius totiusque per venæ medicum vulnus, quam per asperam arteriam, solo tussis molimine, educitur, ideo missi sanguinis superficies tanquam in gelu concreta, & profundum utpote villis solutum & liberum vigileans, & solito fluidius deprehenditur. Venæ cavæ dilatatio Aræti verbis adumbratur venam tota una est, atque continua, a nonnullis autem Medicis ea pars anastomata, quæ secundum dorsum discurrit, egrotare creditur: quoniam efusa quo cor intrat, nos obsecrare sinit: intra pectus enim vel nulli adferens, sed in pectore sub ruata præ-

De Cant.
& sign.
Acut.
lib. 2.

Tir. igno-
rus hy-
drops.

protenditur, donec transversum septum egressa cordi inseritur: igitur siquod ingens malum hanc venam corripit, pectore ambiente delitescit: nec alienum videtur esse, quod ait Van Helmont: Itaque imperium, & actio regiminis venum se extendit nedum in venas, ureteres, & vasa urinaria: verum insuper in cavitatem ventris inter peritonæum, & musculos abdominis, itemque in venæ cavæ divaricationes se inferiores usque & in pedes ac tibias. Sed resecrata per cultrum cadavera in ipso mortis silentio sepultam ægritudinem docuerunt. Caveant qui crassos dies, lucemque palustrem degunt, qui abdomini suo nati esse videntur & voluptatibus, quique athletico & castrensi victu secundam valetudinem evertere contendunt: caveant, inquam, ne vitia cumulentur in sanguine, ne conteratur

Perf. sat.

Cap. 12.

hydria super fontem, & confringatur rota super cisternam &c. ut or allegoricis Ecclesiastæ verbis; nam hydria sagacissimo interpreti Joanni Smith accipitur pro cava, idest venarum trunco maximo, fons pro dextero, & cisterna per sinistro cordis alveo; rota vero aperte indicat sanguinis circulationem, cujus principale instrumentum est arteria magna cum suis fistulis. Huc recidit quod improbat Seneca: Cum fatigaverunt se vino & libidinibus, cum illos nox inter vina defecit, cum voluptates angusto corpori ultra quam capiebat ingestæ suppurare coeperunt, tunc exclamant miseri Virgilianum illum versum.

Ep. 1. 12.

Namque ut supremam falsa inter gaudia noctem
Egerimus . . .

Mit. 1. 2.

Huc etiam recidit quod narrat Tacitus: Vitellius ventre & gula sibi ipsi hostis, Orbo luxu, sevitia, audacia Reipublicæ exitiosior ducebatur: si enim crapulæ antidotus, insensibilis transpiratio, quæ scilicet onustum corpus ad æquilibrium redigit, integra non sit, tumet sanguis, & insolenter affurgit diametro major seu capacitatem canalium: immo si acidum, acre, ponticum dominetur in liquidis vel propter hæmorrhoidum ac inusiti emissarii siccationem, vel tandem propter vehemens animi pathema,

(quod est veluti cogitationis epilepsia, rostroque immanis vultus adunco immortale jeour tundens) humoralis massa incipit sibi esse impedimento, quin libere feratur per præcordia, partim scilicet irritando fibras, partim replendo vasa: quare ubi minor renixus occurrit, fiunt distensiones, scissuræ, varicositates tum in rubris, quæ sanguinem, tum in albis venis, quæ lympham reducant; id quod cavæ potius inferiori & auriculæ ventriculoque dexteris quam sinistris solet accidere: cum enim sanguis enervatus suoque volatili exurus refluat & redundet somni tempore, incidit primo in parietes dexterarum capacitarum, quæ utpote minoribus fibris contextæ minus validæ sunt, quam sinistræ, & magnæ arteriæ cordis.

Æneid. 6.

IV. Fatendum omnino est, organicos morbos extirpari non posse, præsertim cum cessent ii decubitus, qui ab internis ægritudinibus vindicabant. Errat itaque si quis existimet in tali casu medendum esse: ipsa remedia onus, stimulus, & morbi evaderent additamentum; nam cum sanguis trajici nequeat debita proportionem a dextero ad sinistrum ventriculum, ipsa remedia sanguinis aggesta calcando premendoque in atrium cordis, quod est cava & auricula dextra, impetum faciunt: & quia ubi adempta est libertas circuitus per præcordia, necessario sectiones sanguinis ascendentis per venas inferiorum artuum & imi ventris eandem in ascensu cursuque difficultatem subeunt; ideo serum, quod est tota sanguinis massa subtilius, facile per poros effugit & replet spatia carniū, & consequenter cavitates abdominis & dextram præcipue pectoris cum apparente, sed falsa symptomatum moderatione, ut advertit Hippocrates, postea erumpit ad alvum, & statim quidem sanus esse sibi videtur ac a morbo liberatus.

2. De morbo. tit. hydrops pulm.

V. Publica sanguinis via, qua e cunctis visceribus & musculis ad cor reducitur, est vena cava: tumet inferni artus, hydrope pulmonem obsidente; nam sanguis ab arteria ad venam pulmonicam libere transire nequit, & cava ejusque propaggines præsertim inferiores exoneratæ ad cor & in

in orbem restituere non possunt totam illam liquidi mensuram, quæ ab aortæ ramis intra carnes projicitur, & ideo serunt, & lympham ad motum minus aptam, qua pedes ac

Ans. l. 2. 2. In hoc vas

(loquitur Diemerbroek de cava) sicut omnia flumina in mare aquam, ita omnes corporis venæ sanguinem effundunt : unde nil mirum si ligata cava infra cor in cane alioquin sano sex horarum spatio suboritur pseudohydrops quasi asciticus tumor ; ut indefessus scrutator cordis Louvver

pag. 123.

memoriæ prodidit, perforato itaque dextro latere thoracis infra septimam & octavam costam paulo infra regionem cordis, & immisso digito venæ cavæ situs palpiandus est, deinde pectoris latus illud ad venam quampropter compellendum est, quo filum ei facilius obducatur ; atque in isto pectoris situ arte stringendum est vinculum, dein pectore relaxato vulnus consuendum est : peracto autem experimento canis mox oblanguet valde & intra paucas horas expirabit. In dissecto autem abdomine magna feri quantitas innasare conspicietur, non aliter quam si ascite diu laborasset : quod ab impedito sanguinis ab arteriis in venas circuitu secerni prius expertus fueram. Præstare possunt convulsio & orgasmos quod efficit capistrum in cava ; serum enim sanguinis, ut aqua ex humidis contortis lintecolis, per cæcavasis foramina gessit excedere : Spasma, inquit Bellinus, est solutio unitatis in partibus nervosis vel villis musculorum sine vulnere : si vena, vel arteria convulsione seu spasmodica distensione occupata sit, jam habemus quomodo varia vel aneurysma produci-

Lib. 2. de morbo.

tur : nec deest Coi Senis autoritas, quod si convulsio in vena facta sit, hæc quidem per exordia dolorem excitat & pulsat, progressu vero temporis sanguinem ad carnem transmittit, qui in carne putrescens in pus vertitur.

VI. Subsistente demum sanguine in supernis etiam sectionibus manus tentantur œdemate, ac ægri quandoque ruptis intra cerebrum lymphaticis, & non raro sanguiferis tubulis apoplesticæ moriuntur, tametsi repentina suffocatione interire debuisse putabantur. Medicinæ parens Hippo-

Lib. de Arte.

crates eorum, qui a morbo victi sunt, curationem non aggredi admonuit ; sibi imputet quisquis uti noluit medentium imperio, nec se dignum vita judicavit, si multa neglexit, quæ conspirant ad vitam : medicam quærit opem nec invenit : discat impofterum artem, quam contempsit, quam irrisit, necessitatis & temporis filiam esse, ægro tamen miserrimo, & semel pereunti nigrum theta præfigere sine ullo auxilii, & spei suco nec medicinæ decus est, nec sapit humanitatem.

Mede in pias.

VII. In tanto itaque salutis discrimine tria sunt indicata, sanguinis molem detrahere aut saltem ejus acumen hebetare & lenire ; lymphæ recrementa per alvum & vesicam educere, ut sua liquidis volatilibus reddatur, & inde sensim redeant ichrones ad naturales abscessus ; denique affectum canalem defendere ac roborare. Res quidem faciles dictu, executu difficiles, & plane inutiles, cum ad ultima ventum est, ni author vitæ Deus remediis vigorem addat. Ut autem præfatas indicationes ipse adimplerem, quinque uncias olei ex lini seminibus per recentem sine igne torturam expressi cum jure vitulino tenui atque infuso epicratice propinavi ; nam celebre hoc oleum sulphure generoso, sale recondito, & balsamica uligine suæ lævigat, cicurat, resolvit, & quæ resoluta sunt, per alvum secum ipso præcipitat. Scilicet oxymel & gummi ammoniacum strenua urinam cientia, centipedas præparatas alkaico-nitrosa vi turgidas in pulverem tritas, tincturam & sal volatile tartari & hujusmodi alia seligi, quin & jura columbæ turratilis viperea carne sars. & chin. succis radicibus, herbis, floribus, seminibusque traumaticis obstructæ instituiamus. Si adjunctus, Celticus bubo retrocessisset, sublimatum dulce apprime conduceret ; nam alcali seu rete illo metallico venereæ luis spicula franguntur. Excereto circa morbos duo (est altera Græci Dictatoris parænesis) ut juves aut non nocuas. 1. Epid. Ars ex tribus constat morbo, ægroto, scilicet 2. & Medico artis ministro : ægroto cum Medico adversari morbo oportet, saltem dixit obtemperando, quam Medicus & pro Medico imperat Plato : Dili,

In Ti-
mo.

Diligentia victus corrigendi & gubernandi sunt morbi prout cuique datur otium; neque difficile infestumque malum pharmacis instigandum. Ludovicus Cornelius nobilissimus Venetus austerum, egregium, & vita digno Principi imitandum diætæ reliquit exemplum. Ad rem quadrat apte

Epist. 78. quod inquit Seneca: Vir magnus ac prudens animum deducit a corpore, & multum cum meliore & divina parte versatur, cum hac querula ac fragili quantum necesse est. Sed aurea prorsus sunt verba, quæ Sexti Cæsaris Præceptor subdit: Quid porro? nil agere te credis si temperans eger sis? ostendens morbum posse superari vel certe sustineri. Est mihi crede virtuti etiam in lectulo locus.

VIII. Hæc licet pauca atque immatura de venæ cavæ dilatatione mittere ad te volui, Morgagne præstantissime, ut tuum acquiram patrocinium. Humanitatis tuæ specimen præbe, & me dilige, & vale ad artis nostræ incrementum.

XIII. Kal. Jul. MDCCXX. Cassia.

ERUDITISSIMO VIRO ANTONIO

COCCHIO Medico experientissi-

mo Jo. Baptista Morgagnus

S. P. D.

UTinam is essem, Vir doctissime, quem tu pro singulari tua humanitate facile putas, ut triste tibi ac bonis omnibus consultissimi Lancisii desiderium meis possem responsis lenire. Haud equidem inficias iverim, me in quærendis per anatomen ut bonæ ita etiam adversæ valetudinis causis non levein ab ineunte ætate operam posuisse. Verum tamen hic noster mediocris usus neque est cum longa experientissimi Viri exercitatione comparandus, & si vel maxime esset, non ea tamen nobis incredibilis vis ingenii, non ea summa eruditio, non denique tot alia suppetunt, quæ ille ad habitas a se observationes in abditis retrusisque rebus vestigandis adiungebat. Quæ sane omnia siqua alia, certe a te proposita disquisitio postulat atque adeo flagitat. Cavæ namque venæ penitissime latent, & cum dilatantur, ex facile affectiones vel

antecessere vel (quod tu egregie observasti) subsequuntur, ut minime omnibus proclive iudicem, ipsam illarum dilatationem aut in ægrotantibus per propria ac peculiaria signa intueretur, aut in denatis inter tot alia, quæ Anatomici oculos manusque morantur, vitia animadvertere.

Quamobrem factum esse existimo, ut quamvis morbus iste rarus non sit, peritæ tamen ejuldem observationes legantur; quæ cum præterea non ea diligentia, qua opus esset, conscriptæ sint, vix nobis usui esse possunt. Quo magis in tantis tenebris tuos, Vir eruditissime, præclaros conatus admiror atque commendo, authorque sum, ut observando meditandoque rem tam diu obscuram magis magisque illustrare pergas. Fructum sane capies istius operæ non contemnendum: cum enim homines plerique in gulam cæterasque voluptates multo sint brutis animantibus propensiores, magnisque præterea curis animique affectibus obnoxii; quas videlicet ob causas sanguifera vasa tum multo, & erodente sanguine opplent, tum eodem sapius remorante distendunt; neque tamen circum extremos venarum cavarum truncos tam validum circumvolutum habeant musculum, quam bruta nonnulla, in quibus rubicundi insignisque sphincteris instar esse observavi, nihil hercule facilius fieri viderur, posse, quam ut trunci illi, ad quos quidem (ut recte animadvertum abs te est) effectus crudisque adhuc, & crassioribus succis onustus sanguis appellit, in magnos haud raro varices dilatentur; quos si Medici persanare nequeant, at eos ut dignoscere saltem & diutius a ruptura per vulneraria medicamenta aptamque in primis victus rationem tueri possint, maximo opere optandum est. Vides igitur, experientissime Cocchi, quantæ susceptum a te laborem utilitatis fore censeam, quantoque propterea opere a te petam, ut quod egregie incœpisti, præclare absolvas. Mihi sane quod me potissimum selegeris quicum tua ista optima studia communicares, gratissimum fuit. Idque ut intelligas, omni erga te officio omni tempore curabo. Vale & me quod facis ama. Datum Patavii postridie Kalend. Julias MDCCXX.

F. L. N. & I. S.

BAR-

BARTHOLOMÆI BOSCHETTI DISSERTATIO

D E


SALIVATIONE MERCURIALI
PHYSICO-MEDICO-MECHANICA.

AD LECTOREM.



UT solertiae meae, qualis sit, innotuit, primos Medicinæ Parentes, tot tantosque viros ad culmen artis evectos, in defesso contemplationis genio, & philosophandi instituto, illam Medicinæ partem, quæ ad hominis morbos profligandos, vitamque tuendam maxime conducit, phlebotomiam nimirum, & purgationem, ut universaliora magis, sedula diligentia, improboque labore adamussim illustrasse, & enixe addictos in universali corporum purganti, sicco pede salivationem transegisse, nihilque in hoc pulvere desudasse, licet fortassis salivatio in purgantium censu reposita magis universalis eluceat, jam quatuor circiter labuntur anni, quibus accuratis morborum observationibus in hac Sparta exornanda occupatus castra sequor celtica lue denatorum, quorum gratia luci publicæ exponere succinctum Salivationis specimen ante oculos mihi constitui. At circa hujus operis editionem diu dubitabundus hæsi, itidemque prono ad cursum impetui frænum injeci, quia *qui bene latuit, juxta adagium, bene vixit*. Nunc tandem laxam dedi habenam, quamvis id felicitatis fastigium me attigisse minime opinor, ut opusculum meum ad palatum tuum delineasse crediderim, cum hoc nostro felici sæculo nobiliora extent ingenia, & uberiora nunc vivant, ut tot disciplinarum inventa in rerum abstruso latentium reperta, antiquorum mentibus incognita, huc usque in naturæ magnificentia latuisse, ut in posterorum industriam, & gloriam cederent: quorum cœtus concordēs, quid curiosi, quid novi natura parit, aliorum oculis adhuc non animadversum, vario addiscendi studio incitati vitam per pericula non suffrendo labori commiserunt. Quid igitur divitiis alieno partis labore, & aliena industria repertis non fruimur? si nimia primi ævi ubertate defatigata natu-

ra nostris universum tradidisset Parentibus, antiqua nova rerum accessione illustrata, nuperisque experimentorum inventis suffulta non cernerentur. Quod ad meum dicendi, & philosophandi genium spectat, nemo mihi vitio vertat, si non adamussim hic omnia conscripserim, cum semitam fere nullis calcata vestigiis, nulloque afflante lumine pergere cogar, ubi novam mihi sterno viam; si igitur ab æquo deflectens semitam non agnoscam, cui trito insistere possim, conatus meos, quantum fas erit, in viam reducere defatigabor. Non ergo cum Seneca *sequor priores, facio, sed permitto mihi, & invenire aliquid, & mutare, & relinquere*. Quemadmodum enim extensis ventorum flatibus velis sublata temonis directione navis incerta via syrtes impingens, undisque obruta dehiscens casu salutis asylum offendit: ita mihi fortuito continget, si primis initiatus Medicinæ meandris, & ut homo in arte novus opellam hanc meam ad utilitatem ullam revocavero. Præclarum hoc opus ausus sum tentare, non ut exercitatis facem præferrem, sed ut magis expertos Medicæ artis Heroas ad perficiendum hoc opus exemplo meo stimulare, & si alios excitavero ad salivæ morbos venandos, qui labores meos fugerunt, bene jacta erit alea, & frugem carpsisse, metamque attigisse mihi videbitur. Cæterum feliciora ingenia intima quæque, & abscondita scrutantia vident, ubi nobis non ultra progredi liceat. *Non enim, inquit Cicero, parum cognoscere, sed in parum cognito, stulte & diu perseverasse, stultum est*. Tu interim, Amice Lector, hæc habe, quæ si placuerint, lege, ut noster omnis non sit irritus labor; in quo si erravi, humanum scias esse labi. Vale, & me amare perge.



D E

SALIVATIONE.

CAPUT I.

ARTICULUS I.

De Saliva naturali.

Uemcunque opinor libenti animo laturum, si ego ad salivationis historiam graphice pertractandam posthabitis tot eruditorum conatibus, & studio accurate pro virili perpendam, quibus hæc viribus in-

nitatur, quibusve mediis illustretur, ut illa contrahatur industria, atque brevitatem, ut non multum posse inutiliter impendere tempus, si ulteriori inquirendi labore sollicito nova forte mihi contingerit comprehendere experimenta, quicquid in hac mea dissertatione poterit in dubio latere, ad eruendum accessita. Ea enim est rerum natura, hominumque peritorum fertilis industria, & inquirendi libido, ut argumenti ad historiam spectantis notitia in dies plus illustretur. Itaque ut augeatur ipsa, & eluceat historia, (si forte unquam omnibus absoluta numeris futura sit) necessarium, aut perquam utile judicavi naturalis salivæ artificium, ejusque morborum causas, qua fieri poterit diligentia mea, non inani, ut spero conatu, ad trutinam prius revocare.

Inconsultius facere ratus sum, si proprietates, & salivæ usus constituerem, antequam ejusdem qualitates, & affectiones sub examen vocarem, quod ultimo allatum, ut concipiam modo, satis ducor enumerandas eas esse maxime generales affectiones coactionum, quæ ex diversis materiæ particulis in ejusdemque salivæ naturalia corpora abeunt. Atque ea propter operæ pretium fore existimo affectionum causas inquirere, antequam saliva ad ejusdem naturam solertius indagandam me alliciat.

Salivæ corpus itaque fluidum esse videtur eo in primis, quod consistat ex particulis,

quæ dum se invicem in exiguis componentium corpusculorum superficieculis lubricis, atque levibus tangunt, inter se invicem reptatum promovent: hinc inde agitatæ juxta suas superficies adeo volvuntur, ut sui motus momento se diffundentes, aquæ ad instar libere quaquaversum ferantur. Et sane non negandum orbicularem molecularum figuram ad corporum fluiditatem plurimum conferre; Interim vero cæteræ dantur qualitates salivæ, quæ diversas particulas arguere videntur, varie admodum, & aliquando irregulariter figuratas, dummodo ingredientibus partes in corpuscula satis exilia dividantur, atque ad eam levitatem, & volubilitatem redigantur, ut ob molem suam fluidorum corporum particulis liber inter se ipsas motus non intercipiatur; proindeque sint non tantum volubiles, sed actu motæ, ut corpus fluidum reddatur, non quidem solo aggregato talium corpusculorum, quæ spherica sunt, aut alia regulari forma prædita, verum sola duntaxat vehementi & varia particularum illud componentium agitatione. Quæ quoniam tactis corporibus adhærescunt, vel saltem partibus quibusdam turgent, quæ molecularum congruitate, ad particularum, quos tangunt, corporum poros relata, firma adhæensione per superficiem corporis labentes humilitatem impingunt, fluidus, & humectans liquor dici merentur. Si vero notionem humiditatis hætenus explicatam sequamur, supererit adhuc unum quid, quod circa naturam fluiditatis nos instruit; id vero est discrimen, quod fluido corpori, & humectanti liquori intercedit, quæ cum in multis conveniunt, confundi perperam solent: cum omnis humectans liquor sit fluidus, non tamen quodve corpus fluidum humectet. Aër enim, æther, & ipsa flamma corpora fluida vocantur, atque nitrum fusionem passum verus liquor est, hæc tamen corpora ea, quæ tangunt non mafaciunt; ex hoc deduco salivam aqueis corpusculis hac illac motis abundare, quibus exterior corporum superficies guttulis ipsius liquidis irrorari tota conspicitur. Si externi aëris contactu partes exiguum salivæ corporum in novum motum cieantur, quo volubilia illa corpora reciprocam ipsorum adhæensionem impediunt, in ratiorem seriem disponantur, & in aliud adhæensionis genus, & partium complicationem ob quandam viscositatem mutantur, ut in suarum superficierum lateribus se invicem tangant,

B b b 2

faci-

facile in tenues illas membranas, quas bul-las appellamus, contexuntur, adeo ut per crebras evolutiones, quas aer inter eas invicem partes ciet, sibi mutuo ita applicentur, ut super suas invicem superficies labantur, tandemque ob superficierum congruitatem in aëliori partium contactu mox evanescant. Qua ratione numerosæ declinantes superficies salivæ in multitudine parvulorum in convexo sphaericorum, adeo contrahuntur in convexo plana aquæ superficie, ut superficiales earundem particulæ nullis cavitatibus repletæ, aut sulcis divisæ plurimum lucis refrangant, ob quam radiorum lucis refractionem diaphanæ apparent, in quas vicissim aëre subtiliori, & radiis solis coniectis, pellucidum satis corpus deprehenditur. Verum quamvis minimæ hujusce liquoris particulæ sibi invicem commisceantur: tamen aliorum corporum particulas facile admittunt, & cum duobus, vel pluribus junctæ non refugiant misceri absque fluidæ molis incremento, inter ipsas parvula inania intercedent, adeoque sub magna mole parva materies ita coalescit, ut corpus leve constituat. Præter aqueas partes leniter juxta se invicem labentes adiunt moleculæ in saliva viscidiusculæ, quæ in illius substantia natantes coitum, & unionem quasi moliantur: unde ob irregularem agiliam illius partium vagationem hac illac incessanter dilabentium, & ob crassiusculas ejusdem moleculas aliarum celerem, & intestinum motum ægre ferentes, si non compacti, lenti corporis saltem naturam æmulantur; & cum salium ramenta sint in aqueis moleculis ad minima soluta, & intime commixta, insipidi corporis succus saliva deprehenditur.

Saliva igitur cum sit corpus humido aqueum-tenuè pellucidum, lento-fluidum, insipidum distinguitur a pancreatis succo, qui humor tenuis aquæ fontanæ ad instar offenditur; cujus qualitates gustu perceptibiles juxta experimenta, & observationes Listeri, D. de Graaf, & Verheyenii salsoacidæ plerumque attinguntur. Hinc differt pariter saliva a lymphæ, utpote humor saliva tenuior, cum sit plane aquosus. Unde a salivæ commercio maxime excluditur crassum illud viscidumque liquamen, quod a tonsillis, vel tussiendo, vel screando exprimitur, quodque extra orbitam sanguinis secretum in cavitatibus glandularum, palati, faucium, & narium abundantius accumulatur, ubi ab aëris perenni affluxu

subtilioribus particulis, magisque mobilibus dicti humoris abreptis, crassior, magisque tenax portio relinquitur. Hic viscidus humor in narium cavernulis obductis membrana crassa vasculis sanguiferis densissime referta, pluribusque obsita glandulis jugiter transudat; delatus ille per ramos arteriarum carotidum membranæ insertos ad glandulas omnes, a quibus cum recensita membrana suos processus extendat ad os cribrosum, & cuneiforme, atque illorum cavitates undique cingat, potest per cavitatem sphaenoidis in fauces descendere, & a glandulis in nares copiosius emitti: cum membrana, quæ nares obducit, crassior sit, magisque glandulosa, adeoque abundantiori humoris separationi magis apta. Hujus mucici pars magis aquea confertim extillat a punctis lacrymalibus, quorum ductus aperto orificio ad os turbinosum nasi exonerantur.

ARTICULUS II.

De causa materiali salivæ.

Cum igitur existimem salivam esse chylis liquorem, ingenue fateor, quod dubito; at cum magis solícite opiner, ut majorem rationem reddam, cur modo non acquiescam in asserentibus a sero oriri salivam, nec in aliis docentibus a lymphæ; faciet illud fortassis ad hanc meam opinionem excusandam, si in virorum diversimode sentientium congressu liber detur philosophandi locus. Ut itaque libere loquar, quæ sentio, videtur mihi salivam generari potius a chylo, quam a sero, vel lymphæ succo chyloso restaurata. Quod fortasse elucet ex animalium duorum, vel trium dierum inedia, quo temporis spatio nullus salivæ affluxus in glandulas confluit, in sanguinem non irrepente chyloso latice, non deficientibus interea in massa sanguinis, imo seroso aqueis plurimum auctis particulis. Quod si sanguis fame extinctorum spontanea analysi oculis subjiciatur, ostendet quidem partem gelatinoso nutritiam, & fibrosam sanguinis in auras evolasse, & consumptam; sed aqueo-serosa pars in ratione quantitatis crassamento sanguinis quasi æqualis erit: quare multiplicata causa salivam fovente, in ductus glandularum confluat necesse esset salivæ humor, qui tamen in fame confectis, arescentibus glandularum folliculis omnino evanescit. Quippe serum sangu-

guinis, & globuli sunt veteres, atque agre dissipabiles humores, qui a principio vitæ sanguinem conficientes usque ad ultimum senium vix mutationem suscipiunt, humorum itaque materia non sunt attritæ ferri particulæ, & immutabilia fluida, sed sanguis chylo saturatus, qui simplici contactu sanguini commixtus universas glandularum, & viscerum lacunas alluens, sensim in vasa excretoria impellitur, & peculiaribus suis officinis accomodatur. Sanctioriana statica huic assertioni applicata, dum mensuram evacuationum exhibet, illam miris modis illustrat; inquit enim diligentissimus Sanctorius: *Non qualibet hora corpus eodem modo perspirat, quia ab absumpto cibo quinque horis circiter libram ex magna parte exhalare solet, a quinta ad duodecimam tres libras circiter: a duodecima ad decimam sextam vix libram.* Unde maximum chyli dispendium fit, cum totus chylus in sanguine recipitur, minima a duodecima ad decimam sextam, quia parum chyli remanet dissipandum; at hyberno tempore quoniam hebetatur transpiratio, adeoque insensibilis dissipatio chyli per poros cutis, augetur salivæ affluxus ad glandulas; igitur chylus est immediata causa salivæ. Nec dicatur cum Dimerbrokio, chylum virtute quadam peculiari cor ingressum subito, ac vehementer rarefieri, ut in eo instanti vertatur in sanguinem, cum chylus eo diu cum sanguine circumferatur, ita ut tandem sub eadem chyli forma extra sanguinis orbitam extrudatur. Chylus in sanguine recenter cibato diligenter a Listero observatus, & ad multos dies custoditus ferè licet ab ipso pluries commixtus non potuit adhaerere, nec ut serum concrefcere, sed tanquam oleum ex aqua emerit; *Sanguis, inquit, ex vena cujusdam viri missus ad libram, ex toto albus instar lactis inventus est, ad hebdomadas integer mansit, nec fractus ut lac, nec in superficie florem, aut membranam habuit, aut acridinem contraxit, tandem in ampulla vitrea diu servatus putredine resolutus est.* Sic in anse saginato animadvertit Steno succum nutritium in orbe sanguinis diu permanere chylum. *In anse autem ad plures dies largo pastu saginato super ejus sanguinem missum rubentem, & in fundo vitri concretum candidus chylus fluitabas absque ulla aquosi feri indicio.* Hæc auctor; unde chylus dum in orbe sanguinis toties, & ad tot horas circumfertur, sua integritate conservatur, donec tandem in salivam con-

fectus transmitti possit. Deinde cogites. velim cum Listero, quanta sit sanguinis in iætero cum flavo colore affinitas, idest serum, a quo alluentes humores bile infecti conficiuntur, tamen saliva nullo virore lutescens a naturali colore non destitit; porro quæ ab aqueo-serosa sanguinis parte ad glandulas continuo ruentia, & rapide discurrentia facilius in uberes excretiones falescunt, cum flavescente sero flavescent.

Verum enim vero ejusdem salivæ principia examinatus, nescio an fas mihi sit suspicionibus meis indulgere, ut cum aliqua certitudine gradus, & status salium determinantur; quod ut dubiis fiat satis, cum multo majorem deposcat experimentorum laborem, quam nunc mihi vacat, invitat me ad analyticam Chymicorum diligentiam per ignem salivæ principia eruentium, rimandam.

Hæc enim immissa retortæ vitreæ non agre ostendit leni igne commota aquei vaporis prædominium, qui in auras per retortam ascendens, vel per alembicum expulsus, ab ignis calore diffusus, in fine vasis non coit, & insipido aqueum liquorem pressus unitus exhibet. Aucto exinde igniculorum gradu sequitur liquor tenuis, & magis spirituosus, qui est sal volatile in fluorem spiritus evectum, & oleo volatili intime associatum, quod inertem, & viscidam massam in fundo vasis relinquit; ex cujus calce, ac lixivio sal fixum educitur, terrestrioribus remanentibus particulis, caput mortuum nuncupatis; ut inde si qualia in mixto miscibilia existunt, educeret ignis, saliva partibus aqueis magis saturata sulphureo-salinis, terreisque particulis tantum coalesceret, in qua aqueæ moleculæ super alias prædominio potiuntur, & minima salium ramenta, oleosa, & terrestria corpuscula æqualibus mutuo nisibus, licet quantitate, ac mole non æqualia, invicem irretiuntur.

Varii generis salium particulas continere salivam, acidas nimirum, salino-oleosas, insipidas deprehendet, qui maturitate consilii, constanti probata experientia a veritatis scopo minime aberrat, dum investigandam solertius ipsius naturam sibi proponit cum clarissimo Nuchio ab observationibus naturam petente in cap. sialographiæ, post earundem levem inter se commotionem cum alkalinis, cum acidis, tum spirituosus liquoribus salivalem laticem associari percipiet.

Paulo

Paulo vero examinata, atque perpensa maxima illius dissolvendi vi duriorē quoque corporum compagem coalescat oportet activioribus salium principiis, salinis nimirum, sulphureis, urinosi, volatilibus, aquoso latice dilutis, quæ si Chymicis Paracelso, Ludovico de Comitibus, Helmontio, Basilio Valentino sit præstanda fides, comparantur liquori, alcha est, qui corpora in minima, seu prima entia resolvit, & ex eo liquore de universali menstruo participante, acidum, cui par in natura rerum difficile invenitur, solvens elicitur, quod licet insipidum videatur, mire penetrans ita contactu suo ferrum corrodit, massam triticeam fermentat, tincturam Heliotropii rubeo colore tingit: ut obvium sit concipere, salium quoque acidorum prædominium. Farina triticea cum aqua communi subacta in massam redigitur ponderosam, instar luti viscidam: saporis ingrati: Sin saliva inter subigendum adhibeatur, massa protinus effervescent mole intumescit. Salis enim, ac sulphurum portiones in farinæ massa subsidentes ita viscosa humiditate obruuntur, ut se invicem non exagitant. Dum vero acidæ salivæ particulæ in salia, ac sulphura impingunt, eadem in motum concitant: hinc aliæ ab aliorum motu exagitate longa subactione totam massam pensantes, partes terreo viscidas attenuant, & subriliant, adeoque tumultuantes farinaceæ moleculæ incallescunt, & fermentationis motum suscipiunt.

At si compressis corporibus, & inertibus stimulum addit, summe mobilibus frænum imponit, eaque coercet, ut in hydrargyro longe patet. Quotiescunque igitur salivæ spicula salina acina acidorum rigida, & acuta vi suæ gravitatis, & figuræ subeunt mercurii infinita interstitia, exorta a solidis exilibus, & partibus sphericis in puncto contactus se invicem attingentibus, earundem positionem, & in contactu directionis nisum dimovent, atque cunei vim in sphaeroideas partes exercendo illas exaquant; sit ut pessundata globorum figura, & positione contactuum, diversæ resultent oblongæ, & ramosæ, ex quorum ad mutuos sui, arcuosque amplexus dispositorum unione motus ipsius hydrargyri obtunditur, & in corpus veluti fixum resultat. Quod si permirum forte tibi videri possit, salivam cunei vim exercere in mercurii particulas, cogites velim ab earundem ramositate, & figura, moleculas sibi mutuo irre-

tiri posse, ut difficillime sese extricare queant: quo a ratione minime alienus videbor, si hoc rite perpendens suspicabor, ob salinas salivæ moleculas opportuna sui interpositione mercurii partes in crassiora longe corpuscula redactas secundum latiores suarum superficierum portiones sese contingere, quæ tangentia corpuscula varie huc, illuc, hac, illac volutata ad totalem divisionem, aut divulsionem minus saltem, dum apta redduntur, post varios occursum, & recursus, superficies ob latitudinem, & figurarum congruitatem ad cohesionem mutuam ununtur, quæ ubi semel hunc in modum coheserint, majoris contactus secundum superficierum, proportionem rationem habebunt; quorum coalescentium corpusculorum partes, cum a gravitate aëris premantur, urgeanturque, nec a vi ætheris intus ut prius agitentur, mutuo sibi adeo adherent, ut licet specificæ gravitatis proportionabiliter minores sint, ex grandioribus quidem ob molis suæ crassitudinem corpusculis constant, quibus major superficierum scabrities eas adeo adunat, ut totali divisioni resistent, donec intensior ignis, aut vehementior agitatio hanc mutuam partium cohesionem dissolvat.

Quoniam saliva cum solutione mercurii sublimati, & Jovis mixta ceruleum colorem ad album tendentem acquirit, ut idem prorsus efficit aqua fortis, inducitur clarissimus Balgivi, ut credat salivam continere in se sal nitro salinum universali analogum, quo potenter sublimati chrysallos penetrando eosdem fundit, ac exolvit: sed hic non desinit actio salium salivali liquori inhaerentium; nam non minus dissolvendo sulphura instar alkalium, quam in modum aquæ salia aliquando illum dices cum Taury, Helmontio, & chymicis menstruum universale, cum quibus si aliorum auctorum effata circa materialia principia salivæ in unum cadere fas sit, ex omni genere salium conflatum, quod intra reclusos corporum meatus, omniumque alimentorum poros coercitum, valeat omnes resistentias, & partium cohesionem tollere, quæ aquoso tantum menstruo reluctarentur.

Statuto salino principio per stultorum æque, ac sapientium magistræ experientiam, tandem sapere disco, & serio iterum cum Dolæo, Sylvio, Delbene, & aliis in saliva multum aquæ, parum spiritus volatilis, & minimum salis lixiviosi cum olei, spiritusque acidi tantillo mixti, temperati-

que

que considero, a quibus non discrepantibus Balgivio, & Guglielmini nitro-tartareas moleculas in recessu constitutas ulterius addo, ex quo licet plures salium particulae in salivali fluido innatantes mixtura una coeant, salina tamen corpuscula ita intra semet complures exiguas aquae particulas intercipiunt, ut proportio salium ad aquam sit minima. Hinc a varia utrinque corpusculorum allisione inter sese mutuo molant, atteruntque, ut in tam exiguas comminutae particulas, in tam tenuia latera, angulosque adeo levi acumine donatos ab aqueis linguam humectantibus dissolutae, ita agitari possunt, ut licet pluribus salibus referta ob summam exilitatem in ipsos organi poros insinuando sese angulorum acuminibus, membranosas partes juxta variam salinorum miscibilium figuram, & molem varie, leniterque titillent. Haec enim mixtura a salibus diversi generis in aqueoserosis moleculis intime dissolutis conflata nullum saporem habet, ut intra nexus corpusculorum sapidorum excepta diversas saporum percipiendas sensationes gustus organo exhibeat, quo medio sapidorum demulcedine, suavisque saporis substantia oblinitis, & asperioribus salibus collisus, mollis texturam, ingrati que saporis impressionem comprehendit.

ARTICULUS III.

De causa efficiente salivae.

IN tenebris latitabant lymphae ductus ob subtilitatem aciem oculorum eludentes, quousque benignioris aurae assilatu contigit summo Anatomicorum Bartholino, adeo tam lynceo, ac manu adeo agili orbi erudito illos patefacere; at primo intuitu ignorata eorundem mechanica structura ob tenuem substantiam araneorum telas amulantem, sancirum fuit, vehi lympham a corde, tanquam a centro per lymphaticos canales ad partium circumferentiam, cui errori quamplurimi ignixi salivam emanare a rorifero quodam succo per lymphatica vasa ad glandulas trajecto, commenti sunt; sed Billii dogmate de hoc motu lymphae a Ruyschio exploso, ipsique valvulas pertinacissime neganti ad oculos demonstrante, quae ubique geminae, & semilunares situ suo impediunt, ne lympham per eorum meatus ad glandulas excurrat, canuit hoc apud homines commentum. Anatomicorum di-

ligentia per cultum adeo Anathomies culmen pertingit, ut infudandum non sit perstandi viarum ambages salivalem ductum, cum haec vasa cuicumque in Anathome initiato sese manifeste declarent. Fluit saliva a diversis glandulis, tanquam totidem rivulis in oris cavum, quae indiscriminatim, & varie implantantur. Primi generis sunt glandulae buccarum, & labiorum, quorum ductus excretorii intervenientibus fibrillis a membrana buccas succingente emanantibus arctius conglomerantur, quibus in superficie tunicae compressis humor salivalis in os exprimitur. Addit his Steno sublinguales, ad utraque ligamenti latera linguae sitas, quorum excretorii canales ab exiguis radicibus enascentes haud in truncum coalescunt, sed tractu parallelo a lingua versus gingivas tendentes ad digiti transversum fere a dentibus distantiam ostiis exilissimis in oris tunicam exonerantur; accuratior nihilominus Gasp. Barthol. investigatio ostendit, vasa haec non a sublingualibus, sed ab aliis glandulis, illisque aditis germinare; a sublingualibus vero ductus binos enasci, qui in ductum communem coalescentes prope ductus Vvartoniani ostium in os hiant. Hinc occurrunt palatinae, quarum glandulosa productio mediantibus exilissimis, & innumeris excretoriis ductibus palati tunicam perforat, & quasi cribosam reddit in postica parte palati occurrentibus. Accedunt tonsillae in faucium extremitate sitae, quarum sinus ex canaliculis minoribus coeuntes in os hiant, quibus annumerantur uvula, columella, & gurgulio. Quae vero extra os, sunt parotides conglomeratae circa auricularum radicem implantatae, quarum excretoria ex pluribus glandulis, & ramusculis in unum coeuntia oblique descendunt, & osculo satis amplo prope labrum inferius terminantur. Adjungitur glandula maxillaris interna sita interius sub maxilla inferiori, cujus ductus musculos ossis hyoidis ingreditur, & desinit prope dentes incisores inferiores inter gingivas. His subnectitur ductus salivalis a Nuchyo divulgatus, qui ex glandulis in orbita oculi ex pluribus furculis in unum truncum coalescentibus emergit, & non procul a Stenonis ductus ostio recte descendendo super os maxillare in os dehiscit. Infinitae aliae extant glandulae in toto palato per compressionem conspicuae, quas hic recensere operis pretium non est.

Qua lege salivalis humor per recensita vasculorum excretoria in os eructetur, rest est

est summæ opinionum controversia exagitata, sed nondum fortasse juxta naturæ leges explicata. Ut res hæc secretionis dignitate amplissima, explicatuque difficillime a minus incerta hypothese sibi ex necessario ordine succedenti deducatur, animus est spectare oculis externam, internamque glandularum habitudinem, mihiq; constitui occasionem ultro obvenientem arripere, ut illa saltem indicarem, quæ a peritis rerum Anatomicis intelliguntur, quæque earum existimatores explicantes, in glandularum structura penitus fidem meam extorquent. Ruyschius in prodromo suo thesauri Anatomici sexti opinatus est, cui consentit Heisterus cum Verheyenio, glandulam esse congeriem vasculorum, arteriarum, venarum, & nervorum inter se certo ordine circonvolutorum, cum ductu excretorio conflata, e quorum extremitatibus, lateribusque alia minima vasa ortum ducunt, quæ inter se implicantur, intexunturque, ut explicatis pluribus ramusculis in glandulosum corpus efformentur. Hæc vasa tandem infinitis revolutionibus invicem coalescunt, quæ secretoria nuncupavit, quæque omnia una cum nervo peculiari membrana induuntur, ut secundum positionem dictorum vasorum membrana ipsa accomodetur, ne vasa dimoveantur a debito situ ad humoris secretionem necessario. Dicta vasa secretoria in unum truncum coalescentia excretorium vas efformant. Diligentissimus enim Anatomicus docet illud esse mere vasculosum, quod glandulosum ab Anatomicis nuncupatur, tali experimento innixus, videlicet particulam corticalem cerebri accepit, quam postea capillo suspendit in aqua modice calida, digitis illam cerebri corticalem particulam sursum deorsumve dimovens, donec laxatis inter se vasculis conspicerentur filamentorum ad instar. Quapropter juxta Ruyschium glandulosum corpus nil aliud est, nisi vasculorum congeries, quorum ramorum series glandulæ fabricam indigitantium fuit clarissimo Stenonio ante Ruyschium indicata. Malpigijs vero in sua epistola ad societatem Anglicanam de glandularum structura differens statuit glandulas conglobatas vesiculares esse, annuens dictas glandulas cavitatem membranofam manifeste habere. Unde tam in humano corpore, quam in diversis brutorum corporibus periculum faciens, glandulosum corpus simplici membrana compingi testatur, intra cujus cavitatem reatis ad instar

vasa sanguinea vagantur, quæ cum non parva nervorum ramificatione glandularum structuram efformante contorquentur, revolvunturque, a quibus vasculorum convolutionibus glandulæ cavitatem efformantibus aliorum canalium ramusculi hiant, ex quibus demum canaliculis apte in unicum spatium confluentibus deducit Malpigijs, glandulam nil aliud esse, quam vesiculam quandam membranaceam, intra cujus cavitatem vasa sanguifera reticulari modo una cum nervis locantur. Vesicula hæc glandularis fibris carneis confita est, quæ postea horizontaliter ipsam penetrant, tandemque cum sanguiferis vasis, nervorumve filamentis amiciuntur, ut surculi varie contexti in debita crispatione, & necessario tono detineantur. Cavitatem in dictis glandulis vesicularibus præmissa prius harum partium maceratione se vidisse testatur ipse Malpigijs, & præcipue in glandulis præternaturaliter constitutis, quam plures vidit glutinoso humore, & interdum tartarea materia repletam; ex hoc statuit provenire diversum glandularum colorem, ex diverso humore in ipsis glandulosis cavitatibus stagnante, quod confirmat se secus vidisse in sanis corporibus, ac in cadaveribus præcipue hydrope correptis; inde diversitatem coloris in glandulis minime arguere diversam glandularum substantiam, sed ex humoris diversa natura in ipsis glandulis morantis potius oriri ratus est. Bellinus autem naturæ forsitan exigente necessitate putavit, formari glandulam posse, si a summo ramo arteriarum, vel etiam a quacunque parte ramorum aut trunci deducatur canaliculus non conicus, nec emissens ramos, sed cylindricus vel advo-lutus in spiram, vel plicatus in plicas, tum etiam neque intortus, nec plicatus, sed extensus, per quam, sive plicatus sit, & intortus, sive explicatus, & directus, sit ejusdem amplitudinis, & sine ramis, at demum abeat in canalem ampliorem cum vena continuum. Insuper influat per ejus longitudinem sanguis de more, & ex universa interna superficie canalıs originem ducant canaliculi alii hiantes in cavitatem ejusdem canalıs, quales ab interna superficie intestinorum originem ducunt vena lactea hiantes in cavitatem eorundem; & quemadmodum hæc per totam longitudinem intestinorum feruntur ad exteriora, & intra intestinum per mesenterium ducantur, quo usque confluent omne in unicum alveum lumbarem; Ita canaliculi illi hiantes in cavitatem arterie intortæ extra membranas ejus
feruntur.

feruntur per pelliculam aliquam aque, & ipsa, & canalem, ex quo derivantur, apte liget, & sistat, & in communem aliquam cavitatem deducat. Hoc glandularum artificium per Bellinum totum consistit in quodam textu arteriarum, qui circa singulas quasque glandulas admirabili revolutione sibi millies occurrenti invenitur, prodigioso quodam modo implicatum, & veluti reticulatum, opus constituens, quod innumeris filamentis in modum retis confutum post infinitos fibrarum intersecationum occurfus in glandulas læcessit.

Ego tandem opinarer cum Ruyschio, & Bellino, glandulas esse vasculorum complicationem, certo ordine dispositorum, quarum reticulares contextus sint plexus canaliculorum sanguinem vehentium, sed ita coordinatorum, ut sanguis post superatis plexibus retiformis, antequam infinitis ramulis corpus glandulæ penetret, dividatur in tenuissimos canaliculos, a quibus protuberant oscula secernentia in infusus glandulæ cavohiantia, qui postea inflectuntur, & demum curvatura superata sese contorquentes in venarum ramulosos fasci majores abeunt. Fateor enim circa glandularum structuram, earumque excretorium ductum non adeo datum esse labores impendi, & ita obscure petat cultro Anatomico via in dissecandis glandulis, ut minime negotio adiges, si cultris utaris; unde sciendi infortunio inter partes nostri corporis glandulæ tantum cultri Anatomici dexteritatem eludere videntur. Interim vero minime perterito illarum præparationem mihi licuit maceratione cum diligentissimo rei Anatomicæ Amico, quasi ad finem usque rem perducere: at nec ipsa certioribus factis alicujus tincturæ immisione per vasa arteriosa obvium nobis fuit aliquid de earum structura percipere. Reposito autem pancreate in aqua per plures dies, illud maceravimus, postea deducta ipsius peculiari succingenti membrana, iterum in novam aquam reposuimus, quod tandem intra aquam agitavimus, & postea bacillo ligneo supra tabulam ipsum percussimus, donec intra aquam denuo agitatum perpulchre oculis exhibuerit tot filamenta varia contorta, quot obtutum effugere potuere. Simili ritu periculum fecimus de pancreate aselli, nimirum de glandula illa magna, quæ in mesenterii canini centro tantum reperitur. Hæc glandula elegantiori spectaculo suo innumera filamenta patefecit, non secus ac testium fibrillarum con-

toriones, quapropter suspicatus glandulas compingi ex vasculorum congerie, a qua dicta filamenta ortum ducunt, instituta denuo glandularum Anathome ulterius indagando animus fuit, arteriæ progressum in corpore glanduloso expiscari, & per quantum datum fuit observare, arteria in plurimos ramulos scindebatur per totum glandulosum corpus simul cum nervo, qui majori largitate se expandebat in infinitos ramulos, donec oculorum aciem prorsus eluderet. Vena pari incessu vagabatur sicut & arteria, e cujus lateribus infiniti furculi exoriebantur, qui vario modo, & ordine invicem contorquebantur, donec amplius minime licuit observare, an dicta filamenta sint vasa distincta ab arteriis, & venis, an arteria ipsa degeneraverit in tot illa filamenta, quæ jucunda admiratione spectabantur. Attamen suspicor, facillime arteriam in filamenta degenerasse, ut penitus ab arteria ipsa in infinitos ramulos divisa illa filamenta tubulosa extenderetur, vel a lateribus vasis arteriosi profiscerentur, a quibus filamentis tot efformantur arteriolæ tam exigui diametri, & ita tenuis, ut insipientes oculos effugiant. Igitur a vasis arteriosis filamenta illa, sive arteriolæ enascuntur, a quibus variis circumvolutionibus corpus glandulosum compingitur, nimirum arteria primo scinditur in plurimos ramulos cum nervo comite, vena, inde ab arteriosis ramulis filamenta illa minima protuberant, quæ post varias revolutiones in alia vasa minima degenerantia secretoria vasa efformant, e quorum inde coalitu commune secretorium sulcitur. At minus est, quomodo filamenta locentur, quem ordinem servant in eorum circumvolutionibus, quo itinere nervus per dicta filamenta se explicet; decussantur enim invicem in suis flexionibus, & nervus semper arteriam comitatur in ingressum glandulosi corporis, & in primis arteriosis divisionibus ingreditur, ultra quam partium exilitatem minime licet oculo intueri.

De hujus filamentis vasculosi contemplatione, ut certior fierem, in arterias meseraicas per aliquot dies maceratas croceam tincturam injeci, & statim illa, quæ filamenta nuncupavi, flavo calore tingi conspiciebantur, quod fieri non potuisse videtur, si filamenta illa ob arteriæ meseraicarum ramulos tinctura inflatos non flavescendo turgent: ex qua eleganti meditatione faciter cogor filamenta illa ab arteriis enas-

scientia totum quasi glandulosum corpus formare. Hæc omnia fideliter observata Ruyschianis experimentis maxime conveniunt. Quantum ad ea, quæ spectant ad observata Malpighii, timeo clarissimum virum in lapsum humanitatis incidisse, scilicet intra vesiculam membranaceam vasa retis ad instar locari quidem, annuentem; at id quod vesiculosum nuncupavit Malpighius, membranam, vasa, & filamenta intelligerem; cavitatem vero & interstitia ab ipso Malpighio observata, suspicor ipsa glandularum inania præternaturaliter, seu morbose fuisse constituta; ex quo cum Pitcarnio deduco, inter arteriam evanescentem, & nascentem venam, nullum intercedere spatium, quod possit aut pro partium poris, aut pro glandula haberi, nec interjacet glandula media inter venam, arteriamque, orificiis, aut poris, figura diversis instructa: sed glandula illa secretionibus dicata, est pars eorum canalium qui nervum, venam, arteriamque efformat; idcirco ab arteriarum ostiis oscula venarum protuberant cum arteriis continuata, quarum venarum surculi arteriæ flexu versus cor replicatæ videntur.

Investigatis instrumentis, in quibus elaboratur animalium secretio, excogitandum est naturæ artificium, quo illa utitur, ut secernibiles humores a sanguinis consortio extricentur. Steno salivæ a sanguine secretionem explicaturus, fingit venarum contractionem glandulis inhaerentium a nervis hac ratione datis, ut in constrictis venis sanguinis motu moram trahente serosior ejus pars in glandulas transcolaretur. At hanc mechanices disciplinam non curans, aut contemnens doctissimus vir curiosam investigationis ideam, nullæ tamen nisi fallor demonstrationi innixam pensavit, cujus ingeniosissima opinio illis placuisse videtur, quibus explicandi ratio juxta mechanicæ leges non arrisit. Si attendatur cum Borello venam arteriæ comitem esse duplo majorem secundum diametri dimensionem, concipietur fieri oportere, ut a nervis non possint ita coarctari oscula venarum, ut evadant arteriarum diametro minora; unde influat necesse est, dato impetus momento sanguis per ora venarum non tanto obice restrictionis contrahente, ut retro urgeatur. Immo si arteria cum comite vena sit continuatus canal, ut demonstrant cum Pitcarnio ingeniosissimi Anathomici, fieri non posset, ut nervorum si-

lamentata per venarum tunicam distributa continuatis fibrillis per arteriam non dispergantur (si septum aliquod inter finientem arteriam, & incipientem venam non intercedat, quod secet fibras arteriarum in longitudinem extensas) quibus brevioribus factis, & in contractione detinentibus venam, simul arteria constringitur, quo vel nulla sit secretio, vel minime hac ratione major.

Alii, ut facilius ineant negotium, fermentum in glandulis intus hærens salivales humores elaborans somniarunt. Nomine fermenti hinc intelligitur motus intestinus particularum mixti, quæ propria vi motiva in motum concitæ, vel alterius corporis advenientis impetu rotatæ sese mire exagitant, ex quarum mutua turbinatione subtiles, & minus inertes sese quaquaversum explicant, quæque tamen a crassioribus implicitæ usque adeo detinentur, donec crassiores partes a subtiliorum nisi plurimum subactæ, singulæque ad gradum exaltationis eventæ dissolutionem, alterationem compleant. Hanc actionem fermentativam clarissimi viri mordicus defendunt in glandulis operantem, & ut facilius in tutam semitam incederent, cuicunque glandulæ peculiarem liquorem ingenitum assignant, qui in animali primo nascente in diversas glandulas fertur, insitæque vi ratione suæ congruentiæ jugiter in iisdem glandulis permanens sanguinis partes per has glandularum angustias delatas confestim immutat in suæ indolis fluidum, quam opinionem convellere oportet, atque aliam in re rationem, si theoreticam secretionis per se nobilem, & philiatricis necessariam ab objectis conjecturis, fædæque hypotheseos inconstantia vindicare exoptamus. Actio fermentativa si in homine detur potest quidem motu illo intestino, remota particularum coherencia, mutatisque gradibus nissum diversum coherendi modum producere in mixtis, partiumque heterogenearum unionem dissolvere, ita ut corporum minima componentia non nisi in simplici contactu se tangant; at tamen hoc pacto fluidorum subactæ particulæ, ut deferant contactum aliarum molecularum, quæ secernendæ non sunt, ut in unum coeant, (cum in fluidorum natura non ita facilis cogitanda sit attractio, ac electrica vis) nova causa diversa a succo fermentativo requiritur, quæ esse non potest, nisi determinatus impetus sanguinis, & gravitas specifica fluidorum cum solidorum viribus, & conquis proportionata, a quorum

mutua

mutua vigoratione ab invicem rotatz particulæ separari possunt. Non exigui sunt momenti, quæ Borellus de motu animalium contra hanc fermentativam secretionem adducit. Quoniam sanguinis moles non coalescit ex indivisibilibus, sed molecularis quantis figura diversis, oportet, ut ex intestino mixti motu & vertiginosis motionibus agitatæ, atque contrariis rotationibus concussæ ebulliant, rarefiant molecule ipsius mixti, tuque loco cedant advenientibus particulis, & motu contrario rotatz accurrant ad replenda loca ab exeuntibus relicta, qui vertiginosus motus ebullitionis, commotionis, & expansionis in fluidis fieri nequeunt, nisi aliæ particulæ super alias excurrant, quod certe natura, licet subtiliter agat, in minimis, & subtilissimis arteriolarum filamentis in circinos glandulosos convolutis, fieri non posse videtur. Quare absolum est sub rapido, & celeri motu, quo sanguinis massa per fistulas glandulosas propellitur, ejusdem moleculas ab insito glandularum fermento subreptas ebullire, atque rarefieri.

Concesso hoc fermento urget Mechanicorum decus Bellini. Si unaquæque solutio fieret per peculiare fermentum suum, hoc ipsum fermentum vel repararetur ab aliquo liquido animali, vel non: si ab aliquo liquido, cum a se ipso reparari non potest, indigeat oportet alio fermento, & hoc ipsum altero usque in infinitum: si vero non reparatur ab aliquo fluido, erit igitur insitum momento generationis in aura seminali contentum, quod cum per totum vitæ spatium absumi non potest, erit per illud tempus ingenerabile, incorruptibile; sed alteruter fermentum glandulis peculiare, uti in læsis secretionibus sæpe videre est, cum a se ipso in naturale fermentum restitui non possit, ab alio reparandum erit, & hoc ipsum ab alio reficiendum: Ecce infinitas fermentorum. Si vero per totum vitæ spatium alterari non potest, antequam moriatur animal, nunquam vitiabitur perluentium humorum secretio, quorum immutabilitatem observatio præctica redarguit.

Verum qui hanc de fermentis hypothesin amplexi sunt, ultra quod in circulationem sanguinis blaterant, cum ab insito glandularum liquore sanguis præterfluens aliam induat naturam, coguntur re ipsa profiteri, corpora fluida in contactum nitentia, sibi que coherentia in alium abire compositum non posse, nisi mutetur par-

tium se invicem involventium coherendi modus, ut a primo contactu removeantur, vel in prima positione oblique vel perpendiculariter posita per directiones suorum motuum non sistantur, ex quibus demum fit, ut (nisi in contactum determinati gradus, & determinata positione particularum in lineis suarum directionum plurimum mutata) dicendum sit, cohesionem primam eorum corporum in aliam cohesionem a prioris cohesionis vi diversam abiisse: Nam eorum directiones sunt ab invicem variatæ, nec ipsa corpora persistunt ad contactum in ipsum primo nitentia, non solum per lineas motus, eodem modo, ac primo ad invicem positas urgentia. Quoties igitur liquidum immutandum erit in aliud liquidum fermentum, ut cohesionis vis mutetur, debet directionum motus, & nisus in contactum imminuere, vel augere, nec poterunt partes coherentes momentum suæ cohesionis mutare, nisi præsto sit corpus fermenti, quod intime sese partibus in contactum nitentibus, & inter se coherentibus immiscendo, easdem a linea suæ directionis, a gradibus nisum in contactum urgentibus, atque a contactu primo dimoveat, ut in majorem, aut validiorem quocunque modo diversam cohesionem illas urgeat; quod cum requiratur admixtio fermenti in particulas fluidi, per illa vascula se rapientis, nisi determinetur a diversis solidorum, & pressionum momentis a circumpositis fibrillis in motum constitutis, fermentatæ moleculæ eodem directionis motu in glandulas fissi, itaut in ipsas particulas allidens mutuo cum impetu facultas non sit major illarum momento non poterunt licet in fermenti naturam mutatz in glandulis sequestrari.

Quod si sufficiant solidorum impulsus, & diversæ circumpositarum fibrillarum pressionem, ut cohesionem particularum occurrentium mutentur, qui sit, ut tanquam necessarium constituatur ad animalium separationem fermentum? sufficere autem ad cohesionem partium removendam suadet facultas, illa, qua mutuo invicem coherent miscibilia, quæ licet contranitens cordis impulsui, solidorum oscillis, fibrarum circumprimementum connisu, cum tamen sit minor illorum momento; non poterit in eadem positione, & contactu fluidi corpuscula detinere.

Ut evidentius ratio mechanica pateat, qua cohesionis mutationi, & contactus re-

motioni facultatem illam contranitentem viribus impellentibus, & atterentibus resistentem ab iisdem superari ostenditur, inquirenda est causa illius resistentiæ, quæ a corde superatur, cuius vis motiva musculi cordis juxta celeberrimi viri Borelli calculum, cum superet suo momento resistentiam totius sanguinis arteriarum, & fasciarum earundem dilatationem impediendum, non solum major est vi ponderis 1800. librarum, sed ejus absoluta vis musculum constringens, in quo a fibris cordis quasi ad mutuam contactum devenientibus compressa fluida ad minima dividuntur, atterunturque, ad totalem vim, qua sanguis in arteriis expulsionem resistit, eandem proportionem habet, quam unitas ad sexaginta; cujus demonstrationis calculus, licet non evidenti demonstratione ostendatur: tamen si mensurentur resistentiarum aggregata, quæ sanguis patitur, dum fluit per angustissima capillamenta gracilescantium canalium, in quibus nulla fere pars contenti liquidi est, quæ non perveniat ad usque contactum superficie canalis, quæque per brevissimum canalis vectem dimoventur cum majori resistentia, quæ crescit, tum quia liquidum fluens per angustiores canales plures contactus invenit, cum, ut constat ex Geometricis, superficies minoris canalis major sit, quam superficies majoris pro ratione molium, tum quia sanguis fertur per mille flexiones varias canalium, qui illic texuntur in rete, hinc in spiram circumvoluti incurvantur, mirisque modis implicantur, in quorum singulis flexionibus novam semper patitur resistentiam, exerat cor oportet tot vires in singulis contractionibus suis, quot sufficiunt ad superandum insignem resistentiarum cumulum, quæ cum iisdem arteriis contranitentibus sanguini a vi cordis superentur, dum sanguis per exilitatem, & ramificationem vasculorum supra omnes resistentias a cordis contractione truditur, facilius, me allicio, quanquam tædii, ac laboris impatiens, magis diligentia, atque aliorum industria, quam mea instructus, ad internam cordis fabricam perpendendam, quod perinde est, ac naturam, & vires causarum, quæ ventriculorum contractionem producant, ad examen revocare: in quorum constrictionibus cum actio cordis tota consistat, sufficiat ventriculorum nisus considerare, qui, dum contrahuntur, sanguinem eorum constrictione prementes, partem eorum motus ipsi communicant, ob

quam impressionis, & motus communicationem sanguis movetur, urgeturque in circulum. Impressionis igitur motus integris cordis viribus debetur, quæ ventriculorum viribus separatim sumptis debent esse æquales: ut ventriculi sinistri vires, ni fallor, ut inquit M. Furin in Bibliotheca Anglica Gallico idiomate conscripta, vim ponderis novem librarum æquant, illæ dexteri sex, igitur integræ cordis vires minores non erunt vi ponderis 15. m. librarum; igitur sanguis, licet non propellatur, & urgeatur a vi juxta Borellianum calculum determinata, movebitur tamen a vi 15. libras æquante, qua pressionibus cordis subijcitur, & a vivido fibrarum suarum elatere ad partes propellitur.

At quoniam cordis vis, quæ determinata est, nequit impetum illum sanguini imprimere, quo ipse sanguis superare omnino possit tot implicatorum vasculorum resistentias, per quas canalium circumvolutiones perpetuo fluit, refluitque; nisi præsto essent aliæ facultates motrices, quæ novum supra fluidas particulas momentum exercerent. Proinde in cordis subsidium omnes fibræ ut parvi vectes systaltico motu & pressionibus liquida in gyrum pellunt, & ulterius urgent; ab hoc igitur tum solidorum tum fluidorum impulsu, & connisu poterit cohesionis vis immutari, aut nisus particularum in cohesionem nitentium plane tolli, etsi non admittatur imaginarium, atque commentitium chymicorum fermentum.

Verum quum dubio, & infirmo fundamento innitatur quisquis fermentis hisce sudultus secretionis opificium enucleare satagit, concipitur a sanguine in motum agilia fermentatione non posse. Quod autem sanguis a fermentatione non moveatur, ex eo evincit, quod spiritus ardentes in distillatione non exhibet, acres quidem, & urinosos, sed oleotos, atque ardentes omnino nullos. A solo itaque ævis elatere, & spirituum animalium irradiatione cor excitatum in circularem motum cum pulsu arteriarum sanguinem exprimit: at non intestino motu ebullitionis, & effervescentiæ illum exagitat, si nomine ebullitionis non intelligimus motum illum, quo sanguis ab axe ad latera, a parietibus alifus ad axem vasorum repellitur, ut fusque deque in vertiginem agatur, quæ sane ejus incallescenciæ, atque ebullitio, si intra vasculorum ductus ob fermentationem excitaretur, ab incisa vena protinus emicaret.

Quod

Quod si sulphur inesse aliquod sanguini innuas, ut unum ejus fermentationis principium, cujus particulae sulphureae indefinenter in corde accensae totius vitae nostrae curriculo effervescentias remonent, utque in tenuissimum spiritum dissolutae cum aliis liquoribus exaltentur, aliqua febrili inflammatione, ubi sanguis ex toto accenditur, enormiter exaltatae, immo ab ista conflagratione in undequaque gliscentem flammam adactae, si per biduum pabulum nutritium huic flammæ deficeret, cum quod semel fermentavit, fermentationis motum non ineat amplius, deberent sponte quiescere, quod cum non contigat, dubietatem fermentorum prorsus demonstrat, & eorundem utilitatem pulchre convellit.

Explosa ut minus rationi consona fermentorum hypothese in medium producta, nec illa vetus scholarum sententia, qua glandulae per facultatem attratricem secretionem a sanguine promovent, vel per electricam vim humores separant, admitti potest per saniozem philosophandi rationem; nam sanguis a partibus non attrahitur, sed vi cordis contractili, & vasorum resilitione compressus ad partes propellitur.

Pitcarnius vero, cui nec chymicorum fermentum, nec mechanicorum cribrum arripit, sed mechanica magis, & Geometriae nuper recepta conformior explicandi ratio, secernendum liquorem a sanguinis consortio, hac arte contra cribratores directa determinatam in glandulis exposcentes figuram expedire conatur, quae fere tota in hoc sita videtur, quod si fluidum vi impetus gravitatem ipsius fluidi superans in cavitatem tubi adigatur elastici, & facile cedentis, orificium ipsius tubi in circulum abeat: cum impetus fluidi aequali vi per lineas longitudinis tubi, & ad latera ipsius perpendiculares expellat parietes ad aequalia undique a dato axis puncto intervalla, quae aequale impetus momentum sustinendo paria evadunt. Si fluidum magna vi, hoc est fluidi gravitatem multum superante in cavitatem tubi adigatur, manifesta ratione evincitur, & multiplici experientia confirmatur, motui tubi in longitudinem conjungi semper impetum in tubi latera perpendicularem, qui ipsa ab axe motus undique nititur extrorsum propellere, idque vi aequali: quia nulla fingi potest ratio, quare major esse versus unam partem, minor versus alias nisi quae a partium fluidi gravitate peteretur, quam nullius momenti assumpsimus praemagnitudine alte-

rius vis fluidum impellentis; & si latera sint flexilia, elastica, & facile cedentia, tum fieri non potest, quin effectus suos consequatur impetus, expellatque latera ad aequalia undique a dato axis puncto intervalla, eaque tantae longitudinis, ut diductorum laterum tensio, & elasticitas subsistendo impetus momentum, jam pares evaserint: quo casu quam primum induisset figuram tubus, & postmodum in aliam mutabitur, cujus sectiones omnes ad axem perpendiculares necessario erunt circuli majoris vel minoris diametri, pro majori, vel minori fluidi impetu, laterumque majori, vel minore flexilitate in diversis tubi locis. Tales vero flexiles tubi sunt vasa corporis animalis universa, per quae cordis machina fluida omnia propellit ea vi, quae propulsorum gravitatem longe superat. Haec Pitcarnius. Cum igitur sphaera sola sit inter figuras solidas quae datum orificium pertransit quolibet situ ad illud delata, & solus circulus sit inter figuras planas, qui admittit cujuscunque figurae corpus, dummodo diameter corporis non sit major diametro circuli, deducit, fluida, quae separanda sunt, nullam deposcere figuram sibi propriam, & constantem, cum glandulae circulares ex se cuicunque figurae secernendae accomodentur, dummodo vires cordis impellentes ad occursum suum orificii ad cohesionem partium fluentium tollat. Expendamus modo ingeniosissimum quidem tanti viri ratiocinium. Quoniam impetus fluidi in aliqua cavitate contenti, ad hoc ut ab ipsa axe aequali vi undique nitatur extrorsum propellere tubi latera, exigit, ut motus fluidi, quo impellitur per longitudinem tubi, aequet impetum ad tubi latera perpendicularem, qui impetus ab axe ad parietes tubi perpendicularis aequalis esse non poterit motui tubi in longitudinem, quotiescunque motui fluidi in longitudinem opponuntur, & hiant ductus aperti (quos Pitcarnius in demonstratione non supposuit) qui fluido concepta vi in cavitatem tubi adacto egressum cedant, sit, ut adempta plenitudine, & totali inflatione ipsius tubi, impetus fluidi ad latera nitentis eludant; ex quo colligitur in glandulis nullum fieri a sanguine impetum, ut diducantur latera eorundem in circulum aequali motus rectae vel obliquae directionis momento. Cum fluidum in cavitatem glandularum propulsum transeat per diametrum orificii non majorem diametro canalibus excretorii, non erit majoris molis, quam quod pote-

poterit per ductus illos eliminari. Verum licet corpus glandulæ, ejusque orificium extrinsecis distractilibus, & facile cedentibus fibris coalescat, ut possit, si cæteris datis, in circulum abire: Nihilominus tamen minus si ductus excretorii oscula non conniveant, aut oblitterentur, glandula non migrabit in sphaeram, cum pressio liquidorum ad latera minor sit quam eorundem nifus recta incedens, nec sanguinis impetus infringatur ab hiantibus ductuum excretoriorum oris in glandularum corpore sitis, ut illius immixta rectæ directionis velocitate ad parietes augeatur impetus, non fiet, ut æquali nifu diductilia latera undequaque premantur a secernendo liquido, quod sese prius ejaculare conatur linea recta ad perpendicularum per tuborum oscula aperta, antequam ab axe angulos rectos momentum in glandulæ parietes æquales exercent. Igitur ab impetu sanguinis ipsius gravitatem superante nulla in glandulis figura sphaerica evincitur. Ut autem in dubium non revocetur ostensio propositionis, sufficit, aciem intendere oscula glandularum hiare, nec hiare solum postquam fluidum fecit impetum, sed hiare ipso momento temporis quo fluidum impellit. Hinc licet nifus villorum osculi glandulosi nullo contrapondio impeditus sit continuus ad contractionem, & nisi extendatur a fluidis currentibus, aut in eo contentis, ob pressionem cujuscunque liquidi ad contactum suarum fibrarum carnearum excurrentium perpetuo ad contractionem tendat: tamen fluidorum motus omnino directus a perpetua solidorum oscillatione, dum urgendo extendit fibras cavitatis glandulosæ, & in illas æquale momentum impulsionis exerit, quia æquales resistentias non invenit, in fibras minus contranitentes, quæ sunt illæ orificii glandulosi, primo in easdem propagatur ejusdem impetus, qui cum in illas propagari non possit, nisi dilatetur osculi, sit ut simul, & semel ab eodem urgente fluido extendatur cavitatis glandulæ, & excretorii ductus osculum, antequam diductilia latera eodem nifu urgeantur, quæ cum premi non possint ab eodem impetu, primo aperietur excretorii ductus orificium; & licet non aperiat ipso momento temporis quo fluidum impellit, aperiat saltem, antequam colligatur ille impetus in parietes, qui illos in circulum abire cogat. Partes minus resistentes esse fibras orificii excretorii in cavitatis glandulosæ, ex eo patet, quod non solum a minimis fluidi guttulis,

cunei vices gerentibus, & sese insinuantibus inter spatia orificii nullo fibrarum nexu firmata, ab illarum pressione ita urgentur, ut sustinere illam percussionem non possint: sed etiam quia opposita, & se invicem agentia latera orificii nullis fasciarum fibrillis, ut cæteræ cavitatis glandulosæ fibræ, irretiuntur, quæ pluribus fibrarum ordinibus, & fasciculis compinguntur.

Urget tamen Pitcarnius, si corpus recipiendum sit orificio minus, & intra illud possit accommodari, adeo ut omnes sectiones per plana orificio parallela sint minores orificio dato, tum non hoc solum corpus, sed infinita alia cujuscunque figuræ orificium illud poterunt subire; & quamvis maximam corporis sectionem similem ponamus, & æqualem figuræ orificii dati, quia tamen diversissima corpora eandem secta nascuntur figuram, per idem orificium diversissima poterunt transire corpora, sive per idem vas secernens diversissime derivari secretiones. At nonne sagacissimus Auctor exclusis quibuscunque determinatis figuris sphaeram admittit? & tamen secretiones plures, & longe diversas per idem orificium celebrari non sinit. Sic inquit: Per idem orificium circulare transit non tantum sphaera, cujus sectiones similes sunt æquales circulo orificii, sed conus & cylindrus super æquali basi, & per idem orificium transibit, & pyramis, & prisma, & conus, quorum sectiones maxime per plana orificio parallela sunt triangula æqualia, & similia triangulo datum orificium comprehendenti. Ex quo deduco cum annularis cylindrus solus sit inter figuras, quæ admittit cujuscunque figuræ corpus quomodocunque situm, modo corporis maxima diameter non sit major diametro annularis cylindri, multo plurimas, & longe maximas necessario fieri satendum erit, quam si glandula determinatæ figuræ admitteretur, quod est contra artificium subtilissimi Pitcarnii. Unde licet conus, & cylindrus in æquali basi per sphaeram possit transire, non transibit tamen fortasse, si simplici contactu in cæteras particulas non nitatur, & in minima divisus ut ad secretionis opus requisita velocitate polleat.

Quoniam minima solida diversimode inter se complicata, & motu intestino agglomerata fluidum constituunt, hæc ipsa juxta molem, gravitatem, figuram & cohesionis momentum vibrationem suscipiunt. Si v. gr. supponamus in eodem fluido particulas corporeas non omnino dissociatas, sed concate-

catenatas inter se, sive propter varias figuras sese mutuis amplexibus tenentes, sive quia anguli unius corpusculi inter cavitates alterius insinuat non possunt libere vagari, ita ut concipi debeant veluti vestes, qui ab una parte impelluntur a premente, ex altera retardantur a resistentia, quæ contrario nisu resistit impulsui ipsius prementis, tunc quidem particula illæ in spatio fluido actione contraria adhesionis retardata, prementis viribus impulsæ impetus a premente impressos successive retardant; & hoc pendet ex lentore, quo colliguntur prædicta corpora atque resistentibus viribus, quæ imminuendo vim ipsius prementis particulas a contactu non dimovent, & prædictas machinulas a secretionem divertunt. Quia vero corpus idem suscipiens pro diversa situatione ejus diversimode impulsui illato resistit, fit ut actio percussiva varietur pro diversitate resistentiæ & situs variatione procreata; & hæc est secunda causa, a qua impetus energia ipsius percutientis, & resistentia corporis diversificatur.

Si postea impetus gradum impressorum inæqualibus corporibus ab eodem corpore percutiente, & ejusdem viribus mensurentur, erunt quidem eorum velocitates quodammodo proportionales magnitudinibus corporum impulsorum: sed corpora illa inæqualia, quæ impelluntur ab æqualibus viribus motivis inæquali velocitate movebuntur, & velocitates illæ duorum corporum inæqualium eandem proportionem habebunt, quam unum corpus habet ad aliud in ratione gravitatis, & molis. Hinc evidens est, cum corpus fluidum varie contextum diversisque particulis combinatum transferatur a virtute communicata, & propagata a projiciente, dum modo per medium fluidi ab impulsu fertur, modo revolvitur horizontali vertigine circa suum centrum, modo particula centrifugæ excurrunt contra directionem motus ejusdem fluidi non posse æqualiter impelli, ut æquales sustineat impetus, sed longe diversas minimorum solidorum solutiones subire, ut in plurimis particulis sit minime divisum, alias simplici tangens contactu revolvatur; & hæc est prior ratio, quæ ope determinati motus secretionis leges observat; sed ajunt canalis omnis suo liquido plenus cum contrahatur a facultate posita ad contactum laterum omnium nitente intra contentum liquidum, exercent sua momenta in cana-

les animalium villis circularibus in superficie eorundem canalium dispositis, contextos, qui villi circulares æque distantes canalium orificiis contrahuntur per illam ipsam aream circuli, ad cujus circumferentiam ponuntur, erunt non solum momentorum æqualium, sed series globorum liquida componentium, dum per canalia fluunt, cum æquo nisu villos canalium contractiles impellant, & in ejusmodi circuli diametros æqualiter nitantur, canaliculi illi in conicos, aut cylindricos abibunt, quorum coni, aut cylindri in circinos circumvoluti erunt glandulae circularis diametri. At licet momenta facultatum contrahentium canales omnes in genere sint æqualia, seu villi contractiles æque crassi, & dispositi per veram circumferentiam circumlorum in fluidum æque nitantur, & liquida solum æque premant incredibile est, quantum hæc communiter admissa in prodigiosis glandularum productionibus a veritate distent. Artificium naturæ, quo illa utitur ad glandulas producendas subtiliori fortasse mechanica fulcitur.

In summis arteriis protractio cylindrica glandularum inflexa in spiram, & intexta in reticulare opus est filamentorum glomer, quæ flexionibus variis in quas hi iidem rami veniunt, per corpora glandularum implicantur in textus inexplicabiles, eorundemque spiræ ob inexplicabilem illam diversitatem positionum innumerabilibus ramorum ramis ad usque ultimas, quæ universam arteriarum ramificationem texentem glandulas, constituunt, invicem decussantur, implicanturque in mille anfractus ita rotata arteriola, ut filum earundem, quod successive glandulae advolvitur, non veniat in eundem locum cum filo jam advoluto, sed ipsum fecet in decussim. In hac apta superimpositione filamentorum, & spiræ arteriolarum ad se invicem inde decussim positæ, atque diversimode se secantibus mirabili artificio villi contractiles advoluti superficie in mutuum contactum nitentes contrahuntur premendo in puncto contactus superficiem canaliculi inferioris conici, aut cylindrici. Ex horum mutua canalium positione, & nisu directione fit, ut cum momentum, & pressio superincumbentis vasculi non sit minus momento inferioris resistentis, superficies vasculorum conica, aut cylindrica quasi in planam decussata abire cogatur, adeoque fit ut eorundem villi contracti per plana, ut notum est ex Geometri-

triciis, tangencia planum immissarii glandularum non constituent verum circulare orificium, tam affabre contextum, ut tota glandula in arteriolarum ramis evadat in figuram exacte sphaericam.

Recensita aliorum sententia, & sphaerarum figurarum in glandulis necessitate, eaque in dubium revocata, nullas tamen aequabiles, & constantes inter pororum diversitates, vasorumque orientium in animalis contextu esse figuras. Orificia glandularum non solum majoris, vel minoris diametri ratione inter se differre, sed figuris diversis ita efformari, & compingi, ut a diversa fluidorum pressione, a diverso solidorum renitu possint ita distrahi, ita comprimi, restringi, dilatari, convelli, ut si non omnes figuras amulentur, saltem cuicumque figuræ accedant: quapropter fas sit dicere in separatione fluidorum aliquam proportionem filtri cum fluidis requiri, & vires cordis propellentes cum aliqua ad orificia glandularum pressione, quæ superent ad occursum osculorum cohaesionem partium fluentium, quod expeditur determinata sanguinis velocitate, quibus omnibus mechanicorum dissidia dirimuntur, ita ut nec cum Borello, & Porisistis, nec cum Pitcarnio in integrum litigium habeatur.

Quoniam sanguinem componunt minimæ solidorum moleculæ diversimode inter se contextæ, certisque miscibilibus præditæ, ideoque noxu, ac gravitate distinctæ, ab eadem vi cordis impressa minima illa fluidi componentia diversum velocitatis gradum, ut superius ostendimus, suscipiant oportet, quo fit ut a concepto impetu ex fibris contractilibus cordis, vasorumque compressione sanguinis moleculæ, mutatis positionum directionibus, vel arcto corporum contactu relicto per arteriarum conica, vel cylindrica canalicula fluant, & per ipsa ad glandulas salivales delatæ, dummodo diameter maxima particularum fluidi separabilis non sit major diametro orificii, in obvia glandularum oscula separabuntur. Exigunt tamen, ut sint in minima divisæ juxta Borellum, Pitcarnium, & nuper virum maxime doctum Michellottum, quæ non tenaci nexu, sed simplici contactu uniantur, ita ut una qualibet earum possit agitari, fluere, circumvolvi, aliter motis lateralibus, alio enim modo salvati non posset facilitas illa, qua fluidi partes levitet coherentes, & non determinato impetu allisæ superare possunt orificiorum resistentias, & inter diductos

poros sese intrudere; quarum solutiores partes ab axe arteriarum per latera vasorum discurrentes, & non separandas partes simplici contactu tangentes, si arterioli occurrerint glandularum latera nitendo oblique contranitentia, ipsarumque molecularum impetus non erit minor orificiorum viribus, nec major, ut tempus, licet indefinite parvum habeat (ad liquorem enim in aliqua glandula separandum sejunctionis tempus, licet indefinite parvum, requiritur) in orificia vasorum impingent, & in hiantia oscula intrudentur.

Quodcumque fluidum in arteriis præstans a sanguine separandum ab ipso fluido abscedere non poterit in ductus glandularum secretorios, si sanguinis fluentis velocitas ad ipsas glandulas talis, ac tanti momenti non erit, ut possit glutinamentis associatas moleculas dividere, & partium implicatarum nexum laxare, atque imminuere. Mutuis visibus igitur sanguinis rotatis particulis, & vertiginosis motionibus agitata a variis pressionis, & lationis momenti fiet, ut sanguinis solutæ moleculæ modo a pressione fluidorum ad latera vasorum impingentes, modo a lateribus repullæ per axem revolvantur: hinc a tergo superveniente impetu propulsæ, eundem semper directionis visum, & impetus gradum habere non poterunt. Ubi autem canaliculum arteriolum conicum, aut cylindricum Bellini plicatum in plicas, vel in longitudinem extensum, fluidum separandum impinget, atque sufficienter vasorum orificia impellendo extendet, apertis osculis applicabitur.

Quod autem quæcumque sanguinis velocitas velocissime currentis, aut pigre arterias transfluentis non sit sufficiens ad separationem, non modo se dilatantibus, verum se contrahentibus vasculis, ea ducor ratione, quod corpora diversæ gravitatis vi æquali pressionis impulsæ sæpissime velocitates, atque directiones inter se diversas suscipiunt, & conservant. Sic observo, dum globulos plumbeos, vel grana frumenti diversæ gravitatis, ac molis manu projicio, licet gravibus motus imprimatur æqualis quantum ad projicientis vires, in eis tamen velocitatem, & impetum primum non conservari, sed alia recta incedunt, alia oblique vagantur, alia velocius moveri, alia tardius cursu rapi prospiciuntur, servata tamen eorum velocitate reciproce proportionali magnitudinibus, gravitati corporum impulsorum.

rum. Hinc sicut impetus projicientis diffunditur in allata corpora, & communicatur projectis, ita eadem in diversis gravitate, ac mole sanguinis moleculis ratione imminuitur, vel augetur. Sanguis igitur cum non uniformis sit, sed constet ex particulis diversimode figuratis, (corpus enim fluidum, simulque continuo fluens, licet in omni puncto diversibile, componitur ex partillis terminatis, & quantis) & quamquam infinite parvis, & tamen mole, figura, & partium cohesione diversis, ut dubitandum non sit, plures fluidorum proprietates, ac naturas pendere a diverso coherendi modo, a structura, configuratione, ac motu molecularum sanguinem componentium; ita ut particulæ aquam componentes hac ratione similes inter se sint, atque diversæ ab eis, quæ oleum componunt; harum infinita miscibilia partium parvitate maxima potentia diverso gradu velocitatis instructa, & diverso nisu, & causis in projectis corporibus impellentibus aquali impetu inæqualiter operantibus glandulas alunt, quorum velocitatis momenta debent commenturari corpusculis sanguinis gravitate diversis, & inæqualiter ictui cordis & solidorum oscillis resistentibus.

Sanguinis igitur moleculæ per axem arteriarum fluentes illas partes resistentes non ostendent, quibus allabentes vasorum latera occurrunt. Arteriarum tunica quarta interior tenuissima fibrillis in longum protensis villos annulares tunicæ præcedentis ad rectos angulos secantibus, contextitur; Hujus fibrillæ non possunt ita concatenari, ut internam superficiem scabram, & parietes vasorum inæqualiter lævigatos non constituent; adeoque sanguis particulis collateralibus retentus non poterit excurrere, & extricari, quin miris in modis per plana horizontalia, vel inclinata variis ictibus flectatur, indeque circumvolutus minimarum asperitatum confractionibus ita impeditur, ut ictus illatus particulis sanguinis in latera nitentibus a corde, & impellentium corporum impressa velocitas ratione contactus excurrentis projecti impetum retardantis debilitetur; quod evincitur non solum in liquidis fluentibus extra animalium canalia, sed etiam in liquidis per ipsa animalium vascula fluentibus, quæ dum fluunt per canales in linea, quæ maxime distat a canali superficie, majori velocitate rapiuntur, quam si fluerent per lineam, quæ magis accedit ad eandem superficiem, in qua

Sydenham Opera Med. Tom. II.

plures adesse possunt causæ, per quas eadem liquida inæqualibus motibus agitantur in partibus suis. Ex hac inæquali agitatione fit, ut eadem partes sanguinis nunquam semper sistantur ad contactum, in aliam lineam abeuntes mutant positionem in centris suis, excitanturque proinde non solum in diversam motus directionem, sed deflectentes a laterum contactu majori momento agantur. Unde inæqualitas illa momentorum a positione seriei globorum liquida constituentium consurgit, ex quo fit, ut eadem partes nunquam certo loco sistantur ad certum semper contactum; ob quam motus inæqualitatem, positionem variam, & vim liquidum perductum ad immixtum, si ita dispositum sit, ut partes ejus anteriores in latera truantur, nitetur quaquaversum in superficiem ejus internam, & in ipsum emissarium incidet oblique, & separabitur.

Sint ulterius particulæ corporeæ aliæ coherentes, aliæ sese tangentes ut acervus arenæ, (si lubet mere fluidum cum fluidis, & humidis comparere) quæ diversis resistendi modis vim impulsivam projicientis a tergo urgentis imminuunt, eamque retardant. Resistentia quæ primis refertur, pendet ex glutinosis fibris, quibus implicantur prædicta corpora, atque vis divisioni resistens est illa, quæ retardationem infert velocitati ipsius projecti; posteriores vero si sint talis figuræ, ac levitatis, ut possit una earum inter alias excurrere, & contorqueri, tunc quidem propulsæ insinuantur inter alia, & exercentes actionem cunei in alias particulas resistentes insinuantur, quæ non solum impetum projecti retardare non possunt sed resistentias particularum superius expositarum continenter imminuunt. Fit igitur retardatio tardius, aut citius, prout plures resistendi modi in sanguine concurrunt, quæ resistentia constat ex innumeris peculiaribus retardatiunculis una post alteram confectis, a quibus omnibus contraria reactione, ac repulso, vis & energia ictus, & impetus enervatur.

Ex hoc diu perpendens cum doctissimo viro Michelloto, quod ut fluidum separatur, debet esse divisum in partes, quæ non habeant rationem majoris inæqualitatis ad minimam osculorum officii diametrum, & quod hæ partium divisiones se in puncto contactus tangentium oriantur ex mutua fluidorum collusione, se invicem atterentium, & compressivo solidorum conatu,

D d d

col

colligo, quod hæc partium solutio debet imminuta fluidorum attritione, & solidorum nisu, & cum hæc omnia debilitentur, vel augeantur debilitato, vel aucto motu, patet in debilitato motu, vel aucto imminui, vel augeri liquidorum secretiones: igitur non quæcunque velocitas ad quamcunque naturalem separationem fluidorum, sed determinata requiritur.

Corpora insuper, quæ separanda sunt, non solum nitantur invicem in aliorum contactum, sed ipsa se contangant cum nisu, ut repugnent remotioni ab eodem contactu; cum illa determinata positione contactus persistant corpora in eadem cohesione vi, quorum corporum coherentium directiones a mutua obliqua, vel in directum posita, aut perpendiculari situatione non avertentur, quousque illa corpora eodem nisu in contactum, eodemque directionis momento in eandem positionem nitentia, in eadem cohesione persistent. Mutatis igitur gradibus nisu, & variatis positionibus directionum, atque corporibus a contactu cum nisu urgente remotis, non solum mutabitur directio nisu, & gradus motuum, verum cohesione vis plurimum mutabitur, cujus simplex in contactu coherentium modus necessarius est ad perficiendum artificium secretionis. Machina aut hujus operationis a mutuo nisu in contactum coherentes fluidi moleculas removens, & impedimenta illa arripientis ob quæ in canalibus a separatione prohibentur, est impulsus liquidorum in solida, & solidorum nisu, & renisu in fluida, ex quibus omnibus fit demum in textibus reticularium arteriarum sanguinis solutio maxima, ob quam colligatæ particule ab eadem cohesione ita divelluntur, ut sanguis, superatis plexibus retiformis, non solum conservata solutione, quam subit intra cordis ventriculos, & pulmones per totam canalium longitudinem, vasculorum ambagem, & contorsiones ad usque plexus retiformes, verum eadem solutione in eisdem plexibus plurimum aucta glandulas facile ingrediatur.

Cum autem multa particularum cohesione vis, & unio a parietibus cordis allisa, pulmonum pressione concussa, & solidorum viribus, & oscilli, distractis vinculis in minutissimas moleculas dividatur, poterunt mutuis contactibus diversæ particule uniri, & varia filtra pro diversa indole, ac modificatione, quam situs, positura, ordo, & particularum combinatio permittit, separa-

ri; unde cum cor semper eodem gradu nisu, & solida quæque non nitantur in fluida, cohesio illarum partium ob diversum imperus momentum excurrentibus miscilibus impressum ab occurrentibus resistentiis plurimum modificabitur, a quibus simul sumptis immediate dependet sanguinis solutio major, vel minor. Hinc si minuetur solidorum impetus, & vires, augebitur nisu partium in contactum, unde sanguis non solum in eadem cohesione persistet, verum in majorem, & validiorem unionem promovebitur, & hoc subito fiet, si vis illa, qua coherent partes, sit momenti majoris, quam momentum solidorum attritionum. Posita autem cohesione vi, & plurimum promota, cum ad separationem requiratur simplex cohesione contactus, evidens est, vel nullam, vel tenuem admodum fieri secretionem. Ex hoc deducitur, ad quamcunque separationem non sufficere quamcunque sanguinis velocitatem: quia potest dari ille gradus velocitatis in sanguine, qui non solum sufficiat ad particularum cohesione divellendam, verum talis gradus nisu, qui easdem in contactus majores cogat, quo simul velocitatis gradu retardato validior sanguinis coherentia promoveatur.

Cum igitur, ut offendit insignis Bellini proposit. 20. de motu cordis, facultates contrahentes moventur, canales figuram mutant ea ratione, quam secum fert proportio velocitatum, quibus eadem facultates intracanallem moventur, & proportio illa velocitatum pendet a momentis, quibus facultates instructæ sunt, & cum momenta in canalibus pendeant a crassitie villorum, a quibus facultates illæ constituuntur, facile intelligis, quo momento contractionis opus est ad hujusmodi velocitatem acquirendam in hac, aut illa arteriarum parte, quo inde addisces, qua crassitie villorum opus fuerit, ut tale habeatur contractionis momentum, quod cum determinetur a diversa villorum crassitie, non solum inæqualis habebitur directio motus, tum solutio sanguinis major, vel minor, sed tum figura in glandulis plurimum mutabitur ea ratione, quam secum fert proportio velocitatum fluidorum, & positio solidorum, eorundemque contorsio, & resistentia. Quapropter sanguis cum juxta majorem, vel minorem divisionem ortam a connisu solidorum & reactione fluidorum particulas conglutinatas dissociante, & mentes atterente, majori, vel mi-

minori in glandulas impingat velocitate, fit ut diverso gradu velocitatis instructus per varia viscerum filtra præterfluens congruis vasorum separantium orificiis fluidorum impetum recipientibus apponatur, hinc inde a pressione particularum a tergo urgentium impulsus in dispersis viscerum glandulis substantias deponit; & quoniam ab impetu primo sanguini a corde impresso, ejusdem molecularum velocitas, atque solutio debilitatur non solum a proportionali arteriarum afferentium, & venarum deferentium resistentia, verum occursum resistentium varietate, nimirum ab arteriæ spiræ, & cono, a mole corporum fluentium, pondere, & elatere comprimentium impeditur, promovereturque; ideo per totas animalis lacunas, & viscera sagax natura disposuit filtra, ut disfluentium molecularum impetum, & diversas fluidorum solutiones sibi proportionales reciperent. Hinc quamcunque sanguinis glandulas percurrentis velocitatem ad secretionem animalim sufficere redarguunt partes secernendæ, quæ debent esse actu divisæ in minima, ut se tangant simplici contactu: repugnat enim sanguinis separandas moleculas esse actu divisas, & simplici se tangere contactu, nisi admittatur illa velocitas, qua continuatæ partes dissocientur, quæ debet esse directe quodammodo proportionalis illarum cohesioni.

Quis inquam est mentis tam præjudicata, quod quotidie non videat ab accelerata, vel imminuta sanguinis velocitate accelerari, vel imminui liquidorum separationem? si quæcunque sanguinis velocitas ad quamcunque humorum separationem sufficeret sine ulla prorsus figuræ diversitate, explicari non posse videtur, quomodo producatür icterus absque filtri separantis injuria, quem sane vidit Sylvius cap. de Ictero a spiritu volarili, potuque generosiori absque ductus biliarii obstructione productum. Bilis enim a spirituum copia in fluorem nimis eversa ob sui motus accelerationem in acinis hepatis glandulosis minime coercita, ad vascula majoris resistentiæ, & sui motus impulsui proportionali defertur, in quorum conis, & spiris refofo impetu, & corporum elatere comprimentium imminuta motus acceleratione ad cutanea loculamenta inficienda sibi viam sternit.

Sic quando sanguis præter rationem tardius currit, tardius quoque procedit evacuatio. In puerperis observante, Baglivio, superveniente febre ardente lochiorum fluxus

supprimitur, eodemque febris incendio lac evanescit in mammis, reditque remisso calore febris. Igitur cum Pitcarnio, laudato Michelloto a Borello, & cribratoribus Mechanicis glandularum orificia datæ figuræ corpus tantum recipientia admittentibus dissentior, quoniam omnis glandula ex tunice contractilibus, & distractilibus, & facile cedentibus machinulis coalescit: quibus non sufficientibus requiruntur mutati velocitatis gradus, acceleratæ, vel retardatæ percussione impetus, qui a corde sanguinis miscilibus impressus, juxta molecularum ad motum resistentiam, quæ a corporum cohesione, vel gravitate dependet, augetur, vel imminuitur. Attamen quid curiosi, quid mirabilis natura parit in crassis, tenuibusque liquidis separandis sollicitè inquirentes ingeniosissimi viri ultimam in hac re mechanicam eruere non poterunt. Nec mirum si in re tam ardua, tam difficili in dubium manebit, ut Lucretius, quod latet; Ultimæ enim rerum differentia ob datorum defectum ad Mechanicæ doctrinæ leges, methodosque adduci nequeunt.

ARTICULUS IV.

De usu Salivæ.

SI nulli rei destinaretur salivæ latex ab arterioso sanguine per glandulas in os, & œsophagum eructatus, inanis foret naturæ usus glandularum illa productio a tota cavitate palati erumpentium: quapropter cognitis salivæ ductibus, & opificio secretionis perpenso, usus ejusdem in œconomia animali eruendus est. Qui enim glandularum secernendæ salivæ, maxillarum nempe, parotidum, tonsillarum, tyroidearum, buccarum, platarum, & œsophagæarum numerum, e quibus maxima salivæ copia continuo separatur, serio perpenderit, atque ab eis in ventriculum indefinenter exonerari serio considerans, plurimi momenti esse salivalem humorem a provida natura multis usibus destinatum, animadvertet. Hic enim triturationem alimentorum in ore faciliat, eorundem deglutitionem promovel, sapidam a cibus tincturam elicit, qua sensus gustus determinatus, fauces, & œsophagum humectat, sitim nimiam compescit, ad vocis prolationem aptiorem reddit linguam, ab ejusdem cum alimentis in ventriculo admixtione inchoatur eorundem dissolutio ad chyli elaborationem ordinata.

D d d 3

Sali-

Salivale menstruum quosdam a veritate alienos in tantam sui admirationem rapuit, ut solvens mineralibus inde sibi promiserint, & materiam universam, in ipso tamen deliramento decepti, quæritarent; horum quamvis figmentis minime subscribam, activitatem tamen illius laticis evincit elicitus sapor ex alimentis momento tantillum in ore volutatis, cujus miscella eorundem liquefactio, atque dissolutio inchoatur. Dum cibus incisioribus, & caninis diffringitur, in minutas partes subdividitur, qui molaribus commissus, & hinc inde motu linguæ jactatus, undequaque ab effluente saliva irrigatur. Mirari quis desinat, separationem salium tunc contingere, qui ab aqueis salivæ particulis eliquati vi suæ gravitatis, & penetrationis vim cunei exercentes in membranam nervorum apices obducentem, papillarumque copulas efformantem pluribus foraminulis perviam impingunt, & motu linguæ vario undique impulsu, aërisque vi elastica perpendiculariter, & lateraliter, rotati in nerveas linguæ papillas adiguntur, quarum siphunculi linguæ implantati, & apice suo erecti angustissimis osculis occurrunt salibus, qui in nervorum surculis intimius illapsi, aut per organum gustatricis potentia confestim repentes cuspidulis suis ita titillant, certumque motum directionibus suis nervis gustatoriis imprimunt, ut modo constringendo, modo laxando, modo pungendo determinata undulatione afficiantur in nervis contenti spiritus, de quibus motibus anima compos ideam suavis, vel ingrati saporis efformat. Hic salivæ actio non definit, sed ut per continuam dentium collisionem, mutuamque attritionem chyli rudimenta evolvantur, opus erat menstruo aqueo salino, quod per contractionem musculorum temporalium, & massæterum potissimum in actu masticationis, compressis glandulis, jugiter in os conflueret, quousque salinis moleculis plurimo aëre refertis, & gravitate nativis subeundo alimentorum vincula, eorundem nexus, coherentesque particulas vi sui elateris exagitando, cum partium intra alimenti poros coercitarum exclusionem commodius alimentum ipsum macerare, ac subigere posset.

Cibus ita permixtus, & attenuatus versus fauces protoditur, & prius ore clauso per constricta labia ope labiorum sphincteris, de arctato oris cavo actione buccinatorum, & zygomaticorum, tumque simul motum cibi urgentibus basioglossis, & ce-

ratoglossis una expresso succo lubrica linguæ, & palati, juvante ipsius figura, & superficie, fertur cibus usque ad linguæ radicem, ubi appulsus irritando convellit musculos genioglossos, mylochyoides, & stylochyoides, a quorum vi attollitur radix linguæ, larynx, & os hyoides; harum elevatione impulsus cibus epiglottidem deprimat. Hinc relaxato œsophagi sphinctere a musculis genioglossis, & genihyoideis ope myloglossorum, & styloglossorum truditur cibus in gulam apertam, contractisque fibris tunice œsophagi muscularibus oblique decurrentibus ad principium ventriculi usque promovetur. Illapso cibo in ventriculum a liquore salivæ simili docente Malpigio posth. 28. ex alimentorum distensione, & compressionem tunice glandulosæ ex pluribus ramuscularis elicit, motus intestinalis massæ conciliatur, ut facilius liquecere, dissolvi, ac subigi possit a fibris muscularibus, aliarumque tunicarum ventriculi attritione, & pressione, quorum auxilio, & diaphragmatis cum musculis abdominis inchoatæ ingestorum solutiones, ambientium viscerum calore sovente intimius comminutæ quasi in partes ultimæ compositionis resolvuntur. Vel si Listerum audiamus, ut saliva intra alimentorum inania coercita virtute septica expeditius alimenta in chylum resolvat, a cujus acri adurenti, & putrescenti natura concoctu difficilia putrescunt, & macerantur.

Sed non solum saliva variæ naturæ cibos ob salinam quam habet substantiam, vim cunei exerens, omnes penetrando digerit, incidit, ac solvit, verum perenni hoc fluore irrigatæ ventriculi tunice ejusdem salibus in contractionis motum validiorem excitantur, qua ratione in debito tono cum plicarum crispatione, ad facilius expediendam triturationem, detinentur. Perenni hoc salivali liquore humectantur fauces, interiora oris, & œsophagum, madore laxantur, irrigaturque lingua, ut assiduo motu vocum exsucca ne reddatur; alias rigida facta cum faucibus arefcentibus, motus flexibilitatis jacturam facientibus anilis trachæ, vocem edere difficilem, ac raucam; non irrigatis enim fistulæ pulmonaris salivali humore fibrillis, aër hinc illinc ab anulis non leviter concutitur, sed in latera illorum impulsus fortiter repercutitur; quod non aliunde videtur fieri, nisi quod rigida fibræ asperæ arteriæ, dum vi percussione aëris aliquatenus e loco suo distractæ co-

nan

nantur sese restituere, aëri rigidum tremorem imprimunt, adeoque raucus vocis resonat sonus.

Quamquam, si gustui credendum, insipidus humor videatur saliva, contrarium inculcat Galeni experimentum, scilicet scorpionem jejuni hominis sputo bis, terve aspersum protinus interire. *Saliva hominis inquit Aetius tract. primo serm. XI. reptilium venenatorum generi maxime contraria est. Ego enim citra omnem incantationem ex solo jejuni sputo scorpionem pereuntem vidi. Omnibus hominibus inest venenum, feruntque illos salivam; ut ferventis aquæ contactum fugere, quod si in fauces penetraverit, etiam mori: idque maxime humani jejuni oris. Plinius lib. 7. & tamen omnibus contra serpentes inest venenum, feruntque ictus salivæ, ut ferventis aquæ fugere contactum: At intelligenda est jejuni hominis saliva, quæ utpote acrioribus salibus referta, veluti aquæ ferventis contactus, serpentes fugat; inflictum quoque a serpente vulnus, si confestim saliva illiniveris, non lethaliter sæviet, sed cohibitum venenum, nec ulterius diffusum sponte evanescet: Hinc Lucanus lib. 9.*

Nam primum tacta designat membra saliva,

Quæ cohibet virus, retinetque in vulnere pestem.

Venatores serpentum, ut Aldovrandus de insectis lib. 1. statim ac illos cepere, saliva confricant, cujus contactu præeunte Marco Aurelio Severino de Vipera non tantum vilescit violentia veneni, sed si in os illorum diductum expuas, saliva in eorum ventrem delata tantæ feritatis illis est, ut sensim contabescant. Hac ratione nimirum partibus suis salinis confricatæ curantur lichenæ. Saliva hominis jejuni est medicamentosa; etenim in saliva adest virtus absterfiva in ulcusculis, licet minori gradu, quam quæ sit in sarcoticis. *Levis papula, ait C. Celsus, si quotidie jejuna saliva defricetur, sanescit.* Saliva cancerum mammarum ob suas subtiles attenuantes moleculas discutere valet, ut docet Paulus Ammanus Med. Critic. & ratione alkali acido herpeti contrario reddit Schenckius herpetem curari. Salivam robur asserre infantibus, inquit Matthiolus in 2. lib. Dioscordis. Pustulas Crato, scrophulas Hildanus salivam resolvere promittunt; & si animus esset mihi referre, quæ apud Auctores perlegi, quos reor, aut deceptu faciles, in quorum re alii decipiuntur, aut denique vanæ gloriæ, atque

ostentationis nativa hominum indole affluantes, in multo grandiore admirationem facili negotio rem tumefacere possem. Verum sollicitus fui, non plures narrationes conscribere, quas vel invicta mea ad credendum innata tarditate assensum meum extorquere non sensi, quæ nondum exploratæ non videntur iis probabiliores, quam quæ irritæ jam deprehensæ fuerunt. Quæque hujusmodi salivæ experimenta scrophulas, nodos gallicos, cancerum mammarum solventis, nusquam reperire dentur, præterquam in quorundam auctorum vana iactantia, tumentibus libris, atque promissis, ut quisque, ni fallor, experientiis deprehendet, quam parum eventus sui conatus laboribus, & illorum assertionibus responderint.



D E

SALIVA, ET SALIVATIONE

PRÆTER NATURAM.

CAPUT II.

ARTICULUS I.

De Vitio salivæ in quantitate.

HÆCENUS salivæ humanæ natura, secretionem, & usu, qua licuit perspicuitate, investigato: proximum nunc est, ut ejusdem statum morbosum solertius excutiamus.

Quando a naturali crassi, & molecularum nexu deflectit saliva, humani corporis harmoniam subripiens, alienis imbuta particulis, morbosisque insecta miscilibus, a naturali statu recedit, majori, quam par est, labe sanguinem afficit, cujus varia constitutione fluidorum partibus varie labefactatis chronicorum, acutorumque, affectuum luctuosus sæpe panditur numerus. Ut igitur horum morborum idea certior, atque clarior percipiatur, a re longius non erit, vitium in aucta quantitate brevius exponere; quod ad investigandos exactius ipsius, morbos, plurimum conferre videtur.

Peccat saliva in quantitate, quotiescunque subtracto sanguini nutritio pabulo, perenni

renni fluoris ad salivales glandulas appulso, confertim e ductibus effluens in ore undequaque exundat: cuius effluxus jugiter profluens nullo gravium symptomatum comitatu, nullaque saporum malitia conjunctus pthyalismus vocatur.

Si alimentum succi gastrici inertia, laxa tunicarum contractione, viscerumque circumpressionem ruditer in ventriculo elaboratur, non evolutis sulphureo-balsamicis particulis in chylum aquosum nimis facessit: qui in sanguinem delatus, & per omnes cavos fibrarum tubulos cum sanguine circumductus (cum seroso-aquosae ejusdem moleculae a solidorum impulsu ad fibrillas appelli coactae; ex defectu gelatinosae portionis nutritione indigis partibus non apponantur) necesse est, ut aqueis particulis turgidus ad superiora trajectus in glandulas salivales transcoletur. Quae laticis separatio, cum intra ipsas glandulas subsistere non possit, a pressione particularum confertim succedentium, & jugiter ad glandulas confluentium, retroque urgentium in os indefinenter derivetur.

Porro mirum est, si orificia, ac tubuli glandularum diametro gaudeant juxta ampliori, una cum tumore jugularibus venis incumbente in colli lateribus, reprimente sanguinis refluxum, quantum secretionis penum adaugeant. Hae pororum compages dilatata, ac tubulorum vitiosa amplitudo a laxa fibrillarum cohaerentia exorta, salium nisu, & machinularum terebratione a proprio termino recedentium ita distenditur, ut dehiscens glandularum osculis a stimulo solidis inhaerente irritativo, & salium cuneis tuborum villos vellicantibus perpetram labascant. Harum minimi fibrarum fasciculi ad ampliora spatia redacti, si impetus sanguinis augeatur, & a confluyente humoris copia novi distensis tubulis edantur impulsus, vel si salium spicula stimuli vires exercent, ab invicem divelluntur, ut conatibus salinorum cuneorum discissis fibrillis cum suo connisus momento non valeant superare fluidorum impetum, ab impellentibus liquidi moleculis in nimia distractione coercentur tubuli, & ordinatarum partium mechanismus fatiscet, atque exesis vasculis pene destruetur. Unde denegato in glandulas spirituum animalium effluxu, illarum symmetria, tonoque partium attrita, nec naturali tensione, debitoque elatere munita turgentibus particulis aqueo chylosi ad glandulas appulsi minime valent contrahiti,

sanguinisque impulsui resistere nequeunt, unde quaque non irrumpat salivialis humor, & depluat. Hoc in flaccescentibus glandularum fibris ab infarctu, & pressione nervorum cum largiori affluentis salivae copia, atque in aegris in utroque latere paralyti affectis, saepe videre est.

In scorbutica diathesi maxime calidiori, quoniam ob salinas in fluorem evectas particulas, quicquid inest sanguini, est acerrimum, tenue, atque urens, sanguis non potius est novum chylum sibi assimilare; ideoque quia colliquari cogit ac fundi quicquid in fluxum agitur, partes chyli gelatinosae in orbem sanguinis circumductae a salium cuneis nimium solvuntur, adeoque suo naturali lentore destitutae libere vagantes per corpus sanguinis continuo fluxu per glandulas salivales excernuntur. Prae nimia hac salium, & acridinum copia glandularum diametrum distendente, non tantum saburra veteris efferti, & inutilis chyli, verum etiam novi, & oleosi major portio in ipsas glandulas continuo depluit. Irritatis enim villis nervorum, tenduntur capillares arteriolae, unde fit major fluidorum appulsus, quae dum in distractiles vasorum tunicas impetum faciunt, ex earundem distractione restitutis villis vigoratur renisus in contenta fluida, quo fit, ut aqueo serosa portio per validiorem sanguinis motum ad glandulas uberius delata, a solidorum pressione, & fibrarum oscillatione magis commota, in pervia glandularum ostiola irrumpat, & abundationem salivae excitet affluxum. Hic exprobranda est sputatorum conuata consuetudo, qui solo expuendi libidine alliciti, ut vilis facibus cunctis excrementum continenter salivam effundunt; quo spuendi conatu, & perpetua musculorum contractione irritatae, & compressae glandulae sollicitantur jugiter ad novam, & uberiorem urgentur excretionem.

Causae externae, quae quantitatem salivae adaugent, in sex rebus non naturalibusprehenduntur. Aer enim ut frigidus particulis nitro salinis segnius rotatis, nec satis evolutis plurimis refertus poros cutis premendo effluviis corporis insensibilem transpirationem inhibet. Ut humidus aqueis moleculis turgescens leutescentis sanguinis solutionem, laxando fibras imminuit, ut inde aquosa portio sanguinis adaucta urinae, & alvi excretio, & non raro largior salivae effluxus promoveatur, ut Sanctorius animadvertit: *Aer externus per arterias in pro-*

profundum corporis penetrans potest reddere corpus levius, & gravius: levius si tenuis, & calidus; gravius si crassus, & humidus. Cibi admodum aquosi, somnus, & quies naturalia excedentes stadia, excretiones aliarum partium imminutæ humoralem massam inficientes, hisce accedentibus animi motore, & timore diuturno coctionis opus labefactante, ut affectiones cum motu fluidorum momenti minoris conjunctæ, & restrictivæ vasorum influxum, & liquidorum attenuationem hebetantes, salivæ materiem accumulare videntur.

Cum igitur in sensuum omnium silentio, & torpore cum membrorum illa concidentia, quæ somnus vocatur, necesse sit in decubitu horizontalis situs, ut laxetur fluidorum compages, & remittatur tensus solidorum tonus; nil mirum, si laxiori reddita sanguinis cohesione, ibidemque magis enervata fibrarum elasticitate, si licet sanguis in perpetuo sit motu, currat hinc inde, recurratque per membra vario ab inferioribus ad superiora, & contra vim innatæ suæ gravitatis ad superiora pelli cogatur, tamen per musculos, viscerum lacunas, viasque partium obliquas, curvas, & flexuosas tricas languidius trajicitur, & filtratur, quibus gravitatis suæ contrariis moribus debilior reddita sanguinis compages minori vi solida impellit, cujus languida vibratione, & diminuta impulsione magis, semperque magis relaxatur partium solidarum robur; ex quo fit plus equo progrediente somno, ut fluidum ad illam perveniat motus determinationem, quæ ad secretionem singulis in partibus peragendas idonea non est donec tandem non acquisito a singulis sanguinis moleculis proprio gravitatis in centro, nec ad naturale æquilibrium perductis plurima congeratur humiditas, quam, necessarium ad retinendum solidis, & fluidis amissum ob laxatam compagem robur, restituendum ineptam, nimiam salivam inde suppeditantem passim experimur. Hinc solvitur nodus, cur melancholici sputatores existant. Quoniam melancholici in vanis cogitationibus defixi, atque inhaerentes tristitia cogitantes, eaque pensitando timentes, impediunt, ne spiritus impetus facientes in fibras cordis contractiles, in eisdem motu conciti exerant elateris vigationem, quæ uberiori spirituum affluxu destitutæ debiliori impetus nisu se contrahant, ex quibus languefcente magis sanguinis motu per vasa, imminuitur ejusdem attritio, atque

hebetatur per glandulas transpiratio, debilitatur cordis, & vasorum motus. Unde tennes, & sulphureo inflammabiles sanguinis particule crassioribus implicantur, donec humorum illuvie quasi obrutæ, & veluti carcere detentæ coerceantur. Ob hanc partium cruditatem in fluorem vitiosum evehctus sanguis saculentias aqueas ad salivales ductus deponit.

Ob nimium hunc salivæ proventum balbutie plectuntur infantes, quorum fibrillarum tonus mollius, atque raræ texturæ salivæ copiosioris affluxu humectatus sic labascit, ut cum nativa musculorum linguæ, atque palati flacciditate cuicunque sanguinis, & spirituum appulsui facile cedente, minus concinne, & sero perfecte enunciare addiscant. Ab hoc vitio affecto Batto Regi, qui Cyrenas in Africa condidit, de sua balbutie Oraculum Delphicum consulenti, Pythia imperavit, ut in Lybia Regione calida vitam degeret; sic Herodotus. Ad hunc censum refertur deficientia vocis in aphonis, quorum laryngis muscoli a nimio aquei humoris proventu ita enervantur, ut fibris carneis resolutis flaccidi, & inertes fiant ad motum. His laxatis, sonitu per fistulam pneumaticam a motu lateribus annulorum non alliso, nec hinc inde vario repercusso, qua aeris verberatione, & inflexione vox efformatur, æger nullam valet vocem effari. Manifestum hujus rei eventum refert Tulpus libr. 1. observ. cap. 39.

Si vero hæc aquosa salivæ menstrui copia a glandulosa ventriculi tunica jugiter exprimatur, suæ aquositate liquorem gastricum ita inficit, atque inegrem reddit, ut chylicationis opus plurimum labefactetur, menstruo particulis aqueis perperam repleto alimentorum contextu reluctante. Inde sensim collectis cruditatibus vitiosis fibrille stomachi debilitantur, laxatur tonus earundem nimis, obruiturque sanguis, in quo copia humorum aqueorum exundans parum alimenti ad attritos solidorum villos ducetur, quod sit naturali simile, & alendo aptum: sed quicquid ad partes adducetur, erit plane aquosum, cogetque sanguinis massam iter suum lente per totum corpus absolvere, ut habito respectu ad modum, quo sanguis propellitur; ad spatium, & velocitatem, quæ percurrit; & vascula perluit, impossibile sit, quin resistentiam illam offendat, quæ eodemque impetu momento occlusa vasculorum lateralium, & villorum ora permeare possit, ita ut nec a systaltico
fibræ

fibrarum motu major tenuiores sanguinis partes ad cavas lacunas possint urgeri ad vectes fibrarum inflandum.

Quoties igitur sanguis per repetitos circuitus ruditer attenuatur, effœtus erit crassioribus partibus, & aqueis, adeoque illo motu urgetur, quo impetu non poterit ferri ad collapsos sacculos nutriendum, cum major sit nifus in contactum nitentium minimarum riliarum fibras, & canaliculorum componentium, quam sit irruentis sanguinis imperus. Quare particulae illae aquae minori, vel majori cohaesionis vi unitae eam molem, & directionis momentum habebunt, quo per poros carnea substantiae permeare non poterunt; unde cum reliquo sanguine ulterius circulantibus venas pervadent, & succatae nutritioni eo usque inservient, quo usque male aletur animal, & cachexia continget. Hinc fiet, ut solida, ad tantam imbecillitatem redacta fluere quaquaversum permittant humores aqueos, qui in cavitatibus majoribus, vel vasculis cutis membranosis collecti, vel ad partes robustiores appulsi lentescunt validam generant obstructionem, ut in durum tumorem attollantur. partes ad contactum venarum, ductuumque lymphaticorum positae, a quo vasa illa tenera coarctata, & compressa, cum liberum transitum præbere non possit lymphæ, vel chylo, indeque continuo appulsu novi liquoris ad partes vasorum compressas tendentis, & præterfluentis tergum prementis ultra tonum naturalem distensæ tandem rumpuntur, ob quam vasorum exitium ruperam in habitum corporis serum effluit. Ab hac pituitosorum humorum in stomacho accumulatione ibi necesse moram convelli potest ventriculi musculus a majori spirituum copia per nervos fluente, ut enata fibrarum inferius ventriculi constrictione contenta per os ejiciantur, vel nauseosa, si inanis, & solus erit vomendi stimulus, producet. Quod si afficiantur rami nervorum ventriculi cordis communes, ut per ipsos fiat refluxus vividior, & copia spirituum naturali major, & frequentior ad cordis auriculas, spirituum energia eadem in perpetua contractione detinendo, superans pressionem sanguinis affluentis per truncos venarum majorum eludet imperum ejusdem ad ventriculos tendentis: unde a sanguinis pressione non referatis auriculis, sed in contractione persistentibus, intercepto sanguinis, & cordis motu, succedant oportet languores cordis, & animi deliquia.

Si vero chylus nutritivus in sanguinem continuo delatus alitioni partium ineptus, effœto succo inde massa sanguinis vereri faturata per glandulas salivales copiosa succi nutritii jactura indefinenter erumpat, per hanc succi euchymi subtractionem tota sanguinis massa oleoso balsamico pabulo privata acescit, & turbato ob indebitam nutritionem liquidorum cursu in varios siccitatis morbos delabitur: ob quod minimam musculosis partibus nutritionem præbens, cum partium solidarum colliquatione incallescens totius corporis atrophiam inducit, cui calor hæticus in toto habitu paulatim subrepens in omnibus partibus solidis accenditur. Hinc calidum, & acre sanguinis serum per molle & glandulosum pulmonum parenchyma continuo trajectum, eos tandem infarctu aggregatur, inflammat, exulcerat; quo fit ut atrophia, quæ erat in habitu corporis, in tabem pulmonarem paulo ante fatales dies, terminetur.

Verum si chylus per ductus salivales junctiter excretus naturæ incassum in sanguinis reparationem continuo suppeditetur, ne ab hoc perenni chyli effluxu depauperetur, & incalescat sanguis, adeo ut insigniter languentibus viribus a nimia subtractione succi nutritii in statum lethalem, & insanabilem redigatur, ad usum diuturnum lacteæ dietæ æger relegandus est, quo sanguis lenitur, & salia stimulantia demulcentur. Deinde aëri aprico, & benigno commissus; liberali, sed cauto ciborum enchymorum usui refarciatur, ut inde aquas minerales chalybeatas bibendi non impar fiat, quarum beneficio massa sanguinis sensim emollita, etiam succi nutritii colliquatio sensim evincitur; atque inde non tantum a salivatione æger, verum etiam sanguis a salina acri diathesi vindicatur. Ptyalismus autem hinc incassum advocatis incertis intervallis recrudescente, cum insigni virium deperditione, æque, ac per glandulas salivales feri colliquatione, rite continua salivæ deglutitio in symptomatum allevationem præscribitur; qua non tantum salivationis progressus, verum chylus per ductus salivales excretus, naturæ in fluidorum reparationem pedetentim remittitur. Si saliva unicuique non cogitanti sponte in os confluat, atque copiosius eo alliciat ob ductus salivales patentiores, laxioresque, quam par est, exitimo oris collutione, maxillarumque fomentatione ex subadstringentibus, & blande aromaticis decocto posse curari, tum inter-

ne

ne modo laudata subadstringentia commode usurpari, quorum ope paulatim arctantur, ac roborantur ampliores viæ, dummodo defuescant ægri a continua spuendi libidine in consuetudinem perperam adscita.

ARTICULUS II.

De Salivæ defectu.

Cognita quanam ex largiori salivæ affluxu expectari mala possint: nunc juvat in salivæ inopia excutere noxas. Nam non minus ab excessu concidit hominis sanitas, quam a deficiente salivæ penu labatur.

Vitium salivæ excretionem invertens plus minus impediens, vel penitus inhibens, nunc glandulis, & tubulis excretoriis inhæret, nec in ipso salivali latice, motuque sanguinis deprehenditur; ut si enumerare hic vellem ingentem morborum feriem, & maxime chronicorum, qui a sanguine salivali humore non suffecto pendent, sero dicendi finem facerem.

Nativa tubulorum salivalium angustia, humor viscidus salino-fixus glandulas infarciens, ac porulos opplens, vasculorum compressio oscula occludens, minimarum arteriolarum crispatura glandularum cava, & tubulorum ora coarctans, aut diameter earundem nimis connivens, ac tumore aliquo extus incumbente compressus viam salivæ præcludunt, quæ a conniventibus salivæ ductibus quoquo modo obstructis, aut compressis, ne discernatur præpedita, licet cum sanguine confertim profluat, tamen cum ipso circumducta ad alia filtra circumvehitur, in quibus secretionum penso adaucta, glandulis diversis committitur. Quod si chylus jugiter in sanguinem irrepens salivalibus non turgeat particulis, nulla prorsus materies glandulas trajectory per carotidum divisiones cum sanguine ascendet; Igitur in toto deficiet saliva, ut sæpe occurrit in ardenti febre correptis, in quibus sitis extinguere non potest, ac siccitas summa non solum ad fauces, sed per universum corpus diffunditur: in quibus cum calor intensior absumat quicquid humidi ingeritur, & cum sanguinem diluentes moleculæ aqueæ evaporentur, sanguis privatur ea materia, quæ corporis partes humectat. Tamen si ulla inhæret sanguini serosa portio, a singulari solidorum ariditate statim absorbetur, quæ inter duas quatuorque particulas introducta permittit flue-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

re idem liquidum, quod alioquin subsisteret, nisi ab aqueis sanguinis moleculæ disjunctæ essent, quæ a concitato motu ad minima diversæ, & a congregientibus aqueis particulis ad summum solutæ ob turbatam, & confusam fluidi mixtionem diverso cohesionis modo combinati, diverso a naturali impulsu, nisuque rotati, secretionum leges non observant; unde propulsæ a validiori, & celeriori cordis contractione, dum majus supra glandularum obicem contranitentem exerunt momentum, non solum in reticularibus illis canalium textibus sanguinem vehentium factam solutionem conservantes, sed a nodis glandularum, & vasculorum lateribus in ulteriorem solutionem promotæ, citius ora venarum ascendunt, quam oscula ductuum offendant. Quod si satis liquidum non turbato motu exagitati in sanguine hæreat, sed generetur lentor in arteriolis materiem salivæ deferentibus ad glandulas oris, & faucium, tamen nullus dabitur affluxus humidi ad easdem partes, igitur siccitatis sensus, & sitis. Si vero non assumetur ex toto liquidum, effluet e glandulis salivalibus saliva viscidior, quæ in os derivata producet infarctum in villis linguae, & faucibus hærentem.

Inter causas externas occurrit aer particulis siccioribus, & calidioribus refertus, qui in sanguinem indefinenter impulsus crassiora attenuando, & extus ut ambiens leviter comprimendo glandularum cutis folliculos a fluidorum appulsu facile expansiles, videtur diaphoresim augere. *Aër calidus, nisi obstitit crassa, ait Sanctorius, juvat quoque perspirationem,* & aqueo serosas particulas alio divertit. Aër enim superincumbens cylindulis suis gravitat, ac premit partes sanguinis, quæ dum leviter mediante aeris interni elasticitate compressæ majorem semper, quem amiserunt situm omni opere recuperare conantur, facta pressionis aeris incumbentis æquipollentia pressionem, sive altitudini sanguinis majori, vel minori, servata semper proportionem specificæ gravitatis liquidorum, dividuntur, subtilianturque. At moles liquida copiosa, & gravis aeris externa non posset cum interno se facile æquilibrare, nisi misceretur cum mole liquida sanguinis; corpora enim fluida, ut simul mixta in ratione suæ gravitatis æquilibrantur, Cum autem flantem borea, & cælo sereno aer gravior sit, quam flante austro, & calida constitutione, ut

E e e

baro-

barometro. experimur, boreali enim tempore aer fit densior, magisque compactus, adeoque magis gravis; in austro vero, & calore magis rarior, inde minus gravis, adeoque pressus gravitate sua in sanguinem nobis ne advertentibus quidem ingreditur, eundemque sua elastica vi magis aucta, & gravitate sua urget, propellit, atque facillime in ea loca, in quibus minorem invenit resistantiam, & locum capaciorē sese expandendi, impingit. Cum autem capacissimam cavitatem reperiat iis cutanearum glandularum lacunis, ubi magnam vim elasticam acquirens, easdem mirum in modum distendit, per quas ad majus spatium dilatatas fit inde, ut ad minima divisas seri moleculis turmatim foras avolare nitentibus minus resistent aëreæ moleculæ. Rarefacto igitur aëre, dilatatis glandulis, ab earundem systaltico motu promovetur transpirationis insensibilitas, & eo magis si serum & aer erunt cum fluidorum cylindrulis aequalis magnitudinis, sed inæqualis ponderis ad motum dispositi. Ille enim cylinder primo movebitur, qui gravior erit altero; quoniam primum punctum corporis, quod movetur, est centrum gravitatis; ad quem centri gravitatis motum tota moti corporis moles tendit. Si igitur verum est centrum gravitatis duorum liquidorum æqualis molis, sed ponderis diverſi in ea parte reside- re, quæ gravior est altera, necessario consequitur, ut ob aërem externum, qui nec levior interno, nec gravior supponitur; æquali gravitate interno contrahens pari energia vim interni sustinet, in calidiori temporis constitutione serum ab aëre indissociabile primum, & jugiter avolat. Huc referri possunt hæmorrhagiæ; dysenterix, sudores ab exercitio nimio copiosi, vel colliquativi, largior urinx effluxus, vigiliæ nimix humidum assumentes, vel aliorum copiose ducentes salivam imminuunt. Ita, indignatio, ut effectus cum motu majoris momenti conjuncti, aucta cordis contractione, & sanguinis velocitate; cum saliva suum exigit separationis tempus, poterunt in glandulas derivationem, multoque facilius influxum salivæ liquoris prohibere.

Saliva igitur in sanguine non existens, vel ad glandulas non appellens in os effluere non poterit; unde in ore siccitas, & sitis ad fauces, quæ si diutius protrahatur, exsiccabitur magis lingua, ad superficiem maxime, cujus villi tunicam constituentes valide contrahentur; cum vero corpus lin-

guæ non cedat, sed contrahitur validius villorum contractioni, fiet, ut iisdem villi divellantur, hic illic lingua in fissuras diffiliet; quibus si addatur faucium œsophagi, & musculorum laryngis summa cum siccitate rigiditas, prohibita earundem contractione, quæ ad formationem vocis requiritur, rauco, vel loquendi difficultas succedet. Quod si ex toto deficiat in sanguine salivæ humor, excitabitur tabes cum siccitate conjuncta, quam in excessu salivæ attulimus, de qua canit Lucretius:

Jam marcent venæ, nulloque humore rigatæ

Aëreos alterans angustat pulmo meatus.

Ab alimento. ope triturationis in pollicem in ore redacto ob denegatum salivæ laticis influxum insitæ salium moleculæ non evolvuntur, ut a laxato ciborum nexu sapida tinctura elici possit, cujus defectu non delatis particulis salino-sapidis ad nerveas linguæ papillas sensus gustus fere concidit. Quo in casu, quoniam imminuta, vel deficiente saliva nullus liquor digestivus a glandulosa tunica expressus eructatur in cavitatem ventriculi, qui vires suas in stomacho convertendo, dum in ipsius tunicas, & filamenta nervorum impingit, eliquata salina aqueis ramenta in fibras validius infingat, ut vehementius stimulis nervorum villis, internæ ventriculi plicæ inter se mutuo atterantur (in quibus ratio famis consistit) appetitus imminuitur, vel aboleſcit. Ingeritur tamen alimentum, ne vires statim labantur, a quo rudi componentium solutione elaborato dependet in ventriculo perperam insuata incoctio, quo neuriquam in intestinis absolvitur; chylus enim agre in stomacho confectus ob principia ciborum activa minus exaltata, atque dissoluta inertibus corpusculis coalescens ad intestina propellitur, ubi naturali earundem compressione, lenique vermicatione promotus in sanguinem itrepat, crudus, impurus salos exhalando vapores. Quapropter præcordiorum anxietatem, varioſque capitis, & stomachi morbos producit. Chylus itaque non absoluto chylicationis artificio, nec in purissimum rorem mutatus, impuris abundans partibus, lactearum papillas impingit; hinc per lactea ad sanguinem usque delatus fluidorum compagem varie ledit, perpetuoque œconomix animati corporis tendit insidias.

Cum igitur parcior, quam decet, generetur saliva: primo defectu materiæ, quoties ista non reparatur: secundo canalium

ARTICULUS III.

De aciditate salivæ.

vitio, obstructis nempe, compressisque vasculis, per quæ defertur ad glandulas: tertio glandularum vitio ad munus hoc absolvendum ineptarum, triplex indicationum species insurgit, quæ triplicibus morborum speciebus correspondet. Prima absolvitur alimentis convenientibus, qualia videntur potissimum esse juscula ex tenellorum animalium carnibus deprompta, tenuis potus, cerevisia puta diluta, lac, aqua lactis, limacum, caponum, gelatina cornu cervi, eboris, ut inde aquarum usu, & liquorum sanguinem demulcentium sub forma potus copiosa, atque continua eorum ingurgitatione sanguinis siccitas temperetur, quibus exhausta humorum in habitu corporis delitescantium minera suffecta, morbida sanguinis crasis jam penitus vere eversa longo earum usu paulatim restituitur.

Vasculorum obstructio, aut compressio curatur medicamentis attenuantibus incidentibus, quæ crassos simulque lentos respicientia coherentes invicem humorum particulas comminunt, impactasque divellunt. Hac sunt, quæ particulis volatilibus, salinis, acerbis, aromaticis, oleosisque scatent, nec non quæ alkalinis absorbentibus, fixis, & lixiviosis amaricantibus abundant, a quibus motus adauctus, & magis proprius resistentiæ particularum quiescentium imprimitur, iridemque cuneus solvendis fluidorum particulis intermiscetur, qui motu, partis tenuitate, & figuræ aptitudine ad penetrandum non solum compactos humores disgregat, verum sanguini, ac lymphæ fluiditatem denuo conciliat.

Postquam innotuerit glandularum vitium non nisi labore improbo, iteratoque in dies comparatu, illi aptum inveniendi remedium plurimum augebitur notitia, cujus ope, roborantibus externe medicamentis, plerisque aromaticis, salivares glandulæ suffragantur, a quibus si commodum non accipiat æger, melius ferret pingua, & emollientia, quibus rigiditas solidorum ex nimia volatilitate humoris in glandularum poris, ac folliculi conclusi fibras nimium corrugante, vel ab acrimonia nervorum fibrillas irritante, adeoque oscula constringente, unde effluxus liquorum inhibetur, paulatim lenitur, atque laxatur.

SAL in aquea salivæ portione delitescens, quoties in libertatem vindicatum, salivæ spiritu satifcente, depressoque sulphure, cæteris præpollens nimium in fluorem evehitur, ejus spicula angulata salina per aqueas moleculas conspersa aliorum miscibilium superato jugo, cæterisque particulis compede injecto, mutata directione ad occursum cæterarum partium coalibilium in proportionem remanentium, confertim in linguæ papillas impellunt, ubi in nervorum filamentis validius infixis salibus, sensorii fibrillas acriter titillant, eisdem pungunt, atque convellunt.

Hujus naturæ moleculæ cuspide tereti, & acuta, & dein corpore instar cunei majorem in molem aucto constantes, adeo ut quovis modo sensorii fibrillis applicatæ ipsas pungendo, & non nihil comprimendo constringant, hunc saporem eminenter ostendunt. Hac aqueis obvolutæ particulis sanguinis effervescentiam, aut nimiam ejus dissolutionem refrænant, & blando coagulo compescunt. Vel nisi mavis, dicas moleculas acidi esse tetraedras, & non cubas, quæ undequaque suis angulis munitæ, & ab omni parte æqualiter aculeis instructæ linguam facilius vellicent, & quasi pungant. Quod si aliter figuratas esse contendamus nimirum vel laves, vel teretes, fieri posset, ut acidi particularum facies non angulosæ incidant in fibrillas sensorii, & sic has non distringant, nullamque proinde vellicationem patiant, quod omnino est contra acidorum gustus perceptionem.

Si causas medias rimemur hujusce crudæ aciditatis, illæ videntur attingi, atque chylo inhærere in primis viis perperam elaborato ob fermentorum inertiam, aliarumque liquorum minorem in intestinis volatilitatem acquirenti; qua quidem depravata concoctione, chylus non redditur blandior, quatenus ventriculi humor visciditate donatus in tunicas tremoris motus non inducit, & succi digestivi crasim subvertens, salem volatilem, & aquea alimentorum corpuscula non exolvit; unde non laxatis salium calore meatibus, haud in particulas flexiles leves, atque rotundas, sed ad asperas, & inæquales accedens incoctus, & acidus, aculeatisque particulis tumescit, ex quo non nisi incongruus, atque salium & aci-

dorum enormium particulis refertus, massæ sanguineæ, & languentibus solidis committitur, qui per impetum naturalem sanguinis, licet pluribus millibus vicibus per pulmones, & per reliqua viscera, ac partes corporis fluat, paulatim in glandularum lacunis accumulatur, ita ut eodem servato cohesionis momento per minimas acidorum particulas continuo influat, quousque sensum aciditatis excitans, & reliqua cum ipso corripientem, fluidorum præcipuas crases alterare valeat, atque sensim inficere, ut effuso succo jugiter reparata labem scorbuticam accersant. Hinc scorbuticorum saliva acida plerunque deprehenditur.

Quandoquidem enim in sanguine depravato recrementa plura acida congeruntur, quam ut diaphoresi, vel per urinam satis secerni possint, quæ ad oris emunctoria ferro irritata detruduntur. Quoniam liquida sanguinis partes componentia, & quæ in cohesionem mutuam nitentia per motum, quoties in acidas particulas abeunt, transeunt e statu durioris in statum liquidioris corporis, omnes illæ liquidi cruoris moleculæ, quibus componuntur, in libertatem, & facto impetu distractis vinculis in motus majores veniunt, a quibus per resistantiam cohesionis cohibebantur, & producent illos effectus, quos debent ex vi suorum motuum, & figurarum, cujusmodi sunt pun gere, quadam compressione ferire linguæ villos. Elementa igitur feri partes sanguinis componentia non ab intrinseco in ejusmodi solutionem venientia, sed repugnantia, a causa violenta, & morbosa in illam cohesionis vim coguntur, atque detinentur, quæ ita urget partes ultro coherentes ut a prima cohesione sese expedire possint, atque totum mutare compositum per illam occasionem, quæ cogit partes componentes ab illa cohesione cessare, & solutas in novum adire compositum. Quid autem si quid e suave lapidum, ingrato lapidum, ex non acido fiat acidum? nonne diceretur compositum primum ultro immutatum, cum effectus, qui in prioris locum succedunt, contrario modo se habeant? sed hujusmodi sunt partes sanguinis componentes, quæ ante illam solutionem sunt quoddam compositum, quod post solutionem mutatur; igitur partes illæ in statu fluidorum salium exaltatæ dicuntur mutatæ.

Cum autem nullum compositum per vim infitam destruat, oportebit, ut vis, quæ salina concreta fundit, sit his iisdem liqui-

dis externa, quæ a solidorum ictibus in salia urgentiori impetu nitentibus deducitur; quare facultatis illius momentum, quo concrementa salium a mutuo contactu recedunt, & in cuneos acutos coeunt, momento, quo salinæ partes divisioni resistunt, erit majus. Unde partes salia componentes ex vi hujus potentioris causæ se subducere a fusionem non poterunt, nisi tollatur momentum illius causæ agentis, & detinentis ad solutionem, aut addatur momentum resistentiæ componentibus salia partibus, ut cogantur a majori cohesionis vi non dimoveri. Ubi igitur salis moleculæ adherentes invicem in medio fluidi per motuum ambages attritæ, miris modis exagitatæ, commotæ, contrarioque nisu rotatæ in minima solvuntur, ad eam devenire poterunt angulorum acutiem, quæ superet cohesionis vim aliarum molecularum summe evectis corpusculis resistantem, & supra datas partium resistentias vires suas exerentes, exinde ab aliarum commercio liberatæ, & præcipue a spiritu volatili dissociatæ in salivam turmatim affluent, a quibus ingratis sapiens, & acescens saliva emanabit.

Aëris vitio salivam acidam induci nullus crediderim inficiabitur; aer equidem pluviosus laxato fibrarum tono poros, ac meatus cutis suo humido infarciens sanguinis effluvia reprimere videtur: Aer, inquit Santorius, *cenosior, & ponderosior, convertit invisibilem transpirationem in icorem, qui retentus, & deinde non resolutus in cachexiam facere solet*. Ab eodem inspirato salia, ac sulphura redolente spiritus sanguinis valde deprimitur, hinc salino-sulphureis ejusdem particulis sanguinis crasis sensim mutata in mephiritum acidam mutatur. Ad talem humorum diathesim non parum conferunt cibi acidi, sale conditi, acidum ferventes occultum, austeri concoctu difficiliores de acidis fixioribus, & succis tenacioribus, ut pisces marini, pastæ farinaceæ, participant, vina austera, animique passionibus.

In qualitate salivæ immutata loco naturalis saporis acida cum magna aliquando virium laxitudine, & inapperentia contingit, quibus paulatim accedentibus aliis ingruentia mali symptomatibus spe morbus tandem erumpit. Ab acida salivæ impressione in linguæ papillis primo depravatur gustus: a particulis nimirum acido-aqueis nervorum papillæ e poris linguæ protuberantes obducatæ, acidique innatantibus spi-

culis

culis salinis laceſcit ita exagitantur, moventurque validis tremoribus papillarum nervi, ut aliis tremoribus oscillare prohibeantur; unde ex incuneatis salibus in nervorum ſiphungulis, non flexis nervis in aliis partibus, eadem undulatione afficietur gustus organum. A ſaſſamenti iſtis acidis efficeret dilutis molles, & ſpongioſas gingivarum carnes ſubeuntibus intumeſcunt fibrillarum earundem ſaſciculi, qui dein nutrimenti defectu marceſcentes a continuo materiæ erodentis affluxu exeduntur, a quorum putreſcentia, & humorum a ſalivalibus vaſis exundantium expiratione graveolentem oris ſætoſorem olfactamus.

Quia vero ad hoc, ut animal poſſit ope ſanguinis nutriri, non ſufficit, hunc ipſum ſanguinem eſſe quidem ex alimentis, ac certa earundem ratione compaſtum; ſed inſuper requiritur, ut ex ipſa derivari poſſit quicquid fluere debet per nutriendos animalis ductus, & quicquid ad ipſius reparationem exigitur. Hinc fit, ut quoties quantitas ſanguinis cæteroquin in quantitate nihil vitiat ob aciditatem immutabitur, ut per glanduloſam palati tunicam ſerpens, ejuſdemque ſubſtantiam depaſcens ad uſque illud aditum, atque intimum progrediatur, ut villi, in quos inſluit, validius, atque frequentius ab invicem divellantur; unde fibrarum eroſio, & ulcuſcula in oris cavoluxuriant. Quod ſi e glandulis non erumpat, ſed in canalibus ſuis ſubſiſtendo, eoſdemque proinde extrorſum extendendo glandularum ſolliculos obſtruat, vaſaque nimis infarciat ut motus ſanguinis per vaſa propulſi, fiat tardior, continget tumor, qui ſanguine non fluente ad notas leges ſui circularis motus, canales ſancium, & guttulis leviter comprimendo, aut ex toto allabantis liquidi influxum prohibendo, coget villos extendi, & a fluentibus humoribus laxare; unde motus reſpirationis, & deglutitionis leviter lædens ſpuriam producat angina.

Hæc ſaburra acida cum viſcoſis in ventriculo collecta dum fibrillas ventriculi nerveas irritat, ſpirituum animalium influxum non ſolum uberiorem ad ſtomachi membranas promoveret, verum ventriculi glandulas infarcit, & in moleculas digeſtivi liquoris ſeſe inſinuans, ita ventriculi fermentum afficit, ut a glandulis expreſſum, ſenſum non naturalem producat. In hoc igitur ſtatu non naturali ventriculi per acidi affluxum dabitur ciborum averſatio, cum detur

intra ventriculum id, quod proinde vitæ cum terreis, ac ſalinis partibus valet intenſius vexare, & ita fibras ventriculi vellicare, ut per illum humorem ſeſe in membranas intrudentem apepſia, vel anorexia ſuccedat. Ex hoc chylus minus fluidior, ac purior ſæculentiis acidis, ac ponderoſioribus ad inteſtina protrufus, deluſa omnium ſuccorum activitate, lento inteſtinorum motu, fibrarumque conſtrictione ad oſculorum lacteorum papillas deſcendit: quorum orificiorum anguſtia cum ab illis corpusculis, quæ ſunt majoris molis, quam quæ diſcludere, & ſuperare poſſint vaſorum reſiſtentiæ, non deducatur; inde fiet ut a lacteorum capillamentis excluſus chyloſus ſuccus non poſſit minoris diametri chyliſerorum oſcula ita facile ingredi, ſed cum cogatur impingere in profundiores colli cellulas, ab ejuſdem plicis excipietur, qui ſenſim coactervatus infectus evadit, & a maſſa ſuper aſſuente ita ſuperque turgit, ut fibræ inteſtinorum ſenſiles perperam diſtendantur, & humore contento diſtractæ, atque incuneatis ſalibus ab invicem divulſæ, impetumque aculeorum laceſcit, corrugationibus valde moleſtis, & dolorificis torqueantur.

Ut acidior ſaliva emendetur, non tantum abſtinendum ab acidorum abuſu, ſed temperanda plantis plerumque odorem actiferentibus cum ſuavitate, ac fragrantiam quandam ſpirituofam, & aromaticam redolentibus, quæ omnes ſulphureis particulis, ſeu ſalino-oleoſis volatilibus abundant. Horum autem aromaticis particulis depreſſa ſulphurea corpuscula in ſanguine excitantur, ſegniterque commota exagitantur: Hinc coordinatarum partium mechanismus, ac craſis ſanguinis quaſi ſatiſcens reſtituitur: interim vero cruditas acida ventriculi corrigatur vegetabilibus ſale volatili oleoſo abundantibus, ejuſque fermentum acida quadam, ac terrea conſtitutione glutinoſa torpeſcens attenuetur, quibus elatiſcitas fibrarum roboratur, atque iners excitatur digeſtio.

ARTICULUS IV.

De ſalivæ ſaſſedine.

NON adeo acuminatis, quæ in ſalino acidis apparent, ſpiculis, ſaſſus ſalivæ contextus coaleſcit, ſed ſaſſo-terreis involutis ſalium particulis emergit, cubis nimirum, quæ planorum inclinationibus, & lineis ad plana inſiſtentibus conſtantes, in angu-

angulos rectos coeunt, seroque salivali confertim innatantes laterum aciebus aculeatis sensorium, quasi incidendo non nisi salso-sapidum saporem imprimere valent.

Ob angulorum rectitudinem salium moleculæ aqueo latici conjugatæ minus effectum acutiem sortiuntur, atque in linguae papillas jugiter incidentes minime poterunt in nervorum propagines vim rigidaë cuspidis exerere, sed acidorum mole majores, lenique motu in protuberantes nervorum fungulos debiliores percussione impetus exercent, adeoque minus a rectis salium ictibus patietur sensorium; ex quo fiet, ut nec ab enormi fibrarum irritatione a salium acutie inducta districtus gustationis nervus, nec particularum oleoso-levium demulcedine oblitus percipiendæ saliedini se se accommodet. Quapropter oportet, ut massa humoralis scatens seroso-salinis, salsoque acribus particulis abundans plus minus salis sero solutis per glandulosas, ac pervias palati membranas indefinenter trajiciatur, tandemque salso-aqueas exuvias in oris cavo abjiciat.

Chylus ob terreo-salinam fixitatem liquidi digestivi perperam in stomacho conficitur, & intentia biliosi succiacredine imbibitus galaxiam ingreditur, per quam moleculis acrioribus turgidus sanguini commiscetur, a quo reparatus sanguis, & falsa acrimonia depravato laticem saturatus facile in cacochemiam scorbuticam, aut melancolicam facescit, in qua salso-acres particulae luxuriant, atque debacchantur. Igitur terrestria salia in sanguine soluta, vel cum chylo falsa acrimonia redolente in sanguinem deversa salini ejusdem saporis causa sunt, quæ supra sulphura prædominium potita cum insipidis partibus aqueis separantur, donec pinguibus involvantur, & terreis absorbeantur, quibusque dulcioribus, & glutinosis irretita particulis, ramenta sua salina demittunt.

Hinc cibi plurimis, atque copiosis particulis salso serosis scatentes, carnes salitæ, pisces fumo indurati, & sale conditi, fervida qualitatium miscibilium mutatae coordinationes: ita promptius calidior aër, cujus caloricæ particulae motu turbinatæ agitatae, dum in coherencia sanguinis corpuscula impingunt, sui impetus momenta imprimunt circulanti usido, ut intestino motu salini corporis rotatae moleculæ, aqueis particulis occurrentes ab hisce eliquentur, fundanturque. Unde coherens vi miscibi-

lium salinorum superata resistentia ex motu percussione partium fluidi se invicem attenuantium, contingit salium fluiditas certa proportionem, majorique in seroso-aqueis coeuntium, qui in salivali latice acervatim collecti, ac sui juris facti, salium promoveant aperte saporem.

Sic in febribus diuturnioribus a crebra, & nimia sanguinis despumatione tota humoralis massa vapescenti colliquari permittit quicquid acre in sanguine continetur, ut libere proinde fluat, ducanturque per sanguinis salis particulas, a se invicem discedere, atque mixtionis vinculum dissolvere nitentes, quæ humido agglutinante exolutionem prohibente desitunt in libertatem vindicantur, & inter quasque fluidi particulas nitendo sanguinem sondunt: qua salium eliquatione in intemperiem nimis salisam, & acrem vergit humoralis massa, unde ejusdem partes salinæ dissolutæ, & cum sanguine fluentes per vasa ad quascunque glandulas corporis derivabuntur, & per illas secernentur, in quibus naturaliter delabitur illa humoris compositio, in quam soluta partes abierunt.

Inter plurimos morbos a falso acrioris salivæ proventu ortum habentes præter gustus depravationem, quam pluries tetigimus, occurrit animi deliquium, quod quidem succedit, quotiescunque a falso-serosis salivæ acrioribus redditis particulis orificium ventriculi valde sensibile multiplici nervorum propagine intertextum vehementissimis doloribus afficitur, qui per nervorum surculos acri humore obfessos, & in spasmos concitatos ad cor propagantur, ex quibus contractis cardiæ nervi fibræ in contractione detinetur auricularum musculus, qui cum superari non possit a pressione sanguinis affluentis, auricula discludi non patietur, & in contractione persistet; quo fit ut æquabili spirituum, & sanguinis affluxu interrupto motus, ac sensus facultas simul concidat, homine animo delinquentem. Quando vero hujusmodi liquor acrioribus constat moleculis villos stomachi tantum lacessit, eum ad placidum contractionis motum sollicitat, & tunc solus vomendi oboritur stimulus. Quod si validius nervi irritari, & enormi correpti crispatione magis, magisque urgeantur convelli, contenta sursum propellent, & suscitabitur vomitus. Unde autem nerveæ fibrillæ spasmodicæ contractionis eludunt impetum, alkalinae particulae e villosa ventriculi tunica erumpen-

tes undequaque in stomachi villos impingunt, qui salibus sese in machinulas illas intrudentibus adhuc irritantur, stimulantur, & sensim corroduuntur. Hinc ventriculi interna plicæ valido impetu instræta inter se mutuo nisu atteruntur, unde bulimia cum soda originem habet. At quia a continua partium collisione, & mutuo earundem contactu divulsis fibris, perennique acrium humorum affluxu pedetentim aliquid ex ipsis partibus decedit, atque deraditur, villorum compages salibus macerata satiscit, utpote vi salium, & potentie motricis adaucto momento cunei, a quibus molliores substantiæ partes, quæ non tanta pollent soliditate, patiuntur divelli, ut ab invicem distractæ divulsionibus tandem repetitis dissiliant. Cum hac solidorum abrasione inquinatur chylus ab acri menstruo, & a salino acri fluidorum crassi eliquantur sanguinis humores, qui succo aciori quoque restaurari, dum ad intestina uberiori confluxu propelluntur, ea acrius convellunt, & irritant, ut illi perperam lacerati in validiorem, frequentioreque expulsiōis motum concitentur, unde sua molis, ac figuræ momento humor ille, sive ventriculi, sive alium viscerum superabit vim contractionis intestinorum, cum eorundem resistentia ipsi superanda, quæ dependet a flexione tortuosa, & eorundem longitudine minor sit irritantis stimuli, & vis illa, quæ a diaphragmate in intestinis ventriculo alligatis, & musculis abdominis continuè viget, nitetur majori pressione contra intestinorum resistentiam, & tanto facilius, si erit tam acris, adeoque tanto impetu nitetur, ut momento sua molis intestina distrahare possit, atque dilatare, quod cum fiat deorsum, alvi fluxus continget.

In curatione felici huius salivæ in id nitendum maxime, ut salsa acrimonia in serosa sanguinis parte delitescens non exasperetur catharticis validioribus: sed incipiendo a blando, ac lenienti pharmaco transitus fiat ad attenuantia, definendi causa in specificorum maxima copia liquorum lenium facile meabilium antiscorbuticorum, simulque lenem promovendo sudorem. Hinc liquet cur serum lactis, lac ebulliatum, pthiana diluens blande solvens, humectans huic morbo opem non raro egregiam præsent. Hac ratione correctioni feri salivæ per salsosassata, thymum, citratum, acidos succos horæi maturos, rad. aleni, corticem citri, granatorum, limo-

num, aurantium, acetosam, acetoscellare, specificis operam dantibus juvamen salsedini certo allaturos crediderim. Præter jam memorata salsa salivæ ratione conducentia addenda insuper, quæ salis humoribus prodesset docet experientia, ut pillulæ de cynoglossa, gummi tragacanthum, thus masculum, & lapis, ut sensim corrigantur peccantes humores, & subinde producendos evertant.

ARTICULUS V.

De Salivæ amaritudine.

Intimus salivæ amaritiei mechanismus exoritur a certa proportionē, certoque nexu ipsius miscibilium, quorum salino acres, & urinoso-volatiles moleculæ motu rotationis, & permixtionis agitate, dum in oleoso sulphureas impingunt, sui impetus velocitatem, & directionis nisum deperdunt, ut salium devolutæ moleculæ oleosi corporis particulis occurrentes ab hisce irriteritæ refrangantur; unde hebetata salium angulorum acutie, & cuspidibus eorundem inflexis modificantur salinæ substantiæ, quæ non nihil resinosis, asperis, hamulatis aculeis, furcatisque acuminibus gustus nervos divellendo, & sensorium non alte, sed superficie tenus fodiendo, in salivali liquore solutæ in linguæ papillas ideam amaritudinis imprimunt.

Massa sanguinea scoriis sulphureo-oleosarum partium inquinata, & adustis salium recrementis turgida fluidorum crassim sensim subvertens, cacochymiam biliosam inducit, cujus salinæ acrimoniæ corpuscula terreo-acidis particulis inflecta, ita collisionis vim, & directionis momentum in fibris committant, ut ad acinos hepatis glandulosos non coercita, sanguinis motu abripiantur in alvibiles, & excrementitios succos, qui a partibus salinis non fluentibus per suos canaliculos reparati turmatim in glandulas avolant, ubi aqueis commixta in saliva amarorem deponunt. Hinc regio morbo marcescentes sapore amaro sæpe falluntur, acrius enim ab incuneatis in nervorum linguæ papillis salium inflexis, furcatisque aculeis, etiam a mellitis demulcerentur nervei funiculi, juvenisque salium obliuientium delectatione afficerentur fibrilla, divertus tamen non perciperetur sapor, sed suavia papillas impollendo excitarent inflexi salium impressionis impetus, quibus eodem in nervis remanente timore ex amarulentis concepto,

omne

omne dulce linguam quoque blande demulcens equidem amaresceret.

Quod si hepatis laxata fibrarum crispatione, reſeratis ductibus, & perviis glandularum, ejusdem folliculis adhuc occurrat ſalivæ amarities, opinari ducor, particulas ſulphureas, & ſalino fixas enormiter exaltatas in cruoris maſſa uberius, ac citius in bilem facere, quam quæ per tubulos ſellis ſecerni, aut ab ipsis eliminari queat. Dum cor validius, atque frequentius contrahitur aucto ſolidorum niſu augetur ſanguinis impetus per vaſa naturali major, adeoque a celeriori liquidorum motu ad latera nitentium particularum coherencia dimoveretur, & niſuum directione commoti ſalini cunei intra nexus ſanguinis tenuiora coercita ſalia excluduntur, ex quibus imminuta vi reſiſtentiarum in ſanguinis coheſione, particule ſulphureis conjunctæ intra ſe invicem nitunturque, ut in partes minutas deciduæ ad ſummam mobilitatem evehantur, atque in poros, & meatus, per quos erumpere poſſit, ubique novos appellant. Igitur bilis a glanduloſis jecoris, ob adauctum ſui impetus momentum haud coercita, anguſtiis, a ſanguine cum ſero ubique decideret, cum quo ad glandulas oris delata erumpenti ſalivæ tincturam amaram imprimeret. Hac de cauſa in febribus ratione caloris, & motus magis agitantis, fit, ut partes ſubtiliſſimæ, & ſumme mobiles vagentur libere per corpus ſanguinis, quæ non cohibita a partibus humidis ſuo freno deſtituuntur, & niſum quemlibet vehementiorem exerentes, citiorem, acrioremque reddunt ſanguinem. Poſita autem hac fluidorum labe ſanguis natius biliſo acrem indolem, ubi recrementa, ſalium, ac auctorum ſulphurum uberius expandens, ſerum ſaturabit ſenſim bilis ſapore, quæ in ventriculum repens ſurſum aſcendet per ſuperficiem œſophagi; vel cum ſero in glandulis cumulata in oris cavum decideret, inſcietque amaro linguæ papillas.

Diutius detenta fluida in ſalium eſſeratione per tantum temporis ſpatium, quantum ſatis eſt, ut plurimum ſalis in ſanguine eliquetur, alia aëri aſtuanti, ac præſervido inde associata a partibus aqueis ſe junguntur, a quibus, cum non temperetur eorum impetus, erit ſanguis univerſus in ſuas partes ſiccaſ, & ſalino fixas, atque mobiles maxime ſolutus, a quo cum exprimantur ſalia, & continuo ſolvantur, non poterit a canaliculorum ſuperficie non abri-

pi, & in naturale liquidum redigi, ut evadat tam fluxilis, tam coherens, ut pedentem per vaſa circumfluens uberiori amaritudinis peni non elaboretur.

Dum particulae ſalivæ amaricantes linguæ poros ſubeunt undequaque nervorum fungulos continuo laceſcentes, ita tenduntur irritatæ nervæ fibrillæ, ut quicquid particularum e cibis ſarici ſalivali elicitur, ſuum nequeat genuinum pandere ſaporem, ſed potus, cibique omnes amarore ingrato inquinari creduntur, unde ſatiſcens guſtus falſo deceptus amaro dulce exhorret. Hoc ſapore infecta ſaliva in ventriculum deſluit, ubi in liquore gaſtrico exundans moleſtia afficit ventriculi tunicas, quarum fibrillæ ab acri, & erodente humore ſeſe intrudente in membranarum poros intenſius conſoſæ divelluntur. Igitur excitato ſenſu eroſionis, & punſtionis dolor ſtomachi, & cardialgia.

Sit inſuper humor ita vitiatuſ, ut continuo fibras pungendo cogat ſpiritus, impetum, & niſum majorem in emiſſaria nervorum intra villos muſculi ventriculi conſtrictiones exerere, ut ab ipsis in perpetua contractione detentus conſtrictor muſculus convelli patiatur, quo ſtatim ſingultus enormis producat. Si vero amarities viſciditati aſſocietur, & abſumetur humiditas quoſcunque villos humectans, producat lentor ad arterias, glandularum ſalivalium obſtruens emiſſaria, a quo impedita ſaliva, ne libere fluat per ſuos canaliculos, proveniet neceſſario linguæ ſiccitas, cujus ſuperficies a fixo, & ſicco ſanguine hærente ad linguæ canalium extremitates, in lividum colorem abeunte, ſenſim infecta colore illo, alius in linguæ fibris repente in nigrum facere poterit. At vero traduſto bilis lentore, & viſcida ejusdem amurca intra ventriculum, partes ejus acriores per œſophagi ſuperficiem repentes non ſolum palatum, ſed & linguam ſuo amarore, ſuiſque coloribus inſciet. Verum per aſſuxum biliſi ſucci in motum contractivum extirabitur ventriculus qui in valida corrugatione detentus a vellicante, eſſi minoris quantitatis etodente liquido, cum non poſſit ſuperare propter adhaſionem mucidæ bilis ad membranas reſiſtentiam contractarum tunicarum, ſpaſmo dolorifico corripietur: ob quam affectionem intenſius vexato dabitur ciborum averſatio cum naſea, quæ mutabitur in vomitum, ſi humor copioſior fuerit, & in totam cavitatem ventriculi uberius derivabitur.

Se-

Sedulo perpensa natura bilis, ejusdemque commixtione cum saliva, observandum maxime, si saliva amarities ex amurcosa bile, viscida, inerti circa Jecur impacta, oculis hepatis glandulis, sensimque affusa sanguini producat. Tunc huic indicationi satisfaciunt aperitiva stimulantia, quæ figura, partium mobilitate vasculorum fibrillis impacta vim eorundem contractilem augendo, succos stagnantes dimovent. Inter hæc eminent salino volatilia oleosa, & aromatica, uti plantæ omnes, quæ sale alkalina, oleosque aromatico abundant: inde tartarea omnia, quibus accedunt alkalina salina lixiviosa, vel composita, vel naturalia, uti salia essentialia acrum plantarum. Quod si amarities a bilis copia exoritur, quæ simul acredine peccet, præstantissima erunt, quæ bilem imminuunt, & acredinem temperant: ut decocta ex amaris hepaticis frigidioribus rad. gram. ruthe alparagi, cichoreæ, fragariæ, foliorum taraxaci, tunariæ, agrimonie sem. alkeckengi, additis salibus essentialibus plantarum, acetoæ, chichorei, agrimonie &c. exinde tollatur bilis copia a ramis duclibusque hepaticis per emetica antimonialia. Si bilis potentius ad os eleveatur ob sui volatilitatem auctam, ob copiosiores spiritus volatiles ipsi admixtos, amarities ejusdem corrigunt acida tartarea, spiritus minerales acidi dulcificati; inde alkalica terreo-fixa absorbentia, ut e. c. ebur sine igne, coralia rubra, margaritæ, oculi cancr. antimon. diaph. bezoart. mineral. bezoar. martiale. In hoc censu reputantur acida austera, ut pruna sylvestria, succus berberum, granatorum, aquosa quævis diluentia, emulsiones e seminibus frigidis, salina, ut est sal gemmæ, marinus, nitrosus; quod inde totum perficitur alimentis potibusque cito acescentibus, quorum ope sal amarescentis saliva volatile magis reprimatur, & paulatim emendatur.

ARTICULUS VI.

De Saliva Dulcedine.

Saliva dulcedinem constituunt globulosa corpuscula molliter acuminata, ex oleosis flexilibus moleculis acido acibus salium particulis inter se mutuo agentibus, quæ a determinata partium coordinatione resultantes, ac refracto salium nisu se invicem attemperantium exortæ, peculiari inter se combinatione in aqueis insipidisque

corpusculis dissolvuntur; quorum salium asperitates sola particularum collisione nulla edulcorantis cujuspiam facta additione ad sphæram accedentes fere omnem acrimoniam exuunt. Hæ enim salivari liquore commixtæ fibrillas linguæ impingentes molliter nervorum papillas titillando oleosis salibus succulentam grati, suavisque saporis substantiam organo gustus exhibent. Non secus ac testante Boyle de Mechanica saporum ex insipido corpore, summeque corrosivo substantia dulcis elicitur. Selectum enim minium si purificatæ aquæ forti, aut spiritu nitri affundantur, donec in se mutuo calore agentibus, requisita metalli portio dissoluta fuerit, menstruum instar sacchari dulce suppeditabit.

Chylus itaque pluribus refertus particulis salino-acidiusculis, oleosis tamen quibusdam, & mucilaginosus involutus in sanguinem ab aqueis dissolvitur, jugiterque irrepens ob partium ramolarum intra viscosas unionem, substantiam congrue mollem, aquabilemque salis, ac sulphuris gustui exhibens linguam quodammodo oblinat, ejusque partes blando tractu præterfluens leni titillatione afficit, lenique affricu sensorium titillat, ut exinde resolutis per sensoris nervos in molles aculeos particulis antea implexis jucundus voluptatis sensus excitetur. Hæc euchymi succi substantia a motu cordis ita exagitur, ut longiori inter partes sanguinis attritu, & valido ad vasorum latera per repetitos circuitus allitu naturale ejusdem gluten perperam eliquetur, a quo turpiter fuso collabentes partes non instantur. Succus iste primum sanguinis rudimentum in minutiores particulas divisus relinquit flaccidorum villorum cava, in quorum sacculis diutius detineri non potest. Hinc ratione minimæ molis, & tam paucas inter illius componentia cohesiones oleosæ chyli partes fluido eo confusæ ad tantam solutionem rediguntur, ut eodem impetus momento non major resistentia paretur a partibus chyli gelatinosis, quam a particulis aquæ, non erunt majoris molis, nec minoris, aut majoris momenti, ut ad glandulas salivales simul urgeri non possint. Quoties igitur sanguis aqueis chyli moleculis plurimum scatens, aut non poterit extendere vasorum lateralium sacculos, aut a dissenso sacculo vi fibrarum compressus in venarum oscula rapi, urgebitur quidem tanto impetu, ut possit ferri ad inflandos sacculos; At cum

F f f

ma-

major sit circulantis sanguinis impetus, quam nifus minimarum particularum componentium in cava fibrarum nitentium, particulae illae habebunt eam diametrum, quo ad villorum poros permeandum requiritur: sed ulterius circulates eo usque dividuntur, quousque impedito in solidis partibus irroratu, cum sanguine refluente a salivali menstruo possint absorberi, ut suavioribus corpusculis, seroque innatantibus turgidula saliva dulcedine nauseosa corripiatur. Quod si fluor lactescens ob particulas diversae gravitatis, ac potentiae fluido universali confusus, & vertiginoso motu exagitatus, nullam sui patiatur mutationem, sed per universum corpus diffusus ostiola tubulorum salivae inveniat plus julto patentia (antequam particulas nutritias partibus cunctis attulerit, cunctaque viscerum fermenta, atque utiles humores reparavit) per ipsa confertim effluet. Laxatis enim tubulorum fibrillis ob naturalem tensionem, & villorum tonum collabentem, corruunt fibrae folliculorum salivalium circulares, quae cum repellere non valeant impetum impingentis fluidi, & in pervios glandularum poros erumpenti chylo contraniti, aqueus humor cum volatilibus salibus, atque oleis tenuioribus cum paucis acidis, ac terreis implicatus in salivam mutabitur.

Inter causas externas hic occurrunt potus, cibique errores, qui cum plurimi praecesserint, quales certo sint, non est operae pretium determinare. Aliquando febre tertiana laborantes dulcedine admodum fastidiosa afficiuntur, a succis primarum viarum depravatis exorta, quod Bortichius in ephemer. Nat. cur. in muliere post febrem quartanam tertiana correpta observavit.

A dulcibus salivae particulis flexibilibus nerveas linguae papillas blande titillantibus non solum leni spirituum animalium motu dulcedinis idea in anima excitatur, ut omnia ingesta dulci sapore praedita reddantur: sed ab iisdem acido acris refractis, ac remissis salivae corpusculis jugiter in ventriculum deglutitis, atque a reliquarum particularum conjugio liberatis nervorum fibrillae molestis vellicationibus afficiuntur, ut a stimulo irritativo contractionem sui convulsivam patientibus nausea corripiatur agor. Et cum intima ventriculi superficies obducta sit glandulis, in quibus secernitur humor salivae similis, qui ejus tunicis inherens, dilabens, sensimque repens easdem quodammodo convellendo producet sensum summo cum sa-

stidio, quod propter paucitatem, & inertiam spirituum in angorem stomachi mutabitur.

Gastricae hujusce lymphae molli, & flebili molecularum contextu combinatae digestivas vires facile eludent alimentorum resistitiae, quorum cohaerentes particulae intra ciborum nexum coercitae retuso menstruo reluctantur, & inertes solventis cuneos hebetant; unde non dimotis ipsius solubilis particulis, nec alimentorum compage intestino motu resoluta, eorundem concoctio immittitur, atque depravatur. Cum autem ciborum in stomacho incoacta dissolutio sit ad chyli elaborationem ordinata, clare patet, si alimenta non fuerint satis in ventriculo dissoluta, ab iisdem non posse elici particulas seroso gelatinosas, quae in chylosam substantiam mutantur. Quoniam vero supra sulphura salibus praedominio potitis liquores prius dulces fiunt acidi, ut Piso in Brasilia observavit, succum, ex quo sacharum concrevit, a plantis elicatum intra breve tempus acescere, ne miraberis si in hac chyli morbosa dyserasia cum acido motuum turbationis, atque ebullitionis dulcia, & sacharina ineuntia dolorosas in lateribus cieant commotiones, appetitum compescant, ructus nidorosos excitent, ac flatulentias.

Hanc dulcedinem salivae nauseosam corrigent in primis acida, subinde amara. Quoniam si extrinsecus ab aere, si extrinsecus a motu certus caloris gradus certaue internarum partium salivalium constitutio exoritur, quae varia ac imperceptibili transcurfione eadem mutuo sibi allidens tenuior, mollior, minus, rigida, atque magis quam prius congrua sit corpusculis salivalibus imprimatur ille motus, a quo non acriter, sed blanda, lenique titillatione afficitur gustus organum. Hoc ex eo conjicere licet, quod sales vegetabilium salibus asperiores aciem suam, atque saporis acrimoniam sola particularum collisione exuentes, in substantiam mitem gustui gratam pene dixerim reducuntur. Quod autem ab acidis, & amaris elicita corpuscula chylum congruentia, tenaciorem, quam praedicta dulcia corpora solent, linguae saporem imprimant, mirum nemini videri poterit, qui advertere voluerit, quousque sola constitutionis, mutatione, mutuoque partium inter se conflictu dulcis corporis particulae, ab amaris, & acidis corpusculis penetrentur. Acuentur enim corpuscula dulcia, & compositum saliva-

livare mutabunt. Hinc acido salsa, ut tartarea, vitriolata, elixir proprietatis saporrem ingratum, & nauseam dulcedinis emendant.

ARTICULUS VII.

De saliva præter naturam. Prout habet rationem remedii, ac motus critici in morbis.

Non aliunde Medicorum impatientia tam aperte cæcutit, quam ab attenta motus critici ludentium, & juvantium speculatione neglecta, aut ambiguitatum obcuritate latitante, minimorum quoque exactissima perquisitione non æquissima lance perpenſa. Quisquis enim artem faciens absque sedula remediorum, & motus naturæ contemplatione peritus, est furibundus, atque cum ense cæcus in hostem gladiator, qui in minutis cespitans, veluti spretis insolitæ flammæ scintillis, incaute suæ famæ prospiciens, magnum, tam ad ægri salutis jacturam, quam nominis Medici ruinam sæpe excitat incendium, quod miserrime serpens medentibus inscitæ notam quotidie inurit. Hinc in hac longa remediorum cognitionis experientia superbire senes, ingenio, & perspicacia æmulari juvenes juxta meum in magnam admirationem ita rapit ingenium, ut tanta nostri sæculi felicitate in hac arte quandoque oculatum tyronem (qui variis mathematicis præceptis, utpote statices, hydrostatices circa structuram animati corporis recte philosophans, humanum corpus in structura æque, ac in effectibus a tali structura pendentibus numero, pondere, & mensura rimatur) valere credam, quam magistrum non curantem, qui dum insolita naturæ tentamina observat, indebitis remediis statum, rectosque naturæ motus perturbat. Hujus inquisitionis severitatem dum per ratiocinia attingere non possumus, a tali expulsionem morborum allevationem, vel eorundem recrudescentiam religiose observare debemus, ut ab illo motu non divertatur natura, aut removeatur, ut exinde præcepta ad exornandam praxim eruamus. Cæcutiente igitur in arduis morbis ratione, conatus naturæ utcunque fuerint detegendi, nullisque inanum speculationum fucis adulteratæ menti proponendi ut olim Asclepiadum more eleganter sine coloribus pingentium, quicquid obscurioris morborum causæ inest, percertam, constantemque mor-

borum crifim feliciter eruatur. Medentes itaque plus quam par est in theoriarum elucubrationibus luxuriantes indigestis cogitationibus sapient, nisi diuturnæ insolitæ crifcos contemplationi in exercenda praxi omnino se commiserint. Morbi enim absconditum quid sunt, sive ut Hippocrates, *divinum quid in morbis inest*, suasque causas modis tam reconditis & ab humana mente adeo remotis involvunt, ut difficile sit quidquam in illis investigare, nisi attenta, & nunquam intermissa circa morborum judicationem adhibeatur observatio, in qua si consensesceret Medicus prognosticandi disciplinam observando acquisitam, apprimè calleret. Quare summopere mihi arridet in morbos illos, qui per salivationem judicantur, detegendos, laborem impendere, ut inde post sedulam accidentium contemplationem ad rationalem disciplinam reducantur. Natura enim, quæ est omnium morborum vera medicatrix, pro sanguinis despumatione, & effæti humoris evacuatione salivationem seligit, & uliginosas exuvies ad has glandularum salivalium syrtes nonnunquam deponit. Ita febrem ardentem naturali ptyalismo profligatam exhibet Guer. Rolfinckius ord. med. lib. 3. Vertiginem salivatione sponte orta solutam observavit Nicholaus de Blegni zod. Med. Gal. annot. 1. Salivationem naturalem in phthysi salutarem observavit D. Joannes Paulus Vulfstain Archiater Cæsareus, & Academiæ naturalis Curio, ephemer. diligentissimus in dec. 2. anno 1. miscel. nat. cur. observat. 122. & scabiem sædam in milite oborta salivatione nullo alio præsidio adscito sanatam cum D. Hieronymo Baruffaldo notavit Joseph Lanzonus Sylvius Deleboe: *Contingit, ait, quidem aliquando licet varius salivatio sponte, quod in hisce regionibus factum observavi, & quidem cum notabili ægrotum commodo, & liberatione a morbis chronicis a pituita semper pendentibus.* Sydenhamius in febre continua annorum 1667. ait: *Ptyalismus quandoque copiosus sub finem accedebat, si nempe nulla insignior præcesserat evacuatio, atque ægro julapia refrigerantia imperata fuerant, quo quidem si nec evacuationibus, nec usu medicamentorum calidorum fuerit interceptus, morbus ultra spem omnem fugam sibi querebat.* Nobis sæpe mulierem Hystericam spasmodicis affectibus passim recrudescentibus fortè suborta salivatione prompte relevatam, observasse.

Hic salivationis spontaneæ motus optimè

cessit in horum morborum curatione, ad quam quidem aptus natus prae ceteris mihi videtur, cum aegris noctu, diuque miserrime per annos excruciatu levamen attulerit. Natura peculiari quadam lege morborum causas evellit, nisi Medicus intempestivo, ac stulto remediorum usu criticos conatus turbaverit. Sic subdit laudatus Sydenhamius: *Jam vero, ut supra monuimus, febris hujus solutio ut etiam variolarum (que, sors ejus germana merito audiunt) per salivationem non raro fiebat, quae quidem nunquam non salutaris fuit, ita ut eadem liberalius prodeunte tam maculas revera purpureas, quam febrem ipsam evanescere oculis viderim meis. Oborta itque salivatione nulla omnino evacuationo convenit, neque quae vena pertusa, nec injecto quae sit enemate; cum ab utraque periculum sit ne humor alio divertatur. At serum lactis, atque alia refrigerandi vi pollementia necessariam in salivatione elicienda operam navabunt, ut contra cardiaca, & quaecunque alia calefaciebant materiem inspissando, ejusdem educationi officiebant.*

Nec mirum sit aegros ab effectibus chronicis salivatione spontanea feliciter evadere, si diuturni morbi a sero acri saluginoso, salso acido, salso muriatico, fixo volatili glutinoso, in massa sanguinis redundante plerumque excitantur. Sanguinis salibus turgescens ad salivae glandulas dum copiosius impingit, a sero sensim adventante, & a sanguine perpetim urgente distenduntur. Cum enim novus serosus latex ad dilatandos glandularum folliculos, in quos nititur, pervenerit, cum liquore in illis jam contento commixtus vim supra expansarum fibrarum connisus, facile exeat, adeoque nullo glandularum salivae orificio, earundemque fibrarum fasciculo cohibitus sese in fluoris motum vindicat, ceterarumque fibrarum jugo excusso in os indefinenter erumpit, & humores serosi acres, nunc fluidiores, nunc tenaciores cum aegrotantium commodo ex ore fluunt, exciduntque.

ARTICULUS VIII.

De saliva ut signum.

Nullus fere morbus aegrotos inopinato perimet, si sedula salivae observatio, & attenta linguae inspectio, utpote, quae lymphae, sanguinisque statum certius ostendit, & morbos occultos, eorundemque difficilem solutionem denotat, medentes con-

sulat, quos per salivam diligenter singulorum morborum naturam expendentes, tantoque signo praxim locupletantes, nullus falsitatis, aut ignorantiae accusabit, nisi qui artem prognosticandi deridens, hanc incertam medicinam pronunciet, quo fit ut impetu animi de hac differens ingenio suo, & inutilibus commentationibus magis addictus, quam naturae monitis innixus, Hippocraticae sectae crileos, & coctionis leges adamussim speculanti, quae tantopere viguit, ruinas adstruat, & etiamnum calumniis proscindat. Quamobrem ne medentes ignominia obruat, eventum morbi praenotionem Medicis maxime opportunam fore arbitror, ut si homo aliquo pernicioso morbi turbine forte conjiciatur, a Medico naturae vaticinio instructo procul prospiciatur; & ut hujus artis nauticae peritissimus scopulorum, & syrtem praevisor, ventorumque, coelique aspectus observator futura cognoscat, ne nova inopinato ingruente tempestate opus improviso ruina quariatur. Ut igitur ad praxim nos via stabili exornandam dirigamur, impavidique reddamur in praesagiendo morborum eventu, ne aliquis contra medentes caecus imperitorum impetus fiat, per longos, & patientes experimentorum decursus, & juxta veterum monumenta prognosis instituat, quibus ad exitium aegrum tendere, vel ad salutem praevidentes Medicorum existimationi consulere videbimur, nec de futuro damno inculpabimur; unde medicinae parens Hippocrates lib. praenot. haec habet: *Cum etiam si divinum quidpiam nobis inest, hujus quoque praevidentiam perdere. Sic enim optimo jure & admirabilem, & bonum se praestabit Medicus: Quos enim superstites fore cognoverit, eos rectius quoque servabit, utpote ex multo tempore singula consuevit perpendens. Itaque morituros, victurosque praesens, atque denuntians omnem prorsus columniam vitabit.*

Idcirco ut morborum eventus ex saliva nobis innotescat, Hippocratica observata nobis experimentorum additamentis confirmata perquirere licet, quibus occasionem praebet in observatis Hippocratis moriendi cupiditas, & inde dolorem capitis primo experientia consulendi, quem levare a sputo crasso, & non olenti in Coac. praenot. docet, ut ubi ait Hippocrates: *Capitis dolorem solvunt sputa crassa, & non olentia.* Quoniam decubitus cujuscunque humoris tenacioris, lenti, motus crassi, frigidi ad membranas cerebri, sive pericranium, tan-

si est nifus, ut membranz, & nervorum fibrillæ ita comprimantur, urgeanturque, quousque in hac positione fisti absque majori fibrarum divulsione non possint, neque compressi villi contrahi, nisi per copiosiorum spirituum influxum compressionem illam superantium, nec spiritus per compressos nervorum tubulos fluere possunt, nisi violento, & majori nifu in motum raptantur, quorum motiones a pressionibus provenientes, augeat tremorem in fibris inomenti plus æquo majoris, a quo disilientibus quaquaversum villis majori cum impetu cerebrum concutientibus, derivatur dolor. Ab hac doloris vexatione liberatur æger, si humor summæ inertiz in partibus minimæ pressionis consistens, vel villos cerebri comprimens, in sanguinem trajiciatur, qui per sanguinis circuitum tandem producit ad salivæ glandulas ex venis in arterias, ac demum per has in glandulas derivatus. Igitur si copia humoris in salivales glandulas e cerebro trajecti sit crassa, & suis partibus maxime coherens, disfluat a capite doloris materies, adeoque levabitur dolor. In quibus enim sputum olet, cum id quod intus remanet putrefieri valet, fere sphacellari, vel saltem corpus occulte infici portendat, suspensam semper attingit bonitatem, nec remittitur. Pro hujus textus coronide inquit Hippocrates de morbis acutis: *Si e naribus effluerit sanguis, solvitur ægrotudo, atque si sudores supervenerint judicatorii cum urinis albis crassisque, & lenibus subsisteritis, & abscessus aliquis factus fuerit; verum si absque his solvatur, revertetur ægrotudo vel coxa, vel crux dolebit, expuetque crassa, si sanus est futurus.* Cum in morbo acuto humores nimia effervescencia commoti, torpidi, aut parum mobiles per vasa nituntur, cave ne stulto, ac intempestivo purgantium, & diaphoreticorum usu motus naturæ divertas, in quibus si quiesces, paulatim relaxato solidorum tono, oriatur laxitas debita in humorum fluentium compage, quibus mutato inter fluidorum impulsu, & solidorum pressionem inæquali æquilibrio, liquida hinc illinc, quo debent, excurrunt, celeritate fibris proportionata, circum quas dum pererrant, nituntur in arteriolas quaquaversum. Unde si occurrant vasculis capillaribus narium tenuiorum, vel a membranarum porulis colligantur, aut ad glandulas urinæ, sudoris ita impingant, ut sustinere impetum illum non possint, in forma sanguinis, aut alio-

rum crassamentorum secernuntur, indeque morbus perfecte tolli aut subigi poterit. Verum si absque hisce solvatur, quia videtur potius sopita quam resoluta causa morbifica, protinus revertetur ægrotudo, vel coxa, vel crux dolebit, & tunc si evadat æger, & sanus sit futurus, expuet crassa, cum juxta Hippocr. de morb. signum concotionis sit crassities in urinis, in egestionibus, in sputo, & in pure.

De sputo autem hinc maxime solliciti sumus, quoniam humores mille modis, & gradibus virium inter se miscentur, unde diversitas accidentium in morbis a diversa permixtione humorum exorta non semper idem indicat. Hujus salivæ proventus in mentis torpore occurrens cum a maxime flaccidis, & concidentibus glandularum villis cohibeatur, ita ut per membranarum mollitiem fluere possit quantum seri opus est ad generationem salivæ naturali quantitate majorem, fieri non potest, ut solidæ nervorum partes ad mollitiem naturali majorem redactæ in undas veniant sensibus excitandis necessarias: hinc lethargus, cujus signa describit Hippocrates lib. 2. de morb. *Tussis oboritur, & salivam sputat multam, ac liquidam, & nugas garrit, & ubi nugas desierit, dormit.* Ex lethargico autem salivam multam spuente tam aperte patet humorum frigidorum collectionem esse veri lethargi causam, ut nihil sit opus in causarum examine ulterius immorari, eoque magis quod si quid esset explicatu difficile, facile ipsius necessitas ex Hippocrat. lib. 3. de morb. curam tradente explicatur, dum ait: *Ut plurimum sputat, & calefiat, & a vino abstineat.* Cum autem partes flaccidæ, quæ particulis suis minus coherent, quam in naturali statu, cedant per minima, & vix restituantur propter mollitiem, quæ a crasso lentore cerebri glandulas infarciendo provenit, si forte contingat, ut moleculæ salivæ, quæ fibræ nimio saturatæ mollitiem acquirunt, cum sanguine ita fluere incipiant, ut confertim separentur in glandulas, dura, piaque mater elaterem prius relaxatum acquires remorantis fluidi resistantiam superat; qua ratione intensius crispatisque fibris oscillatio villorum cordis, meningum, pressionibus æquilibrata sanguinem æquali motu in gyrum propellit, unde salivæ fluxus lethargo superveniens afferet spem salutis.

Ut vero ob salivæ copiam caput infarcientis evadit homo lethargicus, ita dum exic-

exsiccat, in ferox delirium rapitur, quod falsus est Hippocr. in prædit. *Lingua aspera, & resiccata phrenetica sunt.* Quoniam in phrenitide ab humoribus solutis in calorem abeuntibus excitata sanguis toto impetu jactus per universum corpus celerrime rapitur. Ex illa partium minimarum attritione exuberans calor, absumat quicquid humidi inter duas quasque sanguinis particulas continetur, non affluere permittit illud liquidum ad glandulas, quod ceteroquin a partibus humidis non disjunctum continuo impelleret, adeoque destitutum suæ limphæ vehiculo urat oportet villos linguæ, cujus tilix adusto sanguine combustæ summe arefcunt. Per calorem autem resiccatis linguæ papillis earum vili in superficiem assurgentes penuria humidi invicem sejuncti instar cunei digitos feriunt: Hinc arefcet lingua, si phrenitis orietur.

Capitis morbis succedit faucium inflammatio, quæ in Hippocrat. lib. 2. de morb. habetur: *Febris, & dolor concipit, & fauces inflammantur, itemque maxillæ, & salivam deglutire non potest, sputum autem crassum, ac multum, & difficulter loquitur.* Quoniam in angina humorum copia ad fauces ita subsistit in canalibus suis, ut minus vivide in fluxum acta, vel arteriolas distrahat, vel e canalibus in interstitia derivata vasa infarciat, in quæ depluit, adeo exundat in glandulis ad summum œsophagi positis, aut laryngi proximis, ut ad quem cum hient glandularum ductus in os ducentes, materia quælibet salivæ ad lacunas glandulosas perducta, ibidemque pressa per impetum sanguinis superfluentis exprimitur: & quia ratione pressionis, & humorum copia musculus ad basim linguæ, crassis, lentisque humoribus obrutus plane pervertitur, æquo flaccidior nervus erit, adeoque ita concidet, ut prohibeatur linguæ motus, unde sputum crassum, & difficulter loquitur. Sputa autem viscosa, crassa, valde alba, quæ violenter educuntur, mala sunt, inquit, Hippocrat. in Coac. prænot. Si igitur obex inflammationis, quo impeditur, & retardatur motus sanguinis per arterias, sit tantus, ut per continuum sanguinis affluxum a minimis canaliculis tenuior pars subsistentis liquidi exprimitur, vel in motum ducatur, remanebit siccitas, quæ coget villos, ut humoribus affluentibus non cedant, eoque magis lentor cum siccitate conjunctus fiet minus ad motum facilis, qui connitentibus fibris subsistere cogetur frustra nitens in flu-

xum agi; per continuam autem, & validam fibrarum oscillationem toto impetu exprimitur crassior, & viscosa saliva, quæ violenter educita, cum ostendat fibram non laxari, humores non concoqui, mali omnis esse videbitur.

Quanti fecit Hippocrates, ut in angina saliva fluat, apparet in 2. de morb. ubi ait: *Si saliva supprimatur myrti ramulum complanatum sumito, & tenera ipsius summa parte incurvata, & molli lana obvoluta in fauces immissa salivam expurgato.* Si materia salivalis ex suis canalibus in glandularum cavitates derivata adeo villos glandulosos infarciat, ut humores retro urgentes ad fauces subsistere cogantur; adeo præ humorum copia tendentur villi, ut per continuam, & validam distensionem jugiter in distractione persistentes inepti expulsionem ejus materiæ reddantur; natura propter copiam ejus non valet ipsam totam secernere intra illud temporis spatium, quo ex fluido sanguine eandem recipit angina velocitate minori instructo, quæ si confertim proluciat a myrti ramulis, statim deplentur vasa, quorum fibræ nimio fluido eas distendente depletæ, ita assidua motus exercitatione roborantur, crispantur, ut per fortissimam illarum fibrarum constitutionem majori velocitate, ac impetu excurrat sanguis, subsistentes ad fauces moleculæ, vel ad contactum fibrarum circulantes, tardiorique gradu progredientes ad solidi leges recipiendas ulterius aptæ pressionibus subjiciuntur, & a vivido fibrarum elatere, ac proinde potentiore resistentia fluidi impellendi vi, hinc inde exprimuntur: ex quo Hippocratis consilium ex voto succedit. Deficiente autem ex toto saliva in angina summa perniciēs est, de qua Hippocrat. lib. 3. de morb. vulgaribus ægrot. 7. ait: *Illius anginosæ, quæ apud Britonem aiebat primum a lingua cepit vox esse obscura, lingua rubens desiccata erat primo die, horrida incaluit, tertio rigor febris acutæ: tumor colli, & pectoris ex utraque parte, subruer durus, extremitates frigide, & livide, deorare non valebat dejectiones, & urinae subsistunt, quarto cuncta exacerbata sunt, quinto periit.* Hæc scemina apud Britonem agentis genuina faucium inflammatio fuit, & fortis, in qua a sanguine nitente propter obstructionem ad fauces erubuit lingua, quæ magis sicco per vim caloris proxime ad fauces hærente lentore liquidiores salivæ partes absumente desiccabatur, in qua quoniam

riam a siccitate fibratum, aut per solam compressionem nervorum, tum obstructionem vasculorum, qui ad linguæ basim ducuntur, poterat impediri, aut tolli motus ipsius linguæ; adeoque, *primum a lingua cepit vox esse obscura*. Penuria igitur salivæ laticis desiccata lingua, humor calidus, & valde acris cumulabatur intime intra collum, qui ad interiora æque, ac ad exteriora excrefcens ita comprimere potuit arterias carotides, & urgere canales faucium, ut intra ipsos subsistente sanguine, & deorsum repercusso extuberaret tumor pectoris ex utraque parte *subruber durus*, qui pulmonum fistulam comprimens excursum aëris ita prohibere potuit, ut respirationis via oclusa *spiritus sublimis* educeretur. Unde defectu motus sanguinis in refrigeratis extremitatibus, & quiete ejus livescens, cum quarto cuncta exacerbata fuissent, quinto periit.

In raucedine sputa viscosa salsuginosa mala subdit Hippocrat. in Coac. prænot. quoniam intima tunica asperæ arteriæ confertissima est glandulis, quæ subviscidum quoddam, & mucilaginosum perpetim affundentes, adeoque in cavitatem ejus derivantes jugiter fistulam pulmonariam lubricantes emolliunt: si igitur copia humoris e vasculis sanguinis in glandulas trajecti sit tanta, ut tracheam, & glandulas omnes inundet, atque suis partibus maxime coherens difficile disfluat, ut ipsas multo magis afficiat: debitus lymphæ proventus asperam arteriam humedantis non solum intercipietur, verum relaxabitur, vel constringetur tunica glandulosa, & partes glandulosæ circa superiora asperæ arteriæ sitæ magis intumescunt: Hinc fiet defluxio in vasculis pulmonum, unde raucedo, quam excipient sputa viscosa a lymphæ magis compacta, & in glandulis stagnante, inde salsuginosa ab acri humore, & solutis salibus exorta.

Cum autem glandulæ asperæ arteriæ sint maxime molles, & ab hujusmodi humoribus vellicabiles, atque solubiles, facile irrepertabes, si salium soluta compages cum lentore combinata in vesiculas pulmonares diffluens pro diverso acrimoniæ gradu partes solidiores pulmonum corruperit, unde *sputa viscosa, & salsuginosa mala*. Si majora quæris, plurima pulcherrima vide Coac. prænot.

Quibus pleuriticis in principio lingua biliofa sit, hi septima die judicantur, quibus autem tertia, aut quarta die, circa nonam.

Lingua biliosa, & crassa, quoniam materiam crassiorem intra pulmonum arteriola; cumulatam e vasculis dissolvi, & ad concoctionem tendere significat: si hujusmodi linguæ color contingat circa initium morbi, quo scilicet tempore non nisi parva materiæ collectio facta esse potest, nec membrana pleura violentiorem distractionem passa est, septima die morbum judicari indicabit. *Bulla vero sublivida oriente in lingua in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit, & judicatio ad decimum quantum diem pervenit, sanguinem autem plerumque spuunt*. Cum autem color obscurus, & nigro oleaginosus arguat & lentorem humoris, & cruoris nimiam densationem, & pravam quantitatem ejus, quæ difficile subeat pulmonum canalia, & difficile ab illorum tunicis divellatur, non ita facilius discutietur; unde pulmo pressus a distracta pleura redditur minus aptus extensioni, quo fit, ut vasa sanguinis pulmonum ita comprimantur, ut ex his exprimi sanguis possit, vel a compressis vasculis ita retineatur impetus sanguinis, ut intra ipsos pulmones detineatur, quo sistente, & novo semper ac semper impingente sanguine ita divelluntur per minimas partes vascula, ut distractionis nisum sustinere non valeant, unde sanguinis sputum plerumque contingit. Inde *peripneumonicis, quibus lingua tota alba, ac aspera fit, ambe pulmonis partes inflammatae sunt*. Linguæ membrana cum interiori pulmonum, quæ bifida est, continuata juxta pulmonum inflammationem exasperatur, ac exsiccat, quæ inde in ipsa sicciore salivæ parte ob humidum crassum inter papillas fere magis hærentem, ac spumescentem albescit, cum quod humidius est ac tenuius abeat in auras. Hinc cum admiratione, & maxima cum voluptate hanc distinctionem notat Verna de pleuritide, in qua Hippocr. lib. 1. de morb. si contingat nimia salivæ copia, ut ager expuere nequeat, suppurationem formidat. *Pleuritici præ salivæ copia expuere nequeunt suppurati fiunt, & partim pereunt, partim evadunt*. Humiditas enim nimia villos ad laxitatem disponens parit concidentiam membranarum, & dilatationem glandularum, quæ ratione minimæ virtutis, quæ villi ad mutuum contactum nituntur, & ab illo dilabuntur, a quocunque lentore facilius occluduntur; unde laxatis villis nimio humore irrigatis, & oclusis canalibus impetus sanguinis minor redditur crassitie, ac

ac torpore suarum partium per additionem humoris, ad pulmones fluentis, qui cum subsistat ad partes minoris impetus, nisi poterit e vasis dissolvi, nec a vi pectoris ab imo pulmone sibi viam aperire ad usque superficiem pulmonis, transibit in suppurationem, cujus humoris in cavitatem pectoris defluxus, si extendatur supra universam pulmonum superficiem a singulis ejus folliculis exsudans poterit usque ad fauces parvo cum impetu reddi, adeoque ægrum evadere. Quod si suppuratus humor statim per sputum non reddatur, producet ulcerus pulmonum, vel vomica, sinus nempe magnus, qui putrefactus demum in lethalem lapsum terminabitur. Unde Hippocr. de morb. de peripneumonia ait: *Quod si saliva non probe purgetur, & spiritus fuerit frequens, prædicendum est nullam spem vitæ reliquam esse.* At vero de locis in homine, cum in thoracem fluxeris, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit, dolor lateris mollitudinem occupat, & claviculam ejusdem partis, & febris adest, & lingua superne pallida, ac viridis fit, & excreat impacta, hujus morbi periculum septima, aut nona die instat. Si igitur supprimatur inflammatio, & pars pulmonis affecta sit sub tunica, vel in uno pulmonum, adeoque undequaque a pectore prematur pulmo, ut a folliculo, vel a membranis pus exsudare cogatur: Hoc cum ab impetu sua gravitate minori non reddatur per asperam arteriam in cavitatem pectoris colligetur, quod inde manifestabitur a dolore lateris mollitudinem occupante non sine febre, ac lingua viridi, ac pallida, quæ illo colore afficitur, quoniam summe viscida saliva ita resistit remotioni ab interioribus linguae papillis, quibus allabatur, ut minime ab ejus tunicis divellatur; cui si obstructione pororum aucta admisceantur particulæ biliosæ, color ille pallidus in viridem abibit, quod in septima, aut nona periculum adesse denunciat.

Signa ex saliva hydropico salutem indicantia scribens Hippocrat. in prædit. ait: *Neque sitim esse in hydrope oportet, nec linguam resiccare.* Quia ex vasis lacteis, vel lymphaticis alteris, aut simul utrisque divisus, aut apertis serum a massa ejus dissoluta nimis deciduum, vel chylus e propriis ductibus effusus ventris imi viscera plerumque in hydrope inundat, aut sanguinis pars aquosa ab osculis nimis laxatis vasorum exundans in viscerum cavitates, aut membranarum lacunas extravasatur, non potest

humor ille serosus ad totum corpus, & præcipue ad salivæ glandulas distribui, unde sitis adest, & lingua arefcit. Sitim vero non esse, neque linguam resiccare, cum denotet sanguinis cursum non præpediri, nec serosum humorem intus cavitates coerceri, bonum omen portendit.

Quibus febrientibus cibi fastidia sunt, & oris ventriculi morsus, & multum saliva, iis vomitus fit in Coac. prænot. habetur. Quoniam etenim per statum febrilem sanguinis ratione partium terræ præcipue, ac salis, quæ licet multa saliva dilata, minus tamen, quam par est, temperatæ per humidi admixtionem ad minima non dissolvuntur, nec in liquidum rediguntur, fit, ut non evadant tam fluxiles, ut refluere in sanguinem possint, sed exprimatur solum ab illis, quicquid est liquidius: adeoque cum a superficie ventriculi divelli, & abripi non possint, liberius vellicabunt, & acrius urgebunt ipsius tunicas, a quarum stimulo vellicante nimis excitabitur sensus summo cum fastidio, qui in ventriculi morsum terminabitur: ex hoc sensu doloris crispatis fibris glandulæ omnes ventriculi in expressionem liquidorum nitentur, & villorum contractione expressum liquidum sursum urgebitur, ut magno cum impetu ascendat ad œsophagi superficiem, unde vomitus.

Quibus vero circa dentes in febribus quidam lentore nascuntur, ut iis forte sunt febres. Hippocr. Aphor. sect. 4. cum lentor febrem producat est tam tenax, ut difficilius in fluxum agatur, pars ejus liquidior per ramulos non carentes pressione distributa difficilius ita urgebitur, & solvetur, ut ab arteriis abripiatur solum portio ipsius minus viscida, quæ in glandulis salivalibus derivata, cum sit naturali saliva viscidior, iisdem partibus adhærebit: Unde cum liquidior pars a glandulis expressa non sit naturali sero irrigata, sed magis viscido lentore perfusa, ita in cohesionem venient partes sanguinis, ut generetur lentor circa dentes cum febre forte corripiens. Contra vero morbus diuturnior, ac difficilior, est, si salivam tenuem, ac spumofam primum spuit, lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit; si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur, sin postea, tardius, tandem vero etiam rumpitur lingua. Hippocr. in VIII. de morb. Cum igitur saliva componatur ex particulis chyli, atque liquidis aqueis sanguineis, & illæ ex initio febris crudissimæ sint, per febrilem motum,

&

& pressionem illam exprimeretur mere aqueum, seu quod liquidissimum est, & summe tenuis sejungeretur ad glandulas, cui si succus viscidior ex perenni febris fermentatione compactus in initio adeo congloberetur, ut ratione solius lentoris per ostia canalium salivalium in os sub spumæ forma deducatur, cum spuma sit quid compositum ex aqueo viscidiori, & aëre, tum nimiam entoris lentescantiam, tum ejus lymphæ invincibilem visciditatem ostendet, adeoque saliva tenuis diuturniorem, ejusque spuma difficiliorem morbum denunciat.

Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in calore vero permanens, progressu autem temporis exasperatur, & livescit, & rumpitur, lethalis est. Si vero valde nigrescit in quarta decima die indicationem fore significat. Periculosissima autem est nigra, & cum virore pallida. Linguam circa bifidam sui partem veluti saliva alba obducere, febris remissioris signum est: si quidem id quod super indutum est fuerit crassum, eadem die, si vero tenuius, postmodum, si vero adhuc tenuius, tertia die. Hippocr. in Coac. prænot. Si in principio febris lentor febrem producat, non sit ita fusus, ut per salivam reddi possit, sed motus sanguinis sit tam naturali similis, ut detur illa velocitas, quæ necessaria est ad separandas partes cum aqueis, naturalem similem salivam constituentibus, in colore permanebit lingua, quæ si progressu temporis exasperetur, livescat, & rumpatur, cum exasperetur exsiccatis villis, & a subito stagnante lentore nigro oleaginoso tingatur virore ærugineo, a cujus liciori parte inter papillas magis hærente ita lingua contrahitur, ut a proprio termino recedentibus papillis divellantur fibrillæ, atque dissiliant, pessimæ conditionis febrem ostendent, unde lethalis erit. Si vero in decima quarta nigrescat, cum materiam crassiorem e valis dissolvi, & ad concoctionem tendere significet, morbi judicationem indicabit, quæ facilius continget, si lingua circa bifidam sui partem crassa obducatur saliva; tunc enim per derivationem lentoris, & liquidi lentorem producentis ad salivæ glandulas remittetur febrile incendium, eoque magis, si id quod superindutum est, fuerit crassum.

Inde Hippocr. in Coac. prænot. ait: *Lingua denigrata in alvo liquida celerem mortem significant.* Quia vero ut conquiratur materia morbi, requiritur ut fiat fluxilis; sit autem fluxilis facilius, si liquidiores a

corpore non secernantur; igitur in denigrata lingua si deiciatur per alvum quod est liquidius, incoctilis humor, & pars ipsius durior subsistet intra vascula, unde si adhuc stagnante lentore sanguinis alvi profluvium superveniat, malum. Longum hic esset investigare solentius præternaturales salivæ particulas in sanguine redundantes, ex quarum varia cum cæteris combinatione, & prava earundem constitutione chronicorum, acutorumque morborum idea certior desumitur. Quanti fecit magni medicinæ Parentis Hippocratis verus sectator Baglivius linguæ, & salivæ observationem ad dignoscendos morbos, eorumdemque eventus præfagiendos, ex ejusdem operibus ediscitur, qui expertus est eos in febrem, vel gravem viscerum, & præcipue naturalium morbum incidere, qui per plures dies loco naturalis saporis amarum, viscidum, salum, aut acidum præsertim circa horas matutinas percipiunt, quibus si accedat magna virium laxitudo cum inappetentia, aut alterius mali ingruentis symptomatis comitatu morbus irrumpt. Cum enim saliva morbosus, atque peregrinis salibus infecta intime mixta in ventriculo vires suas explicet, fieri non potest, ut ventriculus præservetur a labe, ut inde appetitum dejecto tonus ejus magis non relaxetur, atque a præternaturali salivæ cum sanguine permixtione fluidorum compages non fatiscat, quæ coagulationi prona magis torpedine membra vincit, fluentis sanguinis cursum retardat, & ad morbos plurimos disponit.



D E

SALIVATIONE ARTIFICIALI.

CAPUT III.

ARTICULUS I.

De indicante, & prohibente generico,

JAM vero hisce, conjectura mea ita favente, absolutis, opportunum fore arbitror, ut salivam arte pellicitam deinceps considerem, cui sane res laboris, & observationis plurimum impendi par est; si vel ipsius vires spectes, vel militarem. Siquidem

G g

dem

dem non desunt homines ingenii acutie, & studii commendatione florentes, qui cum salivationis ultro agnoscant utilitatem, tamen in ea excitanda decepti, vel illam in crimen vocant, vel non amore prosequuntur. Horum cavillis, & dubia aestimatione fit, ut plurimi veritatis incertitudine deterriti de salivatione artificiali non solum indigne, & turpiter sentiant, sed illam erroribus involvant, & silentio excutiant. Unde forte miraberis, & humaniter quæres, quid potissimum me impulerit, ut anxie sollicitus sub iis salivæ artificialis auspiciis rem prælo committerem. Cum enim mecum ipse perpenderem, serio me, seduloque monuerim absque veritatis convitio subtrahere me Reipublicæ Medicæ non posse, quod pro re uata sine mendacio suffragandæ in hominum animos salivationi peridoneum sentio; rudibus illam a mendis vindicare, & severiorem illorum censuram, manco quodam, mutiloque fundamento, nescio quo caducitatis infortunio, innixam diluere consui, si utilitatem spectantibus, viam probe ostendere, ut noxium exuant mendacium, vel excellentiam spectavero, ut male sentientium illa opinio eximatur. Quod si non alienis rixandi studio parum arrideat, celebre apud veteres scias dictum esse, *nec Jovem ipsum omnibus placere potuisse*. Et profecto tanto numero, & tam varii generis sunt, qui licentia longe minus tolerabili salivæ artificiali fabellas calide conficiunt, atque in hanc impingunt verba æque ac facta male consulentes, ita ut mihi non minus admirationis, quam doloris parerent, nisi intelligerem, quantopere humani generis hostis in hoc vertitur, ut bona salivationis, & ejusdem scripta evilescent, quæ suo existimata pretio contra illorum inscitiam, & ad eorundem consiliorum subversionem valent; nec non recorder (quod est hominum proterva indoles) Ciceronis admonentis, *vitari non posse reprehensionem nisi nihil scribendo*. Jam vero, ut consilio meo congruenter faciam, quod hic palam profiteor, ne incohærenter dicta, denique levia, & exigui momenti videantur, in quibus nullum videtur apparere dubitationum vestigium, citra eorum existimationis injuriam, salivationi artificiali religiose adhærere in pretio habeo, quæ licet a tot retro sæculis non intellecta, aut contempta, in ægrorum, tamen solatium, & gratiam a natura inventa uberius nunc Artibus consilio augetur, & latius ita in eorun-

dem emolumentum diffunditur, ut inter universales evacuationes enumeranda reputetur; quam conjecturam nemo, opinor, ratione destitutam judicabit, cui modo critica plurimorum morborum solutio, vel per naturalem salivæ expulsionem eorundem revelatio non latebit: & quidem felicius eventuum consideratione eorum cavillis occurritur, qui salivationem calumniant, vitiiis, ac flagitiis exprobrant, ex quorum clade, ac nequitia (sece præferente natura) artem illam salivatoriam, quam usque omnium scire interest, sine vitæ periculo addiscimus, atque experimur.

Hujus salivationis artificialis genericum indicans est depravata sanguinis labes, & status aliorum liquidorum vitiosus, quo ipsa minus fluxilia, vel mobilia liquida redduntur. Hinc generalis indicantis naturam induit quicquid extranei in sanguine inest lenti, aut glutinosi, quod a sialagogis potest ita fundi, & eliquari, ut ejusdem fusio in glandulas salivales impingens possit per hiantis eorundem orificia, & ductus eliminari. Quod indicans miror sane plurimos negligentia contemptum reliquisse, cum in tota salivandi arte nulla sit pars magis necessaria, & quæ Medicorum consilia exposcat, quam ista, quæ ad intuendam morborum salivationem petentium ordinata naturam, medentium praxim exornat, statuitque in salivandi palæstra artis terminos, aut sæcunditatem: Cujus ope indicata salivatio ad evellendas morborum radices unice par experitur: at a malorum prohibente coercita, & temerario conatu adhibita plurimos post sævas ærumnarum perpeffiones in orci fauces ægros miserrime compellit.

Salivationis artificialis generale prohibens est humorum vitium, quod particulis sanguinis inquietis, seu impetuose commotis peculiariter inhæret, ob quas mediante salivatione potest ita fundi, & laxari fluidorum compages, ut fibrosa pars penitus destruat: vel si licet generico addere specificum prohibens est ita pressa, mutuoque cum cæteris miscibilibus in aliquo viscere amplexu unita, ut absque canalium dilaceratione minime luxari possit; quibus si solidorum liquida vehementium in visceribus naturalibus, aut spiritalibus desitescunt mollires, laxitas, flacciditas, aut soluta unitas accedat, omnibus circumstantiis stipata totum vere prohibentis onus exaurit.

ARTICULUS II.

*De diversitate remediorum salivalium,
eorumque usu, & utilitate.*

UT halagoga mercurii natura penitus nobis innotescat, juvat hic exponere remediorum salivalium diversitatem; quæ immixtum salivæ fluxum ad fauces promoveant, & quicquid ibi hæret una discutiant. Quando enim per glandulas palatinas in summitate palati dispersas, vel per sublinguales in radice, & lateribus linguæ hiantes una cum parotidibus juxta aures, salivalis succus in oris cavam non infunditur, in ipsis tubulis moram nectit, ubi diu subsistens, & in partibus capiti vicinis sensim collectus infestus evadit, ibidemque coacervatus novas operandi vires acquirit, indeque vitiato molecularum nexu male olens, varie morbosos inducit affectus. Ne igitur fluoris salivalis motus retardetur, ut promptius iste, & copiosius eliciatur, inventum fuit subsidii genus apophlegmatismi nomine insignitum, quod pituitosos humores in glandulis oris impactos, & tubulis inhærentes, fluxiles reddit, atque ad motum concitans in tantum emicuit, ut e peculiaribus evacuantibus veluti abreptus ad universalium classem elatus fuerit, quod eatenus concedi non potest, quatenus non totum corpus per ipsum ad has tubulorum syrtes suam deponit uliginem, sed particularis glandularum salivalium morbus tantum tolli posse videtur. Ubi autem humores in tota sanguinea massa, totoque adeo corpore impliciti æquali motu per vasa rapiuntur, sed ad oris glandulas appellentes circa faucium tubulos resistant serosi humores, tunc ut ad motum fiant aptiores, & fluxiles reddantur, apophlegmatismi inciduntur, attenuanturque, ut felicius proluciantur. Quod si quis mentis hallucinatione captus istos vitali nostro calori committi, ad ossa quasi usque penetrare, & inter fibrarum poros, & glandularum omnium spaciola se insinuandi efficaciam suam manifeste admodum in morbis longe gravioribus contendat, in actu hærebit illi aqua. Horum enim agendi modus in glandularum laxitate vel vasculorum irritatione consistit. Quoniam igitur salia volatilia acria urinosa ex objectis in ore elicta, in nervorum fibrillas citissime irrepando urgent villorum oscilla per intervalla minima, fit ut per tremorem illum partes, quæ validiori flexione sese tangunt,

in aliarum contactum magis nitantur; adeoque si quid est mobile per nimum illum vividius urgebit, atque etiam abripietur quicquid est ad contactum membranarum positum, & intra villos contentum. Quare villorum nismus naturalis si partes magis impactas dimovere non possit, cum aucta vi stimuli minorem inveniat in fluidis resistantiam, in contenta liquida nitendo fiet ille vividior, & fluidorum motus ad partium contactus adhuc major; unde ratione aucti utriusque impetus lentescens liquor facilius dimovetur. Quod si fibræ glandularum ita corrugentur, ut appulsui salivæ renitentes effluxui non cedant, optime, feliciterque laxantur emollientibus. Hæc sensim suaviter fauces afficiunt, anodyna vi poros demulcent, & partium nervosarum insigniter leniunt: qua ratione blando tepore laxatis fibris, flexilibus, mollibusque particulis membranarum partium tensione obliterata, uberior salivæ affluxus per hiancia vasculorum repagula confertim appellens jugiter a dilatatis poris extillat. Hinc latus est in praxi apophlegmatismorum campus sub forma masticatorii, electuarii, trochisci, pillularum, & gargarismi exhibendis. Juxta igitur pororum infartus, & glandularum morbos cietur saliva, quæ si ob fibrarum torporem, & languidam villorum oscillationem in tubulis hæreat, commodius prolicetur a mastice, cujus granula ut lacrimæ transudant ex lentisco arbore fauciatæ, grato odore palatum afficiendo, glandularum atoniam resarciunt, & rotundis suis particulis suaviter titillando effluxum salivæ promoveant. Attamen si serosus humor sit tanti lentoris, ut per conceptam nervorum undulationem, & illum villorum nimum in expressionem liquidorum nitentem a glandularum exilissimis ostiis dimoveri non possit paulo acriori stimulo, ut decocto mellito ex betonica, lavendula, majorana, rore marino, ruta, cubebis, pulegio, & nasturtio irritentur fibræ, ut majori contractione correptæ rigidiores, ac breviores fiant; unde adhuc majori nisu impetus sanguini ad partes oris in glandulas stagnanti communicabitur major, quo fiet, ut a villorum pressione attenuato spisso, & lento, aucta velocitate fluidorum, & solidorum tremore salivalis seri valdopere augeatur affluxus.

Si ob vitium villorum minus sensibilem, vel adhuc crassioris lentoris resistantiam divelli renitentis prohibeatur saliva, commodius aptentur sulphurea, resinosa, quæ par-

ticulis salinis volatilibus acrioribus magis explicita, ut tabacum, nigella sylvestris, radix gentianæ, zinziberis, quibus referri potest radix nicotianæ, modo obliervetur, ne tantillum deglutita saliva, graves vomitus, & sedes concitentur, valent intimius commovendo fibras, serum quietem meditantem evacuare, & expressionem liquidorum facilius promovere. Sic in linguæ paralyti liquida e sinapi, theriaca, confectio anardina, & aqua apoplectica optimi sunt usus. Dum enim nervorum linguæ papillæ acrioribus particulis stimulatæ vividius oscillant, contentæ fluidi hærentis moleculæ ob tremoris solidorum motum fortiori agitatione commotæ sensim a vasculorum angustis abripiuntur. Ita nullo impedimento per linguæ substantiam repente fluïdo, & intra villos fluente libera permittitur musculorum fibris contractio, unde resolvitur paralytis. Ad dentium dolorem a sero stagnante radix pyrethri masticata, tinctura Vvedelii odontalgica ad copiosiorem salivam eliciendam est expertissima. In gingivis scorbuticis, tumentibus glandulis, hinc in frigidis capitis affectibus, apoplexia nimirum, lethargo a crasso humore exortis, in quibus serum spissius evadit, cum ægri euphoria adhibentur masticatoria. At si tenui acrimonia vel fluxilitate nimia peccet humor, vel deficiat serum, ut in hæclicis, vel pessimo succo affectis, tutius erit abstinere. Hoc consilio in asthmate, in hæmoptysi, in facile vomentibus, faucibus inflammatis, & anginosi affectibus, ratione irritantis stimuli, tanquam noxiæ fugienda consulimus.

ARTICULUS III.

De Mercuriali Salivatione.

Post medicinæ exortum aureo artis saculo, licet improbo experimentorum labore laxata ingenia, & subtilioribus philosophiæ ratiociniis, suffulta sublimiores de naturæ rerum cogitationes, medicaminum vires, & quancumque morborum, causarumque contemplationem a penitiori physicæ recessu severiori indagine eruere conarentur: Horum tamen mira solertia fieri fugitivi in tenebris latitantis, & quasi silentio involuti, dubiis tantum innixa fundamentis, ignobiliores usus nullis experimentis ornata elicere potuit.

Post casum exemplo monstrante viam

investus in arte mercurius, qui prius ut septicus, summeque deleterius a veterum schola lethalibus infamatus erat exemplis, nunc tandem caput exerens in primis artis subsidiis reponitur. Cum dira lues celtici semini non prius nostro cognita cælo-mortalibus irrepsit, & primis illis temporibus subdole, ac clam summa hominum perniciæ, ac clade sævire cœpit, atque in humorum corpus debaccari, omnia medentium auxilia illuxit: qui medicorum cæcus cum viderint homines inopinato, & non intellecto morbo peremptos, indefesso conamine melioris auxilii medelam investigantes, saniori forte consilio ineuntes ad validiora Arabum medicamina pro scabie devenerunt, quæ hydrargyrum recipiunt, insuetoque delusi morbo luem gallicam cum scabie perperam confundentes, illis medicaminibus, in ulceribus gallicis uti cœperunt, quæ cum ex voto successerint, ex falso verum ducentes casu reperire, quod conjectura fallax distavit, & ratio invenire non potuit; unde mox pro gallica sorde, & luis inquinamenti hydrargyri illinitione reperta, Carpenis ille Chirurgus, ut testatur Fabricius Falopius de mor gal. & Ramazzini, fere primus hanc medicinam callens, summo artis incremento a populari pellicitus aura, & novitatis aucupio sibi viam sternens ad medicinæ culmen, licet sæpe cæcis hominum victimis litans, feliciori tamen sæpius eventu plurimos obliniens tantos obtrinit plausus, ut in magnalia artis adscitus quinquaginta millia ducatorum aureorum lucraretur.

Harum observationum præsidio instructa mens hominum, post repetitas, atque accedentes in dies novas observationes sibi mutuo facem præferentes, cœpit solertia mentis, hominum naturæ methodique pedissequa, novos mercurii usus explorare, & circa ipsius naturæ arcana disputare; ex quo regente rationis lumine in usus varios adscitus mercurius, atque diversæ indolis morborum ad curationem nunc investus, summas distidias in medentium sectis, & in quorundam scepticis Clinicorum ingeniis sola innovandi libidine præjudicatis, excitavit, a quibus sectarum litigiis malesano hominum iudicio fundatis, in germanæ artis subsidium advocatus mirum non est, si post abdicatum empiricum studium, & subreptum theoriarum cultum, luxuriantibus tantum intricatis hypotheson erroribus, & conjecturis, & quasi in arte coercitus ultimos medicinæ fines non attigerit.

Ut

Ut jam ad variam preparationum methodum mentem dirigamus, primo unctio-
num mercurialium cutis illiniendæ, quæ in
lue venerea curanda præscribi solent, sele-
ctiores quasdam formulas referre necessarium
existimo: in quibus linimentis, licet pluri-
ma componentia ingrediantur, horum ta-
men basis est mercurius cæteris quibusve
validior. Unguentum, quo Paræus lib. de
lue ven. cap. x. feliciter usus est, confici-
tur ex particulis sublimati orrosivi, & sul-
phuris in pollinem redactis, quibus affuso
argento vivo, simul cum axungia mox, &
vitellis induratis, omnia diligenter permixta
agitantur, donec minima commota optime
se tangerent. His exacte combinatis rursus
affunditur argenti vivi, axungie, & vitel-
lorum portio, ut priori massæ incorpore-
tur, cui additis tandem oleis therebinthi-
næ, & lauri, mox theriaca, & mithridato
paratur mediocris consistentiæ unguentum.
Juxta mentem aliorum Chymicorum mer-
curius vivus extinguitur saliva hominis,
vel oleo therebinthinæ, liliorum, vel lum-
bricorum, qui inde ab unguento de althæa
Fernelii exceptus, oleoque succini associa-
tus in unguentum coalescit. Sed melioris
fortasse notæ compositio indicatur a Jun-
kenio, & Sydenhamio, quæ ex crudo mer-
curio, & axungia porcina conficitur. Nec
oleum aliquod, nec aliud quidpiam admi-
scent, cum deterius fiat unguentum, si
quod adjunctum laxet habenas, vel hoc fra-
num injiciat, nihilque efficacius, si nil pro-
sus agat. Fortassis additamenta scrupulose
expensa sunt inanes temeræ suppetiæ, quæ
hydrargyri viribus, ac proinde frangendis
mercurii conatibus, aut internas partes pe-
netratione cohibenda impares nil opis con-
ferunt, nec malignitatem stulte peritam
mercurii corrigunt: sed poros cutis occlu-
dendo mercurii efficaciam quoquo pacto in-
fringunt, ut in oleosæ substantiæ amplexu
torpidus paulo hærens, dein oleorum con-
jungio liberatus impetuosius in sanguinem
evehctus celeri motu ruat, donec viscidita-
tes in corpore hospitantes incise, atque at-
tenuatæ per ductus salivales, ejiciantur.
At ab eorum usu, ut ab alea suscipione
plena, nisi morbus vehemens intunctionem
extorqueat, consultius est abstinere, cum
languidius, vel validius, quam par est, flu-
xum salivalium commoveat.

A mercurio non excitatus fluxus oris,
quotiescunque in linimento paratus uberius
alluit spongiosas glandulas, & vasculorum

lacunas, vel quia nervi in memoratis par-
tibus conferti stupore afficiuntur, atque adeo
distrahuntur, ut singuli villi laxo machinu-
larum sædere, & fibræ minori resistentia
inter sese connexæ prementi nisu discludan-
tur, quarum ope ubique humores miris mo-
dis agitati ulterius superare debent asperi-
tatem parietum, resistentiarum occursum, &
postrema fistularum, ductuumque emissaria.
Nunc vero si vis dictarum machinularum
distractarum minor fuerit vi ponderis eorun-
dem liquidorum, quæ in reticulari fibra-
rum, glandularumque contextu continen-
tur, cum in memorata partium distractio-
ne mercuriales particule, ob resistentiam,
quam sibi ipsis faciunt, ad invicem non
possint a languido solidorum nisu, & liqui-
dorum a tergo urgentium pressione in gy-
rum rotati, facile in interiectis loculis, &
fibrarum laxitate stabulantur, & suspenda-
tur oportet eorum influxus oscillorum con-
nissum violenter exhauriens. Machinulæ igitur
fibrarum valde distractæ, & nimis la-
xatæ, etiam sponte sua denuo sese restituere
conantur ad naturalem terminum, ut vi-
detur in arcu, & qualibet machina, quæ
violenter distracta, summeque distensa in
pristinum statum reducitur, pondere nimio
gravatæ non restituentur, ex quibus fieri
non potest hydrargyri circuitus cum liquidis
omnibus eo, quo fas esset, impetu, ideo-
que mercurius magis ad invicem pressus in
illis spongiosis moram necit, nec ejusdem
stagnantes particule sursum impelli possunt,
tum quia resistit naturalis ejusdem gravi-
tas, tum quia laxitas fibrarum, & villo-
rum omnium vis macerata labascit. Hinc
præ nimio infartu, ac pondere circumfusi
humoris superatur nisu, & villorum resi-
stentia, ac idcirco immodica humorum sar-
cina inanitates spongiarum gravantur, ejusque
ligamenta exolvuntur, atque divelluntur.

Si vero uberius mercurialium corpuscu-
lorum copia consistentibus fibris, rigidisque
villis occurrat fluidi particulis earundem im-
plexu tanquam vinculis coercita paulo de-
tinetur; at soluta fluidorum compage sui
juris facta intensius exagitur, & turba-
tim avolare nititur. Unde impetuosius con-
citis fluidorum solutionibus, uberiori nimis
salivæ eruptione sputatio ciebitur; quo fiet,
ut materiæ partibus gelatinosis impactæ su-
burra perquam immensa commota, tota
confestim nimis versus ductus salivales ir-
ruens circa gutturis partes cum suffocatio-
nis periculo aggeratur: adeoque serosi lati-
cis

stes dein vitiosa sanguinis labes, & humorum indoles in elementaribus sanguinis particulis primitus constitutivis eradicata pululat; a qua incerta liquidorum solutione ocus, quam par est, instituta, eventuum inconstantia consequitur, quæ artem contumeliæ redarguit.

Sedulo vero medentes unctionem ægris non tantum gravem, & molestant, sed nonnunquam etiam lethalem fuisse animadvertentes, mercurialia suffumigia investigarunt, quæ parantur cinnabari cum massice, thure, mirrha, vel succino in pollinem redactis, quod prunis injectum ignem concipit, simulque cum sulphure resolutum totum in fumum densum, gravemque evolare nitens per infundibulum vitreum ore excipitur, capite bene recto, ne quid ejus pereat, aut abeat in auras. Vel hydrargyro in therebinthina extincto, bolo vulgari, & carbonum pulvere massam conficiunt, quæ inde sub umbra exsiccata candenti igni imponitur, ut fumosa nubes in altum prorepens pressius in tubo agglomerata, & dehiscencia oris vascula versus promota minimas quasque corporis partes venerea lue affectas præreptet. Verum quantum efficax est mercurii fumus ad saniosam, putidamque salivam promovendam, tantum ex ejus usu recidivam patiuntur hi, qui gummatibus, nodisque plexi, & sævissimis ex lue venerea doloribus cruciati certum mercurii fumum intus non admiserint, quod partes omnes a seminio venereo infectas non valeat subigere. Hinc est, quod ab indeterminatis agentium viribus ab incerta quantitate mercurii in fumum resoluti, & intus elapsi pendentibus, sortitur eventuum inconstantia, quæ licet repetitis tentaminibus, rationeque expiata, dubiam semper, infidamque methodum constituit.

Nec feliciori successu cingula jam veteribus pro cura scabiei adhibita in gallica lue experiuntur. Mercurium saliva, & sevo extinctum in ovi albumen includunt, illiuntque supra gossypium, quod in cinguli modum consuunt. Hinc cuditur famosum illud sapientiæ cingulum, seu mercuriale Rulandi, quod est pannus lineus unguento mercuriali illitus, qui ad lumborum regionem applicatur. Attamen ab hujusmodi topicis ex magna rerum innumerarum congerie conflatis Medicus cautus sit, ne confidenter nimis expectet bona, audacterque nimis utatur: si hæc mercurii per poros cutis in sanguinem repentis genuina, ac

certa nondum innotuit methodus. Unde forte remedio magis, quam morbo confecti libithinam non valent effugere. Excussis itaque dubiis, ac incertis hydrargyri, externo illitu, suffumigio, & cingulis, ad accuratiores mercurii præparationes absolvendas, mihi volupe est mentem revocare. Modo vero ad salivationem ciendam plurimi utuntur turbith minerali, quod est mercurius spiculis acidis olei vitrioli sarcitus. Mercurius vivus olei virrioli combinatus ad minima dissolvitur: post dissolutionem igni lento committitur, & distillando educitur humiditas; inde in fine aucto ignis gradu ultima pars spirituum dispecitur. Restitans massa dein in aquæ tepore sufflata in pulverem flavum momento temporis evanescit, quæ leviter mellita paucis lotionibus valide vomitum, & sedes concitat. Spiritus acidi præcipitati forma mercurium induentes excitando in fibris speciem motus momenti majoris impetu acutorum salium vehementiori eas ita urgent, vel his ita occurrunt, ut ad stimuli locum partes nervorum in eo situ ad contactum positas, & in ipsos occurrentes, quasi divellant ab invicem. Ab hac vi stimuli divulsæ membranæ, & universi corporis villi naturali contractione contractiles validius contrahuntur; adeoque per nisum partium majorem, & vividiorum fibrarum flexionem vividius urgebitur, quicquid est ad membranarum contactum, sive intra ductus, & glandularum inania positum. Unde dimovebuntur magis contenta liquida, quam si nervorum fibrillæ leviter oscillarent: per tremorem autem illum, & spasmodicam tunicarum contractionem, si quid erit mobile, & expressile, a dehiscen- tibus ventriculi glandulis intestinorum osculis, papillis, ductibus, qua poterit, derivabitur. Retusis vero spiculis, aqua communi pluries edulcoratis, & sæpe abluendo hebetatis, mercurialis pulvis omni acridine, & salsedine spoliatur: Ita pungentibus salibus, & purgantibus exutus felicius sanguini fermento gallico effæcto commiscetur, ut promptius cum fluidis effluens oris fluxum promoveat.

Verum genuinum minerale turbith a peritis chymiatris, non a mercurio vivo cum acidis educitur, sed ex sublimato præparatur. Mercurius sublimatus dissolvitur in aqua pluviana calida, solutio aliquoties filtratur, filtrato mercurio guttatim infundatur tantum olei salis tartari, quantum putetur requiri quoad in fundo subsistat pulvis

vis rubeus, qui aqua communi edulcoratur usque dum destituatur omni acredine; inde cohibetur cum aqua mellis optime rectificata sex, vel septem vicibus, quibus terminatis eximatur pulvis, qui in vini alkohol suffunditur, continuoque motu circumfertur, donec vini spiritus protinus assumatur.

Si vero mercurius cinnabari elicitus dissolvatur spiritu nitri, cujus dissolutioni aqua sale marino confecto projiciatur, inde volatili spiritu superaddito salis armoniaci in summe albicans præcipitatum mutabitur. Hoc ipsum aqua fontis abluitur, ut a scorpiis salinis, & partibus terrestrioribus vindicatum felicius salivam movere possit. Sal marinum, vel ejusdem spiritus ex rigidioribus moleculis, & crassioribus corpusculis conflatus in hanc dissolutionem impingens sui impetus percussione, & directionis momento nitri spicula distinguit mercurialibus particulis turgida. Unde mercurius a nitrosis salibus dissociatus suo pondere ad vasis fundum sese compellit. Sic quoniam spiritus salis armoniaci volatilis ratione salis alkali est majoris motus, & momenti, ut possit liquoris particulas salis marini excutere, cujus moleculæ minoris agitationis, & impetus non appellant, penum præcipitationis augeat.

Alius paratur mercurius in spiritu nitri dissolutus, qui lento igne diffusa humiditate in candidam massam facescit, & ignis torturam patiens dum calcinatur, rubescit. Spiritus nitri, & mercurii corrosiva ramenta, dum calcinatione per ignem exagitantur, mutuis visibus in se invicem agunt, eorumque renisus aculeata salia retundens subtilioribus metheorizatis septicam materiam coalescentis aciditatem demulcet, quæ licet calcinatione minus gravis, & caustica fiat, fungulos tamen villos exedit, & ad salivationem excitandam periculo non caret. Hæc vero spiritu vini rectificatissimo pluries combusta resolutis salium aculeis ita oblinitur, ut omnibus votis salivationem compleat.

Galli saniori consilio panaceam veneren lue confectis tutius exhibent. Hæc enim est sublimatus dulcis salibus tertio-erosivis spoliatus, & pluribus sublimationibus lenitus, qui supra porphiritem contritus in alkohol redigitur. Hic pulvis in cucurbita vitri coercitus spiritu vini irroratur, dein eburis spatula passim agitur, ut hinc post plurium dierum infusionem in balneo maris projecto totus vini spiritus distillando

eliciatur. Quo spiritu in vaporem sublimato panacea in fundo vasis reperitur. Vel sublimatus dulcis dissolvitur in spiritu vini, ejusdem solutio filtratur, & spiritu vitrioli præcipitatur. Hic mercurius vasis fundum dum petit, ut nix candescit: Inde aliquoties aqua calida dulcificatur, ut in saccharinum abeat præcipitatum: demum huic superfuso spiritu vini distillatur ter distillationem reiterando. Repetitur diu distillationes, sublimationes salium spicula rigida sublimati corrosivi rescindunt, aut eorundem salium ramenta partim detrahunt, quibus si intime erosivæ acedinis aculei non diffingantur, particula sulphurea spiritus vini intra poros sublimati conclusæ sustentia salia oblinient, partibusque ramosis ævigent. Ab hac panacea non multum differt illa Valentini, quæ æque tuta, ac jucunda in oris excitando fluxu sancitur. Hæc panacea absque glandularum exulceratione levi labiorum dolore, & minima generum inflatione salivæ cursum molitur, qua in molis, ac tenellæ constitutionis hominibus passim utimur. Cum vero virulenta ulcera, & sordida, topki, & saniosæ crustæ corpus descendentes vehementibus ubique doloribus obsident; tunc virus illud liquidorum crasses prorsus evertens panaceæ blanditia sæpe integre non pellitur, & superstes deinde depravata Sanguinis constitutio majori fluidorum solutione expugnatur.

Quamobrem mercurium dulcem in forma pillulari tanto hosti unice parem commendando. Mercurius ab acido salinis aculeis penetratus in minimos, & infinitos scinditur globulos, quos undique acida spiritus nitri corpuscula permeant, eorumque ramentis irretiunt. Hæc massa alba resistans, evaporata igne lento arenæ humiditate, æquali vitrioli calcinati, & salis decrepitati portioni commiscetur, quæ mixtura in matratia reposita igne exagitur, donec in vasis culmen repens secum trahat corrosivos spiritus, a quibus repressa volatilitate, & ab acidis cohibita dissolutione in spiritus, concrescit in chrystallus. Hujus sublimati particula, & motus parvulorum globulorum calore promotæ, impetuque rotatæ, quasi minimis cultris fibras dilaniant, unde summum venenum audiunt. Acutorum salium in mercurio delitescantium & in parvo spatio coeuntium impetus cylindricis suis ad pyramidem in fine basis, & apicis accedentibus ad angulos rectos in fibris membranisque occurrentibus eo target momento, quod

quod ad membranarum poros, & cohaesionem fibrarum superandam requiritur. At mirum, dum acuta spicula sublimati corrosivi in matratio circulantia, in pallas mercurii vivi validius rotantur, mutuis nibus congregientia franguntur. Hinc per solam hydrargyri additionem repetita ignis actione in novis sublimationibus retusis salibus, eorumque cuspis novo mercurio imbibita in sphaeram evadens, vel complanata omnes partes aequaliter impetit, adeoque ab eis aequali momento collisa, & ad quem redit repercussa ab ambientibus solidorum membranarum absque septica facultate irrum-pit in spatium liquore plenum, & ante sui exclusionem diversa mole, & gravitate, adeoque diversa motus quantitate instructa in resistentia corpora vires, impulsus, motus variae directionis, & allosionis exerendo intra sanguinem viscida solvendo labitur. Mercurium dulcem non inferioris frugis conficiet ex mercurio sublimato & mercurio vivo; ex quo fonte premanat Clarissimi Riverii chalomelanos, quod ex mercurio, sale, & vitriolo compositum duodecim sublimationibus ad summum excellentiae gradum evehitur, quibus mercurius vitae additur eo modo, quo a Riverio describitur. Recipiatur mercurius sublimatus, & argentum vivum cinnabari elicatum, & misceantur exactissime, donec mercurius vivus non amplius appareat, postea sublimentur, & duodecies sublimationes reiterentur. Hujus mercurii dulcis cum mercurio vitae quadrupla, qui amiserit totum intus latens venenum per exhalationem tetri ac foetidi sumi, ne vomitum cieat, quadrupla inquam major misceatur, & fiet pulvis colore griseus.

Hæc sialagoga medicamina indicantur a speciali humorum vitio; & peculiari sanguinis dyscrasia, quæ viscida, crassæ, glutinosæ acrimoniæ volatili innititur, in qua crassi omnium quasi liquidorum vitiosa salino-volatiles moleculæ fluorem acquirunt, & lymphaticæ sanguinis trassæque terreæ particulae figuntur, ut inde salibus acrioribus imperium nactis, & parte sanguinis viscida ulteriori coacti unita glutinosum cum acrimonia conjunctum æmulentur. Hæc glutinosæ acredinis sordes per coitum impurum poros urinarii meatus, & prostratarum glandulas coinquinat: inde subdole fluidis in gyrum rotatis impressa sua aciditate erosiva volatili maxime cavos glandularum folliculos post infartum exedit, mem-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

brantarumque substantias cum vasculorum erosione, & pustulis ulcerosis depascitur. Hæc intima magis proserpens ossium periosia cum dolore præcipue noctu lancinativo medios artus occupante, & flexurarum rigiditate convellit, divellitque, ossaque carie, tophis confecta fascinat. Igitur coinquinatæ omnes sanguinis moleculæ, & ulterius pressæ ab ejusdem acidis coagulantibus fortiori amplexu cohibentur; cæteris interim mobilioribus & salino acrioribus fluidorum dilabentibus particulis ipse sanguis crassus, atque mucilaginosus evadit; quo magis mobile sanguinis implicatur quoque ac torpore afficitur, ut ægre pensum circulationis expleat; inde a fibrarum tono ex indebito liquidorum appulsu non suffecto, & sanguine salibus volatilibus, & partibus crassioribus turgidulo non reparato; tum liquidorum, tum solidorum morbus passim contingit.

Liquidorum vero prohibentium conditio est salina materies magis attenuata, quæ involventibus acidis orbata sit acris, & cum oleosis tenuioribus permixta volatilis fortis evadit. Altera autem pars sanguinis fixioribus salibus, & oleis ramosioribus simul tenacissime combinata in densam faciem, & salino adustam muriaticam concretionem: illa ob acrimoniam alkaline volatiliæ producit in sanguine partium solutam cohaerentiam, quæ dissolutio actiones omnes solidorum, & liquidorum partium turbat, & destruit; hæc minimorum canalium coactum facit, & in glandulis obstructions perstinaciter firmat.

Quoniam per aciores mentis conjecturas oculatissimo examine prosecutas, perque repetita tentamina solertissima Medicorum experientia suffulta a pluribus simulque latentibus melancholici humoris proprietatibus, ac viribus exortum morbum salivationem contemnere comportum fuit; ne experimentalis veritatis incremento litemur, fateamur oportet, sanguinis particulas salium adustas nimis evectas, fluoremque patientes, summe activas mercurii vires eludere, terrestrioribus sulphuris corpusculis associatas. Cum strictiori amplexu salium particulae adunatæ ita pertinaciter coherent, ut cuicumque solventi impervie reddantur, arctissimæ eorum meatuum complicationes, a nexu laxari, & in menstrui amplexu rapi non queunt. Quocumque igitur vinculo se invicem associantur salium concretiones, ut retuso impetu mercurii, ejusdemque par-

H h h

ticu-

ficularum penetrationes a solidiori concreto repulsa difficillime divelli, & in minutissimas partes confringi resistant, eorum solidæ concretionis compages prius laxata, nec reclusa auferri non poterit. Tantum intercedat oportet mercuriales moleculas inter, & adustas salium concretiones varias quoad qualitates, & corpusculorum nexus unam in massam coalescentes, discrimen, ut cum mutuis coalitionibus arcte adeo complectantur, ut parvula nulla intervalla, porosve improporcionados relinquunt, mercurialia corpuscula in salina concreta offendentia facile excludant; quæ sane maxime licet poris instructa discrepantibus, tamen nature agentis, in aggreddientis prementes impetus nitentes, facile supra solventis nisum resistantias exercent; Itaque intra melancholici humoris nexus tenuioribus mercurii corpusculis non coercitis, concrementi partes eorum motu ab invicem non divelluntur.

Hinc carcinoma recedentes adustæ salium moleculæ, si volatilibus sanguinis particulis in auras resolutis, copiosiorique aquearum particularum dissipatione, resolutis spiritibus exhausta, nimis evectæ, fluoreque potitæ cum viriolicis, acidisque particulis, & terreo-sulphureis crassioribus combinantur, quæ ad ductus glandularum delatæ firmitus in earum fibris inhærentes folliculo includuntur, dimoveri inquam non possunt ab earum complicatione, licet ab impetu mercurii percussæ, quarum tumor, si fortiori pthyalismo oppugnetur, ejusdem subtiliores particule a gravitate impellentis sæpius commotæ, ejusque impetu allisæ, dum mutuis nisibus agitantur, salium ramenta validius concitata momentum acquirunt, inde in comprimentes fibras cuspida infigunt, & villos glandularum ab invicem divellunt, quibus sensim discissis, ac corrosis cancer sub forma tumoris delitescens fatali clade inopinato prorumpit. Ex quo satis liquet, componentes canceri particulas, aut a mercurio non diffringi, aut ab eodem accendi; unde illud Nasonianum:

Curanda fieri quedam pejora videmus.

Ulcera, quæ melius non resigisse, sunt.

Feliciori licet eventu eruptiones omnes papillarum squamosæ evanescant, dum in graviore imperigine, & lepra salivario cietur: tamen nova eorum morborum seges pullulare incipiens brevi temporis spatio solitam feritatem attingit, ut observavit Villis in quatuor ægris impetigine laborantibus. Effectus hujusce causa in eo confi-

slit, quod intimus partium sanguinis mechanismus particulis non solum acido-salinis, tartareisque diversimodi status, ac indolis effectus, sed salino acri volatili alkalina materia turgidus a salivatione penitus subigi, ac prorsus resolvi nequeat; adeoque superstes labes sanguinis, & humorum acrium indoles primitus constitutiva post evanescentes papillarum corymbos, juxta materie supplementa in concretiones tartareas faciens in cute defigitur, ubi papillarum eruptionibus, quasi totidem hujusce morbi loculamentis incoactis, processu temporis aucto morbificæ materie cumulo, superficies cutis omnis incrustatione squamosa, ac plane ad lepræ confinia evecta obducetur.

Ut enim adustam salium concretionem inani molimine pthyalismo pessundamus; ita eadem debiliores, vitioque plurimos laborantes pulmonum, vel hæmorrhæsi confectos, infami errore necamus. Si enim naturalis pulmonis vasculorum capacitas, ac fibris mollibus, summeque deductilibus coalescentium augeatur nimis, ut partes canalicula constituentes sic divellantur ab invicem, ut minimis oscillationibus nitantur in fluentia liquida, colliquari fluores confertim per eorundem cava trajecti, cum intime non sint soluti, ut per impetum a corde susceptum supra omnes resistantiarum vires excurrant, facile in distensis vehementer fibris, in cellulosis vesiculis, & inanibus spatiis intercipientur, quibus novo semper, ac semper affluente humore per capillaria ramuscula, vesiculæ ex illis prodeuntes, & racematim adherentes mirum in modum ita intumescunt, ut humor ratione inertie non distatus in parva tubercula excreseat, quæ dein dum a pulmonum pressione, motuque incessanti incallescunt, in suppurationem abeunt, & in tabem lethalem terminantur. Quod si ultra tonum dilata vasa a pondere mercurii in majorem extensionem deducta, licet ex majori distensione majorem nata sint ad comprimendum vim: tamen ab impetu sanguinis majori in arteriarum parietes nitentis, & particulis mercurialibus eadem ad ulteriorem distensionem coactibus, tandem distractis plurimum arteriarum membranæ eo distensionis deveniunt, ut vim urgentis ad latera sanguinis, ejusdemque particularum momentum impetus ad vasculorum contactum motarum sustinere non possint; adeoque aucta potentia sanguinis arteriosi extrorsum arteriarum mi-

nimarum membranas urgente, & earundem imminuta resistentia ob maximam distractionem subito divellentur fibrillæ, restitutionis vim in nimia distractione non observantes. Horum autem potentia ad se restituendum cum in partium coalitione consistat, hæc ex frequenti sæpiusque repetita distractione enervatur; adeoque restitutionis robore plurimum imminuto, muscularis fibra arteriæ sectione angustari nitens inefficax. Igitur opus est, ut arteria existente distracta, novaque majoris momenti potentia fluidis applicata distringatur, vel laxetur fibrarum componentium nexus, per quos sanguis inopinato prorumpit, & sanguinis sputum plerunque fatale subsequitur, quod observavit Nicolaus Lemery in suo cursu chymico lethali experimento.

Aliquando in spongioso, & molli pulmonum parenchymate cretacei lapides sæpius concrescunt, qui ubi angulati sunt pulmonum motu, & gravitate mercurii commoti teneram eorum substantiam lacerare solent, quo tussis vehemens, atque arida, dolorque thoracicus non raro cum sanguinis profluvio satis insigni, atque exinde ulcera cum signis phthiseos pulmonaris nascuntur. Verum isti lapides sint læves, neque qui pulmonum parenchyma terere, vel lacerare possint; at concidant canaliculorum partes facile dilabentes, ratione imbecillæ virtutis, qua ad mutuum contactum sistuntur, quorum minimi villi, qui sunt veluti toridem languidi vectes uniti, adeoque parvarum virium capaces, dum ad motum a fluenti corpore majori impetu instructo excitantur, iners illa efficitur vasorum vis & fibrarum minor ad contractionem nisus, qua debili minimorum solidorum energia sistitur ad partem fluidorum motus, indeque fit, ut mercuriales particule a resistentiæ loco repulsæ, a reperiuntur validiori impetus momento instruantur, atque vires percussione in continentes villos exercent; quorum teneræ, ac laxæ fibrillæ maxima distensione coactæ a nova jugiter affluente materia infirmius nituntur in contenta fluida; & cum a languido nisu villorum, particulas fluidi viscidiores, & motui magis resistentes premente, non fiat lentor liquidior, ut seungi, & sese expedire possit, evadet ille ad motum difficilior, & ratione lentoris tenacius hærentis extremitatibus canalicum augebitur pulmonum infartus, quo vasa illa tenera coarctata, & compressa liberum transitum præbere non possunt circulantibus fluidis:

indeque continuo appulsu novi liquoris ad partes pulmonum compressas tendentis, & præterfluentis ad latera urgentis, vasa ultra tonum dilatata, & distenta tandem rumpuntur, quæ viam ad pulmonarem phthisim sternere solent. Unde quotiescunque liquidorum lentor univervalis, & vasculorum infartus tollendus erit, sed aderit pectoris dolor, tussis, aut tubercula delitescunt, immipuetur quidem fluidi crassities, at cruda pulmonum tubercula parvo dolore latentia salivationis agitatione incallescunt, & inflammata suppurantur, quæ in habitu primo phthiseos delitescuntia in irreparabile exitium terminantur.

Nec feliciori eventuum certitudine in nervorum tremore salivatio expetitur. Cum autem ad motus requiratur contractio musculorum maxime æquabilis, atque continua, si spiritus per nervos insuat minori copia, quam par sit sustinendæ tensioni fibrarum, nervorum tubuli dato temporis spatio a derivatis spiritibus solum inflati elevabantur, & demittentur alterne, unde continget tremor; cuius tremoris species in villis impressa, si a comprimente aliquo, vel obstruente, adeoque spirituum influxus interceptante inferatur, salivatione plane tolli, atque averti poterit. At in senibus, & imbecillibus cum tremor a debilitate nervorum, & lucta spirituum proveniat, erit ille compositus ex repugnantia nervorum ad excipiendam pressionem in fibris a spirituum expansione, & nisu, quasi laxatis per membranarum divulsionem diuturno tremore fatiscentium, & inerti nervosi liquidi elatere flexuosos canaliculos, minimasque tilias non replente, qui in labentibus villis obviis, & earundem distractione subortus, cum eorum tenuissima filamenta ad æqualem contranisum inepta tonico motu non æquent mercurialium percussione vibices, tremor idem non modo persistet, verum major succedet.

Ratione non longe diversa male sputatio cietur in eo, qui motibus convulsivis a lædente externo illatis obnoxius evadit. Ita quicumque cerebro debili, aut nimis rara, & laxa nervearum fibrarum textura præditi ex adunatione partium minimarum con-nisu in coactione tam parvo suborta, ut levi motu solvi queat, morbis nervosis tentantur, aut paralyti ex magna villorum siccitate musculorum flexione dirigentium prohibente, vel ab eorundem resolutione motum coercente (quorum pars affecta

protracto morbo contabescit) a mercurialibus obducantur. Gravia enim mercurii corpuscula nimis mobilia fluenda per propriam nervorum substantiam, immo, superatis innumeris diverticulis, & impedimentis, motus suos ubique perperam diversis directionibus, ac velocitatibus, quibus pollent, communicant singulis machinulis totius nervorum fabricæ, & poros impervios memoratæ particulæ commeantes hac illac inæqualiter nervos excutiant; & quia eorum meatus, inanitates, & interjecta spatiola sunt mollia, contracta, & diversis sarculentis referta, impediunt flexuosos trices, atque interfecationibus invicem inclinatis, ne mercuriales moleculæ cursum molientes æquali undique nisu spongiolas fibrarum penetrent, sit ut motu celeri perturbato machinularum dimoveant nexum, indeque deflectantur quocunque, tanta cum virium inæqualitate, quanta videtur necessaria ad implicatam nervorum substantiam raro villorum fœdere copulatam diruendam, variisque quassationibus villos contractiles, nervorum filamenta, & fibras membranarum assidua stimulorum vi laceffendas ordinata; adeoque imminuta vi cohesionis inter exilissima corpuscula ita enervatur villorum, & filamentorum connisus, ut humoribus tiliæ madescentes ad instar spongiæ tanquam cera emolliantur, & pondere mercurii maceratæ a proprio termino recedant.

Hinc cum mercurius vivus insensibilissimus sit nervis, ideo qui pro salivatione unctionem passi, sæpius laborant gravioribus nervorum affectibus, a residentibus (ut pluri Chymicorum cum Lemery facti sunt) hinc inde mercurii particulis, optime auro curantur, testante Etmullero, unde Zacutus Lusitanus unguentum mercuriale conficit ex auro, ut crassiores mercurii particulæ per totum corpus diffusæ post salivationem in fibrarum interstitiis resistentes, promptius se insinuent in aurum. Si intra nervorum spongiosam substantiam viscidis implicatæ subsiderent crassiores mercurii particulæ, nequaquam elicerentur ab auro. Verum quidem est, si aurum atteratur (si vero atteri potest) in partes adeo minimas, ut earum corpuscula, habita ratione molis, & gravitatis energia, reddantur sanguinis particulis levitate paria, & rapi cum fluidis apta, veneream luem tutius auro, quam mercurio sanari. At licet aurum in minutissima sui corpuscula redactum sit, adhuc continet moleculas, quæ a sanguine

evehit resistunt, quæque nullo artificio hactenus cognito ad tantam attenuationem reduci possunt, ut in minimas atomos confectæ sanguini hære, motuque fluidorum rapi possent. Qua ratione licet mole æquales, sanguine tamen graviore auri particulæ a liquidorum commercio seclusæ, nullas in mercuriali sulphure vires exercere poterunt. Quibus vero mollem fibrarum texturam finxit natura, aut qui in mercurii fodinis continuo marcescunt, nervorum labe non carent. Ob jugem solidorum colliquationem, & fibrillarum macerationem a mercurialibus corpusculis intus susceptis, contabescunt nervorum fasciculi, qui perperam a nimio mercurialium impulsu indefinenter laceffiti satiscunt; unde vasorum tono subrepto, tollitur eorundem nisus in fluida, ex quorum retardato motu, & virium solidorum inertia complicatus morbus emergit.

Cum vero sanguis præservidus existens a recta temperie desciscit, & ejus sulphureæ particulæ prædominio potitæ sibi salem asciscunt, quæ invicem allisæ, proindeque in minimas solutæ moleculas nimium in fluorem evehuntur, liquoris mixtione alterata intimeque fusa ejusdem naturali consistentia inordinate solutus dyscrasiam sulphureo salinam, & salso-muriaticam acri-alkalicam indolem induit, cujus, sulphuris, & salis concreciones perpetim huc illuc dispersæ, exterius suffusæ maculas, & ulcera, interius depositæ dysenterias, & dolores pariunt. In hac sanguinis soluta fibrarum coherentia, in qua nimis tenue cogendum, & acre involvendum, doloris artis opus erit hunc morbum solventi ullo salagogo tentare.

ARTICULUS IV.

De Mercuriologia.

Quandoquidem multis retro ab hinc annis ab explorandis mercurii viribus, reluctanti licet animo totus abstinerim; animus tamen nunc meus in illius contemplatione ita rapit ingenium, ut mihi videatur non absque aliqua animi voluptate, & me non injucundo munere versari, si extricatis specierum mercurialium præparationibus mercurialibus, quibus ambiguum communium auctorum notiones non involvunt, examinandas attentius mercurialium vires intentavero, dum eas simul colligere conor, quarum delectatione non immerito allicimur ad elevandas cogitationes, men-

etque aciem acuendam, quibus sublime de tanta mercurii excellentia nostræ utilitati comparata cum Chymicis gloriamur. Totus admirationis nostræ scopus in eo vertitur, ut nobiliores summi illius entis mercurialis usus depingamus, quod quo diutius contemplamur, eo magis ad sui admirationem rapimur. Hanc autem occupationem, qui abjectam, minusque utilem putaret, ipso etiam in medicinæ cælo felicitate careret. Licet autem meam sub eadem tenuitatem sincero sensu animadvertam, nova tamen in dies phenomenorum, & præparationum materia cognitionem suppeditat, ut nec ullatenus dubitem, quin exactioribus adhuc posteritas experientiis, ignotas nobis tum vires, tum præparationes detestura sit. Non est ergo cur metuamus, ne nostra mercurii cognitio de novo antecedentium aut subsequenentium defectu expiret, aut deficiat. Infinitus hic oceanus virium, proprietatum varietatem continet, de quibus longe difficilius cognitionem acquisivero, quam easdem percurrens hausero, aut enumeravero.

Ur autem rem ab ovo incipiam, contra Galenum rixas concito, qui lib. 9. simpl. medicam. sibi minus constans, infido, & malefano artis convitio argentum vivum ex sponte nascentibus non esse, sed ex his, quæ præparantur, velut cerussa, ærugo, lithargyrum contendit, faterique se nullum hujusce medicamenti fecisse periculum, an interimat si devoretur, vel ubi foras sperit admotum. Alii porro, Philosophorum, & Alberti Magni lib. 4. min. cap. 70. sententiam secuti, cum viderint argentum vivum quasi omnibus associari metallis, ipsisque facilius contactu inhaerescere, materiam ad omnem metallorum generationem commenti sunt, quæ in utriculis reposita, nullisque fistilibus vasis coercita, lignea vasa obvia quaque perumpere; quo fit, ut Dioscoridem mirari subeat, qui ab hydrargyro vasa cuncta exedi, ac metalla quibus inhaerit destrui autumans, lethalem potum esse cum Plinio lib. 33. cap. 6. & 8. falso apprehendit, quod internum cordis humorem, vitales sanguinis spiritus subinde congelans, suo pondere interna tandem distringat. Galenus vero quamvis testetur alibi nullum fecisse experimentum contra Dioscoridis sententiam ait, mercurii calorem eo perducere, ut per erosionem interimat. Conciliator ab his recedens in tract. de ven. cap. 6. dicit, quod argentum vivum ore

sumptum, inducit hominem ad epilepsiam, aut apoplexiam. Ad dolendum sane, infrugiferis conjecturæ cespitibus, dubioque experimentorum successu rem longe attigisse: quorum cœtus discordes, aut senio confecta mendacia renovare, aut commenta deliranti figmento excolere animus exhorret, quæ in artem invecita convitia fidenter convellit Agricola de re metallica. Nuper autem inquit cum improba uxor marito aliquot vicibus argentum vivum dedisset devorandum, id sine ullo nocumento ejecit per alvum, quo mercurius uxore humanior optatum scelus

Toxica zelotypo dedit Uxor moecha Marito,

Nec satis ad mortem credidit esse datum.

Misquit Argenti lethalia pondera viri,

Cogeret ut celerem vis geminata necem.

Dividat hæc si quis, faciunt discreta venenum,

Antidotum sumet, qui sociata bibit.

Ergo inter se se dum noxia pocula certant,

Cessit letalis noxa salutifera.

Protinus ut vacuos alvi periere recursus,

Lubrica defæctis, qua via nota cibis.

Quam pia cura Deum! prædest crudelior uxor;

Et cum fata volunt, bina venena juvant.

Samberolitanus in commento ad Avicennam vidit hydrargyrum abortus promovendi causa mulierem ad libram sumpsisse sine noxa, & hoc ipsum confirmatur a Fracastorio in lib. de simp. Brasavolus Medicus Ferrariensis vir sane illa ætate clarissimus, in suo de stirpium examine, sæpius dedisse fatetur argentum vivum devorandum vi verminum semimortuis infantibus, a quo velut e faucibus orci protinus a morbo evadebant. Ita Gorritienses obstetrices, ubi gravidæ diu in partus labore, & cruciatibus inani conatu urgerentur, statim argentum vivum scrupuli pondere nullis incommodis, immo parvus dolorem, & difficultatem lenientes potandum exhibebant, testante Matthiolo lib. 4. in lib. 5. Dioscoridis; ex quo nihil mirum, quod scripserit Avicennas, non deesse, qui bibant argentum vivum, & nullam inde sentiant noxam, quod facile e corpore dummodo haurientes continuo huc illuc deambulant.

De qualitatibus mercurii Fallopius disputans, unam in superficie, alteram in intimis partibus apprehendit, quæ calidæ suapte natura, atque siccæ, habent extrinsecus cum Aristotele partes æris admixtas, a quibus impedita mercurii concretione in flui.

fluidum corpus servatur. Avicennas tamen frigidum, & humidum esse in secundo gradu existimat, cui consentit Averroes, ut refert Pandeclarius. Fernelius de abditis rerum causis frigidum, & humidum in quarto gradu, quod confirmat Matthiolus lib. 6. cap. 28. & solvit ambiguitates circa ejus temperamentum exortas, ubi cum Plinio hydrargyrum vomicam ignis æterni, & sanguinem sistere asserente, addit, argentum vivum interimere, si largius bibatur excessu summe frigido, & humido ex quodam seplastrario convictus qui ardentissima febre correptus, siti intolerabili vexatus, delirio oberrans in pharmacopolium descendit, ut, quod laxaret sitientia, summeque arescentia labra, inveniret, & casu incidens in vas argenti vivi pro aquæ fortassis vice multum ex eo potavit; sed paucis post horis congelatus migravit ad superos; dein patefactis visceribus in ventriculo innatabat argenti vivi libra, & circa cordis vasa sanguis concresebat.

Ex supra recensitis satis innotescit, antiquiores Græci, qui horrore quodam percussu illum nec extremis digitis tetigere, quam admodum jentem de hydrargyro habuere notitiam: quorum vestigia calcant multi ex rudioribus Medicis solo nomine mercurii deterriti, qui, quorum virtus turpis est inscitia, & inanis existit suspicio, malunt ægros certo mortis periculo relinquere, quam anceps experiri remedium, despicientes illud Colli, *totum esse quod est unicum*. Horum dubitationis stultitiam convellit Junkenii observatio. Mulier quædam utero gerens, puello ubera porrigens curriculo viginti mensium Gallico seminio inficitur. Hæc leviter inuncta mercurio, cum renello infante, etsi non lenito, salivationem patiebatur, donec mater, & puellus a celtica lue feliciter evasere. Inde post circiter labente mense inculpata salutis infantem enixa est. Ex quo, silentio prætereo praxin eorum, qui nec mente, nec digitis mercurii vires adumbrantes, exhorrent, ne mercurius a calore vitali excitatus, quasi a Chymicorum igne commotus in sanguine sublimetur, quo septici, atque erosivi salis indolem nanciscente veluti a veneni snore ac claude, homo de medio tollatur. At in corpore fluido leni solidorum impetu promoto, qui calor præcor, gliscit utrens, ut mercurii partes sublimet instar subtilissimi, ac erosivi cunei acutatas.

Ut modo accedam unde digressus sum,

homogenei corpori mercurii explicatio tot hucusque fuit involuta difficultatibus, ut nisi seracior in his resolvendis posterorum industria, quam majorum nostrorum, & nostra fuerit operosa felicitas, illud pensum esse censeo, omnes non tantum unius Philosophi conatus, sed plurium sæculorum tentamina extorquens; cum Chymicorum quoque examina, & sedula Philosophorum solertia propius intiram istius Prothei naturam solertissime investigantium, ad hunc usque diem plus admirationis, quam cognitionis, plus dubitationis, quam certe demonstrationis palam fecerint. Revera naturam, & causas adæquatas mercurii perspicue rimari, atque eruere, gravissimum mihi videtur onus, cui solide absolvendo parem quemcunque hominem fore semper suspensus hæreo. Ut autem hoc in negotio non longe rem, & felicius scopum attingam, utque hydrargyri proprietatum, ac virium maxime veritas clarius eluceat, veritatis auspiciis in arenam descendendo, placeat spargyricam ingredientium præmittere analysim. At cum curiositatem meam intra Chymicorum experimentorum cancellos non coerceam, ego adhuc juvenis non nisi angustam hætenus eorum supellectilem mihi paravi, quibus absque Ariadnæ filo possim egredi, ut tam gravis, difficilisque pensum rem aperire mihi liceat?

E subtilissimis autem effluviis æthereis, ac fluidissimis conflatur mercurius, quorum volatilibus moleculis, & specificis particulis metallicis saturatus in fluorem evehitur, dum rotundæ materiæ primi elementi moleculæ in mercurio eminentes ireturi non possunt, in puncto contactus invicem collisæ perenni motu exagitantur. Spiritus hic mercurialis æthereus in subterraneis antris, & debitis seminii matricibus coercitus, in metallicas minutias appellens sui generis, his amico fœdere associatur, quas in minima ramenta exsolvendo in fluoris motum concitat, ac fluxiles reddit, adeoque compositus emergit perennis fluor, qui mercurius vulgi nuncupatur, cum in suis etiam repertus mineris, licet metallorum mercurio non destitutus, recremento potius metallico constet, a quo si partes terrea metallica, quæ sunt ingenitæ, ac eriginariæ metalli labes, artificiosa enchyrisi separari possent, quas per artem dissociare omni, sed inani conatu laborant Chymici, sublimior haberetur spiritus ab omni metallorum consortio vindicatus, qui jactaretur ab illis per

per ignem, Philosophis mercurius de mercurio dictus; quippe qui metallorum mercurius nusquam reperire detur nisi in Alchymistarum vana jactantia, inutili molimine, & falsis promissis, quod eorum quidam eo usque progressi sunt, ut stigma inusserint his omnibus, qui talem mercurium facere posse sibi arrogant, vel credulorum his, qui eundem confiteri posse sibi persuadent. Huic opinioni famulatur alchymistarum coriphæus Geber, ubi inquit: *Continet argentum vivum in se spiritum internum viventem, & convertentem ignem, si de potentia in actum promovebitur.* Huic consentit Helmontius, qui tract. progyna. §. 14. sulphur externum, originariam metalli labem, separare jubet a mercurio vivo, ut fiat mercurius de mercurio, qui deinde nullo igne poterit in formam terræ precipitari ob maximam sui simplicitatem; cum sulphuris terram amiserit, nulloque igne mutabilis erit. Ita Lullius sulphur inesse hydrargyro opinatur ex eo, quod *nullum argentum vivum promptius convertatur in substantiam sulphuris, quam illud, qui sulphuris molecule ab origine sunt profundissime dissolutæ, atque per dissolutionem intimius commixtæ: Nec ullum sulphur promptius congelat argentum vivum, quam illud, in quo sulphuris qualitates per dissolutionem in mercurio cohibentur; ex quibus concludit, argentum vivum non solum e spiritu volatili, sed etiam e subtili sulphure compingi, ut in corpus summe fluidum coalescat.* Hoc metallorum sulphur est internum ipsi mercurio, ideoque non magis ab omni corrosivo, quam ab ignis actione intactum remanet.

Mirum est, quantum se torquent preoccupata Hermeticorum ingenia, omnes ferme in eo desudantes, ut mercurius purissimo æthere saturatus ab impuro carcere educatur, in quo latitans spiritus ille (ut Geber lib. 2. par. 1. cap. 4. Alchymist. Magister) feliciter extrahi possit ad optatum finem; sed ah quantum deplorandum dolendumque! est improbum enim, & inanem laborem dolosæ artis fundamento innixum, credulos decipiendi gratia, & a dolo fruges captandi, tandem scopo aberrant, ad quem collimant, atque orientem in occasu quærentes cum veste Dianam acquirunt. Externa quidem facie mutabilis est mercurius, ut varias induat larvas, & ludat corporum formas, & si eo redigatur, ut nonnihil ab acidis coarctatus aliquot horas

fortiorem ignis torturam patiatur: nihilominus vel sponte denuo caput exeat, vel facili negotio in vivam formam per alkalia resuscitatur: Qua ratione in terræ poris in liquorem albicantem conversæ ita pertinacissime se invicem adherent, ut licet minutissimi globuli per microscopium adhuc in conspectum veniant, tamen varie revoluturi, atque ita intertexti, ut a nullo Chymicorum labore ad hunc usque diem eorum nexus potuerit exolvi, a quibus curiosi Spagyristæ maximo errore falluntur. Jam satis superque innotescit versipellis præparationibus larvari mercurium in habitu ejus externo, dum a diversis mensuris mutatus modo in liquorem cum oleo vitrioli subflavum, modo cum sulphure in volatilem cinnabarim transformatus: quippe qui salinis corporibus sursum raptus, salium formam, cum regulo antimonii, butyri, oleique substantiam induit; nihilominus addit Fridericus Hoffmannus, tantum abest, ut hæc involucria salina, aut sulphurea, partes sint mercurii constitutivæ ex illius substantia elicite, ut potius composita sint corpora ex mercurio, & menstruo ad ipsum larvandam adhibito, uti exinde ex reductione mercurii in pristinum fluorem abunde elucet. Ideoque cum altioris sit indaginis intimus mercurii nucleus, non attingitur, quo a mutuo amplexu desciscences elementares molecule in salia, ac sulphura faciscunt. Igitur licet variis modis tractetur, nullo modo est coercibilis, quin ubi optime fixatus putatur, insalutato hospite fugam molitur. Ita Bartholus summus Astrologus mercurium ad tantam coegit fixitatem, ut nesciret quomodo in convenienti illum includeret vasculo: sed nescio quomodo, fortissimo addito igne, inopinato mercurium igne-rapi conspexit: tanti nempe laboris est genuina ejus fixatio, ut cum vitriolo, & alumine in corpus mediocriter fixum redigi possit.

Borrichius, cum lamella martis in mercurium vivum projecta intra vas coercitum, & brevi post rota in rubiginem conversa reperiatur corrosa, acidum metallicum occultum intimius hydrargyro associari fortassis, si conjecturæ præstanda fides, a recto non aberrat. Hoc si in debitis vasculis contentum igni exponatur, miram aquæ insipidæ copiam elargitur, intacto semper manente mercurii pondere, ut Raymundus Lullius docet, Boyle in chymista septico, & Joannes Agricola in Poppium

te-

restantur; sed aqua educta, cum remaneat mercurii pondus, de quo dubitare licet, (si ab aëre non subministratur) num sit primorum miscibilium constitutiva, adeo ut nuda ignis actione possibile sit mercurii partes ita secundum novos, differentesque modos disponi, ut modo hanc, modo illam habeant corporis formam, licet ignis impetu commotæ partes in alias substantias omnino diversas coalescere non possint.

Alia metalla ingredi hydrargyri naturam censet Boyles in tract. de coloribus, ubi solutiones mercurii ab aqua forti peractas, non raro virides, observavit, qui color (ut inquit una Fridericus Hoffmannus de cinnabari nativo) sine dubio dependet a particulis immixtis veneris. Sed accuratius paulo si lubet pensitato experimento, suspicio non levis notæ innuitur. Cum spiritus aquæ fortis acidus aggrediatur globulos mercuriales, seque intime ipsis agglomeret, atque interponat (solutio autem nil aliud est, quam intima interpositio particularum solventis intra poros corporum solvendorum) particulae veneris in spiritu vitrioli in aqua forti eminentes, in mercurii corpuscula nituntur, & reactionem passæ exolvere possunt; unde solutio illa vitrioli veneris cum solutione mercurii commixta fas est dubitare, an solventi menstruo, vel soluto corpori debeatur.

Descriptiones, quas nobis de istius corporis ingredientibus tradunt, adeo implexæ sunt, ut etiam illi qui notiones chymicorum conati sunt polire, atque illustrare, fateri teneantur, nescire se quid velint. Igitur spiritus æthereus subtilissimus, & summe mobilis, cum metallicis particulis primogeneis constituit vulgi mercurium, cuius sphaeroidi globuli agilitate naturæ suæ propriæ, sive metallicorum corpusculorum ad hoc necessaria figurarum mutatione, & solidæ cohesionis resolutione, in puncto contractus sese tangentes, his intexuntur poris, quibus agitari queant ab æthereâ substantia, utque particulae admodum minutæ, licet pressæ ordinationi corpusculorum coordinatæ, non quietis expertes, multifariis, & indefinenter suis motionibus corpus metallicum in statu fluiditatis servare queant. Nec fluida forma corporis mercurialis levitatem redarguit, cum idem constet particulis in minimo volumine tam solidis, & tam numerosis, quæ non obstante intestina eorum motionem, corpus, quod componunt, summe ponderosum esse queat, 28

Licet aurum admittere recuset ullum corpus ad se nullatenus intime, aut permanenter ipsi associandum, ut illud satis firmiter ei agglutinatum possit intrinsece alterare: tamen mercurius vivus ita redditur idoneus ad aurum usque adeo penetrandum, & cum eo sese tam intime permiscendum, ut huiusce metalli particulae, quæ tam arcte quandoque agglutinantur, ut, inquam, non sine difficultate ab auro divellantur. Mercurius constat particulis ita apte figuratis, ut in auri commissuras ad ejusdem solidarum partium tricas investigandas sese possit insinuaré, cujus corpuscula nec majora sunt, quam ut poros, aut corporis auri inania introire possint, nec minuta adeo, ut eadem facile lucis ad instar trajiciant, vel ut ob exilitatem nimiam partes, quas invadunt, solvere nequeant: sed porulorum auri diametrum exacte adæquant. Quæ mercurii corpuscula cum sint agilia, aptaque ad motum, ut impetiri corporis albare queunt partes, ab ipsa atmosphæræ pressione impelli, intrudique possunt in poros auri non impletos substantia, quæ tantum resistens, quantum communis aër, æquali nisu non nititur in urgentem mercurium, gravitare, ac pressura ambienti prævalentem. Cum autem mercurius per accuratas auri commixtiones dividatur in particulas summe tennes, & per externam hanc commixtionem acquirat multo plus superficiæ, quam prius habuerat, undique fere tangit auri particulas, quæ in sua superficie mercurialem massam exhibere videntur. Agitatione deinde mercurii corpusculum his in auri poris, ac commissuris a libere vagante materia æthereâ promoveri potest auri motus, & incallescencia, ut Boyles experientissimus pluries observavit de producibi: chymi: principi: aut ex repetitis ictibus, variisque innatantium ipsius mercurii corpusculorum pulsibus; hinc intromissæ particulae rot veluti cunei intro adacti, partes auri, inter quas insinuant sese, emolliunt, aurumque incallescens puritatem amittit.

Virtus anthelminthica summa viget in mercurio, qua vermes occidit, fugatque lumbricos. Cum implicita vermium substantia sit molli, & distractili vasorum sedere copulata, tum diversarum pressurum, tum quassationem, accommodatur ad recipiendos illos humores, qui facile penetrant inanitates spongiosas, & vasorum diverticula, atque glandularum, immo villorum omnium cava, quorum pervia, levisque earum

earundem machinularum textura exsugit non sustinendi ponderis invadentes particulas, quæ minima mercurii segmenta mire solidis vermium partibus irretita, nova majorique motus vi dimota impetum acquirunt; Idcirco dum sese liberant a vinculis pororum, atque vermium anfractibus innumeris istibus, simul percutiunt singulas villorum machinulas, eas distrahunt, resistentias inertes dissolvunt, ac propterea innumerabilibus percussionibus, ac impulsibus depellunt huc, & illuc non solum humores totam vermium fabricam, itemque eorundem nervorum tubulos accolentes, ut debite non respondeant viribus solidorum: verum flexuosis tricis, atque intersecationibus invicem inclinata vascula divellunt, ut eorum fibrillæ non resistant particulis nimis mobilibus, eorumque sphaerulis penetrantibus, confriquantibus, & pene dixerim erodentibus solidorum substantiam, quæ tametsi aliquantum mercurialis liquidi impulsui resistat, nihilominus corporis jugiter gravitantis irritationes, & distractiones cujuscunque partis ita sensim intenditur, ut omnes villorum tilæ a ponderantibus cum fluidis vermium circumeuntibus particulis potius percussæ, quam lustræ dissiliant ab invicem. Hinc plus justo urgentia liquida, quæ tangunt, plus æquo distrahunt, eaque ita dissolvunt a mutuo fœdere, ut resistentiæ vasculorum, & laxi eorum hiatus fluentibus, ac resluentibus undis exagitati prorsus confringantur; ex quo (ut observavit diligentissimus Rhedi) facile concipimus, cur lumbrici a præsentia mercurii primo moveantur, dein irrequieti sese contorqueant, inde moriantur. Quotiescunque mercurius sui aliqua saltem tenuiori portione fluit, atque humoribus vermium intermiscetur, tunc fluunt, & resluent a mercurii pressione, & validius urgente liquida plus æquo provocata, fluunt inquam, & per omne vasorum genus circulum agentibus humoribus, spiritus fieri incipiunt nimis liberi, atque mobiles, adeoque acres, ut illorum minutissimæ particulæ pungentium ad instar, atque acutorum stimulorum penetrent fibras ad partium contactum positas. Ex hoc propterea exoritur contractiones, & distractiones; quot sunt fluxus, & refluxus undarum emergentium a nimis jactato nervorum succo, immo quot sunt contactus particularum impellentis fluidi, & incisiones, & diffusiones agentium fluidorum in singulos villos, a quibus omnibus si indolenter mordeantur

tur vasculorum parietes, & tali incutientis stimuli vi, ut in fibrarum poris distensis, & inamitatis dilatatis congerantur, mobiles atque elasticæ graves mercurii moleculæ sensim diffundantur, vermes nunc convulsionibus variis, nunc tensionibus universi corporis corripuntur. Idcirco cum nulla sit fluidorum molecula, quæ non concutitur, concutiat, jactetur, ac veluti urgentis mercurii pondere prematur, proindeque cogatur summa celeritate moveri, penetrare, & magna concitatione irruere in omnem, etsi minimam, solidorum particulam, ita ut nulla sit fibra, quæ vim non patiat, ideoque inæqualiter contrahatur, laxetur, commuteturque contactum, atque connisum, motus violenti distractionis villorum summopere augentur; adeoque liquidis mercurio interspersis memoratis partibus, quasi maceratis laxantur, immo maximis stimulorum cuneis concussæ, simulque partibus diversæ, & urgentis figuræ nisu perterebrantur, ut propriam resistentiam amittant; ex quo laceratis villis, & omnigenis filamentis confossis tota insectorum fabrica invertitur, & prorsus dissolvitur.

Partus difficultas, quæ naturæ leges non servat, mercurio nonnumquam suffragatur. Ut partus debito procedat termino (ultra infinita alia) requiritur, uteri fibræ mutuo flexæ, arcteque irretitæ, & per earundem protensiones mire implicitæ, & membranarum villi modice extendantur, ut in conatum expulsivum nitentes possint moderate contrahi, & versus inferiora fœtum validius impellere. Si vero liquidorum materies adaucta, & magis pressa ob infartum contractilium villorum velocitatem suam amittit, uteri villi evadent machinæ rigidæ ad instar, non valentis se flectere, qui cum non possint se contrahere, minus æquo agent, & languidius urgebunt; quo fiet, ut in dies magis non solum multiplicata fluidorum aggerie imminuatur fibrarum energia: sed veluti prælo constrictis humoribus uterum quaquaversum gravitantibus, & in ejusdem vasculis hærentibus, pori, locula fibrarum obstruantur magis, ac propterea uteri vasa cuncta majori conatu invicem comprimantur, quam eorundem feret resistentia; adeo interjecti humoris quiete præpeditur conatus impulsivus, compressivus, ut fibræ non impellant tanta vi, quantam exigit energia fœtus resistentis. Harum ex dictis hætenus causis, cum vasa uteri lentis humoribus imbibita, proindeque dura, ac

tenfa impediunt spiritus, ne villosis filamentis impartiantur necessarii conatus: fibræ sua duritie instar funis a lentore liquidorum, & glutine tensæ, cum supra vires proprias inveniant momentum resistentiæ, vim compressivam expulsionis sætis necessariam nequibunt moliri; ideoque cum mercurius tot partibus, tot machinis urgentibus refertus, torque munitus rebus cuneis, quot sunt minimæ ejusdem elementares moleculæ, hanc uteri fabricam urgeat, percutiat, & satis dissolvat inutilia, abradat, depellat humores infarciunt, distrahentes fibras, ac proinde vasculorum infartum, energiam, ac actionem villorum destruentem resolvat; singulæ fibræ, & membrane tegentes sætum in naturalem contactum, & ad partium cohesionem accedunt; unde opportunum conatum cum elastica vi acquirunt validiori connisu sætum urgent, & validius impellunt.

Externe sanat scabiem in glandulis cutaneis constanter residentem, quarum contextus rectiformis constituitur ex innumeris filamentis vasculorum cujuscunque generis mira arte invicem implicatis, per quorum vacuas ambages paralleli emergunt ductus excretorii, qui a Stenone observati ex glandulis subjacentibus oriuntur. Hinc papillæ quædam pyramidales a nervis prodeunt a celeberrimo Malpighio inventore detectæ, quæ a partibus lymphaticis ex ductibus illis exsurgunt perpetim irrigantur. Cum enim serosus iste latex a sanguine elicitus salibus acido-salis turgeat, ejusdem particulæ viscidiores non tantum utrinque acuatis, sed etiam tenuioribus salium mucronibus immixtæ, glandularum lacunas, & cutis porulos, per quos fluere debent, & insensibiliter erumpere, leviter opplent. Fibræ autem nervæ in glandulis cutis dispersæ a salinis particulis subtiliori aëre exagitatis commotæ, ac vellicatæ, molesti pruritus sensationes inducunt, a quibus nervorum, & villorum irritationibus, crassiores lymphæ partes, licet agitæ, cum difficulter sejungantur ab invicem, parvas in cuticula pustulas excitant, quæ a sero indefinenter ad glandulas confluentes in acumen elevatæ, inde a multis salium aciebus, quorum motui non valde resistunt, perterebratæ, acido-salios succos confertim effundunt.

In curatione hujus pruriginosi affectus, & hujus cutaneæ sordis, eo innititur, ut acida acrimonia temperetur, & glutinosa lymphæ incidatur, in quem finem mercurius

extollitur, sine quo difficillime absolvitur curatio. Hic enim nullas patiens inducias, nullaque resistentia coercitus, ad quamcunque corporis glandulosi partem sibi viam parat, & gravitatis viribus impedimenta dejicit, nunc jactat singula, quæ lustrat, & percussiones singulis partibus incutit: nunc citius penetrat filamenta, cunulosque villos, in quos irruit, arctamque seri cohesionem, & salium mixtionem intervertit, quin immo in solidorum machinulas, adeo momentum tremuli motus imprimit, ut ex illarum perenni oscillationum vi, rursus atterantur, atque agitentur, tam cutis glandularum inertes succi, quam illi qui per arterias, & venas fluunt, qui quidem ita jactantur, invicem confunduntur, atque alliduntur, ut post certum tempus reddantur tenuissimi, ideoque comminute seri, inde demum attritæ salium particule, quorum minima segmenta dividuntur, jam divisæ abeunt in auras.

Verum si scabie affectis in glandularum papillis, & cavitatibus vermiculus infideat, modo hic, modo illic fortuito titillans, ut apprimè docet exactissimo microscopio armatus oculatissimus Redi, tu, qui hæc meditaris, revoca in mentem, quæ superius attulimus de vermibus.

Observat Daniel Bartholi Societ. Jesu de glacie, in hydrargyrum demersa, aquæ in glaciem concretæ ramenta protinus aquæ fluorem suscipere. Quoniam liquidorum fluiditas in corpusculis divisibilibus maxime consistens, quæ partibus suarum superficierum, dum se invicem tangunt, separatim hinc inde agitata facile inter continuas eorum partes, & numerosa interstitia juxta suas invicem superficies volvuntur, usque adeo fluoris motum conservat, donec irrequieto motu agitata in resistens corpus incurrens debitum impetus momentum deperdat. Ita Renat. de Carr. Boyles, & Alphonsus Borellus cum quibus Gallileus nel tractato de Gallegianti. Fit igitur, ut aquæ moleculæ in quiete constitutæ, spiritu æthereo mercurii, & subtilissimo, laxato glaciei vinculo intrus commotæ, & hydrargyri gravitatis impetu in corpuscula satis exilia divisæ ad eam levitatem, & volubilitatem redigantur, ut libere sese quaquaversum ferentes in fluidum corpus reducantur.

Non longe diversa ratione Isaac Nevvtonus sancivit, illud esse fluidum, cujus particulæ quacunque vi commotæ, parvoque molimine impulsæ moventur, ac facili-
ter

ter se concutiuntur, licet fluidum immobile nulloque intus turbinari motu oculis subeat. Fluida, quorum partes debilioribus viribus eas diffociare conantibus non resistunt, inter se colica in particulas infinite parvas resolvi queunt. Ex tenuissimo ergo partium contextu fluidorum oritur illa minima resistentia, quam moleculæ in fluidis leviter commotæ diffingunt, & superant. Et licet ad fluidorum constitutionem parvæ, ac exiles requirantur particule, non videtur absolute verum, corpus illud esse fluidum, quod ex minimis moleculis coalescit; quippe componentium corpusculorum parvitas ea poterit cohesione firmari, ut eorum ramositate, curvitate, asperitate, particule, licet sub parvo volumine implicitæ, adeo sibi mutuo irretiantur, ut sese extricare difficillime queant; unde a levissimo pulsu corporis impingentis non propulsa solidum corpus vel tenacius fluidum constituent.

Delibata mercurii proprietate, & minus ruti usibus perpensis, operæ pretium nunc est investigare, quibus elementaribus principiis, salinis ne, aut sulphureis, in quibus impressa est, lues exterminetur. Acida salia auræ celticæ, chymici intra poros mercurii (cum sit alkali volatile) implicari contendunt, nonnulli, quæ a colore, & fluidorum motu ad superiora propulsa sublimantur, ubi viarum irritatione apertis salivæ ductibus pituitosa materies jugiter erumpit. Sed gratis omnino in mercurio alkali dicitur inexistere; neque enim huic corpori, cui quodam quasi experientiz testimonio inesse creditur aliter probatur existere quam ex hypothesi, quod alkaliorum effectus ab assumptis Chymicorum principiis oriantur. Nec assertiones tam late patentes, tantique momenti admittendæ sunt, nisi validis firmatæ rationibus. Immo dum aliam in medium proferre hypotesin aggredior, meum esse censeo rationes adducere, quæ dubitanti causam vindicant, & prolatis assensum prohibent, ne gratis confutationem exornem, multoque minus confidenter nimis sententias convellere insimulet. Hoc vero absque convitio, dum id mihi arrogo, illam mihi indulgendam iri veniam, quam quisque sibi philosophanti debere pensat, confido. Cum alkalinum subiectum ex frangibilibus, rigidisque spiculis coalescens, annuentibus ipsis, coerceatur ab angulosis acidorum ramentis, particulas mercuriales involventibus, eorumque motus re-

tundentibus, acida salia venerex luis supra mercurii corpus vires exercendo glutinosi liquidi cohesionem auferent; nam particule alkali sinuosis angulis intexuntur, adeoque particula acidi impingens in moleculam alkali locum invenit, a quo in eorundem sinum recepta alkaliorum vires diffingit. Si vero in gyrum rotata alkalica mercurialium corpuscula acidorum aculeis coherescerent, eorundem angulorum acutina juxta variam alkaliorum porositatem, & molem, additorumque corpusculorum allisionem in se invicem coeuntium, in tam obrosa latera sese mutuo molarent, angulosque adeo reclusos, ut post variam utrinque luctam, mutuosque amplexus iterum eo unirentur modo, ut eorum cunei certa rursus coalescentia sibi invicem constati, parvula possint exhibere prismata, quæ particulis pungentibus, & salinis sensim expedita, liquidum, cui innascent, omnino insipidum, & ab acore erodente discrepantem suppeditarent. Ita Boyles de mechanica saporum observat; quod si liquori fixi nitri per deliquium facto, caute spiritus nitri guttatim affundatur, donec omnino alkali saturetur, paucis momentis post levem evaporationem chrysalis obtrinent, non acris, nec alkalizati saporis. Ex mutua horum corporum reactione, & passione, alkalizatæ, acidæque particule in fluida coeunt, & post validam corpusculorum allisionem sibi invicem conjunctæ, prisma ejus figuræ exhibent, cujus extrema nimis utpote obtusa, inurere non possunt; ex quo corpus medium resultat. Ita alkaliorum mercurii cum acidis unio, solidorum erosioni non occurrens, at fluidorum consistentiam, crassitiemque promovens, remoto impetu, & in agendo seclusa gravitate, stimulo carebit tenaciores acidorum concretionem solvete.

Sed inquirunt, alkalia sunt corpora poros habentia proportionatos ingressui angulorum particularum in liquido natantium; igitur si vis illa, qua liquidi partes mutuo sese urgent, & æquali undequaque nisu manent libratæ, inveniant locum minus resistentem in alkali poris, utpote aëre subtilissimo repletis, in eosdem fluidum impellet, adeoque acida cusps in spatia inania alkaliorum impingens, in his recondetur, & ab eorum præsentia liberatum fluidum pristinam crassim recuperabit. Verum quidem est ab irretitis salibus inter alkalia corpuscula fluidum edulcorari, at acidi salis particule cum alkalibus combinatæ, &

veluti carcere detentæ in poris alkalium majorem unione nactæ ponderosam molem, cum fluidis circumvehi non possent; quæque pondere majori a liquidorum commercio seclusæ diarrhœam potius, quam phthysimum promoverent. Cum igitur ratio acidi & alkali consistat in proportionem pororum vacuorum ad spicula acidorum, sane nulla apparet necessitas, quod mercurius sit certi schematis, & magnitudinis, ut configuratas acidorum particulas absorbeat; immo ita in minima dividitur, ut a nonnullorum angulorum terebra, & cuneis possit permeari: adeoque non mirandum, si particulas in majorem molem fastigiatas, & turbinatas, nec suis poris commenturatas, ex ipsius parvitate molis excludat. Attamen non imus incicias, quod plus, quam minimas non præferat interspersas porositates, & particularum tales ad invicem contactus, qui a gliscentibus inter partes, & partes fluidi erodentis globulis non possint repleri, prout variæ ad invicem aut cum aliis salinarum particularum superficieculæ cohærent. Partium enim mercurialium nexus tam arctus existit, vel ea est compages, ut aut si non desint pori subtilissimis angulis permeabiles, ea tamen est parvitas mercurii, ut a glutinosis particulis nullo modo penetrari possit; cum ex una parte non existat in his gravitatis momentum, quod valeat partes viscidas ab invicem dissociare, & in minimos cuneos dividere, ut poros mercurii penetrare possint. Ab hoc solo virium defectu excluduntur ab ejus poris salinæ viscido involutæ particule, licet pressæ a totius fluidi superincumbentis altitudine. Ex altera parte particule salis ex tenuitate molis, vel crassitie possunt adeo parvi motus fieri, ut vi careant superandi mercurii resistentias, quas opponit motui illa qualiscunque sit adhesio, quam habent in intrinseco mercurii globuli ad invicem, tanto majorem in resistendo effectum producenti, quanto minores erant corporis mercurialis superficies; ex quo mercurius non potest penetrari a viscidis particulis, quia poris caret glutinosam admittentibus. Minimi pori mercurii penetrationi per aquæ viscidas moleculas faciendæ resistendo, instantibus salibus, & urgentibus spiculis aditum non permittunt, quæ tunc eo tantam non habent, quantam exigent ad eos pervadendos tenuitatem, & impetum. Si verum est, particulas mercurii unius figuræ esse, sicut persuadere videntur summa ejus

simplicitas, & incapacitas corruptionis; si verum est, eas esse sphericas, vel aliquæ ex figuris ad sphericam accedentibus circumscribi, quemadmodum ostendere videntur plures ejus proprietates, non posset esse in mercurio inanum spatiorum diversitas, nec ea ad quamlibet figuram congruentia, quam expostulant plures Chymici. At pororum in mercurio quæcunque sit existentia, & quæcunque eorum amplitudo, an sine gravitatis momento partes salium concretorum, quæ in sanguine existunt, ab invicem separari, & scindi poterunt? hæc non nisi conjecturæ sunt rem adumbrantes magis, quam probabiliori ratione explicantes; immo Philosophorum ingenia earum facilitate allecta ab ulteriori licet utiliori distrahuntur examine.

Quocirca ad tollendam aciditatem a corpore aliquo fluido præsertim opus est, ut a particulis acidum sustinentibus fundamenta aciditatis detrahantur, vel illæ a corpore ablegentur. Cum igitur fundamenta aciditatis in acutis angulorum consistant, requiritur, ut acuti anguli emolliantur, ut in rectos vel obtusos faceant, aut omnino tollantur in curvam superficiem mutati. Angulorum autem ex acutis in obtusos transitus fit per rupturam acutorum cuspidum a validiorum agentium nisu diffringendarum; argumento admodum probabili, multam in mercurio requiri gravitatem, & impetum, qui salium evektorum spicula cohærentibus moleculis implicata possit infringere. Nec reponant posse retundi acutos acidorum salium angulos unione aliorum corpusculorum. Duo enim anguli acuti verticem communem habentes, & secundum latera sibi invicem cohærentes rectum, vel obtusum angulum fere semper constituunt. Sic involvuntur acutæ cuspides lentis, mucosis, & pinguibus substantiis, ac veluti intra vaginam anguli acumen conditur. Hoc artificio salium spicula in sapone mitigantur; sed si hoc fiat, est tantum acidum edulcorare, non in minima resolvere, non destrueri, non partes conglutinatas descindere; adeoque si in particulas salinas cohærentibus nuptas non impingat aliquid, quod non sit ei specificè gravius, magis mobile, & in minima divisibile, nulla spes erit, ut possit una ab altera separari.

Nec magis arridet eorum ratio, qui explicantes actionem mercurii per vasa ad fluida difficulter mobilia impellenda trajecti & salivam vehementer moventis, venas præ-

cipue lymphæ ferendæ dicatas torpore quodam infestari ex quadam vi hydrargyri stupefactiva non dubitarunt. At si propter tenuitatem lymphæ ductuum ab hydrargyri inunctione stupore facile affectorum, ob intensum hydrargyri frigus, amisso tono, & fibrarum vigore, debita lymphæ separatio, reditusque in venas impeditus intra sanguinea vasa cohibetur, quæ arteriosa canalia supra modum distensa ad salivæ emissaria depleri cogantur; quæritur qui fiat ab exinanitis lymphaticis topbos discindi, ossiumque cariem emendari. In lymphæ morboſo liquido totus fortasse later scomes; sed si quoque lateret, quæ ratione hydrargyrus in mercurium dulcem confectus per minima sanguini unitus, & impetuoso motu per vasa raptus vim suam indolemque denuo exercendo lymphæ ductibus torporem conciliabit?

Sane ut rem acu attingam, ne me assumptis pluribus, minusque notis conjecturis, & præpostero hypotheson conatu philosophari videar, quisquis rem attentius contemplatus fuerit, corpuscula mercurium constituentia irrequieto motu exagitata a fluidorum pressione, & circuitu distiliari posse per orbem, facile per sanguinem in minima dispergi advertet, quæ mercuriales in statu fluoris particule non facile cohererentur per vasa, si earundem componentium unio intricata, adhæsiisque tenacior esset: hæc enim mutua fuimet invicem implicatio, alterius ab altera separationem prohiberet, ipsaque molecularum conjunctio easdem ponderosiores efficeret, quam ut simul susque deque attolli, & vertiginoso liquidorum motu rapi possent. Liquidum mercuriale cum sit in minutissimas divisum particulas, facile cum altero fluido, vel solido, quoad omnes partes in illius poros se insinuando, in alterius penetrando, misceri poterit: & postquam est mixtum, mercurii molecule cum sint a continuo gravitationis motu concusse, alterius liquidi solidioris obvia corpuscula non difficulter discindere valent. Hinc ab invicem commixta & minima minimis conjuncta, necesse est, ut corpora agentia possint, agere in particulas patientis, non quiescant, sed sint incessivo motu agitata, aut in rapidissimo cursu constituta instar cuneolorum, quotiescunque in alterius corporis particulas illis congruentes, vel ad recipiendum gluten, curas habentes, impingunt, hæcque easdem divellunt impeditum semotis,

& fortissimis quibusque obstaculis dirutis; idcirco tamen in sua maxima divisibilitate eorundem gravitas nihil evanescit, interrumpiturque: sed quodvis corpusculum infinite divisum, licet mole minus cæterarum fluidorum particularum, gravitate majus, a solidorum nisu cum sanguinis circuitu promovetur, quod ubique celeritate sanguinis majori instructum, a dato cordis impulsu plus momenti suscipiens, majorem impetum in resistentiarum accessus exercere valet; Unde quantumcunque parvus sit impetus sanguinis fluentis cum semper resistentia minor sit momento impellentis mercurialis liquidi undecunque nitentis, agitur intra omnes villorum plures nihil resistens influxui tentantis fluidi, cujus vis tumoribus, & fluidorum lentoribus occurrens innatæ gravitatis impetu, & in stagnantia liquida ad membranarum contactum posita se agere nitens, quasi cuneus coherentes particulas dimovebit, quæ a subtilissimis mercurii ad nullam formam determinatis corpusculis, hinc inde intus commotæ, & jugi eorundem circuitu in motum concitæ, inciduntur, attenuanturque, & qua data potentiori porta ruunt, quæ sæpe per vehiculum salivæ evehit in eorundem ductus ejiciuntur. Hinc resoluta, & subacto fluidorum lentore, spiculis salium retusis, vasa, porique obſtipati a tartarea seculentia stagnantibus sordibus liberantur, atque experiuntur, adeoque fluores omnes totius corporis in ordinem, ac motum rediguntur, & sic pene omnibus morbis, cum a visciditate humorum, & obstructione ductuum ortum ducunt, mercurialia medentur.

Tophi, & gummata non nisi remediis maximo impetu instructis evelli possunt, quorum validi momenti particule sanguini intrusæ, diu in ossium excreſcentiis impellentes vires suas imprimendo per itus redditæque corporis impingentis, penetrantisque gravitationem, obvia quæque discindere, ac renitentes tumores resolvere valent; quæ combinatorum partium resolutio neutiquam in nobis contingeret, si appellentia corpuscula supra data obstacula, & resistentiarum aggregata excurrentia, terebræ, & cunei vires in occurrentes lentores non exercerent; quo fit, ut mercurii gravitas cæterorum mineralium major, non solum ubique celeritati sanguinis æqualis, sed validius momentum suscipiens, impetumque majorem exerens ad loca maxime resistentia, ubi fluidorum motus quasi evanescit, par-

partium cohaesiones tollat, & immotas topheorum particulas dimoveat, quæ a repetito promoventis impulsu commotæ sensim abraduntur, & intimius eliquatæ novæ sanguinis circulationi committuntur. Igitur quoties salina spicula intra fibrarum contextus incuneata, vascula, & fibrarum tiliæ depascuntur, hæc corrosiva salia hebetantur duntaxat a maxime penetranti mercurii energia, quæ cum in omnes ægri partes sese insinuet, acido salinas moleculas occurrendo cicurat; quo interea vis partium elastica vigorem acquirens ad evictorum salium enormitatem una cum mercurii expulsionem insurgit, ac ut plurimum per purulentissimum phthysimum ad oris emundioria celticum venenum demandat, quæ expurgatione completa laceffita quiescit natura, & vires labefactatas resumit.

ARTICULUS V.

De morbis per salivationem mercurialem curabilibus.

SI quis unquam est morbus, qui facili Marte a mercuriali salivatione discutitur, est venereum contagium, quod crudeliter in corpus humanum debacchari cœpit anno 1494. nimirum dum Carolus octavus Gallorum Rex cum Alphonso Rege bellum gerebat, ingenii militum phalange strictissima Neapolim obsidione tenuit; Neapolitani magis fame, quam bello enormiter vexati imbellem ac mollem scæminarum turbam ab urbe ejecere. Galli milites, quos non pudebat cum turpissimis scæminis coire, Hispanorum versutias ignorantes, earum pulchritudine, ac blanditiis allekti nativum libidinis æstrum in scæminas fornicando sociavere: Inde totus amoribus nequàm viatiatus exercitus, insuetoque delusus dolo ultro horribilibus se cœpit pandere morbis. Hinc erudite Fracastorius:

*Qui casus rerum varii, quæ semina morbum
Insuetum, nec longa ulli per sæcula visum
Attulerint: nostra, qui tempestate per
omnem*

*Europam, partemque Asia, Libiæque per
Urbes*

*Sævit; Latium vero per tristitia bella
Gallorum irrupit, nomenque a Gente re-
cepit.*

At incertum est, cum incœpit inter homines grassari, si prius obsidentes Galli hanc lûem experirentur, antequam obsessi

Neapolitani contraxerint; Neapolitani Gallos, Galli Neapolitanos inculcant, & Hispani utrosque Neapolitanos & Gallos vicissim exprobrant, & unaquæque eorum natio reliquis hoc facinus vitio vertit. Sed fortasse melius se pandit ipse morbus.

*India me genuit, peperit me Gallia Mater,
Me alit Parthenopes, dic mihi qua Pa-
tria?*

Hæc venerea lues licet in veterum auctorum monumentis, & observationibus non se pandat; tamen cum ab Avicenna, & Galen^o V. de comp. medicam. VI. de simpl. nu. XI. de simpl. facul. VI. de locis affectis cap. VI. describantur tumores, ulcera, ac postularum species, quæ luis venereæ affectionibus adæquate respondent, credidere nonnulli, hanc veneream lûem, dum Galli Neapolim obsidebant, antiquis morbis fermentale tantum addidisse virus: hinc in Celso, sycosin, mariscas hominem olim scedasse legimus. *Fit vero ait utrunque in his partibus, quæ pilis contenguntur; & apud Martialem lib. VII. Epigrammatum:*

Ficosa est uxor? ficosus & ipse maritus:

Filia ficosæ est, & gener, atque socer.

Nec dispensator, me villicus ulcere turpi:

Nec rigidus fossor: sed nec arator eger.

Cum sint ficosi pariter juvenesque, senesque,

Res mira est: ficos non habet unus eger.

& Juvenalis satyra lib. 2.

Quis enim non vicus abundat.

Tristibus obscænis? castigas turpia, cum sis

Inter Socraticas notissimæ fossa cinedas.

Hispida membra quidem, & dura per brachia sese

Promittunt ferocem animum, sed podice lever,

Caduntur tumide medico vidente marisce.

adeoque antiqui torquebantur quidem ulceribus, pustulis, lepra, scabie, tumoribus: ac veterum monumenta homines in scortis avidè luxuriantes hac lue scedatos topheorumque cruciatus perpassos fuisse non pandunt.

Ex prægrosso igitur concubitu cum muliere venereo semineo conspurcata, malignum virus, & halitus contagiosi à pollutis, & turpibus obscænis prodeuntes, in uretræ virilis poros se insinuant, inde penetrata uretræ epidermide ad prostaticarum glandulas diffunduntur, ibique excitata inflammatione, succi intus contenti acrimonia, acida, salino corrosiva commoti, acidis, & cuspidatis eorum particulis vehementius fibras pungunt, distendunt, & lanci-

nant;

nant, quæ inde a nutrimento in saniam converso magis exulcerantur: Unde in laceratis villis ulcus succrescit, a cuius ulceris impuritate saniosus fluxus, & acre liquamen jugiter effluit, quod foetida crassitie in subtilissima epidermidis membrana feriendo salinis spiculis, ejusdem fibrillas divellit, atque exulcerat. Non solum a glandulis prostratarum exulceratis, aut uretræ exesit poris extillat putida illa sanies, sed cadaverum sectione retulit, reperta esse ulcera in orificio vesicæ, & vicinis partibus cum fluere gonorrhœa, Ballonius Epid. lib. 2. pag. 16.

Hoc acidum acre dilatatis poris, & apertis vasculis a sanguine absorbetur, & mediante circulatione per minimas arteriolas ad glandulas inguinis devehitur, vel in lymphatica inguinis glandulosa irrepit, in quibus aciori parte stimulante, & viscidiori moram trahente, per vim stimuli augeatur liquidorum cursus ad partem, novoque indefinenter confluyente humore, infarcitur corpus glandulosæ tunice, ex quo in dies excrecente dolore morbosa liquida ad inguina augente magis, malignus extuberat tumor, qui artis auxilio facile ad suppurationem disponitur, & ferro discinditur, vel caustico aperitur. Ab hoc venereo veneno infectæ sanguinis particule glandularum cavitatem accolentes, a naturali statu sensim desciscunt: hinc in fluorem evectæ impetuoso motu rapiuntur, quæ tamen dum se quaquaversum explicare nituntur, crassiores particulas glutine implicatas offendunt, a quibus mutuis nifibus invicem obvolvuntur: interim acrium salium, subtiliorum nifus a terræ moleculis, & crassioris sulphuris plurimum remittitur, donec sordes, ac virulenta sanies, vel suppressæ, vel non extinctæ, sero per partes illas circulanti sanguini communicentur, & clam in sanguinem serpent; ejusque salinæ moleculæ a fermento venereo exaltatæ, & in fluorem evectæ, cum viscosis combinantur, quæ in periosia, & pericrania impingentes, in eorundem porulis impliciter detinentur: Harum salina spicula intra fibrarum fasciculos incuneata, cum nec a solidorum nifu, nec a calore possint insensibiliter resolvi, sensiles membranas lacerant, continentia vascula distrahunt, eorundemque villos ita convellunt, ut dolores in cranio, & ossium membranis laxissimi passim sentiantur, qui ad vesperam exoriantur, & magis ingravescent, dum a densiori aëre repressæ, & le-

vi calore agitatæ, ac motæ particule viscido-acriores, nervorum machinulas, & membranas perperam lancinant. Hæ effera salium acrium, acidoque salinæ moleculæ in latice sanguinis hospitantes, in laxam, & spongiosam tonsillarum substantiam delatæ, ibique exaltatæ, earundem fibrarum plexus exedunt; adeoque hujus indolis inquinati succi, glandulas oris, palati, labiorum, & gingivarum, ultro citroque villos commeantes, hic solidorum machinulas jactant, illic ita concutiunt, ut permutatis liquidorum viribus, figura, atque mixtione, una villi, & fibræ membranarum, vasorumque convellantur, & distrahantur; adeoque a proprio termino recedentes, insciantur ab illis angulosis salium particulis, quæ interjiciuntur ad instar cuneolorum inter machinulas jam fluidas, & pene solutas; quæ licet in variis implicationibus, & reticulari contextu non permittant discludi ex toto, nec humores ex toto præterfluere patiantur: tamen a fluxu, & refluxu humorum erodentium in dies magis laxantur, & inquinantur, a quibus proinde depravatæ indolis succis, quasi ab insinuatione totidem cuneorum tenuissimæ substantiæ sese quaquaversum involventium, atque fibrarum contexturam exsolventium, lacerantur vasculorum villi, adeo ut ad instar stillicidii ubertim fluat, & erumpat saniosus liquor, qui sua partium scabritie, ac inæqualitate membranosa, & glandulosa locula magis exurere, & dilaniare poterit, ut in earundem epidermide, vel in membranis gliscencia liquida, motus inertia distensis vasculis eorum putrefactione, & salium aculeis laceratis, terebratisque villis, depascantur glandularum fibras, easdemque partes ulceribus scindent. Si inter ossa, & periosii porulos hamosæ particule, & rigidiores compactæ arctius cohærescant, membranarum fibrillæ enormiter distentæ sensim intumescunt, & instar spongiarum inflantur. Unde viscidus liquor salis rigidis, acidoque acerbis maritatus in has partes firmitus successive impingens simul in coalitionem compingitur, & præ crassitie per poros excerni, nec minuta venarum oscula cum sanguine reliquo subingredi potens, hæreat oportet in illis angustiis, ibique interceptis acidis, acerbisque particulis invicem implicantibus, in tophus atque nodos coalescit, qui inde acidis, atque corrosivis scatentes liquaminibus in ossium caviem degenerant. Dum corrosiva spicula in tendinolas ossium fibril-

fibrillas se insinuant, ossis ad intima penetrando, ejusdem canaliculorum seriem & ordinem diffingunt, a quibus sensim alterata ossium structura, & succis eorundem alibilibus coinquinatis, in ossibus caries suboritur.

Confirmata lue pustulæ, & earum pustularum cognatæ cutis affectiones phlyctenes, impetigines erumpunt, modo orbiculares, vel acuminatæ, modo pruriginosæ, squamosæ, nil icoris effundentes, faciem, vel manus, crura, vel pedes, & nonnunquam univcrsum corporis habitum obsidens. Viscidæ enim, ac terreo salinæ, acres, austere particulæ ad nostri corporis partes appellentes, glandulas nimirum, a quibus deberent revehi per lymphatica in sanguinem, fibras tubulorum cutis, per quos fluere debent, fermento gallico afficiunt, & glandulosarum partium meandris constanter infixæ aculeis suis magis vel minus rigidis, acutivè fibrillas cuticulæ, ejusque tubulos discindendo, & erodendo pruriginosa labe, & ulcerosa commaculant; ut inde abortæ pustulæ in glandulosis cutis tubulis, adeoque solidorum erosiones pro majori vel minori acredinum gradu, pro multitudine divertarum glandularum, & vasculorum exesorum sanie, dolore, & crustosis squamis inter se solum differant. Hujus secundæ messis semel tacta seminio venereo efflorescens, suisque successivis germinationum periodis renascens, nunc scissuris volas manum affligit, nunc rimis mammarum papillas occupat, quæ modo saniosis scatens humoribus spongiosam carnis substantiam depascendo serpit, modo in sœda ulcera excavatur, quæ cutem profunde penetrando, labiisque callosis, & prætumidis, sanguinem sanie confusum si contrectentur, effundunt.

Quando particulæ acido-salinæ angulatis corpusculis a lymphæ copia dilutæ, & assiduè solidorum oscillis comminutæ, cutaneas glandulas leviter obstruunt, ad corporis superficiem spumescientes cuticulam levi pruritu exasperant, erumpentibus interea bullis fere inconspicuis. Salia pauco sero diluta, cum a lymphâ debito viscosiori, tugatis in aëra aquis, eorum vis infringatur, & illorum acumina obtundantur, squamosam, seu crustosam cutis elevationem inferunt. Sub crustis squaminosis effusa lymphâ, cutis, & cuticulæ fibras, in quas impingunt, punctiōne particularum acutarum, & effusi seri acredine gravius pungit, ac lancinat, ustionisque sensum,

ac pruriginis inducit. Cum autem ab aliis jugiter de novo confluentibus salinis particulis compellatur humor, cuticulæ porulis salina ramenta infiget, a quorum angulis minutim secatæ cutis fibrillæ in fursura abeunt, & veluti squammæ in superficie exteriori exsiccatae a cute dissiliunt: Hinc ægri pruriginoso sensu affecti indefinenter cutem icalpentes saniosum icorem effundunt, qui erodentibus particulis æstus per vicinam, sanamque partem proserpit, donec ulcusculis cum foraminibus profundis univcrsum corpus obsidentibus in putrescentem morbum terminentur.

Verum quia venerea lues per se nullum morbi genus constituere videtur, qui cuiunque morborum speciei adeo insolubili nexu confunditur, atque permiscetur, ut pressius eorum naturam æmulari videatur, cum aliorum mille larvetur formis morborum, ne miremini si olim celtica labe inquinari in morbos inciditis, quorum radix non intellecta medentium opem eludit, atque deplorabili ærumna vos turpiter extorquet.

Mercurialis salivatio non coercetur in solo celtico, sed mercurii virtus tam efficax in consummatis, & obstinatis morbis sanandis comperta est, ut Medicos illo, tanquam modo curandi perverso, uti recusantes, in malorum omnium pertinacia ex acri glutinoso suborta vulgaribus reluctante remediis hæcenus non adhibuisse, cum Boyle valde admirer; In his enim ejusdem virtutes æque, ac in morbis a contagio venereo susceptis, efficaces esse non me effugit, quin efficaciores quam aliorum remediorum esse arbitror, ut plurimum experientiis pulchre arridet.

Dum autem de operationibus mercurii ad alienos morbos inusitados relatis loqui decerno, historiam minime vulgarem a Boyle recensitari non possum non referre. Vir quidam, ait, adhuc superstes, Præfectura Legionis Helvetica in Gallia celeberrimus, aliquot annis castra in Belgio secutus, morbum quendam oculorum passus est, Medicorum juxta, ac Chyrurgorum opem omnium recusantem, qui paucorum mensium spatio sensim elabente visione, utriusque oculi jacturam fecit; donec accersitus Empiricus, cui se curæ tormentis subjecit, ipsi ab utroque marium ad grani pondus atrabendum, quendam pulverem mercurialem exhibuerit, a quo statim vomitu, sudore, urina, saliva, & lacrymis per duodecim horarum spa-

Spasmo exagitatus adeo commotus fuit, ut caput ejus plurimum intumuerit: tertio tamen, vel quarto labente die, gradatim visum recuperare incipiens, post quadraginta dies, acutiore visu quam omni vitæ antea-
Et decursu gavisus est.

In colica diuturna, ac pertinaci, cum remedia quævis nil juvant, mercurialia sialagoga exhibeantur, quæ cum maximo ægrotantis levamine observavit Vvillis materiam morbificam in plexibus nerveis uberius aggestam, salivationem movendo huc illuc varie dispellere, & tandem prorsus dissipare. Licet sanguinis particulæ per jugem ejus motum, & agitationem atterantur, subtilizentur, ac lævigentur, sensimque ita disponantur, ut per poros cerebri transcribri, & per nervorum filamenta urgeri queant: Exillimo interim ab impetu sanguinis sortius a tergo urgente posse abradendi particulas diversæ molis, quæ per nervorum canaliculos deciduæ in mesenterii, aliisque abdominis plexibus inter se variis modis uniantur; nimirum quod suis ramositatibus invicem intricentur, vel quod cuspis unius intret poros alterius, denique quod earum superficies læves, & æquales ita arte conjungantur, ut nihil sit intermedium, adeoque hæc non admodum subtiles, nec facile dissipabiles, cum per lymphæ ductus non dissidentur, sensim stagnare oportet, & coacerventur in partibus illis per villorum poros expirare nesciæ, quæ in nervorum tubulis penitus compactæ, ac fibrarum oscillis compressæ, cum semper in motum expansivum nitantur, licet minori impetu, subsistendo intra eorundem canaliculos, eisdemque proinde extrorsum urgendo, fibras, nervorumque propagines inflant, ac distendunt, quarum distensione divulsis villis intestinorum, & eorundem laceffita compage violentam suscipiente vibrationem, oritur colica affectio, cujus violentus impetus in distorsione fibrarum residens, laxari non posse videtur, donec congesta materies a nervorum filamentis penitus discussa, aut subacta non fuerit; quæ si ab aliis medicamentis dimoveri non possit, a particulis mercurialibus sese quaquaversum nitentibus in minimas dividetur moleculas, & huc, illuc varie in motum acta dissolvetur.

Hic exoriri posset suspicio, cur a Medicis non sine ratione mercurius credatur generis nervosi inimicus, aliarumque in nervis cerebri perturbationum concitator, & fortassis sciulus quispiam negabit in para-

Sydenham Opera Med. Tom. II.

lysi detentis hisce remediis esse utendum. Speciosa hæc quidem dubitatio prima fronte videtur; sed tamen vanam esse reperio, ubi contraria hæsitatiōi experientia ad accuratorem sui inquisitionem me invitat. Plures morbo Herculeo, & vertigine diuturna correptos salivatione per mercurium excitata in ind. med. pract. lib. 19. sanatos refert Bonetti, & quosdam paralyticos ab ipsa sanari Vvilliano experientiæ effato edocemur. Attamen hoc remedii genus nolum, ut furiosa violentia extimescendum, cuiquam commendes, nisi sedulo Chymicorum simul artificio elaboratum, ac Medicorum consilio exhibitum, donec exactiorem sui præparationem, & usum nanciscatur. Hoc vero securius confecto in epileptico morbo inconsulto quispiam temere ne utatur, ut prius perspecta causa firmo rationis talo hoc opus animose conflagret.

Cum epilepsia sit totius corporis concussio, quæ statim & ipsi nervi convelluntur, causam hanc latere conjicerem, aut in solido nimis laxo, vel rigido, aut sicco, aut in fluido nimia copia peccante, in sero acri-glutinoso, in crassitie sanguinis, aut spirituum, in quocunque viscere lentore repleto, aut in sola acrimonia tum sanguinis, tum spirituum tenuiorum, magisque mobilium. Sint enim tubuli nervorum in cerebro constituti nimis laxi; igitur copia sanguinis naturali major cujuscunque liquidi nervei, quod intrudere se possit inter omnes fibrillas nerveorum fasciculos componentes, nitetur in nervos influere, adeoque, contranitentium villorum vis, cum non sit in æquilibrio constituta cum fluidis, minimæ cuicunque facultati cedit: & cum a quocunque spirituum impulsu nervea fibra distrahatur, dilateturque, impleri poterit liquido, cujus particulæ nervorum funes sensim madefacientes, veluti totidem cuneoli sese in nervorum dilatatos poros insinuando, illos contrahunt; adeoque laxatis nervis, & copia liquidi naturali majori repletis fibris nervorum tonus, & villorum harmonia tota concutitur.

Sit insuper siccitas in solidis minorem copiam humidi ita continentibus, ut humores quilibet producantur acriores, spirituum similiter acriores; mobiliore impetus, & nisus majores in emissaria nervorum producentur, adeoque irritando, lancinando membranarum fibrillas, maximo cum impetu effluerentur, & inordinate moti poros cerebri ita aperiunt, ut quaquaversum per

K k k

ner-

nervos diffiliant : Unde nervorum fasciculi vehementer dilatati, hinc, atque illinc, intrus violenter moti spiritus concussi, inopinato spasmodica crispatione corripuntur, & animal sibi deficiente spiritu in centro gravitatis molem corporis sustentante, derepente corruet. In hisce igitur causis a solido nimis laxo, & fluido magis mobili, & soluto, quoniam mercurius est majoris impetus, & ponderis, quam quod possit a languida fibrarum energia, & vi sustineri, suspitione salivatio non caret; qua ratione impetus, & gravitas cum videatur calcar addere liquido in furorem nimis concito, male mederis, si malefana mercurii inunctione materię peccantis in sero existentis solutę copiam violentius ad partes superiores, ipsaque adeo cerebri penetralia propelles. Propter hanc inunctionem mercurialem in scabie institutam exortum fuisse comitalem morbum, exemplo patris, & filii Trincavella confirmat.

Contra vero cum Hippocrate de morb. sacr. & Gal. lib. 2. de sympt. caus. cum vigeant in sanguine humores lenti, viscidii, acido-acres, qualis pituita pungitiva; spiritus igitur magis crassi minorisque impetus gignantur, qui propter crassitiem partium, ex quibus componuntur, cum non se diffundant quaquaversum cum nisu, non poterit universa eorum moles fluere per poros villorum, immo portio crassior intra eorundem villorum ganglia subsistet, proindeque eisdem magis extrorsum urgendo, impediet, ne ex toto restituantur nervi, sed in aliquo gradu contractionis persistent; per successivum autem influxum, & effusionem eorundem liquidorum intra nervos, cum reliquum crassius intra majorem villorum angustiam semper subsistat, in majori contractionis gradu persistent nervi, & repetito pluries spirituum influxu, cum restitutione magis, ac magis nervorum imminuta, fiet demum, cum non possit ganglia nervorum spiritus superare, & per eorum extremitatem expirare, ut nihil spiritus ulterius influat; quo in casu retro impulsus majorem ad latera nisu ad nervorum principium usque exercet: Hinc successivo spirituum repulso, & eorundem jugiter appulso, ad cerebri nervos, violentius ipsi concutiuntur, ejusque subtilissima fila lymphę spiritus vehentis mordacitate stimulata crispantur; adeoque nullo, certoque ordine impulsis spiritibus, æger subito

in terram prolabitur, violentis contorsionibus detentus. Modo quotiescunque morbus caducus excitatur ab illis succis, qui ad majorem partium cohesionem fluentia liquida reddunt, aut ab infartu alicujus visceris per consensum ortum ducit, mercurii viribus facile cedit, qui vi suę gravitatis per impervios quosque spirituum canales lenta materia obsessos sibi viam sternens ad minima resolvit, & mucosa fluida extra corpus propellit; unde bene ait Hippocr. de morb. sacr. *Qui salivasi fiunt, ac mucosi, morbo sacro fere non apprehendantur.*

Hac ratione salivatio in paralyfi, quę in sanguine sale, & sulphure fixioribus magis repleto causam habet, cum stabili nervorum, & firma fibrillarum cerebri structura, opem non raro egregiam præstat. Cum ad motum requiratur musculorum contractio, cujus machina ex pluribus filamentis, carnearum fibrarum fasciculis, & tendinosiis fibris conflata per se iners est, & demortua, nisi adveniat facultas motiva, quę est influxus sanguinis per tubulosas musculorum fibras, easdem instantis, & liquidi per nervos subito arescentis intra sinus villorum, & sese quaquaversum effundentis per tensam fibrarum compagem, ut carneę fibrę ab impetu particularum rareficientium, veluti a totidem vectibus possint urgeri, quę inquam imperium asserant, easque a torpore, & sopore excitatas fibras ad motum impellant; igitur si neutrum vel alterutrum liquidorum non influat in sinus, & intra villos fluere non permittatur, non poterit inflatio fieri tubulorum, quę requiritur, ut villi concipiant impetum, & suam indolem, vimque motivam exercere valeant, ut funis denegatis aquę globulis non inflatus; adeoque fasciculis nervorum ad emissaria infartis, vel obstructis a sanguine intra cava fibrarum latibula partium crassitie, & terrestreitate stagnante, licet recurrat spiritus, & sanguis, per ductus non excident in sinus fibrarum, sed frustra ad canalium emissaria nitentur; unde contractio musculorum, & motus tollatur. Itaque dum in paralyfi, in qua materia viscida, ac quasi lapidea in nervis, ac minimis vasculis musculorum solide viget, sudorifica nullius efficacię sunt ad excuneandum in nervis, & fibrarum lacunis impactos humores, felicius salivatio cietur, quę apprime concreta salia inciduntur, dum particula mercuriales in fixa liquidorum corpu-

puscula impingunt ab invicem, ea diffociando facile dissipant; dein cerebro trajecto ductus nervorum subeundo, coacervata fluida in minima dividunt, & spirituum vias referant: hinc inde portiones subtiliores sanguinis summe tenues, atque elasticæ, partesque tenuioris lymphæ ab alterna meningum constrictione in pervios nervorum tubulos propulsæ, in latera earundem validius nitentes, ordinatas ad muscularem motum fibras inflant; adeoque inflant; adeoque extensis fibris, & machinulis musculorum spiritu irrigatis, non solum oscillatione propagatur sensibilium impressio ab extremis nervorum filamentis concepta; sed apertis arteriarum osculis, & nervorum fasciculis in pristinam libertatem restitutis, concinne remittitur sensus, atque motus.

Nunc quoniam mercuriales particulae per tenuissima vascula, & spongiosas substantias trajectæ in eorundem ductibus lente-scentes, inertes fluidi moleculas in motum concitare valent, eodem conatu, & feliciore eventu, ut optime addit Dolæus, c. 7. de scirr. tumores scirrhosos dispescent, & calculosam viscerum duritiem dissolvent, cujus generatio subsequitur a succorum in cellulis glandulosis diversæ indolis coagmentatione. Cum sanguis acido-salinis terreisque scatet particulis, testudineo motu partes corporis perluit, & ad angustos glandularum ductus per arterias delatus, crassiores in ipsis vasculis portiones relinquit, quæ venarum ostiola subintrare nequeunt. A glandularum porro circumpressione, & motu, subtiliores sanguinis in vasis contentæ particulae in motum adactæ, dum a graviorum connubio deficiunt ad ora venarum impingunt, crassiora salia, & terreo-sulphurea in parte remanent, quorum acido-terreæ particulae a sanguinis præterlabentis appulsu validius pressæ, in alkaliorum poris, & sulphurum ramis alius involvuntur, mutuoque nisu inter se ita combinantur, ut undequaque pressis propius ad se invicem accedentibus exhaustis tenuioribus aqueis, tumor exurgat. In hoc graviore casu, licet mercurialia educere possint viscositates sale, acidoque effictas per glandularum salivarium tubulos, raro tamen, nisi post defatigatum medentium opus, usurpentur. Quoniam scirrhosus tumor in partibus mollioribus genitus per successivum fluidorum appulsu, laxas tubulorum, ac cellularum fibrillas inflando ita distendit, ut vehementius distrahis glandularum villis, fortius ab invicem

divulsæ non resiliant in contenta fluida, sit, ut a vehementiori fundente, & impellente novus distensis fibris addatur impulsus, quæ ad susceptum impetus momentum sustinendum impares, uberiores materiae copiam ad laxos membranarum poros deferri patiuntur; unde concrementum quasi lapideum in folliculis conclusum, a solidorum nisu nec ullo incutiente commotum, ab appellentibus succis jugiter irrigatur; atque ex plurium fibrillarum fasciculis a fibroso sanguinis crassamento mediante salivatione depromptis majus conficitur; adeoque in dies magis increscens lapidum ritu in insignem molem extuberat: proindeque in morbis, si summa adsit fibrarum mollities, quarum resiliationis vires a quocunque percutientis impetu facile frangantur, licet jam dudum a mercurio averruncetur morbus, redit tamen, ejusque radix in ipsa villorum flacciditæ, & fibrarum laxitate parva vi extendenda regerminat, ut observavit Vvedelius podagricum salivatione liberatum, post tres annos in eundem morbum incidisse, sed mitiorem.

Scorbuticam affectionem Septentrionis, & maris incolis frequentissimum morbum per salivationem sugari, fatentur Joannes Burgius in dec. 2. annot. 3. Joannes Acholutus in decis. 2. annot. 9. at duntaxat in illo scorbuto, in quo sale evecto, & fluore potito mobiliore sanguinis particulae crassioribus implicitæ detinentur, atque crassam, & veluti acido-mucilaginosam consistentiam induentes, pigre in vasis circulantur, a quibus sanguinis massa compage magis restricta, & crassiori donata, salibus quidem acutis, sed glutine cohibitis, simulque incuneatis detenta, torrentis instar lutum secum rapientis, lento progreditur motu ad viscera minimæ pressionis, & ad vasculorum angustias delata in ipsis sæculentias quasi limosas affigit. Tunc in hujusmodi diathesi scorbutica, in qua crassum est attenuandum, stagnans mobile, & cohærens fluidum reddendum, salivare erit sanum facere.

Hoc consilio in amaurosi, sine optici filamentum dilaceratione, & absque eorundem antiquata obstructione, festinanda est salivatio, si a crasso humore in nervorum meatu illapso, vel ab arteriolis retinae compressis obstructisque deregetur tremor nervorum ad sensorium, vel a tumore in cerebro nervos opticos premente (ut doctissimus Platerus observavit) impediatur dire-

Olio opticorum, & pupillarum planities, ut angustatis canalibus, vel in ipsis hærente glutine, adeoque spirituum via impedita aboleatur visio. Ad hunc humorem ex opticis evellendum, & tenacius in capite impactum proliciendum felici successu mercurialis salivatio procedet. Sic artificiali phryaliismo suffusiones curatas testantur Riverius, Fonseca, & Schenckius.

Ubicumque serum, vel lymphæ sanguinis extra vasa decidua in cavitates aliquas exudando colligitur, vel sanguinis cursu pigre fluente pars ejus aquosa præter modum vasa distendens tandem eadem emollit, ut partium vigore non restituto, & fibrarum elatere sufflamminato extra venas, vel lymphatica erumpat, hydrops succedit, quem vidit D. Andreas Ermius misc. c. dec. 2. annot. 4. obser. 36. a salivatione artificiali de medio sublatum. Verum ne salivatio a scopo aberret, ad quem collimat, in hydrope thoracis a pulmonum labe congenito fugiendam consulo. Pulmone hydatide, vel vomica aquosa turpiter affecto, inter ejusdem sinus lymphæ accumulatur, vel rupta vomica in thorace recipitur, quæ quousque in fistulosis pulmonum vesiculis hæret, cognoscitur a tussi sicca, dispnoea, dolore gravativo, quibus additur hoc unicum tanquam pathognomonicum a Riverio relatum, quo solo hydrops pectoris a cæteris difficultatis respirandi speciebus distinguitur; quando nimirum spirandi difficultas primo quoque somni tempore invadit, ac per noctem magis urget, quæ adventante sensim die lenescit. A practico vulgo hic morbus confunditur, licet graphice ab. Hip. delineatus sit 2. de morb. Febris, & tussis tenet, acervatim respirat, & pedes tument, contrahuntur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius, ac diuturnius; & si quid infundas, aut fotum aut suffumum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sane cognoveris, non pus, sed aquam intus esse; Et paulo post subdit: Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentavit, ebullit intus, veluti acetum; lacera- vit inde sinubus, & vesiculis lymphæ scoto- re olens diaphragma inundat, quæ in thoracis cavo collecta distinguitur a novo dolore, & pondere diaphragmatis fornicem premente, hinc a decubitu in latera cum strepitu lymphæ motus advertes; huic supervenit hæctica febricula, fames sublata, rubor genarum; anhelosa, difficilis, & erecta respiratio, tussis perpetua sicca cum

metu suffocationis jacenti, quibus addit Gal. 5. de loc. affectis cap. 9. fluctuationum: Nam ubi quis, inquit, a statim a decubitu transmittatur, idque maxime si ab uno latere in aliud se convertens defluere aliquid sentiat, pris multitudinem ibi contineri, haud dubia conjectura est.

A vasorum lymphaticorum laceratione suboritur hydrops, prout omne auxiliorum genus spernit, sic a salivatione mercuriali exasperatur. Juvenulam viginti quatuor annorum dissecuit Theophilus Bonetti, quæ per sexdecim annos ascite detenta, indeque tandem mortua, in ipsa nullius visceris vitium invenire potuit: crudeliter hæc enim in pueritia tractata, scilicet pedum sæpissime causa, ob lymphaticorum disruptionem occubuit, quæ per tot annos vitam produxerat misella, ob viscerum labem non subsecutam. Affectus hic prout curatu, sic etiam cognitu difficillimus est; nam licet exterior ventris subdurus tumor una plurimorum judicio evidentissime percipiatur, attamen quæ sit causa tumorem producentis, & quomodo in ventre progignatur, aut aliunde illic adveniat plane nescitur; idcirco hujus morbi naturam, & causam latere arbitror, quia cum prima eius initia non advertantur, subito in immensum excrescens, statu ejus peracto aliam sibi consciscit naturam, & suam amittere videtur. Quapropter opinor, ubi sanguifera vasa, nempe illorum oscula nimis laxa non existunt, aut vasa lactea, aut lymphatica non sunt discissa, innatum cordis virium, & solidorum mala conformato hydropem soventium in suspicionem non cadit (excrescentiam enim ramosam in utroque ventriculo cordis infixam, & per vasa in pulmonem delatam in sectione hydropici reperit Gaspar Baubinus apud Ger. Horstium tom. 1. Loverus historiam de Pericardio in tract. de corde c. 2. fortiter cordi adhærente recenset: post cordis palpitationem ascitem irreplisse observavit Bonetti lib. 2. de palpit. cordis, cujus cadaveris cor relaxatis involucribus circa septum transversum descendens os gerebat; salivationem inquam, sepositis recensita organica vasorum, & viscerum labe, esse in hydrope fortassis unicum auxilium, quod valet cæteras hydropis causas dispescere, antequam æger tenuiori medentium genio indulgens in lethalem hydropem incidat, in quo sauciatis lacteis ductibus minima spes salutis affulget.

Nemini latere puto, omne hydropis genus

aus produci primo ab omni causa, quæ valet serosam sanguinis partem ita coercere, ut redire nequeat in venas, aucta deinde vasa distendit, & tumida reddit, in distensis proinde vasculis elastico robore orbatis sensim restagnans, eadem ita obstruere potest, ut in hisce partibus liquor concreascit, cujus humoris concretio comprimens, aut obstruens, ora vasorum oblitterando, vel arctando ictum, vel cachexiam parit, donec tandem læsio viscerum inde procedat, tumque hydrops priores effectus sequatur. Omnes itaque ægros pertinacibus viscerum obstructionibus hydropem minantibus affectos mercurio curarem. Dom. Panarolus pentec. 4. obser. 24. helleonem hydropicum fecavit, cujus hepar in tantam molem excreverat, ut universam fere diaphragmatis cavitatem repleret, totus durus, & magnitudine monstruosus. Per. Panujus obser. 17. virum, qui hydropem obierat, secuit; huic lien adeo intumuerat, ac induratus erat, ut tres libras lance liberatus penderet; jecur inde optime constitutum, & naturali temperie præditum invenit. A renum calculo ureterem obstruente hydropem notavit Hollerius ad c. 39. lib. 1. de morb. Ab iisdem pinguedine undique obstitis observavit Albertus Kiperi. Mesenterium fere innumerabilibus strumis per totum ventrem se offerentibus reperit Franciscus Caille Genuensis, aut fere ab illis oblitteratum esset, hinc in hydropis cadavere, qua obiit, causam inquisivit. A glandulis mesenterii obstructis hydropem refert Christianus Rudnicus in miscell. curios. anno 1673. observ. 159. Olaus Borrichius in actis Medicis Barthol. cadaver dissectum, quod ex hydropem obierat, habens glandulis omentum scirrhis repletum. Hujus census infinita extant exempla, quæ hydropem a viscerum obstructionibus oriri non ægre pandunt.

Ea enim est universi corporis, & vasorum omnium harmonica constructio, ut humores per intervacuos loculos, & spongiosas inanitates circumfluentes per eorundem ductus æque, atque per poros undequaque elabantur: ex hoc inoffensam mixtionem servantes per pervios fibrarum canaliculos trajecti omnes machinulas instaurant, & partium æquilibrium conservant, tandemque quicquid supervacaneum est per innumera cribra separatur; verum si obstruantur ductus, illic comprimantur, alibi sordibus alluantur, fibræ, villi contractiles, glandulæ, & diductilia vasculorum filamenta

debitam liquidorum quantitatem nec æquali nisu in fluida nituntur, nec contra secernebilia separant; hinc ab obstaculo obstruente, vel circumpremente præpeditis facultatibus contractilibus, non solum retardatur influxus fluentis liquidi, ne per totam longitudinem, & canalium amplitudinem diffundatur: sed cum non possit extrudi a contactu vasorum quicquid est inutile, & stagnat, magis mobile per poros fibrarum exsudat, aut per glandularum vascula erumpit in membranarum lacunas, & paulatim viscerum sinus, atque cavitates laxat, & alluit. Causæ hujus collectionis aquarum est stagnantium fluidorum in glandulis inertia, vascula occludens, & membranas distrahens, quæ præpediens virium ac facultatum exercitationes, privat fibras contractionum, & distractionum vi, ac proinde pressionum ac circumpressionum momento, adeoque stagnantes liquidorum particule a machinulis villorum atque fibrarum valde distractis, ob violentam distractionem, atque tunicarum extensionem ad pristinam cohesionem, & naturalem statum non restituitis, in circulum impelli non possunt; ita affluentes, & undequaque impellentes fluidorum moleculæ, vires, & fibrarum resistentias extenuant, ut impetum appellentis liquidi, & pondus stillantium guttularum sustinere non valeant, ne poros fibrarum præterfluant, ac in cavitates aliquas decidant. Igitur salivatione artificiali moliri poterunt separationes opportuna, antequam ob villos contractiles nimio conatu dilaceratos in interjecta spatiola, inter oscilla infrastructa vasculorum, latentia inter filamenta, spongiolas, atque fibrarum moleculas extra suum locum sitas derivent humores, qui ab hiantibus vasculorum oscillis, & fibrarum poris in proximiores lacunas indefinenter erumpunt.

ARTICULUS VI.

De Phenomenis salivationem concomitantibus, & consequentibus.

Mercurius per plures dies exhibitus, parvaque quantitate assumptus, quaquaversum pergit, atque tam suæ gravitatis, quam imperus ratione, crassos liquidorum pigre circulantium lentores incidit, solvit, ac fluidos reddit; quin paulatim, inde confertim, & magna copia per arterias ad glandulas salivales deducit, donec salivatio

luc.

succedat. Humores in glandularum cavitate existentes, & in arteriolarum capillamentis summe distensis a successivo & indefinente liquidorum appulsu moram trahentes, pituitosi, & glutinosi, acresque soluti, exitum sibi parant per salivæ vias, quæ vitiosis humoribus enormiter inflantur, ac propterea incipiunt intumescere gingivæ, atque angi, dolore tonsillæ, inflammari maxillares, ardere fauces, dum magna copia se ferente ad salivales glandulas pituita, non tantum glandulæ superiores, sed & inferiores inde replentur, ac intumescunt; verum tota oris, & faucium tunica glandulosa eodem glutinoso sero tunc impletur, ac distenta levem, & nonnunquam periculosam producit (si nimirum cessinetur salivatio) in faucibus angustiam, quæ saliva viscosa subsistente in canalibus suis, ac proinde eosdem extrorsum extendendo in tumorem attolluntur, a quo glandulæ vehementer distractæ dolore, atque ardore plebuntur, & cum fibrarum distractio fieri non possit absque eo quod membranz canaliculorum, & quarumlibet aliarum partium in parte, quæ distenditur a proprio termino recedant, neque a sua positione distrahi, quin ab invicem dividantur, poterit aliquando succedere laceratio aliquot canaliculorum, & multo facilius, si acria, ac effera soluti lentoris saliva fibrillis insigantur, & ipsa sint tanti momenti, ac impetus, ut vasculorum connisum, & resistentes glandularum villos superare possint, ex qua canaliculorum laceratione contentus liquor jugiter effluet cruentus, sincerus, mixtus, qui absque illa laceratione poterit pedetentim in os derivari, si per stimulum contusiones, & fibrarum distractiones sint tanti impetus, ut quæcunque continentur intra partem, quæ contrahitur, atque distrahitur, exprimere possint extra glandulas, & eo facilius, quo illæ fuerint vividiores, & cum sensu doloris conjunctæ.

Tumefactis gingivis, quæ ulterius firmant, & stabilium dentes in suis alveolis profundis, maxillis insculptis impares fiunt (dum a ligamentis succingentis membranz distensis trahuntur, pellunturque) resistentia distractarum fibrarum viribus, eaque ratione vacillantes, ac proinde minus firmi extra ordinem quasi per novos alveolos prodeunt, ut excidere videantur, semperque quasi tremore quatiantur; quo casu ut plurimum extrorsum, introrsum, ac si nova foret dentium series protrusi a mercurio,

veluti ab hasta Achillis, quæ vulnerat, & sanat, pedetentim firmantur, & suis fossulis detumescuntibus gingivis denuo recommituntur.

Mire commoti, & ad fauces in primis propulsi humores glutinosi, alique eis admixti per universam sanguinis massam, immo corpus universum diversis in glandulis oris aggeruntur, & spumæ ad instar male olenti continuo ab ipsis extillant, adeoque factor anhelitus qui stagnantis lentoris eruptionem in procinctu esse manifestat, & salivationis stadium plerumque comitatur. Subsistente glutinosa saliva intra arterias, & glandulas, easque proinde distrahente, particulæ succorum quorundam acutissimæ eum ipsa conjunctæ, dum transitum nullo obice impeditum non reperiunt, in vicinas illas fibras vehementius agunt, & impetuosius pelluntur, easque discindendo, non tantum dolores graves, & molestias immanes producant, quin consertim, effluente humore acri, oris ulcera, & linguæ relinquunt.

Salivatio itaque cum fiat per humoris pituitosi ubique, ac in primis in sanguinis massa dissolutionem, hinc ad salivæ glandulas deductionem, quoties paulatim, ac successive a mercurio similis materiæ pituitosæ secretio contingit in glandulis pancreaticis, & ventriculi, toties humoris pancreatici, & stomachici, & quidem viscidioris, & acrioris ita contingit copiosior separatio, ut ad tenue intestinum, ac ventriculum copiosius ductis humoribus, irriteretur potentius eorundem utraque pars. Ab illa enim molesta vellicatione exprimitur copia liquidi summe mobilis per nervos major in ventriculi muscolum, aut in fibras intestinorum, unde illius motus peristaltici violenta inversio, atque inde cum subita, ac valida ventriculi constrictione, si quæ sint contentorum, per os ejiciuntur, atque proinde a confluentibus in intestina humoribus, ibique agitatibus ad illorum expulsionem eadem convelluntur, & alvi fluxus satis gravis, & nonnunquam periculosus consequi solet.

Quoniam vero inflata lingua, in tumorem elevatis faucibus, canales cibi & potus ita comprimuntur, ut naturaliter non pateant, & libere moveri non possint, non solum prohibetur pharyngis motus, sed fibræ musculorum buccinatorum, zygomaticorum, elevatorum, depressorum labiorum cum cæteris musculis cibum in œsophagum protrudentibus, humorum copia adeo contra-

trahuntur, & vasorum tilia infarciuntur, ut materia quaelibet deglutienda ad palatum perducta per impetum a linguae motu vitiato conceptum, & musculorum vires in eavitatem oesophagi exprimitur difficilior. Prout igitur glandularum, & musculorum tumor canalem comprimet, ex æquo vitabitur deglutitio, & eo magis si pharyngis muscoli plus iusto læduntur; Hinc aliquando in artificiali hac per mercurium excitata salivatione, prout comitantur oris ulcera satis ampla, genas in primis & linguam depascentia, dum effluit saliva acris ac exedens, ubi eadem sero ad curationem tendunt, cicatrices molestissimas relinquunt, quæ quoniam motrices fibras ad majores contactus eas crispando redigunt, inde partes nimis arte colligunt, ex quibus denuo non explicatis fibrillis, non raro linguae motus manet impeditus, ex parte prohibetur deglutitio, genarum motus vitatur, & propter fibrarum inflexilitatem constituitur pars veluti rigida, ut mihi semel in praxi videre contigit, quæ ob influxum sanguinis, & liquidi per nervos impediti, a nulla vi, a nullo volente in motum agatur; unde illa pars paralytica fiet, & quamvis linguae, labiorum, genarumque motus, gargarismis, (si in tempore præveniantur hæc mala,) qui humores acres temperant, ulcera mundant, atque blande exsiccant, restitui possit; cavendum tamen, ne conferatim, & diutius promoveatur salivatio, dum non tantum glandulæ successive replentur, atque inde intumescunt; verum tunica glandulosa post peractam salivationem jugiter pituita impletur, & relaxatis fibris distenta & nonnunquam periculosum ptyalismum continuo fovet.

Post longum salivationis cursum tum sanguis arefcit, tum copiosa excretionem succi nutritii per glandulas salivales facta partes musculosæ debita nutritione privata in naturalem quasi atrophiam incidunt, quæ tamen non succedente excandescencia sanguinis, & spirituum, adeoque calore hæctico fixo non irrepente, & colliquante in partibus solidis, ulterius magis non marcescentes a novi oleosi chyli pabulo in sanguinem continuo delato, in dies reparantur, atque inde tota nova massa sanguinis succo jugiter saturata, magis apta alitioni partium redditur, & consequenter massæ sanguineæ emendatione atrophiam totius corporis sensim evanescit, adeo ut inde novo euchymo, & oleoso succo in pristinam oleosam, & nu-

tritioni aptam naturam sanguinis crassi restituta, melius in dies se habeat æger, quo vires carnetque continuo refarciuntur, usque dum sanitate firma, & athletico corporis statu fruatur.

ARTICULUS VII.

De Methodo Salivatoria.

Nunc præstat Gallica sorde marcescentes, ut cum Celso *sternatur via Medicamento* mercurialium suffragia, non ornatum cum ipso Celso edocere, ut sciant ubi fyrtes, & scopuli lateant, & quomodo sint vela trahenda, quibusve plagis advertenda prora, ne mentis lenocinio, ac blanditiæ laboris decepti, præcoci nimium experimentalis impatientia amplectendæ salivationis desudantes, artis constantiæ, & saluti officiant, & incremento. Utile quippe, ac pulchrum est experimentalis, ac empiricæ rationali rei medicæ veritati inniti, ut celtici morbi curationem a rudi experientia vindicem, & in rationalem methodum discentibus æque ac docentibus pronam convertam; experimentorum laboribus mixtorum rationali analysi operam navans, intimamque ab ipsis naturam extorquens, in hac re plura phænomena obscuritate naturæ involuta, pluresque agentium facultates aperta luce mihi paravi, quibus ad ea, quæ in corpore humano salivando operantur, accomodatis, iisque tanquam causis in agendo ad praxim demonstrativam adhibitis, non exiguæ vires arti salivariæ accessere, quæ mentem artificis in experimentalis inventionem excitando, eam in observatorum examine, ac judicio exacuit, ut in percipiendis viribus, ac corporum legibus expendendis securior facta, minus erroneam, ac commentitiam methodum constituat. Itaque per ipsam ad quoddam veri specimen perducti, si nescimus adhuc, quid sint venereorum morborum radices, addiscimus saltem (pluribus inaccessum) quibus curantur; quo fit, ut disruptis Theoriæ medicæ repagulis, ac veluti mei juris factus, per immensum salivationis æquor discurram. Explanatis igitur difficultatibus, & excisis ab arte alienis phylatorum aberrationibus, erigitur animus, & me ad iatrica prælia revoco, ut certi sciendi docendique in arte salivatoria omnium vastissima limites statuatur.

Cum vero, ut propius ad rem accedam,

venerea lues eoque invaluit, ut durior hujusce morbi feritas extirpari non possit, nisi per salivationem mercurio excitatam, mihi onus incumbit, quæ in ea promovenda, tum etiam regenda observatio mihi dictavit, edifferere, cum etiam eo res redigitur, ut non adscitis temere suppetiis salivatio promovenda sit, nulla ratione, quidem assequi possum, qui fiat, ut ad frangendos luis conatus, æger adhuc viribus vegetus, sanguinis missione rectius subiciatur mercurio, cum testante experientia nulla sanguinis evacuatione debilitari, proindeque pares mercurii conatibus, salivationis imperum nullo labore sustineant.

Cum sanguis non solum impellatur a corde, & nisu succedenti sanguinis, quem exercent particule quæque ad contactum, positæ intra vasa a tergo urgentes, sed etiam ab arteriarum tunicis impingente sanguine distractis & sese post dilatationem resistentibus, fit, ut villi membranas arteriarum texentes nimio sanguine distenti, indeque prohiberi, ne possint se plane contrahendo in sanguinem niti, sanguis fluat minori velocitate, quam quæ requiritur ad mutuam partium cohesionem divellendam, & eo minus in divulsionem nitetur, quo in arteriæ distensione minor vis attritionis dabitur, adeoque quoniam per sanguinis missionem fit, ut ipsius particule in mutuam contactum minus nitentes a frequentiori, & celeriori arteriarum oscillatione majori nisu agitentur, sequitur, ut quicquid sanguinis relinquatur in vasis, validius in motum agatur, & si nisu major fuerit resistentia a partibus cohibentibus, & coactis proveniente, intime dimovebitur liquidorum cohesio a motu prohibens partes magis mobiles, & reliquis impellendis aptas; quoties igitur in celtico morbo dabitur sanguis nimis coactus, & arteriarum tunicas ita distendens, ut partes sanguinis succedentes, dum in antecedentes impingunt per illam pressionem non possint se invicem alidentes divelli (quæ major allisio faceret, ut una particula fortius attrita majori vi divideretur ab alia) ille igitur coalitionis nisu per sanguinis missionem minuendus erit, & arteriarum distractio removenda, ut partes divulsæ extricentur, & a solidorum inertia cohibitæ in majorem motum nitantur.

Si vero hic, cui mittatur sanguis, sit imbecillioris, & minime constantis roboris, ut videre sæpe contingit in venerea lue con-

fectis, e sanguinis detractioe concidat oportet virium robur; e sanguinis enim quantitate minore in arteriis contenti minus extenduntur meningum fibrillæ, a quibus minori momento impelluntur per nerveos spiritus; unde minor quantitas spirituum in villos cordis derivata cum ejusdem contractionem remittat, cor in sanguinem nitens, sui que motus impertiens iners pressionis momentum, debiliorem nisu fluenti sanguini imprimet. Hinc successive ob rariorem, & solidorum debiliorem motum augentur liquidorum resistentiæ, unde sanguis recedens minori velocitate per vasa, quam ante missionem, minori momento aliditur; & cum facultates fluidorum attritionem molientes sint maxime infirmæ, earum momento non majori momento cohesio sanguinis non poterunt particulas inter se coherentes dimovere; idcirco lentor in sanguine augebitur, qui major non fieret, si sanguis emissus, enervata cordis contractione, resistentias fluidis non adderet. Quoties igitur certus esse poteris, majorem quantitatem sanguinis, quod perraro videre est, quam quæ fluere potest per canalialia sine vehementi diductilium laterum distensione cum particularum pressione in gyrum languidius rotari, ne dubites, ut motus, & resistentiarum æquus existimator sanguinis missione ægro opportune occurrens, nocere possit; aliâ misso damno hujusmodi præjudicio, in omni salivatione feliciter excitanda præmittendum est catharticum aliquod, quod humores in ventriculo, ac intestinis collectos per alvum educat, ne imprudenter prius adbibitis medicamentis salivationem excitantibus, vomitus, aut ventris tormina exurgant: inde phrisana humectante, & laxativa ægri lue tabescentes præmuniantur, quæ conficitur sarsaparilla, radice bardanæ, graminis, semine hordei, passulis exacinatis, liquiritia, & aqua fontis, quæque pro modulo potus uberi copia, si fas sit, per duodecim dies exhibeatur.

Quoniam celticus lentor a fluidis concretis inspissatus, sanguinem privat ea portione, quæ corporis partes humectando ad motum disponit, lente rapitur per vasa, nec potest intime ab ullo solvente recludi, donec humido omnium fluidorum vehiculo occurrens, laxato nexu cohesio- nis, promptius non compleat circuitus; hinc aquæ moleculæ intra poros viscidæ sanguinis conclusæ ejusdem contactum di-

mo-

movent, resistentias lentoris imminuunt, quibus pariter laxatur rigida solidorum tensio, & elasticitas, ut possit ab impulsu gravi mercurii distensa alternatim restitui: rigidorum vasculorum tonus valide contranitens mercurii momento, ejusdem impetum eludit, at corpus illud, dum diuturne in tunicas arteriarum impingit, sui motum villis impertiens, successive tandem totum in ipsos transfert; impresso autem fibris imperus accelerati momento, solvitur virium contranitentium æquilibrium; unde cum arteriæ nec majori impulsu distrahantur, nec impellentis corporis sublineantur, a se invicem diffiliunt. Idcirco prius preparato agro laxativis diluentibus, mercurio dulci in pillulas efformare cum gum. tragan. vel cum conserva viol. paulatim; ac successive salivationem promoveo, adeoque caute procedens lente moveo. Post quartam, vel quintam diem gingivæ intumescunt, phthyalismus suboritur; cum æger expuere incipit, gradus salivationis summa diligentia expendo, an erumpenti salivæ frænum, vel calcar sit injiciendum: ubi autem phthyalismus eousque effectus fuerit, ut nycthemeri spatio quatuor libras expuat æger, nullum amplius stimulum addo, ut non intendatur salivatio; & cum hoc modo illa satis procedat, caveo ab omni mercurii usurpatione ulteriori; ne a nimia quantitate delatis ad salivæ glandulas humoribus glutinosis, æger in vitæ discrimen conjiciatur. Hoc modo protracta salivatio, si forte prius elangueat, antequam morbus penitus evanescat, novo subinde stimuletur mercurio, quousque mephiti mercuriali, salivæ lentore, & sputi salitate glutinosa omnimode cessante, æger in totum convalescat.

Quandoquidem accidit, præsertim in corporibus sæcibus impuris refertis, ut simul ac mercurio sanguis afficitur, tormina ventris, & dejectiones mucosæ quasi dysentericæ eveniant, quibus non solum curatio morbi retardatur, perturbaturque, verum impeditur, ne salivatio succedat; itaque in urgentibus hisce malis cohibenda est diarrhæa, & sedandus dolor opiat, & pægoricis pharmacis quousque hæc symptomata penitus evanescant, atque salivatio satis procedat. Cæterum bene procedente salivæ purgatione, quoniam in diuturno salivationis stadio non tantum sanguinis fibrosi, & serosi colliquatio, verum etiam saburra ventris effæti, & novi chyli oleosi copia per Sydenham Opera Med. Tom. II.

salivæ ductus libere indefinenter excernitur, sit ut ob continuam sanguinis depauperationem partes corporis solidæ debita nutritione privatae prorsus marcescant; idcirco ad præcavendam hanc vasorum inanitionem, & carnis marcorem, massa sanguinis novo jugiter aquearum succo tempore salivationis saturetur, quo rasura c. c. passulis, aniso, & aqua fontis confecto solidorum colliquatio, & consequenter atrophia totius corporis reparatur. Si in sustinendo urgenti gingivarum, & linguæ dolore impar sit æger, colluatur gargarismate ex rad. alth. liquir. sol. mal. sem. hord. decoctis in aqua fontis, addendo syrup. de hybisc. Si vero cum gingivarum dolore in dies cum suffocationis periculo augeatur phthyalismus, opiat, & anodynis liquoribus compescatur, vel alio divertatur cathartici; cæterum ægri regimen id tantum exposcit, ut a vi frigoris se defendat, cibis euchymis, & moderate vescatur.

A venerea lue liberari hujusmodi ægri, si œconomiam illorum corporum everfam, & vires prostratas resarciendi minus idonei sint, sed sanguine eorum acescente incalcescant, ne in lethalem tabem incidant, siccoque marasmo afficiantur, ad juscula avenacea, gelatinas, & lactea, spiritus defatigatos, & vires deperditas restaurandas apta delegantur. Interim ægro convalescente post salivationem peractam, nec cathartica, nec sudorifica alia in usum revocanda veniunt. Attamen nescio qua ratione quidam freri quicquid malignitatis a mercurio, ut vulgus ait, in corpore relinquitur, aut mercurii reliquias per catharsin, aut diaphoresin expellere conantur. Hujusmodi autem hallucinationes in prædictis illorum præjudiciis fundatæ, ita in eorum animis infiguntur, ut pro Junone umbram captantes, delirantium insomnia pro fundatis principiis concipiant. Serio vero cum Sydenham animadvertendum est, in quibusdam reperiri idiosyncrasiam, quæ ita salivali purgationi resistit, ut nullo modo excitari possit salivatio, quæ ad eradicandam mali radicem par sit; igitur ab isto evacuationis genere recalcitrante natura, ne loco perfectæ salivationis dolores ventriculi, sudores frigidi, dejectio dysenterica cum ventris torminibus insurgant, cave, ne obstinate salivationem importunius urgeas.

Cum igitur allata methodus, nec dies præparando corpus ante salivationem inutiliter consumat, nec decoctis post salivatio-

tionem ægros extorqueat, quisque experimento discat in praxi versatus, eandem longe faciliorem esse, magisque tutam. Nec vos deterreat deglutitionis difficultas, oris labor, & dirigendæ salivationis requisita solertia: Quid autem pulchrum in accurato naturæ, & artis experimentalis labore pluribus inaccessio, quod non idem arduum! Ad hanc itaque salivationis methodum per repetita experimentorum tentamina, perque nunquam intermissas historiarum notationes consecutam, nuperisque historiis excultam animos erigite, quæ eventuum certitudine, & virium constantia, in laborum tædio rationalem disciplinam constituit.

HISTORIA I.

Gallus homo originaria veneris labe sceleratus, sensimque febrili algore emarcescens, universali quasi macie conficitur; pædementum in dies increscens, topus in scyma prope os pectoris, ubi os desinens cartilagineum recipit, costa protuberat. Veneris veris tempore cum decocto exsiccanti, sudorifico hypocausto committitur; ut post octavam circiter diem copiosis sudoribus subtrillioris seri depauperatus sanguis, magis perenni febrili stadio incalescit, atque topus febrili incendio magis urens doloribus ardet; Hinc calore sanguinis inflammata topi particula, motuque ejusdem urgentiori commota, ita ad se invicem allidebantur, ut concretionis nexum diffringerent; sic in suppurationem abeunte tumore ulcus satis ingens, graveque olens cum ossis erosione circumscriptas fibrillas depascebatur. Verum benignioris auræ lumine afflatus ab hypocausto recessit, & successive solventi blando liquore, sed aqueo continuo rigatus, inde salivationis cursum feliciter exegit: Interim solo spiritu vini camphorato pro ulcere adhibito absque ulla symptomatum sævitie, & doloris recrudescentia perdomata febre, repurgato, & consolidato ulcere, ultra expectationis spem triginta diebus evasit.

HISTORIA II.

Juvenis bilioso-melancholici temperamenti, gracilis habitus, angusti pectoris celtica labe autumnis, & hyeme grassante affectus emarcescit, & magis febre lenta, quandoque etiam quotidiano typo algens, atque incalescens, nocturnis doloribus ad

artus fere omnes torquetur cum sicca impetigine faciem, ac fere universam cutem scelerante. Æger ab enormi fluidorum vitio, & subsecuta solidorum labe vexatus, veris tempore salivationi committitur, quam post largum viscidissimi phlegmatis effluxum circa summos labores trigessimis circa diem remittentem, excepit (processu dolore pectoris cum tussi) purulentum sputum, phthysis lethalis epyphenomenon a pulmonari insartu, aut tuberculo ante salivationem in pulmonibus latente, salivationis tempore suppurato, at disrupto; interea ad diluentia, balsamica, & lactea irrita medicamina delegatus, a nova tuberculorum inflammatione, & pulmonum exulceratione una cum colliquativa diarrhæa e vivis funeste sublatus est.

Hoc eventum videtur mercurialia salivatoria proficiscenti tibi pulmonari calcar addere, & quæ extergendis, exsiccandisque internis aliis, externisque partium ulceribus præstantissima passim experimur, in infantis pulmonibus crimine non carent. Clarissimus Morton in phthysi symptomatice a celtica lue haud veretur mercurialium usum. Ideoque, inquit, *nil melius excogitari potest, quam ulcerum pulmonarium sanationem, & crassi sanguinis a fermento veneris eversa restitutionem mercuriali aliqua salivatione tentare.* Hac fortasse adhibita in tertio ejusdem stadio post tuberculorum suppurationem ad extergendum, & exsiccandum consequens ulcus, non vero in eorundem cruditate, aut in pulmonibus prius obstructis, & in phthysim dispositis; cum in hoc casu videantur mercurialia sponte irreparentem phthysim promovere, adeoque ad inhibendam tuberculorum latentium inflammationem, & suppurationem inepta, licet, fortasse ad eorundem exulcerationem abstergendam, exsiccandamque consequens ulcus apta.

HISTORIA III.

Juvenis quidam circa annum ætatis sue vigesimum octavum, lascivus, & nequam post concubitum venereo veneno per contagium adeo inquinatus fuit, ut non obstante plurium medicaminum anticelticorum ope a Medico instituta, aliisque curationis methodis incasso molimine accersitis, post uvulæ erosionem, atque alia luis venereæ stigmata foris, & intus excrecentia, in summam incidere deglutitionis difficul-

HISTORIA V.

tatem a tonsillis intumescantibus, atque inflammatis cum febre, & totius corporis emaciatione incipiente. Ob glandularum folliculos a contento fluido summe turgescientes maximam indebat formidinem mercurialium usus, utpote ab intus commota materie fluidorum, & ad glandulas jugiter assuente tonsillarum inflationem promoven- tium; Verum salivatione promota, dum cetera salivae glandulae a confluyente liqui- do distenta intumescunt, simulque exulce- rantur, ab ipsis tonsillis depluentibus sa- nioris fluxus filamentis, sensim humorum infartus in ipsis gliscens detumescerebat, quous- que perenni fluxu viscidus, atque erosivi phlegmatis erumpente perfecte patiens, & sine ulla recidivatione a tonsillarum tumo- re, ulceribus aequae, ac reliquis luis crucia- tibus penitus vindicaretur.

HISTORIA IV.

Mulier ante gestationis tempus lue ve- nereae affecta, dolore, febre, tophisque in diem incrementibus circumsepta, felici- ter mercurialem, cum dirae luis feritatis remissione salivationem transegit: at post stadium salivationis transactum secundatio- nem passa, uteroque gerens, in quarto men- se celtico veneno denuo inquinata, aut re- crudescere (ut saepe recidivam patiuntur hi, qui vario lenocinii apparatu phthysimum demulcent, aut salivationis tempus non explent) lenta febre, & macie denuo con- ficitur, in osse frontis novus extuberat, aperiturque topus, ac recens ulcus supra uvulam palatum exedit; a quo exorta de- glutitionis ingenti difficultate, tum solida, tum fluida materia per nares regurgitante, summus virium lapsus augebit. In hoc gravi morbi statu alteri salivationi subji- citur sialogogis pillulis, hisque repetitis, aut intermissis juxta tardum, aut celerem phtha- lismi impetum, nulloque interim uterino symptomate obvio, quod abortum prae- nunciaret, copioso sane effluxu mucosi, ac ul- ginosi phlegmatis salivatione peracta inte- gre convalescens, filiam completo gestatio- nis tempore salubrem, absque sui ipsius re- cidivae metu, obstericante mercurio pepe- rit. Igitur quam sit male sanum commen- tum, & inanis timor eorum, qui in praegnantibus mercurialium usum abhorrent, aperte evincitur, & clare elucet.

Vir quadragesimum annum natus, admo- dum robustus, laxaris victus habitus, & cum scortis avidissime luxuriens, nulla virulenta infectus gonorrhoea, celtico rheu- matismo gravissime afficitur, maxime po- stu praedictis cruciatibus in capite, me- diisque tibiis, brachii dexteri contractione, alibique corporis citra ullum tumorem sa- videntibus afflicto, ut nec cubili se conti- nere potens, nec lecto affixus miserrime traheret spiritum; in dies incrementi dolo- ri accessit febris, postquam perenni circui- tu increbescens, gummosus tumor diu de- litescens in sincipite dextero versus oculum protuberans se manifestavit. Remedia mi- nora fere innumera sine ulla symptomatum allevatione adhibebantur: mercurialium usu cathartorum primo melius habere visus; exinde tandem deterior factus, eo tempore praeter immani cruciatu ferro tumorem discin- di passus est, sed frustraneo conatu. Qua- propter cum methodus quaequam nihil opis contulisset, sed recrudescere lue, salivatio- nem, remedium ceteris quibusque validius ultimum, experiri consulitur. Statim cor- pore per catharsin, & phrisanam humectan- tem rite preparato, salivationis stadium sublimato dulci inchoavit, qui ad finem morbi anhelans per quinque dies 37. grana mercurii in dulcem confecti devoravit; a pharmaco quinta vice reperito sputatio co- piofa, & laudabilis incipit, quae sine ma- lo quovis symptomate per mensem proces- sit, & decrecente salivationis visciditate, ac pondere ad residuum spumescens gluti- nis compescendum novo usu mercurii per paucos dies ad 3. 5. interjecto curam con- fecit. Ante cursum hunc phthysimi fini- tum, dolores omnes cum febre evanescere, indeque a gummate ulceroso exsiccato, li- cet longo morbi decursu defatigatus ager, intra quadraginta dierum spatium integre convaluit.

HISTORIA VI.

Juvenis eques vix celtico seminio tactus, jam primum lue inquinatur, & virulen- ta gonorrhoea torquetur, a qua, nescio quo, & sortassis malefana medela vindicatus, do- loribus vagis incalescens accensa febricula inhorruit, a qua statim ingravescent mor- bus brevi ad feritatem perveniens, cum os- sium carie, & gummatibus cranii ad mu- scu-

sculos temporales protuberantibus, irrita tum una, tum alia quacunque methodo, per tres annos tyrannidem suam exercuit. Quare remedia diversimoda cujuscunque fere generis tentata cum potius exacerbationem intulissent, animatur æger salivationis cursum subire. Itaque ex consilii votis mercuriali salivationi committitur, a qua tumefactis glandulis, & fluidorum impetu dehiscenribus tubulis, crassa saliva ab osculis vasorum apertis indefinenter effluxit; unde nullo amplius salivationis stimulo incusso, nulloque addito impulsu ptyalismus per mensem ciebatur. Octava tamen die salivæ saburra confertim nimis versus ductus salivales irrituens compefcebatur syr. papav. & opiat. liquoribus. Hinc mitigatis gingivarum doloribus, & compede injecto ubertiori salivæ effluxui, lento morbo si liquidi cursu stadium salivationis peragitur, quod curriculo dierum triginta pertingens a repetito mercurii usu trigesimo quinto omnino desit. Hac æger cura consumpsit centum grana mercurii, quibus tophus, febris, dolorque capitis ex toto cessavit.

HISTORIA VII.

Fœmina quædam sanioso gonorrhææ fluxu miserrime plexa, inde doloribus nocte recrudescenribus vehementer conqueritur. Verum quia parum primo in affecta parte doloris sensit, tanquam leve malum contempsit: subsequenribus inde diebus evanescente sanioso icore, tumor quidam in sincipite interdum indolens fere succrevit, qui nullo negotio a periti Chirurghi industria sublatus, novos in vertice moliebatur tophos, extuberantes successu temporis in palato plures pustulæ in ulcera cachœtica, & putrida terminarunt. Hæc scœmina dum

patrati sceleris sordes expiare cogitat, tuberculum exiguum in mamma dextera protuberat lente proserpens, & vix pisi magnitudinem exæquans, quod inæquali pede, & mole concrefcens, venis in ambitu turgidum cum colore livido, & obscuro, tactui insuper renitens dura veluti crusta obducitur, firmiterque subjectæ parti adherens deterrimis, ac gravissimis symptomatibus excruciat. Mulier de incolumitate sollicita, licet plurimis morbis labefactata, curæ salivatoris se concedidit, quæ sputationis cursu per mensis spatium repetito, indeque pustulis, & tophis, fœtidisque ulceribus ubique evanescentibus, tunc ad valetudinem se recuperare videbatur; verum gallica totius corporis descœdatione ex istius votis intime perdomata, recrudescit diu delitescens cancerosus tumor punctationibus quibusdam, ac si acu fierent, se patefaciens. Porro ex hoc in dies actus tumor tot ærumnis reviviscit. præque diro dolore ita ingravescit, ut de repente ad ultimum stadium perduceretur, in quo apertis, & corrosis folliculis, & glandularum fibrillis, putris sanies, mox nigricans continuo emanavit, quibus diu obnoxia mulier tandem in lethalem lapsum incidit.

Hoc lethali morbi experimento per salivationem habito turpi inscitia puniuntur, qui mercurialibus carcinoma discurre, ejusdem coagulum resolvere, atque salia corrosiva cicurare nituntur. Nucleus enim canceri, qui longos in annos naturæ, & medicamentis suavioribus inexcussus manet, incidentium, & resolventium usu commotus agitur, inflammaturque: unde incalcentibus acrium salium coacervatis moleculis, non mirum, si in apertam cladem terminetur.

Finis totius Operis.

I N D E X

P R I M Æ P A R T I S

M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| A | | | |
| A eris quantitas contenta in quasi sphærica, & in quasi sphæroidali vesicula inquiritur. | pag. 211 | nis. | 210 |
| Aqua ascendit ad pedes. | 205 | Hæmoptoici, & Hæstici parum æris excipiunt. | 210 |
| Arteriæ magnæ Diameter. | 207 | Hermanus laudatus. | 212 |
| Area artetiæ magnæ. | 218 | Hemicrania. | 427 |
| Aneurisma quomodo fieri possit. | 207 | Hydrops pulmonum. | 210 |
| Arteriæ, & venæ ad instar retis per pulmones excurrunt. | 211 | Hypochondriacæ affectiones. | 220 221 |
| Arteriæ magnæ descendentiæ area. | 218 | I | |
| ascendentiæ area. | ibid. | Inæqualitates, intermittentiæ pulsuum a quibus causis fiant. | 208 |
| Apoplexia a quanam causa. | 227 | Inspiratio & expiratio quomodo fiant. | 113. |
| B | | earum usus. | 114 |
| Bronchiorum vesiculæ quasi sphæricam superficiem describunt. | 211 | adjuvantur a motu peristaltico vasorum pulmonarium. | 115 |
| aliquando sphæroideam. | ibid. | Intestina quomodo separent inutiles particulas. | 222 & seq. |
| Bernoullius Jacobus & Joannes laudati. | 212 | K | |
| C | | Keillius laudatus opponitur Borello. | 205 |
| Calor in quo consistat. | 196 | L | |
| Cephalæa, Cephalalgia. | 427 | Lama Franciscus laudatus. | 216 |
| Cordis momentum determinari vere non potest. | 205 | Leibnitius Guilielmus laudatus. | 212 |
| Curva spiralis an describatur a sanguine per arterias. | 197 | Luminosæ particulæ per pulmones sanguinem ingrediuntur. | 215 |
| D | | M | |
| Diarrhœæ & Dysentericiæ causæ. | 223 | Massa sanguinis tribus motibus præcipue afficitur. | 197 |
| E | | Motus pressionis. | ibid. |
| E qualis quantitas sanguinis continetur in dextro Ventriculo, ac in sinistro. | 206 | separationis. | 197 |
| F | | assimilationis. | 202 |
| Flatuum vires, a quibus dolores & morbi plurimi fiunt. | 263 | Michelottus laudatus Borellum tutatur. | 205 |
| G | | refert vires elasticas æris, &c. | 212 |
| Globuli plano-ovales elastici sunt, & figuram mutant. | 192 | Malpigijs laudatus videtur tribuere motum spiralem sanguini. | 213 |
| Glandularum angustia non impedit aptam separationem. | 202 | N | |
| Gravitas specifica sanguinis.) | 208 | Nutritio quid sit. | 203 |
| feri sanguinei.) | ibid. | fit paulatim. | 204 |
| aquæ communis.) | ibid. | Nevvtonus Isaacus laudatus. | 212 |
| Gravitates æris, & aquæ expendantur. | 217 | P | |
| H | | Paralysis. | 227 |
| Hepar quomodo separet corpora. | 199 | Pondus sanguinis humani. | 206 |
| Hepatitis cur difficultatem afferat respiratio- | | feri humani. | ibid. |
| | | aquæ communis. | ibid. |
| | | Polyposæ materiæ quæ ratione resistent sanguini. | 208 |
| | | Pectus consideratur a Pitcarnio tanquam Sphærois. | 210 |
| | | | Pe- |

| | | | |
|---|--------------|--|-----|
| Peripneumonia quomodo fiat. | 214 | Serum ad alia corpora est in ratione tripla. | 191 |
| Pleuritidis legitimæ origo, & basis. | <i>ibid.</i> | Separationis methodus ex Leibnitio, Bernoullio & Conoro. | 197 |
| spuriz. | <i>ibid.</i> | Singultus. | 222 |
| Polenus Joannes laudatus. | 212 | Stomachi dolores. | 220 |
| Pulmonis substantia jugulum versus angustior est, versus vero costas spurias extensior. | 210 | T | |
| Proportio motus fibrarum glandularium. | 201 | Timpanytes. | 222 |
| Phthisis cur afferat difficultatem respirationis. | 210 | V | |
| R | | Vallisnerius laudatus. | 220 |
| Renum affectiones. | 223 | Vena subclaviæ non descendunt recte, sed inclinate. | 227 |
| Resolutio massularum sanguinis a quibus motibus fiat. | 194 | Ventriculus dexter cordis debiliior est momento suo, quam sinister. | 206 |
| S | | Volvulus. | 222 |
| Sanguinis analysis. | 192 | Viscera quælibet Animalium suas habent glandulas specifica figura & textura donatas. | 198 |
| Sanguis cur albescat in cancriis aliquibus, <i>ibid.</i> | | Uncia sanguinis probabilius expellitur singula systole. | 207 |
| Sanguis e capillaribus lentissime effluit. | 219 | Z | |
| Sanguis quando ab arteriis in venas fertur. | 224 | Zendrinus Bernardinus laudatus. | 219 |
| quam lineam describat ascendendo per venas. | 225 | | |

I N D E X

S E C U N D Æ P A R T I S

M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

| A | | M | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| A Poplexia | pag. <u>244</u> & seq. | Motus solidorum ab actione cerebri . | <u>230</u> |
| Anima organis compenetrata est . | <u>250</u> | Motus contractionis & distractionis . | <i>ibid.</i> |
| apra est dirigere , extendere &c. machi-
nulas Sphæroidales musculorum . | <i>ibid.</i> | communis est omnibus fibris . | <u>231</u> & seq. |
| Auditus sensatio &c. | <u>264</u> & seq. | quomodo fiat . | <i>ibid.</i> |
| Vitia . | <u>269</u> | Michelottus Petrus Antonius laudatus . | <u>406</u> |
| B | | Morgagnus Joannes Baptista laudatus . | <u>241</u> |
| Bellinus laudatus . | <u>246</u> | Motus fibrarum cerebri , alter absolutus ,
alter relativus . | <u>253</u> |
| Borellus Alphonsus laudatus . | <u>247</u> | Memoria quomodo fiat . | <i>ibid.</i> |
| Bornoullius laudatus . | <i>ibid.</i> | Mania . | <u>256</u> |
| C | | Melancholia . | <u>257</u> |
| Contractio , & distractio fibrarum naturalis
& præternaturalis , &c. | <u>231</u> | Maculæ seu muscæ volantes . | <i>ibid.</i> |
| Cephalæa , Cephalalgia quomodo fiant . | <u>254</u> | N | |
| Convulsio & Motus convulsivi quomodo
fiant , &c. | <u>236</u> & seq. | Nevvtonus Isaacus laudatus . | <u>263</u> |
| Cur sine dolore . | <u>237</u> | O | |
| Cur cum dolore , &c. | <u>238</u> | Opisthotonos . | <u>241</u> |
| Capitis vulnera in parte dextra , cur asse-
rant convulsionem in sinistram <u>partem</u> ,
& e contra . | <u>237</u> | Oscillationes solidorum erantur . | <i>ibid.</i> |
| Coma & carus . pag. 251 | <i>ibid.</i> | Ophthalmia . | <u>435</u> |
| Coma vigil . | <i>ibid.</i> | Odoratus sensatio & vitia . | <u>269</u> & seq. |
| Cæci cur longævi sint . | <u>454</u> | P | |
| Cataracta . | <u>262</u> | Pachionus laudatus . | <u>254</u> |
| D | | Paralyfis &c. | <u>245</u> |
| Dolor quomodo fiat . | <u>264</u> | Pia Menynx haberi potest pro sensus com-
munis organo . | <u>246</u> |
| Discursus & Ratiocinatio . | <u>253</u> | Polenus Joannes laudatus . | <i>ibid.</i> |
| Delirium . | <u>255</u> | Phantasmata quænam sint . | <u>252</u> |
| Duplicatio objectorum . | <u>262</u> | Phrenitis . | <u>256</u> |
| E | | Risus Sardonicus . | <u>241</u> |
| Empisthotonos . | <u>241</u> | Reminiscencia quomodo fiat . | <u>254</u> |
| Epilepsia cum dolore , & sine dolore . | <u>242</u> | Ronchallus Franciscus laudatus . | <u>259</u> |
| F | | S | |
| Fantonus Joannes laudatus . | <u>245</u> | Spasmus Cynicus . | <u>241</u> |
| G | | Strabismus . | <i>ibid.</i> |
| Gutta serena . | <u>463</u> | Senus quomodo fiat . | <u>265</u> & seq. |
| Gustus sensatio . | <u>271</u> | Soni velocitas . | <u>266</u> |
| Vitia . | <u>272</u> | Sonorum diversitas & sequi . | <i>ibid.</i> |
| H | | Sapores quomodo fiant . | <u>469</u> |
| Hermannus Jacobus laudatus . | <u>231</u> | T | |
| Hemicrania . | <u>454</u> & seq. | Tetanos . | <u>240</u> |
| I | | Tremores unde , & seq. | <u>243</u> |
| Imaginatio . | <u>253</u> | Tactus vitia . | <u>273</u> |
| L | | Transpiratio & vitia transpirationis | <u>274</u> |
| Lethargus . | <u>251</u> | V | |
| Lana Franciscus laudatus . | <u>265</u> | Vallisnerius Antonius laudatus . | <u>241</u> |
| | | Vertigo . | <u>251</u> |
| | | Valsalva laudatus . | <u>268</u> |
| | | | <u>1N.</u> |

I N D E X

T E R T I Æ P A R T I S

M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

| | |
|---|--------------------------|
| A | |
| A Er potest esse causa Diabetis & Diarrhœæ . | pag. 296 |
| Aquæ frigidissimæ potus damnatur . | 300 |
| Quando permitti possit . | <i>ibid.</i> |
| Æquilibrium mixtionis massæ sanguinis quid sit . | 277 |
| C | |
| Calor præternaturalis in Sanguine quomodo fiat . | 288 |
| D | |
| Divisio febrium in intermittentes & continuas . | 279 |
| Dolor capitis in febribus . | 294 |
| Diabetis causa . | 295 |
| E | |
| Elementa æstuosa & elastica quænam sint, & elementa inertia quænam . | 279 |
| Elementa inertia majoris inæqualitatis respectu corporum elasticorum cohibere possunt elementa elastica minoris inæqualitatis per aliquam temporis differentiam . | 288 |
| Elementa elastica majoris inæqualitatis respectu corporum inertium minoris inæqualitatis nullo modo frænari possunt a corporibus inertibus, unde fit calor sine frigore in febribus continuis . | 286 |
| F | |
| Febrium definitio . | 277 |
| Febres sunt a vitio mixtionis elementorum sanguinis . | <i>ibid.</i> |
| Fluida alia sunt homogenea, alia heterogenea . | 281 |
| Frigoris causa in febribus . | 286 |
| Febriles accessiones cur statutis temporibus redeant . | 289 |
| Febres Organicæ quænam sint . | 285 |
| Quotidianæ regulares . | 292 |
| Quotidianæ duplices . | <i>ibid.</i> |
| Lymphaticæ . | 293 |
| Tertianæ regulares . | <i>ibid.</i> |
| spurix . | <i>ibid.</i> |
| Quartanæ legitimæ . | <i>ibid.</i> |
| spurix . | <i>ibid.</i> |
| Ephemera . | <i>ibid.</i> |
| Continuæ . | 297 |
| Inflammatoriæ . | 298 |
| Erysipelatosæ . | <i>ibid.</i> |
| Lypuriæ . | <i>ibid.</i> |
| Malignæ . | |
| Hæclicæ . | |
| G | |
| Gulielmus laudatus . | 279 |
| H | |
| Hermanus Jacobus laudatus . | 281 |
| Hepatitis . | 292 |
| L | |
| Lana Franciscus laudatus . | 296 |
| M | |
| Media densitas, media crassities, medium pondus debent esse in statu naturali sanguinis . | 281 |
| Michelottus Petrus Antonius laudatus . | 287 |
| Morganus Joannes Baptista laudatus . | <i>ibid.</i> |
| N | |
| Nevvtonus laudatus . | 281 |
| O | |
| Oscillatio fluidorum juvat, ut minimi canales aperti teneantur . | 279 |
| P | |
| Potiones frigide cur damnentur in accessione frigoris . | 300 |
| R | |
| Ratio reciproca momentorum corporum elasticorum & non elasticorum sanguinis: vel reciproca massarum & velocitatum corporum eorundem, ubi Lestorem monuimus, & . | 277 |
| Item ratio homologa fluidorum & solidorum . | 279 |
| Pariter ratio homologa momenti distractionis & contractionis vasorum servandæ sunt in statu naturali sanguinis, & naturali mixtione ejusdem . | 280 |
| S | |
| Sanguis in febribus non semper peccat velocitate, sed tarditate . | 277 |
| Sanitas in quo consistat . | 300 |
| Siris in Febribus . | 301 |
| Sudores in febribus . | <i>ibid.</i> |
| V | |
| Vigiliæ in febribus . | 301 |
| Vomitus . | <i>ibid.</i> |
| Vallisnerius laudatus . | 300 |
| Verulamius citatus . | 286 |
| W | |
| Wolfius citatus . | 282 |
| | IN. |

I N D E X

MECHANICES MEDICAMENTORUM.

A

- A** Tmosphæra pressio infervit unioni, nexui & æquilibrio efficiendo, & conservando particularum massæ humorum. pag. 310
- Affrictus corporum inter se sunt causæ caloris. 315
- Aquæ minerales bibendæ sunt cum moderamine. 330
- Adstringentia quænam sint, variæ species assignantur, & quomodo agant, explicatur. 338
- Cur parva quantitates exhibita apta sint magnas quantitate humorum irretire. 339
- Alpinus Prosper laudatus. 330
- Animalium fluida habent salia figurata. 348

C

- Circulatio sanguinis quot vicibus proxime compleatur singulo horæ spatio. 317
- Cantarides cur vesicam lædant. 324
- Cordialia non cordi tantum, sed etiam Cerebro, 341
- Cerebello succurrunt. *ibid.*
- Quænam sint cordialia. *ibid.*
- Quo tempore exhibenda sint. 342
- Cordialium abusus damnatus. *ibid.*
- China-China quomodo operetur in febribus superandis. 345
- Juvat concoctioni humorum. 346
- Concoctio humorum quid sit, quomodo fiat. *ibid.*
- Concoctio a quibus indicatur. 347

D

- Distractioni fibrarum est proportionalis contractio earundem in statu naturali. 304
- Diuretica yarîi ordinis quomodo operentur. 329
- Diuretica valida semper caute adhibenda. 330
- Diaphoretica quænam sint, & quomodo operentur. 331
- Quomodo diaphoresis excitetur ab externis. 334
- Caute tentanda. *ibid.*

E

- Elementa actiosa, & elastica quænam sint; quænam inertia, & non elastica. 303
- Ægritudo reddit animal vel in toto, vel in parte inæqualiter leve, inæqualiter grave, inæqualiter laxum, inæqualiter calidum, & inæqualiter frigidum. 309

Effluvia corporum habent minimas figuras similes figuris corporum majorum, a quibus emanant. 310

F

- Fibræ primo simplicissimæ, deinde magis compositæ fiunt. 303
- Sunt repletæ fluido, ex quo nutriuntur, conservantur, & moventur. 304
- Impellunt fluida æqualia temporibus æqualibus in statu naturali. 308
- Motu elastico donantur. *ibid.*
- Fibrosum compositum consideratur cylindricum, aut quasi cylindricum. 304
- Figuræ herbarum ostenduntur a Fracassato in Operibus Malpighii. 313
- Fluida moventur motu spirali in canalibus. 335

H

- Hellenium cur mures occidat. 324
- Hypocacuanna quomodo dysenterias curret. 343

L


- Lympha cur minus incalescat quam sanguis. 315
- Lavagnolus Bartholomæus laudatus Professor Patavinus. 346

M


- Mixtio particularum sanguinis facienda est in ratione reciproca, aut quasi reciproca earum, ut unio nexus, & æquilibrio fiant inter se in statu naturali. 310
- Medicamenta emittunt effluvia, & qua ratione agant in fibras opere superficie-rum. 311
- Agunt opere figurarum. 312
- Agunt opere motus, & elateris. 313
- Agunt in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum. *ibid.*
- Medicamenta dividi possunt in partes minimas. *ibid.*
- Medicamenta purgantia cur aliquando ele-give purgare videantur. 322
- Mercurius cur palatum laceret, & salivam promoveat. 324
- Medicamenta specifica ut Hypocacuanna, China-China quomodo agant. 343
- Mineralia suas habent figuras. 313
- Mixtio humorum feliciter fit per lineas tri-
M m m 12

- rales. 335
 Morganius Joannes Baptista Professor Patavinus laudatus. 325
 N
 Nux vomica cur canes occidat. 324
 O
 Opiata cur ligant fluida, & solida. 339
 Cur aliquando dissolvant, & sudores promoveant. 346
 Ut sine noxa operentur quid agendum *ibid.*
 P
 Proportio reciproca momentorum particularum sanguinis, aliorumque fluidorum inter se; homologa proportio fluidorum, & solidorum inter se; & inter solida unius generis, & solida ulterius habendæ sunt, ut habeatur unio nexus, & æquilibrium actionum, & reactionum in statu perfectæ sanitatis. 309
 Purgantia cum plurimas materias promoveant per intestina. 321
 Penetratio corporum facile obtinetur per lineas spirales. 335
 Præparatio humorum facienda. 342
 R
 Ramosæ superficies corporum quomodo agant contra fluida, & solida, & quomodo adstringant. 311
 Renum morbi quomodo fiant. 332
 S
 Sanitas in quo consistat. 308
 Sanguinis massa quomodo successive densior reddatur in canalibus arteriosis. 309
 Sanguis in venis non amittit motum æquabilem. ibid.
 Sustinet unitatem, & nexum tam in arteriis, quam in venis. 320
 Sanitatis status reddit animal æquabiliter leve, æquabiliter forte, æquabiliter constans, æquabiliter mobile. ibid.
 Superficies medicamentorum leves, molles, & laxæ quid agant. 322
 Asperæ, & inæquales quid operentur. ibid.
 Succulatæ abusus damnatur. 343
 T
 Torti Franciscus laudatus. 348
 V
 Vomitus quomodo fiat. 326
 Cur expedite, & promptè materiæ in vomitu per Oesophagum ascendant. 327
 Cur aliquando specificæ materiæ evomantur reliquis retentis. ibid.
 Vomitoria quibus exhibenda, & quibus prohibenda. 329
 Urinæ oleosæ cur eveniant, & quomodo cognoscantur. 332
 Vallisnerius Antonius laudatus. 313

SUPPLEMENTUM
OPERUM MEDICORUM
THOMÆ SYDENHAM.



L E C T O R.



UM nihil antiquius nobis in animo sit, quam bene de te; benigne Lector, deque eruditis Viris mereri, atque in unum hoc enitatur, ut non minus in horum utilitatem, quam commodum gemere nostra præla non desinant; hinc factum, ut nihil intermiserimus unquam, quod nostrum hoc studium magis magisque valeat usquequaque testari. Postremam igitur nostram editionem Operum doctissimi Viri THOMÆ SYDENHAM, Genevensis altera subsecuta novos exhibuit hodieum ineditos Tractatus Medicos, qui, quoniam Doctorum Virorum, desiderari possent in hac nostra, quam aliqui accuratissimam tibi donare curavimus. Quapropter bono animo illos ipsos Tractatus hic in calce hujus Operis accipe insertos, nostros labores accipe, accipe nostros conatus in hoc unum incumbentes, ut tuis & studiis serviamus & commodis.

Tractatus in Genevensi Editione 1736. tractatibus Medicis SYDENHAM additi.

Dn. D. Caroli Friderici Loevv, de Febre Petechiali ann. 1683. Pofonii grassata, & cujus descriptionem in Adversariis Paternis repererat, Epistola ad Clariss. Dn. Francisc. Frider. Possinger, Archiatrum Cæsareum.

Dn. D. Andreæ Loevv *Historia Epidemica Hungaria*, annorum 1688. 1687. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. ab ejusdem filio Dn. D. Carlo Frider. Loevv, Perillustri Lucæ Schroekio, Academ. Natur. Curios. Præsidi, &c. anno 1726. communicata.

Dn. D. Josephi Lanzoni *Constitutio Epidemica Ferrariensis*, ann. 1729.

Dn. D. Caroli Frider. Loevv, *Historia Febris Catarrhalis*, qua ann. 1729. Mense Novembri & Decembri, per Europam Epidemice grassata est; cui accedit *Constitutio Epidemica anni 1730.*

Dn. D. Caroli Richa *Constitutio Epidemica Taurinensis annorum 1720. 1721. 1722.*

Dn. D. Caroli Friderici Loew, de Febre Petechiali ann. 1683. Pofonii grassata, & cujus descriptionem in Adversariis Paternis repererat, Epistola ad Clariss. D. Francisc. Frideric. Possinger Archiatrum Cæsareum.



Eniam dabit audaciz meæ, qua ardua negotia turbare non sum veritus, par suffragio Tuo humanitas: tanto facilius, quo majori fide Tibi affirmare possum, non alia causa, quam pietatis lege impulsum me ad hoc scriptio- nis genus accessisse, ut extaret aliquando gratæ mentis documentum, pro illo insigni favore Tuo, quo Tibi me dudum tam in publicis, quam privatis consiliis reddidisti obstrictissimum. Non facile succurrebat, qua ratione Tibi grati animi pietatem probarem: nihil ex propria suppellectile, quamvis plurima sese offerrent, ad dandam erga Te mei significationem, dignum esse censeui: urgebat interim, quia, relatorum me gratiam affirmare non audeo habendæ saltem, & quavis ratione declarandæ gratiæ officium. Malui proinde ex re, non tamen prorsus aliena, nempe beati parentis, Vir- tutum Tuarum veneratoris, laboribus, aliquid depromere, quod Magnifico Tuo Nomini sacrum simul animi referendæ gratiæ cupidissimi publicum esset documentum. Suscipe igitur serena fronte historiam morbi petechialis, qui anno 1683. Pofonii epidemice grassatus est, a Parente meo pie defuncto, sollicitè conscriptam, Illustrique Nomini Tuo inscriptam in lucem publicam emittendam. Si quantum per occupationes Tuas gravissimas licuerit, hanc qualemcumque publico bono destinatam opellam perlustrare volueris, inveniens forte non plane contemnenda, & digna, quæ in publicum emittantur. Fiet autem hoc eo felicius, si pace Tua, Perillustri Nomine Tuo sese hoc opusculum multis probaverit. Hujus summa, ut supra monui, est expositio morbi petechialis, qui Pofonii epidemice grassatus est, ad fidem scripti, a beato parente relictæ. Initium hujus historiciæ expositionis ducitur ab anno 1683. quo per Dei gratiam soluta

obsidione Viennensi, regno Hungariæ, misero fatalique bello miserime afflicto, sigillatim mense Septembr. pax restituta fuit. Tunc vero copiis militaribus hyberne dimissis, & Pofonii etiam per suburbia dispositis, mali semina sparsa sunt. Milites enim, quod gregatim in contruberniis arctius collocati erant, omnia squalore, terra immunditie, & foedis odoribus compleverunt, ipsumque quasi aërem inquinantes, catervatim, & veluti per manipulos in febrem malignam petechialem inciderunt. Morbus brevi invalescens, quam plurimos ex illis consumens, in malum tandem epidemium degeneravit, & in incolas plerosque, sine ætatis discrimine, maxime vero in juvenes, maturæ & robustæ ætatis homines, non modo plebejos, verum etiam nobiles & divites, vehementer grassari cœpit, ita, ut ferme nullam domum intactam reliquerit. Incepit morbus hic epidemius mense Novembr. anni supra citati, qui statim horrore artus corripuit, interdum intensiore, interdum remissiore, non nunquam per intervalla recurrente, quem pressio pede exceperit calor in principio levis, qui agrum primis adhuc diebus vix a negotiis solitis detinuit, interiora tamen occupans sensim auctus est. Ob sanguinis ergo rarefactionem majorem, & noxam visceribus impressam multa statim oriebantur periculosa symptomata, nausea, anorexia, vomitus, cardialgia, sitis, non nunquam remittens, dolor capitis, vigilie, lassitudo spontanea, quæ symptomata ad iv. diem sensim aucta perdurabant, tanta interea non nunquam lenitate, ut quamplurimi vim morbi laxatam crediderint, ejusque causam in errorem externum commissum rejecerint. Verum progressu temporis morbus malignitatem suam prodidit, intensissimi caloris sui effluvia per totum corpus diffundens, horrendæque producens symptomata. In unico saltem homine mitior vis morbi observata fuit: in blandissimo per totum decursum calore nulla sitis, nullum oriebatur delirium, morbi de solo capitis dolore, & prostratis viribus querela fuit. Cæterorum fere omnium, hoc morbo laborantium corpora quasi incendio fumare, insolito calore gravari ac corripì visa sunt. Hinc observabatur lassitudo & jactatio totius corporis, subita virium prostratio, in non nullis vigilie diuturnæ, quas statim exce-

excepit delirium, non nunquam in incremento, non nunquam in statu morbi, aliquando mitius, & per unum saltem diem durans, aliquando ferocius, non nunquam mussitando proditum, non nunquam nullum fuit observatum, ut in pistoris cujusdam uxore, nunquam delirio correpta, & tamen die VIII. prægressis convulsionibus mortua. Sed præstabat delirium ante nonum accessisse diem, quam post nonum; quosunque enim post hunc invalit, omnes fere mortui sunt. Horum delirium non nunquam degeneravit in furorem, quo agitati surrexerunt, & robustissimorum alioqui hominum actiones ediderunt. In declinatione morbi non nunquam somnus obrepserat continuus, ita, ut agroti & cibum & potum neglexerint. Sic & mentis emotiones taciturnæ in eo, qui alioqui facultate loquendi pollebat, ut plurimum erant periculose, quale exemplum in saponario quodam habui. Porro somnum ægrotorum plerumque turbabat inquietas nocturna: hinc delirare cœperunt, & absurda loqui. Tinnitus & susurrus aurium ut plurimum in incremento jam huic morbo accedebat, quibus sese auditus difficultas, modo salutaris, modo funesta, collatis nempe reliquis symptomatibus periculosis, adjunxit, ut & oculorum dolor & ardor. Sæpiissime illis coruscationes varique coloris figuræ observabantur. Vultus, inprimis apud moribundos, ferax fuit. Tremor manuum frequens, sed labiorum continuus, & semper exitialis, & intra XXIV. horas imminentis mortis nunciatus, quod videre licuit in duobus, Vivis illastribus, ut aliorum exempla prætereamus. Tremorem autem statim vel sequebantur, vel præcedebant convulsiones, non tamen adeo funestæ, utut periculoso satis indicio fluctos legere cœperint decumbentes. Quorum aliqui moribus tandem convulsivis & ipsa epilepsia correpti, violentia morbi consumpti sunt, cujus exemplum præbuit quidam juvenis XXI. annorum, qui post convulsiones incidit in motus convulsivos, & ipsam epilepsiam IV. horas durantem. Curatæ tamen epilepsie huic morbo die XII. supervenientis, & per integrum diem observatæ exemplum habui in juvene quodam pannifice. Ad unum fere omnes caput rotari, sequæ vertigine laborare dixerunt. Vertiginis inseparabilis comes erat dolor capitis, qui & in artus & lumbos non nunquam sese diffudit, ut ingentes nebritides, uterique a seclis adesse crediderint, quod in virgine quadam observavi, causam tamen semper

a miasmate maligno infestante sanguinem, quod in majoribus venis & arteriis ad illas partes devolvebatur, deducendam esse duxi. Gustus sæpiissime plane fuit depravatus ac perversus in hoc morbo, ut agroti non nunquam aquam pro vino biberint, poma citrina pro uvis recentibus, quod meo exemplo testari possum, comederint. Aphonia quoque, non semper tamen lethalis, observabatur, cujus per integrum ferme diem durantis, & tamen curatæ exemplum præbebat quidam juvenis viginti aliquot annorum. Respiratio sæpenumero difficilis fuit, & frequens, expiratio vero non nunquam quasi flammea, quæ semper mala, uti videre licuit in quodam saponario. Pulsus non nunquam, inprimis in principio, sanorum fuit quam simillimus, non nunquam celer, frequens, intermittens, debilis, inequalis, ut sæpiissime judicium de signis morbi prognosticis sefellerit. Erat tamen quoddam genus pulsuum, quo præsentem mortem certo prælagire potuimus, si nempe decumbentes ad contrectationem pulsus aut manus retraxerint tremulas, easque introsum duxerint, vitæ quasi suæ timentes, aut si tremens, palpitans & caprilians observatus fuerit pulsus. Anxietates, liposymia, syncope, in hoc morbo maximum cordi facessivere negotium, ut non nunquam per tres dies iteratis vicibus continuaverint. Tussis non nunquam in principio, ut plurimum in incremento & statu, aliquando humida, aliquando sicca, sese exerebat, quarum posterior pejor, & malignitatis arguebat præsentiam. Cardialgia correpti, præ dolore ingenti, solum de dolore & gravissima mole pectoris conquesti sunt, existimantes, hoc sublato, se pristinam recuperaturos sanitatem. Morbi principium semper erat cum anorexia, nausea; interdum vomitus, qui si per aliquot dies duravit, nullisque medicamentis mitigari potuit, neque macularum eruptione superveniente cessavit, funesti semper exitus erat signum: aliquando die septimo aut octavo demum oboriebatur. Sitis in his symptomatibus cum morbo incrementum sumebat: non nunquam tamen ferme nulla, præsentem licet ingenti & totum corpus quasi corripiente calore, observata fuit, quod pessimum erat signum. Singultus, huic morbo ut plurimum in statu superveniente, plerique, quos sub mea habui cūra, sunt mortui, quidam tamen etiam servati, ut adeo singultus non semper signum imminentis mortis in febribus acutis inallibile sit; ut refert Epiphanius.

Fer.

Ferdinandus. Hemorrhagia quoque sæpissime hunc morbum secuta, periculosa primis diebus, & in ipso morbi statu, quod multis exemplis probare possemus, aliquando tamen critica, & sibi relicta, salutaris; sed imperitia chirurgorum die septimo suppressa, funesta. Sequiorem sexum morbus iste duplo gravius affligebat. Pleraque enim hoc tempore menses erant expertæ, aliæ primis statim diebus, aliæ nono demum die, qui semper exacerbabant symptomata, ut paucissimæ evaserint; benignior vero fuit morbi vis in mensium fluxu destitutis. Sed nec puerperæ, & gravide ab hoc morbo fuere immunes, licet non omnibus exitioso. Soror enim mea hac febre epidemiali correpta per Dei gratiam convaleuit, & robustum suo tempore enixa est puerum. Alvus quamplurimis per aliquot dies fuit obstructa, ut eam tandem suppositorio referare debuerimus. Nonnulli agrotorum jam in principio diarrhoeam perpeffi sunt, quæ si nullis medicamentis, ejusmodi affectibus alioqui maxime accommodatis, cedere voluit, res desperata fuit sæpissime tamen & in principio, incremento, & statu, remediis rite adhibitis, optimo cum successu sedata fuit, imo diarrhoea critica, die vii. cum ægri levamine, quæ frequentibus diebus in sua sponte cessavit, oborta est. Et sateri quoque debemus, fluxum alvi moderatum sæpissime non fuisse attendendum. Sic vermes tam in principio, quam statu ævo & ætate sat longos rejectos in duabus personis, quæ tamen evasere, vidi. Sudores sæpenumero sua sponte apparebant, interdum critici, qui omnes boni, interdum vero resolutivi, imminente inprimis morte, qui pessimi: totum enim corpus tunc temporis in vaporem & madorem resolvi videbatur. Parotides permultis oboriebantur ut plurimum die xiv. & per xiv. ferme dies durabant, nunquam tamen lethales. Adhibitis enim mox sudoriferis per insensibilem transpirationem disculsi sunt, sine omni metu recidivæ. Lingua sæpissime erat fissa, non nunquam muco albicante indurato, inprimis adulto, jam morbo, quasi crusta quadam obducta, ut etiam potulentorum, ob membranarum œsophagi fibrarum a calore ingenti exsiccatarum difficilem constrictionem, laboriosa fuerit deglutitio; aliquando nigra, quæ & faucibus peregrinum huncce suum impressit characterem, ut tandem sphacelo correptæ & exesæ fuerint, quale exemplum in puero vii. annorum, hoc symptomate affecto, & propte-

rea metu dolorum viginti ferme dies neque cibum, neque potum, neque medicamentum assumentem, habuimus. Exanthemata, tandem aliis jam ii. quod meo exemplo testari possum, aliis & ut plurimum iv. aliis vii. erupere die, in aliis non una vice exiere, sed tractu quorundam dierum; alii secundam quoque eruptionem die xiv. experti sunt, cui aliquando superveniebat vesica in dorso, nucis magnitudinem æquans, & aquam limpida continens, funesta, quam in Barone de Nobis conspeximus. Erant maculæ, quantum ad colorem attinet, versicolores, rubræ, purpureæ, fusæ & quasi crocei coloris, albæ, ut in æthiopico quodam, nigre, livide, quæ duæ posteriores pessimæ, in primis in dorso, manibus, pectore, pedibus, navibus, non nunquam & facie, quæ non semper funesta, interdum magnæ, interdum parvæ, pulicum morsibus similes, nullum tamen punctum in medio habentes, non nunquam sparsim, nonnunquam confertim milii solis & sudaminum instar, (aspidines miliacæ dictæ, quæ etiam male, per septem, octo, novem dies, conspiciendæ. Sed morbus hic tam varius ac multiplex fuerit, ut non tantum ætatis discrimine sævierit; verum etiam in omnes sporadicos morbos, si qui ægrum vexabant, sese transformaverit, ut aliquando tussim, sæpissime cataractum, aliquando colicam, podagram, pleuritidem, febrem tertianam, servando exactissime periodicam exacerbationem, tempore nempe apyrexie evanescentibus maculis, ingruente vero paroxysmo redeuntibus, mentita fuerit, quis quæso omnia symptomata, quibus hic morbus auctus & exacerbatus est, enarrare queat? Sufficiat ergo, hæc fideliter, prout in praxi mea observavi, annotasse. Morbus hic non nunquam cito, non nunquam tardius sua decurrebat tempora, ut etiam xxiv. dies, licet rarissime, funestus fuerit; die xii. ac xiii. ut plurimum graviora ac vehementiora erant symptomata, proindeque accuratius attendenda. Etsi vero in Hungaria frequenter est hic morbus, & quotannis observandus, grassari tamen vehementius more solito hoc anno cepit, ut ferme in solum contagium, corpora metu atque timore debilitata facilius corripiens, rejicere causam ausi fuerimus. Principium quidem huic morbo debere milites, utpote qui temperiem hujus regionis nec observantes, nec ferentes, sed vino nimium indulgentes in morbos inciderunt malignos, gregatim deinceps in contubernia arctiora con-

jecti non modo *commilitones*, verum etiam *inquilinos* contagione infecerunt, quæ latius serpendo & cundo tantas acquisivit vires, ut in *morbum epidemicum* degeneravit, & plures e medio sustulerit. *Anni tempestas* malum hoc insigniter fovebat, nempe ut plurimum *humidior*, cum *pluviis* copiosis & fere continuis, *nebulis* foetidissimis, creberrimi toto fere *Novembri*, & *Decembri*, quo tempore *petechiae* in homines gravius debacchari sunt. Etsi vero vehementia *frigoris* subsecuti mali huius vim sublatam aut minutam arbitrati sumus, tantum tamen absuit, ut cessaverit, ut potius ferme eandem noxam ac *vehementiam*, licet alter *mensis* præ altero fuerit *benignior*, exeruerit, in *ensem Junium* usque eam protraxerit, plures non modo *familiaris* cum ægris versantes, verum etiam *nullam plane consuetudinem* cum *infectis* habentes, & homines, qui ægrotos visitabant, fugientes, semperque domi quasi fixi hærentes, corripuerit, ut in ejusmodi homines ex sola *imaginatione* contagium manarit, correptosque sustulerit. *Remedium* præcipuum ac præsentissimum fuit *Vene sectio*, a qua & *curam* semper *ordiri*, eamque in *primis diebus* *repetere* debuimus. Quam primum vero *maculae* sese in conspectum dedere, quamvis plerique *auctorum*, & inter eos præcipuus NEUKRANZ *de purp.* id suadeant, penitus tamen *abstinendum* erat ab hoc alioquin præstantissimo remedio. *Purgantia*, quæ ad unum fere omnes admittunt scriptores, *Vomitoria*, etiam in *principio*, nullum hic invenire locum, imo omnes, quibus *Purgantia* exhibita sunt, *brevi post expirarunt*; eorum vero *exanthemata* semper apparebant *latiora*. Ex iis, qui *Vomitoria* assumpserunt, paucissimi, nempe ii solummodo, quorum *robur nature* adhuc erat *inconcussum*, evasere, in quibus & *citius* morbus sua decurrit tempora. *Expellentia*, *alexipharmaca*, *confortantia*, *cordialia*, *temperata*, v. gr. *spec. liberant. sal. volat. C. C. fixat. unicorn. mar. C. C. philos. prepar.* item *Emulsiones*, *mixture* ex *misbridatio*, *confecti. alchem.* & *aqua fumar.* inprimis tempore *continuarum vigiliarum* data, ac sequenti die *vesperi* iterata, quæ ad *somnum placidum* ægrotos disposuit, ac *deliria* mitigavit, *lap. bezoar. orient.* præcipue ubi *cordis anxietates* vehementer urgebant, qui *miraculosa* fere ratione eas statim sustulit, omnes hic *tulerunt punctum*. *Symptomatibus* ex proprio fonte erat succurrendum; e contrario *calida*

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

omnia, quæ majorem excitantur effervescentiam, vitanda. *Antimonium diaphoreticum* quoties fuit datum, fere semper excitavit *diarrhæam*; exhibitum vero in *febris malignis sine exanthematibus* rarius, facile tamen *terr. sigillat. vel misbridat.* sedata fuit. *Fœminis*, *affectibus hysteriis* obnoxiiis, *extract. castor.* præsentissimam tulit opem. *Vesicatoria* justo tempore applicata, non modo in *aphonia* sæpissime agrotis sermonem reddidere, verum etiam *ferociam deliriorum*, ac quasi *phrenisides* debellarunt *Opiatorum* usum, utpote in his *regionibus* merito suspectum, experiri nolui, *Topicis* quidem frequenter in *perpetuis vigiliis* & *capitis doloribus*, cum *successu* admiscui. Quod si jam ad *exuv* pervenit morbus, *sudoribus* probe elicitis tandem *spec. de gemm. frigid. de hyacinth.* cum *nitro* ordinavi, quorum usum, quo usque *penitus remisit calor*, continuavimus. *Confortantia*, *cordialia*, *balsama* in frequenti usu habui. *Restaurantia* *juscula* interdum & noctu aliquoties ægris exhibenda suavi, *vini ac cerevisie* usu omnes abstinere jussi, *aquam coctam* ex *rad. scorzon. C. C. & ras. ebor. sem. sænic. &c.* pro potu ordinario præscripsi. *Mutationem linteorum mundorum & indusorum* crebram, etsi permittat NEUKRANZ *de purp. p. 351.* semper tamen ego, ob rationes certas & experientia stabilitas, *dissuasi*. Viso jam *penitus morbo*, & *viribus* aliquantum jam redeuntibus, tandem ad *Purgantia* descendendi, quibus reliqui *excrementitii humores*, ne *recidiva* subsequeretur, cum *emolumento* agrotantium expellerentur. Hac ratione *quamplurimos* per Dei gratiam *pristinæ sanitati* restitui. Hæc, VIR, LECTIO-NE & EXPERIENTIA CELEBERRIME, sunt, quæ illis temporibus observavit, & bona fide de hoc morbi genere litteris consignavit *beatus Parens*. Hujus *paternæ* *industriæ monumenta* plura possideo, *gravissimo* Tuo *judicio*, una cum *meis rarioribus observationibus*, subjienda, & si Tibi ita visum fuerit, *publico bono* non invidenda. Nihil proinde avidius expecto, quam, quod sine Tua molestia fiat, Tuum de hoc instituto *consilium*. Si Tibi placuisse intellexero, affirmo Tibi, me existimaturum, mihi *gravitate judicii Tui*, & *conatus* meos *juvandi facilitate* id, quod maxime unquam cupierim, contigisse. Quod superest, Tibi CÆSAREÆ NOSTRÆ ACADEMIÆ spes fortunæ commendo, nihil dubitans, quin de hoc meo studio recte

N n n &

& benigne sis existimaturus. Dab. *Vienne*
die vii. Febr. A. S. R. clb lccccxxx.

Dn. D. Andree Loevv Historia Epidemica Hungariae, ann. 1688. 1697. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. ab ejusdem Filio Dn. D. Carolo Eriderico Loevv, Perillustri Luca Schroeckio, Academiae Nat. Curios. Praesidi, &c. ann. 1726. communicata.

ANni tempora, prout variant, suos habere morbos certos jam pridem lib. 3. Aphor. 21. recte annotasse Hippocr. praesente anno abunde confirmavit experientia. Scilicet mense Julii & Augusti cum caelum quasi flammasset caloribus, & pluviarum ferme toto illo tempore expers fuisset, quibus alias intemperies aëris sicca temperanda & corrigenda, Febres solito magis in hac urbe grassari ceperunt. Quarum principia cum horrore, vomitu, nausea ægrum occuparunt, subsequentibus statim caloribus, siti, dolore capitis, virium prostratione summa, cardialgia, ut plurimum dies noctesque durantibus, aut biduo post, adhibitis sudoriferis, in *intermittentes* ut plurimum febres, inodo *tertianas*, modo *quotidianas*, imo *quartanas*, per intervalla secundum suum typum repetentes, terminantibus. Tantam autem hæc febres benignitatem in se fovebant, ut raro administratis legitimo modo remediis, h. e. *V. S. Anti febrilibus ex Card. ben. absinth. centaur. min. lap. cancr. chinchin. arcan. dupl. flor. nitr.* aliisque, ultra ostiduum sese extenderint, quin penitus remiserint. Non senserunt has febres tantum provectionis ætatis homines, verum etiam infantes lactentes & ablactati sine ullo ætatis discrimine. In nonnullis deprehendebantur *continua*, dies noctesque ægrotos affligentes, & *V. S. sudoriferis ordinariis, nempe spec. de hyacinth. autim. diaph. spec. de gemm. frig. mixtura mea ordinaria &c. cum confortantibus junctis*, tractatz, omnes terminum suum elapso 15. dierum spatio benignissime absolventes. Hisce continuis annumeranda quoque fuit *Pemphix*, vulgo *Nessel. Kranckheit* dicta, tunc temporis grassata, quæ ægrotos, (qui quasi urticæ urentis vim essent experti,) excruciauit pruritu, tumore permagno variæ magnitudinis in toto corpore, modo imperialis, modo floreni, modo grossi, modo to-

tius cubiti, superficiem cutis occupante, eamque in vesicas non adeo rubras, sed magis albas attollente, mox redeunte, aliisque symptomatibus febres continuas malignas alias comitantibus. Quæ febris licet aliis temporibus *benignissima* adhibito sudorifero intra biduum remittere soleat; nunc tamen admodum *maligna* more continuarum sua decurrit tempora, propinatis autem *medicamentis diaphoreticis, expellentibus temperatis &c.* DEO benedicente apud omnes felicissime xv. die superata. Observavimus etiam, quod notatu dignum & perrarum, tunc temporis certam febrium speciem, quæ fuit *complicata ex febre quotidiana continua & tertiana*, una die binas habens exacerbationes, altera unicam, quam *Hemistriæum* appellare placuit. Fuit absque horrore, cum continuo calore, ingenti præcordiorum compressione, ut de continuis constrictionibus pectoris conquesti fuerint, siti inextinguibili, intensioribus tamen hisce tempore exacerbationis, cum vigiliis, deliriis, diarrhæis, in primis virium prostratione summa, ut semper animi deliquia metuenda fuerint. Febris hæc admodum periculosa continua ingentem reconditam habuit malignitatem; quapropter more aliarum febrium malignarum, v. gr. *V. S. sudoriferis, expellentibus, confortantibus mixtis, ordinariis*, ratione tamen habita symptomatum urgentium, tractata felicissime intra xxi. dies fuit subacta atque ejecta superstitite quidem adhuc aliquali pectoris compressione, *Laxativo* tamen medicamento sub finem exhibito, penitus sublata.

*Constitutio Epidemica Sempronienfis
Anni 1697.*

NON quivis annus quovis fovet morbos, multo minus una eademque symptomata. Prout anni variant tempora, aerisque tempestates, sic quoque morbi, qui nunc benigniores, nunc peiores, multorumque funerum non nunquam causæ existunt. Hoc jam dudum observavit, ac *recto libro III. Aphorismorum* nobis demonstravit maximus Græciæ Doctör, *Hippocrates*. Et quis non videt, diversum aëris statum humores modificare morbificos, eosque disponere, pro diversitate locorum aliarumque circumstantiarum, ad producenda symptomata, quandoque graviora, aliquando mitiora. Id videre licuit anno 1697. quo *hyemem rigidissimam* experti sumus. Produ-

xit intensissimum illud frigus non solum *varios pectoris morbos, catarrhos, coryzas, gravedines, tussesque vehementiores, & transpiratione impedita, lympham disposuit in coagulum pronam; adventante vere, liquatque macrocosmi humoribus, lympham hactenus torpida apud plurimos subiit mutationes; inde in quibusdam febres tertianæ subortæ, in plerisque febres continuæ, pleuritides spurie, malignitatis expertes, in plurimis, in primis sub finem Aprilis, Maii, Junii, Julii, quo tempore magis effestationes biliosæ ob excessivum calorem ambientem notabantur, febres petechiales Epidemicæ. Referam ex morbis, quos hoc anno perlustravi, solum præcipuos. Inceperunt petechiales more solito cum rigore, caloribus p. n. siti, anxietate præcordiorum, quandoque vomitu, doloribus capitis, in sueto artuum languore, sine causa manifesta, cum insigni extremorum lassitudine, ut plurimum quarta, aliquando septima demum die maculæ effloruerunt petechiales, in quibusdam copiosiores majoresque, in quibusdam minores ac parciore. Deliria sexto jam, septimo, octavo morbi die supervenientia, boni fuere ominis. In illis enim decima quarta vehemens notabatur obsurdescentia, & decima quinta caloris, adeoque morbi solutio. Si serius, v. gr. 10. 11. 12. contigerunt deliria, atrociora symptomata, nec non malignitatem prænuñciarunt summam, nullusque expectandus fuit motus criticus, sed paulatina solutio. Observavi hoc in quamplurimis in primis in Cive hujus loci primario, ex itinere sexta morbi die reduce. Septima, adhibito uno vel altero medicamento expellente, bezoardico, vidi corpus petechiis copiosissimis rubris conspersum, eodemque die notavi summam in somnum propensionem, vix non dispositionem lethargicam: Vesicatoria quippe aliquot applicata ægrum a somno abstrahere non valuerunt, & excitatus licet quandoque comederit; medicamenta expellente, sudorifera, epileptica, confortantia sedulo assumpserit, subito nihilominus in somnum recidit, salva manente respiratione; acceperunt 10. die deliria: excitatus enim ex suo profundo somno, & interrogatus minus apposite, minus ordinare respondit, desubito in somnum relabens. Die undecima & sequentibus supervenerunt motus convulsivi; diarrhææ involuntarius urinæ fluxus, summam, symptomata exitiosa. Decima quinta calores p. n. observavi*

longe remissiores, pulsus naturali similem, somnum autem adhuc profundum. Si exsuscitatus fuit patiens, neminem agnovit, torvis oculis vidit, ad interrogata mullitando, minus intelligenter respondit, flocos frequenter legere continuavit. Morbum igitur hunc in pessimis signis constitutum ex Hipp. Coac. nec non 2. Aphorif. 27. difficillimum ac periculi plenissimum pronunciaui. Decima septima demum die, suborta obauditione, ad se rediit, stupidus quidem & obliviosus, præteritorum immemor, vires tamen brevi resumpsit. Vidi in alio subiecto, eundem morbum in optimis signis constitutum, duodecima, rarioribus tunc temporis existentibus jam maculis petechialibus, produxisse pustulas miliares, parvas, albas, acuminatas, innumeras, excessivam sanguinis ebullitionem, nec non malignitatem latentem prodentes, & 15. die, prægressis vix momentaneis convulsionibus, funestas. Observavi, malum hoc fuisse epidemicum, nullumque ætatis habuisse discrimen, juvenes vero puerosque frequentius invasisse, ac contagium in domo delituisse, aut substituisse, donec in reliquos fere omnes sæviit. Qui valetudinis salutaris sue solliciti fuerunt, ac in tempore, spretis præposteris medicationibus, meam postularunt, ad unum omnes convalescerunt. Incepi, prævio unico sudorifero, pro ætatis diversitate prima & secunda jam die a V. S. in brachio, quam sequenti die pro rei exigentia in pede, ante exanthematum eruptionem, repetii Alexipharmaca, (malignitatis enim hic summa est habenda ratio.) sudorifera ex spec. de hyacinth. Liberant. Antimon. diaphor. C. C. philos. præpar. lap. bez. orient. mithridat. &c. mutatis mutandis, singulo octidiorio exhibui cum sudoris imperio. Quamprimum mentem adverti vacillantem, imminentis delirii prodromum, Vesicatoria, nuchæ pedibusque imponi jussi, addidique pulveribus sudoriferis confortantia, nec non epileptica, v. gr. pulv. epilept. March. unicorn. manif. specif. cephal. Mich. mag. ungu. alc. perl. &c. Nimiis vigiliis ac deliriis summis mixtura mea ex mithridatio cum conf. alkerm. pulv. epilept. de gemm. frig. aut analept. &c. Syrup. papav. in aqu. solut. ut plurimum vespere, & quidem cum fructu obviam veni, Alvi fluxum stypticis quandoque singulo trihorio aut quatrihorio exhibitis compescui: obstructionem enematis sustuli. Cum calores p. n. decrescere inceperunt, quod sæpissime sub initium decimi quinti diei con-

rigit, contentus fui solis pulveribus precipitantibus, v. gr. spec. de gemm. frig. Aufimon. analept. C. C. philos. fl. nitr. quotidie semel aut bis in usum vocatis. Vinum ac cerevisiam prohibui, concessique solum aquam ex ras. C. C. ebor. sem. fœnicul. rad. scorzon. collum. Reliquis symptomatibus ex suis fontibus prospexi. Sub initium quartæ septimanæ, appetitu jam redeunte, ne in priorem morbum reciderent, dedi *Laxativum*. Et hac methodo, DEO sint laudes, omnes petechiis etiam pessime decumbentes, excepta unica persona, servati sunt. Morbilli mense Junio, Julio, omnes fere pervaserunt domos, & observavi illos epidemicè grassatos, primis quatuor diebus ut plurimum gravissimos, apparente efflorescentia, quæ elapso quattriduo evanuit, levissimos. Quibus legitima adhibita fuere remedia, expellentia nempe, sudorifera, v. gr. pulv. alexit. lap. bez. C. C. philos. unicorn. mar. omnes stando quasi ac deambulando tractati, etiam convaluerunt, elapsis aliquot septimanis morbum evaserunt. Qui in cura sunt neglecti, aut mamani, aut in febrem inciderunt exanthematicam, (quam *Rossariam* nominare solemus, & consistit in maculis rubris, latissimis, in toto corpore densissimis, erysipelas quasi universales referentibus, post quartum diem evanescentibus, & squammularum instar decidentibus, cum ægri alleviatione), cum caloribus continuïs, sibi magna, aliquando deliriis, nemini exitiosam aut reportarunt tumorem fluctuentum totius corporis, permultis funestum. Notavi simul, quando unus aut duo in domo morbillos superarunt, decimo demum quarto aut quinto alios ejusdem domus in ægotantium locum successisse, adeoque morbillosum contagium serpiens a 14. in 14. delituisse ac substituisse. Mense Junio, Julio, frequens fuit *Iderus*, cum aliquali alteratione, appetitu dejecto, nausea, siti, oris, amaritudine, deturpato curis, inprimis oculorum, colore, pruritu, urinis croceis, cerevisiæ brunaceæ similibus, turbidis, excrementis quandoque flavis, copiosis, sæpissime albis, cinericiis. Obstructionem ductus choledochi referavi, bilemque in massam sanguineam, ac in habitum corporis jam derivatam reduxi, ejusque acrimoniam salino-sulphuream excessivam correxi aperiensibus salibus ex pulv. hepat. Tart. Vitriolato, sal. e. cichor. acetosoll. additis granis aliquot diargydit. Instar omnium fuerunt acidulo *Cretica*, quibus bilem sufficienter dilui,

atque felicissime spatio 2. aut 3. hebdomadarum ictericos restitui. Præter *hydropes*, *calculos*, *podagram*, *arthritis* &c. tempore autumnali more solito, *Quartana* prodit contumacissima, quam, si *Vene* sectione, purgatione, diebus paroxysmorum instituta, nec non medicamentis Antisebrilibus chinatis ter aut quater exhibitis infringere nequivi, reliqui intactam, optime gnarus, multitudine atque frequentia medicamentorum facile ad *Cachexiam* ac *hydropem* disponi, adeoque magis destrui. *Natura* igitur opus hoc commisi, atque expectavi æquinoctium vernale, quo tempore natura, uno vel altero medicamento adjuncta, quandoque per se sebre hanc felicissime subigere solet.

Constitutio Epidemica Sempronienſis
Anni 1699.

DE Japonibus scribit *Vuylhelmus ten Rhyno*, *Dissert. de Arbrit. in suis notis*, p. m. 92. quod quidem pestem ignorent, variolas tamen timeant, cum ipsis maxime sint contagiosæ, atque sæva & multiplici hominum strage illorum terras depopulentur, ut major etiam mortalium pars his in Japonia aliquando succumbat, quam peste alibi, atque idcirco præ labis istius metu, parentes liberos, mariti uxores, & quæcunque dulcia sunt vel sanguinis vel thori pignora, relinquunt. Unde Japonæ & Sinae liberis dotati, ubi interrogantur, quot soboles alant? Fregerunt totidem, quot variolis jam laborarunt; reliquorum enim vitam in ancipiti locant, adeoque inter permanentes proles non numerant. Idem responsum fere a nobis hoc anno nonagesimo nono tulissent Curiosi, si ex uno alterove quæsisissent, quot filios, aut filias habeat? Tot nempe, quot jam variolarum virulentiam superarant. Etli enim apud nos *Variolæ* non adeo aliquando, observantur funestæ, hæc tamen hyeme australi, tepidiori ac humidiori plus minus existente, illæ, pestis instar, in infantes & adultiores furere cœperunt, eosque pro diversitate tempestatum, magisve vel minus maligni ætheris, nec non humorum in corpore existentium, varie affecerunt. Inceperunt modo cum horrore, quem excepit calor intensus, pulsus fortis, oculi turbidi, sitis intensa, aliquando jactatio inquieta, sternutatio frequens; non nunquam jam primo aut secundo ebullitionis die apparuit una vel altera pustula in facie, dorso, ut plurimum vero sub finem

tertiū, aut quarti diei eruperunt *variole*, primum rubræ, exiles, rotundæ, figura nempe, colore & magnitudine regulari, cum febris symptomatumque, etiam si hætenus fuerint gravissima, atque nervoso generi periculosissima, remissione, aut notabili diminutione. Hæ turgidæ maturuerunt brevi, justoque tempore exaruerunt jam incrustatæ. In quibusdam subiectis pustulæ fuerunt admodum raræ, solito tamen majores, hinc inde sparsæ, valde discretæ, ita quidem, ut iisdem affecti in lecto vix contineri potuerint, quin deambulare voluerint, si ipsis concessum fuisset, quæ variolæ mitissimæ ac benignissimæ fuerunt. *Diarrhæa hæmorrhagia narium*, diebus ebullitionis suborta omnibus saluti fuit, detracta nempe nimium quantum ebullientis ac æstuantis sanguinis, nec non semini variolosi parte, quod reliquum fuit variolosum fermentum facilius, in primis jam laxatis venarum spatiis, evolvi, digeri, expellique potuit, & in his *variolas* observavimus discretas, raras, *benignissimas*, saltem hinc inde sparsas. Qualis enim status humorum ebullientium in corpore, in primis in centro, talis quoque se exseruit & effloruit in extremis, habitu corporis: unde quo pejor materia ebulliens, eo periculosiores & deteriores variolæ. Sic spiritus quandoque a miasmate varioloso irritatos magis, quam oppressos observavimus, qui magno sæpe conamine quiescencias suas ad cutem amandarunt, serumque virulentum repurgarunt felici eventu, tuberculis tam magnitudine, quam colore & figura regularibus enatis. Notavimus e contra spiritus a miasmate hoc varioloso diebus jam ebullitionis obrutos ac fere oppressos, ut amplius sese sufficienter expandere nequiverint, multo minus inquinamenta variolosa excutere potuerint. Remansit ergo miasma virulentum in massa sanguinea, quam ad coagulum disposuit. Tangebatur quidem cuticula rubedine quasi erysipelacea, ac tumore afficiebatur, nulla tamen aut fere perpauca apparere variolarum vestigia, potius loco harum tertia jam die maculæ in facie, dorso, naribus, pedibus, manibus, effloruerunt purpureæ, quæ exacte morsus pulicum aliquo modo obsoletos repræsentarunt, copiosæ, aut diebus ebullitionis, quarta nempe, antequam ulla adhuc comparuit pustula, aut ante plenam & sufficientem variolarum eruptionem, quæ semper manserunt parvæ, sessiles, depressæ, confluentes, duræ, septi-

ma die lethales. Observabatur in his pulsus debilis, catarrhus suffocativus, ob nervos affectos, insultus epileptici, subultus tendinum, deliria, maculæ purpureæ, latissimæ, ac nigredinem spatio aliquot horarum tendentes, ante, aut post mortem largissimum sanguinis per alvum profluvium. Certissima sane summæ inflammationis in sanguinea latentis, nec non instantis sphaceli, adeoque indubiæ mortis indicia. Unam habui virginem octennem, in qua maculæ hæ purpureæ jam disparuerunt, ut aliqualem reconvalescentiæ spem nobis fecerint; tempore maturationis variolæ confluentes, imprimis in facie, manserunt sessiles, depressæ, duræ, cartilaginossæ quasi, cutis ipsa erysipelate fuit affecta, & intensa rubedine tincta, tumida, symptomata novis accessionibus febrilibus fuerunt exacerbata, quæ tandem xv. die funesto terminarunt eventu. Unicum habui puerulum 7. annorum, ejusmodi maculis purpureis una cum variolis correptum, qui hæmorrhagia narium copiosa quarta die suborta a periculossimo atque exitiali hoc malo liberatus fuit. Reliqui omnes his *petechiis purpureis* laborantes, etiam si ex methodo medendi ordinaria & optima, *expellentibus* nempe, *sudoriferis*, *alexipharmacis*, *bezoardicis*, *confortantibus*, *neruinis*, *antepilepticis*, v. gr. *spec. liberant. de hyacinth. pulv. pannon. lap. bez. orient. pulv. epilept. C. C. philos. unicorn. mar. diascord. Frac. misbrid. conf. alchem. &c.* tractati fuerint, mortui sunt. Sine dubio a veneno varioloso pestifero sanguinis compages nimis fuit soluta & jam in fluorem conversa, in primis serum acre, virulentum redditum, atque dispositum non solum visceribus, sed & partibus externis, mediante efflorescentia, necrosin induxit funestam. Neque *gravida*, licet alias naturæ consilio a morbis epidemics immuniores sint, quam alii, ab hoc variolarum contagio suere immunes, imo decubuerunt pessime hæ semper sexta aut septima die *abortum* passæ sunt cum magna *Uteri hæmorrhagia*. *Variola malignæ* ut plurimum inceperunt cum *lumborum & abdominis doloribus*, qui si cum erupturientibus jam pustularum notis remiserunt, *boni*, sin minus, *mali* fuerunt ominis, ut plurimum enim in his variolæ aut non sufficienter eruperunt, aut, si prodierunt, confluerunt, & tempore maturationis depressæ manserunt, sæpe resugerunt & in sauces gulamque copiosæ incubuerunt, *catarrhumque lethalem*, imprimis circa mor-

bi statum, induxerunt. In permultis salivationem in eruptione, & post eruptionem observavimus copiosam, qualis a mercurio absumpto oriri solet. *Diarrhœa* diebus maturationis oborta, *peffima* fuit, natura enim jam debilitata, & in negotio maturationis impedita, deducendo aliorum materiam variolosam succumbere debuit, variolis nempe non bene maturatis, quin potius collapsis, aut *catarrhus*, aut *convulsiones* supervenerunt funestæ. Respiratio anxiosa, interrupta, vel sublimis, imprimis in morbi statu semper fuit convulsiva, & indubitatum signum malignitatis, quæ nullis medicamentis expelli potuit, quin potius humores in suo motu impedivit, atque sic lethalitatem intulit. Observavi in filiolo trium annorum, tempore eruptionis, die tertia & quarta morbi, summam extremorum, pedum nempe, manuum ad carpum usque, nasi refrigerationem, sine ullo sudore, cum pulsu debili calorem vero in reliquo corpore sufficientem ac præternaturalem. Metui sanguinis recursum, caloris languorem, & necrosim imminuentem, adeoque frigus hoc brevi fore morticinum, in primis materia variolosa in centro retenta minusque expulsa, exhibitis tandem *expellentibus* variis, *brzoardicis*, nec non *linetis calide applicatis*, spatio bidui rediit ad extrema calor, variolæque prodierunt copiosissimæ cum summa symptomatum alleviatione, & maturatis tandem variolis, vitæ conservatione. *Mense Aprili, Majo* notabantur *morbilli*, qui, si ex methodo tractati fuerunt, sudorque successit ex voto, in omnibus *benigni*, neque efflorescentia inflammatoria diutius mansit, quam per quadriduum; quo tempore una cum maculis squammarum ad instar deciduis, calor cessavit penitus. Observavi autem in quibusdam morbillosam hanc inflammationem effloruisse in dorso & facie ad instar herpetis, cum pustulis splendentibus, mox in rubedinem morbillosam ordinariam variæ figuræ abeuntibus. Fuerunt exanthemata hæc morbillosa mali moris, adeoque in cura probe attendenda, & *expellentibus*, *sudoriferis*, *alexipharmacis* sedulo tractanda. *Mense Aprili, Majo, Junio* frequentes fuerunt *febres petechiales malignæ*, quæ invaserunt cum horrore levi, nec manifesta sanguinis æstuatione, sed calore mitiori, quem æris injuriis adscripserint ægroti; neque crediderunt se ægrotare, donec calor, hæcenus effectum suum occultans, ingrave-

scere viresque vacillare cœperint, ut jam ægroti decumbere coacti fuerint, magno cum damno suo tandiu contranitentes. Accessit anxietas præcordiorum, sitis immanis, capitis dolor, vigilæ, scabrities, deliria, aliaque symptomata. Qui ab initio *Vene sectiones* admiserunt, medentumque opem implorarunt, atque dicto præscriptove audientes fuerunt, evaserunt omnes; qui vero neglexerunt curam, eamque demum die VI. aut VII. inchoare voluerunt, ii plerumque die XIII. XIV. XV. XVIII. XIX. mortui sunt. Quicumque à *Purgantibus* credentes vitium hæere in Ventriculo, curam inceperunt, ad unum omnes decesserunt, & in illis maculæ observatæ sunt longe majores ac latiores. Qui sudare ad variæ assumpta *alexipharmaca*, *diaphoretica*, *expellentia* in incremento & progressu morbi non potuerunt, etiamsi bene ac perite, alias tractati fuerint, mortui præcesserunt *sudores spontanei*, copiosissimi, resolutivi. *Subsultus tendinum* in tangendo pulsu in statu morbi notatus semper *exitialis* fuit. *Convulsiones epilepticae*, in primis distorsiones in ore & fronte variæ, *funestissime*. *Sensûs hebetior*, si nempe ægroti se non laborare, sed optime valere dixerunt, *manus tremulæ*, *respiratio difficilis ac frequens*, *difficillima citra faucium tumorem deglutitio*, *inevitabilem prænuntiavit mortem*. *Maculæ quo tardiores in efflorescentia, eo pejores*, apud quos die demum septima, aut nona, prodierunt, ut plurimum observabantur funestæ, secus, si jam quarta eruperunt. Eadem ex rubro colore tendentes in lividum, nigrum, extremam sanguinis corruptionem indicant. Circa *Solstitium, mense Junio*, morbus hic fuit *peffimus multisque exitialis*. Causa hujus febris petechialis malignæ, cum calor sæpe, in primis in initio, non adeo savus fuerit in prava & maligna indole querenda fuit, quæ citra insignem calorem vi sua corrodebat partes corporis fluidas & solidas corripit, dissolvit, destruxit, ac violentia sæpe materiam expulit, modo *per alvum*, crisi imperfecta ac funesta, modo *per insensibilem transpirationem*, ubi ægroti, in primis sub finem, sudoribus fere disfluxerunt, qui fuerunt resolutivi, peffimi. Sanguinem igitur ac serum in hoc morbo coagulati ac incrassati, sæpissime ex sale corrodebat maligno summam contrahere acrimoniam, ex symptomatibus abunde claret.

*Constitutio Epidemica Sempronienſis
Anni 1700.*

HOc anno inſueta fere fuit aëris intemperies. Menſe Januario, Februario temperatum frigus extitit; menſe Martio, nec non Aprili fere toto tempeſtas nivibus & gelu ſæviit, quo tempore graſſari cœperunt febres continuæ exanthematicæ, ſolis confortantibus, blandiſſimis diaphoreticis remixtis, tractandæ. Etenim, qui more ſolito aſſumpſerunt & continuaverunt ſudoriſera, ex ſpec. de hyacinth. Liberant. Antimon. diaph. & volat. C. C. mitridat. illi omnes, viribus xinde exhaustis, & convuſſionibus ſubortis migrarunt ad ſuperos; qui vero in principio tractati ſunt *Venæ ſectiōe*, deinde blandioribus diaphoreticis, ut plurimum tamen confortantibus & epilepticis, v. gr. pulv. epilept. M. ſpecif. cephal. pulv. analept. mag. gran. kerm. perlar. C. C. unicorn. mar. convaluere omnes. Calores non adeo intensi fuerunt, debilitates vero ſummæ cum vigiliis, ſudoribus ſpontaneis, pulſu celeri, frequenti, tremoribus, nec non motibus convuſſivis. Menſe Junio, Julio plures pluvioſæ notabantur dies, quam ſerenæ; menſis Auguſtus & medius September fuere ſereniſſimi, calidiſſimi. Reliquo medio Septembri & toto menſe Octobri tanta pluviarum fuit frequentia, ut poſt hominum memoriam his menſibus viſæ non fuerint crebriores. Si enim de die non pluit, certe nocte pluit, imo poſt 14. dies pluvioſos vix duo ſereni apparuerunt, quos ſtatim pluviz exceperunt continuæ. Per has igitur inſuetas anni conſtitutiones ſævierunt, Tuſſes, rheumatismi, febres, in primis quartanæ, quæ in vicinis noſtris locis fuerunt epidemicæ, apoplexiæ ipſæ; apud infantes frequentes fuerunt variolæ erraticæ. Senes experti ſunt debilitates ſummas inſtar febrium continuarum, ſed benignarum, recurrentes, quæ ſolis confortantibus medicamentis ceſſerunt.

*Conſtitutio Epidemica Sempronienſis
Anni 1701.*

ANnus ineuntis hujus ſæculi incepit eadem inſtantia, qua ultimus annus ſæculum finivit. Januario quippe & Februario frigora uno vel altero die notabantur intenſa, tertio vel quarto valde remiſſa, unde ex inſuetis his anni mutationibus ortæ ſunt deſluxiones bilioſæ in brachiis, oſſe iſcbii, pedibus, ſummæ dolorificæ, utrique

ſexui inſeſtæ. Rheumatismi hi bilioſi ſudoriſeris neutiquam tractari debuerunt, utpote quorum uſu dolores ſemper exacerbati, ſunt, meliori vero ſucceſſu *digestivis ex ſalibus*, v. gr. pulv. hepat. rubr. & cichor. acetofell. Sal. tart. vitriolat. diagryd. ſulphurat. quotidie adhibitis obtemperarunt, & intra xxiv. dies evanuerunt. Martius fuit valde benignus, Aprilis vero & medius menſis Maii ob frigora infantibus funeſtus, hi nempe valde inſeſtabantur Vomitis, catarrho ſuſſocativo, colicis convuſſivis, epilepticis. In Junio nil occurrebat notatu dignum, niſi quod mane hoc & præterito menſe rorem in foliis arborum, in primis prunorum, inſtar mellis, noſtrates vocant *Honigthau*, eumque fructiferum indicare annum credunt, copioſum obſervaverimus. Julius totus exæſtuavit, niſi febres tertianas, (quæ ſexto paroxyſmo abierunt,) & in ſenibus, adultis ac infantibus puſtulas, ſive exanthematica miliaria, quæ occuparunt, totum corpus cum moleſtiſſimo pruritu. Cauſa ſine dubio quærenda in efferationibus bilioſis, in primis lymphæ ab externo calore valde intenſo evocata, ſed facile refrigerationibus, v. gr. ſpec. de gemm. frig. ſt. nitr. lap. cancr. &c. & balneis hordeaceis repreſſa ac contempta. Toto menſe Auguſto calores fuere intenſiſſimi, pluviz pauciſſimæ, ſere nullæ, noctes ſimul calidæ. Jam valde graſſari cœperunt febres cum frigore duarum, aliquando trium horarum, inſecutus eſt ſtatim calor ultra 40. horas durans cum capitis dolore, ſiti, virium proſtratione, linguæ ac faucium ariditate, vigiliis, quandoque deliriis, ut juraffes febrem imminere continuam, ſed poſt adhibita ſudoriſera, *Venæ ſectiōem*, remiſit calor atque in intermittentem febrem, ita tamen, ut vix aliquot horæ inter paroxyſmum & apyrexiam interjectæ fuerint; & ſic una febris exceperit alteram, aſſixitque diu inſirmos; rariſſime enim ante nonum paroxyſmum terminavit. Si *Venæ ſectiōe*, diaphoreticis & præcipitantibus, cum malignitate non caruerit, rite tractabatur, nulli ſunt funeſta. Febres hæ maxime ſævierunt menſe Septembri, quem obſervavimus calidiſſimum, ſiccifiſſimum, ſine ullis pulviis. Menſis Octobris incepit cum pluviis, quæ per aliquot durarunt dies, inſequentibus mox caloribus inſuetis, ac vix poſt hominum memoriam notatis. Continuaverunt æſtuoſiſſimi dies per Novembrem fere totum, ita, ut nullus

senum tantæ æstatis & autumnus calidi & constantis recordari potuerit, unde optimum & generosissimum crevit vinum, quod tamen successu temporis minus generosum evasit. *Morbi* fuere pauci, iique ut plurimum ordinarii. *Sub finem Decembris* exasperatum fuit cælum, & terra frigore obriguit.

*Constitutio Epidemica Sempronensis
Anni 1702.*

HAC hyeme permutata quasi videbantur tempora. Frigora intensa solum durarunt ad sextum *Januarii* diem, septimo supervenerunt pluvie, subsequenter diebus nebulæ, cælum turbidum, mox serena, calida tempora. Toto *Februario*, exceptis vehementissimis ventis, eadem fuit cæli facies, nullum frigus, nullæ nives, ut plurimum siccitas, serenitas, ut credidisses imminere æstatem; nocturno quidem & matutino tempore quandoque aura observabatur frigidiuscula, sole tamen oriente statim fuit temperata, unde jam medio *Februarii* habuimus flores violarum, nec non flores cerasorum acidorum. *Morbi* his mensibus, præter catarrhos frequentes, vix notabantur alii. *Martius*, qui insecutus est, fuit siccus, quandoque ventosus, pluvie, quæ oboriebantur, fuerunt temperatæ, fertiles. Hujus initium *phthificis, helicis, hydropicis* valde fuit funestum. Circa æquinoctium vernale inceptum copiosæ inter pueros grassari febres continuæ, ut plurimum malignæ, petechiales. Invaserunt illos levissimo rigore, lassitudine spontanea, succedente calore non adeo magno, subinde remittente, sed tertio aut quarto die vehementius recurrente, quo ut plurimum in conspectum venerunt exanthemata, deliria brevi post comparuerunt, in quibusdam vehementia, & quidem cum vigiliis, in quibusdam breviora, maculæ erant parvæ instar morsus pulicum. *Febres hæ epidemicæ diaphoreticis, præcipitantibus & confortantibus temperatis, non sudoriferis fortioribus, tractatæ, nulli fuerunt sanestæ, sed valde contagiosæ.* In adultioribus, utpote viris, maculæ, ut plurimum observavimus latas, successerunt statim deliria, convulsiones, epilepsiæ, & his fere omnibus decima tertia dies fuit exitialis. Duravit epidemica hæc lues in *Junium* usque, quæ sine dubio magnis siccitatibus cum Hippocr. 3. Aphor. 7. adscribenda. *Aprilis* plerumque fuit serenus, calidus, subinde ventosus, frigidus. Hunc excepit Ma-

jus frigore quidem moderato, sæpe tamen, præsertim Borea interspirante, rigidiusculo: fuit variabilis, nunc calidus, nunc turbidus, pluviosus, mox frigidus, ventosus, unde vitis justo tardius & inæqualiter gemmas suas protrudit. Frequentes hoc mense fuerunt *arthritis vage*, quæ solo reiterato *Laxantium*, minus *suboriferum*, usu tractari voluerunt. *Julius* fuit valde temperatus calidus, ut & *Augustus*, si exceperis imbro & tonitrua horrendo fragore & fulguribus, in primis noctu, mense *Augusto* frequentia, & grandinibus insolitis, quæ aliquoties præsertim die 12. 13. 18. promontoria nostra fere omnia, & quidem optima, valde destruxerunt remixta. Fructus omnes horæi valde fuere insipidi, humidi, & ad putredinem proclives. Unde frequentes habuimus febres, primo intuitu continuas mentientes, adhibita tamen *Vene sectione & sudoriferis*, tertio & quarto die in intermittentes tertianas degenerantes, tandem præcipitantibus & laxativo brevi consopitas. *September* comparuit uno alterove die serenus & amœnus, tertius & quartus serenum diei cælum noctu tempestuoso tonitru & fulguribus terribilibus sædarunt. Sequentes dies mox sereni, mox turbidi, pluviosi, aliquando frigidi, in primis noctu, & notavimus circa festum Matthæi bis pruinas, sed plane innocuas. Hoc mense habuimus *Diarrhæas, dysenterias*, quibus adhibitis *rhubarbaro tosto cum myrobalanis, & dein adstringentibus ex corall. fl. ferr. cum misbrida*, cito medebamur. *Octobris* quatuor dies initiales fuerunt sereni, amœni, calidi, his quadriiduum successit frigidum, ventosum, imbridum, nivolum, autumnus præludium, octava mane gelu & pruina nocentissima folia ac uvæ nondum maturas in omnibus fere promontoriis decoxerunt, & millena damna fecerunt. Jam remittere cœpit frigus, & cælum ad aliquot dies inclauit. Circa medium mensis fere octo turbidi, nebulosi, solis expertes, notabantur dies. Tandem circa 20. exortis ventis, nebulisque discussis cæli facies mutari cœpit, æstasque in autumno constans comparuit. Fuit enim ab hoc tempore usque ad sextum *Novembrem* serenitas, cum frigida tamen aura matutina. Septima tota die pluit, octava nix cecidit ingens; successit horridum gelu octiduum fere durans, quod & botros in copia adhuc in promontoriis existentes vix non in lapides convertit. Medio *Novembris* amœnior aura com-

pa-

paruit, caloreque fortiori nives uvasque glacie adstrictas solvit. Hoc tempore frequentes fuerunt *febres*, quæ nullum servarunt typum, quin potius *febres malignas* mentitæ sunt. Invalerunt cum horrore caloribus primis diebus fere continuis, summo virium languore, capitis dolore, siti, oris amarore, siccitate linguæ. Adhibitis *Vene sectione & sudoriferis blandis*, tertia vel quarta jam die terminarunt in *intermittentes*; quarum paroxysmos *arcano duplicato, sale Card. Ben. cort. chin. de chin.* ac tandem *levi laxativo* suppressimus. In his notatu dignum fuit, quod, etiamsi valde post febres comederunt, vires tamen per longum temporis spatium recuperare nequiverint. His mensibus copiose grassari cœperunt inter pueros & puellas *variole*, quæ observantur modo *benigne*, modo *maligne* confluentes, depressæ, adhibitis *blandis diaphoreticis*, sanguinem contemperantibus, verbi gratia *pulv. alexit. C. C. philos. pulv. epilept. spec. de hyacinth. unicorn. mar.* aliquando, si exire noluerunt, addito *sale volat. C. C.* nec non *lap. bezoar*, nulli funestæ. Accuratam insuper symptomatum rationem habere debuimus. Sic accidit, ut puerulus V. annorum ex variolis malignis convalescens *gingivis superioribus* reportaverit *ulcusculum*, quæ primo intuitu ab adstantibus pro *aphthis*, *Mundsaule*, judicata & tractata sunt, elapso 24. horarum spatio corrosivitate sua magnam jam maxillæ superioris & inferioris occuparunt partem cum summo fœtore & nigredine, maximoque imminenti *sphaceli* periculo. Adhibuimus frequentiores *injectiones ex decoct. rad. aristoloch. iridis flor. mastiche, thure, mundificantiâ, balsamica, v. gr. elix. Propr. sine acido, bals. peruv.* quibus tandem corrosivitas, fœtor, nigredo recessit, & puerulus pristinae sanitati restitutus est. Taceo, *catarrhos, reumatismos* mense *Novembris & Decembris* frequentes. Sine dubio morbi hi ut plurimum ex lymphâ a varia aëris anomalia, nec non erroribus diætæ, v. gr. fructibus horâis hoc anno valde putridis, viscedinem & spissitatem disposita, quæ in sanguine coacervata eundem in tumultuarios motus concitavit, deducendi.

Constitutio Epidemica Sempromiensis.
Anni 1703.

A Nni hujus principium aura temperationi, nivibus stipata illuxit, paulo post
Supplem. ad Sydenham Tom. II.

successit frigus intensum, quod brevi remissit, & in pluvias abiit. *Februarius* gelu sævit ingens, nivesque ceciderunt sapissime, mox tamen accedente aura calidiuscula in liquorem solutæ. *Martius* comparuit caloribus amœnissimus, siccus, quandoque tamen interveniente Euro, rigidus. *Aprilis* simul præter morem siccus fuit. Habuimus his mensibus ventos vehementes, nives copiosas, quæ terram liquore balsamico sufficienter irrigare potuerunt. *Majus & Junius* fuere æstuosissimi cum paucissimis pluviis; unde uvæ circa festum Viti jam fere defloruerunt omnes. Hoc semestri notavimus *febres continuas*, non adeo frequentes, nec malignas, sine dubio, ob vinum nimis leve ac tartareum, quod præterito crevit anno, diureticum, minus sanguinem accendens. *Variolas* habuimus in copia, modo *benignas*, plerumque *malignas*, sessiles, depressas, quæ tamen si rite *bezoardicis temperatis, expellentibus, confortantibus, v. gr. pulv. alexit. sep. de hyacinth. antimon. diaph. C. C. philos. præp. pulv. epilept. lap. bezoar. orient. unicorn. mar. misbridat. &c.* tractatæ sunt, paucissimis, imo fere nullis funestæ. Et licet plurima tum temporis conspicerentur puerilia funera, causa tamen mortis magis adstantium incuriæ & negligentia, aut medicastorum præpostera ac perversa curæ & imperitiæ, quam malignitati adscribenda. Notatu dignum fuit, me his temporibus inter alios habuisse Comitissam valde sanguineam, corpulentam, jam fere quadragenariam, variolis correptam. Huic sub prima morbi invasione, quæ erat cum rigore, caloribus, cordis compressione, virium languore &c. curavi aperiri *medianam*, præscripsi *bezoardicos expellentes pulveres* more solito, *pulv. alexit. C. C. philos. lap. bez. orient. unicorn. mar. &c.* & ecce præter omnium expectationem tertia & quarta die erupere per totum corpus *variole* copiosissimæ, sexta accessit *immodicus mensium fluxus* ad instar puerperæ, retrocesserunt illico variolæ, quæ absque hoc fuere depressæ, sessiles, confluentes, verbo, pessimi moris. Mutavi medicamenta, dedi frequenter *spec. de hyacinth. corall. rubr. terr. sigill. misbridat. mag. smaragd. pulv. epilept. M.* non omisis *confortantibus*. Fluxus hic immoderatus continuavit ostiduum, nec *stypticis* sisti potuit: durante fluxu variolæ non creverunt, nec ad maturitatem tendere voluerunt, sed confluerunt, majoraque conciliarunt symptomata, etiamsi *expellen-*
O o o *tia-*

zia, bezardica antepileptica stypticis semper consideratissime miscuerimus; octiduo elapso fluxuque cohibito tandem parvulæ hæ variorum, non fastigatæ, maturitatem receperunt, symptomata remiserunt, & Illustrissima Comitissa a varioloso hoc affectu, periculi pleno, præter omnium opinionem ac spem, liberata est. Variolæ hæ permultorum oculis valde fuerunt infestæ, & modo inflammationem reliquerunt pertinacem, modo tumorem deposuerunt contumacem, ac coagulationi vel condensationi aptum. Priori feliciter medebamur aquis aphtalmicis ex aqu. plantag. rosar. chelid. tur. præp. sacch. saturn. posteriori inflatione pulveris subtilissim. ex sacch. canariens. antim. crud. lap. scissil. præp. perl. præp. & si opus fuit, Vescicatoriis. His mensibus varios atque diversos notavimus hæmopticos, tam senes, quam juvenes; in quibusdam enim sanguis ad os & Alarum ad aliquot libras sine ulla progressu tussi excretus est, & in his fere nulla adsuit irritatio, sed sanguis floridus lubricavit sibi ipsi viam, & unica irruptione extravasatus per os affectavit exitum; in quibusdam quasi extussiendo sanguis pedetentim reiectus est, in his sine dubio vasa pulmonum fuerunt erosa, & salinæ particule massæ sanguineæ inexistentes teneras pulmonum vesiculas stimularunt, inde irritatione, facta tussis producta fuit cruenta. His feliciter subvenimus Vena sectione & medicamentis adstringentibus ex compos. sporniol. Cr. lap. hæmatis. ocul. cancer. trochisc. de spod. de corbe, addito laudano de tribus in refracta dosi. Si sanguis fuit sedatus, ordinavi pectoralia traumatica cum resolutivis mixta, v. gr. elix. pectorale cum ess. traumatica, nec non decoct. pector. ex fl. & fruct. pector. usitat. item gelatinam pectoral. ex rasur. C. C. ebor. cum herbis pectoral. factam, it. decocta ex herb. alchymilk. scabios. pyrol. sanicul. millesol. suffilag. pulmonar.heder. terrest. rad. tormentil. sem. anis. fœnic. rad. chin. &c. Mense Junio ex caloribus insolitis, nec non ingurgitatione aquæ frequentiori adultiores æque ac juvenes reportarunt febres tertianas frequentes, sed sumptis salibus absint. centaur. min. card. ben. cort. peruv. ac tandem purgante brevi curatas. Julius non tam amœnus & serenus fuit, quam pluviosus, nocte dieque frigidus, ventis summe molestus, qui in primis a die quarto ad octavum valde favierunt, & frumento, quod violentia sua excusserunt, quam maximum intulerunt damnum; circa 24. ad finem usque cali-

diffimi notabantur dies. Augustus incepit cum frigore pluviis, quæ hoc mense fuerunt copiosæ, stante tamen austro suos alternavit dies, fuitque variabilis & inconstans. September exstitit serenissimus, amœnissimus cum insolito aeris fervore, quandoque pluviis intemperiem solis contemperantibus atque terram irrigantibus. Octobris primi octo dies fuerunt pluviosi, frigidi simul, hoc tamen non obstante, tertia & sexta die observavimus tonitrua & fulgura, elapso octiduo cessarunt pluvie, & subsolanus superveniens radiis solaribus non solum terram madidam siccavit, sed & bottos a nimis pluviis jam putrefactos valde exsicavit, illosque in pulveres fere redegit. Toto Novembris, nec non Decembris mense cœli temperies notabatur placidissima, ut credidisses verum adesse tempus. Circa natalitia intensum frigus ingruit, terraque congelavit. Frequentes hoc semestre biliosus notavimus febres, quæ cum rigore, mox caloribus, vomitibus, præcordiorum angustis pueros æque ac adultos invaserunt, primoque intuitu continuas mentitæ sunt. Duravit calor ut plurimum 40. horas cum dolore capitis, siti vehementi, ariditate lingue ac faucium, adhibitis vero Vena sectione, diaphoreticis, remisit, & in ordinariam tertianam cum apyrexia degeneravit, atque antifebrilibus salibus, nec non chinatis rite tractata sexto paroxysmo cessavit. Memini, me plurimos habisse, qui octavum sustinerunt paroxysmum, & hi ex febre reportarunt icterum. Calor hic non adeo flavus, sed saturatior & fuscus fuit, sine dubio a particulis acribus, biliosis, sulphureis, quæ copiosius in sanguine collectæ tandem in habitum corporis sese diffuderunt, cutemque deturpato imbuerunt colore. Alvus in his omnibus sufficienter suoungebatur officio, porum choledochum in duodeni & jejuni confinio non fuisse obstructum. His feliciter, & quidem intra paucos dies medebamur pulveribus ex sale cicchor. arcan. dupl. aut tart. Virriolat. spir. salis coagul. pulv. hepat. additis non nunquam aliquot granis diagryd. sulphurati. Verissimum itaque est Dioclis monitum, notante Celso, prodesse nempe icterum, si post febrem oritur. His temporibus aliquos notavi cachecticos, nec non hydropicos, qui in icterum fluxum inciderunt, quorum superiora corporis marcescebant, & mirum in modum flavescebant, tumentibus interim inferioribus & abdomine. Vesiculæ in horum pedibus

bus abortivæ stillabant liquorem summe croceum. Causa sine dubio salibus lixiviosis sulphur sanguinis ita modificantibus adscribenda. Cura ad tenacissimas obstructions tartareas & dyscrasiam viscerum dirigi debuit, & profuerunt in specie *martialia*, *pulvis cachecticus*, *Tinct. mart. aperit. Myns. spir. aperit. Penor. Purgantia* singulo octiduo semel exhiberi debuerunt, v. gr. *Recipe pulv. rhabarb. ℥j. gualap. ℥ss. & absinth. gr. vii. g. g. grij. ol. mac. gttj. M.* Quod si venter a *laxantibus* observabatur detumescere, his cum successu singula hebdomada pro exigentia symptomatum & ratione virium propinari potuerunt; sin tumor post purgantium usum in eodem statu mansit, aut infirmus naturæ ductu frequentes dejectiones sine alleviatione habuit; abstinentum fuit a purgantibus. *Diuretica* in his casibus alias omnem absolvere videntur paginam, hic tamen cum summo iudicio & discrimine adhiberi debuerunt, & si unquam, certe hic, urinæ status probe considerandus fuit. *Urina cruda, alba, tenuis* testabatur de sanguinis textura valde laxa, & hæc pro medela requirebat *salia lixiviosa*, ut pot. *sal. stipit. fabar. ononid. junip. rubul. absinth. tart. vitriolat. spis. sal. coagul. &c.* *Urina rubra* docuit sanguinis texturam esse valde strictam, atque abundare salibus lixiviosis, unde præscribi debuerunt *salia volatilia*, v. gr. *succin. & volat. tartar. buson. lumbric. terrestr. in primis amara decoctum ex herbis, absinth. mij. eupator. mar. & ℥ss. bacc. junip. mij. rhabarb. ver. ℥ss. m. pro infuso &c.* Scroto tumenti maxime profuit decoctum ex *sol. ros. absinth. menth. mil. cumin. cum vino factum*, & cum spongia calide applicatum. *Febres petechiales*, quæ observabantur, fuerunt valde *benignæ*. Alias, præter morbos ordinarios, *catarrhos* nempe, *tusses, rauces* &c. nil memoratu dignum occurrit.

*Constitutio Epidemica Sempronensis
Anni 1704.*

Januarius ineuntis hujus anni totus fuit valde frigidus, nivofus, *Februarius* e diverso præter morem temperatus, ut plurimum serenus, aliquando pluviosus, aliquando ventosus, quandoque nivofus. *Martius* incepit cum intenso frigore, solis tamen splendore atque serenitate temperato, quinta nix cecidit copiosa, quæ sexta jam in liquorem abiit, septima supervenit tempe-

ras tumultuaria, valde nivofa, octava dies fugatis nubibus purgatoque aëre mira illuxit serenitate, quæ tempestas pulcherrima, ventis mitioribus remixta, sicca, non solum ad æquinoctium vernale duravit, sed & uno quasi tenore in *Aprilem* usque continuavit. Imo *Aprilis* sua natura alias variabilis, hoc anno fuit amœnissimus, serenus, siccus, absque pluviis fere, cum caloribus ad finem usque prope æstivis: die 27. tonitrua & fulgura ingentia cum pluviis habuimus, sol tamen nubila mox serenavit, unde arbores justo citius folia & flores emisere suos. Tertia mensis *Maii* dies incepit cum pluviis, quas secuta sunt frigora, & quinta pruina matutina, quæ vineis nostris maximum damnum intulit, alias totus mensis fuit serenus, calidus, siccus, ventosus. Successit *Junius* serenissimus, siccissimus, pluviarum expertus, ventis tamen mixtus. His mensibus, imprimis superioribus, *Morbona* æque ac *Belona* apud nos valde sævit. Hungari quippe a Nostreis deditionem civitatis sollicitantes, sed repulsam reportantes rabie velut accensi hinc inde discurrerunt, nobisque excidium minati sunt. Civitatem d. 18. Februar. e longinquo obsidione cinxerunt, eam tamen supervenientibus adversis cæli tempestatibus, nivibus nempe & ventis insolitis, intra biduum solvere coacti sunt, interim IX. septimanis nos undique tenerunt conclusos, ut nullus exire ausus fuerit. Milites *Cæsarei* frigoribus & militaribus laboribus, imprimis tristi esuritione & aquæ potu valde hæcenus debilitati, huc tandem in defensionem civitatis dispositi ad novi desuetique cibi ac vini copiam, quæ miseris nostri large obtulerunt, gravati in periculosos inciderunt morbos, *castrensibus non absimiles*. Conquesti sunt de languore totius corporis, *nausea, stomachi gravèdine, caloribus, siti, dolore capitis, vigiliis, accesserunt deliria*, aliquando *alvi fluxus*, non nunquam *petechia*. *Vena sectio* prima aut altera die instituta, nec non *sudorifera ex spec. de hyacinth. C. C. philof. lap. cancr. autim. diaph. &c.* sæpe in herba suppresserunt malum, unde ægri intra quattriduum convaluerunt. *Purgantia & Vomitoria*, etiam in principio adhibita, non conduxerunt, morbum potius exasperarunt, & malignitatem latentem evocarunt, quam tandem *expellentia*, imprimis *mischridatum cum confect. alkerm. & confortantia* diu continuata sustulerunt. Qui methodo ordinaria fuerunt tractati, eva-

serunt omnes periculum; qui autem citius iusto nosocomiis valedixerunt, etiam si fere nullos in diæta errores commiserunt, ut plurimum in priorem morbum reciderunt. Inter hos unus *febre maligna* laborans ex delirio furibundus profiliit e lecto, & per fenestram secundæ contignationis sat altæ in fluentum præcipitem sese dedit, in aqua hinc inde discurrit, defatigatus tandem, & exanimis fere in lectum deportatus alexipharmicis, sudoriferis, confortantibus convaleuit. Morbus hic epidemicus a victu profectus primo mense militibus gregariis inhaesit, brevi post cives, qui curis, laboribus, frigoribus, excubiis diurnis & nocturnis insuetis defatigati vino horto, generosissimo, dulci, etiam nocturno tempore præter morem indullerunt; invasit, atque in febres malignas petechiales degeneravit. Sanguinis quippe una cum reliquis humoribus ex erratis vitiosam diathesin nactus facillime malignitatem concipere potuit. Inceperunt mense Februario cum languore summo, calore moderato, qui in dies crevit, vigiliis, siti intensa, aliisque febrium comitibus symptomatibus. In his si exanthemata prodierunt die quarta, evaserunt omnes rite tractati periculum die XV. secus si maculae in conspectum venerunt die septima: infirmi enim periculosissime tunc temporis decubuerunt, & 21. demum die mortis periculo liberati sunt. Mense Februario valde benignæ fuerunt petechiae, Martio peiores, Aprili pessimæ. Observavi in quodam juvene sat robusto petechiis laborante, pustulas XIV. morbi die exeuntes pellucidas, ceu crystallinas, partim milii seminis, partim lentis, imo multas pisi magnitudine hinc inde per totum corpus disseminatas, in dorso vero numerosissimas, aqua plenas, summe malignas; interdebatur enim febris cum anxietatibus, cordis compressionibus, convulsionibus; albescebat tandem hæ vesiculae & suppurare cœperunt, hinc exsiccatae jam exaruerunt, & squamatis circa 21. diem deciduerunt, quo tempore pauperulus morti jam vicinus, præter omnem spei feliciter enavigavit periculosissimam hanc charybdim. In foeminis semper notavi mensium fluxum, aliquando diarrhoeam simul, quæ omnibus fuit funesta. Deliria præmatura fuerunt exitiosa. Sic robustus quidam Vir 45. annorum, quinta morbi die incipit delirare, sexta est mortuus: & foemina triginta annorum similiter robusta tertia die delirans, quarta est mortua. Horum

sanguis prima & secunda morbi die *Vena sectione* extractus exhibuit in superficie pituitam densissimam instar crustæ vix separabilem, & croco quasi tinctam; brevi ante mortem bilis utrinque sese diffudit in totum corporis habitum; singula mortis prænuntia. In febribus hæc malignis frequens fuit *attritio* aut *excoriatio in natibus*, non solum a longiori decubitu, quin potius a sanguine suo modo malignitate corrupto deducenda, qui qua data porta, sarcinam suam deponendam & excernendam quaesivit. Latuit autem ut plurimum *gangrena* & *sphacelus*, caroque tandem adhibitis adhibendis, v. gr. *unguentum ægyptiac.* ad os usque excidit cum ægrotum levamine. Mense Februario morbilli epidemicæ grassari cœperunt, qui tamen ex methodo tractati benigni fuerunt, instante æquinoctio verno indies magis invaluerunt, & invaserunt infantes æque adultos, & puerperas, cum horrore, caloribus summis, stillicidio lachrymarum copioso, mordaci, oculorum rubore ac tumore, cum tussi serina, gravitate & compressione pectoris, maculae effluerunt ut plurimum secunda morbi die, aliquando quarta, quandoque septima, & persisterunt quatuor aut quinque dies. Observavi hoc tempore morbillorum tres species, *maculas* nempe *latas*, *rubras*, sine pustulis, adeoque non elevatas, neque superficiem cutis superantes; altera species cutim solum transparuit, & hæc duæ species inadvertenter evanuerunt, quas vulgus retrocessisse putabat; tertia prodit cum *maculis parvis*, *rubris*, quæ in dies auctæ, & supra cutis superficiem modicum elevata racematim coaluerunt, quarumque protuberantia, digito leviter admoto tactu percipi potuit; post quinque dies, morbo jam remittente, maculae per totum corpus latissimæ & maxime rubentes evanuerunt, atque squamularum formæ deciderunt, cute farina quasi conspersa relicta. Morbilli quo citius prodierunt, eo benigniores, quo tardius, eo peiores fuerunt. Incessit sæpe hic morbus sub vario stipatus satellitio. Sic mense Aprili ad puerperam vocatus deprehendi morbillos copiosissimos, protuberantes, quibus interspersæ fuerunt maculae petechiales, deliravit valde, imo tubarum in vicinam inflatarum cantus & pulsati tympani sonos, inter difficultates somni per phantasiam oblatos articulata imitata fuit, frequenter risit, convulsa & aphona tandem jacuit, neminem novit, 15. tamen morbi die, adhibitis ex-

pel

pellentibus alexipharmacis temperatis, cordialibus, ad se rediit, atque debellatis symptomatibus gravissimis convaluit. Eodem tempore gratiosam habui puellam 6. annorum, *variolis* veris laborantem, supervenerunt nona morbi die, variolis necdum in statu constitutis, *morbilli* copiosi, gravissime inde decubuit, sed ex duplici hoc morbi feliciter emerfit. Verissimum igitur est Axioma medicum. Qualis humor effervescit in corpore, talis efflorescit in cute. *Morbilli* hi, si perite *expellentibus*, v. gr. *pulv. alexit. de hyacinth. lap. bez. orient. pulv. epilept. C. C. philos. antim. diaph. unicorn. mar.* cum *pectoralibus & confortantibus* mixtis, nec non servato simul idoneo diætæ calorisque temperamento, tractati sunt, omni vacarunt periculo, neminique fuerunt funesti; neglecta autem, aut præpostera vel perversa morbillorum cura, aut præmatura, superatis jam morbillis, aëris mutatio, vel inordinata rerum non naturalium diætæ, præcipitavit quam plurimos in *tussim ferinam, febrem continuam, respirationem difficilem, pectoris compressionem, catarrhum* ita dictum *sufocativum, lethalem*. Mense *Majo & Junio* continuarunt adhuc *morbilli*, *febres continuæ, tertianæ intermittentes, variolæ*, quæ *sporadice* hinc inde vagatæ sunt, sed fuerunt sine malignitate, adeoque convenienter tractatæ facile curabiles. *Julius* fuit amœnissimus, sed cum summis caloribus, quarta coorta est gravissima tempestas cum frequentissimis tonitribus, flammarum fulgoribus, nec non grandinibus insolitis, quæ in civitate ut plurimum magnitudine juglandis, imo ovi gallinacei, prægressio imbre, ceciderunt, ad vineas tamen sparsim venerunt adeoque illis exiguum intulerunt damnum. Sub initium *Augusti* remiserunt calores, sed sexta audiebantur tonitrua terribilia, grandines cadebant insolitæ, copiosissimæ, quæ in optimis nostris præmontoriis & vites & uvas prorsus destruxerunt. Jam successerunt æstuosissima tempora, quæ vix sustinere potuimus neque spirarunt etelæ, nullæ fuerunt pluvie, quæ fervorem solis contemperassent, imo eadem aëris constitutio erat in *Septembri, Octobri* nec non *Novembri*, ut credidisses, autumnum in æstatem fuisse conversum; habuimus quoque d. 25. *Septembris* vesperti tonitrua & fulgura sufficientia, unde in residuis præmontoriis, quæ a grandine intacta manserunt, generosum crevit vinum, imo generosius crevisset, si nobis ob metum tumultuantium Hunga-

rorum serius vindemiare licuisset. Finitis enim jam vindemiis æstuosa & sicca adhuc continuarunt tempora, sine ullis fere pluviis. Sub finem *Novembris* & initium *Decembris* nives deciderunt paucæ, & moderata subsecuta sunt frigora. Mensibus æstivis, *Julio* nempe & *Augusto*, existente cœli maxime æstuoso, *diarrhæe & dysenterie* factis fuerunt frequentes, & magis pueros adultiores, senes minus, infantes sporadice affligerunt. Præcessit diarrhœa cum fastidio, languore totius corporis, siti, dejectionibus copiosissimis, serosis, ut plurimum biliosis, viscosis nec non pituitosis, valde fœtidis, mox insegura est dysenteria cum dejectionibus cruentis & purulentis, numerosis ad 70. 80. intra diem & noctem, aliquando velut momentaneis, ut miseri vix fellam foricariam deferere potuerint, & circa noctem cum majori exacerbatione, ut plurimum caloribus, quamvis non adeo urentibus, pulsu celeri, siti, inquietudine, acuto intestinorum & ani dolore, inani, licet frequenti, desidendi cupiditate, præcordiorum anxietate, vigiliis, in progressu morbi blanda accesserunt deliria, non sine malignitatis nota. Quandiu sanguis cum materia biliosa, mucosa, purulenta & saniosa, aliquando cum strigmentis exivit, tandiu de vehementibus torminibus & doloribus conquesti sunt. *Dejectiones nigre, fœtidæ* in morbi statu, majoris corruptionis denotarunt gradum, indicio manifesto, imminere jam *gangrenam* & brevi *sphacelum*, unde in illis dysenteria antea cruenta & torminosa jam observabatur fere indolens, pulsus quasi nullus, extrema frigidissima, sudore copiosissimo resolutivo frigido persusa. Refrigerationem hanc infirmi non percipiebant, quin potius de calore interno & siti conquesti sunt, imo manibus glaciæ instas frigidissimis res aut loca frigida capessere desiderarunt; & hi omnes, salvis tamen sensibus mœtuque membrorum illæso, elapsis ut plurimum 48. horis, mortui sunt. Causa hujus affectus adscribenda fuit partim copiosis fructibus horæis, acido-æqueo acri fermentifico fœtis. partim caloribus frequentissimis, bile inde acriori lymphæque acidiori & quasi corrosiva reddita. Succum nempe eminenter acres, mordaces neciendo in intestinis diutius, quam par est, moram, primo absterferunt intestinorum mucum, deinde illorum crustam villosam, sive velamentum bombycinum simul abraferunt, & altius penetrando ipsas glandulas eroderunt, atque

atque ulcus, vel quasi tale, instar vesicantium, induxerunt; inde membranarum intestinorum sensum sensumque a sale corrosivo erosio vasorumque osculis referatis, non solum sanguis frequenter stillavit, sed & tristissimus doloris sensus accessit, imo spasmodica vellicatio, qua intestina spasmo quodam irritata motu quasi vermiculari dolorifice sese torserunt, unde non mirum, successisse tandem inflammationem, gangrenam ipsam, nec non lethalem sphacelum. Quo enim major acrimonia, eo major spasmodica fibrarum nervearum irritatio, major fermentifica humorum fusio, glandularum, ductuum & vasorum intestinalium eliquatio, nec non cruoris simul cum plexibus glandulosis ac reliquis intestinorum contentis excretio. Profuerunt sub initium morbi, non obstantibus torminibus & supervacaneis excretionibus, humores acres diluentia, & leviter Evacuantiâ, ut pote aqua Laxativa cum aqua cinnam. in primis rhubarb. tostum, quod blande laxando simul ob partes terreas admixtas adstringere, & leniter roborare solet, cum myrobalanis & elaeosacch. cinnamomi propinata, nec non clysters absterfivi ex spec. emoll. hord. vitello ovi, conf. rosar. lacte, aliquoties adhibiti. His præmissis, statim deveniendum fuit ad incrassantia demulcentia, adstringentia cum anodynâ mixta, unde singulis quatuor aut quinque horis exhibui pulverem sequentem: 2℥. Corall. rub. præp. 3℥. lap. hematit. terr. japon. an. gr. viij. iheriac. cal. gr. iij. laud. de trib. gr. ʒ. M. mutatis tamen mutantis, addidi sæpe terr. sigillat. fl. ferr. bol. armen. pulver. stypt. Cr. smaragd. præpar. crystall. mont. pulv. dysenter. Crat. ex tragacanth. gummi. arab. & corall. constantem, Aut. mosch. &c. in primis, ubi calores fuerant ingentes, compos. sperniol. Cr. spec. de gemm. frig. unicorn. mar. spec. de hyacinth. &c. imo moderanda fuerunt medicamenta ad ipsius excretionis, malignitatis, & virium modulum. Sæpe videbatur jam alvus adstricta, morbusque sublatus, brevi tamen malum recrudit, & exivit iterum, aliquando cum, aliquando sine cruore materia mucosa in minima quantitate cum summis torminibus alvum ad excretionem stimulans; adhibitis autem frequentioribus clysteriis ex decoct. hord. cum capit. vervecin. nec non continuatis pulveribus adstringentibus, ex toto cessavit. Tandem, ne propter derafos plexus ilei glandulosos fluxus alvi cœliaco non absimilis remaneat, ordi-

navi summo cum effectu balsamica, stomachica, bals. peruv. opobals. Tinct. corall. elix. Virriol. M. pulv. stomach. elect. diacynam. Reg. nuc. in Ind. condit. Et sic dysenterici intra tres septimanas ex integro restituti sunt, quo usque etiam a vino abstinere debuerunt, contenti aqua cocta ex rad. tormentill. ras. C. C. obor. mastich. &c. Quos invasit cum vomitu, hi pessime decubuerant, & vix servati sunt, optime autem ipsis profuit balsamum peruvian. nec non opobalsamum cum corall. rubr. exhibitum. Adstringentia, sine præviis blandis Laxantibus, in initio & progressu morbi adhibita protraxerunt morbum, tormina exacerbaverunt, & post se plurimum febres arthritides, pedum tumores, lenterias reliquerunt. Opiata hic fere omnem absolverunt paginam, imo fateri debeo, me fere nullum dysentericum sine frequentiori exhibitione laud. de trib. commode restituere potuisse; exhiberi autem debuit, antequam dysenteria fuit consummata & plane ulcerosa, aut vasa majuscula exesa, aut sensus doloris jam periit. Mense Augusto frequentes habuimus rheumatismos ad brachia, scapulas, seniores, lumbos, coxas productos, sine ulla rubedine, multo minus tumore, non tam articulis, quam musculorum interstitiis firmissime & diutissime inhaerentes, cum motus impotentia, doloribus lancinantibus, profundis, fixis, qui noctu exacerbati somnum impediverunt: infirmi enim loco moveri nequiverunt, & quo statu fere primo jacuerunt ac decubuerunt, in eodem manere debuerunt, & sine cruciatu ac vehementi dolore vix moveri aut attingi potuerunt; adfuit simul tensio & caloris acriusculi sensatio cum pulsu frequenti. Vulgus hunc affectum nominare solet *delapsum catarrhorum a capite, es ist ein Fluss im Arm oder Fuß gefallen*. Statuendum potius rheumatismum provenire a sero aut lymphâ acriori, flatulenta, retrogrado motu impedito, in specialem aliquam membranosam, tendinosam, nerveam & musculosam partem delabente, ibique stasin patiente, & partes fibrosas, nerveas tendente, easque tristi sensu vellicante. *Arthritis Vaga* hoc anno frequens fuit. Invasit homines prævio horrore instar febris, membranosas ac musculosas articulorum partes dolore, rubore, tumore & movendi impotentia corripuit, vagabunda fuit & ambulatoria, modo hanc, modo illam invasit partem, nulla tamen loco ultra 48. horas fixa mansit,

remissionem sæpe, relicto solum tumore, simulavit, at opinione citius, imo vehementius rediit, & priorem locum occupavit, imo memoratu digna in plerisque fuit paroxysmorum invasio dolorumque motus, dum quo tempore humerum, carpum aut digitos dextræ manus, eodem tempore & genua sinistri pedis; & quo tempore sinistri brachii, eodem dextri pedis partes singulari alternatione & saltu dolorifico infestavit. Similiter hic peccavit serum, sine lymphâ acido acri, sed sale volatili intimius fœta, quæ ad periosteum, sive sensibilibissimas articulorum mobilium membranas detrusa, eas distendit, vellicavit ibique sicuti spina infixæ saviit. Cura *arthritidis Vagæ & rheumatismi* una eademque fuit. *Vena sectio*, nisi adfuit magna febrilis alteratio, intensior arteriarum pulsus, nec non præcordiorum compressio, nil profuit, vires potius abstulit. *Purgationes*, utpote turbationes & colliquationes liquorum naturalium exasperarunt magis malum; reiteratus autem *enematum*, in primis *laxantium*, usus v. gr. *Rec. pulv. hepat. ʒi. sal. cicbor. acetosell. an. gr. v. diagryd. sulphurat. gr. vi. secul. ari gr. iv. M. aut decoctum ex fol. sen. S. S. ʒi. rhabarb. ʒj. crem. tartar. in aqu. cicbor. infus. addita manna & aqua cinnam.* summopere profuit, in primis si vespertino tempore *pulvis confortans* frequens exhibitus fuit: *Recip. pulv. analept. ʒi. epilept. gr. viij. lap. cancr. præp. gr. vij. laud. de trib. gr. ʒi. M. opiatorum* enim vires hic summe deprædicandæ sunt, morbi quidem causam non tollunt, somnum tamen conciliant & dolores mitigant: non autem necessum fuit singulis diebus *opiatis & laxantibus* uti, dirigi & moderari potius pro re nata morbi indole debuit cura. Ab usu *sudoriferorum* nunquam felicem vidi successum. Post inunctionem *spirituosorum*, v. gr. *spir. vin. campb. formic. sal. armoniac. junip. lumbric. &c.* semper notavi dolores osteocopos, adeoque abstinendum fuit a *spirituosis*, nec non *unguinosis, emplasticis*. Optime autem, in primis sub finem morbi, profuerunt *Therma Badenses*, aut *balnea acidularum*, imo in ipso morbo *balnea ex aqua dulci cum bordeo* parata. Atque hac methodo tractati felicissime intra 20. aut ad summum, si copia peccavit materia, 40. dies restituti sunt. *Febres* his temporibus habuimus frequentes, quæ urut prima die tragœdiam a pandiculatione, oscitatione, languore, frigore, mox calore latius intenso auspicate

sunt, cum subsequente secunda die apyrexia, speciem *intermittentis* simulante; supervenientes tamen paroxysmi, qui fuerunt cum languore, pulsu magno, exacerbatione caloris aliorumque symptomatum, confirmarunt intermissionem istam fuisse dolosam, & latuisse sub hoc cinere ignem *continuum febrium*, nec non *malignitatem* ipsam. Et post enim videbantur quandoque, in primis mane, remittere calores, nunquam autem intermiserunt. Crescente morbo, creverunt symptomata, imo convulsiones in statu morbi notavi frequentes. *Deliria serotina*, v. gr. die 11. 12. supervenientia semper fuerunt *exitiosa*. *Febres* hæc more *continuarum Vena sectione* in principio *diaphoreticis, bezoardicis, confortantibus* tractari debuerunt. Ultimis tribus mensibus, præter *febres tertianas, quartanas, catarrhos*, vix alii notabiles occurrerunt morbi.

*Constitutio Epidemica Sempronienfis
Anni 1705.*

Quo clementior anno præterito fuit aëris constitutio, eo rigidior sub ingressum anni 1705. comparuit cœli temperies. *Januarius* quippe incepit gelu congelare aquas, imo continuavit frigus toto hoc mense sine remissione, nives ceciderunt paucæ, & spirans Euronotus induxit siccitatem. Nec mitior fuit *Februarius*, quin frigore & gelu longe rigidior, sine ullis nivibus. *Martius* illuxit gratiosa serenitate, & exoptato calore, sed quinta nives ceciderunt magnæ, sexta frigus, quod ad 12. usque duravit diem; circa *æquinotium vernale*, spirante aëre meridionali, frequentiores habuimus pluvias, fructiferas, quas serena, calida mox insecuta sunt tempora, adeoque *Martius* ut plurimum siccus extitit. *Aprilis* varias sustinuit ventorum mutationes, & frequentiores, vix non quotidianas, in primis circa finem, pluvias, oblectamenta vernalia inhibentes: imo & *Majus* fuit valde inamœnus, frigidus totus, excepto uno aut altero die, pluviosus. *Continuavit* pluviosa & frigida hæc aëris constitutio ultra *medium Junii*: unde non mirum, uvas circa festum *Viri* nec dum florere incepisse. Circa *solstitium æstivum* temperatior aura & calores desiderati demum redierunt. Morbi, qui in hoc semestre inciderunt, erant varii. In *Januario & Februario* continuabant *febres quartanae*, quæ tamen, uno vel altero *Laxativo* adhi-

bito, nec non chinatis medicamentis cum arcano duplicato, præter morem ut plurimum superari potuerunt, neque ullam labem post se reliquerunt. Frequentes erant rheumatismi in pedibus, manibus, scapulis, humeris, cum dolore acerbo, sine inflammatione, sine tumore, hi diaphoretica sustinere non potuerunt, sed solis temperatioribus cholagogis v. gr. infusis ex manna, sol. sem. tartaro, cum aq. cicchor. &c. clysteribus, præcipitantibus, nec non balneis hordeacis, &c. & pro re nata, in summa dolorum exacerbatione, grano dimidio laudani de tribus, tractari voluerunt. Catarrhos habuimus copiosos, qui in febres degenerarunt continuas, non adeo funestas. Servati enim omnes sunt, qui statim ab initio adhibuerunt Alexipharmaca, eaque continuarunt. Mense Februarii jam inceperunt febres petechiales, quæ pleuritides ab initio mentitæ sunt, inceperunt cum horrore levi, febre lenta, tussis sicca, dolore in pectoris regione, ad scapulas, claviculas ascendente, cum molestia ægri, si in partem sanam decumbere voluit; assumptis autem sudoriferis evanuerunt dolores, & quarta, imo in plerisque septima demum eruperunt maculæ. In aliis simularunt febres intermittentes. Sic in Virgine quadam XVI. annorum, sanguineophlegmatica, tunc temporis ordinario mensium fluxu laborante, notavi tres paroxysmos, more febris quotidiane intermittentis, mane cum horripilatione, subsequo calore, circa vesperum intermittente, dolore capitis gravativo, siti, lassitudine &c. quotidie recurrentes, quarto calores continuos, prioribus longe intensiores, nec non eruptionem macularum, septima hæmorrhagiam narium sat largam, decima deliria blanda, manuum tremores, linguæ ac faucium ariditatem molestam, 12. 13. novam copiosorum exanthematum, prioribus jam evanescentibus, eruptionem; & ecce 16. morbi die, non obstante hæmorrhagia, quæ ex alleviatione morbi judicabatur critica, septima oborta, obiit. Maximam malignitatem exanthematica hæc febris in recessu gessit mense Martio, Aprili. Incepit cum horripilatione, calor in sanguineophlegmaticis, quorum sanguis sero viscido abundat, miris, sed subdolis; in sanguineis intensior, adfuit languor totius corporis, mox subita virium prostratio, membris quasi lassitudine fractis, aut contusis, sitis non adeo magna, nausea, vomitus, pulsus naturali fere similis, unde magis de

languore, quam calore, conquesti sunt, sexta aut septima æstus invaluit, atque malignitatem sequentibus diebus prodidit, supervenientibus gravioribus symptomatibus, utpote exanthematum eruptione, cardialgia, pulsu celeri, frequenti, vigiliis, vehementissimis capitis doloribus, deliriis, moribus convulsivis, linguæ ariditate & fissuris &c. Venæ sectiones prima aut altera die institutæ, nec non repetitæ valde profuerunt, serotinæ omnes nocuerunt. Laxativa, etiam sub initium morbi exhibita, rejicienda fuerunt, & memini in his exanthemata longe latiora prodidisse, quam in aliis, eosque gravissimis symptomatibus, tremoribus nempe totius corporis, deliriis furiosis, tandem aphonia, convulsionibus epilepticis, tentatos fuisse, omnesque satis occubuisse: clysteriis ex humectantibus & emollientibus confectis, nec non suppositoriis alvum adstrictam commodissime referare potuimus. Cura methodica maxime dirigi debuit ad vires, quæ conservari, ad humorum fervorem, qui temperari, ad malignitatem, quæ corrigi debuerunt. Præstitimus hoc blandis diaphoreticis, bezoardicis, cordialibus, v. gr. pulv. alexit. spec. de hyacinth. C. C. philos. pulv. analept. lap. bezoard. orient. antimonium diaphoretic. unicorn. mar. conf. alterm. mag. perlar. orient. &c. exhibito singulo oclihorio pulvere uno, aut potiuncula. Sic corpus mansit perspirabile, sanguini sua constitit systasis & crasis, atque malignitas exuperata fuit. A medicamentis spirituosiss, volatilibus, bezoardicis fortioribus, calidis, quæ in hoc casu magis obsuiffe, jam a longo tempore in his calidis oris expertus sum, studio abstinui. Vinum omnibus interdixi, aquam solam ex rad. scorz. ras. C. C. ebore. sem. anis. &c. concedens. Acutissimos capitis dolores Vesicatoria nuchæ apposita sustulerunt. Seviit vehementer hic morbus æque in adultos, atque gravidas. Sic binas habui, harum una, tertia morbi die, gemellos vivos, nondum maturos, oclimestres, qui intra aliquot dies mortui sunt, peperit; altera sexta morbi die filium æque oclimestrem, qui sex diebus vixit, enixa est. Fortior hic sine dubio sanguinis motio & rarefactio, qua apertæ & laxatæ sunt viæ, partus hos acceleravit, inde puerperæ valde debilitatæ, sed solis confortantibus, analepticis, bezoardicis blandissimis, aliisque pro morbi & symptomatum exigentia remixtis, tractatæ, binæ die XV. evaserunt ex morbo hoc gravissimo. Legitima enim & ma.

& matura medicamentorum applicatio omnibus salutaris fuit, secus, qui a principio neglexerunt remedia. Sic inter alios novi mercatorem, Silesitam, eadem febre detentum, qui fere omnia respuit medicamenta, tandem delirio phrenetico correptus in lecto vix detineri potuit, die 12. deinum prodierunt exanthemata, indubia mortis die 14. morbi subsecuta indicia. In alio pauperculo *potecziali febre* extrema laborante notavi in dorso, brachiis, pedibus, naribus quam plurima *ulcuscula*, elevata, dura, cum intenso dolore, inflammatione, ad instar furunculorum, ichore plena, sed tubercula illa ulcerosa valde fuerunt maligna, naturam *anthracum* æmulantia; caro enim in circuitu inflammata, tandem sphacelata & corrosa, ubique tota excidit, adhibitis expellentibus, Alexipharmicis & mundificantibus externis, præter omnium spem sanitati pristina restitutus est. Caterum multiplici experientia edoctus ingenue fateor, etiam si omnia signa sefellerunt, me tamen sequentia in prognosi nunquam decepisse: deprehendens nempe in tangendo pulsu *contractionem aut subsultum tendinum*, pro certo mortem prædicere potui. Sic ex *lingue ariditate, fissuris, asperitate, scabritie, siccitate*, quasi lignum attingeret, nigredine, in primis, si retorrido calore cum vicinis faucibus aruit, aut *crusta quadam nigra obducta*, quæ licet sæpius os fricando & colluendo detergeretur, statim tamen nova repullulavit, infallibile summæ interiorum partium inflammationis & fiderationis, nec non mortis augurium habuimus. Lingua enim etiam in minima inflammationis suspitione statim resiccare incipit, & crescente inflammatione crescit pariter & siccitas linguæ. Hoc morbi stadium sæpe ultra XV. morbi diem fuit protensum, aliquando felici, aliquando funesto eventu. Sic memini quosdam 16. alios 18. imo 22. demum morbi die fuisse extinctos, alios jam integre restitutos ex levissima causa & errore dietæ *recidivam* reportasse, quæ tandem, inflammatis glandulis in pectore, in primis pulmonibus sitis & exulceratis, in *hæticos* degeneravit calores, longo tamen medicamentorum pectoralium usu superabiles. Mense Maio febres *petechiales* delævierunt, & evaserunt ex his omnes, qui ex methodo tractati sunt. Eodem tempore *Icterus* frequens fuit, qui flavo suo colore deturpavit totum corporis habitum, speciatim vero oculorum politum ebur, nec non tempora. Conque-

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

si sunt de pruritu in cutē, maxime dorso, de caloribus transitoriis, lassitudine ulcerosa, doloribus capitis, somniis turbulentis, intensissima siti, inappetentia, oris amaritudine. Alvus plus solito adstrictior, & quæ exierunt excrementa, penitus albescentia, pauca, viscida, urina crassa, turbida, subnigra, in superficie oleaginosa, crocea fuerunt. Utrique hic fuit obstructio tubulorum biliferorum, a viscida lymphâ hepatis & acinorum glanduliformium, nec non saburra tartarea proveniens: inde bilis ab acido fixiori plus minus austero, torpidior & spissior reddita, in motu suo impedita, neque per destinatos canales, tum ad vesiculam, tum per ductum cysticum in ductum choledochum ad intestina delapsa, potius resistans, in venæ cavæ propagines, tanquam fontes suos recessisse, ibique serum cum sanguine, & exinde productos humores, nutritioni & excretioni dicatos, citrino suo colore infecisse necessum fuit. *Martialia, rhabarbarina, aperientia* non solum ductus illos obstructos feliciter referarunt, sed & bilem peccantem, atque jam ad habitum corporis delatam eduxerunt per episcrasin, v. gr. pulv. hepat. cachect. croc. mart. aperit. cum salibus, rhabarb. Alex. spir. sal. acetosell. absinth. cichor. tartar. vitriolat. arcan. dupl. rad. curcum. &c. additis pro re nata, & quidem optime cum successu, aliquando granis aliquot diargydii. Mense Junio continuarunt adhuc febres continue, sed fuerunt valde benigne. Jam inceperunt tertiana, quartana, curatu tamen faciles. Julius incepit cum caloribus, subinde tamen nubibus exasperatum cælum in primis die 19. & sequentibus aliquot diebus, stante Borea, frigidam effudit pluviam. Cum Sirii ortu etiam exorti sunt calores, qui cum insolito & vix tolerabili aëris fervore usque post ejus occasum, imo toto mense Augusto, sine ulla alternatione, continuarunt, excepto XIX. Augusti, quo cum imbris, tonitribus & fulgure grandines per mediam horam deciderunt copiosissimi, quæ promontoria nostra fere omnia destruxerunt. Totus September aut ventosus, aut frigidus, aut pluviosus fuit, adeo, ut vix quatuor dies sereni toto mense numerari potuissent. October exiit amœnus, calidus, siccus, & quamplurimum contulit ad maturitatem uvarum, quæ alioquin immaturæ mansissent. Hinc vinum nec quantitate, nec qualitate laudabili crevit. Novembris initium ventosum, utcumque siccum fuit, progressus ad

P p p

finem

finem usque pulcherrimum, serenus, calidus. Sub initium *Decembris* apparuerunt hyemis indicia, nubibus & nebulis aer turbidus, frigidus, mox infecuta est æmœna, serena sine nivibus tempestas, ad finem mensis durans, nobis quidem grata, sed ob hostium furorem valde infausta, ferrea & ignea. Tumultuantes enim Hungari die 24. *Decembris* civitatem nostram arctiori obsidione cinxerunt, eamque circa prandium ex monte Leonhardi globis ignitis continuo ex machinis bellicis majoribus explosis invaserunt. Primam stragem sustinuerunt suburbia (non exclusis V. domibus in civitate interiori existentibus,) quibus flamma hæc procella, aut diversa incendia sacram Christo nascenti noctem in funestam cinerum diem vetterunt. Die Nativitatis CHRISTI ignitis suis globis nova incendia facere, atque residuum in cineres redigere, sed frustra, tentarunt; pilis autem suis majoribus igniaris, *Bomben*, ingens damnum ædificiis intulerunt; tandem biduo post, re infecta, discesserunt. His temporibus, mense nempe *Julio*, *Augusto*, *Septembri*, *Decembri*, adhuc continuarunt *febres continuæ*, *petechiales*, & notavi inter alia honestas duas feminas, sorores; quarum una mense *Augusto* *febre exanthematica* laborans, die X. morbi acquisivit frequentem *diarrhœam* cum torminibus & doloribus inflammatoriis, vigiliis continuis, caloribus intensissimis, die XII. extrema, sudore resolutivo perfusa, etiamsi de æstu gravissimo, potius anxietatibus, conquesta fuit, frixerunt, 13. mortua. Latuit hic sine dubio *intestinorum sphaecelus*. Altera soror mense *Septembri* eadem *febre petechiali* correpta, sumpsit sub initium morbi, nil mali suspicans, ante macularum eruptionem, nescio cujus suasu, *Laxativum*, die 10. incepit delirare, adhibitis tamen adhibendis, die 17. calores remiserunt, & mens rediit, imo jam periculum evasisse ab omnibus judicata fuit; die 19. morbi in *femore pedis sinistri* ex insperato prorupit *macula nigerrima crustacea*, *instar anthracis*, magnitudine duplicis grossi, quæ igneo suo fervore latius sese diffudit, carnem subditam exussit, atque die 21. pauperculam e medio viventium sustulit. Mense *Decembri* in alia femina 46. annorum observavi easdem *maculas petechiales* tertia jam die prodeuntes, valde *lata*, non obstante *Vena sectione* secunda morbi die administrata, tertia incepit delirare, quarta obiit. In his casibus usique peculia-

ris sanguinis corruptio, & singularis malignitas supponi debuit. Mense *Augusto* ex flagrantissimo sole aerisque siccitate ortæ sunt *diarrhœæ*, *dysenteriae* cum tenesmo, vomitibus, siti, doloribus abdominis; ut plurimum conjuncti fuerunt calores, inde methodo ordinaria tractari non potuerunt, quin potius *alexipharmacis*, v. gr. *terr. sigillat. Japon. bol. arm. theriac. cal. spec. de gemm. frig.* curam aggredi debuimus. Ubi nullus adfuit calor, ibi optime profuerunt *blande educientia*, in primis *rhabarb. tostum cum myrobalan. citr.* aut *aqua laxativa ipsa cum aqua cinnamom.* sub initium exhibita, aut *clysteres abstergentes ex bord. cap. verruc. lacte &c.* frequenter applicari. Materiam adhuc resistentem acrem, austeram, acidam, utentem feliciter deinceps *absorbentibus*, *adstringentibus*, ac *incrassantibus*, v. gr. *corall. rubr. alabast. terr. jap. sigillat. crystall. mont. &c.* correximus. Sic multum præstitit *opobalsamum*, nec non *oleum nucis* interne exhibitum; non minorem utilitatem attulit *Cataplasma* toti abdomini applicatum: *Recip. pulv. centinod. burs. pastor. an. m℞. fol. rosar. ruor. balaustr. an. ℥iij. diacydoniat. cum spec. ℥℥. nuc. mosch. n. ij. massich. ℥j. caryoph. ℥j. F. Cataplasma*, adde *ol. myrsin. cydon. massich. an. ℥j. M.* Hoc mense *erysipelata* frequentissima fuerunt, sed uno vel altero *sudorifero* exhibito extincta. Nec bis mensibus continuerunt *febres quotidianæ*, *tertianæ*, *quartanæ*, quæ circa finem mensis *Octobris* valde *contumaces* extiterunt, senibusque funestæ. Frater alios affectus *rheumatismos* nempe, *catarrhos*, *podagricos dolores*, *odontalgias &c.* sequentem notavi casum. Honestæ matrona, annorum 45. multarum prolium mater, circa finem mensis *Novembris*, prægressa jam a longo tempore spasmodicis digitorum manus sinistrae, agonizantem puellam in vicinia visitans, eamque morientem conspiciens, valde perterrita concidit *epileptica*, deportata domum, & in lectum illata tandem ad se rediit præteritorum fere inscia. Ad ipsam vocatus nil intentatum reliqui, aperui *venam in brachio dextro*, ordinavi *clysteres* dedi *antiseptica*, v. g. *pulv. epilept. spec. cephal. M. castoreum unioorn. mar. ungu. alc. cran. human. aqu. birund. c. castor. epilept. L. &c.* affectum tamen curatius perpendens deprehendi spasmodicum, vel potius pulsus & subultum magnum in medio, annulari & auriculari digito sinistrae manus, ubi frequenter & fere in-

Indefinenter illorum extremitates ad volam manus retractæ sunt; bihorio elapso majorem persensit in prædictis digitis subsultum, mox paroxysmum epilepticum; adeoque celer motus tendinum veluti subsultorius, instar pulsus ordinarii, indubitatum instantis paroxysmi fuit præsagium. Sensit autem infecutas exacerbationes omnes manifestam originem traxisse ex extremitatibus trium digitorum sinistræ manus, indeque in momento, quasi volando, auram quandam adscendisse per brachium ad caput, affectoque cerebro, pars corporis sinistri variis motibus valde agitata & concussa fuit, pes tremuit, oculos contorsit, spumeum quiddam circa os apparuit, reflexo capite versus dorsum, adfuit simul omnium sensuum perturbatio. Diræ hæc symptomata, si remiserunt, durarunt autem quandoque uno horæ quadrante, quandoque brevius, ægra tandem sopore quasi oppressa jacuit, mox gravi suspitio ad se rediit horum omnium inscia, atque solum de gravitate capitis ac lassitudine membrorum conquesta est, ut plurimum, finito paroxysmo, modicum sanguinis ex nimio motu convulsivo in pulmonibus extravasati, ore rejecit. Sæpe velut ab utero suffocata rubebat insigniter, quum lassitudine quadam ac sensum oborientis febriculæ rudimento. Non quidem continenter horrendo hoc symptomate, sed interpolatis vicibus, modo serius, modo ocus aliquando quotidie, aliquando tota septimana semel, commiseratione digna exagitata fuit, prout venenata hæc materia vel citius, vel tardius, auram suam subtilem, vel spiritus suos volatiles emisit, qui in cerebrum delati irritando sensiles ac nerveas fibrillas celerem illam, inordinatam & involuntariam concussionem membrorum, cum conspicua mentis labe, ac terribili nervorum contractione illius potissimum corporis partis, ex qua malignus vapor speciatim in cerebrum fuit mandatus conciliarunt, miseram nostram, si extra lectum fuit, cadere fecerunt. Malum hoc necdum radicatum quo ex toto tolleretur, nihil non tentatum fuit, cum per *castorica*, v. g. *pil. coch. de succin. Cr. extr. cum syr. de cichor. c. rhab. &c.* tum per *Vesicatorium*, ad eliciendam materiam peccantem, regioni carpi impositum. Carpum deinde æthiori vinculo circumligari curavimus. Interne quotidie mane sumpsit *pulveres epilepticos ex pulv. epilept. M. g. viij. mag. eran. hum. gr. v. unguil. ale. præp. gr. vij. unicorn.*

mar. g. iv. pulv. castor. gr. v. vesperi vero mixturæ sequentis gutt. 30. Rec. Elix. uterin. Cr. eff. succin. sal. volat. oleos. an. 3j. M. his continuatis remiserunt symptomata, non tamen ex toto cessarunt. Unde sanguinem *cruciatim* ex brachio nempe dextro, & pede sinistro simul & semel detrahi curavi tandemque *mistur. simpl. cum elix. uterin. Cr. & eff. anod.* exhibui, quorum beneficio malum hoc potissimum, una cum motu tendinum subsultorio in digitis intra menses devictum fuit. Pro roboratione membrorum & nervosarum partium, nec non avertendo recidivæ metu, ablegavi ipsam mense *Majo* sequentis anni ad *Thermas Batavino-Austriacas*, & quidem optimo successu, Pristinam enim recuperavit sanitatem. Thermas autem quotannis visitare debuit, quod licet deinceps non observaverit, nullum tamen similis morbi indicium per multos annos amplius in conspectum prodit. Et hæc dicta sunt de morbis, qui hoc anno apud nos observati sunt.

*Constitutio Epidemica Sempronensis
Anno 1706.*

CRedidisses præteriti anni exitu & ferocientium hostium abitu, nos jam calamitatibus, molestiis, periculis vacuos; furoremque hostium erga nos in lenitatem esse conversum. Sed ecce illorum furor mox abiit in rabiem. Cogitantes enim de nostro interitu & civitatis exitio, d. 2. *Januarii* ad pristinam stationem redierunt majoribus machinis, mortariis pluribus & requisitis bellicis probe instructi; 3. die *Januar.* summo mane, continuis tormentorum & pilarum jactibus tam ardentem pulsarunt, ut fulmina & fulgura de coelo descendisse putasses, imo sparso missilium flammaram imbre nova incendia excitarunt, & quam plurima civium ædificia immani grandine quassata destruxerunt. Sed cum hostes vidissent, se continuo machinarum bellicarum boatu & fragore inconcussam civium fidem & constantiam neutiquam evertere posse, sexto *Januarii*, summo mane, trino agmine & magno impetu mœnia invaserunt, admotisque quamplurimis scalis, nec non globulis quamplurimis manu injectis, mœnium fastigia, quæ jam attigerunt, transcendissent, nisi nostrorum Civium & inhabitatorum pectora pro muro fuissent, atque continuis scloporum explosionibus, nec non clavis præferratis permultos de muro in

jectas fossas præcipitassent, hostesque pedem, relictis centenis & ultra mortuis, in pristinam suam stationem referre coegissent. Hostis itaque invictam civium constantiam jam expertus, adversis tempestatibus cœli quotidie magis magisque invalescentibus, die 10. Januarii obsidionem solvit, recessit, sed a longinquo nos cinxit. Cives interea insuetas in excubiis sub Jove frigido & humido per aliquot menses constanter continuarunt suas stationes, atque intrepide defenderunt sua mœnia. Alias hic *mensis* valde horridus fuit, frigore tamen quandoque remittente, placidior. Mellior aër sub initium *Februarii* observabatur in progressu remissum aliquod frigus, sub finem nives, subsequo frigore congelatæ. *Martii* ingressus rigidissimus subito cum sereniori ac blandiori aëre commutabatur, circa *æquinoctium* frequentes fuerunt pluviae, mox nives, mox varii ventorum tumultus, adeoque *Martius* non siccus, sed humidus extitit. *Aprilis* comparuit nivofus, mox tamen serenior & amœnior factus calore suo veris delitias produxit languentes animos excitavit, & ad finem usque siccus ac calidus permansit; die 30. ingens tempestas cum fulgoribus & tonitribus oborta est, quam præcessit magna papilionum cohors occidentem versus volitans. *Majus* fere totus mane subfrigidus fuit, siccus, circa meridiem calidus, cum paucissimis pluviis. Toto *Junio* grata & exoptata habuimus tempora, calores intensos, sæpe venti, quandoque pluviae nocturnae contemperarunt amœnissimæ, Mercurii dies fuit serenissimus, & die Sancti Viti uvæ in omnibus promontoriis jam defloruisse notavimus, inde nostrates præcocem vindemiam augurari solent. Toto *Januario* morbi, præter *catarrhos*, hyemali tempore non infrequentes, nec non *quartanas*, nostris desideratas dederunt inducias. Sub initium *Februarii* febres notavimus continuas, malignitatis tamen expertes, *rheumatismos* frequentes biliosos, *defluxiones* seroso biliosas in capite, maxime pone aures, aliquando sine tumore, cum modica febrili alteratione; summe dolorificas, *suffumigiis* ex olivano & *cataplasmatibus* emollientibus curatas. Continuarunt illæ in primis mense *Martio*, & invaserunt articulos maximo cum dolore, inflammatione, tumore, senibus, in primis podagricis, exitiosæ: in his rediit *podagra*, sed sine doloribus, quæ retrocedens materiam peccantem ad pectus transtulit, ibi-

que *catarrhos* lethales excitavit. Sed miratu dignum fuit, quod præter hujus mensis indolem nullæ febres continuæ, exceptis paucis *catarrhalibus*, quæ senibus fuerunt funestæ, obortæ sint, cum tamen sæminæ cum prolibus suis; superioribus mensibus, maximum metum & terrorem ex turbis bellicis conceperint, & pro majori securitate diu noctuque squalida cellaria inhabitare debuerint, cives autem & incolæ omnes in excubiis quam maximos excessus sub Jove frigido & humido in vino commiserint, adeoque humores ad morbos generandos, aut suscipiendos disposuerint, in primis, cum absque hoc *Martius* sit humorum genitor, motorque dolorum. Beneficium hoc adscriptum vino novo, quod præterito crevit anno, levissimo, claro, acido, tartaro crudo abundanti, diuretico: hoc potenter viscidam bilem diluit, solvit eamque per alvum & urinam eduxit, adeoque sanitari nostræ valde proficuum fuit. Aliis annis vina hujus loci nova, ubi calore solis & cœli benignitate ad summam maturitatem pervenerunt, generosa ac potentia tartaro subtili scatent, oleosa sunt, & nec dum defecata, largius hausta bilem a naturali sua crassi dejiciunt, alcalicis suis particulis quam maxime sanguinem accendunt, visciditate autem sua hujus circulum retardant, toti corpori torporem inducunt, caput gravant, constipant, imo particulis suis hamosis salino volatiles maxime activas reprimunt, actiones animales simul lædunt, & varios morbos, in primis febres continuas, malignas, petechiales conciliare solent. Mense *Aprili*, *Majo*, *Junio* repullularunt febres continuæ, petechiales, quandoque sine malignitate, methodo tamen ordinaria feliciter eradicatæ. Inter alia notavi gratiosam filiolarum quinquennem, febre continua correptam, cum maximis abdominis doloribus, torminibus, vix non convulsivis, & imminentis epilepsie metu; loqui nil potuit, dolorem autem ejulatu expressit, continuarunt calores sine ulla intermissione ad 12. diem. In horrendo illo ejulatu ob metum gravioris mali 11. & 12. morbi die dedi laudan. de trib. gr. ℞. cum pulv. epilept. M. castor. unicorn. mar. & birand. c. castor. &c. laudabili cum successu & subsecuta quiete. Durante morbo, & 6. septimanis post morbum ne verbum eloqui potuit, licet omnia bene intellexerit, & linguam quaquaversum movere ac volutare, bibere, comedere, deglutire poruerit;

rit. Topica præscripti varia, verbi gratia *unguentum ex conf. anacardin.* ℞ij. *alkerm.* ℞j. *extr. castor.* gr. viij. *ol. succin.* gutt. iij. pro illinitione, & frictione faucium, linguæ & palati. Fomenta ex *infus. major. salv. chamomill. hyssop.* collo, in primis laryngi frequenter applicuimus, donec interior laryngis rima a siccitate coarctata ac constricta, aliquantum iterum humectata officio suo fungi potuit, atque sensim & sensim, licet sub initium difficulter, verba articulata expressit. Humores biliosos ex abdomine ad musculos laryngis, inque nervos vocales, metastasi facta, delatos, præter calorem febrilem, interiorum laryngis rimam arefacientem, eosdem affecisse, conjiciendum ex prægressis vehementissimis, vix non convulsivis, abdominis doloribus, in tempore consopitis. Iisdem temporibus observavi in filiolo sexenni *calores continuos* sine ulla intermissione, vix remissione, ad 30. diem & ultra, non obstante legitima medicamentorum administratione, extensos, adeoque non sine malignitate, tandem tamen feliciter superatos. His mensibus *rheumatismos & arthritides vagas* notavimus frequentes, methodo autem nostra superius tradita mox profligatas. Mensis *Julius* fuit æstuosissimus, noctes præter morem calidæ, sine ullis fere pluviis: die 16. cælum opacis & atris nubibus de subito exasperatum, effudit imbrem largissimum cum tonitribus, in vicina cum grandinibus insolitis, maximu *Rustensium vinearum* damno. Sub ingressum solis in leonem, nisi quandoque grati spirassent etesæ, calores vix fuissent tolerabiles; tandem ultima hujus, prægressis noctu crebris tonitribus nec non fulguribus, gratiosa ac tepida superveniens pluvia cum amœnissimis & subfrigidis ventis ingentissimum auræ calorem contemperavit, terram refocillavit, & omnia, recreavit. In *Augusto* terra per totum mensis cursum fervido solis calore fovebatur, subinde tamen nocturno tempore tepidis pluviis animabatur, inde jam sub initium hujus mensis maturas habuimus uvas. *Ægidii dies* mira & exoptata illuxit serenitate, & serenavit totum mensem exceptis 17. 18. diebus, qui fuerunt frigidi, ventosi, pluviosi. Per *Octobrem* totum eadem gratiosa serenitas, siccitas & æstus amœnus duravit, cum nebulis matutinis, solis splendore discussis, exceptis 6. 7. & 8. diebus; qui sparserunt pluvias. Hinc vinum crevit generosissimum. Secunda *Novembris* primam demum

notavimus pruina, & continuarunt amœnissima, calida illa tempora, præter ætatis anni morem, toto mense, nisi quod 14. 15. intervenerint pluviz, & 24. nives ceciderint ingentes, sequenti tamen die liquefactæ. Eadem cœli tempestas continua, serena nempe, calida, aliquando nebulosa fuit usque ad 17. diem *Decemb.* 18. vero, 19. pluviosa, nec non nivosa; die 20. ingruit gelu, quod post biduum remisit, reliquis diebus pluviz, nebulæ, venti ac calores alternarunt, quæ tempestas, prædominante calore circa Natalitia, *pyrorum flores & turiones sambucinos* elicit. Mensibus æstivis omnis generis *febres*, quæ *continuas* mentitæ sunt, nobisque ab initio imposuerunt. Invaserunt hæc cum horripilatione vix sensibili, insequente calore, ultra 30. horas du ante, cum vehementi siti, capitis dolore, vigiliis, vomitibus, præcordiorum angustia, anxietatibus, virium prostratione, linguæ ac faucium squalore, ita ut *febrem continuam* fore metuerim; adhibita tamen *Venæ sectione* in brachio, & repetita in pede, exhibitoque uno vel altero *sudorifero*, remisit calor, & tertio aut quarto die ut plurimum in *intermittentem tertianam duplicem* terminavit; ast inter apyrexiam & paroxysmum brevissimum fuit intervallum, imo, saltem aliquot interjectis horis, nova *febris*, sine ullo frigore, accessio, & quasi composita ex *tertiana & quotidiana*, altera autem *levior* typum *quotidianæ* referens. Ante paroxysmum dedi *antifebrilia ex salibus*, *arcan. dupl. cort. chin. lap. cancr. &c.* in caloribus vero diuturnis, ob metum latentis malignitatis, nec non ingentem debilitatem, *blanda diaphoretica*, utpote *lap. bez. orient. pulv. analapt. M. C. C. philosoph. magist. perlar. conf. alkerm. &c.* aliquando, in primis ubi capitis dolores fuerunt intensi, loco *antifebrilium* præscripti *spirit. sudoris.* ℞j. cum *spirit. anod.* ℞ss. & quidem laudabili successu: non enim tantum dolores remiserunt, sed & paroxysmi febriles brevi cessarunt, & ut plurimum soluti sunt spatio 15. aut 21. dierum. *Febres tertianæ* circa hæc tempora fuerunt frequentes, sed adeo mites, ut post quintum aut sextum paroxysmum, adhibito *Laxativo*, nec non *antifebrilibus salibus* recesserint. *Febribus continuis* corripiebantur permulti, sed sine gravioribus symptomatibus, & absolverunt jam die 15. suum cursum feliciter; hinc omnes servati, qui non incuria neglecti, sed methodo ordina-

dinaria tractati fuerunt. Menſe Julio, Auguſto, Septembri, diarrhœe, dyſenteriae ex radiorum ſolatio, æſtu invaſerunt quamplurimos, ſine ætatis discrimine cum maximis torminibus, tenefmo, dejectionibus copioſiſſimis, purulentis, cruentis. Principum curæ ſumpſimus a *rhabarb. roſt. myrobal. citrin.* aliquando ab *Aqua laxativa*, in primis ſi ventriculus cruditatibus labefactatus aut gravatus fuit, acrimoniam humorum temperavimus *abſorbentibus*, v. gr. *coralliis rubris*, *terr. figill. ſt. ferr. cryſtall. mont.* &c. continuas dejectiones, & dolores correximus *clyſteriis ex decoct. bord. aut oryz. capit. vervac. vitell.* ſæpe injectis, nec non *adſtringentibus*, *incrāſſantibus*, *demulcentibus* ſæpius exhibitis, v. gr. *pulv. dyſent. Cr. terr. catechu* &c. *miſtridat. theriac. cæl. laudan. de trib.* imo ſateri debeo, etiamſi ſingulis 5. aut 6. horis medicamenta *adſtringentia* exhibuerim, me tamen ſine opiatis nihil profeciſſe, adeoque *Laudanum de trib.* in acciſa (reſracta) doſi aliis additum & ſæpe repetitum hic optimam tuliſſe opem. In quibuſdam obſervavi neque hæc quicquam profuiſſe, quin potius inſirmos aliquando evomiſſe bilioſa, indicio, ventriculum una cum primis viis, cruditatibus acribus, bilioſis, adeoque cauſa morbiſica adhuc eſſe repletum, iis bis dedi *rad. Ipecacuanb.* & quidem pro doſi *ʒij.* inde frequentiores habuerunt vomitus, pauciores dejectiones, quo facto, reliquum curæ *adſtringentibus*, *incrāſſantibus*, *anodynis*, v. gr. ſequenti *pulvere* aliquoties exhibitio, & ſingulis 6. horis repetito, *ʒſ. cryſtall. mont. corall. rubr. præp. terr. japon. ana gr. viij. theriac. cæl. gr. iij. iv. laudan. de trib. gr. ſſ.* aliquando *gr. j.* M. feliciter peractum fuit. Tres perſonas notavi, quæ, abſumptis jam roſcidis & baſamicis lymphæ particulis, ſpiculis autem acribus, adeoque doloribus, auctis tandem, ſupervenientibus dejectionibus atris, cadaverofum odorem ſpirantibus, indolentibus, artuum refrigerationibus, mente ac ſenſu privata *gangræna* & *ſphacelo inteſtinorum* obierunt. In alia matrona 5. diebus ante mortem præceſſit ſingultus, omnem caſtorinorum & opiatorum ethicaciam eludens, inflammationum & convulſionum internarum, nec non mortis imminentis prænunciuſ. Menſe Octobri in ſcenam prodierunt morbi vitio *renum* & *veſicæ* orti. Sic in Perilluſtri quodam Domino, ſeptuagenario, alias robuſto, notavi *Iſchuriam*, ſive totalem urinae ſuppreſſio-

nem, ex *calculo renum* tubulos obſtruente, natam. Adſuerunt maximi dolores circa lumbos, vomitus frequentes, anguſtiæ & anxietates præcordiorum, obſtinata alvi obſtructio, nullus veſicæ tumor, nullus in pube dolor, nulla perinæi gravitas, nulli calores, imo pulſus naturali fere ſimilis. Cathetere flexili ſæpe immiſſo ne gutta urinae extrahi, aut *calculus* in veſica latens deprehendi potuit. Adhibuimus ſæpiſſime *clyſteres emollientes*, *balnea aque dulcis una cum herb. petroſel. malv. parietar. chamomill. melilot. verbaſc. ſtram. aven.* &c. unguenta pro inunctione lumborum, ex *unguent. roſac. ol. ſcorp. Maſch. ſucc. citr. præp.* &c. Interne fere quotidie dedi *decoctum ex ſpec. dialth. Fern. & aperitiv. For. cum ſol. ſenn. mechoacann.* quibus magnam ſeroſorum humorum, alias ad renes tendentium, copiam per alvum eduximus, ne guttam vero urinae elicere potuimus, Potus ordinarius conſtabat ex *ſpec. dialth. Fern. & aperit. For. cum raſ. C. C. ſem. anif.* Ex *diureticis*, *liſchonthripticis*, *pellentibus*, ſumpſit *tinct. ſal. tartar. ſpir. ſalis dulc. baſf. ſulphuris terebinth. ſuccinat. ſal. gemiſt. ononid. fabar. ſpir. ſalis coagul. tartar. Vitriolat.* aliaque, imo pro exigentia ſymptomatum utpote vigiliarum, dolorum, etiam *laudan. de trib.* in reſracta doſi, alvoque libera exiſtente; pro corroboratione virum *conſortantia*. Sic tandem ſeptima morbi die robore naturæ moti ſunt *calculi* ex renibus in ureteres, cum vehementi, lancinante, pungente dolore; ex his brevi delapſi in veſicam urinariam: patente jam exitu parum urinae, non quidem ſine dolore, emiſit, mox una cum tribus lapillis, magnitudine fabarum, urinam ſubcruentam, ſine dubio ex laceratis vaſculis a calculorum aſperitate, excrevit, & poſt ſubnigram, tandem, & quidem abunde, pallidam, copioſa materia viſcida, ſabuloſa reſertam. Dolores ſtatim poſt excretionem urinae evanuerunt omnes, remanente ſolum laſſitudine ulcerosa ſenſuumque torpore, donec vires ſuas deperdiſtas recollegit, atque ex integro convaleſcit. In aliis eodem tempore obſervavi ſummum *urinae ardorem*, ubi quidem fere nullus urinae fuit defectus, maximus tamen dolor, & in urethra ignea quaſi roſio. In aliis *Stranguriam* animadverti, ubi continuus fuit ad mingendum ſtimulus, nihil tamen, niſi una vel altera gutta effluxit. His omnibus feliciter medebamur *decocto aperit. For. dialth. Fern. cum ſol. ſenn. clyſt.*

steris, nec non *topiis*, *balneis*, aliisque superius allegatis. Inter morbos illius temporis etiam occurrit *Passio Iliaca*. Hac corripiebatur quidam Vir Juvenis, *hernia scrotali* jam ab aliquo tempore laborans, alvi nempe contumacissima obstructione, vomitibus frequentissimis, doloribus circa umbilicum summis, instituta autem repositione, nec non adhibitis crebrioribus enematibus, aquis laxativis, cataplasmatibus ex decoctis emollientibus, alvus stimolata sui officii memor copiose excrementa reddidit, evanuerunt dolores, nec non Vomitus, imo jam periculum evasisse ab omnibus iudicatus fuit. Sed ecce, diebus aliquot elapsis, nescio quo errore commisso, in eundem morbum recidens, accedenti febre, vomitibus stercoreis, obstinata alvi constipatione, sudore frigido in extremis, doloribus atrocissimis, delirio, singultu, virium languore, & ultima die dejectionibus spontaneis, septima recidivæ die, remediis prioribus nunc nihil proficientibus, extinctus est. Jam addam, quæ de immodico hemorrhoidum fluxu notavi. Fuit Vir quinquagenarius, artis pharmaceuticæ peritissimus, ex familia, cujus indigenis masculis hic affectus quasi proprius, ortus. Is jam in ætate sua juvenili fluxum hunc sanguineum expertus est, qui si statim & definitis temporibus, singulis nempe mensibus, moderate rediit, sanitati quam maxime profuit; si vero ex voto non successit, statim toti corpori languorem induxit, intestinorum tormina, gravitatem circa os sacrum, calores febriles quasi continuos, biliosas capitis destuxiones, oculorum inflammationes &c. conciliavit. In ætate virili sanguis non amplius moderate ad uncias, sicuti ante, & menstruatim, nescio qua sanguinis acrimonia aut vlarum laxitate, non periodice, sed singulis fere septimanis, ad libras manavit cum notabili virium deiectione, faciei colore ad viriditatem inclinante, gravitate in coxis, in cruribus magna debilitate, ut vix incedere potuerit. Sisti cito hic fluxus non debuit; sanguis enim statim regurgitavit ad pectus, & anxietates præcordiorum, respirationem difficilem, palpitationes cordis induxit. Cum vero immodicus hic fluxus latentem hactenus cachochymiam, nec non acridinem & falsedinem sanguinis insignem prodiderit, imo aut hydros, aut phthisis, aut apoplexia exinde metuenda, & vires jam labantes medelam urserint, suasi omnino in brachio *Vena sectionem*, *roborantia* & *temperantia*,

acidula, bilem acrem, lentam, rosivam corrigentia, & per epicrasin educentia, v. gr. *Tinct. rosar. corall. mart. aperit. c. succ. oxalid. M. Tinct. feri lact. caprin. cum tamarind. & rhabarb. fact. pulv. hepat. sal. cichor. grana granatorum acidorum succulentia*, quæ masticavit ejusque succum deglutivit, *pulv. cachect. Qu. lup. cancer. crud. smaragd. præp. corall. mag. perlar. emulsiones ex sem. frig. cum decoct. hord. & julep. rosac. fact. nitrosa ipsa, compos. Sperniol. Cr.* quibus ebullitionem in sanguine nimiam compescuimus; fluxum vero immodicum blandis adstringentibus cohibuimus, v. gr. *Tinct. mart. adstring. lap. hematit. eff. trav. mat. fir. de ros. siccis, myrtill. trochisc. de spond. carab. croc. mart. adstring. dent. eq. mar. f. hippopotam. succo urticæ express. & depur. infusa millefol. sanguisorbe, vino rubro ex infuscarn. cotoneorum*, aliisque in primis topicis, v. gr. *unguento Comitissæ*, quo inungi debuerant hemorrhoides, & dorsum, aut aliis fomentis, linimentis & fotibus ex *succ. plantag. burf. pastor. verbasc. sangu. dracon. thur. terr. sigill. rad. bistort. tormentill. &c. it. vernice*, in qua intinctus fuit pannus lineus & cum *ol. rosar.* admotus *Polygonum*, utpote singulare & decantatum euporiston, sub axillis frequenter gestavit. Observari autem diligenter debuit, ne alvus plus solito adstricta fuerit. Hac igitur methodo symptomaticas excretiones temperavimus, atque Pharmacopæum nostrum ad multos annos conservavimus; donec tandem mœrore animi confectus, & viribus jam exhaustus placidissime obiit. Mense Decembri luctuosa epilepsia notavi phenomena. Puer octennis noctu hora xii. in aream mictum exiens spectrum ibi perspicit, horrore ac terrore plenus summo cum angore & clamore in hypocaustum & lectum veluti furatus rediit. Vix sese ad quietem componens tentabatur horrore, sudore frigido, affectibus convulsivis. Mane accersitus deprehendi inordinatam ac involuntariam membrorum concussionem, modo cessantem, modo redeuntem. Affectus hic indies invaluit, & secutæ sunt brevi gravissimæ convulsiones nervosi generis, genarum labrorumque terribiles spasmi, adfuit continuus digitorum, velut aliquid comprehendentium, lusus, contumacissima alvi adstrictio, nulla spuma circa os, oculi manserunt aperti & irretorti, respiratio libera, oris autem distortio enormi, largorifu mox superveniente; dentes valde coe-

runt

runt, ut pro infundendis cibis liquidis & medicamentis, instrumento aperiri debuerint, articulata vox periit, & nil, nisi clamor remansit, mentis operatio defecit, nec sensu nec memoria alicujus rei extitit, sedere, stare, ambulare nequivit, & quando mater ipsum elevare voluit, mox instar globi sese incurvavit, mox in alios incredibiles flexus instar arcus sese præcipitavit; nec paroxysmus inducias concessit, sed duos menses indefinenter fere diu noctuque continuavit. Terrorem morbum hunc convulsivum produxisse, extra omne dubium est, licet non excluderem *vermes*, quorum aliquot ante & in morbo excrevit. In hoc tumultu morbiq; vehementia pro demulcendis partibus convulsis, vellicatis ac distortis, *antepileptica specifica* sæpissime exhibita, v. gr. *pulv. epilept. M. spec. cephal. Mich. mag. cran. hum. ungu. alc. præp. unicorn. mar. cinnab. nat. castor. aqua epilept. Lang. hirund. c. castor. &c.* nullum præstiterunt emolumentum. Vomitoria cum *Laxantibus* mixta, v. gr. Recipe: *Aqua laxant. ʒij. syr. Emet. A. S. ʒʒ. M.* pro una vice, quæ pro educendis humoribus biliosis, cum acido confermentatis, fixis, binis vicibus exhibui, observavi hic felicissime profuisse. Jam optimo cum successu reiteravi specifica, v. gr. Recipe. *Specif. cephal. M. gr. viij. pulv. epilept. ʒʒ. castor. gr. viij. ungu. alc. præp. aut unicorn. mar. gr. v. M.* eaque quotidie bis aut in forma pulveris, aut potionis, additis aquis appropriatis & syrupis, præscripsi, quibus aliquando gratum ʒ. aut ad summum gr. j. *laudan. de tribus* addidi. *Enemata* multum profuerunt. Atque sic post duorum mensium tædia expugnatus fuit morbus, ut jam puer sui compos stare, ambulare, sedere, cibum ac potum capessere, articulate loqui potuerit. Subsecuto mense *Majo*, ne in posterum recidivaret, misi illum ad *Thermas Badavino-Austriacas*, ex quibus redux immunis jam ab hoc execrando morbo vivit, & quod mirandum, sine ulla mentis aut memoriæ labe. Hoc mense duos notavi *Apoplecticos*. Unus octogenarius ex ordine senatorio, prævia vertigine, lassitudine membrorum, de subito *apoplexia* correptus cum sensus ac motus abolitione, pulsu magno, in debilem tandem & frequentem mutato, omnibus incassum adhibitis, secunda morbi die placidissime obiit. Alter fuit Reverendissimus hujus loci Plebanus, 56. annorum, atque habitus corporis obelioris. Hic, dum nocte

Natalitii Domini hora secunda matutina sacris peragendis intentus, præ verecundia, justo diutius retinisset urinam, ab altari reversus de tremore, vertigine, anxietatibus conquestus est, mox domum vectus & in lectum delatus ex regurgitatione seri urinosi ad superiora *Apoplexia* fortissima eum stertore, spuma ante os, tactus, spatio semiquadrantis, adeoque eadem hora, qua sanus fuit, repente interiit.

*Constitutio Epidemica Sempronienfis
Anni 1707.*

JANUS bifrons eadem serena fronte, quæ veterem annum denis serenissimis diebus clausit, auspicatus est novum totidem serenis, calidis, siccis diebus, unde statim x. die ingruerunt frigora, mox subsecutæ sunt nives copiosæ, quæ congelatæ ad festum Purificationis usque jacuerunt durabiles. Secundus *Februarii* dies totus fuit turbidus, & regula rusticorum hoc anno verissima: Sole nempe micante, die purificante, nix aut frigus erit majus, quam ante. Eo ipso enim die remisit frigus, nives liquatæ omnes, ingruerunt pluvix, nebulæ, quæ ultra septimanam instituerunt, densissimæ, sordidæ, corporibus nostris valde infestæ; die 17. 18. rigidos habuimus ventos, boreos, qui siccarunt terram. Jam ad aliquot dies frigoris vis soluta sed die 24. Festo *Matthæi* intensior facta in medium *Martii* continuavit; adeoque *Februarius* fere totus siccus fuit; *Bacchanalia* amœnissima, serena, calida, dies *Cinere* valde frigidus, ventosus; medio *Martii* ceciderunt nives, mox secutæ sunt pluvix. *Æquinoctiale* tempus notabatur valde turbidum, pluviosum, nivosum, lutosum, imo ad finem mensis usque tumultuaria tempestas, mox ventis, mox nivibus, aut pluviis, molesta, raro serena; adeoque *Martius* valde humidus atque ingratus. *Aprilis* incepit cum nivibus, pluviis, mox insecuta sunt frigora, quæ tempestas tumultuaria x. continuavit diebus imo totus mensis magis fuit frigidus, ventosus, quam calidus. Ipso quoque *Majo* cælum, si paucos amœnos dies exceperis, ut plurimum atris inhorruit nubibus, & dies turbido aëre frigidisque ac frequentibus pluviis reddidit minus vernaes, minus majales, rigidi præter morem extiterunt. Mense *Junio* longe aincenior ac placidior aura comparuit. *Medardi* die valde serenus sine ullis pluviis, & rediit nunc calor intensissimus,

mus, imo, quod ex tot aëris vicissitudinibus & cæli inclementia, superioribus mensibus prægressa, nullus præsumpisset, multo minus credidisset, jam ante diem Viti copiose uvas in flore deprehendimus; die XVI. supervenerunt pluvie gratiosissimæ, fructiferæ, mox æstus increvit, & fere tribus septimanis indefinenter, nulla intercedente pluvia, continuavit, cujus ardore terra valde exiccata dehiscere, homines autem ob largiores sudorum effusiones defatigari debuerunt. Febres *continue* modo cum, modo sine exanthematibus, modo benignæ, modo malignæ, prouti apud nos quotannis observantur epidemicæ, ita & hoc semestri fuerunt frequentes, in quam plurimis malignitatis expertes, & methodo ordinaria, superioribus annis jam tradita, tractatæ, plerumque die XV. in alio nono, in uno septimo, prægressa eodem die hæmorrhagia critica, ex voto solutæ. Alios invasit cum maxima malignitate. Sic honesta quadam scæmina, quadragenaria, ex eadem *febre* die morbi denum XI. incepit delirare, quod alias pro pessimo & fatali signo habeo xv. recesserunt calores, sed quinque diebus & noctibus insomnibus continuis transactis, valde deliria ab assumpto *pulvere epilept. M. mag. marg. perl. pulver. analept. castor.* nec non grano uno *laudani de tribus*, somno quidem jucundissimo quievit, sed expergescens in gravissimas incidit convulsiones, cum continuo tendinum insultu variisque labiorum spasimis; tandem XVII. die, adhibitis frequentioribus *antipilepticis, confortantibus*, nec non *enematibus*, alleviata præter omnium spem convaleuit. Et sicuti serotina deliria latentem produnt malignitatem, si non exitium ipsum, ita præmatura funestum semper præfagiunt exitum. Observavi hoc iisdem mensibus in filiolo sex, in juvene XVII. in Viro L. annorum, qui omnes ex *febre maligna* tertia die inciderunt in continua deliria, sexta convulsi mortui sunt. Atia scæmina melancholica, & simul gravida, cujus maritus cum quatuor prolibus simul & semel mense Martio in uno cubiculo, epidemiali hoc morbo decubuerunt, (qui tamen convalescerunt omnes,) eadem *febre maligna* detenta cum *uvule ac tonsillarum inflammatione* summa octava recentem enixa est puerum, inde valde debilitata nona delirare incepit, & ex calore, viribus exhaustis, emaciato corpore, vigiliis continuis, credebatur certo certius peritura. Sed ea fuit fortitudine, ut *sudori-*

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

feris, confortantibus, Epilepticis, rite tractata calores illos intensos ultra xxx. dies sustinuerit, & periculum evaserit, remanente aliquali mentis labe. Mense Januario singularis contigit casus. Puella xv. annorum ob leves errores commissos matris castigationem verita sibi ipsi mortem consciscere voluit, sumptisque aliquot granis *mercurii sublimati* incidit de subito in continuos vomitus, alvi fluxus cum gravissimis intestinorum torminibus, siti magna, linguæ ac faucium ariditate; sed causa horum symptomatum mox patefacta, accersitus exhibui *theriacalia*, in primis *crystall. mont. 3ss. cum ol., amygd. dulc. it. jusc. pinguia*, & loco potus ordinarii *lac bubulum* suasi; his acidum venenosum absorptum, acrimonia obtusa, & puella ab interitu vindicata fuit. Venena enim mineralia sola corrosivitate agunt, ex qua, si non statim ab initio idoneis medicamentis succurratur, *necrosis*, & ex hac sanguinis & feri destructio. Hoc videre licuit in scæmina mediæ ætatis, nutrice, cui ab alia *arsenicum citrinum* malitiose in jusc. propinatum fuit, intra paucas horas extincta. Hæc cardialgia lypothymiis, intensissimis torminibus, vomitibus, alvi defectionibus cum irritatione acerrima valde agitata; post mortem exhibuit stomachum & intestina partim *gangrenata*, partim *sphacelata*, erosa, sanguinem nigerrimum. Eodem tempore vir quadragenario major, sanguineus, diu noctuque per triduum somno profundo, *lethargo* vix absimili, quasi sepultus jacuit, sine ulla alteratione febrili, aut pulsus mutatione, quarta, *Potione Laxativa mannata* sumpta, expergescens, sibi optime præsens, atque ad interrogata apposite respondens, de *prostratione virium*, & sequenti die in brachio dextro de *tumore*, aliquali *rubore*, sed *dolore* summo valde conquectus, sexta obortis *caloribus* & *supervenientibus deliriis*, atque omnibus incassum adhibitis, *su locatus* obiit. Hac hyeme *articulorum dolores* sine inflammatione, sine tumoribus, valde grassati sunt, ubi *laxativa, aperientia, precipitantia, decoct.* nempe *aperitivum cum sol. fenn. S. S. rhubarb. mann. tartar. lap. cancr. præp. sal. acetosell. cichor. diagryd. sulphurat. sp. pulver. hepat. flor. nitr. tartar. Vitriolat. &c.* sæpius adhibita omne absolverunt punctum, & intra quadragesimam medicam morbi vehementiam infregerunt. In honesta quadam scæmina iisdem *doloribus* detenta, sed *alvi fluxu* simul laborante,

Q q q

septima die morbum notavi jam solutum. Præstat igitur in his affectibus *alvum* habere magis *laxam*, quam *adstrictam*. Mense *Februario* in *ablaſtatis* & *laſcentibus* copioſas obſervavi *febres catarrhales*, quæ invaſerunt *renellos* cum *tuffi vehementi*, *caloribus continuis*, *ariditate faucium*, *facie floridiori* & *rubente*, *siti*, *ſternutationibus*, *reſpiratione frequentiori*, in aliquibus inter *reſpirandum* cum *ſtertore* & *ſonitu*, utplurimum cum *dentitione*. Profuerunt hic *enemata* ſæpe *adhibita*, *exſellentia temperatio- ra*, *aciditatem lymphæ corrigentia*, cum *pe- ſtoralibus mixta*, v. gr. *pulv. alexit. epilept. ſpec. diatr. antihect.* *Por. lap. C. C. philoph. ſyr. peſtorales*, *inunctiones ex ungu. peſtoral. rubr. potab. cum ol. irin. anif. deſt.* &c. *ratione ſimul habita virium*. Atque hac metho- do omnes ante nonum diem ſeliciter ad ſanitatē perducti ſunt; *convulſionibus* au- tem *epileptiſis* ſimul tentati perierunt fere omnes. Vernale tempus *phthiſicis* & *hecti- cis* valde grave, quamplurimis funeſtum fuit. Sic inter alios officialis, nec dum tri- cenarius, ex caſtris ſub finem *Nov.* præteri- ti anni redux, & jam ab aliquo tempore *hectica pulmonari* laborans de *tuffi* vehe- mente, *gravitate peſtoris*, *copioſa materiæ purulentæ* *expuitione* valde conqueſtus eſt. Affectum hunc curatius examinans ex *ro- rida partium nutriendarum ſubſtantia* jam fere conſumpta, ex *calore* non amplius la- tente, ſed jam *manifeſto*, ex *pulſu frequen- tiori* & *celere*, in primis poſt paſtum, ex *urina oleagiноſa*, ac *difficili reſpiratione* ad *motum* quamvis atque *aëris alterationes*, ex *frequentiori tuffi* quandoque *ſicca*, quan- doque cum *sputo purulento*, quam utplu- rimum, ſumptis cibis, ſecuta eſt *vomitio*, ſecundum *hectica febris gradum* jam im- minere, atque *humorem nutritium* in *gelati- noſam* magis *ſubſtantiam converſum* quaſi *deliquari*; ſive *pulpas carniū* hinc inde in corpore *manifeſte quaſi depaſci*, quæ *ſpe- cies febris Marasmodis* dicitur, *judicare* de- bui. Externe pariter & interne *adhiberi* curavi *remedia*, quæ alias huic affectui habentur *appropriata*, *expectorantia*, *abſter- ſiva*, *analeptica*, *refrigerantia*, *traumatica*, *obtundentia*, v. gr. *pulver. anonym. ſpec. diatr. lac. ſulph. pulv. Haly. lap. cancr. ſpec. de gemm. frig. pulver. analept. anti- hect.* *Por. ſpec. pro decoct. flor. & fruct. ſpec. peſtoral.* (quibus quandoque *beneficio alvi* non ſuccedente, *addi mannam elactam*) *Syr. de injub. flor. papaver. loch. ſan. & expert.*

de pulmon. vulp. conſerv. roſar. bellid. ruſſi- lag. *emulſiones ex ſeminibus cum decocto bordei*, *julepo roſaceo* & *nitro perlato* pa- ratas, *gelatinas ex herbis peſtoralibus* &c. *lac caprillum cum ſacebaro mane potum*, aliaque; *externe unguent. rubr. potab. peſto- ral. cum ol. irin.* nec non *emplaſtra peſto- ralia uſitata & cataplaſmata*. Cura hæc hyemalis videbatur ſuccedere ex voto, re- diit *appetitus*, redierunt *vires*, remiſerunt *calores*, non niſi poſt paſtum revertentes. Aſt *induciz ſolum* ad breve tempus fue- runt, nulla *pax*; Inſinuavit enim ſe ma- lum, nobis id minus opinantibus, increve- runt *calores*, ſæpe velut *paroxyſmos* *fe- brium æmulantes*; ſupervenerunt *ſudores no- cturni*, vel *matutini colliquativi*, *virium proſtrationes*, *reſpiratio anhelofa*, *indicio manifeſto*, *miaſmata pulmonum ulcerativa* in *maſſam ſanguineam* copioſe *delata* ibi- que *confermentata*, *ignem peregrinum in- ternum* non ſolum hætenus *ſoviſſe*, imo *eroſione* ad *plottidem producta*, *vocem rau- cam conciliaſſe*, verum etiam *alimentarium* ac *roridum lymphæ nectar acrimonia ſua* *vôlatili*, aut *ſemmento ſuo putrido* penitus *inquinaſſe & deſtruxiſſe*, ut jam *corpus ma- rasmo incurabili conſumptum*, *pedes vero tumidi*, & *cutis vix oſſibus hærens*, tan- quam *funeri ſuo propemodum ſuperfuerit*, donec tandem *lenta morte tabeſcens* mense *Majo* placidiſſime obiſſet. *Hecticam ex ſcot- buto calido* natam obſervavi in juvene xvii. annorum. Is alias *melancholicus*, vitæ ſe- dentariæ *amans*, ſæpe ſenſit *tumorem* in *ſiniſtro hypochondrio*, aliquando *febriles al- terationes*, *brevi tranſeuntes*, *palpitationes cordis*, *frequentes phlegmatis moleſte ſalſi* & *tonſillis aliſque oris glandulis rejeſti*, in primis *matutino tempore*, *excreationes*. *Facies* fuit *lurida*, *pallens*, *ſubtumida*, *macu- lis copioſis*, *lividis*, *granulatis reſerta*, quaſi *pulvere pyrio aſſata*, *indicio certiſſimo*, *liquores vitales a ſalibus acido bilioſis*, *acri- bus*, valde jam eſſe *deturpatos*, unde *parti- culis ſulphureis rarefactis* *facillime febris lenta, hectica*, ſeſe *inſinuare* potuit. *Calor* fuit primo *occurſu mitis*, paulo poſt *acer & mordax*, qui ſemper circa *veſperum* ſub ſchemate *febrilis paroxyſmi* rediit, ſed in *inflammatorios calores* terminavit; obſer- vabatur jam *urina oleagiноſa*, *reſpiratio difficilis*, *ſitis magna*, *appetitus proſtratus*, *emaciatus corporis habitus*, *continua pul- monum oppreſſio*, *virium languor*, *decubitus in dextrum latus* valde *moleſtus*, *tuffis* cum

eum sputo purulento, spisso, fœtido, corpus sudore tota nocte quasi disfluxit cum pulsu frequenti & marasmo, atque contabescens torpidus fuit, morosus, profundis cogitationibus defixus vix ad interrogata respondit, neque claram, sed non nisi submissam & raucam vocem edere potuit, quod vitio pulmonum sanie repletorum, qui aëris copiam, quo vox formatur, imminuunt, natum. Hoc tamen quo notandum quoties alvus fuit concitior, & ad diarrhœam proclivior, toties alleviationem symptomatum sensit patiens. Accessit tandem facies Hippocratica, nares scilicet acutæ, oculi concavi, tempora collapsa, genæ exesæ, malæ protuberantes scapulæ, claviculæ, costæ prominentes, artus cum reliquis musculosis partibus excarnes, verbo: ossa tegit macies, non juvat ora cibus, & fuit sceletio simili. Adhibuimus ex speciosissimo medicaminum thoracorum & scorbuticorum apparatu satis mature remedia, v. gr. pulveres pectorales superius, notatos, cum pulver. hepat. rad. ari, tartar. vitriol. &c. remixtos, linctus, gelatinas, emulsiones, electuaria, infusa decocta ex spec. prodecoct. pittoral. flor. & fruct. nec non herb. fumar. becabung. trifol. fibrin. cichor. acetos. hepat. nob. flor. bellid. aliisque cum sero lactis, aliquando cum aqua ad formam potus Theæ parata; imo mense Majo, cum animadvertissem, heclicos calores aliquantum deferuisse, lac caprillam recens cum modico sacchari, a quo tamen ob acidum vel salum ventriculi fermentum, anxietates præcordiorum, hypochondriorum tensiones, adauctam inde febrem, mox abstinere debuit. Nil vero magis profuit in sudoribus nocturnis, quam unguent. resumptiv. in frigid. Gal. cum saccharo saturni paratum. Ast vehementia & diuturnitas morbi elusit opem & operam omnem; donec tandem medicamentorum pertæsus, accedente extrema virium prostratione, fari necessitatem longiori vita dignus, magno cum parentum luctu perfolvisset. Eodem tempore Franciscanus xxx. annorum laboravit phthisi vera, sive consumptione partium corporis musculosarum a colliquatione & pulmonum vitio orta, quæ fuit cum compressione pectoris, difficili respirio, sed fere sine febre; huic præmissis pectoralibus in primis antihæctico Pot. aliquando cum pilulis de cynoglossa remixtis, exhibitisque subinde laxantibus mannatiss, decoctis quoque aut jusculis ex herbis pectoralibus, resolventibus, expectorantibus

&c. lactis caprilli usus optime cessit. Acrimonia enim humorum salina inde fuit temperata, serum dilutum, corpus humectatum, & ad nutritionem dispositum. In aliquibus observavi febrem heclicam ex Quartana, ut plurimum autem ex febribus continuis male judicatis subortam. Harum enim fermentatio & calor p. n. continuatus lymphæ rorem absumpsit, inde viriam habitusque corporis concidentia; acredo vero, quæ alias, per vices accessit, & tumultus edidit fermentatione continuata, aucta & quasi domestica facta febrem heclicam Marasmoden in uno & altero induxit lethalem. In pueris & puellis III. IV. V. VI. annorum, notavi eodem tempore apud nos alias valde frequentem Tabis speciem, quæ fuit cum abdominis tensione & intumescencia, calore intrinsecus aucto, pulsu circa vespærum celeriore, inquietudine nocturna, carne flaccida, totius corporis extenuatione, etiam in iis, qui avidissime comederunt, ita quidem, ut carne jam ablumpta, ossa omnia prominuerint, sola cute contexta. Faciei color fuit pallidus, subniger & lividus, nulla fere adfuit tussis, nullam sputum, respiratio libera, indicio evidentissimo, hos sine pulmonum corruptione, marcore contextos, causam autem fuisse querendam in mesenterii, ductuum nempe lacteorum, glandularum obstructione, nec non humorum corruptorum in abdomine abundantia; utut non negem, lumbricos tunc simul in intestinis nasci potuisse, qui quandoque in conspectum venerunt. Unde non mirum, cum universi sanguinis systema sale acido jam scatuerit, corpora debito alimento privata, in tantam incidisse maciem. Huic malo quamplurima opposuimus remedia, in primis aperientia, martialia, v. gr. croc. mart. aperit. cum salibus, arcan. dupl. nitrosa pulv. hepat. sal. C. B. tartar. vitriol. antihæct. Pot. lap. cancer. rad. ari &c. aliquando antihelminthica, v. gr. aqua contra verm. cum syr. flor. persic. aliaque Topica, unguent. contra verm. deoppilat. ol. cappar. tamarisc. colocynth. spirit. sal. ammon. &c. sed irritato conatu, omnia, donec tandem lenta tabe consumpti supremam diem clausissent. Osmestres aliquot partus his mensibus habuimus, quos tamen omnes spatio v. vi. vel vii. dierum mortuos observavimus. Jul. incepit cum caloribus, quos tamen quandoque contemperarunt pluvie lenioresque venti, has die x. habuimus copiosas, quas sequentibus xiv. diebus

bus calores exceperunt intensissimi, die XXI. XXII. XXIII. tonitrua horrenda cum fulguribus, quandoque cum, quandoque sine imbris a die XXV. ad finem usque variæ aëris vicissitudines, mox diversi ventorum tumultus, mox frigora, mox pluvix, rarissime solis splendor. Integer *August.* si sex aut septem dies amœnos per intervalla calidos, exceperis, pluviis, & ventis præter ætatis anni indolem, valde rigidus fuit. Pluvix continuarunt ipso *Ægidii die*, sequenti autem, discussis jam nubibus nebulosis, cœlum serenatum gratiora nobis promisit tempora, & secuti sunt XIV. fere dies calidi, sereni, noctes tepidæ, vini culturæ exoptatæ. Medio *Septemb.* rursus varias subiit mutationes tempestas, maximæ exortæ nebulae, solis demum meridiani splendore dissipatæ, sed brevi in pluvias fere continuas, aut de die, aut de nocte, in primis *æquinoctiali die* abeuntes, quæ cœli inclementia ventosa ac pluviosa in *Octob.* usque duravit, unde botri nec dum bene maturi aut digesti iusto citius ob excessivum humidum computruerunt, & deciderunt copiose in terram. Quinta *Octobris* spem fecit haud exiguum serenorum temporum, sed octava valde pluit, a qua ad ultimam lunæ quadrantem, i. e. XVIII. grato solis splendore corpora nostra incaluerunt, quo ipso ingruerunt pluvix, XIX. gelu XX. nives, quorum casus die XXI. cum procellosis aëris agitationibus ac frigore ingens fuit, earum tamen præceps solutio. Jam imminuerunt *vindemiae*, & vinum, quod collectum fuit ante pluvias aut nives, in *Jul.* usque, salibus heterogeneis a mucilagine terrestri & sulphurea quasi ligatis, & in fermentationis negotio sufficienti impeditis, permansit turbidum, mucilaginosum, sed sine fœtore; post pluvias autem contraxit fœtorem putridum, quem retinuit usque ad depurationem, quæ tandem post annum subsequuta est cum grato colore & sapore. Circa finem *Octobr.* autumnalis amœnitas nobis iterum affulsit, quæ toto fere *Novemb.* qui siccus extitit, continuavit. *Decemb.* varius & inconstans fuit, mox frigidus, mox nebulosus, mox pluviosus, unde nives, quæ die S. *Andræ* ceciderunt, brevi tabuerunt. Hoc semestri frequentes habuimus *febres Tertianas*, quæ ut plurimum sine prævio horrore, potius cum corporis gravitate, præcordiorum angustia, vomitibus, siti, capitis dolore, vigiliis, in primis caloribus intensis incepterunt, & primis IV. diebus

continuarum, quam *intermittentium* gentium redoluerunt, donec tandem ad perfectam apyrexiam devenerunt. Initium curæ a *Vene sectione* sumpsi, atque præscripti præcipitania, antifebrilia ex *lap. cancr. sal. ab. sintb. C. B. centaur. min. arcan. dul. antim. diaph.* tandem die intermissionis *Laxativum*; quibus feliciter sexto, aut ad summum septimo paroxysmo sublatae fuerunt. Nec defuerunt *quotidiane*, *quartane*, facili tamen negotio levatae. Eodem tempore viguerunt *febres continue*, acutæ, quæ sub initium videbantur benignæ, tertio tamen & quarto die latentem suam prodiderunt malignitatem; calores enim hæcenus vix considerandi, jam intensiores facti, immanes produxerunt cephalalgias, vehementissimas virium prostrationes, deliria, vigilias, sitim, linguam scabram, fissam, tendinum contractiones, motus convulsivos varios ac inordinatos, quos una cum tremore labiorum in chirurgi hujatis facie observavi frequentes, non tamen, quod mirandum, lethales. R. P. Franciscanis lues hæc fuit popularis, eosque fere omnes hic existentes invasit. Illi enim multum mendicatum & collectum emissi vini novo turbido ac musto se obruerunt, ac corpus prava victus ratione ad *cacochymiam* disposuerunt. Jam reduces cibis luridis esurialibus, pro more & exigentia temporis, stomachum onerarunt, indeque has *febres continuas* sibi conciliarunt. *Vene sectiones* sub initium administratæ optime profuerunt, *diaphoretica expellentia*, v. g. *antim. diaph. mitbrid. dia-scord. Franc. spec. de hyacinth. C. C.* cum *confortantibus* & *antepilepticis* mixtæ omne tulerunt punctum, morbumque hunc præcipitem, qui ex symptomatibus gravidissimis judicabatur pernicialis, ubique septima die nulla interveniente notabili crisi, represserunt, atque omnes, (fuerunt illorum undecim,) ex hoc morbo convalescerunt. Fœminas notavi aliquas ætatis provectioris, non gravidas, *fluxu mensium immodico* laborantes, qui ut plurimum, in primis in plethoricis, ad XIV. dies duravit, & intra octiduum rediit cum languore, lassitudine totius corporis, facie pallida, quasi exsangui, inappetentia, siti, caloribus, dolore capitis, lumborum, hypochondriorum inflationibus, lipothymiis. Causa immodici hujus fluxus eadem omnino, quæ mensium ordinate fluentium; & sicuti in hoc sanguis turgescens venulas, interiorem vaginæ superficiem adeuntes divellit, ac per harum ex-

extremities ruputas nomine menstruorum nigricans lente promanat, donec subsideat aliquantum, ac imminuat eum turgescencia, de quo legi meretur *Bobnius æconom. animal. progymnas.* 16. pag. 254. ita in immodico fluxu eadem vasorum vaginalium oscula rupta, necdum occlusa, sed magis hiantia continuo quasi fundunt sanguinem, modo grumofum, modo serofum, pro habitudine sanguinis & feri hic aut in quantitate, aut qualitate, & motu peccantis atque exitum affectantis. Laxior enim & mollior vaginæ compages admittendis & emittendis sanguinis menstrui ordinarii æque, ac extraordinarii, copiis magis accommodatur, quam solidior ac durior uteri substantia. Cum vero affectus, hic, si negligitur, ut plurimum *cachexiam hydropem, atrophiam* minari solet, maturavi curam, atque in plethoricis quantitatem sanguinis, indeque natam ferocientem turgescenciam deplevi *Vene sectione in brachio* feliciter instituta, excedentem ebullitionem & fermentationem ab humoribus biliosis, acribus, salinis volatilibus, sanguini inductam *uterinis leniter incrasstantibus & adstringentibus*, v. gr. corall. rubr. lap. hemat. trochisc. de cavab. de spod. pulv. Heurn. croc. mart. adstring. terr. sigill. imo terreis omnis generis, Tinct. antiphtisic. Gr. corall. succ. urticae &c. in malo contumaciori & refractatio cum his *adstringentibus sigentia*, i. e. laudanum de tribus accidendi maritavi. In *hypocondriacis, scorbuticis*, ob sanguinis impetus ex obstructione viscerum, in primis mesenterii, non spontaneus fuit, sed qua data porta, ruens coactus, ab *Adstringentium* usu *præcordiorum anxietates, capitis dolores*, aliaque symptomata hysterica notavi. Hic omnino locum invenerunt *Laxantia*, sed lenissima, extra paroxysmum propinata, v. gr. *decoct. fol. fenn. tamarind. & quod specificum fuit, rhabarb.* ipsum in substantia deglutitum. Profuerunt quoque, licet per accidens, cum *confortantibus* mixta, v. g. Tinct. tartar. corall. compos. sperniol. Cr. aliasque *martiali temperata*, acorem simul abscorbentia. Pro meliori tandem viscerum & vasorum firmitudine, nec non fibrarum ac pororum coarctatione, optimo cum successu ablegavi illas ad thermas *Badarvino-Austriacas*, ex quibus reduces ordinariam, & naturæ convenientem menstruum fluxum expertæ sunt. In Perillustri quadam matrona notavi *Tumorem exiguum in pudendis*, qui tamen non extra pudoris sinum propendebat, sed, men-

sibus non fluentibus, quotidie crescebat & intumescebat valde, mensibus autem fluentibus, qui sæpe intempestivo, aliquando immoderato & continuato ad aliquot septimanas fluxu urgebant, detumescebat. Adnatus fuit *uteri orificio*, cuius substantiam cum vagina & pudendis absque hoc spongiosa, rugosa & glandulosa est, in qua varii generis humores stagnare & subsistere possunt, inde tumoris incrementum & decrementum. Tentavimus *injectiones cum aqua calceis vivæ, decocta lignorum* aliaque, irritato tamen conatu, suasi tandem *incisionem*, quam reformidarunt *Chirurgi Viennenses*, atque potius naturæ hoc opus committi, quam crudele & anceps sectionis remedium experiri decreverunt. Ejusmodi tumorem utero extrinsecus adnatum, tres libras ponderantem, in virgine xxiv. annorum felicissime secuit *Chirurgus Halberstadensis*, cuius mentionem facit *Frider. Hoffmannus in annotat. super Poterii opera, cent. III. capit. 47. pag. m. 332.* & ipse *Poterius eodem loco*, nec non *Blancardus in Collect. Medic. centur. 3. observ. 51. pag. 421.* Sarcoma autem totam uteri vaginam occupans forasque propendens, atque interno ejus orificio adnatum observavit *Kerkringius Specileg. Anatom. Observ. 53. pag. 114.* ex uteri orificio interiori varias excrescentias membranaceo-carnosas propendentes *Ruyschius, Centur. Obser. Anatom. chirurg. 6. pag. 13.* nec non *Bartholinus Centur. I. hist. 94. pag. 139. Centur. II. hist. 6. pag. 161. Centur. II. hist. 58. pag. 248. Sogerus in M. A. C. decem. I. ann. 2. pag. 199.* aliaque. Laboravit simul *fluore albo*, effluxitque fere indefinenter e pudendis materia purulenta, fœtida, sed sine dolore, indicio certissimo, serum seu lympham hic sola peccare copia, deponique in glandulis per uterum illiusque vaginam disseminatis, quæ nimium laxantur, ductus autem excretorii inde valde dilatantur, & sphincteruli, quibus hi ductus claudi recludique solent, a peccantium humorum, qui in vasis sunt fluxiles, jam extra vasa latefcentes & ichorefcentes, mucosi, copia magis vel minus resolvuntur. Pro depletione feri excrementitii & viscosi, cum sit plethorica, ordinavi *Vene sectionem in brachio, fonticulos, laxantia ex manna, rhabarb. fol. fenn. diuretica, terebinthinata nempe & succinata, mag. lap. cancr. decoctum dauci, aperitivum Fort &c.* non omisis quandoque *martialibus & tartareis*. Serum corrigere, ejusque qualitatem cum

cum sanguine contemperare, nec non utrum glandulasque flaccidas roborare voluimus infuso ror. mar. cum vino, pulv. absorbente Vvedel. pulv. ex ebor. unicorn. fossil. off. sep. corall. osteocoll. test. ovorum calcinatis, perlis, alum. plum. sacchar. saturn. tinctur. corall. essent. lign. in primis elix. Propriet. rhabarbarino mane ad 49. guttas & vesperi vero sequenti pulvere: Recipe margar. osteocoll. carniol. aa. ℥ijss. corall. rubr. prepar. margar. prepar. mastic. gummi. arab. off. sep. unicorn. fossil. ebor. aa. gr. XV. ol. lig. sassaf. gutij. M. & dividatur in v. dos. it. Recipe rad. chin. sarsaparill. a. ʒj. passul. min. ʒj. mastich. ʒij. alum. plumos. ʒj. sem. anis. ʒj. concis. D. ad nodul. Spec. Sackel zum Vasser. fieden, pro potu ordinario: nec omisimus Topica, inunctiones, suffitus ex salvia, mastiche, succino, rhure, imo nil intentarum reliquimus, eradicae tamen penitus affectum hunc contumacem non potuimus. Cum autem ex longa praxi constet, fluorem hunc album quandoque, in primis valde obesis, prout nostra fuit, & jam a lunari tributo fere absoluta, nec adeo enervata, in quibus humores turgent, si non est immodicus, proficuum esse, & pro fonticulo microcosmi habendum, qui impedit, ne corpus in majorem excrescat molem, abstinendum jam a medicamentorum usu, & curam ad thermas majales differendam duxi. Hypochondriaci variis, & gravibus symptomatibus his temporibus tentati sunt; in quibusdam ventris inferioris viscera, in aliis præcordia, in aliis cerebri confinia maxime affici videbantur. Ex multis unicum saltem hypochondriaci enarrabo exemplum, in quo syndrome gravissimorum symptomatum apparuit. Vir, ætatis mediæ, temperamenti cholericæ, habitus corporis tenerioris, ipso æquinoctii autumnalis die incidit in ventriculi dolorem, quem pressio pede secuti sunt æstus vagi, atrocissimi capitis dolores, cordis palpitantes, anxietates præcordiales, dolor & constrictio in pectore, sive gulæ strangulatio, quæ suffocationem minabatur, præcordiis enur. constrictis, non solum respiratio difficilis, & ad motum quemvis laboriosa fuit, sed & non raro supervenerunt animi deliquia, ex quibus laboribus & angustis sudor erupit frigidus; in partibus extremis notabantur spasmi & stupores cum fornicationis sensu & tremore undulante, in somno pavores, terrificis insomniis interturbati, continua intellinorum murmura,

in ore sapor biliosus, alvus ut plurimum obstructa. Observavi autem ex symptomatum horum confluxu suffocationes has hypochondriacas plerumque fuisse spasmos & contractiones partium nervosarum, ortasque a ventosa & humorosa hypochondriorum sentina. Sæpe ex mœstitia nimia, atque diutius continuata, nec non excessiva lætitia, in has incidit ægritudines. In paroxysmo, præmissis clysteribus, eximie profuerunt, & omnibus palmam præripuerunt castorina cum anodynis mixta, v. gr. pulv. castor. gr. viij. epilept. M. ℥ss. specif. cephal. g. v. laudan. de trib. g. j. M. it. mist. simpl. cum ess. castor. anodyna maritata. Extra paroxysmum in eam maxime incubuimus curam, ut humores viscidos, acidos, obstructionum auctores, attenuaremus. Multi in hoc passu multa laudant, atque pro specificis venditant. Nos in tanto medicamentorum apparatu in martialibus & blandis laxativis, v. gr. Rec. Vitriol. marr. g. j. diagryd. sulphurat. g. iij. pulv. hepat. g. viij. ol. carminat. M. gut. j. M. pro j. vice, indubitata semper medelam invenimus, imo hoc pulvere exhibito imminuentem sæpe paroxysmum declinavimus, levi enim eguit purgante, quantum vel infans vj. septimanarum vel minor adhuc ferre posset, sed singulo mense bis eundem pulverem in usum vocare debuit, inde alvus ocies soluta, & molestissimus affectus sublatu fuit. Non minori voto successerunt acidula Rautschenses, quarum usu maximam alleviationem sensit. Jam addam, quæ in Viro ecclesiastica dignitate conspicuo de Anaudia notavi. Is LIV. annorum, plethoricus, atque alias hypochondriaco affectui obnoxius, jam mense Julio balbutie lingue laborare cœpit; non enim tantum in concionibus, sed etiam prælectionibus precum publicarum, quin & in communi conversatione quasdam syllabas & voces inter pronuntiandum absorpsit, vel quasi suppressit, ut vix intelligi potuerit, & sumpsit hic affectus sensum atque sensum sua incrementa, donec sub finem Septembris mane derepente incidit in Anaudiam, sive impedimentum sermonis, ut articulate nec duo verba proferre quiverit, cum stupore digitorum manus dextræ. memoria factorum & gestorum, imo reminiscentia reflexiva læsa, neque enim scribendo mentem suam exprimere potuit. Linguam quaquaversum movit, volutavit, exporrexerit, sapissime comedit. Graviora metuens Venæ sectionem in brachio ordinavi

sine

sine mora, nec non medicamenta *nervina*, *cephalica*, v. gr. *spec. diamesch. dulc. diamb.* *contr. apoplex. spec. ceph. M. extr. castor. sal. volatil. succin. C. C. spir. sal. ammon. cum aqua lil. conv. eff. ambr. lign. aloss, sal. volatile oleosum*, aliaque. Linguam in primis frenulum, inungi iussi linimento ex *conf. anacardina, alterm. compl. ol. rut. lavend. cinnam. extr. castor.* His frequenter adhibitis adhuc eodem die sese recollegit, atque intelligentibus loqui cœpit, redeunte simul memoria. Sensus motusque linguæ usus semper perstitit integer, loquelam nunquam amisit, quin potius sermonem exteriorem per motum linguæ exprimere, ob aërem tamen minus sufficienter inter fluantes gutturis sinus impulsium & reflexum, non satis intelligibiliter proferre potuit; natum hoc utique vitio *laryngis*, nervorumque sexti paris, qui sunt vocales. Sermo enim impeditus fuit a resolutis aut relaxatis nimium musculorum angustæ laryngis rimæ constringendæ aut angustandæ dicatorem, ligamentis, quorum fibræ sine dubio a sero nimis copiose, vel per arterias, vel per vasa lymphatica ex toto corpore plethorico affluente, flaccidæ redditæ rimulam haud sufficienter pro allisione & extrusione violenta aëris angustare ac disponere valuerunt. Accessit & aliud malum valde suspectum, *faucium constrictio*, suffocationem, sive strangulationem metiens. Hæc aliquoties, sed derepente venit, ipsiusque fauces quasi laqueo constrinxit, liberamque respirationem inhibuit, brevi tamen remisit. Putabant vitium hære in *pulmonibus*, aut *abscessum* inibi latitare, sed falso; potius a particulis acidis & austeris hypochondriacis, mediantibus nervis recurrentibus, musculos faucium in spasmos cogendo, viam idcirco aëri percludentibus, ne a musclicis respirationi interventibus præ angustia loci facta ex & impelli queat, deducendum. Cum vero vidisset, se quidem voces & verba, nondum tamen expedite, neque semper integro sensu & phrasi proferre posse, urgit ulteriorem curam, quam ob anni ætatem, *autumno præcipiti*, ipsi denegavi, eamque ad incrementa dierum differre volui. Moræ igitur pertæsus incidit in aliquem, qui perfectam mali curam etiam hoc tempore promisit; deditque inter alia *Vomitivum*, ipso solstitio byberno imminente, quo id affectus est, ut quidem magnam humorum saburram, fictitium nempe, aut potius, *imaginarium pectoris*

apoplema Vomitu rejecerit, inde alleviationem ad biduum sentierit, paulo post tamen in maiorem debilitatem, mentis vacillationem ac torporem, propensionem in somnum loquelam difficiliorem inciderit. Nec his acquiescere voluit, sed ordinavit *sumisuctionem nicotianæ*, ipsi alias insuetam, nervis infestam imo *nervinis morbis exitiosam*; experientia enim constat, *Apoplexiam* inter *nicotianæ* usum sæpe invasisse, teste *Deckero exercit. Pract. p. m. 89. & Riccardo Carr, epist. Med. 2. p. 21.* Inde valde obliviosus factus, & sub initium Februarii sequentis anni gravissima *apoplexia* tactus, subito interiiit.

*Constitutio Epidemica Sempronienfis.
Anni 1708.*

CRedidisses hac hyeme denuo permutata fuisse tempora, atque adesse æstatem etiam in frigidissimis alias mensibus. *Januarius* quippe nullum fovit gelu, nullas nives, fuit ut plurimum pluviosus, nebulosus, humidus, nubilus, calidus. *Februarius* quasi totus calidus, amœnus, ut plurimum serenus, quandoque pluviosus, ventosus, & circa finem cum modico frigore & nive, quæ tamen altera die evanuit, unde jam medio mense observavimus diversos flores. Huic ad *æquinoctium* fere usque plane similis *Martius*, amœnus nempe, calidus, qui in copia flores, elicuit. Circa *æquinoctium* die XVIII. XIX. XX. suborti sunt venti valde frigidi, rigidi, qui congelarunt terram, sed sub finem mensis aura iterum comparuit turbida, pluviosa. *Aprilis* præter morem illuxit serenus, calidus, plane æstivus, raro pluviosus, siccior magis. *Majus* variabilis, ad medium usque frigidus, pluviosus, a medio ad finem calidus, amœnus: II. autem, III. & IV. fuerunt pruinae, quæ hinc in vineis damna fecerunt. Totus *Junius* pluviosus, *Medardus* quoque & *Job. Baptista* effuderunt pluvias, imo nulla dies hujus mensis fuit sine pluviis. Toto *Januario* præter *oralgium* in *Viro*, *miclum cruentum* in filiolo quodam post partum, *pleuritidem cum diarrhœa*, nullos fere vidi morbos. *Variolis* tamen laborantes habui, quorum unus erat. VI. annorum, qui eruptis prius tertia morbi die una cum *variolis petechiis purpureis*, quarta die antea correptus *hæmorrhagia navium* mortuus est. Mense *Februario* observavi *Apoplexias fortissimas*, uti quoque *febres continuas VII. die*

die solutas. Hoc mense scœmina quædam enixa est *fatum mortuum secundine* remanserunt, altera die mortua. Murtio filiolum quendam Rustensem *clausura ani* laborantem habui sub cura, de quo *Sculteti Armamentarium* videri potest: succurri etiam scœminæ *otalgia* laboranti *misl. simpl.* mixta cum *ess. castor.* De doloribus capitis, *Vertigine*, *diarrhœis* cum maximis caloribus, *febris tertianis* continuis, *variolis* tunc temporis grassantibus nil adducam. *Aprili*, *Majo* *Junio* continuarunt *variolæ*, quas tamen modo in filio quodam prægressa est *epilepsia*, modo in puella die III. IV. V. secuta est *hemorrhagia narium*, jam in alia die XII. *herpes miliaris*. Quædam *variolæ* confluebant, quibusdam jungebatur sub initium *diarrhœa*, quibusdam *erilepsia*. *Febres* continue *catarrhales*, *diarrhœæ* quoque his temporibus in conspectum prodibant. Mense tamen *Junio* *Variolæ* epidemice grassantes maxime erant malignæ. Sic eas observavi in aliis cum *maculis purpureis*, in alio cum *vibicibus*, in alio suborti sunt XII. die *furunculi* instar *anthracum*, in aliis *tumores* & *parotides* instar *bubonum*, aliis *palatum*, *gingivæ*, *fauces* fuerunt *exesæ*: alios consumpsit calor *bellicus*, inflammatorius, & fuerunt hæc *variolæ* funestæ die X. XXIII. XXVII. Sic malum, sive venenum variolosum in Gratiolo parvulo Ebergeny fuit insanabile, adeoque plus docta valuit arte. Incepit morbus cum horrore, quem ingentes exceperunt calores, quandoque *deliria* *firis magna*, *pulsus celer*, *languores* totius corporis tertia die eruperunt *variolæ*, quarta *maculæ petechiales coloris purpurei*, guttarum instar copiose per cutem dispersæ, inde variolarum excretio retardata fuit quæ tandem omnes coierunt in unam, totamque faciem *crusta*, sanie foetidissima referta, contexerunt. Undecima die supervenit *diarrhœa*, brevi tamen consopita, die XII. aliz effloruerunt *vesicæ*, *aqua limpida flava*, quandoque *sanguine remixto*, plenæ, quæ ordinarias contexerunt *variolas*, magnitudine *ovi columbini*, imo *ovi gallinæ*. Sic haben aufgesehen wie die ordinairen Zangen-Blateern, so durch ein Velicatorium aufgezo-gen werden, oder als wenn man sie in heisz-siedend Vvasser verbrennt hätte, & steterunt per biduum: die XIV. notavimus in dorso lateris dextri tumorem, qui nullo modo maturari potuit, sed resolutus tandem collum occupavit, omnemque maturati-onem respuit, imo sese resolvit. interea

calores continuarunt intensi, accessit *tussis* cum exputione *materiæ purulentiæ*, quandoque *sanguinis*, *fætor oris* fuit cadaverosus: indicio certissimo, pulmones variolis re-fer-tos, valde esse inflammatos, exulceratos, ut plurimum consumptos, si non *sphacelatos* XXIII. demum die pauperculus viribus jam exhaustus obiit. Post mortem observata tota *facies* & *abdomen nigerrimum*, ex quo colligendum non solum totam massam sanguineam, verum etiam omnia viscera corrosivo hoc veneno varioloso fuisse infecta, tandem *sphacelata*. Julius magis pluviosus fuit, quam serenus. Augusti initium æque pluviosum, quinta incepterunt calores, qui toto mense continuarunt. *Ægidiis dies* sine pluviis, & per totum *Septembrem* mira aëris siccitas, calores præservidi, intensissimi, etiam nocturno tempore, qui durarunt usque *æquinoctium*, mane rus cecidit, & supervenerunt *nebulae fructiferæ*. Flavuit ut plurimum hoc tempore auster, bonum alias constantis tempestatis signum. *October* ultra medium serenissimus, pulcherrimus, calidus, d. XIV. XV. noctes frigida, inde in aliquibus promontoriis botri congelati, superveniente tamen solis splendore statim regalati; d. XXVII. ante festum Simonis & Judæ ingentes ceciderunt nives, dies festivus, nempe XXVII. valde serenus, sed frigidus borealis, XXX. nec non XXXI. iterum nixit, sed tertia nix absumpsit priores, ut jam sine damno vindemias nostras uberiores præter expectationem, colligere potuerimus, neque nocuerunt nives, potius conservarunt botros a frigore, vinum autem, quod crevit in abundantia, fuit generosissimum, suavissimum, dulce. In *Novembri* aëris temperies longe benignior, & quidem calidior affulsit, *Decembri* aëre mutato ceciderunt d. VII. VIII. X. nives copiosæ, profundæ, mox secuta frigora, & circa finem denuo nives. Mense *Julio* continuarunt *Variolæ malignæ*, neminem tamen, qui X. annum excessit, hoc tempore invaserunt. Accedebant semper cum *somno*, ita ut nocte dieque dormiverint III. aut IV. diebus. *Augusto* nulli fere morbi viscebantur præter *diarrhœas* & *dysenterias*. Circa finem ob continuas aëris siccitates, calores præservidos, *Sirio* insigniter urente, incepterunt *febres erraticæ*, quæ nullum typum servarunt, invaserunt cum aliquali frigore, insequente calore, aliquando ultra XX. aliquando ultra 40. horas durante, post apyrexiam aliquot saltim interjectis horis novus paroxys-

xyismus accessit, cum capitis dolore, siti, lingue & faucium squalore virium debilitate, ita ut febrem continuam fore judicasses; donec tandem transactis aliquot paroxysmis in tertianam ordinariam degeneravit, quod ut plurimum circa septimum diem contigit. Adhibui *V. S. diaphoretica, præcipitantia*, quamprimum vero notavi tertianas, aut tertianas duplices, exhibui statim *chinata cum arcan. dupl.* optimo cum successu. Septembris continuarunt febres tertianæ, sexto paroxysmo solutæ, ubi optime profuerunt *chinata &c.* De his febribus erraticis vid. *M. N. C. Dec. III. ann. VI. p. m. 177. app. nec non H. M. V. p. 300.* Inter alia notavi, animi effectus quid possint. Officialis quidam incidit in ejusmodi febres, præcessit horror, secuti sunt calores, qui in IV. durarunt diem continui cum anxietatibus præcordiorum, aut pectoris compressione, ut sæpe in lecto erectus sedere debuerit, cum capitis dolore, siti, deliriis &c. Adhibita *Vene sectione in brachio & pede* quinta die remisit calor, qui tandem undecima intermisit, ut jam extra periculum judicatus fuerit. Quid sit, accepto tristi & ingrato nuncio derepente incidit in somnum profundum, & quasi in extasim, ut exinde expergeheri non potuerit, tandem applicatis *clysteriis*, nec non *Vesicatoriis* intra XV. horas ad se rediit, omnium rerum inscius, vix loqui valens præ nimis debilitatibus, alit eodem die relabatur in priorem somnum profundum sicque elapsis vix XII. horis, accedentibus convulsionibus, sine febre comatosus satis cessit. Pari ratione nobilis matrona, quinquagenaria, temperamenti sero-biliosi habitus carnosioris, in sterili matrimonio semper existens, tributum tamen lunare suum accurate, sed largissime persolvens, hypochondriacis nec non hysteriis passionibus valde obnoxia, jam a longo tempore valetudinaria, incidit sub finem mensis Septembris in febrem continuam subsimilem, quæ rite tractata degeneravit in tertianam exquisitam septimo paroxysmo judicatam. Reliquit autem post se summam virium prostrationem, anorexiam, capitis gravitatem, anxietates, cachexiam ipsam. Urina, quam hætenus reddidit, fuit turbida, cum sedimento copiosissimo, mucoso, coloris rosei, non tamen fetens. Materiam hanc hypochondriacam, quam natura, optima morborum medicatrix, per ductus urinarios excretam voluit, jam motam, promovimus digestivis, aperientibus, v. gr. *Supplem. ad Sydenham Tom. II.*

pulp. hepat. tartar. vitriolat. arcan. dupl. sal. cicb. lap. cancr. tinct. sal. tartar. tandem decoct. aperit. For. cum sol. semm. & manna acuto. Quinquies inde dejecit, relicta tamen aliquali, sed torminosa in intestinis hypercatarsi ad biduum; qua sedata melius sese habuit, atque ordinarius mensium fluxus institit. Octiduo post, i. e. quarta Februarii observavi pulsum alteratum, iusto celeriotem, sexta vespere affectum soporosum, propensionem nempe gravem, & invincibilem in somnum, reipsa dormivit, & excitata oculos aperuit, ad interrogata paucis, sed apposite respondit, de nullis doloribus conquesta, mox relapsa in somnum; si adstantes devotas ac pias cantilenas canere inceperunt, ipsa simul expergefacta statim cecinit, neque ante cantare destitit, quam inchoatam absolvit stropham, adeoque semper sibi fuit præsens, omnes cognovit, nunquam sensibus neque internis, neque externis, neque motu destituta, sed valde debilitata, & ad actiones more solito obeundas languida, respiratio fuit integra. Calor febrilis notabatur p. n. lentus acris & mordax, qui vespertino tamen & nocturno tempore intensior, pulsus celer, mollis, facies pallida, subtumida, quasi leucophlegmatica, oculi ultimis diebus quasi turbidi, lacrymabundi. Opposui huic Comati soporoso varia v. gr. *castorina, cinnabarina, jovialia, sal. volatilia, succin. C. C.* cum pulveribus epilepticis & confortantibus remixta, nec non *Vesicatorium* nuchæ applicatum, sed sine operatione, imo irritò successu omnia, donec tandem somnus hic p. n. septima die corpus fratri suo morti tradidit. Paulo post mortem e naribus copiose stillavit ichor serosus. Verissima igitur manet observatio *Vuedelii* opiologie inserta, p. m. 46. fatetur, se nunquam vidisse affectum soporosum vere talem, ubi non adfuisset calor p. n. simul quod & ipse aliquoties jam in praxi observavi. Eodem mense Illustrissima Comitissa gratiosam enixa est filiam, quæ lac sugere ex papilla non potuit, sed id per nares summa cum molestia & anxietate reddere debuit. Examinatis faucibus, columella & tonsilla cum postica parte palati absuerunt, unde lac, quod deglutire non potuit, per nares resultavit. Non diu superstes fuit, tertio enim a natiuitate die, accedentibus moribus convulsivis satis cessit. In causas inquisituri, quare natura in formando corpore a recta formatione & scopo deflexit harumque partium

rium deficientium oblita fuit, sciant, *Illustriſſimam matrem libenter & quidem attente ac conſiderate ſepe in diſtractos canum & felium viſtus ludendo inſpexiſſe*, adeoque horum ſtructuram fortiter ſibi impreſſiſſe. Interim *Vvedelianum porisma*, uvulam nempe ad deglutitionem eximie facere, manet veriſſimum. Parallela aliquo modo hiſce exempla, ſi cui volupe fuerit legere, adeat *Observationes Vvedelii recenſitas in M. A. N. C. legat Dec. II. Obſerv. 5. anna 5. M. A. N. C. p. 12. nec non Salmuth. obſerv. med. 6. cent. 3. pag. 115. ubi ſimiles reperiuntur caſus. Febres erraticæ* adhucdum *Octobri* continuarunt calores autem non adeo fuere intenſi, interim obſervavi *hemitritæos*, ubi febris una die bis venit, & altera ſemel. Vice Colonellus quidam ex febre colica bilioſa cum vomitu correptus incidit in deliria, ex hiſ in convuſiones epilepticas, qui tamen evaſit. Sic alius quidam Vir laboravit febre continua cum maximis debilitatibus, capitis dolore, corroſione & torminibus ventris, ſexta ſupervenit fluxus alvi, ſeptima icterus, qui occupavit totum habitum corporis, cum deſectionibus albis, urina ſaturatori, nigricante, oleaginosa, proclivitate in ſomnum, & ſolvit calores. At initio dedi diaphoretica cum confortantibus mixta, caloribus vero jam abactis ſpec. diacurcum. cum pulv. rhabarb. tartar. vitriolat. ſal. cicbor. trochiſc. de eupator. &c. *Novembri* inceperunt graſſari morbilli ut plurimum benigni. Tuffes ſerine atque catarrhi frequentiffimi. Mense *Decembri* continuarunt adhuc morbilli, qui tamen ſub finem anni maximam induerunt malignitatem, fuerunt valde parvi cum maximis catarrhis, fuerint &c. Quidam correptus ex febre maligna cum diarrhæa, vomitibus, ſingultu continuo, tandem adhibitis *V. S. ſtypticis, caſtorinis*, nec non opiat, quæ prodoſi ad gr. ij. præſcripſi, nona die convaleſcit præter omniam expectationem.

*Conſtitutio Epidemica Sempronienſis
anni 1709.*

Januarius incepit cum frigore, quod a die v. ad xii. valde exaſperatum, imo poſt hominum memoriam acerbiffimum fuit, remiſit tamen ad aliquot dies, d. xviii. vero iterum intendebatur, verbo, nives ceciderunt ſupra nives, gelu ſupra gelu, & continuavit per totum menſem. Mense *Februario* continuarunt frigora, imo xii. & iv.

ceciderunt nives copioſiſſimæ cum horrendo gelu & ventis, ut homo in plateis vix ire potuerit, quam tempeſtatem nemo unquam obſervavit, adeoque vera fuit ruſticorum obſervatio; Sole amicante, die purificante, nix major erit, quam ante. Sol enim hoc die ſplendebat. Poſt novilunium remiſit gelu, ſed rediit die xviii. xix. ingens cum nivibus, quod continuavit: die xxv. & xxvi. longe majores ceciderunt nives cum omni tempeſtatum inſolitarum, frigorum & ventorum genere, quæ præcluſerunt ubique vias, arbores frigoribus obnoxias decuſerunt cunctas. Duravit hoc in *Martium* uſque. Continuavit enim & hoc menſe gelu una cum nivibus, quæ copioſe ceciderunt, ad æquinoctium uſque, adeoque hyems hujus anni fuit ſumma, tempeſtas ſæviſſima, nivis altitudo maxima, cujus nulla hominum ante nos recordatur memoria. Jam miteſcente hyeme jucundiora & calidiora aſſuſerunt tempora. *Aprilis* enim fuit valde amœnus, ſerenus, calidus. Majus tamen erat frigidus, pluviſus, xvii. die nixit. *Junio* denuo calida, ſicca tempeſtas obſervabatur, Mense *Januario* continuarunt adhuc morbilli cum tuffibus vehementiſſimis, catarrhi; febres continue ſeptima die ſolutæ, quæ tamen leviffima occaſione redierunt. Hoc menſe in puella octenni obſervavi menſes ordinarias. *Februario* graſſabantur petechiæ, febres continue, & matrona quædam mortua eſt comate ſomnolento ſeptima morbi die. *Martio* viſebantur morbilli, berpes miliaris ex puerperio. Catarrhi fuerunt frequentiffimi, & apud infantes cum febre continua. Febres continue, petechiales adultos quoque invadebant, quæ poſteriores per totum *Aprilem* obſervabantur. Mense *Majo* morbi præter catarrhos, febres intermittentes ſere nullis. Virgo tamen quædam nobilis hoc menſe ſphacelo ex colica bilioſa duarum dierum fuit mortua. Erat hæc ipſa virgo xxxii. annorum, atrabilaria, quæ d. ix. *Maii* derepente vesperti incidit in ſæviſſimos, & acutiſſimos ventris dolores, qui dextra magis parte cruciarunt, atque modo ſurſum, modo deorſum iverunt, in primis vero regionem umbilici uſque ad ſcrobiculum cordis occuparunt, tanta ſævitie, ut exiſtimaverit ſe veru ignito perfodi, urſerunt vomitus, anxietates ſummæ, adſuit omnimoda excrementorum & flatuum retentio; ordinavimus frequentes enematum injectiones, nec non aquam laxativam, quam prima vice rejecit, altera vero retinuit, irritum tamen cona-

tonatu omnia. Secunda enim die fluxerunt *mensēs coloris nigerrimi*, accessit paulo post *singultus*, mox *totalis fere* tum *pulsus* tum *caloris extinctio*, salvis sensibus motuque membrorum illato, quam refrigerationem non percepit, quin potius de intensissimis caloribus internis, quasi candenti ferro intus adusta fuisset, conqueſta, manibus glaciei instar rigidissimis subinde loca petiit frigidiora, eademque die, i. e. secunda Martii vesp̄ri mentis tamen compos, velociter, sed feliciter humanis rebus erepta est. Succī hic intestinales, in primis biliosi, acres inter plexus nerveos melentericos, nec non fibras intestinales hærentes, atque in illarum anfractibus conclusi, acrimonia sua tormina & cruciatus excitarunt terribiles, atque in fundum Ventriculi penetrantes Ventriculum ad vomitus & singultum stimulant, arsenicalem autem naturam mox induentes intestina instar mineralis veneni assumpti corroserunt, dilacerarunt, atque in ea more perforantis terebellæ, aut spinæ infixæ, se infixerunt, inflammationem conciliarunt, & stagnante in capillaribus sanguine, acrimonia sua corrosiva in momento fere intestina sphacelarunt, quasi in ferventissimam aquam immersa fuissent. Similes casus vid. *Job. Sob. Sophron. Kozack de sale, c. 6. sect. 15. pag. 260. Dominic. Panatolum Observ. Med. 50. Pentecost. 4. p. m. 139. Segerum observ. 82. dec. I. ann. M. A. N. C.* Mense Junio morbos nullos observavi, exceptis febribus tertianis, nec non casu infelici cujusdem Domini, febre continua laborantis, quam die ix. exceperunt terribiles convulsiones epilepticae, inde secuta deliria &c. Calores intermiserunt, deliria vera remanserunt. Sub initium quartæ septimanæ observavi novos calores ex scorbutō ortos, cum maculis scorbuticis purpureis, vigiliis continuis, deliriis, nec non copiosa sanguinis per inferiora partim grumosi, partim floridi ad tres medias ejjectione, inde summa virium prostratio, & cum fine quintæ septimanæ mors. Julius hujus anni fuit valde ventosus, quandoque præter morem austerus, frigidus, sine pluviis fere. Totus Augustus erat valde calidus, exceptis sub finem aliquot diebus, qui fuerunt ventosi, frigidi. Frigus quoque observabatur per totum Septembrem, qui ut plurimum pluviosus fuit. Ægidii die usque ad prandium pluebat. In Festo Matthæi circa vesp̄eram habuimus ingentia fulgura,

tonitrua, pluvias, sed sine grandinibus. Mense Julio, Augusto, Septembri, Octobri insolite sine ætatis discrimine sævierunt febres, peculiarem enim habuerunt naturam, invaserunt cum modico horrore, mox caloribus continuis, ut etiam peritissimi credidissent, adesse febres continuas malignas, vomitibus, alvi fluxu, siti, doloribus capitis, vigiliis, v. demum die remittente calore degenerarunt in intermittentes exquisitas, quæ pro subjectorum temperamentis, sanguinisque ac humorum constitutione modo contumaciores, modo benigniores fuerunt. Paroxysmum imminens ut plurimum comitabantur frequentes dejectiones biliosæ, nec non Vomitus terribiles cholerae instar. Evomuerunt quippe modo frustra pituita coagulata, viscida, modo bilem flavam, modo vermes ævi & ævi copiosos, diebus intercalaribus cessarunt vomitus, alvi fluxus. Versipellis hæc febris epidemica quosdam invasit cum exanthematibus urticae puncturis similibus, quæ calore retrocedente recesserunt, & calore redeunte redierunt. In duabus personis, una xvii. altera xxx. annorum, observavi his febribus supervenisse apoplexias fortissimas lethales. Raro servarunt statâ sua tempora, sed quandoque x. xii. horas præponendo & anticipando virulentiam suam ad 30. aliquot, imo 40. horas exercuerunt, quandoque unus paroxysmus exceperit alterum, donec tandem peregrino materiæ miasmate sufficienter dissipato, & extincto, septimo, aut ad summum octavo paroxysmo terminatæ sunt, relictis post se pustulis & fissuris in lingua, inflammatione faucium, abscessibus, semper autem virium prostratione summa. Venæ sectio etiam in principio adhibita nil profuit, quin potius febrilis paroxysmus post ejus administrationem incrementum sumplit, sanguis autem extractus floridissimus apparuit, & natura magis debilitata fuit. Conduxerunt blanda diaphoretica, quæ paroxysmos in ordinem redegerunt, & post tertium paroxysmum laxantia die a febre vacuo exhibit, Tandem devenimus ad antifebrilia, uti sunt salia amarinscula, quæ incidunt, serumque attenuant, v. gr. sal. absinth. C. B. centaur. min. arcan. dupl. nec non alcalica, fixa, pulveres nempe insipidos ac terreos, quales sunt lap. sancr. specif. febril. Cr. Omne autem fere punctum absolvit decantatissimus corr. peruv. cum salibus mixtus, & evacuato jam corpore, i. e. ante accessum v. vi. & paroxysmi propi-

natus, septimum vel ad summum octavum paroxysmum subegit, atque hac ratione febrem hanc jugulavit. Rimatus causas procatarticas epidemialis hujus febris, aëris anomaliz & intemperiei, nec non largiori potui propter calorem externum vix tolerandum eam adscribendam duxi. *Augustus* enim, qui fuit calidissimus, poris nimium apertis corpora sudore copioso manare fecit, inde serum absumptum, aut subtractis partibus tenuioribus biliosæ particulæ auctæ, atque hoc modo acrimonia biliosa, fermentifica, irritativa enata, quæ licet a largiori potu dilui, & serum refundi videretur: Ventriculi tamen intestinorum tonum labefactavit, & ad excernendum aërem & miasm plus justo contenta citavit. Utut non negandum, febres hæc epidemicas ex miasmate, aëris sobole, simul aliquid participasse. Non fuerunt contagiosæ, imo si rite tractabantur, nulli funestæ, ex incuria tamen & negligentia, aut medicastrosum præpostera & perversa cura ac imperitia accedente *cachexia* & *hydropse*, multis exitiosæ. Et hæc ratio est, quod in aliquibus locis Hungariæ ex defectu medicamentorum, aut perversa, aut neglecta cura hæc febres *malignitatem pestiferam* assumpserint, in primis si ex miasmate, aëris sobole, aliquid participarunt. *Febres petechiales*, quæ tamen autumnus præcipiti quotannis sunt frequentissimæ, hoc anno vix observavi, & si vidi, fuerunt *benignæ*. *Diarrhææ* atque *dysenterie* eodem tempore frequentes quoque fuerunt. Infantes, quos corripiebant, si superarunt *nonum diem*, evaserunt.

*Dn. D. Josephi Lanzoni Constitutio
Epidemica Ferrariensis
Anni 1729.*

Quam amara est, ac semper erit, apud Ferrarienses memoria anni hujus 1729. ejus calamitatis initium fuit Lunaris cursus Septemb. anni elapsi 1728. Tunc enim austro spirante,

Post largos imbres pluviamque madentem

inceperunt aquæ pertinaciter adeo super terræ faciem effusæ, ut totam telluris superficiem aquis pluvialibus contextam, semina futuræ messis respuentem, inspicere fuerit coactus infelix noster Agricola:

Hinc moderatrix Cynthia nostris

in quavis periodo aqua pluviali scatebat, & usque ad Majales dies cæli claritas non effulsit, sic corruptæ in imis vallibus aquæ fortentes dabant nebulas, & in illis, non ex illis, pene infinita oriebantur insecta, hinc erucæ, culices, muscæ, & varia ranarum & busonum genera totam terræ superficiem infecere, quod forte corruptionis aquarum ac aëris signum evidens fuit; sic apud *Plutarchum* legitur, artem medicam pestilentem æstatem ex araneorum frequentia prænunciare; Accessere æstivæ Lucæ, cum derepente in Vinariis cellis totus Bromii liquor excanduit, qui erat solatium cordis, & in ipso excitata præternaturali fermentatione, mutato colore, sapore, ac motu, ejus omnis compages vitata comparuit, unde recte caneret *Silius*

Et marcida vina largiuntur.

Hic ego exclamavi cum discipulis meis, o nos infelices, ex vini corruptione humorum discrasiam experiemur; inter vinum & sanguinem enim intercedit mutuo analogia; unde ex illius putrescentia corruptio humorum nostrorum erit timenda; & hic cœpere in hominibus febres, primo sub *tertiana* figura cum vomitibus, ac alvi fluxibus biliosis, aliisque pravis stipatæ symptomatibus; nullis cedebant remediis, a Venæ sectione complicabantur. Et hic bilem continere nequeo; cum enim in meis publicis ac privatis Lectionibus, in meis scriptis, typis datis, docuerim venæ sectionem Panaceam non esse, imo suadente *Celfo* anceps esse ac periculosum præsidii tale genus, attamen, velut si esset aqua fluminis, sanguis inutiliter, imo damnose, disperditur, & cum venæ sectio sit magnum remedium, non nisi urgente necessitate in morbis magnis, ac internis inflammationibus, apoplexiis usurpari deberet; Ast in tertiana suasu Doctorum, & speciatim *Job. Fortis*, *Ramazzini*, *Rolarii* &c. Venæ sectio usurpata duplicat febrem, ut in praxi facienda meis ostendi Tyronibus; ex missione enim sanguinis fontes tertianæ febris, stabulans in primis viis, mutato loco in venas transit, unde ardens facta morbus evadit lethalis; & ut verum candide dicam, nescio in quo libro Doctorum legerint hæc illi nostri Pseudo Medici vel non studentes, vel non legentes, aut non intel-

telligentes, quod pejus est: Ast redeamus in viam; si a cortice Peruviano susebantur istæ febres, post paucos dies in fortiores redibant, imo invaso tota afficiebatur familia.

Cui latebat in corpore pestis,

& brevi temporis intervallo repleta Nosocomia, & nulla pene domus a furore hujus febris exempta; omnia monasteria agrotabant, & nullus in urbe locus ab hac lue immunis evasit: In multis causa mutato loco febres produxit ardentes, unde ad plures, sive ad Alibanthas, migrarunt.

Quot labor & dure rapuit inclementia Mortis.

Nec audax lues timuit Principis habitaculum, sed sacram illius ædem ingressa ejusdem turbavit venas, & pene totam illius familiam solita febre affecit, atque multos aulicos enecavit,

Perque omnes sevit Mors inopina vias.

Sanctimonialium Septæ pene omnia febricitabant, multæ celestæ absque sacerdotibus erant; & sine iacris populus remanebat; præsertim ruri, ubi pessima ista lues totum expandit vexillum. Hic mihi notare liceat plebeios nonnullos, neglectis remediis, solo usu vini generosi convalescere, & ego jure fateri possum me, meosque familiares, hac febre affectos fuisse, & nunquam vini potum reliquisse, & ego in hac febris constitutione recidivans solo usu pul. China-chinæ, aut Cascarillæ cum vino malvatico ad plures vices assumpto, convaleui, cujus pulveris ac vini potioni successit alvi fluxus, ac si assumpsissem Cassiam, vel Mannam.

Accessit Autumnale æquinoctium, quo tempore putarent multi hujus constitutionis finem videre; sed incassum spes ivit, nam post æquinoctiales dies multi denuo ægrotarunt, alique nondum febrem passi, Octobris hujus tyrannidem experti, in febriles insultus incidere: Sic Mater ministrans filiis ægrotavit, sic Dominus servis, sic maritus coniugi, sic familiares invicem sibi effervescentias febriles communicabant, ita ut omnis pene familia ægrotaverit. In nonnullis variabat febris, & præsertim in reci-

divis, unde modo sub forma hæmitritæ, nunc rheumaticæ febris, nunc deliræ &c. morbus redibat, aliquando absque ullo remedio cessabat, nunc in quartanam transibat, modo in pustulas, ac scabiem commutabatur: in aliquibus apparuerunt vermes, per vomitum & alvum excreti, modo vivi, nunc mortui, quod forte indicium erat summæ corruptionis humorum in primis viis stabularium, urina in aliquibus turbida reddebatur, at pene jumentorum lotio similis, in aliis albescens, subviridis rufa, sabulosa, ac fetentissima; unde judicavi concoctiones non fieri in corpore, sub potus corruptione; Liberi enim a febre pristinum colorem non recuperabant, vires non redibant, nutritio impediabatur, & excrementa semper biliota, vel cruda, concoctionis signa non dabant. Bombyces in veris initio catervatim peribant, volucres sugere, pisces solummodo crescebant. Nonnullis apertis corporibus hoc morbo denatis, in ventriculo ac omnibus intestinis instenta est magna Copia humoris viscido-flavo-viridis, una cum aliquibus maculis lividis in ipsis intestinorum tunicis; vesica fellis erat in statu præternaturali, nam liquor felleus pene gypseus erat, mutato sapore, sicuti succus pancreatis austerus apparuit, cætera vero viscera erant sana, & ne minimum quidem a statu naturali recedebant; in aliquibus nonnulli vermes in intestinis reperti sunt, in aliis non.

Communes autem morbos a communibus causis progigni certum est, ut etiam fateretur Cl. Ramazzinus communes vero causæ sunt potissimum aër, alimenta mali succi, & aquæ corruptæ, ita in nostra urbe, & agris, hæc fuisse morborum hujus constitutionis Causæ, & semina, ex his ergo omnibus, sed promptius ab aëre tanquam e communi fonte; e quo nemo non potare cogitur, morbos quosdam derivari, qui multos eodem tempore afficiant, omnium pariter est consensus. Ad hanc porro nostram epidemiam excitandam, in unum convenisse, & aërem vitiatum & prava alimenta ingesta fas est arbitrari; primum quidem locum aëri a sua temperie naturali non solum secundum anni tempora recedenti, sed particulis humanæ naturæ incongruis ad satietatem pleno concedendum dixit Clarissim. Ramazzinus; secundum autem locum pravis alimentis & aqueis vitiatis; Quamvis autem de miasmate contagioso aliqua posset esse suspicio, namque in una

dona

domo uno infecto, statim alii ejusdem familiaris febricitabant; id tamen potius in communem diathesim ad maturitatem eodem tempore evectam, non secus ac cum Autumno fructus omnes eodem tempore maturescunt, referendum puto potius, quam in effluvium aliquod contagiosum, exiens e corpore primi agrotantis; Hic autem non pigeat referre *remedia*, quæ, ut sciam, sue re aëris apposita, ut hæc febrilis prava constitutio evinceretur; Primo nonnulli medici in principio leniens pharmacum exhibebant, mox cucurbitulas sacrificatas dorso applicabant, inde pul. Chinæchinæ propinabant, & febris sistebatur saltem per aliquot dies, si vero redibat, iterum China porrigebatur, ita ut aliquis fuerit qui plures libras talis pulveris sumpsit: Alii porro medici sanguinis missionem celebrabant, & febres duplicabantur; multi assumpsere pulverem rad. contrajervæ, corticum aurantiorum, corticum medic. fraxini, decoctum amarum D. *Lemeri*, coriandrum pul. Theriacum *Andromachi*, rad. Carlinæ, alii experti sunt Mithridatii usum frequentem; *Diascordion Fracasiorii*, Decoctum centaur. & verbenæ, vinum absinthio correctum, Chinæ corticem adjuabant alii addendo modo rhabarbarum, modo cremor tartar. vel Sal catharticum Angliæ, ad hoc, ut fusi humores corrupti in primis viis facilius per alvum exirent; Ego vero, quod ad me quotiescunque assumo in vino pulverem chinæ febrifugæ, statim alvi fluxum patior, ac si cassiam, vel mannam, susceperem; Ol. nostrum contra pestem, vulgo *del Cartagna*, a multis adhibitum fuit, sicut etiam vomitoria ipsa, & immensus aquarum potus; verum ait *Ramazzinus*, quid opis expectandum in his febribus ab aquæ potu? imo ex ejus usu sanguis pigriore motu per vasa efflueret, ac tandem cachexiæ & hydropes succederent; uti accidit in Juvene a *Ramazzino* memorato; ego certe modico vino sum usus, nec unquam vidi aliquem pravam effectum ab eo: Infinita propemodum curavi corpora in hac constitutione, & juste fateri possum, neminem affectum febris talis constitutionis, a me curatum, mortuum fuisse, præter duas feminas, unam 65. annorum iliaca passione necatam, aliam ex suppressione mensium, inflammatione cerebri extinctam. Hæc currenti calamo scripta sint in memoriam hujus constitutionis pessimæ. (*Ferraria Alzorsini m. Febr. Ann. 1730. missa.*)

Dn. D. Caroli Friderici Lörvv. Historia Febris Catarrhalis, quæ anno 1729. Mens. Novembri & Decembri per Europam Epidemice grassata est, cui accedit Constitutio Epidemica Anni 1730.

Quanto, quamque indefesso labore Societas Imperialis L. C. Nat. Cur cum in *rartorum* perscrutatione, tum in *utilium* tam *physicalium*, quam *medicinalium* rerum detectione a primis incunabulis ad hæc usque tempora, usa sit, Acta atque Volumina nostra satis superque testantur. Laudem merentur *Bauschius*, *Febrius*, *Volckamerus*, *Schreokius*, alique tanto majorem, quo sæpius a *Membris Academicis* eorum communicationem petierint, quæ *utilitate majori* se commendaverint. Atque hinc est, quod toties de *constitutione aëris* non modo, sed & de *morbis epidemicis* accuratorem descriptionem efflagitarint. Quod magis autem hac ratione inductus Pater pie defunctus, & de *mutationum aëris* genuina annotatione, & de *affectuum* independentium diligentiori observate, & de *probabilissimorum remedium* consignatione Societati per multos annos sollicitum sese præstitit; hoc fidelius hæc ipse ex Auctoris schedis posthumis æque recensita, ac in ordinem digesta, sub titulo *Historiæ Epidemiciæ Hungariæ*, Act. Phys. Med. A. C. L. C. N. C. Volumini I. deinde a me sunt annexa. Neque per plures annos a me conscriptum, atque publico bono destinatum opusculum de *epidemica Viennensi constitutione* denegaturus, si sese hæc qualiscunque opella lectori probaverit. Hujus summa est expositio *febris catarrhalis*, quæ Ann. 1729. sigillatim mense *Septembr.* atque *Octobris*, Viennæ epidemicæ grassata est, atque eo accuratiori delineatione opus habet, quod hujus mali semina non tantum per *Sueciam*, *Daniam*, *Hollandiam*, *Angliam*, *Hispaniam*, *Galliam*, *Helvetiam*, *Italiam*, *Austriam*, *Germaniæ partes reliquas*, *Hungariam*, *Poloniam*, totamque *Europam* eodem tempore sparsa sint; verum & in curatione *cautelæ* nonnullæ occurrerint, ut non adducam, morbum hunc esse *rariorem*, neque quotannis *obvium* neque ab ullo sufficienter *descriptum*. Utut enim & *Schenckius* in Præfat. ad *Libr. obs.* mentionem faciat *febris catarrhalis*, quæ anno. 1580. præter *Germaniam*, *Italiam* adeo afflat, ut vel

Ro-

Rome saltem ultra 9000. hominum illata strages excreverit, & Antonius Menjotus in *Dissert. Patholog.* p. 140. tussim se ferinam, contagiosam, malignam; avorum memoria populatim sævientem, & a cucullo, quo capita solebant operire, coqueluthe vulgo dictam recenseat: & Nicol. de Blegny in *Zodiaco Med. Gallic. sive Miscel. Med. Phys. Gallic. Ann. I.* p. 184. paucula quædam de catarrho anno 1679. epidemico, tussi perpetua, vigiliis, oppressione, febre continua, dyspnœa, pleuripneumonia stipato, multis lethali, atque remediis ordinariis non cedente, nobis reliquerit; superficialia tamen sunt, neque animum curiosiorem exantiant. Adeat, cui volupe est Thomam Sydenham, Practicum quondam Londinensem celeberrimum, ubi præter ea, quæ Doctissimus Carolus Raygerus, Pannoniæ decus illustre, atque Paulus de Sorbais nobis de tussibus tradere, quæ anno 1675. per autumnum longe lateque depopulatæ sunt, plura adhuc inveniet. Quod enim Car. Raygerus *Ephem. Germ. Dec. I. Ann. VI. & VII.* p. 312. annotavit, dum per totum Septembrem, mediumque Octobris anni citati, ob insolitam aëris temperaturam, æstatem pluviosam, insequentem autumnum inæqualem, modo serenum, modo pluviosum, insolitos etiam catarrhos Posonis, Vienna, per totam Austriam, in Silesia, in primis Uraßilavia, imo per totam Germaniam, homines eodem tempore, eodemque prope modo cum rigore & calore invasisse, nemini tamen exitiosos fuisse scribit, illud Thom. Sydenham in *Praxi Med. Experimental.* p. 275. & 304. seqq. non solum confirmat, dum sub finem Octobris ob tepidam, atque ad instar æstatis placidam tempestatem, de repente in frigidam humidamque mutatam, tusses numerosiores grassatas adducit, quam alio quovis, quod meminit, tempore, nemini fere parcentes, cujuscunque is fuerit sive ætatis, sive temperamentæ, integras, vero familias simul pervadentes; sed etiam evincit, febrem hanc catarrhalem fuisse eandem epidemicam, quæ Julio 1673. ingressa progrediebatur, cum & hæc antequam catarrhi se ostenderent, & illa, quæ post catarrhos permansit, æque, ac catarrhalis, semper cum dolore capitis, dorsi, atque artuum quoslibet aggressa sit, atque V. S. aliisque similibus medicamentis tractari debuerit. Idem & nos annot. 1729. experiri sumus, cum per totum anni decursum usque insequentem, epidemica quædam febris se-

se exeruerit, quæ & ante catarrhalis accessum, & post ejus declinationem pro diversa mutatione aëris, aliarumque circumstantiarum, diversos affectus quidem simulavit, semper autem cum summa lassitudine, dolore capitis, dorsi, atque artuum initium sumpsit, atque V. S. similibusque remediis, quibus catarrhalis, sublata est. Licet ergo mense Jan. Febr. & Mart. ann. 1729. non nulli hepatitidem, aliasque febres inflammatorias incurrerint, in plurius vero catarrhales malignæ petechizantes in conspectum prodierint. April. Maj. & Jun. tam benignæ quam malignæ catarrhales, cum variolis malignitate non carentibus, continuaverint. Jul. August. & Septembr. non modo catarrhales malignæ, aliæque continuæ, atque ipsa purpura alba in puerperis; sed & frequentiores atque pertinaciores diarrhææ æque, ac tertianæ duplicatæ observatæ sint. Mense Octobr. multi angina peripneumoniæ, pleuritidi, aliisque febribus inflammatoriis obnoxii fuerint; die 21. Novembr. tepidiorem excipiente humido frigida tempestate, præter malignas, sæpius adducta catarrhalis oborta sit per Decembrem inandito modo sæviens atque 4. Jan. 1720. nonnisi nivibus, atque vento, frigidiori cedens: licet tandem Jan. Febr. & Mart. anni 1720. angina, pleuritides, febres malignæ, petechiales visæ sint; semper tamen prior illa epidemica sub iisdem latuit. Hoc certius, quod hæc catarrhalis, alias tum abundantia sive sanguinis, sive feri, nonnunquam viscidioris, nonnunquam impurioris, præditos hincque sanguineo-phlegmaticos magis invadens, tum sensibilioribus, relaxatis, vel ob obesiorem, spongiosioresque constitutionem varioribus fibræ, valis minoribus majoribusque poris instructos afficiens, tum ratione ætatis, modo infantibus ob temperamentum calida humidum, teneriorem texturam, majoremque sensibilitatem ab aere externo familiaris, modo adultis ob naturam siccioram, firmiorem atque compactiorem structuram hincque ob majorem congestionem versus pectus tussi sicca molesta, modo senioribus ob humores spissiores, fibrasque de suo tono dejectas incommoda: tum ratione sexus, sequiorem, ob majorem sensibiliorem infestans: tum eos occupans, qui vel alias huic obnoxii, vel lesionem in pectore sentiunt, vel meticulose existunt, vel partes capitis atque colli glandulosas ab aere humido-frigidiori non satis defendunt; quod inquam, hæc febris præterito anno tam contagiosa fuerit, ut fere

omnes homines, sine ullo discrimine, & eodem tempore, & eadem ratione, iisdemque circumstantiis & symptomatibus, more omnium epidemicorum morborum, tam per totam Europam, quam Viennæ, multo celerius, vehementiusque petierit, quam ullo unquam tempore. Unde etiam est, quod in hac Civitate non 60000. hominum, quod novellæ tradidere, sed longe major numerus hanc perpeffus sit. Neque enim eadem cholera, neque aliis temperamentis pepercit, sive deinde fuerint plethorici, sive minori quantitate sanguinis præditi. Neque in hominibus viscido abundantibus solum erant, spectabiles, sed etiam in illis, qui sanguinem fluidiorem, sufficientique sero dilutum obtinere. Æque in macilentos, ac obesiores æque in robustos ac debillores, & sensibiliores, æque in infantes ac adultos, non modo juvenes, verum etiam seniores, cuiuscunque sexus fuerint, tam extra conjugium, quam in illo viventes, imo & in ipsas gravidas, ab epidemicis affectibus alias magis immunes, vehementer grassari cœpit, ita ut neque domi hærentes, neque in itinere constitutos intactos reliquerit, sive dietam accurationem observaverit, sive minus. Etsi vero etiam injuriis acris alias adfuetor sæpius aggressa sit, tantum tamen abest, ut hac vice omnes, in quibus ob majorem sensibilitatem alias continui, gravioreque catarrhi vigeant, in eandem inciderint, ut multi potius immunes manserint. Perillustri quidam Dominus mutato climate nulla febre catarrhali, licet alvi contumacissima obstructione laboraverit, correptus fuerit, atque ex gravidis, quamvis in plerisque debilitates syncopica abortus, aliaque periculosa Symptomata supervenerint, quædam tamen reperta sit, quæ sanguine viscidiori non obstante, nihil de eadem perceperit. Gravius decumbebant, nullis medicamentis utentes, hocque magis, si corpore calefacto, atque ad sudorem disposito, aeri humido-frigido sese exposuerint, quod in duabus Serenissimorum Principum aulis conspeximus. Contagium per totam Europam præseferbat, ut & activam, & ad corruptionem pronam materiam præsupponat. Quamvis autem Viennæ non tanta malignitate comparuerit, quanta quidem in agro Bononiensi, inque quibusdam locis Angliæ, cum ibi petechiæ, aliaque periculosiora Symptomata insimul accesserint, atque homines intra paucos dies instar pestis e medio sustulerint; nihilominus tamen &

hic in altero præ altero major malignitas sese prodebat, prouti nempe vel simplicem regularem febrem catharralem, vel aliis morbis gravioribus junctam expertus fuerit cum hi posteriores non solum anxietates, pathemata syncopica, vigilias extraordinarias, aliaque vehementiora symptomata post se traxerint; sed & in causa fuerint, quod quibusdam non xv. vel xvi. sed xiv. vel xxi. demum die febris hæc valedixerit. In omnibus malum hoc epidemicum initium sumpsit cum spontanea lassitudine, vigiliis, calore majori, sine ulla tamen siti, pulsuetudine, debiliore, suppressa seze, aliisque quæ malignis tribui solent, Symptomatibus, quæ comitabatur inappetentia & tussicula sicca, tam ob continuitatem, quam ob vehementiam molesta. Plerique horum conqueffi modo de pectoris, modo de capitis congestione, interdum gravior, interdum levior, quam presso pede excepit nonnunquam respiratio difficilis, nonnunquam vertigo, ut & gravitas capitis, & delirium, & coryza, & stermutatio. Porro quam plurimi præter symptomata recensita afficiebantur vel dolore dorsi satis atroci, vel stupore, & dolore articulorum, artuumque tensivo, vel horrore, vel diarrhœa. In quibusdam tamen & alia notatu digna phenomena complicabantur, quæ pro diversitate subjecti fuisse diversa, ita ut alii non tam horripilatione, quam horrore intensiori, atque per aliquot horas durante correpti sint, alii raucitate laboraverint, alii ob plethoram, calorem majorem, faciei inflationem, rebumatissimum, obnubilationem atque obscuritatem visus experti sint, alios alia occupaverint. Non attingam dorsi atque abdominis dolorem in gravidis, neque mentionem injiciam anxietatum, quæ meticulosos obruebant sæpius, neque vomitus atque dolores lumborum in calculosis observatos, neque pertinacem sensum frigoris in hysterics circa futuram sagittalem annotatum adducam; hoc saltem addam, in iis, ubi graviore morbi prægressi sunt, non tantum debilitates syncopicas; sed & periculosiora in conspectum produisse pathemata, quod tum in aliis, tum in Viro quodam Juvene, nobisque amico videre licuit. Is enim existens habitus macilentoris, temperamenti sanguineo melancholici, atque ad hæmorrhoides cæcas inclinans, licet ex febre, quæ post prægressam iram, dietam neglectam in itinere, acidulas Selteranas, neque decenti modo in usum vocatas, non tantum febris con-

continua, maligna atque ob calorem summum, sudorem fere colliquativum, alvi pertinacem obstructionem, vigilias continuas, deliria, debilitatem pullus, spasticas torsiones oris, floccorum lectionem, *periculosissime* typum præferebat; sed & die xv. *tertianam duplicatam* transit, sequendo deinceps triplici *tertiana* simplicis *recidiva*, quarum *qualibet*, etsi *excessum* in *dieta* pro fundamento habuerit, *diversissimis* tamen remediis tractanda erat, ut & *postrema* partim die *vacuo* initium sumpsit, partim loco *anticipationis* in prioribus spectanda *postposuit*, terminando deinde in febriculam *lentam* cum summa debilitate, continuo sudore, foetorem de se spirante; *purpura alba*, *tussicula sicca*, *œdematibus*, aliisque; licet, inquam, hic Vir optimus ex hac febre *periculosissima* æque ac *intricatissima* restitutus fuerit, *viresque* jam aliquantum redierint; eidem tamen catarrhali mense Decembris expositus erat, hocque gravius, quod deliriis ferocioribus, calore summo, vigiliis ad diem vij. solutionis usque stipata fuerit. Progressu temporis, atque morbo in statu suo constituto, & Symptomata sensim aucta sunt. Pulsus, qui in principio fuit debilis, jam fortior, celerior reddebatur, ut de doloribus pectoris versus hypochondria sese extendentibus nil dicam. Deliria in quibusdam continuabant, plerisque dolores maximum facessivere negotium, ut neque tussire potuerint, ad unum omnes, qui præsentem morbo auræ frigidiori temere sese committere, sudoremque neglexere, vel gravius, vel diutius decumbebant. Conspecti id ipsum in Illustriss. atque Excellentiss. quodam sene, plethorico, binis vicibus, cum post primum exitum, catarrho nondum penitus discusso, multa statim orta sint periculosa Symptomata, congestio versus pectus, caput, opthalmia, respiratio difficilis, anxietates, hæmoptysis, plenitudo pectoris e spumido quasi sono inter respirandum colligenda, pulsus suppressus, inquietas nocturna somnum turbans, lassitudo summa: & altera vice, etsi morbus ad declinationem pervenerit, ita, ut sub blanda diaphoresi, fortior somnus & respiratio accesserint, tantæ tamen alterationes, vigilie, debilitates eundem de novo invaserint, at graviora metuenda fuissent, nisi V. S. reservandi sine instituta æque, ac continuis blandis excretionibus, tam poros cutis, quam per vias urinarias, atque alvum specie diarrhæe, quam denique per tussim vim mor-

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

bi a vij ad xiv. diem laxatam vidissemus. Adducta confirmat mors pauperculi, hydrocele simul laborantis, quæ intumescerem totius corporis, ob denegatam diaphoresin in hypocausto frigidiori excipiebat. Porro infantes ob deglutionem materiæ rejectæ torminibus affligebantur: hinc erat inquietas nocturna. Sic & in puella dilatationem peritonæi circa inguen dextrum cum metu herniæ, ob tussim hementiorem non modo observavi, verum etiam in gravida, præter dolorem, qui & in dorsum, & abdomen sese distudit, debilitates syncopicas, tonsillarum inflammationem, lactisque e mammis eruptionem deprehendi. Lipothymia ut plurimum in prædebilitatis increbescerebant, ut & spastica stricture circa nucham in vetula quadam, quæ apoplexia ante aliquot annos tacta erat. Sed cum morbus hic tam varius fuerit, sese transformaverit, ut aliquando febrem continentem sapissime continuam, aliquando intermittentem mentitus fuerit, quis quæso omnia Symptomata, quibus hic morbus exacerbatus est, enarrare queat? Sufficiat ergo, horrorem interdum remissionem, interdum intensiorem, & per aliquot horas in iv. personis continuantem, altera vice non accessisse, cujus per octo horas cum calore majori, sudore copiosiori, arituum dolore immani, atque hæmoptysii, durantis, & tamen secunda vice non annotati, exemplum præbebat fœminas quædam Juvenis, ut & alius febrem catharralem negligens, ex itinere Taurunensi redux. Sicuti autem in hoc horrores comes erat dolor pectoris acutus, respiratio difficilior, calor intensus, quæ partim ob calidiorum adhibitionem ob loci in morbo mutationem, graviores sequebantur Symptomata, stricture pectoris, aliarumque partium pertinaciores, deliria, urinae suppressio, substultus tendinum, vigilie, pulsus debilis: ita & xi. die rejecto materiæ copiosioris & rubicundæ, & foetorem de se spirantis sub tussi fortiori in eodem loco junctum habuit dolorem, ut de critica atque salutari ecretionem per poros cutis, vias urinarias, alvum sub forma udoris æque, ac diarrhæe, quæ a vij. usque ad xiv. perdurabant diem, nil adducam. Febres compositæ plerumque ex duabus constabant acutis continente nempe atque continua. Atque harum tres species occurrerant. Vel enim catarrhalis, & biliosa, sicque duæ continuæ, vomitu biliioso initium fumentes, complicabantur, vel catharralis sociam habuit continentem, hincque in aliis.

558

ju-

juvenibus non modo, verum etiam *senioribus*, ut plurimum *iv.* vel *vii.* demum die *hemorrhagia narium* salutaris, in aliis *hemoptysi*, in aliis *vomitu cruento*, in aliis sequioris sexus *hemorrhagia uteri*, in aliis quatuor tam adfueris, quam non adfueris personis *hemorrhoidibus* conspicua erat, imo *hemorrhagia critica per alvum*, copiosissima sine ullo incommodo in Juvene *xx.* circiter annorum, die *vii.* cum ægri levamine oborta est, vel *catarrhali* jungebatur in *plethoricis*, sanguine *viscidiori* præditis; tum *continens*, tum *continua alia inflammatoria*. Hinc conquerebantur sæpius de *phrenitide*, febribus *anginosi*, *peripneumonia*, *pleuritide*, *hepatitide*; aliisque. *Pleuritidem* veram animadverti in *gravida*, eaque juvene, *plethorica*, congestionibus pectoris dedita. Atque licet hæc, præter *Symptomata ordinaria* in febre *catarrhali* perspecta, & *sitim intensam*, *vomitum*, *dolores dorsi* atque *scapularum* experta sis, & *ii.* die morbi *V.S.* celebrata insignem horrorem observaverit, & *iii.* partim ultra duas horas infantis motum senserit, partim dolor latius, versusque anteriora extensus fuerit, & *v.* ob doloris *vehementiam* tussire vix poruerit, donec *vi.* *vii.* *viii.* *anxietates*, *vigilie*, *deliria*, *diarrhæa* sese exeruerint, & *xi.* etiam melius disposita sub blando udore, atque *urina* sedimentum jam jam deponente, *abortum* perpeffa fuerit; tamen per Dei gratiam *pristinæ sanitati* restituta est, postquam nempe multum *sanguinis grumosi* per uterum excretum, aliquid *membranosi* a natura ejectum fuerit, atque tandem morbo *purpura rubra* supervenerit. Puer, quem enixa est, cum *septimestris* fuerit, atque in pectore, dorso, capite *inflammatio* adfuerit, diu non vixit, licet *S. Baptismate* adhuc tinctus sit. *Angina contagiosa* cum febre intensiori, majori *congestionem* versus caput, *coryza*, *gravitate auditus*, *difficultate respirationis*, *deglutionis*, *locutionis*, *vigiliis*, *alvi obstructione* tum *illustri*. quendam Dominum, tum & *Eidem* a *servitiis* existentem *circumstantiis* iidem eodem infestabat tempore. In utroque enim non modo morbus repetitis *V. S. resolutivibus* atque *discutientibus* temperatis, cum *internis*, tum *externis* adhibitis, *clysteribus*, aliisque facta die *iv.* *diffusione* atque *excretionem sanguinis grumosi* per *nases* imminebantur, sed & *febris catarrhalis*, morbo vix ad *declinationem* accedente, sese producebat, quæ tamen in priori dolore auris

atque *excretionem materiæ* cuiusdam solvebatur, licet *angina*, quæ sublata videbatur ob *præmaturam aeris* mutationem recruderit. In *declinatione* morbi materiæ *viscosæ* facilius per *tussim* succedebat *excretio*, quam blandus *udor*, modo citius, modo tardius, comitabatur, ut & *urine turbatio*. Ut plurimum hæc *tenuissimam cutem*, vitro adhærescentem ostendebat cum *sedimento roseo pallido*. Dolor æque in *pectore*, ac circa *hypochondria* remisit, nonnunquam facta *dissipatione* in *artus*, quod in *gravida* spectare mihi contigit, nonnunquam *auris* dolore sequente, *Joh. Nic. Pechlinus obs. med.* 45. L. *ii.* p. 320. scribit, notum esse, quod *vellicata membrana tympani*, tremula vibratio cum *nervosa epiglottidis*, sive *concussis pulmonibus*, ob *consensum tussis* producat. Unde & ille dolor circa *aures* vel *consensui nervorum*, vel *congestionem humorum* tribuendus est. Hoc cessante *pleurisque*, *vigiliis* diuturnioribus torquebantur antea, *somnus* obreperat *continuus*. Et si vero *excretionem materiæ* peccantis per *sudorem*, febris hujus vis sublata aut minuta sit, nullaque *exanthemata* sese ostenderint, compatebant tamen in iis, qui *sudorem* neglexere. Hinc non modo post *inunctiones* crebriores puerpera & *rubra*, & ejusdem filia *alba* tentabatur *purpura*; verum etiam facta *præmatura frigoris* admissione nonnulli ob *materiam incrassatam parotidibus*, *bubonibus*, aliisque tumoribus glandulosis infestabatur. Adducta *symptomata* non nisi per *aliquos dies* perstabant. Erant tamen & alia; quæ per *totum morbi decursum* urgebant. Sic inter *omnes* *extraordinaria lassitudo* dominabatur. Nonnullis ægrotorum *fluxus hemorrhoidalis*, aliis *udor* *continuus*, aliis *diarrhæa*, aliis *vigilie* perpetuæ obortæ sunt, quas per *septiduum* durantes deprehendi in *duabus* personis, altera *pleuritica*, altera vero ab aliquot annis *suppressionem hemorrhoidum* laborante, *V.S. solitam* prætermittente, *alvi obstructioni*, animi *pathematibus*, affectui oculi *obnoxia*, atque anno 1729. mense *Septembris* febre *catarrhali* correpta. Febre autem sensim evanescente *lassitudo* in omnibus adhuc diu permansit; imo *aeri frigidiori*, sive *nocturno* sive alteri sese exponentes, *tussi* diuturniori *doloris stricturis* circa *scapulas*, aliisque atrocioribus vexabantur *symptomatibus*. Veram atque *genuinam causam* quod attinet, præ aliis noscenda est *proxima*, sive *immediata*, qua detesta non modo *proximiores*, tam

naturales, quam *non naturales*, aliaque partescent. Certum autem atque evictum est, *immediatam*, modo *pulmonum*, modo *faucium*, modo *vicinarum* partium *stasis* constituisse. Hinc enim *motus* humorum *impeditior*, hinc ad easdem partes *affluxus* copiosior, hinc ipsa tandem *febris* *secundaria*, *catarrhalis*. Ex *mediatis proximioribus* humorosa malum hoc insigniter fovebat cum ob nimiam humorum *quantitatem*, ab aere *humido frigidiori*, *transpirationem* impediente, *inductam*, tum ob *qualitatem* in aliis *spissiore*, in aliis *rariorem*, ob eandem *rationem* enatam, tum denique ob *motum* humorum *progressivum*, & *ratione totius* *massae sanguineae*, & *ratione pulmonum* *vehementiorem*. Quamvis vero alias *temperamentum*, *constitutio corporis*, *fibrarum*, *pororum*, *etas*, *sexus*, *vite genus*, aliaque, quae partium *solidarum* & *fluidarum* *dispositionem naturalem* ostendunt, atque *remotiores naturales* audiunt, plurimum ad hunc morbum faciant, tantum tamen abest, ut hac vice aliquid contribuerint, ut potius *aer*, *cibus*, aliaque *causae remotiores non naturales* attendendae fuerint. Aerem si spectes, ubique *insolita* vigeat *constitutio*, quae tamen hinc inde vel *quantitate*, vel *qualitate*, vel *motu* diversa fuit. Unde & *aer* corpora, dum eadem modo *ambit*, modo *intrat*, innumeris *modis* afficiens, non modo huic febrī *catarrhali* per totam *Europam*; sed & hinc inde *diversis* *Symptomatibus* principium dedit. Sic circa *Bononiam*, vicinasque provincias, in primis in *convallibus* *depressioribus*, incolae hoc *gravioribus* *pathematibus* affligebantur, quo major *pressio* ab aere *graviori* *nebuloso* in *pulmones* ibidem *exercebatur*. Sicuri vero *aer figure* atque *proportioni* *contentorum* acceptum referre debet, quod jam hanc vel illam *qualitatem* obtineat: ita etiam *effluvia* tam *ordinaria*, quam *extraordinaria*, mense *Novembris* atque *Decembris* anni supra citati in aere per totam *Europam* dispersa, *qualitatem* illam *vitiosam* cum eadem *communicarunt*, a qua nominata *febris* proficiscebatur. Hic loci enim mense *Octobris* tempestas *placida* ac tepens observabatur, quam sub initium *Novembris* excipiebat alia multa diversa, *frigida* scilicet atque *humida*, *nebulosa* subito ingruens, ut non attingam aeris *intemperiem* modo *nebulis* foetidissimis modo *celo* magis *sereno*, conspicuam, interdum *pluviis*, atque *frigore*, interdum *calore* sese exerentem, prae-

ter solitum per totum *Nov. & Dec.* perseverasse, usque dum *ventus* septentrionalis *nitrosis* atque *nivosis* corpusculis, quorum copiam huc secum deferbat, aeris labes noxias *iv. die Jan. 1730.* elueret. Neque *Viennae* tantum *inconstans* aeris *constitutio* erat *spectabilis*; sed etiam *iisdem* mensibus per *Hungariam*, *Poloniam*, *Saxoniam*, *Angliam*, *Hispaniam*, *Galliam*, *Italiam*, inundationem aliqualem ob *pluvias* copiosiores *perpeffam*, *Daniam*, *Sueciam*, *Moscoviam*, aliasque regiones *visebatur*. Cum ergo a copiosioribus *aqueis* particulis, & aer *humidiorem* aequae, ac *frigidioris* *qualitatem* per totam *Europam* sub initium *Novembris* natus sit, atque ab eadem *relaxatis* fibris, porisque *constrictis* *transpiratio impeditior*, hincque partium *biliosarum*, aliarumque *inutilium* *excretio* imminuta, atque humorum ad *corruptionem* producta *dispositio*, mirum non est, ingruente *placidiori* tempestate, humoribus ad *vitiosam resolutionem* jamjam inclinantibus *orgasum* illarum, sicque febrī *catarrhali*, malignae, datam fuisse occasionem. Evincitur id ipsum ex eo, quod haec *febris* & sub initium *Novembris*, praesente ubique *simili* *constitutione* aeris, in *Gallia*, *Anglia*, *Hispania*, *Italia*, *Austria*, *Hungaria*, *Polonia*, licet in *Suecia* prius, in *Helvetia* vero tardius, comparuerit, & sub *finem* *Decembris*, atque circa principium anni 1730. *vehementia* *frigoris* subsecuti mali hujus vis ubique sublata sit. Licet enim recedente febre *catarrhali* per *Austriam*, aliasque provincias aliae febres spargi coeperint, nec tamen ita prorsus *epidemicae*, nec *iisdem* *Symptomatibus* amplius stipatae fuere, Sicuti vero *particulae aquae* atque *ignae*, etsi semper in aere sint praesentes, alias neque *aeri*, neque *homini* tam *subitaneam* alterationem inducunt: ita in earundem *abundantiam* mense *Nov.* atque *Decembr.* praeteriti anni *perspectam* unice causam rejiciendam censeo. Huic constitutioni savebant & alia *impuriora*, atque *extraordinaria* *effluvia*, sive a rebus *inanimatis*, sive ab *animatis* in aerem deducta perpendamus. Quod ad primum momentum spectat, nil dicam de *influentiis syderum*, utut veritati consonum, pro diverso situ, atque conjunctione *solis* cum *planetis* *diversam* materiam *subtilem* in terram deferri, hincque *diversas* corporis *affectiones* proficisci; paucis saltim addam, anno 1729. cum circa *Romam*, *Napolim*, aliaque loca *Italiae*, crebriores *terrae*

notus, ob *Vesuvium* diutius reclusum sensisse incolis, qui 20. *Decembris* & per *Ducatum Mediolanensem*, & per *Helvetiam* se ostendebant, tum eisdem 24. *Octobris* hora vi. *matutina* arcem *Fridericianam Hallensem* *Norvegorum* aque, ac in *Nericia* civitatem crebro hora viij. tanta vehementia occupasse, ut *caminos* decedentes viderint, tum denique *montem Islandicum*, *Schvveselberg* dictum talem concepisse *flammam*, qua territorium ad distantiam ij. milliarium destructum, licet tandem *nivibus* copiosioribus extincta fuerint. Cumque hic ignis occultæ atque *subterraneæ* vi *Heclæ* adscribendus sit, neque illi *metus* *Italix* aliam nisi similem efficaciam *Vesuvii* pro causa agnoscant, dubium non est, quin hac occasione & *sulphureæ*, & aliæ *vitiosæ* particulae per *aerem* longe lateque disseminatae sint. Harum praesentiam probant *tempestates* cum inauditis atque insolitis *fulminibus* atque *tonitribus* & mense *Novemb.* atque *Decembr.* versus *Neapolim*, in *Vicente Pessulano*, circa *Constantiam*, & circa *Hafniam*, *Uratislaviam* &c. anno 1730. Mense *Jan.* sicque *inconsueto* tempore annotatae non modo, sed & *phenomena* illa, quæ partim die 16. *Novembris* 1729. in *Hollandia*, *Coloniae Agrippinae*, *Francofurti*, *Hanoviae*, *Luettiae Parisiorum*, *Varsaviae*, partim die 15. *Febr.* 1730. *Vienne*, circa *Coloniæ Allobrogum*, aliaque loca *Helvetiae*, in aëre conspiciere licuit. Accedit & hoc, quod civitatibus *populosioribus* incumbens aer *fumeis*, aut aliufmodi *heterogeneis* effluviis scateat. Unde in his & *gravior*, & *acrior* redditur, praestans deinceps maiorem *pressionem* in pulmonibus, ut & *irritationem*. Atque hinc tam illud est quod *Vienenses*, praesentibus die 4. *Dec.* *nebulis* oculum *vellicantibus*, frequentiori *screatu*, crebrioribusque *sussibus* expositi fuerint, quam quod *vehementiora* *Symptomata* in *majoribus* Civitatibus *viventes* sint perpassi. *Uliginosas* regiones si quis adeat, deprehendet aërem multo *humidiores*. Hinc minor *motus* *elevatorum aquosarum* particularum, hinc tandem major ad *corruptionem* dispositio, cuius testes sunt *nebulae crassiores* *æridissimæ*. In his ergo locis *gravius* agrotabant decumbentes, hocque magis, si & aliæ causæ *occasionales* loci fuerint. Plurimum huc faciebant effluvia *animantium*. Cum enim *femina* morborum *contagiosa* in subtilissimo, activissimo, corruptionique obnoxio *miasmate* consistant, atque hinc ab *animantibus*

longe lateque *fermentescentes* particulae in aërem deterantur, patet, non modo ab *agrotis*, hac febre *contagiosa* laborantibus, in familiaribus cum illis *versantes* effluvia vel per *pulmones*, vel per *poros cutis* derivata; verum etiam ob *luem* illam quæ in *Italia*, *Palatinatu*, *Austria*, *Pannonia*, *Valachia*, *Podolia*, *Vvollandia*, *Polonia*, inter *pecora* hinc inde serpebat, innumera *putredinosa* *miasmata* eodem anno in aërem fuisse dispersa. Hæc deinde & alios *contagione* infecerunt. Etsi enim quidam statuunt, quod *contagium* nonnisi in *sua speciei* radices agat, atque hinc defendant, *hominum* *pestem* *bruta* non afficere, *equorum* *luem* non nisi in *equos*, *bovm* in *boves*, & *suvm* in *suillum* *genus* tantum ire, in *alienum* minus, vel inde tamen *contrariorum* elucescit, quod & *Moscoviae*, testante id ipsum *Gothofr. in Chron.* *peste* anno 1655. tantopere *sæviente*, ut & *corpora* *terræ* nondum commissa in plateis a *canibus* devorata sint, fidem *rabie* correpti, *homines* *vivos* dilacerarint; & interdum a *piscibus* *mortuis* *contagio* ortum duxerit, & nostro ævo *luēs* *pecorum* tam in *Hungaria*, quam *Austria*, Mense *Octobr.* & *Novemb.* 1729. se prodens febrem *catarrhalem*, initium sumentem cum *turbatione capitis*, atque intra *quattriduum* vel *hemorrhagia narium*, vel *hemorrhagia* per *alvum*, vel etiam *vomitum stercoreo* terminantem, junctam habuerit, & eodem tempore in *apris* aliquid *parulenti*, innuentis *corruptionem*, inventum sit. Neque est, cur dubitemur, per *cibos* *contagium* quoque in *homines* manasse, cum non modo certo constet, cuiusdam *nebulonis* *audaciam* eo processisse, ut *pecora* *luē* hac *demortua* *hominibus* vendere non erubuerit; verum etiam probabile sit, *pecora* fuisse consumpta, in quibus *dispositio morbosa* adfuerat. Producentur tales morbi eo felicius, si sive *solis* sive *ignis subterranei* calore in aërem *elevatae particulae* decentem *motum* non obtineant. Conclusas enim *aqueas* mox sequitur *corruptio*. Hinc & in multis locis prope littora *Africae* occidua a *tranquillitatibus*, quam a *procellis* imponentibus magis terra marique timetur, & in insula *Sancti Thomæ* statim a *solstitio* *brumali* menses duos aut amplius *vensis* *silentibus* *incolarum* plerique languent, & *tranquillio* tempore *pestis* vehementius in *homines* grassatur, & circa *Bononiam* in *convallibus*, ob *minorem* *circulationem* *aëris* multi perire. Quemadmodum ergo *motus* *aëris*, qui *ventum* constituit,

tuit, sanitati magis conducit: ita & aërem effluviis pestilentibus inquinatum emendat sæpius sonitru & fulgur, unde in tempestate pestilente in quibusdam urbibus populosis machine murales crebro disploduntur, & pulsantur campane. Neque tamen hinc omnis ventus pro salubri habendus est, cum meridianus corruptioni faveat, atque solus Septentrionalis, a plagis nivosis impetuose descendens, particulasque nitrosas secum ferens, aërem puriorem reddat. Atque hæc est ratio, cur non modo in Lesbo, flante Austro, incolæ ægrotent, Coo tussire serantur, superveniente Aquilone protinus convalescant, sed e vento frigidiori subito febris catarrhalis vis minuta atque sublata sit. Prognosis ratione vitæ & mortis quod attinet, tenendum est, febrem hanc quamquam Viennæ omnes cum summa lassitudine, vigiliis continuis, deliriis, dissimulatione symptomatum, aliisque signis malignitas aggressa sit, atque gravide nonnunquam debilitatibus syncopiticis, nonnunquam abortui expositæ fuerint, in aliis hæmoptysin, vomitum cruentum, phrenitidem, anginam, peripneumoniam, pleuritidem, hepatidem, aliaque periculosiora Symptomata socia habuerit, qualia in plethoricis, defectu visceris laborantibus, imprimis humoribus male constitutis, animadvertimus, neminem tamen e medio sustulisse. In Helvetia ab eadem, quam modo descripsi, febre nemo enectus. At e contra Lutetia Parisiorum multis exitiosa erat, utur in Anglia, Hispania Italia, atque Polonia adhuc pluribus funesta fuerit. Etenim Leopoli pauci servati; Ferraria atque Ravennæ tot tantique hominum obiere, ut magistratus Bononiensis incolis accessum denegare voluerit, ino Londini medio Novemb. intra septimanam 908. atque deinde majorem numerum, quam quidem anno 1665. tempore pestis, illata strages excrevit. Si prognosin ratione modi eventus attendamus, terminabatur partim staseos rheumaticæ dissipatione, partim materię peccantis excretionē salutari. Sic somnus, atque respiratio faciliior sub continua diapnoe æque, acurbatione urinae, in aliis jam post primam exacerbationem, in aliis, & plurimum iv. vel vii. in aliis quoque xiv. die accedebant; ut taceam de ejectione copiosioris materię per tussim, atque rubicandæ illius sætidæ, quam in pleuritico gravius decumbente xi. cum levamine, rejectam conspeximus. Febris continentis interdum conjunctæ inseparabilis comes erat hæmorrhagia, non-

nunquam per naves nonnunquam per vasa hæmorrhoidalia, aliquando iv. aliquando vij. die, nonnunquam parcior, nonnunquam copiosior fuit observata, ut in Juvene xx. annorum, nunquam hæmorrhoides experto, & tamen die vij. ultra mensuram sanguinis floridioris cum solutione morbi deciciente. Sic & uteri hæmorrhagiæ largior in puerperâ, quæ xi. die abortum perpessa est, oborta salutaris, qualia exempla in vaccis quidam habuere. Staseos rheumaticæ dissipationem probat dolor pectoris, versus hypochondria descendens, qui & in artus & aurem nonnunquam sese diffudit; ut & excretio lymphæ cruentæ secuta sit. Diarrhœa neque solvebatur, neque gravior reddebatur morbus. Nonnulli ægrotorum modo liberiori aëri sese exponentes maturius, modo inunctiones in usum vocantes, sudorem neglexere, quorum hi symptomata acerbiora non modo, verum etiam in declinatione morbi purpuram incurrebant, illi vero vel vehementiores congestiones versus caput, pectus, ophthalmiam, catarrhum suffocativum, hæmoptysin sensere, vel de chronico atque pertinaciori catarrho conquesti, vel etiam tumoribus glandulosis interdum circa aures, interdum circa tonsillas, interdum circa inguen infestabantur. Ex omnibus, quos sub meâ habui, cura, habui autem quamplurimos, atque ultra ducentos, nonnisi duo sunt mortui, quorum alter itineri, durante morbo sese committens, alibi in lethalem morbum incidit; alter vero pauperculus, ob sudoris neglectionem, aliasque circumstantias hydropæ funesto occupabatur. At petechiis, huic morbo in agro Bononiensi, Britannia minori, Angliâ supervenientibus, plerique sunt enecti, Angliæ quoque Lincolnia comparuit, quod pessimum atque exitiosum erat signum. Affectus hic, ratione temporis eventus, instar aliarum febrium malignarum cito sua decurrebat tempora, ita, ut plurimum Viennæ vel iv. vel vii. die crisi salutari solutus sit. Etsi vero in Angliâ idem sub initium annotatum sit, grassari tamen vehementius deinde & in his locis, & circa Bononiam, Florentiæ, Mediolani, & per totam Pœtoliâ cæpit, ut intra paucos dies instar pestis plurimos e medio sustulerit. Venæ sectio in tussi illa epidemica, quæ anno 1669. afflivo tempore cum pleuritide in conspectum prodit, atque de qua Thom. Bartholinus Ephem. Germ. D. I. A. I. p. 130. agit, locum non habuit. E contrario in febre catharrthali, an-

no 1675. *Viennæ, Posonii*, aliisque in locis popularim sæviente, multi auctorum, & inter eos præcipui *Car. Raygerus, Thom. Sydenham, & Paul. de Sorbait* l. c. *Venæ Sectionem* extollunt tanquam remedium præcipuum ac præsentissimum. In nostra deprehendimus, *Venæ sectionem* in *plethoricis, gravidis, adjectis ad apoplexiam, catarrhum suffocativum* dispositis, vel *angina, peripneumonia, pleuritide, hepatide, hæmoptysi, vomitu cruento*, atque febre continente laborantibus, sub initium institutam, non modo lassitudinem, cephalalgiam, vigiliis, spasticas strictureas in pectore, dorso aliisque partibus sustulisse; verum etiam omnia Symptomata reliqua minuisse. Sicuti igitur in his subjectis ventilatio sanguinis & utilis, & necessaria erat: ita in iis, qui vel a prægressis morbis gravioribus prædebitati fuere, vel me non statim in consilium vocarunt, vel brevi antea V. S. usi sunt, eandem nunquam celebravi. In omnibus porro eo in primis intentio dirigenda erat, ut maligna atque contagiosa illa materia, quam brevi temporis spatio intima corruptio sapius excipit, in tempore ex corpore eliminaretur. Cumque hæc sub balitus forma corpus occupaverit, hinc eadem rursus per poros cutis sub continua, blanda, atque æquali diapnoe discutienda erat. Unde temperata diaphoretica, diaphoretica fixa antim. diaph. aliaque, quæ absque vehementiori commotione operationem suam edunt, absorbentia ostracodermata, quæ acrimoniam salino-sulphuream, sanguini orgasmum inducentem, atque sudorem impediunt, partim absorbendo corrigunt, partim per diuresin educunt, omne hic tulere punctum. Eadem remedia cum celeberrimus *Car. Raygerus* in Pannonia, tum *Adamus a Lebenwaldi* in febre catarrhali epidemice dominante in *Stiria*, tum *Londinenses* hac vice cum V. S. sub initium cum successu adhibuere. In plethoricis quibus alexipharmaca calidiora, sudorifera, *Spir. Sal. armon.* similiaque propinata fuere, sequebantur congestiones majores versus superiora, deliria, fortiores pectoris oppressiones, inquietudines, subsultus tendinum, suppressio urinae, quibus & temperatiora deinde medicamenta exhibenda erant. Purgantia, quæ nonnulli assumpserunt, vomitoria, nullum hic invenere locum, imo omnes, quibus præscripta sunt, majores staseas materiae acris commotiones incurrebant, eorum etiam una hæmoptysi corripiebatur. Sufficientem opem omnibus tulit

modo pulvisculus ex absorbente, antim. diaph. arcan. dupl. addito interdum nitr. dep. concinatus, modo potio ex aquis diaphoreticis, absorbentibus, atque antimon. diaphoret. constans, modo emulsio parata ex semine card. Ma. Symptomatibus ex proprio spasticis succurrebam, ita, ut spasticis stricturis præsentibus cinnabarina addiderim, alvi obstructioni humectantia opposuerim, in diarrhæa non modo arcan. dupl. omiserim; verum etiam regimen diaphoreticum tanto magis injunxerim. Adstringentium, narcoticorum, opiatorum usum, quamvis multi Auctorum ea suadeant, experiri nolui, cum *Olaus Borrichius de somno & somniferis p. m. 34.* referat, quendam applicato empl. opiato solum in vasa vertice, ex catarrho pituitoso in gravem paralytin incidisse. Nitroscinnabarina, emulsiones, portiones analeptice conjunctis bezoardicis, tempore continuarum vigiliarum data, ad somnum placidum ægrotos disposuere. Quod si affectus anginosi supervenerunt, repetitis Venæ sectionibus atque clysteribus, tandem interne digestiva cum temperatioribus diaphoreticis ordinavi, externe vero Cataplasmata discutientia, Gargarismata, atque injectiones commendavi quorum usum, quousque penitus remisit morbus, continuavimus. At expectorantibus in tussi sicca penitus abstinui. Ex iis, qui in publicum prodire coacti sunt, nulli diaphoretica dedi, insistens magis præcipitantibus, utrum non nisi blandioribus diaphoreticis & materia noxia in declinatione mali penitus proscribenda fuerit, & dolores circa scapulas in quibusdam remanentes auscultaverint. Dietam quod spectat, neque durante morbo, neque eo superato, autæ frigidiori commitendum erat æger, hocque minus, si diarrhæa adfuerit. Victa etiam febre, omnis tamen excessus ratione cibi & potus vitandus erat. Juscula, atque infusa instar theæ ex rad. scorz. cum bissop. veron. atque sem. fœnic. in frequenti usu habui. Et animadverti, tam his observatis, quam accedente infirmul cum corporis, tum animi continentia tranquilla, omnes per Dei gratiam pristina restitutos esse sanitati.

Constitutio Epidemica Anni 1730.

Qualem sub exitu anni 1729. constitutionem aeris generalem habuimus, talis per triduum etiam primum Anni 1730 *Viennæ* stetit, nempe ut plurimum humidior, frigidior, cum nebulis in pluvias abeun-

abeuntibus. Atque licet vehementia *Aquilonis* cum *nivibus* 4. *Januar.* sese exerentis, vitiosam hanc atque *inconstantem* aëris qualitatem sublatam, arbitrati sumus, tantum tamen absuit, ut cessaverit, ut potius eadem *inconstantia* redierit, tempestatem *frigidam* die 10. *placidior* ac *pluviosa* exceperit, huic non modo 16. *frigidior*, *nivibus* atque *venris* tumultuaria, verum etiam 30. denuo alia multum *diversa*, atque eadem die mane *calidiori*, a meridie *frigidiori* vento. modo *pluvius*, modo *nivibus* conspicua, successerit. Similis aëris *alternatio* spectabilis erat per totum *Februarium*. Sub *initium* enim aër *frigidior* cum *nivibus* ingruerat, in *progressu* tepidior, ut plurimum *nebulis*, vel *matutinis*, vel *vespertinis*, quandoque & *pluviis* nocturnis sese prodens, qualis ad *postremos* usque *Februarii* dies perseverabat, ut de *cæli ardentis* phænomeno, quod 15. die circa *vesperam Viennensem* oculos ac mentem in se converterat, nil dicam. *Martii* ingressus *nivosus* subito cum *pluvioso* aëre commutabatur, imo ob *pluvias copiosas* & *frequentes*, cum cælum, si paucos *amænos* dies exceperis, plerumque *obnubilum*, & *obsitum* tenebris erat, tum ad *finem* usque mensis iste *humido frigidus* permanfit. Similes *vicissitudines* ratione *frigoris* eadem *hyeme* per totam *Europam* observare licuit. *Januarii* enim constitutionem si examines, & *Halæ Saxonum* erat *pluviosa* die ij. qua hora viij. *vespertina* sese incolis in *nubibus* aliquantulum *nebulosis halo* obtulit, & *Londini* xij. *placidior*, tamque *nebulosa* comparuit, ut jam *quarta pomeridiana* fauces accendere coacti fuerint, & *Neapoli* xvij. aërem blandiorem *frigidior* æque, ac *tumultuosior* secutus est, *flamma Vesuvii* etiam invalescente, & *Varsaviæ* xix. *frigus* intendebatur, *Hafniæ*, *Uratislaviæ*, *Soraviæ* que ingens sub *exitu* tempestas cum *fulguribus* & *tonitribus*, *nivibus* ac *pluviis* oborta est. Sic *Februarius* tam *frigidior* atque *nivosus* sub *principium* non solum *Varsaviæ*, sed & *Venetis*, quam *tepidior* magisque *pluviosus* postmodum in posteriori loco, *Monte Pessulano*, *Alesia*, *S. Hippolyte*, aliisque *Civitatibus* vicinis in conspectum prodit, ita, ut *Constitutionem Viennensem* ubique fere representaverit. Sed nec *lumen boreale*, extraneos fugiebat, licet neque eadem die, neque iisdem *circumstantiis* *Europam* omnem sua lege compleverit. Alibi enim jam iv. quod *Moscoviæ*, *Petripoli*, *Revaliæ* que degentes testantur, alibi, & quidem

Varsaviæ, *Uratislaviæ*, *Tiguri*, *Bernæ*, *Colonie Allobrogum*, *Romæ* atque *Florentiæ* xv. visebatur, alibi alix quoque *circumstantiæ* accessere. Non adducam, præter *phænomena* huic *lumen communia*, & in *Helvetiæ*, & *Petriburgi* binos *arcus* oculis occurrere, altero in *boreali*, altero in *austiali* plaga apparente: neque attingam, materiam *phosphorescentem*, radiis ex *priori arcu* exurgentibus, atque variis *coruscationibus* conspicuam, tandem & in *alterum* fuisse compulsam, ibique *claviori* refulxisse luce, disparentibus in *priori* successive *columinis* rediantibus: neque mentionem injiciam *susurri* illius, quem *Petripoli* radiis motu tremulo procurrentibus nonnulli perceperunt, multo minus *calorum* sæpius jam annotatorum. Hoc saltem addam, idem non modo *Romæ* atque *Revaliæ* diutius durasse; verum etiam *Moscoviæ* sequenti nocte recurrisse, utut minoris fuerit momenti. *Martius* ut plurimum *nivosus pluviosus* fuit. Hinc observabatur aura *humidior*, & *frigidior*, in non nullis locis *aquæ nivalis* major *confluxus*, qualem in circulo *Suevico Hornbergenses* maximo suo damno experti sunt. *Leopoli* tamen atque in *Svecia* *nives* copiosiores, circa *æquinotium* vernale cadentes, acerbissimum excipiebat *frigus*, ut & *Holmiæ* lacus per totam hanc *hyemem* non conrescentes tandem *frigidibus* congelati. Eadem ergo perquam anomala atque *irregulari* crasi aëris per omnem *hyemem* ubique manente mirum non est, hanc & eosdem peperisse *morbos* alibi, quos genuerat *Viennæ*. Hoc tum in aliis liquebat *febris*, tum magis peculiariter in *catarrhalibus* mensis *Septemb.* & *Decemb.* 1729. Sicuti enim hæc *posteriores*, quæ *anno citato* *epidemicæ* per *Europam* grassatæ sunt, sensibili aëris *qualitati* in acceptum referri debent, quod illis *mensibus* exortæ sint; ita etiam *qualitati* *frigidiori*, quæ in *Januarium* incidebat, earum *iniminationem* unice adscribendam esse censeo, Unde etiam est, quod *Viennæ* iv. *Januar.* vehementia *frigoris* derepente sublata sint, alibi vero ob *frigus tardius* ingruens diutius continuaverint. Hinc *Bononiæ*, in *Ducatu Mantuano*, *Ferrariensi*, *Mutinesi*, aliisque *Longobardiæ* partibus, itemque in *Sabaudia*, *Delphinatu*, *Marfiliæ*, per diu perseverarunt. His recedentibus novæ *febres* invalescebant. Neque numero tantum erant spectabiles in *Agro Brixiano*, sed etiam ob anceps illud *periculum*,

lumi, in quod eos, quos in *Podalia*, *Britannia minori*, *Florentie* affecerant, conjicebant. *Viennæ* febris hæc maligna sub diverso schemate prodiit, ita ut in aliis simplicem continuam, nonnunquam nullis exanthematibus stipatam, & tamen diarrhæa, vigiliis, deliriis, motibus convulsivis, aliisque periculosioribus symptomatibus sese exerentem, non nunquam petechialem præsentaverit, in aliis etiam complicata, atque modo cum inflammatoria, vel angina vera, graviori, vel pleuritide interdum vera cum sputo cruento; interdum spuria, vel hepatitide periculosiori, ob diarrhæam, vigiliis, deliria, conjuncta fuerit, modo cum intermittente comparuerit. Nullis exanthematibus conspicua, continua aliquando jam iv. quod in tenetiori ætate annotare licuit, ut plurimum xiv. die in adultis disparuit, semper tamen sub blanda diapnoe atque turbatione urinæ solvebatur. In petechiali decens regimen diapnoicum præ aliis attendendum erat, quo non observato Symptomata exacerbabantur, ut paucissimi evaserint, sive deinde V. S. in usum vocaverint, sive minus, quorum posteriores hoc proximiores morti fuere, si & in morbo purgans aliud assumpserint. Sic *Domina* senectute cuncta, atque alias interdum calculo, interdum hæmorrhagiis navium nimis obnoxia, tam V. S. quam diapnoe, aliisque neglectis, non modo hæmorrhagias, diarrhæam, catarrhum suffocativum, deliria consumpta est. Aliud exemplum præbuit quidam *Juvenis* viginti aliquot annorum, qui etsi statim sub initium V. S. instituta sit, probatissimaque remedia exhibita fuerint, post frequentiore tamen, alvo respondente, corporis refrigerationem incidit in diarrhæam, vigiliis, deliria continua, hæmorrhag. navium symptomaticam & die viij. purpur. alb. ipsamque aphon. lethalem. Tandem unus, prætermissa *Venæ* sectione, in eadem febre petechiali purgans, me nondum in consilium vocato adhibuit, ubi res desperata fuit. Sequebantur enim multa statim periculosa symptomata, diarrhæa, animi abjectio, anxietates, vultus ferox, vigiliæ continuæ, deliria, atque die xii. ipsa mors, utut vij. hæmorrhag. nar. oborta sit, sudor accesserit, urina sedimentum deposuerit, diarrhæa cessaverit, atque vesicatoria sufficientem effectum ediderint. Fatendum etiam est, peculiarem *Januarii* indolem atque constitutionem, cum quartanam illam duplicem chronicam, ædematibus, in-

fartuque lienis occurrentem, atque incidentibus, digestivis, blandioribus laxantibus, febrifugoque *Nic. de Blegny*, ex malis aurantis amaris cum vino albo parato cedentem, tum tertianas diuturniores, aliasque multum fuisse, quod aliæ intermittentes hoc, & sequenti mense invadentes testatum faciunt. Aliquando enim his sub initium jungebatur continua, remanente deinceps simplice, sive tertiana, sive quotidiana aliquando etiam sub finem accedebat; ut in *Juvene* quodam, cui mense *Februario* in quotidiana chronica supervenit purpura. Sicuti vero nominatio mense *Februar.* non solum febres catarrhales *Luætiæ Parisiorum*, *Verfaliæ*, *Gratianopoli*, *Marsiliæ*, *Camberii*, *Romæ Liburni*, perque *Ducatum Mutinensem* adhuc dum spargebantur; verum etiam *aliæ* sunt, *Augustæ Taurinorum*, *Mediolani Bononiæque* vilebantur, ut de *lue pecorum* circa *Laudensem* agrum infestante nil tradam: ita *Viennæ* præter congestiones versus partes superiores, æumatismos, modo clavum hystericum, cujus omnes erat febricula statim hora rediens; modo odontalgiam contumaciorē post se trahentes, atque apoplexias, febres continuæ malignæ continuarunt. Harum alia fuerunt exanthematice, erumpentibus vel petechiis, vel purpura vel morbillis, alia nullas ad corporis peripheriam ejectiones proferebant, quarum tamen posterioribus, ob summam vitium prostrationem, vigiliis, deliriis, motus convulsivos neque hic loci, neque *Rustini* in *Hungaria* mutum fidei habendum erat. Etsi vero multi agrotorum, quod supra monui, curam a purgantibus incipiant, & ex his in febre petechiali nullum unquam restitutum fuisse scribat *Parens* pie defunctus, in *Historia Epidemica Hungariæ*, idemque & ego in mea praxi notaverim, sæmina tamen quædam hoc mense etiam servata. Hoc autem notatu dignior est hic casus, quod eadem persona febre petechiali detenta, & laxans sub initium assumpserit, & exanthematibus jam præsentibus V. S. celebrandam curaverit. Unde accersitus tandem deprehendi exanthematum retrocessionem. Affectus hinc indies invaluit, & secuta sunt non solum brevi deglutitio difficilis, anxietates, subsultus tendinum, pavores sub somno deliria; sed & xii. die tam petechiæ nigre, quam purpura alba, quibus sese auditus difficultas, atque rigiditas totius corporis adjungere, ut & soporosa effectio. Morbum igitur hunc in pessimis signis constitutum, atque

que lethalem pronunciaui. Sed tantum abest, ut exitiosus decumbenti fuerit, ut porius adhibitis mature *Vesicatoriis*, blandamque *diapnoen* promoventibus, sensim atque sensim sub *secunda purpuræ albæ* eruptione, quarta septimana contingente Symptomata remiserint, atque patiens ab hoc affectu *periculossissimo*, præter omnium opinionem ac spem liberata sit. Mense Martio partim *catarrhales Florentiæ*, Neapoli, Anticarie, partim *morbilli Lutetia Parisiorum*, partim aliz *malignæ*, atque intra paucos dies *lethales Bialæ Polonorum* sese sistebant. Eodem tempore *Viennæ* sese offerebant *congestiones*, tam in *junioribus*, quam in *media* quam etiam in *consistente* ætate, jam versus *nares*, jam versus *pulmones* magis tendentes. Non nunquam evacuatio *sanguinis* per *nares*, nonnunquam excretio *seroso mucida* materiæ vel in *coryza*, vel in *tussi humida* succedebat, quandoque nulla fuit observata, humidioribus nempe congestis in *stagnationem* deductis. Unde varii denuo *affectus* pendebant. Inde enim non tantum tumor non nihil rubicundus, sed nequaquam inflammatorius, *Cheilocace* dictus, de quo *Arnoldus Boerius obs. med. de affectibus omis.* p. 30. C. X. pluribus egit, in *adulto* nascebatur; verum etiam *inflammationes*, nunc in partibus *externis*, *tonsillis* atque *dentium periosteo*, nunc in *internis*, sive *anginam* veram cum febre, sive *splenditiem* mensibus instantibus spectes, obortæ sunt. Neque *malignæ* febres minuebantur, sed in aliis sub *simplicis*, in aliis sub *compositæ* apparere schemate, quarum prior aliquando *continentis*, plerumque vero indolem *continuae* habuit. Atque hæc posterior huic ob *cephalalgiam*, *dolorem pectoris* molesta erat, illi gravior ob *catarrhum*, atque *debilitates syncopicas*, isti *periculossior* ob *vigilias*, *deliria*, *diarrhæam*, *torciones oris* xi. die apparentes, in omnibus ob *anxietates*, *abjectionem animi*, *summam virium prostrationem* vehementior, hocque magis, si *purpura albæ*, vel *petechiis* supervenientibus non rite tractata fuerit. Sic in robusto quodam Juvene notavi febrem *petechialem*, ob *purgans* repetitis vicibus sub *initium* morbi assumptum, inter paucos dies *funestam* æque, ac *latioribus livescens*que *exanthematibus* stipatam. In *fœmina*, quæ in *purpura* doloribus *spastico-arthriticis* varia *unguenta* & *linimenta* opposuit, ob *impeditam* hinc *transpirationem*, *mensēs*, mox *disparentes*, *Vienne*

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

Sectionemque neglectam, quæ hic loci ut plurimum necessaria est, non modo *gravidam* statum animadverti, sed & *periculossam* judicavi. Sed ecce, *temperatis diapnoicis* per aliquot dies usurpatis, erumpente *purpura albæ* copiosissima & *dolores*, aliaque symptomata mitigabantur, & *febris* hæc intra spatium *xxi. dierum* solvebatur, etsi *dolores arthriticos* diutius adhuc censerit, sublatis successive *antispasticis*, *laxantibusque* blandioribus. *Simplex* hæc *maligna* febris interdum *inflammatoriam*, interdum *continentem* junctam habuit ubi remedium præcipuum erat *V. S.* Hac vero prætermissa, quamvis optima etiam *medicamenta* propinata fuerint, irrita sæpe fuere omnia. Id ipsum videre licuit in *virgine* quadam juvene. Licet enim in eadem ob *plethoram* *mensēs* alias *parciores*, tanto magis *V. S.* in *continente* febre commendaverim, monito tamen hoc salutari non auscultabat *Parens*. Unde mirum non est, quod *mensibus* sub *initium* quidem accedentibus, mox tamen iterum cessantibus, *summam lassitudinem*, *dolores spastico-arthriticos*, *cephalalgiam*, *vigilias* sub *principium* jam præsentēs, *plura* secuta sint *periculosa* symptomata, *dolor dorsi*, *major congestio versus caput*, *acerbior dolor capitis*, *propensio ad somnam profundiorē auditus*, *difficultas*, *hemorrhagiæ longiores*, *ad debilitates syncopicas usque*, *sudor frigidus*, atque die viij. *motus convulsivi ipsaque mors*. *Aprilis*, sicuti sua natura alias *mutabilis* ita & hoc anno *Viennæ inconstantiā* suam prodidit. Sub *initium* enim *serenus* comparuit, sed *triduo* elapso alia multum diversa *tempestas* ingruerat, nunc *pluvius*, nunc *nivibus* sese exerens. *Humidam* hanc æque *frigidam* in *progressu* tepidior ac *amœnior* excipiebat, imo & huic *postremis* *tribus* diebus denuo *horrida* magis, atque *tumultuosa* ob *ventos*, *pluvias*, *nives* succedebat. *Majus* ut plurimum, in primis sub *principium*, *pluviosus*, hincque *humido-frigidus* oboriebatur, quandoque tamen & *fortior* placidior, tam *prioribus* diebus, quam *sigillatim* sub *finem* observabatur, ut nec de *tonitribus* & *sulminibus* crebrioribus die viij. atque *xx.* recurrentibus, nec de *grandine*, quæ *x.* cadebat, quicquam adducam. *Toto Junio* exoptata habuimus tempora, *calores*, sæpe *pluvie* nocturnæ *amœnissimæ* interdum mitis atque lenissimæ *ventus* contemperabant. *Vere* toto quanto constitutio aeris eadem fere mansit in aliis *Europæ* regionibus, atque hic locorum erat.

T t t

erat. *Aprilis* enim sub introitum *Holmiæ*, remittente frigore blandior notabatur, deinceps *Ustæ*, perque totam *Bohemiæ* pluviosus, *humido-frigidus* sentiebatur, tandem *salidior* succedens non modo glaciem *Petripoli* solvebat, verum etiam in *Polonia* perexigua & perminuta flumina reddebat. *Majus* & *Junius* alibi quoque magis pluviosi fuere cum ille tam ob nives junctas pluviis *Cracoviæ*, quam ob ingentes tempestates cum fulguribus, tonitribus, horridis, grandinibus, & ventis violentis *Colonia Agrippina*, *Heudena*, variis in locis provincie *Ultrajectinæ*, *Dromorie*, *Vvalvici*, *Bardevici*, in *Saveria*, *Episcopatu Monasteriensi*, *Susati*, *Borolini*, *Hale Saxonum* exortas, subfrigidus atque inamœnus permanerit, hic vero posterior tam turbulenta tempestate sese exhibuerit, ut modo fulguribus gravioribus *Polonis* atque *Barolinensibus*, modo grandinibus in *Barcheria*, *Volbynia* degentibus modo ventis vehementioribus incolis circuli *Burgundici* damnum intulerint, modo ob frequentes copiosissimæque pluvias *Molybergæ* intempestivus fuerit, *Cameneciæ* atque circa *Halam Magdeburgicam* viventibus disruptis piscinis multum molestiæ asperferit, atque in *Valachia* jam homines, jam pecora, dum circumfluerent aquis, atque in harum abundantia viverent e medio sustulerit. Si morbos cum vere surgente increbescerent, atque ad solstitium æstivum usque infestantes reputemus, ob similem aeris constitutionem ubique vigentem eisdem hic regnasse liquet, qui homines adorti sunt alibi. Mense *Aprili*, *Majo*, *Junio* enim cum intermittentes, tertianæ in *Italia*, tum continuæ, vel nulla exanthematica emittentes, malignitate tamen non carentes, atque nunc catarrhales anginodes *Lutetiæ Parisiorum*, inque *Ducatu Ferrariensi*, nunc alias circa *Guardistallum* representantes vel exanthematicæ, tam sub vario *Moscoviæ*, *Holmiæ*, *Nemausi*, *Cazallæ* sese sistentes, quam sub pestis schemate in *Podolia* apparentes, febres grassabantur. In quibusdam locis & alii viscebantur morbi. Sic lues pecora aggrediebatur in *Germania*, dysenteria in castrorum metatione circa *Molybergam* milites afficiebat *Junio*, apoplexia atque podagra præter solitum eodem mense homines *Moscoviæ* invadebant, *Vienne* mensibus vernis sese offerebant congestiones versus pectus, caput in hæmorrhoidariis, sanguineque spissiori præditis, rheumatismus capitis ob menses parciore, lumbago rheuma-

tica, cephalæa cum febre, opthalmia, odontalgia, affectus spastico-arthritis, arthritis fixa post iram; atque excessus rationem potus in hæmorrhoidario commissos, malum ischiadicum refrigeratione prægressa, chira-gra post animi excedentiam, podagra mensibus post terrorem disparentibus, febres intermittentes, quotidianæ, etiam infantibus familiares, tertianæ, in aliis anticipantes, in aliis postponentes, quartanæ si non solis salibus digestivis, atque viscidum incidentibus, tamen pulveri *Lentilii ex cort. fraxin. rad. gentian. rubr.* atque sale absinthii concinnato cedentes. Præter has continuæ continuarunt, non solum primariæ, sed & ex secundariis inflammatoriis, peripneumonia atque pleuripneumonia. Posteriori juncto sputo cruento, atque graviori febre laborabat quidam *Juvenis*, prior vero reperiatur cum aphonia in ancilla, utraque V. S. atque diaphoreticis temperatis sublata. Frequentes erant malignæ, interdum simplices, interdum compositæ existentes, Quandoque enim continua complicabatur cum continente, qualem hæmorrhagiis, atque sudore intra primum septenarium solutam videre licuit in Illustriss. quadam filia XIII. annorum, quandoque & intermittentem habuit comitem, ita, ut aliquando sub tertianæ schemate incescerit, aliquando etiam mitius tractata in tertianam sive simplicem, sive duplicatam, pulvere ex fl. chamom. sale absinth. atque antim. diaph. parato, brevi curatam, transierit. Nonnulli horum jam in principio hæmorrhagiam narium, vel hæmoptysin perpeffi sunt; quædam tamen femina & sub paroxysmo intermittentis vomitu cruento correpta est, unde in iis quoque V. S. cum successu sub initium celebrabatur. Sæviit hæc maligna febris æque in gravidæ, atque alias. Rariorem *Leythepenti* habui casum. Etsi enim femina quædam juvenis, & sub initium purgans assumpserit, & die vij. V. S. in eadem instituta sit, & nimias ob vigilias huic pharmacopœus narcotica exhibuerit, & post incongrua hæc artificia multa statim enata sint periculosa symptomata, vigilie continuæ, deliria non interrupta, lipothymia, tremor artuum, floccorum lectio, aliaque; tantum tamen absuit, ut obierit, ut potius Vesicatoriis nuchæ, pedibusque applicatis denuo ad se redierit, vocatis deinde in usum confortantibus, analepticis, bezoardicis temperatis pueros geminos enixa sit, atque præter omnium spem ex morbo gra-

gravissimo evaserit. Neque *exanthematica* nostris ullas dederunt inducias. *Catarrhalis*, licet in infante cum *inflammatione* tonsillarum, *deliriis* iv. die, superveniente *hemorrhagia* navium largiori sudore, urina turbida & inquinata, remiserit, alterationes tamen febriles post se relinquens, non nisi *purpura alba* subpullulante penitus disparuit. *Petechialis* ægrotis eo plus negotii facessabat, quo minus studiosa, minusque decens adhibita fuerit curatio. *Laxantia* etiam sub introitum morbi noxæ erant, & memini fabrum aurarium, ob propinatum purgans, atque refrigerationem factam, *lypothermiis*, *vigiliis*, *deliriis* tentantum die vij. e medio esse sublatum. Neglectam *petechialem*, hincque confusam animadverti in tribus juvenibus, quorum unus prioribus diebus in summam virium prostrationem, gravitatem pectoris, *vigilias*, *deliria*, *diarrhæam*, die vij. in subsultus tendinum, singultum, vij. in *petechias* nigras, viij. in soporem, sequente in purpuram albam, motus convulsivos incidens ix. die mortuus. Cæterorum alter non modo sub principium vertiginem, dolorem gravativum pectoris, alternisque diebus exacerbationem percipiens; sed & in progressu febris *vigilias*, *deliria*, *manuum tremorem*, *floccorum lectionem*, *torsionem oris*, alvi involuntariam excretionem incurrens die xii. fato succubuit; alter *biliosus*, variis excessibus deditus, præviis *vigiliis*, *deliriis* *diarrhæa*, die vij. sopore, *apbonia*, *urine suppressione*, ix. artuum tremorem, x. *urine involuntaria emissione*, tremore labiorum, subsultu tendinum, aspectu torvo, xi. *floccorum lectione*, *torsione oris*, alvi *dejectione involuntaria*, moribus convulsivis periit, quamvis ubique nihil non tentatum sit; imo tardius accersitus iisdem sanguinis detractione in statu amplius locum non habente, pro re nata *bezoardica temperata*, *confortantia*, *subadstringentia*, *antispastica*, *vesicatoria* aliaque longo usu atque experientia probata remedia suaserim. Eodem tempore multos occupabat *purpura*, quæ tamen prudenter tractata nulli funesta fuit. Spargebantur præter febrem *scarlatinam* in teneriori ætate cum vomitu, sufficula, *cephalgia*, moribus spasticis, convulsivis, *deliriis* præmaturis occurrentem, atque blandis *diapnoicis*, *antispasmodicis*, sudoreque die vij. victam, & aliz dum species, *purpura* nempe *rubra* atque *alba*. Atque hæc quidem etiam infantes febre *catarrhali* licet superata vehementer affligebat, quendam vero ex

adultis ob refrigerationem summo periculo exponebat. Cum enim proclivior sit febris hæc materiam morificam per poros cutis proscribere, mirum non est, mutatione lacti, atque aeris frigidioris admissione facta die vij. in subjecto nostro *plethorico*, *cachymico*, ob sudoris retrocessionem, majores statim *anxietates*, *inquietitudines*, *vigilias*, *mentis alienationes* ulque ad xi. diem durantes, in conspectum prodisse. Gravius sic decumbente ægro in consilium quoque vocabatur Archiætorum Cæsareorum Comes, Perill. atque Magnif. D. de Longobardi, cujus nomen, dum audio, veneror. Tametsi vero *Lectione* & *experientia* hic Vir Celeberrimus serio imperaverit, ut & continentiam tranquillam sibi commendatam haberet, & medicamenta *diapnoica antispastica* a me præscripta subinde repeteret, & aliis salutaribus *monitis* auscultaret, impedire tamen non potuit, quin *adstantes* suavis aliorum medicorum, contra *obstructionem* per *quattriduum* præsentem *clysterem* applicandum curassent, nisi eadem die xii. *purpuram albam* copiosissime erumpentem detegissem, atque sic Patientem ab orci faucibus liberaissem, quem mox *clystere* jugulassent. Julius ultra dimidium *pluvii* conspicuus erat, ita tamen, ut tempestas *pluviosa* cum *sereniori* per totum mensis decursum alternavit. Unde *gratus* atque exoptatus observabatur, quamvis & die xiii. *violenta* tempestas non tantum *Vienne* cum frequentissimis *tonitrubus*, flammæque *fulgoribus*, sed & in *vicinia* cum *grandinibus* insolitis, maximo *vinearum* damno, oborta, & *postremis* diebus ob copiosiores *pluvias* *horridior* secuta sit. Similes *vicissitudines* ratione caloris, atque *siccitatis*, per totum *Augustum* sentiebamus. Calor enim semper moderabatur *pluviis*, aliquando *citius*, aliquando *tardius*. Nonnunquam *mane optima* tempestas comparuit, *spurca* succedente *vesperi*, nonnunquam *calorem* per aliquot dies durantem *pluviarum* *continuas* excipiebat, imo & sub *finem* æstus *diuturnior* imbres *largiores* prægressus est. Atque ob *pluvias* tam sub *initium* mensis *sequentis* ingruentes, quam circa æquinoctium *autumnale* continuantes tempestas *frigida* atque *humida* ad *postremos* ulque *Septembris* dies perseverabat, reliquis, a *tertia* nempe ad *xvii.* *Serenis* atque *equalibus* existentibus. Anni *æstatem*, cum ineuntem, tum adultam, tum præcipitem *pluviosam* & alibi deprehendimus. Sive enim *tempestates* gra-

viore, atque numero non modo spectabiles, verum etiam ob fulmina vehementiora, torpida horrenda, grandines immanes, in Volhynia, Leopoli, circa Lovitium, Upsale in Ducatu Bremensi, Dresda, Auguste Vindelicorum, Francofurti, Londini, Suffolcia, Lutetia Parisiorum in Civitate Remensi, Pivardia, Genae attendamus, sive imbres largiores, atque per copiam, & aquarum pluvialium affluentiam vel animatorum, vel oppidorum, vicorum, vinearum, agrorum, pratorum, aliarumque rerum inanimatarum jacturam factam in insula Citiuorum minori, Cremesie, in Austria superiori, Bohemia, Palatinatu, Bruxellis, Halle Saxonum, circa Berolinum consideramus, luce meridiana clarius id ipsum est; utur Holmie, atque in Moscovia major calor majorque siccitas cum nebulis foetidissimis, quam ab xi. annis sese exeruerit, ut & pisces inde in Suecia perierint. Hic tamen temperabatur calor pluvis adhuc dum Julio cadentibus, illinc frangebatur Augusto accedente frigore quod equinoctio autumnali appropinquante & Moscoviae, & Ottoniae majus incrementum sumpsit. Denique & notatu perdignum ea, quae ruri a grandinibus intacta permanserunt, a cicadis turmatim Poloniam, Lusatiam Superiorem & Inferiorem, atque Marchiam Brandeburgicam ingredientibus, intra spatium xxxv. horarum fere omnia fuisse consumpta, irreparabili incolarum damno. His mensibus aestivis, praeter apoplexias Hagae Comitum ingressas, arthritidem Londini instantem, atque podagram Romae, Moscoviaeque increbescens, diversae febres adhuc dum spargebantur, ita ut ex continuis inflammatoriis, quales sunt pleuritides atque peripneumoniae, Gallos invaserit malignae modo in Salopia Anglis intra quadriduum funestae, modo in Apulia militibus Caesareis lethales, modo Cazalla degentibus periculum minantes grassatae sint catarrhales in Ducatu Mantuano regnaverint, variolae Romae, Lutetiae Parisiorum, inque Campinia vignerint, dysenteria in Italia hominis adorta sit, pestis in Poetelia, Volhynia, Moldavia saevierit, imo denique & lues quaedam pecora circa Caementiam, Chotiniam, inque Spirensi Episcopatu occupaverit. Eodem tempore Vienna commotioni humorum supervenire solebant haemorrhagicae congestiones, quas pro diversitate loci nunc haemorrhagia narium, nunc haemoptysis comitabatur. Quin etiam ansa hinc arrepta in mensium retentione visus hebetudi-

nem habuerunt sociam, cedentem non solum antorgasticis, atque antispasmodicis, verum etiam fluxu menstruo redeunte penitus disparentem. Sicuti vero rheumatismos nunc inde videre licuit; ita similis congestio per totum latus dextrum sese extendebat in fene plethorico, & podagrico alias, & brevi ante morbum de Stranguria aequae, atque catarrho conquesto. In hujus facie periculosa sese sistebant Symptomata, inflatio, ophthalmia, oris tortura, partium adfectarum actio laesa, ut neque comedere, multo minus fistulare potuerit. Atque hic mihi superpetas praeter ceteris ferebant diaphoretica, antispasmodica, nervina vel in infuso, vel in decocto pro oris elutione, vel linimenti forma praescripta, quae post V. S. reiterata adductis Symptomatibus superatis, imo rheumatismo circa claviculam subsequenter etiam discusso, successive aegro sanitatem reddebant, licet maturius aeri frigidiore, atque humidiori se exponens podagram tandem incurreret. Sunt & alii adhuc morbi, qui subpullularunt. In aetate graviore raucedo sese prodebat, tussis vehementior eandem affligebat, in primis hypochondriaca, quali Illustris. quaedam Domina septuagenaria, juncto dolore hepatis, laborabat. In subiecto sanguineo-cholerico, atque podagrico, nephritidem calcidosam, cum doloribus acutissimis, clysteribus, digestivo-antispasmodicis, ol. amygd. dulc. balneis relaxantibus, unguentis emollientibus, quae calculi secessum facilitabant, sustuli. Affectibus Spasmodico-arthriticis ex propria fonte erat succutendum. Sic in hemierania chronica, malo ischiadico, podagra antorgastica, digestiva, diaphoretica, antispasmodica majorem opem ferebam, quam ab ullo alio remedio expectari potest. In arthritide fixa cum tumore manus hae quidem non sufficiebant; sed pulvis ex sale cicchor. secul. ari. pulv. hepat. rubr. atque diagryd. Sulphurat. paratus, laudatis interpositus fere punctum tulit, cujus hinc usum, quo usque penitus remisit dolor, continuavimus. Occurrebant etiam in adulta virgine plethorica motus convulsivi contumaciores, durantes per triduum, artusque adeo torquentes, ut in luxationem cubiti inciderit. In causum mali inquirens animadverti, eosdem sine manifesta causa fuisse enatos, neque unquam, si convulsiones ob terrorem post morsum canis in Juventute perceptas excipias, ab eadem antea perpessos. Remedium praecipuum ac praesentissimum fuit pulvulus ex matr. perl. praep.

antim. diaph. nitr. dep. lumbric. terr. præp. cinnab. constans, quem aliis non iuvantibus exhibui, eumque deinde, applicato quoque *clystere* repetii. Nec defuerunt febres *malignæ*, *acutæ*, interdum sub *continentis*, interdum sub *schemate continuæ* apparentes. Quam plurimæ fuere *exanthematicæ*. Sæpe complicabatur *purpura rubra*, in primis in *infantibus*, sæpe *petechias* emittebat, hæc febris. Atque *petechialis* denuo duabus personis, quod *purgantis* assumpserint, a *vino* non abstinerint, *diapnoen* neglexerint, *tremoribus* totius corporis, *vigiliis* perpetuis, *deliriis* furiosis sese repræsentans, funesta erat. Alios affecit sine *exanthematibus*, quod tum *catarrhales*, tum *dysentericæ* sub finem *Septembris* invalescentes satis superque probat. Quædam jam in principio *dysentericæ* menses, expertæ sunt, in quibus *pilulas Stbal.* subjunctis *spec. de hyacinth.* atque *corall. rubr. præp.* cum successu adhibui. Taceo *quotidianam*, *tertianam duplicatam*, *ischuriam* gravissimam V. S. in pede decrescentem, *diarrhæam* torminosam post iram *nitrosam* atque *præcipitantibus* victam, aliosque morbos his mensibus sese offerentes. *Octobris* initium *serenum*, utcunque placidum fuit, *progressus* ad finem usque *nebulis*, *pluviis*, *nivibus*, *grandinibus* conspicuus, *humido frigidus*. Totus *Novembr.* aut *nebulosus*, aut *pluviosus*, aut *ventosus*, aut *nivosus* erat, adeo, ut eodem mense neque quatuor dies *tranquilli* & *sereni* numerari potuerint, neque *frigida* atque *humida* tempestas unquam minuta sit. Quamvis autem & *Decembris* *pluviosus* comparuerit, *repens* tamen atque æstatis simillima tempestas eidem jungebatur, quam vix per *iv. dies* stantem excipiebat alia multum diversa. Sequebatur enim *ventosa*, *nivosa*, *rigidior*, quam ullo, quod memini tempore, *frigori* acriori die *xx.* atque *xxi.* obortis *pluviis* quidem remittente, sed *xxiii.* majori vehementia cum *Aquilone* atque *nivibus* redeunte. Sicuti vero priores *Octobris* dies, tam ob cælum splendore plenum in *Palatinatu*, quam ob *siccitatem* in *Ducatu Montano*, ac *Dresdæ* calidiores quoque fuisse intelligimus: ita & *sequentes* atque *postremos* jam *venti* rigidiores *Venetis*, in *Hispania*, jam *pluvie* non interruptæ circa *Scaphusiam*, in agro *Bononiensi*, *Ducatu Guardistallensi*, insula *Juonis*, aliis provinciis *Hispaniæ*, *Camæniciæ*, jam *nives* *Holmiæ*, *Petripoli*, in *Ducatu Nuvogardiæ inferioris*, *Camæniciæque* humido-frigidiores reddebant.

Atque hæc, *frigida* scilicet, atque *humida* tempestas, dum ob *ventos* circa *Portum ostium*, *Dublinum* violentiores, tum ob *pluvias* in *Palatinatu*, *Coloniæ*, *Bruxellis*, *Lutetiæ Parisiorum*, *Romæ*; *Genovæ*, *Calpe* copiosiores; tum ob *glaciem*, *nivesque* in *Moscovia*, *Polonia*, *Suecia*, recurrente *placidiori* aëre solutas per omnem *Novembrem* continuabat. Denique & *Decembr.* aura *temperatiori*, *pluviis* frequentioribus slipata, *Batavis*, *Gallis*, *Germanis*, *Polonis*, aliisque illuxit, tantumque abest, ut talis permanferit, ut potius *surbidus* successerit. Testes sunt non modo *venti* vehementiores *Romæ*, *Liburni*, *Venetis*, *Neapoli*, in *Lacu Lemano*, *Maclopoli*, *Rupellæ*, *Hanoveræ*, *Coloniæ*, *Agrippinæ* in *Franconia*, *Hesniæ*, in mari *Baltico* sese exerentes, verum etiam *nives* cum acerbissimo gelu in *Moscovia*, *Polonia*, *Suecia*, *Holsatia*, *Saxonia*, *Gallia*, *Helvetia*, *Hispania*, *Baviera* invalescentes: Remisit quidem *frigus* in *Bavaria*, *Polonia*, aliisque regionibus per paucos dies, mox tamen rediit *intensissimum*, cum omni tempestatum insolitarum, *nivium* & *ventorum*, genere. *Autumno* nunc *arthritis* *Londini* crescebat, nunc *podagra* *Romæ*, *Mediolani*, *Genovæ*, *Lutetiæ Parisiorum*, in *Batavia*, *Berolini* affligebat. *Romæ* eodem tempore *pleuritides*, *peripneumonice*, *angina*, aliæque febres *inflammatoriæ* frequentes erant. *Malignæ* & in *Palatinatu inferiori*, & in agro *Lunensi*, & *Genovæ*, & in insula *Juonis* in homines sæviebant. Non defendam easdem vel *classicula Hispanorum præsidiaria* mediante ex *America* in locum posteriorem fuisse delatas, vel ex fonte quodam impuriori ortum sumxisse, hoc saltem addam, has modo *continentis* Schema, modo indolem *continuæ* exhibuisse, cutem aliquando *maculis*, aliquando *nullis* fuisse interstinctam ut de *duplicatis* in quibusdam perspectis nil adducam *Variolæ* *Coloniæ Ubiorum*, *Londini*, *Lutetiæ Parisiorum*, *Versaliis*, circa *Auricum Carnutum* in *Luna Villa*, in *Hispania* regnantes, si morbos reliquos non exuperabant, numero tamen æquabant. Neque *pestis* in *Podolia*, *Polthynia*, *Moldavia* crescebat, neque *lues pecora* occupans remittebat; sed latius serpendo & eundo tantas acquisivit vires, ut eorum quantitatem maximam in *Bohemia*, circa *Pasovium*, *Zammoscii*, in *Lithuania*, *Marchia Brandenburgica*, versus *Ducatum Magdeburgicum*, aliisque in locis *Saxonie* e medio susceperit, cui malo in postremis regionibus mul-

multum favebant miasmata putredinosa a cicadis relicta. Caterum præter *paralyfes*, *apoplexias Romæ Mediolani, Cernæ, Lutetia Parisiorum, Hamburgi* sese sistentes, nil memoratu dignum mihi occurrit. Iisdem mensibus Virgo quædam Viennensis post V. S. ob menses pauciores in pede institutam, crocique essentiam adhibitam, fluxum mensium nimium incurrit, quem adstringentibus ab ordinario præscriptis expugnare per vij. Septimanas, sed frustra erat conata: hic ego ad repetitum antorgasticorum usum confugi, neque poenitenda opera, quandiu enim ita propinarentur, satis recte habuit, sed cum his moderaretur tantum fluxus, non tolleretur, V. S. in manu suâ; qua celebrata sine antorgasticorum præsidio omnino convalescebat. In aliis *rheumaticos* decubitus vertus faciem, in aliis *otalgiam*, in alia post refrigerationem, atque aliqualem *loebiorum* suppressionem *ontalgiam* vidimus; in alio puero ob neglectam *diapnoen* diu *purpuram* prepresso sese ostendebat *chelocace*, sive labrosulcium, cum exulceratione labii superioris oris gravius, ac quasi *hereditarium*, alii *coryza*, *angina*, *tussibus* laborabant; in aliis affectibus *spastico-arthritis*, *digestivo-diapnoico-antispasticis* sublatis invalescebant. Innumeræ quoque hinc inde spargebantur febres, *inflammatoriae*; *malignæ*, *catarrhales*, *exanthematicæ*, *intermittentes*, *tertianæ*, aliz: sed præ omnibus *purpura alba*. Invadebat enim non tantum *infantes*, maturius in febre *scarlatina* mense Junio aeri liberiori commissos, sed & *adultos*. Sequiorem sexum duplo gravius afficiebat. Sic affectum *hysterici*, *animi abjectio*, *ardor* atque *anxietas cordis*, *cephalalgia*, *vigilia*, *deliria* usque ad xvi. diem continuantia in Juvene quadam Domina *purpura alba* superveniebant, quibus sese excretio critica partim per sudorem die vij. apparentem, partim per *hemorrhagiam narium* largiorem xvi. obortam, sequentibus xvi. etiam mensibus, adjunxit, ut & *exanthematicum* eruptio xi. & xvii. secunda vice cum levamine sese prodens. Dux ex puerperis hac febre laborantes meam implorarunt opem, quarum alteri *camphorata myrrhata*, similiaque interne dederunt, alteri tincturas spirituosiores præscribere Medici. Etsi vero *calidiora* utrique dissuaserim, atque ob *vigilias* & *deliria*, *temperatiora* laudaverim, tantum tamen absuit, ut id ipsum in prioribus observatum fuerit, ut potius *massam humorum commoventia* repetierint, sicque im-

perite tractata, nulla de *siti*, nullo de dolore conquerens, utinam etiam *naturali* fere existente, die xi. sublata sit. Posterior, quæ non modo *spongiosioris* atque *plethorici* habitus erat, verum etiam ante annum cum sub initium gestationis menses continuos, tum medio tempore *fluorem album*, tum vij. mense *abortum* experta est, hoc gravius decumbebat, quod & in *abortum* denuo abique causa manifesta inciderit simul duabus simul *molis* secedentibus, & ob violentiorem *secundinarum* diutius remanentium extractionem debilitates *syncopicas* senserit, & die viij. sudore præsentem aerem liberiores admiserit & viij. *exanthematibus* jam prodeuntibus *encinatis* injecto facta fuerit, & ob neglectam *diapnoen*, dum surgeret maturius, atque *purpura* sub blando odore sensim evanescente, *rheumatismo* pedis summe dolorifico tentata sit. Serio hinc imperavi, ut sub continentia tranquilla regimen *diapnoicum* sibi commendatum haberet *Variolæ* copiosiores, ordinariis quidem majores, atque sub initium *pellucide*; deinde tamen ad ambitum *inflammata*, juncta febre exquisita, vigiliis, deliriis *suppurascens* æque, ac die xiv. *exiccata*, decidentemque cum solutione mali sub blanda *diapnoæ*, urinæque *turbatione* viscebantur in filia jam adultiori, cujus in fratre mitiorem vim morbi animadverti. Nil dicam de *pleuritide* in Juvene vij. die sudori cedente. Neque vel de *cachexia* cum nodis atque *abscessu* mammæ in puerpera a purgantibus fortioribus, suâsu *barbitonfortis* assumptis aucta, *digestivo*, *diapnoico antispasticis* autem a me ordinatis, sub copiosiori sudore, copiosiorique *urinae* excretionem successive penitus disparente, vel de aliis morbis *sporadicis* quicquam adducam. Hoc saltem addam, *mortuorum* numerum, sicuti Londini 26761. Amstelodami 8911. Brunsvici 1233. Licaonia 400. Berolini 2691. Wirtembergæ 260. Dresdæ 1740. attigerat, ita Vienna ad 8493. sese extendisse. Sufficiat hæc de constitutione epidemica hujus anni fideliter, prout & in alieno, & in mea praxi occurrebant, annotasse.

Dr. D. GAROLI RICHA,

(Philos. & Med. Doct.

*Constitutio Epidemica Taurinensis
Anni 1720.*

I. **H**umanum Corpus variis passim advenientibus impressionibus excipiendis aptum, variis idem malis affici notum est, quæ quidem modo ab occulta æris diathesi ortum habent, modo intime profecta a variis fermentationum generibus, vel etiam putrefactionibus humorum, ut ajunt; seu rectius ab alterato fluidarum cum solidis partibus æquilibrio, ad cujus legem mechanici præceptis illud idem comparatum est, subnascuntur. Hinc multiplex morborum cohors ab omni ævo terris incubuit, seu ab hac, vel illa peculiari corporum particularium anomalia, seu a causa magis generali producantur; Hosce postremos proprie *Epidemicos* dicimus, vel indiscriminatum, nulloque servato ordine homines invadant, vel continua quadam serie, ceu facto circulo se se invicem excipiant, statisque temporibus oriantur.

II. Si quibus autem in morbis *divinum* illud ab Hippocrate proditum elucet; id sane in epidemicis cernere est, quorum causam rectissime venerandus idem senex in anni tempora rejicit, quæ prout constitutionem suam naturalem servaverint, vel ab ea recesserint sanum, vel ægrotum corpus efficiunt, variasque ægitudines producant. Nihil sane quicquam animum universæ, quæ patet, Medicinæ pomæria perlustrantem tanta admiratione percellit, quam discolor, illa, & plane sui dissimilis istiusmodi morborum facies, tum qua varias ejusdem anni tempestates, tum quæ discrepantes diversorum ab invicem annorum constitutiones referunt, ab iisque dependent; ut vere *divinum* quid dixeris inesse iis, nec immerito *divino* laudis honore celebrandos, qui occultam illam, atque inexplicabilem æris influentiam, unaque simul desævientes morbos scite norunt expendere, ac prænunciare.

III. Atque id quidem rite assequi res est multi otii, ac summe ardua; Opus utique vere magnum, cui fortasse unus Medici ætas non suffecerit. Diu nanque, ut ut improbus, exantlandus labor est, antequam

nos aliquid memoratu dignum in hocce sciendi Istmo, inque tam multifaria horum morborum serie extricanda præstitisse jure possimus gloriari. Neque is ego sum, qui me in his, quæ jam trado, omnem absolvisse numerum credam: Novl enim *quo ex luto mihi finxeris præcordia Titan; Quamvis sit mihi curta sepellex*. Satis erit ad laudem inchoasse telam quove pacto se res habuit nuper, quod ad hanc scilicet, in qua degimus, Urbem, ejusdem agrum pertinet, enarrare.

IV. Quod ut ego felici calamo assequi pergam, ac dilucide, quantum fieri potest, quotannis prosequi, ac illustrare; consentaneum duxi, quæ propria ac sua sit hujusce Cæli natura, quidve in hoc, quem premimus, Agro laudandum, quid culpandum sit, antequam ad alia progrediar, paucis exponere. Mea etenim immo Hippocratis sententia, id scitu maxime est necessarium, nemoque Cinicorum alicubi esse potest, vel mediocri fama celebratus, quin ante omnia locorum, in quibus se velit exercere, cum positiones, ac ventos, tum aquas, & cæteras æris, & alimentorum qualitates (quæ Urbium Cælum constitutere videntur) probe cognoverit.

V. Eaque quidem omnia ad commendationem Taurini agri concurrunt. Enim vero Taurinorum Augusta, si modo ejusdem positionem spectemus, mirabili certe vel casu, vel consilio haud longe ab Alpium radicibus in ancena planitie excitata fuit ad lævam Eridani Fluviorum, Regis, *nullo annuum*, ut Plinius ait, *claritate inferioris*. Hinc lætissimi Colles, quæ Orientem adspicit, trans Padum nitidissimo prospectu consurgunt oppositam imminetibus Alpium ad occasum Solis fastigiis faciem præbentes; Hinc effusissimus ager, quæ Boream, ac Meridiem spectat, protenditur, quem *Taurinates campos* vocat Anonymus in Panegyrico ad Constantinum; *Taurinos* ego potius dixerim elegantiore vocabulo, quæ quidem usus est Ptolomæus, Tacitus, Plinius, & alii quam plures. Sic etiam Taurini Populi dicti sunt, qui antiqua Ligurum stirpe huc primi confluxere.

VI. Isque est Urbis, tum Agri conspectus, vere, si fas est ita loqui, *Elisius*; Ecquis enim haud videt ex tot hisce inter se non diversis modo, sed quasi contrariis locis, Collibus nempe Alpiumque cervicibus haud longe ab Urbe impendentibus, amplissimaque interjecta planitie mixtam

veluti quandam ex omnibus, ac libratam Atmospharam consurgere; fluidumque aëra, quem a Sole potissimum, Luna, ventisque inæqualiter premitur, perenni motu agitatum, minimo illud negotio a finitimis Montibus in patentem planitiem, & vice versa contendere, sursum illud prementibus, urgentibusque partim domorum ignibus, partim æris campani pulsu, & discurrentium Civium miscela.

VII. Sic vero præsertim comparata Urbs est, ut liberum habeat Solis tum ortum, tum occasum; qua nanque parte Orientem intuetur Solem, ita compositi sunt interjecti Colles, ut ejus illa radiis nulla, vel exigua diei parte defrauderetur; qua vero Occidentem adspicit, diffusæ Alpes, fere sexto ab ipsa lapide, Occidui morientis Solis aspectum nullimode inhibent; quinimmo radios quoquo modo reflectendo, ac declinando hilarem, latissimumque vespera incolis ferunt.

VIII. Insuper præstant modo dictæ Alpes, quod excelsis illis, quibus eminent, cervicibus, lenes, mitesque occidentales ventos, quos cæterum impetuosos maxime, ac insalubres potissimum Gallis occidentalibus novimus, lenes inquam, mitesque Subalpinis ferant, ea quidem ratione, quod uberissimam illam, si quid ego hic judico, vaporum aquosorum copiam, quam hi secum ex Oceano Atlantico vehunt, magna ex parte per vastissimum totius Galliarum occidentalis tractum dimiserunt, tum si quid adhuc retinent, antequam alpes pervadant, deponunt, quo scilicet dein lenes ii, ac temperati Subalpinas hæc Regionem benigno afflatu recreent.

IX. Quod vero orientales ventos attinet, hosce libere per universum Agrum Pedemontanum perflare sinunt exarati Colles ad Orientalem Urbis plagam compositi: nec humiles nimis, nec elati; ita tamen dispositi, ut nonnisi purissimum ætherem, leniterque retusum, ac mitigatum ad nos prima luce appellere permittant, perque patentem campos discurrere.

X. Neque disliteor haud adeo insensum nobis fore Boream, atque illi oppositum Austum, si quid opportune illis opponeretur, quod medium veluti libramentum eorundem vim frangeret, ac temperaret. Cum vero libere hi tum a Septentrionali nivibus obsita, tum a Meridionali vaporibus aquosis divite plaga, nullo interjecto obice discurrant; furentes inde, ac debacchantes

savissimo plerumque flamine Incolas verberant, vel eo maxime, quod assurgentes utrinque montes, apertum iis campum, ac quandam veluti alveum, quo mare sæviant, præbent. Longe vero Meridionali inferior Boreas est, quod ille inquinamenta, quæ secum vehit, medio quasi in itinere, antequam in obviam illa planitiem illabatur, interjacentibus maritimis Alpibus, quæ a meridie imminet, ac Niciensem ditionem a Pedemontio determinant, dimittere cogatur aliquando. Boreas vero e Montibus glacie, nivibusque tectis sponte ruens subiectos campos pervadit, libereque furens non modo aërem valde condensatum, & compressum adducit, sed & minuta corpora nitrosa non parum insensa secum advehit, erodendi, irritandique facultate prædita, quod aperte quidem ipsamet ostendit ædificia, quæ cum maxime inveterascunt, adversa Septentrioni facie, non leves corrosioni notas præ se ferunt. Equidem, ut rem omnem in pauca contraham, ex hisce omnibus ventis, quibus Taurinus Ager perflatur, neminem agnoscimus Orientalibus salubriorem, neminem insuper insensorem Borea, atque Austro, insensosque denique minus, ac forte etiam salubres, cum maxime moderate flaverint, Occidentales didicimus.

XI. Plures vero fluentes aquæ uberi gurgite hosce campos alluunt, haud exigua incolarum felicitate; Hinc rivulos pene innumeros cernere est per universum agrum longe, lateque eximia, nec unquam satis laudata Colonorum industria disseminatos, qui rursus dein una omnes in unum, alterumque amnem, majoremque alveum excurrunt. Hosce inter amnes aquis, tum munere præclariores sunt Padus, ac Duria; Ille e gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen elati, finibus Ligurum Vagiennorum, visendo fonte profluens, condentique se se cuniculo, mox in Forobivensium agro iterum exoriens, placidissimo motu, quæ præsertim aprici colles eminent, juxta Urbis mœnia præterlabitur; ultroque dein pergens murato itinere Orientem versus excurrit, quo tandem aquis dives in Adriaticum mare tergeminis ostiis se se exoneret. Hæc ex Alpibus Cottis præcipiti tramite decurrens altero sui alveo Pado adfunditur, altero in rivos diviso per Urbis seminas salubriter devolvitur, immundiciarum faciem, impurum spiritum, & causas gravioris Cœli secum una removens, auferensque.

XII.

XII. Sunt enim Alpes ita dispositæ, ac comparatæ, ut si quo in loco, hic sane admirabilem lufum excelsis earundem cervicibus præbeant, uberesque effundant in subjectam planitiem aquarum latices ex intimo earundem gremio profilientium, perque tot amphractus, ac mœandros læto, gratoque murmure decurrentium. Hinc soli bonitas aliis longe telluribus, quæ clementissimo Cælo gaudent, profecto non inferioris. Hinc frugum omnium, ac rerum proventus uberrimus, nullo non tempore, parvo etiam pretio copiosa tellure salutarem incolis, ac hospitibus victum largiter subministrante. Hinc benigna aëris nativa indoles, quod caput est maximum, potissimum repetenda; Sicuti enim secundum Theophrasti (1) axioma, *salis est aqua, qualis est terra, per quam ipsa percolatur*. Ita quoque, me iudice, plurimum una simul conspirant, atque invicem juvantur, lædunturque, aër, & aqua: nilque adeo magis, quem scilicet ceu immensum quasi spongiam minutissimorum corporum, quæ a terraqueo orbe, perenni tum externo molimine excitantur, concipimus, puritatem, bonitatemque, ac locorum proinde felicitatem, atque incolumitatem conducit, quam dulces, probatæque aquæ suos per alveos, & canales libere excurrentes.

XIII. Ecquis vero lymphas, tum quæ ex intimis Alpium amphractibus scaturiunt, tum quæ sponte ubique in universo agro profiliunt, tot inquam infontes lymphas crimine, aut malitia culpaverit, quarum bonitatem certissimo argumento, præter spargiricam analysin, longa diu experientia, probatusque apud incolas usus testatur? Quis limpidissimos ubique orientes fontes criminabitur, ad quorum quamplures, tanquam ad sacras Thermas concurrere ægros novimus, eorumque auxilio diuturnis ipso malis evadere? Quis puteales ipsas, quæ tum in Urbe, tum in finitimis Oppidis passim prostant, aquas vitio redarguerit, quas, aut saltem plerasque, longo usu, optimas esse didicimus? Quod enim harum pleræque putidæ alicubi reperiantur, malum hoc acceptum referendum est non lympharum venulis, sed modo corporibus facile putrescentibus, quæ in puteos ipsos præcipitata sunt, modo nimis quieti earundem putealium aquarum, modo tandem, quod fre-

Supplem. ad Sydenham. Tom. II.

quenter accidit, Architectorum imperitiæ, qui puteos cavant juxta latrinas, aut cloacas, quarum sepulta lues infontes aquas contemnerat.

XIV. Scio quidem fluviales maxime, non omnino infontes haberi, utpote quæ exoticis particulis, cum præsertim nives æstivis mensibus liquefcunt, inquinatæ sunt. Atqui adventitia hæc labes hujusmodi aquarum est, quam facili ego aliquando Marte diluam peculiari quodam, quem mihi olim elaborandum constitui, tractatu, *de morbis endemicis, seu de Medicina domestica Subalpinorum*; In quo quidem tractatu tum natives, tum adventitias hujusce, in quo degimus Cæli qualitates fufius, ac elaboratius exponam, tum, quæ præcipua res erit, naturalem Pedemontani agri historiam a nemine, quod sciam, tentatam adhuc, atque ab amicis diu expetitam, accurato, quantum fieri poterit, stylo persequar. Hæc interim satis erunt impræsentiarum pro ea, quam modo aggredior, felicique omine prosequi in dies cogito, exornanda Provincia. Manus itaque ad Tabulam.

XV. Utque ab ante acti anni 1719. exitu, Hippocratis more, incipiam. Fervidissimam, ac pulverulentam æstatem siccissimi veris, ac hyemis sobolem, pluviosus, ac lutulentus Autumnus excepit. Nulla scilicet visa dies ab autumnali æquinoctio ad hyemale solstitium usque nubibus expers, ac læto Cælo. Nec diu quidem se se prodere distulit morbosa proles sub februm larva nullo fere typo suborientium, quæve morbillosarum, ac variolosarum indolem præ se ferebant, delitescens. Et sane morbilli, qui præcedentibus annis totam pene Pedemontanam Regionem, longe, lateque, infestarunt, jam fatiscences dein, variolis locum cesserø, quæ ineunte æstate subortæ, autumnò maxime debacchatæ sunt, deploranda tenellæ præsertim ætatis clade. Curiosum sane erat, quo hæc pacto ab uno ad alterum finitimum oppidum migrabant, ac se se invicem excipiebant, perpendere, eundem scilicet quo antea morbilli apparuerant, ordinem servantes, ac morem, ingeniumque. Alpina nanque loca ab hisce primo, mox universus denique Pedemontanus ager funestatus est. Diceret ab Alpibus illas ad Subalpinas Urbes transiisse: unde demum factø velut agmine, ac impetu a

V v v

fini-

(1) *De caus. plant. lib. 6. cap. 3.*

finitimis regionibus ad magis diffitas, a Subalpinis ad Insubriam, ad Insubria ad Mutinensem agrum, ab hoc ad Romanum, totamque dein extremam usque Italiam propagatae sunt. Quodque mirum magis est, ac considerandum maxime; quod lethale esse solet hisce erumpentibus, nigroque propemodum lapillo signandum; id fere proficuum extitit, ac salutare: motus nempe per alvum spontaneus ab ipso variolarum erumpentium exordio ad usque supremum earundem stadium perdurans, cuius beneficio haud paucos memini, jam pene Orco proximos, ex insperato servatos. In quo quidem id ego potissimum didici, variolas nempe, cum maxime symptomatice, ut ajunt, erumpunt, alio utique more curari, tum judicari, ac illas, quae essentialiter se se produnt.

Variolarum Classi merito adnumerabantur putridae febres, variolosa, inflammatoria, ut subinnuimus, & hujusmodi aliae, quae aestivis mensibus suboriri coeperant, ac tum forte cudebantur, sequenti postmodum Autumno, ac Hyeme erupturae. Hisce se se addidere comites: Pleuritides spuriae, Ophthalmiae, Anginae, Dysenteriae Stranguriae, atque hisce affinium morborum prolixa Cohors, quorum una simul atque eadem omnium origo est, unum, idemque incrementum.

XVI. Atqui desit tandem, accedente hiberno solstitio, pluviosa Autumni constitutio, latioreque temporum indolem praenunciare visus est novus oriens Annus (1720.) sereno, mirique adeo Caelo, ut medio fere Januario Veris exordia praeludere jam tum coeperint, Occidentalibus ventis praemature spirantibus, quibus aequo pede identidem praeter morem Australes succedebant. Quis aegrorum status in illa vere insolenti conditione temporum fuerit? Quid inde subsequenti aequinoctio pertimescendum maxime, facile is conjicere poterit, qui quod Hippocrates ipse in hujusmodi (1) inordinatis temporum vicibus portendit, plane didicerit? Et sane vix a pluviosa ad siccissimam rursus vergere visa est temporum constitutio, ut illico putridas febres in petechiales, ac male moratas illis affines, ac con sanguineas evadere adnotavimus, sensim evanescentibus variolis, nigramque faciem exantatis petechialibus, ac mali moris febribus,

quae de die in diem invalescebant, tradentibus. In hac postrema variolarum scena adultos maxime correptos vidimus, secus ac cum primitus apparere illae coeperant, primavos tunc flores tantum, tenellosque infantes adorta.

XVII. Quae igitur ineunte Januario exoriri coeperant malignae febres, eadem, appropinquante Vere, quam immanissime debacchabantur, ac velut rupto aggere torrens longe, lateque per universa quaeque Subalpina Oppida crudeli more desavebant. Addiderant hisce vim, atque robur ingens in illa siccitate temporum, in quam ex pluvioso Autumno inauspicato incidimus, hiscentes ab Australibus oris assidui flatus, infesti quantum! Praeluserant hisce quoque denso agmine morbilli, ac succedentes variolae, quae superioribus annis, ac praecipue exacta nuper aestate, maximam infantum cladem ediderat. Facile hinc conjicere erat iis potissimum vexatos iri labente anno Subalpinos Incolas, ni quae impendebant mala averterent Superi, miseraeque terras desenderent. Auditum tunc quoque est Romae hujusmodi febres, tum anginas, ac pleuritides desavire, quae multa hominum millia utriusque sexus, & omnis aetatis, ac dignitatis interfecere. Quod ego quidem non absque ingenti animi dolore meminisse videor, cum praclarissimum, & amicissimum virum Joannem Mariam Lancisium, Summi Pontificis nuper quoque dum haec ego scriberem, in Caelum elati Archiatrum, & Cubicularium intimum, de re medica, ac litteraria optime meritum, cui ego plurimum debeo, in luctuosissima illa rerum scena e vivis sublatum, & adhuc lugeam, & mecum una lugeat universa Litteratorum Respublica. Mylis quoque in Sicilia, haud absimiles morbos jam tum superiori Aestate, Autumnoque extulisse caput, inque dies ingravescere magis, ingenti militum tum Hispanorum, cum Germanorum, ac Incolarum funere audivimus.

XVIII. Exaratis febribus spasmodici pectoris affectus, sub ipsum Aequinoctium, ac diu adhuc post ipsum consociabantur, siccissimoque inito foedere, auctis veluti viribus, juniores maxime, ac robustiores ausi sunt laceessere, inque Libitinae censum deducere. Hisce quoque Comites aderant, absque iis merebantur Ignem sacri, anginae, arthri-

(1) Lib. de aëre, locis, & aquis.

arthritides, erysipelata, & alia id genus mala, quæ quidem eo magis recrudescere, quo parcius sæviebant exaratae febres, ac spasmodici pectoris affectus, fatiscere rursus, ac cedere, quo immaniter magis illi increbrescebant, ac ita vicissim reciprocantibus imperiis ludere pluries observavimus. Qui vero chronicis, ac tæbe potissimum, ne quidquid ad historicam morborum narrationem desit, jam diu conflictabantur, hosce initio Veris ex omni prorsus spe decidere, adque interitum properare celerius forte, quam par erat, adnotavimus; Quin insuper multis de tæbe in dubium venientibus, ipsa tunc est confirmata, atque haud scio si quis ex iis etiam modico tempore superfuir.

XIX. Isque fuit Austrinus hyemis status. Raro scilicet, aut nunquam *Boreæ penetrabile frigus* persensimus, quin insuper nivali vellere defraudata terra, ea saltem quantitate, quæ nostro huic Cælo congrueret, metus aderat, ne parum inde frugifera futura messis evaderet. Solabatur tamen annorum antecedentium felix ubertas, ut venturis temporibus provisa sufficerent. Equidem exarati affectus, si modo Arthritides excipias, quæ quoque satis apte ad vernaes morbos referri queunt, exarati inquam affectus Veris potius, quam Hyemis ingenium redolebant. Et revera non aliunde excitatas, ac pene dixerim expergescitas, nova veluti prole sobolescere crediderim præfatas affectiones, quibus tunc obruebamur, nisi ab Austrinis sævientibus flatibus, atque hinc præter morem serena, ac Veris speciem referente Hyeme, cui pluviosus Autumnus post ingentem illam temporum siccitatem prægressus fuerat. Hinc enim præludente, præmaturo afflatu, vere, ut vegetantia, quæque in agris, ita & humani corporis liquida intestino motu fermentescere cœperunt magis, ac agitari.

XX. Cum vero impar incœpto absolvendo muneri, ac minus congrua foret liquidorum massa, tum ob alternantium ventorum indolem, qui plerumque humidi, mox sicciterum perflantes, modo in motum data liquida ciere magis, modo illa cohibere, ac minus apta suscepto muneri reddere videbantur, leviozem inodo, mox præviorem aëra, ac condensatum magis adducendo; tum ob particularum sanguinis spigitiuosiorẽ præconceptam, ante aëra potissimum aëstate, ac vere, Phlogosim, cujus veluti proludia extiterant desævientes mor-

billi, atque is affines variolæ, impendentium jam tum malignarum febrium præfagia, ac incrementa; tum denique ob pluviosam Autumni habitudinem, morborum parentis, omnium Medicorum ore feracissimi; evidens est ad minimum adauctum momentum motus, quod reliquum erat balsamici, ut mea fert opinio, oleosi, aquosi, ac dulcis plus iusto, dissipatum iri, tum multigenos dein intra prædisposita civium corpora collectos Sales acres; erodentis, absque Autumnii pluviis in flumem evectos, ac recens ab Austro ulterius fusos, accedente novissima quacunque causa, tum maxime exoticorum quorundam miscela principiorum, vincula quæque discissuros obvia, hinc turbata solidarum partium resistantia, universam humorum massam, forte minus, quam par erat, sibi invicem hærentem, quam citissime fermentativarum particularum præsentia dissolvi. Ea nanque est unius fluidi ad alterum æquilibrîi ratio, ut unum veluti ab altero pendeat, eaque vicissim inter se una simul conspirent, ac ludant. Ubi vero quid insensum evenit, tamque pulchre inter se invicem comparatae partes non eam amplius observant æquilibrîi legem, tunc universam penitus massam intestino, ac pene dixerim, civili bello perfractam, ni quam primum periclitanti, ubi forte defecerit, naturæ opem præbeat ars, obeundis functionibus imparem evadere, ac tandem collabi penitus necesse est.

XXI. Quod quidem concessum tum exoticis, tum indigenis fermentativis particulis irascendi imperium, ingeniumque, evidenter, ac præclare satis, tum quæ potissimum grassabatur febris, tum quæ passim sub illius exortu, ac incremento sese prodiderant phænomena, ostendebant. Enim vero quotquot agrotare cœperant, hosce, plerisque saltem, febris indefinenter fere, nulla quidem conspicua, & peculiari accessione sævissime divexabat, quousque scilicet maculis purpureis conspersa, ac scedata cutis emergeret, aut quidquid aliud præludens præsentaneum interitum prænuntiaret; afficiebantur autem potissimum Meninges, aut Septum transversum, aut Hepar, illque finitimæ partes. Multis primò insulsi rigor, ac horror supervenit, quemadmodum in febribus intermittentibus videre est; sæpe etiam inermittentis typum mentiebatur, subque illius larva ad septimum fere diem, non nunquam ad undecimum usque nec ultra ludere visa febris; mox in malignam

evadebat, qualis ab ipso initio revera aderat, eo quidem magis lethalis, ac periculosior, quo diutius latens, non juniores tantum, sed senes, ac sapientiores sorte fefellit. Nec tamen sese, ita prorsus abscondi noverat illa unquam, quin aliquam subesse fraudem suspicio, aut metus foret, quidve mali moris, ac re ipsa divinum vel intermissionis, vel vexationis die appareret; alii nanque de immani capitis dolore, alii de ingenti aestu, ac totius corporis lassitudine conquerebantur. Quidam siticulosi aderant, ac diu vigiles. Haud paucos gravis adeo sopor, ut vix excitari potuerint, occupaverat; atque horum neminem servatum memini.

XXII. Ubi denique conspergi, ac foedari maculis cutis, aut principes partes periclitari videbantur, tum mitescere febris, frangi, consternarique vires, squallescere visa facies laborantis, ac pene jam deficientis naturæ præludia, quæ nullo amplius revocari poterat Cardiacò, aut Alexipharmaco, qualicunque. Hæ vero peticulæ, ut plurimum quarta die, & septima erumpébant; primo quidem in dorso, collo, & pectore conspicuæ, mox ad extremos usque pedum ungues sese expandentes; Observatumque paucos evasisse, quibus primis diebus illæ apparuerunt. Miles, cui tertio morbi die maculæ illæ ingenti agmine proruperant, sexto celerrime periit. Puella decennis Olitoris filia vehementissima febris cum horrore, ac frigore correpta fuit; statim per exordia sitis multa aderat, & incontinens corporis jactatio. Postridie peticulis pene lenticularibus tota visa conspergi cutis. Tertio parum synceri sanguinis e naribus stillavit. Urinæ crassæ, mox tenues, postremo nigre. Dejectiones alvi biliosæ, spumantes. Quarto deliravit. Quinto sincerus iterum sanguis e naribus effluxit. Sexto rigor febrilis rediit, multa, nigra, foetida vomuit; sub Solis occasum mortua est.

Puellam alteram meminisse non sine lacrymis lubet Uxoris meæ sororem, hujusmodi febris prehenfam; cum illi fluere de more muliebria; eaque ad quartum usque diem perdurarent. Quinto nauseabunda aderat, insomnis, toto corpore dolens. Multa vomuit biliosa, ac virulenta. Sexto ad meridiem, novus subortus est rigor exemplo; urinæ per initia tenues, postmodum crassæ, rubræ, quæ in matula depositæ non subsidebant. Postridie ejus diei, quo cessarunt mœnstrua, ingentes maculæ purpureæ

in dorso, pectore, & collo conspiciebantur, quæ dein novo exorto rigore febris, penitus evanuerunt. Septimo verba cum delirio; ex alvo dejectiones biliosæ, graveolentes; nox laboriosa, lentor dentium. Octavo remissa sunt omnia. Nono maculæ illæ densiore examine rediere: crebra spiratio, ad Vesperam multum deliravit. Decimo intercisa, & deficiens respiratio, aurum surditas; circa meridiem valde deliravit, confestimque rursus ad mentem rediit. Ex quo alvo irritata nihil successit. Paulo post oborto stertore celeriter expiravit. Ætas erat annorum fere septendecim.

Nec, diverso prorsus more, duo Chirurgi studiosi, in Regio SS. Mauriti, & Lazari Nosocomio degentes, quorum alteri ingens macularum examen secundo die, alteri quarto, apparuerat, defuncti sunt; Prior quidem decimo; alter vero decimo quarto: Neutri conturbata alvus; irritata eadem pauca demisit tenuia, biliosa, mordacia; uterque diebus paribus gravius habebat. Alterum memini haud absumili fato demortuum, cui prodire modo, mox regredi visæ peticulæ sunt ad plures vices. Hæ autem statim ab initio confestim eruperant. Robustus erat, ac ætate florens. Universa corporis lassitudine, & fractione, ut ipse agebat, conquerebatur. Sitibundus valde; Secundum, tertium, ac quartum diem eodem more transegit. Quinto exasperata sunt omnia, pauca, biliosa, tenuia ex alvo reddidit. Urinæ impense rubræ, oculi scintillantes, ac lucidi. Sexto evanuerunt maculæ; nihil ab alvo dejecit, deliravit. Septimo convulsiones. Octavo vox obscure se prodebat, extrema, frigida, livida, stillæ sanguinis e naso. Nono ad intelligentiam rediit, pauca dejecit nigra, graveolentia. Undecimo convulsiones iterum visæ, totaque maculis denuo foedata cutis. Decimo tertio vox pene defecit, Vespere obiit. Jurisconsultum juxta D. Pauli ædem decumbentem febris acuta continua cum dolore lateris corripuit. Sitibundus admodum aderat, & pervigil; urinas reddidit multas, turbulentas, albas, quæ nec depositæ subsidebant. Alvus commode habebat. Quinto die vehemens aestuatio, & stomachi fastidium adfuit. Potum continere minime valebat. Urinæ eadem, indistinctis, ac pene inconspicuis maculis foedata cutis. Sexto deliravit. Sub vespere mitius se habuit, commota sponte alvus, dormivit. Septimo multa ex alvo secesserunt sponte, probæ

indolis; urinæ copiosæ, concoctæ, in quibus multum subsidebat, profluxere, sitis defuit. Octavo motus ad alvum intermisit; mens emota. Undecimo conturbata iterum alvo, febre liberatus, atque omnino judicatione absolutus. Huic cum primum conturbari visa fuit alvus, multus ex utraque nare sanguis erexit.

XXIII. Profecto quotquot ab hac febre, sati ope, vel Medici, evasere (haud paucos autem evasisse memini,) hosce utique omnes sponte oborta ventris turbatio, eaque critice ad perfectam usque judicationem recurrens, integre absolvit. Sane neminem, quod sancte profiteor, e vivis sublatum vidi, quotquot is sponte evenit ad alvum motus, cui copiosa plerumque sanguinis e naribus, quandoque etiam ab hæmorrhoidalium venarum osculis effusio præludebat. Sudores, tum cæteræ quæque evacuationes, vel per urinam, vel per alias vias, per quas natura crises suas moliri solet, vel suppressæ penitus, vel irritæ plerumque aderant, ac nihil decernentes; saltem vix quidquam sperandum ab iis: Quodve mirere magis, sub ipsam peticularum eruptionem, earumque per totum corporis habitum effusionem, sæpe oborto ad alvum motu, haud paucos, quos prolixum nimis foret referre, ex insperato, velut ab Orco revocatos vidimus, ac restitutos; Quod jam tum antea deservientibus superiori ætate, Autumnumque variolis observare contigit; haud exiguo ægrorum numero, assidua sponte oborta diarrhæa, mox ab ipso variolarum exortu, aut incremento præter spem servato.

XXIV. Noxia ut plurimum venæ sectio aderat, tum cætera quæque instituta remedia, si modo illa excipias, quæ collabentibus tuendis viribus, neve sanguinis compages penitus diffiliret, inque pejus rueret, opportune occurrebant, cardiaca nempe grata aciditate præstantia, aut acidis consociata. Neque calidiora quæque quidquam quam præstabant, nisi forsitan hoc pacto *camino oleum*, ut fertur, addere; Fræno namque magis, quam stimulo egebant humores jam ad orgasmum proni, ac nescii stare loco. Cunctando potius restituenda erat res, quam velis, & remis occurrendo. Ad humorum impetum compescendum egregie etiam præstitit Peruvianus Cortex opportune adhibitus. Ejus enim præsidio plures vel integre

sunt restituti, vel si forte nonnulli recidivas passi sunt, paulo post convalescere. Cæterum æque ac V. S. minus prospere cessare vesicantia, ut quæ sanguini ad fluorem apto habenas potius mitterent, quam coercerent.

XXV. Quod si ante quartum diem materies turgeret, primæque viæ, ut ajunt, cruditatibus, ac iniquamentis scaterent; Emetico prudenter administrato, ut blanda purgatione tempestive instituta, neque non solum ullam unquam noxam exinde profectam memini, sed felicius indeeducta humorum saburra in stomacho contenta, exanthemata apparere, collapsas vires restitui, naturam denique ipsam ad perficiendum opus suum pro massæ sanguinæ a pravo miasmate expurgatione apriorem consurgere, validioremque effici, ac veluti ab interitu revocari, observavi.

VXVI. Equidem cum primum suboriri cœperant hæc mali moris febres; purgationes passim per exordia, ut mos est, a Medicis adhibebantur; ipseque ego ab hujusmodi methodo minime abhorrebam, vel ob id maxime, quod ventriculum impuritatibus oneratum, in plerisque noveram, minimeque cunctanum in iis casibus esse sapienter Medicos admoneat (1); Hipocrates in aphorismis. Ubi vero prodire maculæ, totaque illis scædari cutis videbatur, sacro quodam metu percelli mihi animum, commoveri, perturbari senseram, maximeque extimescere, ne forte retractis ad interna humoribus, omnia in pejus quam celerrime ruerent. Cum autem nihil inde noxæ proficisci, quinimmo mitiora quæque evadere animadverterim, turbatoque leniter plerisque ventre haud paucos hoc more servatos observaverim, secus ac illos, quibus, aut in principio neglectum fuerat, aut parum salutare creditum hujusmodi auxilium, cunctis dein, modo tempestive, ac bono fato accersitus fuerim; blandem purgationem, aut etiam robustioribus leve emeticum præscripsi, læto persæpe eventu; Cardiaci namque remediis, quibus oppugnanda aderat febris, tum Peruviano Cortici, si sorto hunc etiam in subsidium acciri opus erat, referabantur fores, licebatque iis sanguineam massam minime deturpata facie subire.

XXVII. Atque ob hanc sorte causam ce-

(1) 4. Aphor. 19.

lebriores Practici suspecta conclamant alexipharmaca per initia febrium malignarum, nisi exonerato ab impuritatibus stomacho, primisque viis ab obstructionibus expeditis. Neque is tamen ego sum, qui indiscriminatum purganda esse corpora statim ab initio contendam. Fieri nanque poterit, ut id genus auxilii, quod modo haud paucos revocavit ad vitam, necem alio tempore ægris inferat; quod maxime observandum esse docebat memoratus Hippocrates lib. 1. de morb. n. 1. & 2. *que scilicet bono per fortuitum successum Medici ægros curantes faciant.* Sæpe visum est in febribus alvi profluxia noxia fore; mortemque inferre, quæ aliquando salutaria extitisse novimus. Idque est Epidemicorum huiusmodi morborum ingenium, ut qua methodo currente anno ægros liberaveris, eadem ipsa anno jam vertente forsitan e medio tolles. Sæpe oborta hæmorrhagia plerosque servatos refert (1) Diemerbroech in Peste Neomagensi; Secus hanc olim lethalem experti sunt Tolosates, ac Lugdunenses. Ita scilicet ludunt morbi; Ingens proinde adhibenda cautela est, omnibusque animi nervis contendendum Medico quo tandem investigato, ac perspecto morbi genio ad eundem perdomandum recto pede, & intrepidus procedat.

XXVIII. Cæterum novum minime est per huiusmodi febrium initia purgationes adhiberi; Id quoque olim proficuum experti sunt Ballonius lib. 1. *Epid.* Septalius *caut. med.* l. 5. num. 47. Manardus Ferrariensis 5. *Epist.* 3. & 13. *Epist.* 1. Victor Trincavellius, Gentilis Fulginas, & plerique alii; Morbosam Constitutionem huic nostræ fere similem describit Galenus, in qua ii facile sanati sunt, quibus (2) *præexsiccatum*, sic ille inquit, *præpurgatumque corpus fuerit; quippe quod, ait ille, evomuerint ex iis nonnulli, & omnibus venter produxerit;* Atque hinc quidem didicimus sæpe in primis viis latere hostem, qui nisi *proximus* (3) ejiciatur e sede, evellaturque, quod alienum a natura est, frustra tentabit Medicus in fine propellere. Forte etiam Subalpinis ob lautorem victum major iis necessitas adest purgandi corpora per acutarum initia ægritudinum, quæ omnes præ cæteris ortum potissimum habent a stoma-

co. Didicimus insuper exanthemata, ac excretiones quascunque, quæ in principio, vel augmento accidunt, nullas fere esse criticas, sed symptomaticas, cujusmodi hæ fuerunt, nil sane decernentes, tum periclitantis naturæ præludia, tum plerumque turgentis, morbumque facientis materiæ hinc inde latæ, ac stare nesciæ, certissimum argumentum. Ubi autem in acutis materiam turgere, ac putridorum, aut malorum humorum copiam (si fas est ita dicere, & antiquissima verba usurpare) subesse animadvertimus, eadem die purgandum esse Hippocrates jubet 4. Aphorism. 10. Turgentem vero materiam subesse, virulentam, vagam, ac certam sedem non habentem ex variis, ac vehementibus, quæ suboriuntur, symptomatibus facile colligi, ac dignosci potest; cum scilicet natura multa, aut prava qualitate affecta, concitata materia, tentat inter initia eam expellere, excretionibus per alvum, per vomitum, per sudores, per urinas, per cutis efflorescentias, &c. Num id turgere materiam docet? Num evacuanda eadem quam citissime, ac statim ab initio? Ne forte, ut (4) laudatus Sepralius ait, *ad princeps aliquod membrum repat*, aut ad terminum eum ducantur humores, de quo locutus est Galenus libro adversus Julianum.

XXIX. Nec me quidem latet paradoxam forte nonnullis videri hanc locutionem, qui omni labore exanthemata, ubi semel apparuerint, per fortiora cardiaca magis promovere, aut retrocedentia eadem expellere iterum ac provocare, omnibus nervis contendunt; rati scilicet ita salvari debere patientiam, quem virus alias jugularet, quem tamen hæc ipsa nimis operosa methodus promptius enecat. Ast vulgaris hæc opinio est longe ab Hippocratica Schola recedens. Distinguendæ nanque sunt quæcunque contingant, excretiones in acutis, num scilicet salutari quadam eveniant crisi, num erroneo potius, ac deleterio naturæ conamine; utque sinere illas, intercipere hæc, aut saltem minime deterreri æquum est. Sic idem ipse Gaius in famosa Historia Simonis, in quo lata exanthemata erant, minime veritus est purgationem aliquando commendare (5).

XXX.

(1) Lib. 1. de Peste.

(2) 5. Meth. Med. cap. 12.

(3) 4. de tuenda valet. 4.

(4) Sent. Animadvers. Medic. lib. 5. num. 47.

(5) 2. de morbis vulgaribus 6.

XXX. Cum vero invaluerit malum, aut primæ criseos periodus præterlapsa, satius aderat ab omni remediorum genere abstinere; exasperari nanque morbum, atque omnia celeriter magis in pejus ruere exinde vidimus, collapsis jam tum viribus, neque amplius vim remediis sustinere apta laborante, ac pene jam deficiente natura: quod si minime amplius prodesse posse novimus, ne saltem remediis noceamus, conclamant omnes, quod & magno, & bono viro dignum inquit Celsus, ne quidquid præcipiamus, quod confirmatam artis auctoritatem malevolentissimorum hominum calumniæ subicere queat. Neque autem adulto tantum morbo a remediis omnibus abstinere satius fuit; quin id quoque salutare, ac proficuum maxime experti fuimus, vel in ipso hujusmodi febrium exordio, quæ sola plerumque purgatione, ut subinnuimus, tempestive instituta, felicius cessere, quam repetitis phlebotomiis, purgationibus, aut mille alexipharmicis, quæ pleno gutture, tanquam Deorum munera, receptariorum Chorus adeo celebrat, adhibitis. Equidem ut rerum experientia, ita & remediorum defectu Græcorum Medicinam Arabum scholis longe præstantiorem nemo non videt; ii nanque a mascula illa Græcorum medicina recedentes tantam adeo remediorum farraginem contulerunt, ut iis obrui potius quam direfcere etiamnum videamur. Et vero si illud est, quod maxime cavendum Oratori, & prævidendum putat Antonius apud Marcum Tullium, quodque eum sollicitare summe solet, non tam ut pro sit causis elaborare solere, quam ut ne quid obsit: non quin enitendum sit in utroque, sed quod multo turpis est Oratori, nocuisse videri causæ, quam non profuisse: id profecto longe æquissimum in salutis causa, atque ubi præsertim de humano corio luditur, videri debet, in qua vel levis offensio non sine magno corporis dispendio suscipi potest.

XXXI. Atque is quidem artibus Sapientis Viro mihi amicissimo, juxta sacram Divæ Virginis Consolatricis ædem decumbenti, graviter hujusce prosapiæ febris, ex eunte Febuario ægrotanti opem tuli. Is præstanti corpore, atque animo, ac veluti ad Polycleti statuem compositus, simplici tertiana paulo post æquinoctium autumnale superioris anni ad aliquot dies laboraverat. Rediit illa hyeme, aut saltem illius indolem, ac genium primo intuitu refere-

bat, quod horrore, ac frigore suas quasque accessiones metiri consuesceret; Atqui post septimum diem ingravescent magis, atque ex simplici duplex continua evadens, quid revera insensum, ac exitiale præludebat. Urinæ tenues aderant, conatus vomendi inanēs, pulsus durus, intermittens, diffusæ ubique maculæ, vixque conspicuæ ad cutem, sub Solis occasum omnino delitescētes. Decimo quarto mitescere visa omnia; dejectiones ex alvo copiosæ, frequentes, spontaneæ, pulsus æquior, urinæ magis coloratæ. Decimo septimo, ac decimo octavo recruduit iterum febris, intermissio ad alvum motu Præcordiorum contentio ad umbiliculum utrinque promissa: ipse animo vacillans, vix bene sui compos, pervigil, sub vesperam delirans. Decimo nono minus lugubris scena; multa ex alvo proba demisit sponte; dormivit. Vigesimo quarto ingravescere iterum visa febris; Genarum rubor, linguæ exarescens, respiratio difficilis, pulsus intermittentior, urinæ subrubræ, turbulentæ, quæ nec depositæ subsederunt. Abdomen inflatum, ac summe tensum. Irritata clystere alvus nihil deiecit. Vigesimo septimo multa rursus ab alvo secesserunt una cum concreto sanguine, sæculento, nigro; mitius se habuit. Vigesimo octavo, vigesimo nono, trigesimo primo idem obortus ad alvum motus, assidue perseveravit ad quadragesimum usque, cui tandem perfecta judicatio successit. Mirum sane, ut tantam adeo concreti, ac nigerrimi sanguinis quantitatem deiecerit, quæ singulis fere diebus ubi deiecit primum ex alvo sanguinem coepit, ad geminas fere circiter libras accedebat. Hæc illa erat turgens materia, quæ cum nondum ad excretionem comparata foret, ubique errans, ac impetum faciens sæva illa symptomata induxit, quæ in toto hujusce morbi decursu illuxerunt. Hæc illa inquam est, quæ præpurgato statim ab initio corpore, magnam in partem imminuta fuit; unde remissa semel impetus continuitate, recreandis viribus spatium dedit, quæ & pluribus præliis redintegratæ, & plurium dierum decretoriorum opportunitatibus, ceteris firmis stationibus collocatis, aucta, alioqui animosum hostem matura cunctatione frugerunt. Ecquid autem agendum Medico erat, præterquam vires tueri, tum strenue congregientem naturam passim erigere, quo tandem novo velut delectu habito par illa foret, constitutis, ac velut destinatis ad con-

conflictum diebus, quidquid insensum sibi erat suis e finibus amovere, expellere, eliminare. Ex quibus omnibus efficitur, in inveterascentibus morbis excitata ad judicationem natura, intermissum esse, & quodammodo interruptum, minime quidem continuum solutionum impetum; id quod luculentissimis verbis docet toties laudatus Galenus *cap. 5. lib. 2. de dieb. decret.* Ceterum haud paucis in hac febrili incurfione una cum sponte oborto ad alvum motu multum sanguinis ex hæmorrhoidalibus vasis profluxisse, jam fere inclinatis rebus, ac pene conclamatis adverti, atque eorum neminem interiisse.

XXXII. Nunc de vesicantibus, quorum applicatio minus prospera comperta est, pauca manent attingenda. Sane in febribus malignis, ac pestilentibus, in quibus sanguis ad coagulationem contendit, nihil iis præstantius, nihil aptius itidem, aut proficuum magis. Ast ubi humores ad fluorem proni sunt, ubi acriores iidem, ac effrænes, ubi sufflaminandus potius, quam stimulandus cruor est, nihil iis noxium magis, nihil magis perniciosum. Id olim quoque in Epidemica sui temporis constitutione recte adnotaverat P. a Castro. Vir insignis; ego mehercle multos absque iis perfecte liberatos vidi.

XXXIII. Ex adverso egregiam ægotantibus opem tulit Corticis Peruviani usus debito tempore, ac arte institutus. Is enim humorum massam coercere, excitatumque in sanguine orgasmum, mea, ac doctissimorum Virorum, inter quos clarissimus Ramazzinus dignus utique est recenseri, mea inquam, ac aliorum, quos ego summo opere veneror, sententia sistere, ac cohibere par est, quod unum maxime expetebatur in illa rerum caligine. Equidem quidque de hoc exotico antifebrili, tum de cæteris celebrioribus specificis, quæ huc usque in usum medicum advecta sunt, scripserint magni nominis Viri, præstat adhuc plura admirari magis, quam intelligere; saltem de iis nihil hætenus perspicuum, quodque animum veritatis avidum expleat, allatum est. Si quid vero unquam lucis sperandum, totum lubet ab eventu ediscere. Ab hoc juvat famosi hujus Apyretici, aut cujuscunque specifici naturam, ac vires expendere, metiri, discernere; Hoc dignum Philosopho,

hoc dignum Medico Viro. institutum; minime vero ratiunculas ad libidinem comparatas, & ipsius imaginationis ludibria effingere. Hinc culpari ab uno, laudari ab altero, modo probrosis titulis, modo magnificentissime vocari passim novimus celebre istud febrisfugum. Neque enim tanta adeo opinionum inter se dissensio proficisci aliunde potest, quam quod secus, ac revera attingi debent res, eadem plerumque expendantur, minus forte æqua ingenii statice, aut mente præjudiciis occupatissima. Ego quidem hujusce, quod adeo apud nos invaluit præsidii efficaciam utique veneror, ac si superis placet, ad Astra feram. Ast illud ceu Panaceam e Cælo delapsam omnibus remediis præferre, atque in omnibus febribus indiscriminatim exhibere, haud parum ratam rem esse judico, nec medentibus decoram; æque ac si quis Opium, quod mirabile, ac magnum est sedativum, sine ullo sorte delectu in omnibus morbis, ubi compescere opus est, adhiberet. Nec vero semper ubi fræno humores egent, Cortice coercendos puto; sæpe enim plus periculi rimendum est a subito, & intempestivo sufflamine, quam non erat antea. Quamobrem in Corticis exhibitione respiciendum est ad id quod intus molitur natura; humorum status expendendus, num ad fixitatem scilicet, num ad fluorem contendant. Quid cavendum denique, quid experiendum; vivida mentis acie examinandum. Est quid *divinum* in remediorum usu, ut quid (1) *divinum* etiam in morbis inesse prodidit Divinus senex. Atque id quidem ab eorum majori, vel minori efficacia, aut ab secreto, ac pene inexplicabili eorum quorundam agendi modo minime petendum est, sed ab eorum administrationis more, quod caput est maximum, & administrationis tempore; ad quæ duo potissimum capita cautiones Medicæ referendæ sunt. Sepienti pauca.

XXXIV. Ego sane quidquid boni ab hoc præsidio in hac febrili scena ægotantibus accessisse comperi; id totum illius, quæ pollet, efficaciz, figendi humores, eosque aut a se invicem dissilientes, aut coherentes minus cogendi una simul, cohibendique tribuendum puto. Hinc sane aliquando minus ex asse voto respondisse Corticem auditum est in quibusdam febribus, quod forte humores minime ad liquationem vergerent, ejus-

(1) 2. *Progn.*

eiusque diathesis essent ii, quæ stimulari potius egeret, quam coerceri. Quinquinam autem potestatem fluida quæque in nostris corporibus figendi, cogendique habere pro re certa suppono. I. Quod motum sanguinis, & spirituum compescat; & alvum ipsam densiorem, obstipatioremque reddat; compertum nanque est iis, qui ad plures dies hoc remedio usi fuerint, ventrem adstringi, ut clysteribus indigeant. II. Stiptica fere gustu, ac moderate subastringens deprehenditur, ut pater. III. Si quas illa febres fugaverit, hæc spiritu salis armoniaci, qui summe potens est humores coactos laceffere, & ad motum ciere prompte revocamus. Atque ob hanc utique causam haud auspicato cessisse nonnullis Peruvianum corticem olim scio, & funestos casus memorari. Vratislaviensibus in constitutione quadam anni 1699. valde funestum illius usum ferunt Acla Eruditorum anni 1701. (1) quod scilicet infarcta crassis humoribus corpora, in frigida illa, & humida prægressa temporum habitudine, remedia expeterent, quæ segnius labentia fluida urgerent potius, quam figerent, aut saltem abortam febrem, quæ forte auspicato contigerat, haud ita cito fugarent. Sæpe non modo utilis res febris est, sed & hanc profuit accendere; Fortasse enim, ut Celsus ait, *curationi opportunior fiet, ut humidioribus agris ignis.*

Sive illis omne per ignem excoquitur vitium, atque exsudat, inutilis humor.

Secus res tamen evenit aliquando; Nosque id ipsum salutare experti nuper sumus, ac vere proficuum, quod noxam olim forte, ac detrimentum attulit. Juvat hinc adnotare quantum profutura medentibus sit, quantum artis decori, ægris vero salutis, ac emolumento futura exacta temporum cognitio. Sicuti enim apud Agricolas, *annus est, non terra, quæ fructificat*, ita & nos sæpe videmus, ac fere acu tangere fas est, non a particulari corporum dispositione, sed ab anni temporumve constitutionibus diversos passim morbos exoriri, quos sæpe prodest diverso modo subigere.

XXX. Cum vero ab eventu res nobis expendendæ sint, præstat nunc hujusce corticis usum, quem auspicato nobis cessisse novimus, maxime commendare iis, quibus opus est, aut concitatum orgasmum coercere.

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

cere; aut effrenem impetum sistere, aut tendentes ad liquitationem humores figere; quo saltem, aut remissa impetus continue, aut coercito orgasmo, aut humoribus, ne a se invicem penitus desilirent, interceptis, aut si qua forte excandesceret nimis, mitigata febris, redintegrata, auctaque viribus natura vincere queat, ac superare hostem. Neque exigua certe res est specificum habere, (liceat mihi eo nomine exoticum istud febrifugum vocare) huic præstando muneri aptum. Cæterum quidquid de hujus usu in morbis asseri unquam poterit, aut excogitari, id lucis quidpiam utique, at parum certe, asseret, *Vincet enim semper latendi natura*, ut olim de Nili origine agebat Lucanus.

XXXVI. Modo superest de sanguinis missione pauca effari. Profecto nunquam non noxia in hujusmodi febribus comperta hæc est; ab ea namque atteri magis, ac deficere vires, quod unum præ ceteris magis funestum, ac certissimum impendentis jacturæ præsagium observatum fuit, dejectum animum, perfrigerari extrema; inque summum discrimen adduci ægros frequenti observatione adnotavimus. Quod mirari utique subest, tum maxime quod nullum aptius, nullum idem in hisce Regionibus (quod sancte testari possum) tutius expertum præsidium sit, quam vena sectionem, sive ob Cœli hujusce nativas qualitates, sive ob Subalpinorum temperamenta huic climati, ac Cœlo congrua. In hac autem Epidemica constitutione totum mutatum ab illo cruorem augurari licebat, & ad fluorem pronum magis, tum ob fervidissimam temporum præcedentium indolem, tum ob exlegem, Austrinam, consuetumque morem minime observantem hyemem; ac proinde nil mirum improspere cessisse venæ sectionem, quinimmo ab illa cane pejus, & angue abstinendum; etiam si, ut aurea Hippocratis adest sententia, qui in haud ablimili anni constitutione sanguinis missionem (2) valde quoque improbat, *morbis magnus sit, vigenisque etate homo*, ne scilicet major fibrarum cruoris dimotio contingeret, a qua non nisi extrema quæque discrimina expectanda sunt.

XXXVII. Ne vero id gratis, aut Dictatorie me pronunciasse quis credat, decet paulo altius hujusce depravatæ sanguinis

Xxx

dia-

(1) pag. 523. mensis Novembris.

(2) l. 5. de rat. vietus r. 19.

diathesis, ejusque ad fluorem potius ad concretionem tendentiae originem, ac causas inquirere, quæ & eadem hujusmodi febrium eisque affinium affectionum, quæ per ea tempora deserviebant, origo extitit, ac incrementum. Ac primo elingere lubet animo quidquid dissolvere, aut coagulare par est, illud idem agens quoddam esse valde potens, quod prout vel ad acidum, vel ad acre magis accedit, coagulare, aut dissolvere aptum est, protestatemque induit obvia quæque fluida, aut ad concretionem, aut ad colligationem inducendi. Hæc duo insuper diversa principia perpetuo nostris corporibus inesse satemur, atqui ita simul æquilibrata, ac æqua invicem proportionem instituta, ut quo uique in mutua vicissim actione permanent, nec ab externo quopiam agente alterutrum ad motum urgetur nulla exinde incommoda corporibus inferant, quinimmo tutam, ac firmam servant cruoris massam, tum Vestalis Ignis nativos lares, & focum. Ubi vero a principio quodam extrinseco eorum alterum supra alterum efferri, ac dominatum acquirere contingit; tum obrutam penitus fluidorum massam cernere est, institutas æquilibrii leges minime servari amplius, ad lentorem inde aut ad fluorem liquida vergere: prout acidum illud est, aut acre, quo prædominatur, & vim suam exerit, supra cetera principia elementaria evectum agens. Hinc patet quam diverso telorum actu, ac diversis pene dixerim artibus occurrendum sit ubi scilicet aut unum, aut alterum horum præpollet sanguinis diathesin immutare aptum, ac diversos proinde effectus inducere.

XXXVIII. Illud autem externum agens, quod intrus latentem, ac veluti coercitum ignem laceffere, ac excitare par est, ab iis, quæ nos ambiunt, aut nobis imminet rebus, petendum esse extra omnem controuersiam aleam positum est; nee aliunde quidem profluere posse videbatur, quam ab aere nobis circumfluo, cui quandoque accedunt, atque ad excitandos populares morbos in unum conveniunt modo corruptæ, ac stagnantes aquæ, modo alimenta mali succi, & pleraque alia. Potissima vero, ut incolunitatis, ac salubritatis, ita morborum communis causa aer est, vel rarefactus nimis, vel condensatus, tum particulis heterogeneis, extraneis, ac humanæ naturæ incongruis dives. Hæc nanque sunt, quæ in rarefacto aere, magis, aut minus exaltatæ, inque vitæ hospitia exceptæ vi-

riatam in fluidis diathesin inducere queunt, a qua diversa morborum proles enascitur.

XXXIX. Neque autem de aere loquens, eum criminis reum esse contendo; At qui una cum illo miscentur, extraneos, tum exoticos sales, hosce ego alterationum omnium, quæ ab aere profluunt, morborumque parentes agnosco. Aer namque elementum incorruptibile est, ac reliqua elementa tum aqua potissimum conservandæ, ac tuendæ hominum incolunitati illo haud minus necessaria, ac opportuna. Si quam vero alterationem aer concipit aliquando, hanc utique ab extraneis corporibus, tum heterogeneis particulis, quæ una cum illo commiscentur, excipit, iisque inficitur, satis aptus idem eisdem a se remove, atque protrudere, cum nullum obvium sibi obicem offendit, quo minus illas a se expellere potens sit. Ut stagnantium, ac putrescentium lympharum in limpidum quempiam amnem irruptio fluminis aquas confundit, ac turbidas reddit, atqui hæc ad pristinam iterum puritatem redeunt perenni aquarum gurgite uberi alveo assidue decurrentibus; Sic aer quandoque ab exoticis ventorum afflatu elatis salibus inquinatus, novo intruente vento iidem liberatur, ac purus redit; neque enim etsi aliquando majori cum energia iidem agant, diu perdurare queunt, quin aut sensim fatiscant, aut tandem integre abeant, ac dissipentur.

XL. Quæ quidem satis superque evincunt, cur insensos nobis experiamur Boream, & Austrum, atque iis potissimum, quæ hisce præter morem persflantibus, suboriuntur, ægritudinibus obnoxii sint Subalpini Incolæ. Enim vero cum nitrosi, acidique exotici sales a Boreali plaga, secus vero lixiviales, ac urinosi ab Australibus oris continuo profluant; atque hinc persflantes venti libere per univertum Agrum Pedemontanum discurrant, nullo, ut innuimus, saltem exiguo, qua sævit Auster, interjecto obice, qui effrenem eorum motum, ac vim compescat; conicere quisquis potest, quam facili negotio irruentes venti extraneos hujusmodi sales ad nos vehant, iidemque corpora inficiantur, eo quidem magis, quo diutius perdurant ejusmodi venti, aut alterius sibi oppositi silentio, eos a se protrudere aer minime par est, ac remove. Si quis interim modum scire cupit, quo aer extraneis, atque humanæ naturæ insensibilis particulis imbuitur, & quomodo is interdum per ventos huc, illucque trans-

transferatur; plene id habebit a Fr. de le Boe Sylvio.

XLII. Ut vero a nitrosis salibus, quos subacidos esse contendimus morbos omnes oriri novimus ab humorum fixitate, ac lentore progenitos, utpote quod fluida quæque cogi ab acidorum præsentia, atque interpicum conspicuum est; ita ab lixivialibus, ac urinosiis particulis, ab Austro delatis eas potissimum affectiones, ac funestas passim ægritudines enasci experimur, quæ ab humorum colliquatione, ac fluore dependent. Ut enim figendi acida, sic dissolvendi facultatem acria, ac lixivialia præbent. Sic nunquam hiscere audentibus aquilonaribus ventis tum superiori anno, tum labente hyeme. qui Australium assidue perflantium ventorum vim frangerent, aut eorum saltem sævitiam compellerent; Nil mirum, ut hi acria corpuscula summe insensa vehentes secum, sævissimas illas febres induxerint, quæ sese novo oriente anno prodiderunt.

XLIII. Hinc enim e salibus acribus præter morem elatis, stimuli que vicem agentibus commoveri sanguinis massa, turbari illa, accendi febris, mox sæva quæque symptomata ludere visa sunt, naturalis humorum textura dissolvi, ejus vincula discindi, diffuere ferossæ molleculæ, rutilæ, ac gelatinosæ a se invicem secedere celerrimo, præcipitique tramire, ni quam primum, antequam totum illico sanguinem pervadat, fermentum illud acre, irritans, hærens, evellatur, ejus vis, ac sævities maxima infringatur, demulceantur spicula, imminens, aut jam ortus orgasmus coerceatur, temperetur impetus, præbeaturque tantundem natura spatii, quo inire illa pugnam queat, animose congregi, materiam morbi subigere, solvere, movere, secernere, excernere, vere illa morborum medicatrix, utque Hippocrates ait, *docta sine magistro* (1).

XLIII. Quæ si quis omnia attente perspiciet, conjiciet equidem, ac facili negotio concipiet, quæ fuerint horum malorum exordia: tum rationem, cur utilis extiterit acidorum usus? cur temperantia, nimium horum impetum infringentia, modice figentia, stiptica opportune adhibita, utilia eadem, ac tuta? cur auspiciata minus, funesta, nunquam non noxia venæ

sectio, ac vesicantia? cur turgente materia voto ex asse respondens purgatio, primis diebus, ab initio statim instituta? cur excretionem per alvum, per vomitum, per macularum diffusionem ad habitum corporis in principio morbi lethales? cur exeunte ad judicationem morbo motus ad alvum, aut hæmorrhagia superveniens bonum? cur prostratæ initio vires, languidiore eadem, ac pene emortuæ? quæ ratio symptomatum omnium, quæ sese exordio, incremento, ac statu febris prodidere? Infuetus, ac minus frequens Subalpinis; secus ac Boreas, Austro est; neque enim sævissimo adeo flamine illum deservisse unquam, ut hisce temporibus diu compertum est, hinc forte ea quæ profuisse olim didicimus, nocuisse nuper, ac funesta deprehendimus. In universum vero Austrum maxime, atque illi affines ventos male passim audiri novimus; quinimmo, quod forte peculiari quarundam regionum temperamento tribuendum est, harum nonnullas is quam immanissime verberare solet.

XLIV. Cur autem nitrosæ ab Aquilone particule, lixiviales, ac summe acres ab Austro ferantur, nimis prolixa res foret attingere; Neque id ad institutum nostrum profecto attinet. Equidem nullum ventum per se singulari, & specifica virtute, ac qualitate pollere, nisi quæ a loci, unde oritur, natura, nec non medii, per quod transit, indole derivanda sit, pro re certa habeo. Ex quacumque enim parte nivibus obsita, sive ad Austrum, sive ad Septentrionem, Orientem, vel Occidentem posita illa sit, frigidos perflantes ventos experimur, secus ac illos, qui paludes, terrasque stagnantibus aquis perfusas transeunt, aut qui per arenosa deserta, æstu Solis adusta loca perspirant. Cum vero Boreas ex terris gelu constrictissimis, & a Sole remotis assiduo flamine spiret, & mare glaciale, ac altissimos montes perpetua glacie, nivibusque obsitos pervadat; Tum ex adverso Austro ex percalidis, & arenosis Africæ locis veniat, Zonamque torridam, nec non Mare Mediterraneum percurrat; Facile hinc adiscere est, exoticas ab utroque, ac summe insensas particulas ad nos advehi, nitrosas quidem ab Aquilone; volatiles, acrioresque ab Austro. Norunt id plane, qui hisce magis obnoxii sunt, quam graves iis,

XXX 2

fæ-

(1) §. in 6. Epid.

favosque morbos inferat tum frigoris Pro-
mocondus Aquilo, tum plumbeus Auster.
Quod enim juxta diversas Epidemicorum
morborum habitudines experimur, qui pro
diversa temporum conditione, diversis telo-
rum ictibus oppugnantur; præclarum id no-
bis documentum præbet, cur quæ Septen-
trioni magis subjecta loca sunt, aut e con-
tra, aut quæ Borealibus ventis magis in-
festantur, vel Australibus, peculiaribus illa
morbis; ac unicuique regioni propriis di-
vexantur magis; quæve e. g. profunt An-
glis, eadem sorte Romanis noceant reme-
dia, ni forte toto mutato Cælo, nova in-
gruat morborum proles novo, ac diverso
more oppugnanda; adeo verum est illud
Celli (1) *disferre pro natura locorum*; ad-
dam ego & temporum, *genera medicinae*,
& aliud opus esse *Rome*, aliud in *Ægypto*,
aliud in *Gallia*; aliud insuper faviente Au-
stro, aliud flante Borea, aliud Euro. Cur
vero Austrina hujusmodi constitutio diu
adeo, ac præter consuetudinem deservierit,
neque hiscere unquam auferint Aquilonares
venti, qui eorundem favitiem infringerent,
quæsit quidam mihi est ratio, num vero
reperita fuerint, *mibi hæret aqua*, ut dici
consuevit.

XLV. Austrinos ergo flatus, seu præci-
puos in hac Tragœdia Auctores culpæ li-
cet, qui in massam sanguineam tales inve-
xerint dispositiones, ut ad excitandam hanc
malignam febrem satis virium habuerint,
silentibus ut plurimum Borealibus ventis,
qui nubila detergent, & aeris impuritates,
eo repellerent, unde decesserant, ad Australes
scilicet plagas, ex quibus omne malum
ad nos profectum suspicari fas est. Nihil
magis ac pene momento temporis aeris sta-
tum immutare posse, quam flantem Au-
strum, ut ex ponderoso levior redatur, jam
dudum novimus, docente Barometro. Quod
denique præcipua hujusmodi mali moris fe-
brium ratio ab Austrinis statibus petenda
sit, hinc, conjectari licet, quod ea salu-
briter degerent loca, ac veluti in portu
aliorum spectarent naufragium quæ obverso
multorum collium dorso protecta favientes
flatus eludebant, dum in hac Urbe, ac to-
to fere circumjecto agro exarata febres gra-
sarentur, ac desavirent.

XLVI. Sed quæ jam innuimus enuclea-
tius reperamus, & clarius. Austrina hyems,

quæ pluvioso Autumno successerat, exara-
tis febribus occasionem præbuit, exoticis,
acribus, ac heterogeneis particulis una cum
inspirato aëre cruore admixtis, quarum præ-
sentia, & miscela, seu totidem favientibus
stimulis aciores molleculæ extricata magis,
suique juris factæ totam invertere humora-
lis massæ texturam, ejusque vincula tan-
dem discindere ausæ sunt. Equidem liquida
ad fluorem potius, quam ad concretionem
prona fuisse præter alia multa, quæ talem
adfuisse sanguineæ massæ, dispositionem at-
testabantur, id ipsum conjectari fas erat a
manifestis notis, quas eductus e secula vena
sanguis præferebat, semper enim roseus, ac
purpureus, nihilque glutinosi præferens mihi,
aliisque Professoribus apparuit, ac tota Cæ-
lo diversus ad eo, qui solet educi in qui-
busdam morbis, ut Pleuritide, Peripneu-
monia, aliisque affectibus interdum popula-
ribus, in quibus manifesta lentoris vestigia
cernere est. Quod ad exanthemata atti-
net, hæc etsi plausibilis quidem ratiocinio
Villius, aliique coagulationis potius, quam
fusionis humorum præludia esse contendunt
ob fixiores sanguinis particulas venarum
extremitatibus hærentes; vero similiter ma-
gis crediderim, a fibris illa sanguinis disso-
lutis, eque sua statione dimotis ob sal acre
illud, & volatile sanguinem ad fluorem dis-
ponens, ortum ducere, quo pacto similiter
effusus ab arteriolarum osculis cruor tenuio-
res sui partes dimittit, quæ hinc inde dis-
fugientes, ac profugæ sui sorte erroris mo-
ras in cute designant.

XLVII. Hæc per hyemem gesta. Veris
initio Cælum votis communibus respondit
moderatis imbribus delapsis, quos novam
lætamque faciem periclitantibus rebus alla-
turos augurari fas erat, si qui tota pene
hyeme hiscere nunquam auferat, favus Aquilo,
silentibus tandem per intervalla Austris,
erumpere tunc minime visus foret, insue-
tumque frigus media inter primordia Veris
inducere. Huic quandoque Occidentales Ven-
ti mitiore statu adspirantes succedebant, re-
currentibus mox Austris iterum, tanta adeo
varietate rerum, ut sæpe unius diei spatio,
æstatis, hyemis, veris, atque autumnii vi-
ces contingerent, modo sereno, pacatoque
Cælo, modo torbido, nubilo, pluvioso. Cu-
riosum aderat Mercurii errores in Barome-
tro adnotare, qui elatus modo, mox hu-
mi-

(1) pag. 3. in Proœmio.

milis, ceu nescius flare loco, incertas temporum, aërisque vices prodebat. Numquam adeo tam infida, ac sibi invicem adversa diu visa aderant tempora, quæve tam longe ab instituto more desisterent.

XLVIII. Nova hinc dira indolis acutorum morborum proles sporadice defævientium caput extulit, ac præcipue spasmodicarum ægritudinum, quibus gliscentibus diuturniores ejusmodi aliæ se se prodere ausæ sunt. Inter cæteros vero quam immanissime cruciabatur Podagricorum cohors, tum qui Nephriticis, Scorbuticis, aliisque id genus affectionibus obnoxii passim aderant. Nec hysterica quidem mulieres immunes visæ; hæc siquidem spasmodicis cruciatibus dirum in modum, ac diu magis, quam unquam consueverant, vexatæ sunt. Apoplecticos quoque plures, quam unquam contigit, enumeravimus, conspirantibus una simul hemicraniis, vertiginosis affectibus, aliisque hisce affinis, aut consanguineis. Notatu dignum est, vix quempiam ab acuta ægritudine omnino evasisse, quin in diuturniorem, ac inveterascentem morbum incideret. Vestalem novi in Monasterio *del Crocifisso* degentem acuta febris paulo post æquinoctium ægotantem, quæ superata tandem febris pertinacissimo capitis dolore divexari cœpit, quo & adhuc (dum hæc ego scribo) illa sævissime plectitur. Ipsa superioris solstitio variolis correpta fuerat, quæ tunc temporis longe lateque sæviebant.

XLIX. Hisce vigentibus intercurrentibus morbis febrium malignarum sævities remitti quidem, atqui hæc iterum, velut auctæ viribus statim fere recrudesce viæ, ac magis, magisque debacchari, quibus plures per ea tempora satis defuncti sunt. Tum præcipue cum aut diuturnis illæ affectionibus succedebant, aut gravioribus aliis stipatæ irascebantur, inuito simul scedere, quo truculentiores evaderent. Harum unum, atque alterum exemplum lubet recensere. Pia mulier tertio febris insultu, spasmodico pectoris affectu correpta, quarto obiit. Sacerdos satiosis pustulis toto corpore diu scatens, quæ statis temporibus magis, aut minus desæviebant, cum amico cuidam sibi obvio occurreret, fallente pedum vestigio, in terram incidit; mox obscurari lumina, sanguis ex utraque hære profluere, ipse veluti oborto rigore contremiscere visus est. Postridie mitiora omnia evasere. Nec ipse lecto sese affligi passus est, amicorum consilia, ac preces eludens. Undecimo

febris acuta supervenit caligantibus oculis, deficiente voce, vix mente compos. Latæ maculæ densissimis examinibus totam cutim scædabant; Urinæ rubræ, per initia tenues, nihil subsidentes. Decimo nono, ingenti oborto sopore, expiravit. Secto cranio pia mater cum vasis solito tumidioribus se nobis præbuit, tum sinistri Hemispherii amphractus diloricati invicem, ac dimoti; Multum in utroque ventriculo serum: Sinus majores, choroidæus plexus, tum cætera quæque sanguinea vasa copioso dilutoque sanguine tumentia: Diffusæ ad cutim maculæ latiores in cadavere apparebant. Dubium adeo, num a lapsu potius, num vero maligna oborta febre decesserit; an utroque, junctis una viribus, quo citius ægrum perimerent. Frequentiores iis temporibus ephemeræ febres, quam intermitteutes, observavi.

L. Lubet hinc conicere magis, ut quæ toties dicta sunt, iterum repetam, quæ fuerit Austri sævientis indoles, quæve sit Austrina vigente constitutione temporum, metuenda morborum proles? Quod si & ultro pergere quis velit, expiscari fas quoque foret, & magnorum virorum more magnam rerum fiduciam habentium decernere, quid ex adversa, si quæ contigerit forte, constitutione, annique habitudine prænunciandum? Profecto si rem paulo accuratius perpendamus, quilibet Annus semper aliquos affectus secum una infert, qui revera quid Epidemicum redolent, quos, etsi leves aliquando, ac teguoris momenti, haud ita facile tamen curari cernimus, quin prius a vulgari methodo discedamus, eaque iis præsidia adhibeantur, quæ, expenso ingruentium affectuum genio, profutura magis conicimus. Lubet hinc etiam ediscere morborum quorundam genesis, qui sporadice passim, nulloque non tempore, quo Epidemici sæviunt, contingunt. Hosce quidem feliciter, aliquando cedere novi, eadem methodo, ac iisdem fere remediis, quorum olim eluserant illi vim. Id mihi haud ita pridem adnotandum, cum forte fortuna quidpiam de epidemicorum affectuum indole, a quorum utique studio, ac inquisitione nullum confiteor ætatis meæ tempus abhorruisse, ab illo sciscitaret, ac expendendum maxime Author adfuit, ac Præceptor idem, Ornatissimus vir, de Medica omni, tum litteraria re meritissimus Joannes Fantonus, Regii Subalpinorum Principis a cubiculo, Medicus, ac Primarius in
Tau-

Taurinensi Archigymnasio Theoricæ Medicinæ Antecessor. Recte scilicet perpendenda est annorum constitutio, ut ex illa, tanquam ex fonte, genuinum cujusque morbi genium repetere, tum æquam illi curationem adhibere valeamus.

LI. Equidem ephemeræ modo dictas febres, tum spasmodicos affectus, qui ea tempestate percrudescebant, ad Principem effectum reduci posse unaque omnes ab eodem amne ortum ducere satis dilucide innoscitur. Atque id quidem recte norit, qui quotquot in sanguine ex doctissimi Gulielmini calculo subeunt variæ, ac diversæ combinationes, quas fere sexcentas olim recensuit Hippocrates, animo expenderit.

LII. Utque ab ephemeris febribus exordiar aliquando; Hæc quidem ab intermittentibus, nec genio tantum, sed re, ac origine toto Cælo differre neminem latet, si quis utriusque indolem, ac genesis attente adnotaverit. Acidi mineram, quam nemo in ephemera febre culpaverit unquam, seu pituitam præter modum viscidam, cui acidum fermentum magis, vel minus irritum hæret, intermittenti febre præludere, vel stabulantem in stomacho, ut placet (1) Etmullero, vel ductus laterales Pancreatis obstruentem, ut (2) statuit Sylvius, communis Medicorum sententia est. Quæ quidem pituita, seu materies, in venas effusa, & partibus spirituosis sanguinis permixta potis est, tot excitare turbas, & febrilem (3), ut aiebat Carthesius, *tempestatem ciere*. Quidquid scilicet ad acidam discrasiam humores disponere par est, id intermittentibus febribus incunabula, ac focum præbet. Quod quam longe ad Ephemeræ genio, ac more discedat, conspicuum est; Hæc nanque continuarum simplicissima, quam habet accensionis febrilis causam, hanc minime extra vasa hospitantem habet, aut intime in universa liquidorum massa ludentem. Simplex, ac levissima molecularum sanguinis commotio ephemeram febrim inducere apta est, quæ brevi compescitur. Nec ineptum omnino proinde foret conicere, quas Austriæ diu laviens attulerat acriores, volatilioreque particulas, sin minus universam humorum massam in robustioribus corporibus inficere, saltem turbare illam exoticorum salium miscelam potuisse, atque ephemeræ febres indu-

cere. Cur vero Peruvianus Cortex, quem ego superius salutarem extitisse in iis febribus, quæ in hac exarata constitutione suboriebantur, adnotaveram, ob figendi illius, cogendique facultatem; cur idem ipse cortex in intermittentibus, quarum quidem indolem ex prædominio acidæ mineræ deduximus, cujus vis est cogere quidquid, ac figere; cur inquam in intermittentibus idem proficius experiatur, tutissimumque præsidium passim audiat, atque ajunt specificum Antipyreticum magnis adeo laudibus decantatum? Res nimis operosa foret decernere. Num ludere remedia, ut morbi dixerim? Num me potius inanes conjecturas effingentem quis arguet?

LIII. Opus hic esset exoticæ febrisfugi naturæ paulo fufius, quam superius attigimus, explicare; Forte, & magnificos titulos, magnæque illa elogia, quibus apud quamplures vocari illud etiamnum solet, excutere; quod tamen nec mei muneris esse scio; nec hujusce utique Spartz, quam exornandam ego, ac illustrandam suscepì. De illius abusu peculiarem, ac decies legi dignum tractatum edidit Celeberrimus Ramazzinus, minime veritus se quandoque, nec dum cum juvenis adhuc foret, sed cum jam virili Toga incederet, illo familiariter usum fateri, procedente vero ætate experientia edoctum a priori sententia recessisse; Ita scilicet ait Vir doctrina, tum animi candore dignus inter magnos Viros recenseri. Forte alchali illud volatile, acerrimumque ab Austrinis flatibus delatis lixivialibus salibus, atque una cum aëre inspiratis, magis evectum, inque sanguinea massa impetum faciens, quæ potissima fuit febrium, quæ in hac constitutione desavierunt, causa, alchali fixo Chinæ emendari, aut saltem cohiberi contigit. Nec forte etiam abs re erit suspicari, quæ quoque Clarissimi, atque amicissimi Viri A. M. Reina, Celebriorumque in hac Urbe Medicorum sententia est, ex mixtione Chinæ Chinæ una cum acido prædominante in febribus intermittentibus, inque primis viis obvio, quid emergere febrilis fermenti (sit verbo venia) crasin invertere aptum, ac excitatos motus compescere. Ex solutionis vitrioli permixtione cum solutione Chinæ Chinæ speciem quandam atramenti idem laudatus Ramazzinus, & alii adnotarunt.

LIV.

(1) *De febr. c. 17.* (2) *Tr. 10.*

(3) *P. 1. Ep. 51. & 88.*

LIV. Nunc ceteros affectus, saltem præcipuos, quorum tam discolor, & ingens sylva ab una radice succreverat, lubet expendere. Horum plerique ab ipso solido male affecto proficiscebantur. Adeo facile est, inducto semel in liquidis vitio, aut iis ab instituto more defæctentibus, solida quoque crimine culpari, quæ una cum illis invicem comparata sunt; Juxta nanque id quod intime latet in sanguine vitium, solida modo tendi, ac summe elastica fieri, modo laxa eadem, ac debilia prorsus, imminuta elasticitate; observamus, utraque dein inveterascentium morborum, diuturniorumque incrementa ægritudinum. Equidem quos potissimum hac tempestate defævisse adverti spasmodicos affectus, ab eodem illos genio, a quo acutæ febres prodierant, derivasse arbitror, ab illa scilicet acrimonia in fluidis inducta, cujus præsentia solida quæque diversimode pungi, vellicari, ac irritari perspicuum est. Quæ namque defævierant diuturnæ ægritudines, hæc utique fibræ admodum tensæ, crispatæ, rigidæ nimis, ostendebant, plerumque effrænam.

LV. Mulierem novi hysterici affectibus jam dudum olim per intervalla obnoxiam, iisdem seivissime, toto anno divexatam, ac tandem fato defunctam. Stupendum equidem erat tot, ac tam diversas impetum facientis solidi incurfiones, ac pene dixerim explosiones cernere, ceu Protei in morem ludentis. Sæpe visa spasmis tota convelli, præcordiis valde tumentibus, multa evomens biliosa, mordacia. Desinente vere iisdem spasmodici affectus assiduo more irasciebantur, mox in supremo quoque ventre haud absimilem scenam ab illa, quæ in abdomine jam pridem egerant, ludere cœperant, quæ tandem in certam quandam amentię speciem denegaverit, cujus miratus sæpenumero sum nullam ab Authoribus mentionem factam fuisse unquam, cum tamen haud raro diuturniores hystericos affectus illi prolusisse adnotaverim. Sæpe in risum, & lachrymas effusissimas ridicule erumpibat. Aliquando ditiores quam revera foret, modo alteram e nobilioribus Regiæ affectis sese jactabant; Frons, oculi, vultus amentem feminam redolebant. Accedente Autumno, sui que compos magis facta, sæviore more hysterici insultibus vexata fuit, qui ab infimo ventre ad Thoracem propagabantur, ut fere suffocationis periculum impenderet. Raro visa febris,

quæ nec typum, nec genium prodidit unquam. Sub initium hyemis adstringi sibi adeo fauces persenserat, ut vix quidquam deglutire par foret. Atque tunc temporis ad ipsam vocatus fui, ad illum diem usque ab Agyrta quodam inconsiderate, inclementerque curatam; Cumque facium affectio jam pene desierit, nedum tamen spasmodorum causa deerat penitus, quin immo hi ferocius recrudescentes quandoque, tympanitidis in morem abdomen stendebant. Quæ de re in consilium quoque advocato Clarissimo, Doctissimoque viro Jacobo Cicoguinio Augustæ Regis Matris Medico Primario, & Consil., ejus sententia, & auctoritate celebriora quæque antispasmodica expertus sum, eaque omnia, quæ promptiora compescendis, coercendisque insultibus, tum quod magni momenti aderat, emendandæ acrimoniæ humorum aptiora credebantur. Meliuscule habuit; Atqui haud paucis patratæ in victu erroribus, tum ob sæva animi pathemata, hysterici spasmi pristino iterum more ludere, ac frequentiores suboriri, tumere crura, venter, præcordia, ac denique atrocius sævire omnia cœperant rursus; Ipsaque tandem paulo post hyemale solstitium defuncta est.

LVI. Nec longe ab eodem spasmodorum tramite abludebant, ab acrimonia illa scilicet Austrinis flatibus evecta, atque ad activiorem sublimitatem elata, immanes, sævissimique progeniti Podagrici, tum nephritici affectus, quorum ingens visa soboles, ægrorum cohors, quam acerbè ingemiscentium ob sævos, dirosque cruciatus, ac diuturnam, quæ immaniter torquebantur, carnificinam, nullo pacto exorabilem. Valde affines inter se geminas hæc ægritudines arbitror; Utrique harum obnoxii valde sunt Subalpini, quod nativis sorte Cœli qualitatibus, aut generosioris vini potationi, lauriorique victui referri potest. Utramque vere spasmodicam, absque summe crispato solido profectam, facile erat conlicere, tum ab enormi cruciatu, quo vexabantur ægri, tum a cæteris, quibus utraque comitabatur, Phænomenis; Cernere nanque erat nullum in nodis artuum tumoris vestigium, ut fieri solet, in quo topheæ materies plerumque reperitur iis, qui Podagra laborant, aut quidpiam aliud consimile, præter intensum nonnullis dolentis partis ruborem, adurentemque calorem. Nulla quoque in plerisque nephritide dentis, renibus, aut qua alia cunque parte cal-

calculi impacti suspicio, aut ejusdem futuri prologia in urinis; nihil fere persentientibus agris aliud, quam tensionem violentam, acerbissimosque dolores fixos plerumque, ac prementes, ac si fibræ quæque nervæ spasmis rigerent, aut pressuram quandam, & coarctationem, ut ita loquar, experirentur; Utrique parum profuerant remedia quæque adhiberi solita; Quæ solidum affectum demulcere, acrimoniam in fluidis elatam compescere, lixivialia spicula, acerrimosque sales coercere magis apta erant, multis profuere; Diluentia, anodyna, emollientia tum interne, tum externe adhibita utramque paginam, ut ajunt, implebant. Longe tamen in universum inferior nephriticis Podagricorum prosapia est. Hisce namque nec in hac modo constitutione, sed fere semper, & olim adhuc minus efficacia, ac damnosa sæpe comperta sunt universa, quæ passim deprædicantur, medicamentorum externa, quam interna, quorum, uberrimam segetem videre est apud Lucianum: Elegans est ac mire jucunda, quæ apud illum Podagræ allocutio legitur ad illos, qui secreta quædam remedia se habere jactitant, quibus elidere ejus potentiam queant. Hujus aliquot versus e Græco sic ipsæ ego verteram olim.

*Quis invictam me dominam dolorum
Ignorat Podagram in terra mortalium?
Quam neque Thuris vapor placat.
Neque effusus sanguis aras ad incensas,
Non templum divitiarum undique
suspensis ornatum donariis:
Quam neque Apollo Medicamentis expugnare valet,
Omnium Medicus in Cælo Deorum;
Non filius Apollinis Doctissimus Æsculapius, &c.*

Ea scilicet natura Podagræ est, ut omnibus æque plorare illa imperet, eam vero irritantibus occurrere soleat multo iracundior, ditiorque.

LVII. Cæterum qui calculo sive renum, seu vesicæ jam diu laborabant, hi sævius omnes, atrociusque divexabantur; Haud pauci ex iis mortui sunt; Libet hic rarissimum ingentis calculi vesicæ exemplum narrare, quod mihi fere tempore adnotare contigit. Sacerdos quidam Gallus Romam contendens, acerbissimis cruciatibus vesicæ, sævissimaque stranguria correptus, in No-

socomium SS. Mauriti, & Lazari mense Julio se contulit. Fatebatur olim hujusmodi doloribus vexatum fuisse Lutetiæ Parisiorum, cum adolescens adhuc foret, iisdemque liberatum celebris Lithotomi ope, exiguo calculo. Adultior factus iisdem per intervalla recurrentibus affligebatur, nunquam tamen dire adeo crudeliterque. Septimo dein die mille inter conamina, ejulatusque expiravit. Secto cadavere; insignis in vesica repertus est calculus, perpolitus undique, & lævigatus, ponderis tredecim unciarum cum dimidia, durus adeo, ac revera Siliceus, ut vere quid lapideum quis diceret marmore resiliens. Renis dextri substantia pene exesa aderat, alter præter morem grandior, nigerrimus, ac fere putridus; Vesica crassa valde, ac fere carnea; Uterque ureter solito amplior. In horum altero qua in vesicam desinit, sex, vel septem exigui calculi occurrebant taliter invicem impacti, & cuneati, ut præclusa omnino via urinæ, enormiter expansus canal, alterius veluti idea vesicæ rudiores deluderet, quasi re ipsa, foret vesica duplex. Ac sorte in hunc crassum, atque supinum errorem Medicos Casauboni incidisse puto, dum viri tanti vesicam urinariam nobis geminam obtrudunt. In sinistro uretere nullos quidem calculos, at urinæ quantitatem summe olentis, ac fetidissimæ comperi.

LVIII. Exaratis spasmodicis ægritudinibus merito quoque accensebantur quotquot cætera per ea tempora desæviebantur magis, ut hemicranie, vertigines, acutorum illæ morborum reliquæ, aut diuturniorum affectionum præludia. Unum scilicet harum omnium Parentem Austrum contendimus; Una omnium scena. Unus idem ludendi genius, ac mos, etsi pro diversa solidorum residentia, magisque aut minus adaucta elasticitate eorundem dispares adeo, ac discolors affectus subluderent. Qui Spasmodorum doctrinam intime callet, vimque, & potestatem solidorum in corpore viventi scdulo expendit unquam; Is Vates esto. Re vera quidem *id morborum genus*, ait Doctissimus Baglivius nulli in hac arena secundus, (1) *ab spasmodica fibrarum oscillatione pendet, totiusque curationis scopus diriggi debet in ea primo tollenda, aut saltem compescenda, deinde fluido peccanti incumbendum.* Diuturna olim hemicrania laborantem

(1) De fibra motrice specimen pag. mihi 231.

tantem senem Paralyfi dein & artuum contractura correptum memini. Mulierem hysterica novī, cui quoties intultus eminebat, savissima illi profundebar emierania. Amicus meus diris nephriticis doloribus per intervalla vexatus, hosce sibi impendentes prævia vertigine, oculorum caligine, hebetudine didicit, eo atrocius sævientes, quo dirior Austro perspirat. Novit id unum Magnus Senex, ac quantum solido insensum Austrii flatus, comperit Posteris tulit, illo (1) inquiens, *animum lebetari, caliginem visui offundit, gravari caput, tarditatem, & languorem in auci*. Nec quis putet Hippocr. nisi experientia prius edoctum tam grande effatum, tam sidenter, absolute pronuntiasset; In libris enim Epidemior. Constitution. habet Austrinam huic nostræ haud absimilem, cui magna etiam antecedentium temporum siccitas præcesserat, unde postea consimiles affectus hyeme, ac vere apparuerint, Equidem sicuti Aquilonaris tempestas spiritalibus organis infesta est, ob ferociam colluviem, quam parum perspirantia corpora abunde cumulant, ita Austrinam capiti, quod Spasmodis sedem præbet, ac incrementum, maxime insensam didicimus. (2) Ut vero in Imperiis, sic in corporibus gravissimum esse morbum qui a capite diffunditur, aiebat Plinius.

LIX. Nec vero rarum adeo, ac incongruum forte quis credat spasmodicas ægitudines ex aeris vitio observari? Quam facile ab aëreo hocce, in quo degimus, Oceano, aut rectius ab exoticis particulis una cum illo exceptis, humani corporis liquida quæque inficiantur, fuscè superius attingimus. Hicce autem inquinatis semel, stimuli que vicem agentibus, quam facile una invicem conspirantia solida afficiantur, irritentur, convellanturque diuturniore, aut graviore scena juxta individuorum diversitatem ipso quoque fluido hujusce turbationis causa summo pere magis affecto, conspicuum est? Insolitum morbum spasmodicum convulsivum variis in locis Electoratus Saxonici, & Marchionatus Lusatiæ superioris nuper Epidemice grassatum legimus apud Gælichium (3). Alterum huic haud absimilem affectum describit Sennertus sub nomine spasmi maligni, & Epidemii cum febre, de quo An. 1596. Facultas Medica Academiae Marpur. Supplem. ad Sydenham Tom. II.

gens consulta consilium Medicum imperita est a Gregorio Horstio, in Operibus Medico-Practicis publicatum, & a Gregorio Leisnero denuo excusum. Simile quid etiam Parisiensibus olim, dum nebuloso existente aëre, qualis revera esse apud nos solet flante Austro, evenisse refert Eruditissimus Fantonus; (4). Id curiosorum ingenia dudum exercuit. Equidem pauci, ac forte vix ullus vitus est iis temporibus morbus, qui aliquid spasmodici haud præ se ferret.

IX. Sed ab affectibus spasmodicis divelli nequeo citra istoriam unam, ac alteram. Vestalem vidi e Monasterio Gælestinarum Sanctissimæ Virginis Annunciationis, Scorbuto, Proteo illo scilicet plurimorum symptomatum syndrome diu olim, tum quam acerbissime hoc anno divexatam, quæ sanato derepente cruris ulcere, quo tota fere hyeme laboraverat, miro quodam spasmodicorum capitis, & colli correpta, ut os minime aperire potuerit, trium dierum spatio velociter obiit. Altera Historia haud ita recens est, sed Pæonio stylo notanda, ab Adversariis b. m. Venerandi Senis, Avique mei, Archiætrorum Comitibus, haud exiguo bonorum, ac doctorum hominum mœnore non ita pridem defuncti, excerpta. „Vidi ego, ait, Mulierem stupendo convulsionis genere vexatam, in quo se se ne per momentum quidem quietam continere poterat, sedens in lecto, & mentis omnino compos. Torquebatur se se mire ægrota, & membra cum capite in gyrum veluti contorquebat. Si quando aquam peteret bibitura, necesse erat poculum ori prudenter admovere, & ipsius motui circulari obsequi, poculum elevando circumducere, donec sitis esse sedata. Cum autem bibisset, ferebatur liquorem non recta descendere, sed in circumum circumagi, & veluti per gradus, trochlear, aut helicis in moram, descendere, usque dum in ventriculum delaberetur. Feliciter tamen, quod ab illo audisse memini, evasit.

LXI. Reliquum est de scorbuto, tum subitaneis necibus pauca dicere. Quod ad illud attinet, veteribus minime prætervisum utique; Licet haud ita Subalpinis familiaris sit, ac gelidiori sub climate viventibus, ubi

(1) 3. Aph. 5.

(2) Lib. 4. Epistol.

(3) Exercit. sub. sociu. Francof. T. 2. sect. 1.

(4) Dissertat. Anat. 12. de org. respir. 317.

ubi dire sævit, illo tamen immunes omnino haud esse Italos, ceterosque Meridionales Incolas jam dudum novimus. Neque enim illum semper ab humorum stasi ortum ducere, vel ipsi Septentrionales Incolæ norunt; Quandoque scilicet ab cruosi laticis fluore initium habet, sevisque miseros torquet. Hinc forte tolerabilior audit apud Danos, Norvegos, Batavos, ac toto divisos Orbe Britannos, quod ibidem magis ille ab humorum lentore pendeat, sevis ac apud calidiores oras, Austrinis flatribus magis obnoxias salibus cruori affusis dissolvere potius, quam cogere aptis. Utque raro apud Septentrionales caco-chymia, seu Scorbutus, (idem nanque esse puto caco-chymiam veterum, ac modernorum Scorbutum, saltem æqualia habere fata) ut, inquam, raro apud Septentrionales Scorbutus occurrit ab colliuatione humorum, ita apud nos ab eorundem lentore ortus. Id ego olim tum rerum usu, tum longa apud Anglos, ac Batavos mora didici, haud exiguo ægrorum meorum emolumento.

LXII. Atque huius potissimum indolis, qui modo anno sevit, Scorbutum fuisse, adverte, tum ob latices ad liquationem prouos, tum ob Austrinam totius Anni constitutionem eo diuorem, quo acriores sales ob defectum humidi in tam ingenti siccitate temporum elati magis aderant, ac sui Juris. Profecto temperantia quæque, leniter refrigerantia, nitrosa, acida acrioribus cæteris fortioribus, abstergentibus, colliquantibus, orgasmum facile inducentibus, quorum tam magna seges, palmam præripuerunt. Ejus quippe genio, non nomini studendum erat, quod si quo in morbo, in hoc præsertim accurate investigandum, & distinguendum monet Clarissimus Boerhaave. (1) Sedum vermiculare, cochlearia, trifolium fibrinum, sempervivum minus acre; Zingiber, acerrima quæque apud Anglos commendata maxime scio; An hæc tuta æque, ac ejusdem sint efficaciz apud illos, qui sua calidiore climante vivunt, judicent docti? Mihi quidem methodum placidam, successivam, continuam, quæ magis humores compescit, quam stimulat; quæve nostris nascuntur in boris, indigenas, plantas minus acri sale præditas, Septentrionalium methodo, ac exoticis celebrioribus præferendas compertum est exemplo mon-

strante viam. Notissima est observatio de memorato sedo vermiculari Actis N. C. inserta, quod scilicet in expeditione Danica multi per illud in formam decocti exhibitum, a Paralyti scorbutica restituti sint, evacuato per vomitum muco admodum viscido; An id hisce in oris proficuum æque, profecto ambigo. Forte etiam nusquam visus est Scorbutus alteri similis, aut quorum eadem essent Phænomena; Sæpe vidi huic hecticam febrem accessisse; Sæpe illum memini in Asciten, mentiundo tympanitidem degenerasse; Utrique latæ maculæ rubræ ad cutim diffusæ, aut icterus multiplex sæpe prolusit.

LXIII. Exarata sanguinis ad fluorem tendentia subitaneis forte etiam mortibus occasionem dedit, quibus ab hyemali solstitio superioris anni ad æstivum usque, decem circiter intra Urbis mœnia ex tempore sublatos audivimus, tum viros, cum sceminas, puerosque, Illi scilicet toties memorati exotici, acerrimique sales ab pluvioso Autumno, Austrinaque hyeme ulterius fusi ac evecti, inque se ipsis magis existentes, ut Hippocratis verbo utar, occurrente forte, aut prævio pravorum humorum apparatu paulatim collecto, aut peculiari alia quacunque dispositione, promptiores aliquando, ac potentiores tum ad solida irritandum, sciendendumque, tum ad fluida dissolvendum redditi suere, proindeque apti magis, præcipientes adeo mortes inducere. Cæterum frequentiores hujusmodi neces, cum maxime sævit Auster satis, quidem evincunt, earum plerasque ab humorum fusione ortum ducere; Quæ vero flante Boreâ sæpe etiam contingunt, hæc ab humorum lentore potius, aus ab organico vitio pendere.

LXIV. Ver igitur egimus Austrinum insolens. Sub initium Maii æstuosum præter mortem extitit Cælum, Sole in Occasu apparente, non secus, ac Julio, aut Augusto mense. Huic immoderato calori pro-luserant,

Ætheris impulsus fremitus, Cælique fragores.

Remitti mox cæpit æstus, quodve supererat Veris satis beate transegitus. Pulchrum erat Mercurii lusus in Barometro, cum magna sorte impenderet tempestas, cernere; Is nanque illico ad extremos fines momento temporis descendere, moxque ire.

(1) *Aph. de cognosc. & curand. morbis n. 1253.*

iterum restituta serenitate sursum emergere videbatur. Ceterum cum Austriana extiterit totius fere Anni constitutio; nunquam visus est in sublimiora loca illa se recipere, haud ausus unquam ultra vigesimam lineam evadere, quæ illius major excellitas fuit. Præclare hinc, ac dilucide pleraque explicari queunt Phenomena; tum quæ sita quare ad Austrinos status difficilis sit respiratio, ut de quadam veluti suffocatione conquerantur omnes? Cur Urinatores quidam, hominesque; pene dixerim, amphibii ad plures horas sub aquis degant? Cur, quod haud præter rationem, etsi paradoxum videatur, scripsit Th. Cornelius, aer crassus vaporibus refertus ad vitalia munera obeunda aptior sit, quam aer tenuior? Cur in Phthyi pulmonari, famosæ, & magnæ Urbes magis commenduntur, quam Villæ, aut Oppida, quæ aère claro, & perflato gaudent? Cur humidus, & minime perflatus aer nulli salubris? quæ sane omnia a majori, aut minori pressione aeris rarefacti, aut condensati magis, perflati rari purioris, aut humidioris pendent, ut palam faciunt experimenta in machina pneumatica circa animalia facta; neque ob aliam causam in editissimis montibus gravem duci anhelitum credendum est, nisi quod ibi minor sit aeris pressio, quam in imis Vallibus. Sed e diverticulo in viam.

LXV. Exacto Vere Æstas successit mox ab ingressu turbata ventis lætior dein, amæniorque, blande adspirantibus Etesis. Sæpe auditum circumstremere Cælum, ingentes resonare tonitrus, magno misceri murmure Æther, quin vel minimum plueret unquam, *Sole dies referentes siccos*. Post caniculares, varia aeris temperies, Zephyrique, & Austri alternatio; Illo autem circa Septembris initia prævalente; plurima pluvia, & horridiuscula aura per aliquot dies infesta. Æstatis reliquum moderato ventorum statu tranquille peractum, felicioribus auspiciis arridente Æquinoctio.

LXVI. Fatiscere enim sensim adulta æstate exitiales febres, tum spasmodicæ ægritudines observatæ sunt, faciemque tradere intermittentibus febribus, quæ Augusto, & Septembri mense illucescentes, subque ipsum dein Æquinoctium vulgares factæ magis; stativa castra ponere cœperant, palmamque illis eripere, aeris procul dubio ab æstivo fervore in autumnale frigus degenerantis prologia. Scenam quoque ingredi visæ continuæ quædam, aliæque ardentes paroxys-

mis interpolatæ, catarrhales tussi, & asthmate molestæ, quandoque, & angina, oculorum, ac tonsillarum inflammationibus, quæ dein intermittentes migrabant. Media æstate ob fructuum forte intemperantem ingluviem, & immoderatum aliorum illecebrarum gulæ usum, Diarrhœæ, ac dysentericæ comparuerunt, quæ difficillime medicamentis compescebantur, Verminosa quoque spectata proles ludere, sævaque symptomata producere in adultis æque, ac in teneriori ætate constitutis; Horum nonnulli etiam nulla dysenteria, aut Diarrhœa essent correpti, assidua desidendi cupiditate cum torminibus quibusdam conjuncta vexabantur. Post frustra adhibita enemata lenia, evacuantia, humorem aerem demulcentia, balnea; tandem cum ab Ascaridibus malum foveri suspicio foret, majori cum successu anthelmintica enematibus addita, perque os data fuerunt.

LXVII. Haud paucos etiam Colicæ dira corripuit; Nullum iis præstantius auxilii genus, quam fons ex lacte recenti, addita modica dosi Laudani liquidi. Mirum sane ut concitatum dolorificum, sive is ab violenta abdominalium musculorum contractione, quos ego Principem ludere in hisce diuturnioribus affectibus scenam arbitror; sive ut perperam visum est, a convulsionibus intestinorum pendeat, unde decantatus ille oritur antiperistalticus motus; mirum inquam, ut illum præfatus illico fons temporis momento compescat, contractasque partes pristino genio restituat, moremque serat clysteribus, aliisque prædiis opportune institutis, convoluta, si quæ fuerint; intestina explicandi, aut verius in Thoracem illa ultro propulsa, forte in situm naturalem reducendo.

LXVIII. Ego quidem diu mecum animo expendens diros, acerrimosque dolores, quos sæpe advehit huiusmodi affectus, quid aliis subesse illi suspicatus sum aliquando; saltem non semper illum, aut sæpius sedem habere, ut vulgo ferunt, in Cælo. Idem olim a Carolo Pisone, doctissimo sui temporis Medico excogitatum scio, qui forte in hac eadem arena Villisio præluxit. Uterque haud multum a vero aberravit; Quid enim utrique visum est, in nervoso systemate latens, quod nemo unquam expendere. Sane quidpiam minime vulgare in hoc affectu proludere compertum; Nec opus quidem antiperistalticum motum, aut convoluta intestina effingere. Huiusmodi fig-

Y y z

men-

mentum nuper (1) in Regia scientiarum Academia Lutetia Parisiorum a præclarissimo Viro strenue explosum est. Equidem ut chylus tot inter molimina, tum ascensus, ac descensus momenta elaboretur, perficiaturque. Ut idem celeriore tramite lactearum oscula subeat; Ut alvinæ faeces, qua data porta, ruant, excernanturque, fibras intestinorum ita compositas adverte, ut oscillantes illæ, ac circumprementes invicem perenni ludant more, exaratis muneribus comparatæ. Iique ille est peristalticus seu circumpressorius motus, rectius forte vermicularis, dictus Anatomicis; Qui vero, cum iisdem abludentibus fibris, ingesta sursum egeruntur, perque os ejici contenta quæque in ventriculo, ac intestinis cernimus, ut in Colicis affectionibus contingit passim, id opposito motu fieri contendunt, quem *Antiperistalticum* vocant, aut fibrarum structuram, ac leges minime norunt, aut festivis appellationibus oblectantur. Si quis Enterocelen expenderit unquam, hujusque phenomena cum illis contulerit, quæ in Colica sæpe subluant, facile inveniet, quam affinis invicem affectus uterque sit? Quo enim more prolapsa intestina, ni quamprimum docta manu reponantur; convolvulum sæpe, ac mortem inferunt; ita & eadem in Thoracem a violento musculorum abdominalium conatu adacla, perque septum abrepta haud impari ludunt discrimine. Ecquis autem in hernia intestinorum, in qua sæpe etiam Aegri faeces alvi evomunt, antiperistalticum motum effinxit unquam? Quod si atrocissima quæque symptomata ab strangulatione intestinorum ob musculos abdominis valide meatum abstringentes satis illa apte deduci queant; Quidni & colici dolores ab eorundem intestinorum, quæ ultra in Thoracem adegit nitentium musculorum spasmus, ac vis, strangulatione ob septum transversum meatum, per quod illa forte abrepta fuere, constringens, totam proinde tam sævi, acerbique mali Theoriam, non a convoluzione intestinorum, atqui ab violenta contractione musculorum abdominis deducere fas erit, quorum nisu per septum transversum abripiantur intestina, inque Thoracem adigantur, propellanturque? Est altera Herniæ species, quam cruralem vocant, cæteris longe sævior, sæpe colicam mentiens aliquan-

do, in qua intestinorum portio intime infixæ reperitur, qua cruralia vasa eminent. In hac & diris cruciatibus affligi miseros, & faeces per superiora ejici, constipatam alvum, tendique ventrem cernimus, immane quantum! Num intestinum etiam aliquod, sive tenue illud fuerit, aut crassum, dilatatote forte diaphragmate, obque ingentem contrahentium musculorum tensionem infixum ibidem, adaclumque, qua potissimum nervi intercostales emergunt, tum ab eodem diaphragmate pene dixerim, strangulatum eadem inducere haud poterit. Pænomena, nullo præludenti antiperistaltico motu, ut in utraque allata herniæ specie contingit? Colicæ cujusdam memini apud veteres Medicinæ Principes sermonem haberi, in qua nedum intestina tantum una cum Omento, at pancreas ipsum, Mesenterium, Lienem per septum transversum, scissis retinaculis abripi ferunt; Chordapsum hanc vocat Celsus, alii *Volvulum*, aut *Miserere*, cujus prolixam descriptionem, & expositionem egregie tradit Lindanus (2) Hinc intestinorum inflammatio eorundem sphacelo præludens; hinc affligium viscerum, ac diaphragmati præsertim labes in velocem gangranam delinens, lethifero proludente singultu. Cæterum colicos hujusmodi dolores, sive illorum phenomena, sive sedem considerem, æstate populariter ingruentes, iis accensendos crediderim, qui vetere potissimum sub diversa spasmodicorum specie ludebant, ab eadem scilicet vulgari, communique causa nervoso generi summo insensa productos; cujusmodi exempla videre est apud Aeginetam, Zacutum, Cratonem, Ballonium, & alios quamplures.

LXIX. Nec abs re futurum arbitror quendam innuere de Massiliensium Peste, quæ æstatis initio magnam in illa Urbe stragem edere nunciatum est. Illius incrementa hæc fuisse ferunt: Navis oneraria ab Orientalibus Oris profecta, ubi dira Pestis sæviebat, Massiliam appulerat infectis Mercibus dives, quarum contactum mox quidam extemplo e viventium numero sublatis sunt; hinc semel orta labes ad miseros Cives propagata. Brevi temporis spatio illustris, copiosa, & florentissima Urbs, ac circumjectus ager ingenti clade deletus pene, ac vastatus magnum finitimis æque, ac diffusis gentibus me-

(1) Vide Reg. Scient. Acad. Acta Anni 1713. p. 470. edit. Amstelod.

(2) Exercit. IV.

metum iniecerat, ne sædò afflatu diu, ac longe manaret lues, atque affines ultro pervaderet. Quas ideo præcautiones hisce in casibus humana solertia adhibere solet, eas provido consilio præoccupavit. Invidissimus REX NOSTER, Italiæ totius incolumitati, cujus jam dudum ipse Patronus, ac Vindex est, dum suorum bono consulere, prospiciens. Ubi enim primum de pestilenti lue, quæ Massilienses infestabat, rumor Taurinum pervasit, totum illico ingentem Alpium tractum, quæ Galliam ab Italia determinant, numeroso milite custodiri iussit, ne cuiquam permetteretur ingressus, ullaque aura pestifera per eos, quos opposuit Natura Montes, ab infestis locis per aliquam secretam viam hæc Regiones adiret, inficeretque. Nec satis cautum existimans, multo post cum externis, atque etiam finitimis Civitatibus commercia intercepta non tanti faciens commoda, & beneficia, quæ ex liberæ Mercaturæ commercio omnibus Civitatibus proveniunt, quanti publicam Subditorum salutem. Instituta quoque sunt eodem tempore publicæ preces, ac iram Supremi Numinis placandam, magno ad celebriora Urbis Tempia Civium confluxu, ut nunquam alias tantus in unum populi conventus, tantaque erga Superos Reverentia, ac Pietas; IPSO AUGUSTISSIMO REGE una cum Piissima Regina, ac Regio Principe magna suis pietatis exempla ferente, vere optimo, adque omnium nostrum felicitatem cœlitus demisso REGE.

LXX. In dies interim magis percrebescere auditum pestiferam luem, adque Aquas Sextias dein totius Provinciæ Caput, Tarasconem, Arclatum, Telonem Martium, ac finitima quæque Oppida longe lateque diffusam. Multi nullo proludente signo, e vestigio interibant. Nonnulli ut ab fide dignis hominibus accepimus; intra paucos dies, prævio vomitu, deliquiis animi, prostratione virium, sævissimoque dolore capitis e vivis migrabant. Haud paucis carbunculi, exanthemata maculæ, sædæque ulcera, apparuerunt, funesta prorsus. Quosdam ferunt, quibus Bubones rite proruperant, ex insperato servatos. Infanda nimis, luctuosaque res est singula quæque recensere; Nec profecto absque lacrymis legi potest sincera malorum Historia accurate fideliterque a Doctissimis Viris Galliarum Regis mandato

Massiliam missis, ut Medicam opem Civibus ferrent, inter mortes, ac funera exarata. Hanc recens in Italicum vertit, ac criticis notis erudito calamo illustravit Clarissimus Muratorius Serenissimi Ducis Mutinæ a consiliis, ac Bibliotheca. Quædam enim visa sunt Sapientissimo Viro, quod ad Pestes naturam, ac ingenium spectat, parum verosimilia, saltem congrua minus, nec satis apta, quibus vera, ac genuina Pestis Theoria inniti queat, ac Vir superioribus annis elaboratissimum Tractatum, *Del Governo della Peste*, cum dira Viennæ orta lues, tota Austria serperet. Eundem diversis in locis nuper, Mediolani, Brixie, ac Taurini quam elegantissimis Typis editum nunc iterum Mutinæ apud Solianum cudi audio a doctissimo Authore magnam in partem adauctum, & locupletum.

LXXI. Hac autem serie sæda adeo lues sese prodere visa est. Principio multis lingua, osque viscido, lentoque humore operum plerum aderat. Nonnullis obstitata alvus; Haud pauci oborta Diarrhæa, aut effusione sanguinis celeriter defuncti sunt. Vomitus, deliquia animi, ac sævus capitis dolor in singulis fere præluserant. Plures intra biduum, vel triduum alto sopore, aliis Phrenitide correpti e vita migrarunt. Sæpe obvia verminosa soboles perniciosi symptomatibus stipata; Plerisque nihil huiusmodi proludebat. Cadaverum sectionibus maxima intus visa Phlogosis, ac intestinorum sphacæla. Dirius in pueros, ac fœminas sævitum. Cæterum ab æstivo solstitio ad autumnale æquinoctium usque, plusquam quinquaginta hominum millia cujuscunque sexus, ac ætatis una in Massiliæ Urbe, ejusque agro interiire.

LXXII. Hæc funeste adeo luis indoles. Quæ vero præcipua illius causa extiterit, modestè inquit se illam minime penetrare ausum Clariss. Chicoineau, ex iis, qui Massiliam missi sunt Medicis, alter, (1) ratos utique, ac scite conscius nihil attingi posse verosimile; quodve huc usque quod cujuscunque Pestis, genesis, ac naturam proditum est, hypotheticum esse, nilque protus ad ægrorum curationem conferre. Quamobrem sedulo idem admonet ad res magis evidentes advertendum. Quæ scilicet fuerint pestis initia, quæ illius incunabula, quidve originis principium, ut Hippocratis ver-

(1) Vide opusculum inscriptum;

Relation de la Peste de Marseille, &c.

verbo utar, animo, atque oculis expendendum. Utinam sane Vir Doctissimus moderate adeo de huiusce Pestis propagatione, tum præcautionibus adhiberi solitis effatus foret? Ait enim Pestilentiam sese contactu minime diffundi, aut vero iniasmatum, seu corpusculorum ope ex infectis mercibus, Terræque abditis, aut e superiori quopiam fonte exhalantium manare, quæ per æthera inane dispersa dein, ac simul una cum potu, ac cibo suscepta in sanguine ludunt, eumque inficiunt, quo pronus ille magis, aut labem suscipere aptus est, sive ob congestorum humorum colluviem, sive ob terrorem, aut metum animo injectum. Intrepide ideo sese asserit ægris tulisse opem, nulla unquam contracta labe, omnia quæque remedia præservationis, aut præcautionis jure celebrata hætenus noxia potius, quam proficua esse contendens.

LXXIII. Velim ego attentius ad tam fœdæ pestis, quæ Massilienses crudeli flamine etiamnum verberat, initia animum adhibuisset Vir Clarissimus; nec profecto crediderim infontem adeo contactum infectarum rerum ab illo celebrari. Equidem pestifera quæque lues, ut de febribus malignis olim erudite agebat Præclarissimus Sydenhamus, non omnium morbus est, nec longe illa pergere potest, nisi alias, ac ut ita loquar, pennas illi præbuerint homines. Novimus in recenti luctuosa Boum clade quam utile fuerit rem in tuto ponere, cumque infectis stabulis commercia quæque interciperet. Idem quotquot de hominum Peste scripsere, consilium est; Idem Sapientissimorum Magistratuum institutum; Idem acceptus ubique gentium usus, ac mos. Neque aliud hætenus aptius ad huiusmodi labem præcavendam documentum, aut præsidium scio, quam terra marique ad fines, & loca suspecta idoneos viros mittere, qui solitis cautionibus ad rem tanti momenti assiduo invigilent, nullique, sive exterorum, sive Subditorum sine datis sanitatis vadibus, aut prævia, ubi opus fuerit in designato quopiam loco, constitutis diebus, mora, ingressum concedant. Hisce artibus unius fere sæculi spatio magna Italiæ pars,

tum præsertim An. 1656. cum dira lues Romæ, Neapoli, ac Genue quam immatissime deserviret, servata est. Iisdem nos tutos, ac Sospires fore beneficentissimi REGIS cura, & studio speramus, foreque Pesti, atque omnem illi aditum ad hæc Regionem præcludere. Intrepidum quidem sese gerere summe laudo; Nihil in Pestibus perniciosius unquam, quam injectus animis timor. Sola sæpe metus, ac terroris imago absque præsentia pestis graves intulit ægitudines. Ast cætera quæque præsidia, ceu noxia potius, contemnere, periculosa plena alicui opinio est, absurda prorsus, atque ipsa, prope dixerim, Peste exitiosior. Urque ait laudatus Muratorius (1) *Da cacciarsi via colle pericchie; anche senza esaminarla, non offendo saviezza; &c. E tanto più poi, (2) inquit Vir Doctiss. perchè non si fa intendere, come mai venga nè pure in pensiero a persone, che riflettano alquanto ai passi d'una Peste, ch'ella non si comunichi per Contatto, o Contagio. Stet quidem suus invicto animo honos; Stet sua illi gloria. Nec tamen æqua laudis pars auferenda est cautionibus cæteris ab Sapientibus Viris summo opere commendatis, absque diuturno rerum usu probatis.*

LXXIV. Quod vero ad Pestis naturam attingit; Minime reticenda est Doctorum quorundam virorum huiusce ætatis sententia, qui veneficam luem consistere ajunt in verminosa quadam putredine tot tantæque edere strages, seque vel proxime per contactum, vel remote per fomitem de infectis in sana corpora propagari apta. Ingeniosum utique excogitatum, ac forte etiam admodum probabile, neque a recentioribus tantum vindicatum illud, excitatumque Ath. Kircherio; Fabro Chymiatro, Langio; Cogrossio, Vallisnerio, Corte, † ac pluribus conjecturis assertum, sed a priscis etiam gravissimis Authoribus diligenter scriptis commendatum; Et quidem huic ipse opinioni lubens, ut fieri debet, Sententiam meam adjungerem, si quæ omnia occurrunt Phænomena dilucide explicari, quidve certi de huiusmodi argumento decerni posset. Atqui ut docte advertit Eruditissimus, ac

(1) *Observazioni intorno alla Relazione della Peste di Marsiglia pag. 24. (2) Ibidem. (†) In id etiam strenue incumbit Eruditiss. P. Saguens tot editis operibus celeberrimus, elaboratumque opus brevi se daturum luci,*

in quo causam pestis ab præfatis animalculis deducere nititur; ipse doctiss. Author nuper pollicitus est in litteris Cl. P. Romam Regium in Taurin. Archi-Gymnasio experimentalis Philosophia Antecessorem.

ac amicissimus Pestalossius, (1) Celeberrimus apud Lugdunenses Medicinæ Professor, suos huiusmodi hypothesis, gravesque patitor Manes, nec dum adhuc extra omnem dubitationis aleam posita est. Enim vero, qui fiat in Urbe quapiam, aut Agro, ubi longo temporum spatio nulla sævit lues, eaque proinde infecta, aut peculiarium vermiculorum examina haud amplius aërem occuparunt diu, qui fiat inquam, ut horum progenies a remotissima plaga advecta semel tam facile illico multiplicari; Ut brevi dierum intervallo universam Atmosphæram inficere, perque ora, nares, ac patentiores quasque vias intus excepta, tam difficiles morbos efficere, seque ad affines agros, ac regiones propagari possit, anceps hæreo; Equidem ut propriis nondum illa oculis, ita, & mente assequi haud posse unquam tot minuta animalia crediderim, quæ propigini semel, ac longe lateque dein manare Pestis queat, tanque sæpe diverso more proludere?

LXXV. Quod autem dicatur ab aliquibus in emissio ab affectis hominibus sanguine, aut etiam microscopio armatis oculis vermes inspectos fuisse? Id minime satis esse ad huiusmodi hypothesis tuendam, vel ex eo deduci potest, quod nedum in affectis Peste, at vel in ipsis etiam sanis hominibus continuo hisce seateat cruor. Dein vero hi soboles potius, quam Parentes, aut Pestilentiarum Authores esse videntur; Neque enim illos adeo minutos repertos unquam memini, cuius revera exiguiusculæ esse molis effingi debuerint, aut mente concipi. Cæterum si minuta hæc animalia in sanguine, aut fluido quopiam, ceu in proprio elemento degunt; Ut vivere illa diu, ac latere queunt extra propriam sedem? Ut sese recens excitare dein, explicare illa, ac suapte ingenio e vestigio multiplicari? Crediderim potius (eoque fidenter magis id ego ajo, quod solidioribus rationibus hæc mea sententia innitatur, & Magnorum Virorum nedum inter externos, sed & inter nostrates, quorum consuetudine, ac judiciis uti in hac Civitate soleo, ac præsertim Illustrissimi, Amplissimique Viri I. A. Manzini Regis Medici Ord. & Conf. Clarissimi. Jo. Fantoni, Cicognini, ac Parentis quoque mei Ven. quem silen-

tio præterire nefas foret, Medicorum Regis Primarii, & Consiliarii, suffragio comprobare illam noverim.) Crediderim inquam verosimiliter magis pestiferam quamlibet eo nomine dictam luem, tum quæ præsertim Massilienses tam dire adeo, crudeliterque exagitat, ortam esse a peculiari quodam veneno, cuius inanime perpetuum seminarium in vastis illis Asiæ Regionibus effingere lubet, inque Europam advectum aliquando. Nec forte incongruum erit quandoque veneficam huiusmodi luem hisce ab oris repetere, nostro illam sub Cælo natam, adultamque concipere, quod medius fidius mirum neutiquam videri poterit reputanti, ut rem magis exemplis illustrem, tot passim morbos contagiosos intra nos ipsos sæpe progenitos, unde postmodum obvia quæque corpora tenerrimo afflatu inficiuntur. Neque vero novum est, ut olim de hydrophobia Cælius (2) Aurelianus tradidit, in animalium corporibus peculiare venenum innasce, quod postmodum cætera contagione corrumpat. Quæ ab exotico huiusmodi veneno, aut fermento (nam quo alio usurpato a Medicis nomine clarius nunc referam imaginem pestiferi illius principii, unde lethalis hæc labes exoritur, nequaquam invenio) producit Pestis, dirius sævit, quam quæ ab nativo alio quopiam, seu indigena oritur.

LXXVI. Possem utrumque venenum illud, tum adventitium, tum nativum cum Arsenico, & Sublimato comparare, nam in solidis partibus revera pares cum erodentibus veniens invehit effectus; Ab instituenda tamen huiusmodi comparatione me lubens cohibeo, minime ignarus innumeras & esse, & excogitari posse veneficorum miasmatum conjunctiones, unde varix, difficilisque prodeunt nocendi artes. Neque id est huiusce loci exponere, cum præsertim id eos tantum ignorate accidat, qui hospites in chymica, & Anatomica arte non sine ingenti piaculo diversantur. Cur autem, quaque actione fermentum illud, sive adventitium, sive nativum fuerit, sese sano in corpore insinuare, excitatumque semel sedem ibi figere, tum sese in alios homines propagare momento temporis queat, pulveris Pyrii exemplo satis præclare explicatur. Atqui sive animatum in sanguine seminarium, vel ina-

(1) *Avis de precaution contre la Maladie contagieuse de Marseille pag. 31.*

(2) *Lib. 3. acut. morbor. cap. 9.*

circumque prorsus miasma pro vera Pestis causa statuitur; Lugendum utique est, tum olim, tum nuper apud Massilienses nondum inventum fuisse verum, certumque praesidii genus, quo tam foeda, saevaue iues curari queat.

LXXVII. Ad Subalpinos redeo; Utque rem omnem in paucis contraham: Pluviosus Autumnus exitit: Hyems Austrina: Ver insolens: Lætiior Æstas, temperata, amœna. Bombycum soboles exigua. Tritici, ac frugum ubertas copiosa satis. Puteales aquæ multo cæno referta. Inops Flora. Mellis parca perceptio. Vini proventus ingens, quem nemo sperare auferit unquam initio Veris. Adeo forte quæ tritico, ac frugibus haud læta omnino tempestas est, ipsa vineis, ac orientibus uvis, viribusque secunda magis est, ac felicior. Erucæ, & Bruchi hortos omnes medio Vere depopulati sunt; Redierant hi Æstatis initio, at lenis aura ab Orientalibus oris adspirans cito in fugam illos convertit. Qui Hyeme, ac Vere proluferant vulgares affectus, hosce adulta Æstate satiscere penitus, inque Scenam sese prodere intermittentes febres adverteram. Sævis quoque defierant Æstate, saltem mitiore flamine perficere cœperant Austrini flatus. Numquam amœnioris Autumnus lætiora initia extiterant, aut felicioribus auspiciis prope visa splendescere Libra. His ego sequentem protinus telam exordiar, cœptumque semel opus pro viribus persequar, non exiquo quidem labore, nec tenui fortassis laude; Si quem Numina sinant,

Audiatque vocatus Apollo.

Constitutio Epidemica Taurinensis Anni 1721.

I. **I**nstituto meo inharens prægressam Constitutionem, qualiscunque ea fuerit, in fine cuiuslibet anni describendi, eo libentius id exequor, quod exacti nuper Constitutio anni ab ea, quam superiori experti fuimus, toto pene cœlo diversa uberem explicet contemplationum segetem, quo nihil in re Medica tractanda utilius inquam, tum rectæ medendi methodo, (quod Venerandi olim Senis, idemque Magni illius Angliæ Cancellarii votum fuit, consiliumque,) appositum nil magis, aut accommodatum: Satque proluxam dicendi materiem suggerat, quod alterum quoque magnam profecto rebus lucem, ac perspicuitatem asserre poterit aliquando. Deinde etiam animosum me effecerant magis, maioresque ad rem sedulo,

alacriterque gerendam, ac munus quod mihi persolvendum quotannis constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vires, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tum extra Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac literaria optime meriti, ad quos prima huiusce Telæ flamina, primaque studiorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno defuit Oratio mea, inde initium ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnus dies haud illuxerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab iis, quæ a gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem inducere, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Parentibus Austris. Plurima nanque pluvia Septembris initio delapsa, mox subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumno, perque hyemem dein, ac ante aetam æstatem se se prodiderant, exitiales febres Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia insequentes ac morem, heu infandum nimis, in fugam verterat; ortumque dederat intermittentibus febribus, quæ jam tum proludere cœperant, lætiorumque, saltem funestam minus, Subalpinis futuram rerum scenam polliceri. Subirascebantur utique ac quandoque remigrare rursus, pedemque referre, ac subludere videbantur nondum deletæ ille penitus, atque harum affectæ, comitesque, immanes, immitelque Colicæ, Nephritici, ac Podagrici affectus, tum Spasmodica aggritudines cætera superiore anno exarata. Earum tamen vis nec diu quidem, nec impetiose adeo favere, nec præterquam ad paucos tantum, unum scilicet atque alterum, extendi visa; Quibus vel familiares jamdiu aderant illæ, vel recrudescerent potius reliquis, ac priorum morborum soboles; Ceu prope interitum, ac jam delinquens candelæ, aut ellychnii lumen per intervalla adhuc reviviscens dein omnino deficit, exstinguiturque. Forte etiam ob uberrimum vini proventum liberiore pede sibi met unicuique indulgendi concessa facultas, lætissimis Autumnus diebus, ortum exaratis recrudescerentibus aggritudinibus dedit, sæviendique adhuc imperium. Strenuus Miles, cum vespere cibo, ac recentis meri potationi nimis intemperanter indulserit, dimidia nocte diris ventris cruciatibus angitur, una cum vomitionibus inanibus,

ac irritō desidendi conatu; Summo mane cum jam fere animam agere videretur, elato nimirum, ac tympani in morem protenso ventre, foru, balneo, anodynīs, ac oleosīs plerisque opportune adhibitis, feliciter evasit. Minus laeta res obtigit Prænobili alteri, ac Præclaro Viro, qui cum una cum amicis ruri degeret, recentioris vini potu, etsi modum, ac sobrietatis limites minime excesserit, Colicis doloribus, quibus obnoxius olim fuerat, extemplo correptus, celeri fato occubuit. Aperto cadavere abdominis musculos, tum obliquos præsertim, transversosque intensos admodum reperimus, atque adeo prærigidos, intentosque, ut perquam acuto cultro difficile adhuc foret illos abscindere. Ventriculus, ac Duodenum intestinum vacuum penitus occurrit, secus Jejunum, ac illi affine Ileum, quod utrumque flatu tumens, ac valde tensum se se intuentibus obtulit, adeo ut oblitteratæ fere vix conspicerentur amplius in horum altero valvulæ, quas numerosas plerumque cernere in illo est *convincentes* dictas Anatomicis, rectius forte *rugas*, aut *juga*. Rugarum enim hæc potius instar se habent a pariete interno intestini efformatæ, ceu juga quædam præterlabenti liquido remoram modo eidem per varios anfractus, ac orbes contendenti opem præbentia auxiliatricem. In externa porro Ileī facie ingens visum diverticulum paulo infra illius exordium, duos transversos digitos longum, ceu processus alter vermiformis, eadem qua Ileum figura, latitudine, atque substantia, cumque ejusdem intestini tubo, labe officio, communicans. Sæpe ego hujusmodi diverticula, seu processus, ut illa vocat *Verhejenius*, in Ileo reperisse, olim memini in cadaveribus præcipue Virorum, quibus colicæ humorales, ut ajunt Prædici, frequentes obtigerant. An id quidquam lucis allaturum magis in re medica; An & hinc potius ortus durat peculiaris affectus alter, de quo haud ita pridem meminerant (1) Viri Doctissimi in *Commentariis Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis*, cum nempe haud ipse intestini tubus, sed ea duntaxat diverticula intra herniæ sacculum coercentur, exercitioribus Medicis decernendum relinquo. Plura quoque de hisce Ileī, tum Recti diverticulis, herniisque, in quibus illa intercipiuntur, verba facit, ubi & *Supplem. ad Sydenham Tom. II.*

suas iridem observationes addidit Clarissimus, ac toto Orbe Celeberrimus *Morgagnius*, Anatomicorum hujusce ævi facile Princeps, cujus eruditioni, peritiæ, ac Doctrinæ levīs nimis hæc est aqua laudis Præfatio. Optandum utique, quod *Bartholinus*, *Diemerbroeckius*, *Verhejenius*, tum & *Riolanus* ipse (3) audacior æquo criticus, rerum Anatomicarum, ac Medicorum scientia insignis, qui laudatis viris facem tulit, idemque tria nonnunquam hujusmodi diverticula, seu processus adnotasse ait, morborum historiam sincere nobis, fideliterque exarassent illorum, quorum in cadaveribus id observaverant; Forte enim quidquam ex hoc dilucide, ac præclare magis nobis in hac re modo innotesceret. Sed de his alias: Neque enim fas est in ipso Orationis limine diutius extra orbitam divagari.

III. Prodigiū vero, ut institutam semel Anatomicam cadaveris sectionem prosequar; Prodigiū maximum, ac celeris necis causa penes Septum transversum latens in conspectum tandem sese prodidit, quod dilatatum aderat, immane quantum! Ibi potissimum quo intercostalis nervus ad imi ventris viscera abit. Per hunc nanque ingentem hiatus, qua data porta viam sibi ultro in Thoracem fecere Colon, Pancreas, tum Epiploī magna pars, Plurimum in sinistro Thoracis claustrō effusi sanguinis a disrupta Pancreatis vena conspiciēbatur, ac sinister Pulmonis lobus totus pene sub scaleno musculo alte absconditus, actatusque. Quæ quidem omnia eo libentius a me adnotata sunt, diligenterque exarata, quo vera Colici sic dicti affectus Idea nobis elucescant magis, quæve tot sæculorum spatio Arabum mentibus excogitata invaluit, diu Antiperistaltici motus doctrina, ceu scissitia, ac mechanicis legibus adversa omnino, tandem aliquando obsolescat, aboleaturque, facem ferentibus laudatissimis, tum in Anglia, tum in Gallia viris, qui detegendo in dies vero unice, ac gnaviter jamdudum incumbunt. Ad vulgares febres, quæ sub ipsum Æquinoctium, ac diu adhuc post ipsum toto Octobri, ac Novembri mense exeuntis Anni 1720. caput extulerant, me conféro.

IV. Hæc quidem utut intermittentium indolem, ac morem toto sui decursu quodammodo prætulerint, ingeniumque; Attamen

Z z z

quid

(1) Vide *Comment. Reg. Scient. Acad. Paris. ann. 1700.*

(2) *Advers. Anat. III. animadvers. V. pag. 8.* (3) *Antrop. lib. 2. cap. 14.*

quid insolentis, quodve re ipsa vulgare quidpiam, ac revera *Divinum* inesse iis ominabatur, præ se ferebant. Neque enim diuturniores adeo extitere, quas quisque Medicorum jure merito suspicabatur, quasve futuras, vel ipsa quoque Anni temporis conditio suadere poterat. Dolor insuper intensus capitis, idemque assiduus febrilis paroxysmi affecla, eique sæpe proludens; Oculorum rubor; Pullus parvi, humilesque; Ingens corporis jactatio, quid denique in ipso ægrotantium vultu, ac urinis facile conspicuum intuentibus, quid intime latens, aut superioris forte ludentis adhuc constitutionis residuum, aut illi quæ jam prope impendebat, antecurrens, quid inquam ab consueto intermittentium febrium genio, ac more diversum subludere significabat. Jam tum scilicet credebantur mox eruptura mala, aut prope orientia eadem anteire cœperant, ac elucescere. Atque hæc quidem potissima esse debet solertis, ac diligentis Medici cura, ingruentium nempe morborum excursus sedulo adnotare, vel minutissimas circumstantias, ac occasiones castigatissimo examine expendere, atque uno verbo *primam*, ut aiebat *Hippocrates*, *malorum originem* detegere; Unde futuros rerum eventus magna sui laude prædicere queat, iisque occurrere.

V. Nec equidem omen fefellit exitus. Prope nanque ingens illico, imminente solstitio, Erysipelatum numerosa cohors, tum intra Urbis muros, tum longe, lateque per universum agrum, atque ad finitimas usque regiones propagata est, silentibus tum temporis, aut saltem ferocitate deposita parcius sævientibus, præfatis intermittentibus sic dictis febribus, diviso velut inter alterutrum imperio, ac facultate ludendi. Raræ tunc, ac insensæ minus ægri tudines cæteræ quæ appetente hyeme solent potissimum in Subalpinam gentem se se immittere. Omne adeo imperium sibi, potestatemque irascendi erogaverat præfata morborum progenies, infesta initio multis, funesta paucis.

VI. Ejus nanque aderant moris, atque indolis, ut ludere magis quam sævire, lacessere potius, quam vincere velle videretur. Fabebat ludentibus læta hyems Austris perflata frequentibus, at qui mox subsequenti Subsolano, aut altero quopiam e gelidioribus ventis terga dabant victoribus. Ludere ventos revera quispiam dixerit inter se altero alterius iram coercente, sæviriemque, invicem, se se vicissim excipientibus Aus-

tribus modo, modo Orientalibus, immitique Borea, atque ita reciprocantibus imperiis. Præ cæteris vero Orientales maxime a medio circiter Januario ad finem usque Februarii lenissime perflarunt, tranquillo, amœno, & sedato prorsus Cœlo. Atque id quidem observare erat, quod cum primum hi spirare cœperant Septembri mense, fugatis illico Austris, qui heu luctuose nimis sævierant diu, exarata statim febres intermittentes prodire, quæ quidem rursus hiscentibus iterum Australibus ventis imminui, aut saltem mitius ludere videbantur; Recrudescere hæc vero dein, cum silentibus illis prorsus, Orientales perflabant, aut gelidus Boreas, quorum utrique eadem ferme efficacia concessa est, quia eadem, similique ratione condensatum, ac frigidum aera ex vicinis montibus adferunt. Sæpe etiam memini medio Vere, aut impendente prope Æstate in nostris regionibus, iidem perflantibus, tum Orientalibus præcipue, frigus plerumque recrudescere magis; Quod evenire arbitror, cum nives in toto excelsio Alpium, quæ ad Boream imminet, tum abrupto Apennini tractu jacentes, altiori Sole factæ liquecant, frigidasque partes in nostrum acrem vehunt. Quantum nanque frigus immittat Atmosphæræ nix, vel glacies soluta præclaro experimento inde demonstrari potest, quod spiritus vini rectificatus nivi adusus tantum gelu efficiat, ut liquor aqueus in propinquo mox in glaciem convertatur.

VII. Hæc inter ventorum, ac morborum lusus cernere erat modo Erysipelata, modo exaratas febres intra suum se se alveum condere, ac prope extinguere; Nullus vero præfatis febribus, etsi ingruente hyeme in fugam verti viderentur prorsus, nullus inquam iis negaverit unquam omnium, qui labente anno erupturi erant, morborum principatum, ac veluti prædominium. Quisquis nanque morborum circa æquinoctium autumnale maximopere furit, is totius anni constitutioni nomen impertit suum; quod a Doctissimis Viris jam diu adnotatum scio: atque ob id sorte mos erat *Hippocrati* Constitutiones Epidemicas, quas sermone eleganti adeo, atque ad rei naturam opposito exaratas reliquit, ab Autumnali Æquinoctio inchoare, prope occidentibus Vergiliis. Nec insolita quidem res est Epidemicorum Principem, qui sub Æquinoctio Autumnali præ cæteris invaluit, initio hyemis mitius lacessere aliquando, cum ex

adver-

adverso, ut recte advertit Magni nominis Vir Sydenhamius, (1) Epidemici inferioris ordinis, qui sub eo merentur, tunc temporis præsertim ingravescant, & rerum potiantur, donec dictus anni Princeps eorum vires frangat, & deleat nomen. Hujusmodi aderat memorata Erysipelata, quæ ludentibus vix orta hyeme Austris caput extulerant. Cœperant quidem illa primo paucos tantum invadere; mox vero ceu rupto aggere torrens in apertum magis erumpere, holque atque illos nullo discrimine aggredi, nec Civibus modo, sed & universis pene Subalpinis gentibus insensa, atque illis præsertim, quæ iis in locis degebant, quæ ab Australibus ventis verberari magis consueverant. Quod vel ipsa intra Urbis mœnia advertere erat. Ea nanque parte numerosiore agmine sævire illa visa sunt, quæ meridiem adspicit, nova Urbs dicta ab Immortalis memoriæ Principe CAROLO EMMANUELE SECUNDO inchoata, aucta dein, perfectaque ab Piissima, atque ad Magnarum Principum, ac Reginarum exemplar nata MARIA JOANNA BAPTISTA, tum ab AUGUSTISSIMO REGE NOSTRO VICTORIO AMEDEO, præclara Domorum structura, eleganti Viarum amplitudine, editisque Templorum cervicibus nulli pulcherrimæ Urbium secunda. Ea scilicet ventorum indoles est, ut sive leniter, mitique flamine spirent, sive rupto ceu turbine, seraque miscentes murmura præcipientes ruant, quidquid in altum tollitur, ac inane per æthera fertur, secum una ferant per mille id ipsum vias, ac itinera mille necem hominibus adferre potens. Uter vere in universum existialis magis Boreas ne aut sævus ab alto ruens Aquilo, an circa terram serpens illi oppositus Auster? an qui ab ortu incumbunt, aut qui vespere ab atro consurgunt, decernere nemo ausus adhuc, cum lethiferos quisque effectus induxerit sæpe; tum maxime cum vel diu nimis, vel minime servata temporum lege dire, crudeliterque deserviunt? Ediscere id quidem, ac prænoscerere par ille unice erit, qui locorum positiones, temperiemque Cœli uniuscujusque Urbium propriam recte expenderit, tum plures una invicem observationes, Astronomorum moræ, ac exemplo, instituerit diu, aut rite contulerit institutas.

VIII. Utque Erysipelatum morem, quo

ea scilicet pacto eruperant, fusius, ac propius exponam; Plerisque illa absque ullo proludente signo in hac, aut illa corporis parte inopinato apparebant. Aliis vehementissima febris prodituro Erysipelati facem tulerat, eratque jam prope erumpere impendentis Erysipelatis indicium certissimum, ipsa remissa extemplo febris, deficientisque, Ejusmodi aderant febres, quas revera erysipalatosas dicere fas est, quæ superioribus annis, cum latissime sævientes variolæ cumulatissimam edidere stragem, hisce præire consueverant, ac prope jam eminentes prænunciare. Eruperant autem in vultu potissimum; Nonnullis humeri, aut crura obsidebantur. Statim vero ac detumescere videbatur facies, aut quælibet alia affecta pars; Conturbari hinc cœperat leniter alvus, atque hoc pacto intra paucissimos dies morbus integre absolvebatur. Haud paucis hæmorrhagia primis periodis e naribus prorumpens felici sidere restituit rem. Huic proludebant Hypochondria dura; tumida, dolorosa, aut intensus capitis dolor, aut oculorum rubor, aut tinnitus aurium. Cæteræ quæque Crises, quas sæpe moliri Naturam novimus, hisque morbo exitum dare, aut impares prorsus aderant, aut illas experiri malum. Totum quod erat artis opus, in eo innitebatur, ut ipsa Medicatrix Natura eo libenter contenderet, quo duci annuebat. Quod si oneri ferendo impar foret, haud deerant Medentibus Artes, quibus labentem erigerent, ac sublevarent, quo læta dein crisis per eas, quas ostenderrat illa vias, succederet.

IX. Et sane haud paucos memini nullius Artis ope, sola Medicatrice Natura sanatos: Haud exigua saltem spes salutis erat, totum concedere opus Naturæ, aut ejus motibus per opportuna remedia obsequi. Equidem ut in morbis omnibus, ita in acutis potissimum, tum in Erysipelate præsertim, ac morbo omni inflammatorio haud exigua Medico opus est doctrina, prudentia, & sagaci cunctatione, imo religiosa naturæ motuum observatione, aliter perniciosi nascentur errores. Magna utique Sapientie pars est mentem a præjudiciis liberam servare, nec dirigentis Naturæ motus per intempestiva Medicamenta prævertere. Novit id anum Magnus Hippocrates Jatricæ facultatis Parens, atque ex illo ce-

Z z z 2 le-

(1) *Morb. acut. sect. 1. cap. 2.*

lebrī *Macrobiū* elogio fallere nescius, & falli, qui diversis passim in locis, tum præcipue in libro de *veteri Medicina*, qua summa incumbendum sit prudentia, & circumspeditione in re Sacra tractanda, sic ille vocat medendi Artem, præclare admonet Medicos, quorum plerosque jam tum temporis idem in se admittere noverat, quod imperiti Navigantes; Etenim, qui in tranquillitate, ait, navim gubernantes delinquant, manifesti non sunt; At si ventus magnus, ac tempestas ipsos deprehenderit, tunc conspicui sunt palam omnibus hominibus, quod ignorantia, & erroris sui culpa navim perdiderint. Pervenustam, pulcherrimamque de hoc argumento Orationem olim in Patavino Lyceo habuit Clarissimus *Ramazzinus*, quam una cum cæteris ejusdem celeberrimi Viri operibus Genevenses Typographi superioribus annis edidere.

X. Atque hic loci mihi de Erysipelate, tum in universum, tum in specie, ejus scilicet quod tota in Urbe, atque Agro tunc temporis sæviebat maxime, verba facienti, in mentem subit Consilium Medicum, quod Latino Carmine nunquam satis laudatus Vir exaravit ad præclarissimum nostri sæculi Poetam diro hujusmodi in cruribus Erysipelate laborantem. Quam pulchre, quam eleganter, quam docte Divini Senis Oracula elegiacis versibus expressit, ac prope dixerim illustravit! Hos ego haud abs re futurum duxi Orationi meæ adnectere, ceu gemmam, aut monile quodpiam eximii fulgoris.

Ad Illustr. & Rev. Dom. Abbatem

MICHAELEM CAPELLARIUM

Poetam Celeberrimum Erysipelate laborantem Consilium Medicum.

- „ C Rura Tibi, ut scribis, dirum Erysipelas adurit,
Vir bone, nec reperis qui levet arte malum.
- „ Plurima promittunt Medici, nanque id Medicorum est,
Sed Tu ne fidas, nam dare verba solent.

- „ A pingui, atque oleo, veluti cane (1)
& angue caveto,
Unguina succenso dant alimenta foco.
- „ Pingua quin faciunt, partem (2) putrescere perustam,
Nasceturque ulcus, quod cachoetes erit.
- „ Nec minus herbarum succos apponere tentes,
Crura nec ut mos est, lacte fovere velis.
- „ Talia quippe nocent, coguntque recurrere morbum,
Qui ex imo ad summum proliciendus (3) erat.
- „ Quid faciam ergo inquis? Tu sustine, & abstine, talis
Decubitus criseos est, mihi crede, loco.
- „ Interea in lecto recuba, & suffusa rubore
Aëre ab externo membra tuere precor.
- „ Sic etenim poterit sensim expirare quod urit,
Hæc sat nota Coi sunt documenta Senis.
- „ Tute ergo observa ac tristes animo expue curas,
Sitque bene ut valeas unica cura Tibi.
- „ Noli dum langues, Musis, Phœboque videri
Tam charus, quin sis charior ipse Tibi.

Aureum itaque hoc maxime præceptum in mentem sæpe revocandum, tum in Erysipelate curando præsertim, quod idem amico Poetæ laboranti consulebat Vir Doctissimus: *sustine* nempe, & *abstine*; Talis enim decubitus Naturæ victricis conamen est, ac criseo loco, quam si alio avocare contendis, *putredo*, ac *suppuratio* expectanda illico, funesta quantum!

XI. Totum ideo, ut quæ semel dictæ sunt, iterum repetam, concedendum aderat Naturæ opus, cum præsertim quod moliebatur, conficiendo muneri par illa foret. nec administram Medici opem efflagitaret. Advocanda utique quandoque erat in auxilium Ars, quæ quidem copiosa celebrata semel, aut etiam repetita, si vires tulerint, Sanguinis missione e cubiti Vena, aut e Saphena, ubi opus adesset, hoc uno plerumque subsidio *utramque*, ut ajunt, *paginam* adimplebat, tum apparente nondum, aut prope jam eminente Erysipelate, tum etiam ipso jam adulto pene, nedum tamen remissa penitus febri, aut alio quopiam adhuc

(1) Hipp. de affect. m. 57.

(2) Hipp. 7. aph. 20.

(3) Id. 6. Aph. 25.

adhuc perseverante, quod urgebat magis, fero, immitique Symptomate. Hæc una aderat potior solertis Medici cura; Quod reliquum erat fauste sed celeriterque absol-vebatur quiere, victu tenui, liquido, anti-phlogistico, potu simili, medicamentis di-luentibus, & refrigerantibus simul, vel sin-gulari dote acri specifico opposita præditis.

XII. Hostile nanque acre illud Austrinis flatibus elatum, quod idem superioribus an-nis diras pepererat ægritudines, id ipsum, si quid ego hic judico, nedum subactum penitus, diversi tamen generis particulis, commixtum, quas gelidus Boreas superiore Autumno præmaturo attulerat, cruoris ru-bri arteriosi, inque minimis canalibus sta-gnantis artritum efficere par erat, atque hinc *phlogoses* inducere, vel in finibus ar-teriosis, vel in vasis lymphaticis arteriosis, dilatatis osculis, admissos globulos rubros per fines transmittere non potentibus. Quid-quid enim erodendo, crispando, adurendo va-sorum extrema ita ardeat in Conicis, Cylindricisve, ut diameter aperituræ fiat diametro Sphæræ Sanguinis minor; Quid-quid cruorem aut lympham cogit ut coeat, aut eidem violentum motum præbet, quo-rum utrumque ab acriorum corporum præ-sentia explicari sat apte potest; quemcun-que ad inflammatorium morbum, Ignem, ut aiebat, *Hippocrates*, aut *phlegmona*, qui omnes ob causæ, & effectuum similitudinem ab Igne nomen habent, gignere satis est in minimis æque arteriis, ac Lymphæ du-ctibus. Ut enim in cruore rubra, sic in lymphæ alia est forte pars crassior reliquis.

XIII. Quoties vero inducta semel stagna-tio liquidi in vasis est, sive acre illud spe-cificum, sive aliud quodcunque, sit quod lympham aut cruorem cogat, finesque va-sorum urat, erodat, aut distrahat; Acli adhuc a superstitie vita cruoris vis, eos ipsa effectus inducere par est, erupturi, aut prope jam erumpentis, aut erupti tandem Erysipelatis, aut phlegmonis prologia, ac incrementa: Arteriæ nanque primo minu-tæ, vixque visibiles obstructæ jam a San-guine distendente augentur; Hinc tumor ruber, sive prima Erysipelatis Scena. Va-sa mox lymphatica arteriosa antea, pellu-cida, & invisibilia eadem patiuntur; Un-de augmentum rubedinis; Distenta dein va-scula rupturæ propinquant in fibris mini-mis, ac valde invicem compinguntur liqui-da, & solida; Hinc dolor punctorius, du-rities, renixusque partis adulto jam prope

Erysipelate, adauctoque. Cætera hinc repe-tenda Phænomena, rubedo splendens, calor, æstus, debilitas, molestia, febris, ab atrium partium liquidi inter se in solidum, tum solidi in illas, a rubro accumulato, ab ir-ritatis fibris, a celerius per aperta viarum acto sanguine, Mechanicis hæc eadem omnia legibus præclariora, atque illustriora.

XIV. Exorientis hæc adultique Erysipe-latis prologia. Posteriores illius Scenam exegerat Natura, quod incœperat illa opus, absolvens. Id vero resolvendo potissimum assequebantur, qui idem latissimus ac tu-tior modus est, quo morbi inflammatorii exire solent. Obque id præcipue Artis Ma-gistri, ac Principes Viri ab oleosis ac pin-guibus, tum topicis, quæcunque ea sint, refrigerantibus, anodynis cavere jubent, ne aut pinguior factus humor, ac spissior, ef-fusus idem, tum glutinosus magis suppara-tioni præbeat faciem, qui alter modus est quo terminatur inflammatio; aut retropul-so forte, inque parte affecta hærente adhuc atroque facto magis, *gangrena*, aut *Scir-rhus* oriat, tertius illa, hic quartus ab-euntium inflammationum finis. Hinc ubi sæpe occulta manent Erysipelata, atque in-tima illa obsident delubra, in acutas, aut lentas ægritudines desinunt; Velocis eadem aut lentæ mortis causa, cum scilicet, aut in sphacelum, sive ut ait *Duretus* Subalpi-norum Medicinæ decus eximium, in *Systro-phen phlegmonica* abeunt inflammatae par-tes ut in Iypiria febrî, seu, ut illam vo-cat *Baglivius*, Erysipelate alvi: aut coacta eadem forte in glanduloso tuberculo iners materies in Scirrhum tandem degenerat, qui ut Spacelo, *gangrena*, carcinomati idem, seu cancro a similitudine sic dicto, proludit inevitabili fato, ut in diuturnis obstructionibus glandularum contingere sæ-pe videmus, post assiduas febres neglectas, aut male curatas, atque earum præsertim glandularum, quæ liquorem facilius inspif-sandum obtinent, vel ratione loci stagnare plus cogunt.

XV. Mihi equidem numerosam adeo tunc dierum latissime oberrantium Erysipelatum cohortem vix ingruente hyeme extemplo editam adultamque animo reputanti, haud inanîs utique metus subiit, ne forte appe-rente Vere acriora facta spicula, sævientibus maxime atque una invicem assiduo more inter se configentibus Australibus, ac Borealibus ventis, durioribus malis or-tum præberent, ac incunabula, quibus jam

tum

tum proludere illa videbantur. Metuendum scilicet ne hujusmodi *Systrophes phlegmonicae* intra pulmones tandem, ceu in Principe Theatro subluderent aliquando; Statim atque hyberno exacto frigore, ac novo concitato tumultu in liquidis aptior foret praefatis, exoticis particulis aditus, quo intra eademmet liquida ea, qua pollebant diu, crudelitate saevirent; Notum jam tum scilicet erat perspectumque mihi, quam mala cubaret in praecordiis labes. Nec vanum utique, atque inanem prorsus metum effecerat ventorum una ludentium indoles; Utriusque enim flatus saepenumero Subalpinis potissimum exitiosi exitire, tum maxime, cum se se vicissim excipientes, atque alterno ludentes flamine varias, ac discrepantes inter se invicem alterationes aeris gignunt. Cum vero aereo hocce fluido nobis circumfluo, tum liquida, cum solida aequilibrii perennitatem illius acceptam ferant, quo vita ipsa coepit semel, ac servatur diu; Sitque inter duo haec nostri corporis componentia, liquida nempe, & solida ipsa aer veluti librae *canon*, atque *examen*, cui utraque parent, ac obsequuntur. Conspicua res est alterato librae *canone* servatura eadem haud amplius esse instituti aequilibrii legem, ac proinde tot inter discrimina rerum jure merito suspicari fas esse imminente propius vere nova oritura mala, quibus nigram faciem jam tum praebuerant ludentia passim Erysipelata, tum pronus heu nimius hoc anno ad *Stasin* cruor, tum quae *Epidemici primi Ordinis*, seu anni Principis Morbi dignitatem sibi comparaverant exortae paulo ante Arcturum febres, quas etsi intermittentium plerasque morem servasse meminim, quid tamen *Sacrum* ac re ipsa ingens inesse iis, solertibus Viris jam tum visum aderat, perspectumque.

XVI. Sane ut ab Erysipelatum narratione ad exaratas febres gradum faciam, exercitioribus utique haud imposuerant illae, vel primo sui initio, quippe eam, quam praetulerant primo adpectu faciem, facile conjicere erat simulatam esse; subque ea larva, ac simulationis artificio magnum latere aliquid se se manifestius ostensurum aliquando. Enim vero cum nihil hujusmodi unquam superiore anno contigerit, eruerat statum liquidorum toto jam penitus Caelo discrepare ab eo, quem ipsamet liquida dudum obtinuerat: Ad *Stasin* scilicet magis illa vergere, eaque proinde praecavenda mala, quae a prono ad concretio-

nem sanguine ortum ducere novimus. Atque hanc quidem novam rerum Scenam induxerat nova anni Constitutio appetente Libra, statim atque hiscere coeperant a gelido Aquilone Septembri mense flatus, qui diathesin Aeris extemplo prope immutarunt.

XVII. Memini equidem me pluries tum temporis de iis quae Subalpinis prope impendebant currentis de cursu anni, aegritudinibus, sermonem habuisse cum celebrioribus Artis Magistris, quos eximiae mihi laudi foret debita honoris praefatione singillatim recensere, si prolixiore me esse sineret dicendarum rerum magna seges, ac dignitas. Edoctum fecerat anteacla superioris anni Constitutio, quae a sanguinis fluore, quae ex adverso ab eodem ad fixitatem ac lentorem properante, quae rursus ab hac vel illa aeris crasi timenda magis, ac praevidenda sunt. Ecquid autem perspicuum magis, quam a tendente ad concretionem Sanguine ea quidem praenoscere, ac praenunciare, quae a minus veloci tramite progredientibus liquidis, hinc a consueto eorundem more abludentibus solidis necessario subsequi, atque expectanda esse Mechanicae nos leges docent, quibus tum liquida, tum solida inter se invicem eleganti ludunt spectaculo? Ut exacto anno prodierant mali ingenii febres, tum quae sub iis merebantur spasmodicae aegritudines caeterae, illae a sanguinis fluore ortae, haec ab exoticarum particularum spiculis, quas una secum invexerant dire, ac diu saevientes Austri; Nova modo rebus inducta facie a priori diversa prorsus, nova quoque morborum proles caput extulit, quos anteire, ac ceu prima acies celeritate vincere visae fuerant recens enatae Autumno febres. Tantum scilicet adhuc intra liquida res erat brevibus circumscripta finibus, propagata nondum ad solidas partes labe. Et sane ut parva saepe scintilla magnum excitavit incendium, novae hinc, totque ortum duxerant aegritudines, quae omnes quidem ab uno fonte progerminarunt, una omnes, ac eadem methodo profligandae, etsi pro diversa, quam indurant, larva inter se invicem differre quodammodo viderentur.

XVIII. Enim vero si praefatas febres attentius expenderit quispiam, si harum ortum, ac incunabula, morem, ingeniumque, otiose singula, & considerate perpendimus, atque haec omnia in animo vere cogitamus, nullam prorsus illas inter ac febres intermittentes, ita vulgo dicta, origi-

nis

nis affinitatem comperimus. Sic quidem illas vocare lubet ab intervallo paroxysmi interjecto, ut morem Practicis veteribus geram, quibus olim appellationes febrium, quibus dignoscuntur, a qualibet sanguinis alteratione, vel symptomate particulari desumere satius visum fuit, quæ diversæ speciei febribus pari jure possunt competere. Quidquam tamen inesse iis peculiare, arcanæ anni Constitutioni, refrenum, nilque penitus cum intermittentibus vulgo dictis commune, aut hisce proprium tum ipsa febris indoles, tum quæ sub illa ludebant per hyemem Erysipelata, ad quorum aspectum sese illa toties abscondere visa est, tum quæ deinceps proximo Vere, ac æstate sese prodiderant ægritudines aperte satis ostenderant. Nec quidquam vetat *Erysipelatosas* nuncupare, aut si mavis dicere *Igneas*, ab urente sensu caloris, inducta in liquidis stasi, *Hemitriteas*, sive *Semiterrianas* dixerit Veteres, de qua febre doctissimum vide *Duresum*, in *Coac. & suum*, quem ita bene commentatus est *Divinum Senem* 1. *Epid. com.* 3. *apb.* 5. Neque enim abs re erit hæc febris concipere, seu accensionem quandam erysipelatosam cruoris ad fixitatem vergentis, qui idem statim ac perflantes Austri rarefactum magis aëra effecere, ante aëti lentoris vestigia in hac, vel illa externa corporis parte deposuit. Ubi vero denuo hiscente Borea constrictus magis, condensatus ac compressus aër evadebat, docente Barometro, eadem iterum redibant febres, intra ipsamet liquida rursus sese condente igne; Qui idem aut Phrenitides plerumque, aut funestas huc illuc *systrophes* ludens pepererat.

XIX. Ac revera intervallum illud Paroxysmi interjectum larva erat, seu simulationis integumentum, quo incautiores aliquando hujusmodi febres sefellant. Cernere erat in hoc apyrexia statum, si modo ita dicere fas est, ægros, non ut mos est in cæteris febribus, pene omnino sublevatos pleno inter duos quoque paroxysmos intercedente intervallo, aut potius vexatos pene dixerim magis, anxios, pervigiles, siticulosos, ore, oculis, ac fronte turbatos; Pulsus aderat parvus, humilis; urina impense rubra; tensivus capitis dolor, dirus, ac immitis prorsus, æque ac sub ipso febris statu, ac incremento; Nullus quoque tum accensionis initio vomendi conatus, aut ullum vel levioris nausæ vestigium, quod hærentem in primis viis mali fomitem: ostenderet,

quam citissime removendum; tum declinante paroxysmo emergens sudor, quo apparente solent intermittentes febres per vices desinere. Summa nanque rerum, ac potissima morbi causa a Phlogistica liquidorum crasi, ac proinde turbato eorundem progressu repetenda erat. Quod quidem probe distinguere, tum probe noscere opus aderat, ut inde curativæ indicationes rite dirigerentur; Aliter exulcerabatur magis res, stupente Medico, ac morbi malignitatem perperam accusante. Neque etiam, ne quis me immemorem prorsus credat, ac rerum, quas sub oculis habuimus nuper, oblitum, eadem aderat singulis æqua rigoris accessio. Quidam enim exiguo orroris vestigio; Plerique valde sensibili rigore corripiebantur. Nonnullis primo tantum accessu, ac febris aditu, haud paucis ad singulas accessiones, ac vices idem rigor, ac horror supervenit. Horum plurimi toto apparentis Apyrexia decursu molesto quodam frigoris sensu detinebantur, pulsu vix elato, ceu exquisita tertiana laborantibus aliquot ante accessionem febris horis contingere solet. Quidam etiam properante ad exitum morbo, una cum judicatione majori horrore obriguere. Sæpe id latentis diu vomitæ inopinato disruptæ præludium exitit; Autumno quidem, ac per hyemem omnino pauci: Vere, ac æstate longe plurimi, Vix quenquam novi absque sanguinis e naribus, aut ab hæmorrhoidalibus venis profluvio sanatum. Utrique horum conturbata sæpe alvus proluit, aut quod inchoaverat opus, absolvit. Quibus nihil hujusmodi obtrigit, Phrenitide per hyemem, ac Veris initia correpti sunt, quorum neminem servatum vidi. Orto autem Vere plerisque læta pulmonum suppuratione, dummodo in docti, ac solertis Medici manus inciderent, incolumes evasere. Quæ quidem sequentibus ægrorum recensitionibus illustriora effigere pergam.

Æger Primus.

Sutoris Uxorem, propter Regias Archigymnasii Aedes degentem, quas superioribus annis vix confecto bello, Magno ac Rege digno sumptu e fundamentis erexit, atque hoc ipso An. MDCCXX. XII. Kal. Decembris festissima pompa, omnique lætitiæ apparatu, Musis reservavit INVICTISSIMUS REX, ignis, ut *Hippocratis* verbo utar, hoc est vehementissima febris cum rigore prehendit. Huic inter exordia intensus capi-

capitis dolor contigit, lumborumque, ac præcordiorum dextrorum, quæ quidem mox fluentibus mensibus allevata sunt. Sexto die rursus suborto rigore exasperata sunt omnia. Somnia non aderant, extrema frigida, pulsus parvus, sitibunda erat, adusta alvus pauca demittebat. Septimo pulsus elatior, urinas reddidit impense rubras, levius habuit. Octavo rediit rigor, capitis lumborumque dolores intensi magis, lingua sicca, urens, fuliginosa. Nono quievit. Undecimo sub noctem conturbata est alvus, multa que prodire cum bilioso affluxu. Decimo quarto perturbata iterum alvo perfecta judicatione absoluta fuit.

Æger Secundus.

Mulierem quandam gemellas laboriose enixam, cum non admodum partus purgamenta processissent, primum quidem febris corripuit horroris sensu haud exiguo; Mox capitis, & cervicis gravitas non sine dolore tenuit. Postridie moleste habuit, non dormivit. Tertio die repetiit una cum rigore febris, pulsu parvo, humili prorsus, abjecto, præcordiorum anxietate magna, siti multa, inordinate quidem, & inconstanter perturbata, rursusque consistente alvo. Septimo paulo elatior pulsus; sub Vesperam febris rediit, exiguo præludente rigore. Octavo lochia repente fluere, atque uno, eodemque temporis momento latis pustulis subrubris sædari visa cutis, quæ ad tertiam usque vicem sese ostenderant, condebantque vicissim. Capitis mox, ac cervicis dolor remiserat. Quievit. Undecimo copiose adhuc fluentibus lochiis integre convaluit.

Æger Tertius.

Præsul dignissimus, qui juxta Dianæ Templum, nunc Sacram *Confraternitatis Sancti Spiritus* ædem decumbebat, febris acuta correptus est cum rigore. Lingua rescicata erat, siticulosus, bile abundans, somnum non cepit. Postridie vix horum vestigium aderat. Tertio, quinto, ac septimo per vires repetiit febris una cum intenso dolore capitis, qui interjecto paroxysmi intervallo augebatur magis, quin etiam vix elatus pulsus toto Apyrexie tempore percipiebatur. Nono in sinistro femore splendens rubedo apparere visa in Orbem veluti, ceu lata macula paulo supra femoris articulationem cum Tibia, quæ cito priorem deferens locum in

superiori femoris parte sese prodidit, mox in ejusdem lateris Tibia haud longe a malleolo interno, Thaleri Imperialis magnitudinem haud multum superans *Erysipelas volanicum* appellant. Decimo quarto copiosa e naribus hæmorrhagia superveniens morbum feliciter absolvit. Huic alvus ab initio continenter biliosis liquidis multis distillabat, aut si consisteret, servida, & cruda deiciebat, Urinæ per totum morbi decursum rubræ admodum sublime quid in medio suspensum habentes.

Æger Quartus.

Nobilissima Mulier, quæ prope Collegium Patrum *Societatis Jesu* habitabat, ut filiam enixa est, nec purgationes irent, eam tertia die acuta febris cum horrore corripuit. Octavo deliravit, statimque ad intelligentiam rediit. Undecimo per intervalla soporis quadam specie detinebatur. Sub noctem extrema paulum perfixere, sed mox recaluit: Mente nonnihil mota est media nocte. Duodecimo sub tempus matutinum latenter obiit. Aperto cadavere plurimum grumosi sanguinis in cavo uteri repertum, tum vasa quæque uteri sanguinea distenta valde, ac fere varicosa; Intestinatorum externa facies atro suffusa colore; Hepar prægrande admodum. Potissima vero mortis causa in dextra uteri tuba sese prodidit, ubi disrupti recens tumoris vestigium aderat, ac inundantis adhuc materię albæ, sædæ, teterrimæ. Plura mihi quoad morbi historiam, tum anatomicam cadaveris administrationem scire haud licuit a Medicis, qui tum curationi, tum sectioni intererant. Sane ejusdem, ac reliquæ, quæ tum temporis sæviebant febres, indolis hanc fuisse, qua nobilissima Mulier fato cessit, fidem fecerat indugia *Archigenis* conjectura, tum quæ in cadavere obviam venerat puris copia, disruptus Tubæ abscessus, vasorumque per uteri substantiam repentium varicosa tensio, a lentescente cruore, unde phlogistica primum labes, mox suppuratio ortum tulit,

Æger Quintus.

Adolescens tum illustri stemmate, tum morum candore, ac probitate præclarus, qui prope Templum *B. V. Angelorum*, decumbebat cum ejusmodi Erysipelate, cujus supra memini *agroso tertio* per Autumnum labo-

laborasset, quo crura modo, modo pubes, ac finitimæ Scroto partes infestabantur; auriginosus extemplo factus, acuta dein febris, extrema hyeme, quæ cum exiguo rigore primum, mox absque ullo rigore pervices reperit, correptus fuit; Pulsu vix elato, qui idem per totum morbum permanserat, magna capitis gravitate, siti ingenti, adusta alvo. Quod postremum quidem in omnibus fere hujusmodi febribus agrotantibus adnotare erat. Reliqua, quæ ad morbi decursum pertinebant, cum ea distincte unquam scire mihi concessum haud fuerit, reticere magis lubet, quam exarare. Sexto ingenti oborto stertore celerrime periit, enata forte, ut ego suspicor, ac propagata ad pulmones labe, quæ tum per hyemem simulate incedens proximo mox Vere larvam abjecit.

Æger Sextus.

Jurisconsultum juxta *Theatinorum domum*, qua ad forum itur Olitorium, febris a cœna vehemensprehendit; Noctem laboriosam transegit. Postridie per totum pedem ad talum usque tumor subruber, ac tensus valde apparuit, cujus in centro atrum quid aderat, ac subnigrum. Insania correptus est; Ex alvo mere biliosa pluxima processere. Paulo post convulsionibus a capite subortis celeri fato interiit. Ingenii erat tetrici admodum, atroque vultu, absque hominum consortio omnino alienus, ceu *Myfanthropos* alter.

Æger Septimus.

Pari quoque etsi veloci minus fato sublatuſ est piissimus Sacerdos *Congregationis Oratorii Divi Philippi Nerii*, mihi amicissimus; Is cum initio hyemis diro cruris Erysipelate laborasset, paulo post, medio scilicet Januario desipere leviter cœpit, mox in furorem repente agi una cum febris acuta statis vicibus repente. Urinæ aderant pallidæ, decolores, tenues, atro quodam in iis suspensio, quod in acutis plerumque morbis Phrenitidem præſagire solet; Oculi protuberantes, trucesque; Facies tetra, vultuosa, horrenda aspectu; Lingua, pulsus durus, respiratio rara, & magna, fæces albæ, collectio floccorum. Præcesserant hisce somni turbulenti, Stillicidium narium, oblivio subitanea, alvus suppressa diu, ac mœror ingens tum prope imminentis, tum præsentis

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

mali præludium idem, ac comes. Rogatus ego una cum Parente meo, ut agrotanti opem præberem, ejus sententia, & auctoritate nihil præsentaneum magis visum fuit, quam ea citissime validissima remedia adhibere, quibus tolli posset inflammatio ad cerebri arterias orta; Missiones nempe sanguinis repetitas, diluentia ex decoctis antiphlogisticis, nitrosis assatim exhibita, pediluvia, Epispastica, Cucurbitas, clysmata, & his similia, quibus ex voto obtrigit ferocitatem morbi compescere; apparente iterum ad crura Erysipelate, cujus præsentia, ceu læto enitente sidere exarata symptomata quæque mitius extemplo laceſcere, ac dein sese subducere prorsus visa sunt. Hæc una namque salutis spes erat materiam morbificam, ut cum Practicis loquar, in parte Principe dire lucentem, quam vincere prorsus haud poterat Ars, ad crura revocare, quo illa primum erroris sui notam reliquerat. Atqui evanescens brevi recens ortum Erysipelas, omnemque deinde eludens Artis opem sævioris mali omen tulit. Facta namque ad pectus indomiti humoris metastasi, inque exili pulmonum membrana, ac tenellis vasorum reticulis oborta phlogosi, lethalis Peripneumonia impedito sanguinis trajectu successit, quæ nullum faciendæ amplius Medicinæ locum reliquit. Nil melius *bona crisi*; Nil pejus, & mortiferum magis, quam prava metastasis, vel egressionis progressus ad pessimam *Epigenesin*. Mala enim orta malis gravissima inferunt mala, quæ sunt veluti soboles quædam tum *Phlegmones*, tum qualitatis malignæ, & partium oppressarum.

XX. Atque hæc sunt selectiores Ægrorum historiarum ea, qua passim in adversariis festinante calamo exaratæ fuerant, styli perspicuitate, ac brevitate, quod in historica narratione potissimum expetitur, conscriptæ. Quæ quidem haud exiguam lucem afferent, tum iis quæ superius attuleram, tum quæ adhuc dicenda manent plura, per Autumnum, ac hyemem gesta, perque totum dein currentis anni decursum. Enim vero, ut de harum postrema tantum eloquar, quantum ab hac una lucis in morborum successione dignoscendis, præcavendisque quam sibi illustrandam, exornandamque Spartam constituerat seriore Libitina dignus Illustris *Baglivius*; Quantum inquam lucis, claritatisque eniteat nemo non videt. Equidem magna hæc est Sapientiæ laus morborum conversiones, non leves illas utique, & parvi momenti, quæ frequentissime occurrunt, &

A a a a suc-

succedendi progressum, ac normam constantem servant, at quæ vel solertioribus sæpe negotium facessunt Viris, futuras nosse, ac velut e specula prævidere: Sæpe hinc novum orientem, aut recens ortum morbum vel ipsa inter exordia reprimere contigit auspicato.

XXI. Timendas morborum successiones scite non minus, quam docte admonuit ex *Galeno Ballonius*, ac diu olim, qui utrique præluxit, Magnus Artis Dictator *Hippocrates*; Timendas utique, atque eo magis considerandas, quod hæc inter conversiones, ac transmutationes morborum multa passim symptomata contingant, quæ bonis, & eruditis Medicis ob similitudinem, & fallaciam sæpe imponunt, & novi morbi tanquam rediviva soboles, ex aliis subinde consequantur, atque repullulent. In universum vero calamitosior est morbus, qui alteri succedit per metastasim materiæ morbiticæ in Partem Principem fractis jam viribus. Nemo nanque dubitat, quod materia prioris morbi mitior sit, quam secundi per metastasim nati.

XXII. Nec difficile erat conjicere tot inter nova orta mala imparem, ac prope effatam Naturam haud posse amplius diu ludentis impetum eludere, illius vim feritatemque compescere. Simile quid olim Panormi obtigisse memini Præclaro Equiti Triremium Præfecto, cui ad tertiam usque vicem enormem Tragediam dirum luserat in crure Erysipelas, totidemque illud vicibus gravior alter morbus exceperat, quo tandem, num auxiliatricis Artis ope, an Naturæ potius victricis auxilio incertum adhuc, utriusque saltem beneficio, conturbata sponte alvus, tum copiosa contingens ab hæmorrhoidalibus venis sanguinis evacuatio, desperatam jam pene rem opportune restituit. Nihil autem hujusmodi, quidquid molita fuerit Ars, Piissimo Viro contigit; Errabunda nanque materies vix erroris monumenta prodidit; Magnum profecto lentoris argumentum, quo ceu compede obstricta liquida haud poterant amplius in libertatem adigi, ac certanti Naturæ obsequi. Neque enim Criseos loco erat, aut imparem potius Naturæ conatum ostenderat recurrens ad crura

Erysipelas, quod lethali tandem Peripneumoniae lampada præbuit; nil nanque paulum criticum unquam. Pro morbi vero magnitudine impar heu nimis aderat Erysipelatis in crure vestigium; Ita *Temeni Nepi* (1) apud Senem Magnum, in acuta, & magna febre metastasi facta est ad digitum, & mortua est, cum non sufficeret ad suscipiendum exigua adeo pars quidquid expellere Natura tentaverat. Cœperat ipsa quidem, nec potis fuerat inchoatum motum absolvere, insausto prorsus judicio, exituque infelici: Ceu cum exhibitum olim venenum post multos annos, derepente exorto in parte aliqua externa dolore homines celeriter extinguit. Atque tunc ego quidem cum currere vidi Erysipelas absque ulla alia manifesta crisi, & ditionis mali omen adstantibus haud sine magna Artis laude prænucciavi (2) *Avicennæ* consilio edoctus, cujus utique fraudis, & inemendabilis doli infinita prope exempla legere est apud *Hippocr.* & *Galenum*, alioque Medicinæ Principes, atque Antesignanos (3).

XXIII. Dignaque sane quæ attentius expendatur, hæc ipsa aderat tot invicem morborum conversio, atque successio. Erysipelati nanque, quod primum in re proluserat, Phrenitis successit, huic altera vice Erysipelas, atque huic postremo Peripneumonia, qua tandem vita defunctus est æger. Totidem malorum successionibus totidem quoque cernere erat ludentis una tempestatis mutationes obsequi. Cum primo enim Erysipelas præluxerat, Austrina Constitutio vigebat, quæ ad plures dies prope appetente Solstitio perduravit. Successerant hinc gelidus mox ab Aquilone flatus, ac tum quidem in Phrenitidem factus est transitus. Dein vero repetentibus Austris, Erysipelatis iterum in crure vestigia graviore morbo præludere; Novo nanque inducto repente frigore, Borealiū ventorum afflatu, postremum Tragediæ actum absolvit inopinato oborta lethalis ima intra præcordia *Systrophe*, qua tunc dierum plures celeriter e vita migrarunt, atque hos inter Senes potissimum, rum qui serosa ad pectus colluvie conflabantur diu. Tot scilicet malorum transmutationes a diversa Aeris Diathesi,

(1) *Secl. 1. lib. 2. Epidem.*

(2) *2. 4. tract. 1. cap. 29.*

(3) *l. 4. Epid. tract. 81.*

Id l. 3. Epid. tract. 2.

Id. l. 1. Proreptic. secl. 2. com. 17.

Petrus a Castro secl. 4. §. 44. & seq.

Bagliu. Pract. Med. lib. 1. pag. 51.

thesi, quod *Divinum* illud est, ac revera Sacrum Mortalibus, proficiscebantur, impendentium morborum prologia, ac incrementa.

XXIV. Prope nanque imminabat prævisa diu nova malorum Soboles, quorum præcipua Scena intra Thoracis delubra parabatur. Prodire quidem jam tum per hyemem cœperant exitiales pectoris ægitudines, at errantis potius in morem nedum auferant adhuc sese palam, apertoque Marte prodere. Nondum enim larvam abiecerant penitus exortæ Autumno febres; Quinimo attollere hæc magis caput properante Vere visæ sunt, novo recens, atque acerbissimo oborto frigore, quod luctuosam rerum faciem ipsa inter Veris exordia reddiderat. Denso hinc agmine visæ foras erumpere Arthritides, Hemicraniz, Anginæ, atque una cum toties exaratis febribus ultro, citroque ludere, quibus illæ ceu ingruente hyeme Erysipelata, ac Epidemici inferioris subfellii famulabantur. Uno in Monialium Cœtu *Divæ Mariæ Magdalene* omnes fere Vestales angina correptæ, extremos morituræ hyemis conatus dire pertulerant. Quidam quoque e Civibus, cum magis ingravesceret frigus, repentina morte sublati sunt. Quosdam etiam memini hosce inter tumultus repente insanientes, quibus nil tale unquam contigerat. Plerisque ulcera per hyemem prodire maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnullis etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri aderat. Haud paucis pustulæ oriebantur, dein exulceratio, Prurigo modica, dolor ingens; Multis humor exibat, sed non admodum, qui referre, vel pus, vel saniem videbatur. Dira æque iis quoque extitit hyems quos diuturniores ægitudines dudum vexaverant; Plerique horum nanque ad interitum iusto celerius forte properarunt, atque hi potissimum, qui Scorbuti, Phrysi, aut Hydrope laborabant dudum. Hos inter Scorbuticis præcipue frequentissimæ obtingere hæmorrhagiæ lethales ex ipsa cute externa non apparente vulnere, quod mirabile dictu, observatum fuit in Picloris filio septenni prope *Collegium Nobilium Patrum Jesuitarum*, In Cauponis uxore ad *Forum Carolinum* jam quinquagenaria prope, tum in Quæstoris famulo haud longe a *Foro Castri* dicto; Potissimum vero ex labiis

gingivis, ore, naribus, utero huiusmodi excretiones obtigerunt. Memorandum Mulieris exemplum adhuc subit lethali huiusmodi ex raninis venis hæmorrhagia brevi temporis intervallo pereimptæ. Cœperat illa diu olim Scorbuti dire vexari innupta adhuc. Nupta dein sævius per vices recurrere sæpe malum consueverat, quod quidem ingravescere magis, ac vires *acquirere eundo* ostenderat difficilis magis, anhelosa, ad motus vel paucos fere deficiens respiratio; Dolores varii, ac vagi per omnes internas, externasque corporis partes mira producentes tormina Colica, Hysterica, Iliaca; Rubræ modo, modo flavæ, ac violaceæ maculæ in cute apparentes; Crurum tumor accedens, recedensque; Oris fætor, Gingivæ tumentes, adque minimam pressionem evomentes cruorem; Dentium vacillatio, ac nigredo; Quodque funestissimum aderat, varicosi annuli ad raninas venas, quibus inopinato referatis lethalis oborta est hæmorrhagia, cui obistere nulla Ars potuit unquam. Huic Soror aderat, quæ atrocibus æque conflictata malis haud absimili prorsus fato biennio ante vitam cum morte commutaverat. Utrique harum cum tenella adhuc ætate forent dira scabies, ac improba ulcera futuri incrementa mali præluserant, quibus sicca dein ac lenis Elephantiasis successit.

XXV. Horum alteri, quos tum temporis repente e vivis sublato memini, late admodum maculæ, ut a Chirurghi ore didici, qui inspiciendo cadaveri accitus fuit, ut quæ celeris adeo, citroque necis causa fuerit ad eos, ad quos id spectat, renunciaret; late inquam admodum maculæ in universo corporis ambitu conspiciebantur; colore violaceo, ac fere subnigro, tum quæ præsertim præcordia, cruraque, ac totum vertebrarum tractum occupaverant. Magnæ id quidem inductæ in liquidis stagnationis monumentum. Id nanque est exiguas inter, quas *exanthemata* Græci vocant, ac latas maculas discrimen, quod illæ fusionis, (1) ut superiore anno adnotavimus; hæc coagulationis potius, ut ajunt, prælogia sint, quod idem mihi assidua per sexdecim fere annos apud Subalpinos praxis edocuit. Illæ febribus continuis, mali moris, exitialibus morem gerunt, hæc diuturnioribus passim malis, ac Scorbuti potissimum

Aaaa 2 fa-

(1) *Constit. Epid.* 2720. pag. 64.

facem præferre viſæ, tum perſæpe etiam repentinam mortem proſequi, aut illi prodere, ut in repente denatorum Cadaveribus cernere eſt aliquando. Illæ rurius rubræ magis occurrunt ob tenuiores quas effuſus ab arteriarum oſculis cruor dimiterat, proſugas, ac diffugientes hinc inde partes; Hæ vero ſubnigræ, ac ſublividæ prout ob fixiores ſanguinis particulas venarum extremitatibus hærentes, ut ait *Villifius*. Illæ ſanguinis Phænomena coire amplius haud poteris, hæ futuri, ac prope imminentis lentoris exordia. Hæſce inter poſtrema, quæ ſublividæ ſunt, prolixioribus illæ malis, quæ nigræ vero ſubito, aut celeri fato præludere ſolent. Nuper deſideratus omnibus, dum hæc ſcribo, celeriter obiit Amicus meus, qui ad novum Urbis ambitum *apud portam Secuſinam* habitabat, cui perquam latis huiusmodi maculis ſummo quodam mane, cum alias ſaniſſime degeret, interſtinſta illico cutis apparuit. Veſpere cum ad cœnam lætus accederet, e vivis repente exceſſit. Nuper etiam diuturno conſectus morbo ad plures abiit Piſſimus Vir prope Templum *Divi Franciſci de Paula*, cui biennio ante ſublividæ maculæ Veris initio, mox ſœdus Icterus nulla proludente febris inopinato obrigit, præduris diu, ac tenſis admodum Hypochondriis; Aperto Cadavere vel minimam bilis copiam in cyſtide, ac nigerimam prout, atramenti ad inſtar obſervavi. Idem olim in mortuis derепente adnotavit *Fernellius*.

XXVI. Atque hoc quidem ſenſu ajebat *Duretus*, livores pejores eſſe quam nigredines, in Chronicis nempe affectibus, ubi illæ à malis veniunt per mala; ſucceſſione veluti, ac converſione unius morbi in alium metuenda quantum. Secus utique in acutis, in quibus *palindromes*, ac *gangrenæ* prope jam factæ indicio nigredines ſunt. Sive vero ſublividæ, ſive nigræ ſint ad cutim maculæ; Utriſque diuturna jecoris ægritudo aut vehementiſſimus dolor præludere conſuevit. Hinc ſublividis potiſſimum Icterus ſæpe, aut illæ Ictero fatali proludere. In hac ego Icteri ſpecie à viſciditate, & ab amurcoſa bilis qualitate orta tartareis, veluti pro ſecreto, uti ſoleo, & aqua Nucerriana Sale admixto prunellæ, repetita per duas, vel tres vices purgatione alternis diebus ex Rhabbarbo, quod olim jure meri-

to *Patrem Hepatis* ob ſpecificam ejuſdem ad pleroſque Hepatis effectus curandos virtutem dixere *Arabes*; Deinde ad Serum lactis veniendum cum marrubio bullitum, & ſingulo mane calide dandum; Quod ſi nimium fuerit amurcoſa bilis circa jecur impacta, aut magna ejuſdem viſcidæ, nigræque prout copia, addi poterit cum ſero in maceratione drachma una hellebori nigri præparati alternis diebus vel cochlear unum, aut alterum *Syrupi cachectici Fernelli* cum helleboro, qui ſyrupus magnarum eſt virium in Chronicis; Et demum omni bile hac methodo expurgata, (hic primus curationis ſcopus prudentis Medici eſſe debet) chalybeata, & roborantia uſurpanda, nunquam infelici ſucceſſu.

XXVII. Neque enim raræ omnes Icteri ſpecies tantum, quotquot recenſeantur à Præcticis, tum huiusmodi exarata modo, cui ſublividæ ſæpe maculæ anteire ſolent, ſed Chronicis fere morbi omnes à male affecto Hepate ortum habent. *Tante ſcilicet molis* adest hæc una haud immerito Princeps pars inter cæteras, quas præclaro quodam munere in œconomia animali fungi novimus; Ut contabeſcant hæc ſenſim neceſſe ſit illa laborante, ac pereant tandem, ni ab imminente exitio quam citiſſime tueatur, Hyſtericis, Calculoſis, Colicis, Scorbuticis, Lienoſis, Aſciticis, Tympaniticis, ac innumeris id genus aliis nunquam obſervatum incolume hepar, quinimo ab hoc uno malorum ſomes, ac origo ſæpe repetenda, obſtruſto ſcilicet, inflammato, aut ſcirrhoſo, quæ tria duritatis nomine vocat *Hypocrates*; (1) Quod autem horum aderit, ſtercoſæ dejectiones oſtendent.

XXVIII. In hac perturbatione rerum, totque inter exaratas ægritudines diuturnas, quæ impendente Vere, aut ægros ad interitum celerius forte, quam par foret, ducere, aut exacerbare magis viſæ fuerant, obviam veniunt peculiareſ Virginum affectus, qui, ſi dire crudeliterque unquam, tum per hyemem maxime erga inſontes Puellas tyrannidem ſavitiſſime exercere, a copioſiore liquido ibidem potiſſimum ſtagnante, ac preſſis nimium proinde vaſis orti, quam ab effæcto eodem, pravo, ac vapido, ut etiamnum ſerunt exercitatiſſimi Viri. Proderant hinc iis magis, quam celebriora quæque chalybeata uſurpari ſolita, iterata venæ ſectio in pede.

Ipfæ

Ipsa dein vasa a plethora nimis debilitata adstringentibus opportune roborando, ac confirmando. Quibus confestim ad Martialia properatum est, magna iis repente excitata Phlogosis graviora intulit mala. Ars quippe erat iis consuetam Artis opem haud adhibere, quod quidem ab Constitutione Anni ediscere est, ejusque Principis ingenio Morbi, cujus imaginem sæpe etiam referunt diuturnæ quotquot eo tempore sæviunt aggritudines cæteræ.

XXIX. Haud paucæ quoque Mulieres vi-
sæ fluore albo per hyemem laborantes, tum subsequenti potissimum Vere, ac Æstate; Atque illæ quidem præsertim, quæ hysterici olim insultibus vexari consueverant. Ars quoque iis erat non equidem effæcto, pravoque cruori suæ restituendo indoli non fermento ulli uterino emendando, aut exaltatæ bili demulcendæ incumbere, aut erodentibus salibus coercendis, inutili remediorum apparatu. Ast potius, ut ego arbitror, profectum ab universali causa malum, antequam radices ageret, aut adhæresceret magis, elidere; Radicatum vero si quod foret, ac missis stirpibus firmatum proprio in solo, ac delubro reprimere. Utor ego frequentissime in hoc morbo, quo potissimum Noitrates Mulieres laborare solent, ter quaterve purgato corpore (si hysterica fuerit bis purgasse suffecerit) injectione aliqujus liquoris appropriati.

XXX. Quod ad hujus fluoris scaturigines attinet, in obscuro adhuc res later. Nemo fane, quod sciam, acu illam tetigit hactenus. Crediderim ego haud aliunde petendas esse ilias, quam ab iisdemmet menstruorum fontibus. Nec profecto ab verosimili prorsus aliena hæc hypothesis est. In quotquot enim, quæ hujusmodi profluvio diu laborantes e vita migrarunt, nihil in utero compertum memini, præterquam feri aliquod in ejus fundo effusi, quodve adhuc exigua copia premente digito ab hiantibus forte vasorum orificiis guttatim profliebat, ceu in iis quoque intueri est, quæ inchoante fluxu menstruo, aut pene jam peracto, defunctæ sunt. Quamobrem ut satis est ea foramina, per quæ uteri sinus cum hujus cavea communicare Clariss. Viri observarunt, prope imminente menstruo fluxu a vi erumpentis sanguinis tantummodo diduci, quo sanguis subinde effluat periodo nulli ignota, desinens idem fluere, mox ac imminuta vi, tum quantitate liquidi, quæ unica est periodici ejusdem fluxus potissima

causa, sese contrahentibus circumjectis fibris, exarata foramina occluduntur, aut saltem tantum patent adhuc, quantum satis est exiguo sero jugiter transmittendo, quo uteri cavea humecta servetur. Ita laxaris forte fibris, aut iisdem a nimio sanguinis affluentis impetu debilitatis feri fluxum contingere puto magis, aut minus diuturnum, quo major, aut minor est fibrarum laxitas, quove magis illæ aut minus sese restituere queunt, inque proprios systalticos nisus consurgere. Raro, ac vix raro quidem puellas, aut virgines hujusmodi affectu correptas memini, sæpe equidem nuptas, tum quas hysterici insultus frequentissime laceßere consuevere; Plerasque etiam novi a difficili partu in hanc ægritudinem incidisse, nonnullas post assiduam uteri hæmorrhagiam; Neminem unquam quinquagenaria majorem, aut quibus menies defecerint. Quam facile vero laxari vasorum uteri fibræ, quam levi de causa foramina diducta semel haud occludi penitus dein, quam celeri tramite per tot implicatissimos uteri sinus affluens liquidum, tum gravitate sua, tum forte etiam copia, uteri vasa distendere, villosque divellere repetitis arietationibus, & gravitatibus queat, neminem later! Obscurior res est quænam illa sint, quove more se habeant exarata foramina; per quæ ab erumpentis sanguinis impetu diducta leviter, aut diducta semel, nondum penitus occlusa amplius, tum menstrua evacuatione cruor, tum serum diuturno fluxu secedit. Num villi illa sorte arteriarum uteri evanescentium seu venarum ejusdem primo nascentium, vel earum limites? Sed de his pro instituto satis. Ad Arthritides modo, Hemicranias, Anginas, quæ ruente ex alto Borea Veris initia præcesserant, mea se convertit Oratio; Ne quid per hyemem gestum prætermittam. Neque enim tantum juvat delibare rem, sed & amplius lubet excurrere, quove illa omine præluxerit, aut obtigerit, expendere.

XXXI. Una eademque aderat harum omnium ægritudinum curationis ratio, si modo ad Principem ludentem affectum mentis acies dirigebatur. Sive enim ad fauces, sive ad ortus, sive ad involucra cerebri, sive ad oculos, (Opthalmiæ nanque plurimæ sub id quoque tempus profluerant,) præcipuam ageret Scenam Morbus; Unus idemque erat vincendus hostis; idem omnino curandi scopus in singulis, idem pariter, si ab hoc quispiam Medicorum tantisper

sper abluderet scopo, expectandum agrotantibus solum, *Ostendit autem sanatio*. Neque enim purgantia, neque anodyna, neque alia quæque hisce olim conducentia auxiliorum genera, profuisse visa, præter venæ sectionem, quæ feliciter sæpe restituit rem, tum ea una simul exhibita remedia, quæ aut præsentis Phlogistico affectui compescendo, aut impendenti liquidorum præcavendæ labi, ex qua hujus, vel alterius Partis Principis imminens aderat Sphacellus, *Natura monstrante viam*, citius occurrerent. Princeps nanque ad Principis morbi vim reprimendam, coercendamque, cuius imaginem referebant exarata omnes ægri-tudines, Princeps inquam præsidii genus id erat, quod stagnationem, ac lentorem liquidi eluderet, hoc uno affecti crimine, nimia scilicet sui copia, ac pondere, quo lentescere idem in vasis opus erat, aut saltem si non omnino adhuc lentescere videretur, ad concretionem, ac fixitatem celeri gradu contenderat; Quodque idem ob prægressas Constitutiones annorum magna ex parte Australium id amiserat sui, quod illud poterat perenni actum in Orbem more tueri, absque prope impendenti exitio, ac iactura vindicare.

XXXII. Agebatur siquidem de sanguine, qui mole sua sibi metipsi erat noxa, ac detrimenti. Nullus hic proinde cunctationi locus. Timendum enim, ne dum Romæ confuleretur, Saguntus expugnaretur. Si qua in re periculum fecit mora, aut *Præceptis* commovente (1) *Hippocrate*, visa occasio fuit: In hac equidem illa eluxit maxime. Ipseque ego quod sancte assero nulli ex iis, qui per ea tempora ægotaverant, aut Arthritide, aut alio quopiam ex prænarratis affectibus, tum aliis plerisque diuturnioribus inauspicato cessisse huiusmodi præsidium meminimus, dummodo opportune administratum, dum præsens aderat indicans, ut Præfici ajunt. Ejus nanque erant huiusmodi omnes affectus indolis, ingenique, ut liquido gravitate peccanti morem gererent, cui haud lætius unquam, ac feliciore sfidere occurrere Ars novit, quam venæ sectione repetita, quousque ita ad solidorum libellam sese haberent fluida, ut restituta invicem præclara æquilibrii ac conspirationis lege, facta, tectaque res foret, supremum heu subitura prope discrimen! Cur vero lentore peccans

cruor meninges modo, modo fauces, oculosque, ac artus laceffat inermes, modo infantes aliquando pulmones, quod sapissime obtigit, haud ita implicata res est, ut Dædali ingenio opus sit ad id revelandum, demonstrandumque; Excelsa profecto magis eadem, ac digna Philosopho *originis principium* harum ægri-tudinum, quas præsens currentis anni Constitutio in Scenam tulit, tum earum genium, ac morem propius inquirere. Cur eadem Arthritides, quæ tam dire adeo crudeliterque superiore anno sub Principe ludente affectu militaverant diu, diversum ab iis, quæ modo per hyemem potissimum extulerant signa, toto cælo præsidium expeterent? Cur illæ spasmodicis cruciatibus molestæ magis, hæ nihil huiusmodi prætuleraut? Cur raræ hoc anno hysteri-cæ mulierum affectiones extiterant, quæ olim paucis pepercerant? Cur nullæ prorsus, aut vix paucae ephemerae visæ febres, aut diaræ, ut vocant, quartanæ, ac huiusmodi aliæ ægri-tudines cæteræ, quæ nullo non tempore proludere solent, tum ultro citroque ire nullius in servitutem redactæ?

XXXIII. Cæterum ab lentore sanguinis, tot omnes etsi discrepantes invicem ægri-tudines prodiisse ipse extractus è vena cruor colore, habituque aperte satis manifestabat. Quidpiam nanque instar pelliculæ, aut exilis membranæ in ejus superficie conspiciebatur, qua disrupta, viscosus, ac nigerrimus sanguis in fundo vasis supererat. Sæpe altera, ac tertia vice opus extitit sanguinem mittere, imperante morbo quantum demendum aderat cruoris, non equidem illius colore, aut habitu, ut adhuc plerique autumnat *Celsi* (2) autoritate suffulti, qui ait, cum sanguis profluat, colorem habitumque ejus attendere opus est; nam si is crassus, & niger est, viliosus est, ideoque utiliter effunditur: Quod quidem idem *Celsus* accepisse videtur ab *Hippocrate*, dum dixit in Pleuritide sanguinem esse mittendum, donec melior, aut ex nigro ruber appareat. Sane huiusmodi sententia, utut improbanda omnino non sit, reticere tamen haud possum hinc sæpe decipi Medicos; eamque nullo unquam in morbo curando satis esse constantem, aut sufficientem metam, & periculo non vacantem superflua evacuationis, aut suspitione diminutæ; Perinde ac vetustissimam alteram *Galen*i ævo percelebrem ad

(1) 1. *Aph. sect. 1.*

(2) *Lib. 1. cap. 10.*

ad animi usque deliquium. Habent id quæ à Majoribus tradita nobis oracula sunt cum cæteris rebus commune longa vetustate præclaris, ut illa frequentius in medium afferri soleant, quam recte intelligi, & convenienter usurpari. Non enim quia purus, aut quia mutatio in meliorem non fit, semper continuanda est missio; Neque quia mittitur, suppressendus est: Sed donec aliqua utilitas appareat, aut confertim, aut per vices educendus est, maxime in acutis morbis, & suo initio, quo, (si particulares sunt, ut Pleuritis, Phrenitis, Peripneumonia, Angina, & aliæ inflammationes internæ, quibus suppuratis necessario ut plurimum mors sequitur, aut etiam non raro suppurationem præcedit) dempta in tempore morbi materia, quæ in venis est, mature etiam cesset discrimen à morbo. Quod similiter in ardentibus febribus, & synochis faciendum est. Detrahendus scilicet sanguis non sumpta meta à colore, & substantia ejus, sed à morbi magnitudine, statu, & Patientis viribus. *Leonard. Bottallus de curat. per sang. mission. c. 27.* Nihil sane Artem Medicam æque conjecturalem facit, quam medicamentorum quantitas, quæ, ut habet *Galenus* (1) *neque dici, neque scribi, neque definiri omnino potest.*

XXXIV. Detrahendus vero statim aderat sanguis, ac febrilis Scena exordiebatur, aut præfatæ particulares ægitudines proludebant; Ut desistendum illico, ac conicere erat patrem fore Naturam obeundo certamini. Hæc meta, is scopus erat mittendi sanguinis, *servare vires.* Equidem raro ullus gravissimus morbus, ut Cynanche, Peripneumonia, Phrenitis, Febris ardens, cujus forte genium prætulerant exortæ Autumno febres, ne quid de cæteris dicam, non citissime, & felicissime curantur, dummodo opportune convenienti remedio illius succurratur. Atque hanc utique opportunitatem, seu occasionem aut tempus conveniens albo signandum lapillo iidem morborum motus indicabant, potissimum quidem per horum initia, sæpe etiam sub eorum decursu, aut illis jam ad exitum properantibus. Nulla nanque expectanda unquam remissio febris, quæ si obtrigerat aliquando, haud læti ominis erat; Nullus hic advocandus dierum numerus,

aut exoranda Crisis. Ejusmodi quidem aderant exarata ægitudines, quas ipse olim *Galenus* (2) tradiderat, in quibus nihil tale quidquam attendendum aiebat, imo *quocumque die mittendi sanguinis scopum in laborante invenoris, in eo auxilium illud adhibendum.*

XXXV. At urget, ajunt hic loci quam plures, urget in hac parte, *Celsi* sententia dicentis (3) *quod si vehemens febris adest, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est.* Fateor id ego quidem, nec quidquam Magni Viri laudi demptum velim unquam, quem ego tam præstantem doctrina fuisse reor, ut paucos ei anteponendos Latium protulisse censeam: Atque is forte Magnorum Virorum instar multa maluit seris Nepotibus in obscuro relinquere. De his proinde suspicari fas est locutum esse febribus (4) *purissimum Scriptorem*, ac prope dixerim (5) *Medicorum Deum*, quæ certam observant intermissionem, aut saltem per vices impetum remittunt, etsi semper durent. *Intermittentes* illa dicimus, has *continuas remittentes*; Quamvis etiam tunc vel in ipso impetu majore febris nocere unquam, sed potius juvare venæ sectionem compertum sit.

XXXVI. Secus equidem censendum de iis, quas *Causas*, seu *Ardentes* vocant, ob frequentiam, discrimen, samandique laborem funestas sæpe: Cujusmodi aderant, quæ Autumno primum se se prodiderant, ac toto fere Anni decursu ultro citroque oberrarunt. Et sane aut *samulante Natura* brevi solvebantur copiosa narium hæmorrhagia, ut plerisque eo tempore obtrigit, aut eadem *Natura Duce*, opportune celebrata Phlebotomia quam citissime per initia, atque in ipso earum impetu jugulabantur; Secus aut ultimam rebus jacturam celeri nece attulerant, aut in diurnos affectus diros admodum, ac graves quanquam minus calamitosos abiere. Quibus postremis quidem nihil præsentaneum magis, aut opportunius unquam, quam sanguinis detractio; Atque hæc quidem per hyemem, Autumnūque. Orto autem jam Vere in Peripneumonias desiere lethales prorsus. Hæc nanque ut mox addam, aut velox induceto Sphacelo fatum, aut lentam ægitudinem facta suppuratione tule-

(1) *Metb. Med. 7.*

(2) *Lia. de cur. rat. per sang. miss.*

(3) *Lib. 1. cap. 10.*

(4) *Vossius de Vir. sermon. 1. cap. 16.*

(5) *Casaub. ep. 29.*

tulere; Cui imminenti exitio, antequam scilicet sive Sphacelus, sive abscessus prope esset; nil præstantius unquam docuit Ars, quam sanguinem demere lato vulnere, ac repetitis vicibus, dum vires ferant. De febribus loquor, quæ ab *fluxu cruoris* proficiuntur, cujusmodi potissimum aderant, quæ exarata Constitutione viguerant, iis fere consimiles, quas tum olim *impetuosas* vocaverat memoratus *Galenus* (1), quasve idem proluxa sanguinis missione sæpissime, subque ipso earundem impetu, exortu, ac incremento jugulasse fatetur. Hosce inter, quæ copiosa narium hæmorrhagia morbum absolvit, pueros præsertim hac ope servatos vidi. Adulti vero, aut proveciores ætate Viri, quibus id copiose minus contigit, haud pauci in Arthritides, ac Hemicranias incidere graves admodum.

XXXVII. Nec citra operis pretium fore puto, si quod accidit mihi vidisse, hic enarravero, quod ad exaratos affectus, qui una cum ardentibus febribus longe lateque sævierant, præsertim attinet, atque Arthritides potissimum, tum Hemicranias. Anginz enim, quæ novo repente exorto frigore faciem præbuerant cæteris, brevi constitutos sibi fines persolverant; Adque primos mitiore flamine adspirantium ventorum flatus omnino desierant. Utque ab Arthritide initium feram: Ejus hæc aderant moris ut Vertebrarum tractum, tum anteriorem Thoracis partem, ipsasque adeo Costas, earumque interstitia lacefferent magis, quam Illia, extremosque Artus. Præcipuus namque hic hudebatur Tragœdiæ Actus, cum maxime haud convenienti tempore, aut vana remedium farragine orientibus malis succurrebatur. Plures seseclerat nempe consuetus hujusmodi ægritudinum mos; stupebantque admodum cum eludere illas cætera quæque usurpari Præclicis solita remedia videbant, ac contumaciores effici, delato mox ad universos Artus Malo, quod hanc primo, aut illam tantummodo partem occupaverat; quodque præcavere utique poterant præstantis auxilii genere, quod ludentis morbi indoles initio suaserat, suadebatque adhuc pari securitate, ac fiducia.

XXXVIII. Hisce artibus affini meo, cui dira Arthritis hos modo, ac illos artus crudeliter divexabat, opem attuli, ac incolumen illum citius sorte, quam ipse sibi spem

fecerat, reddidi. Huic sub finem hyemis febris occurrit, quæ tertio die mirius lacefferet statim cœpit: Atqui ferus universam Spinam, imaque occupans præcordia, mox ad omnes fere artus delatus dolor acerbiorum inutiles ægritudinem, cui frustra lenientibus, purgantibus, diureticis usque adhuc opitulabatur. Rogatus ego, malorumque origine, ac successione sedulo explorata, iussi sanguinem, detrahi ad uncias decem; Dietam quod attinet, juscula hordeacea, avenacea, panatellam, atque ejusmodi alia de more præscripti, tum ptisanam ex hordeo, ac rad. liquiritiæ, acetosæ in aqua fontana incoctis, pro potu, ac denique *Sydenhamii* consilio, ut æger per aliquot horas singulis diebus lecto sese abstineret, præceperam, cum calor jugi decubitu, ut citatus Author ait, morbum sæpe promoveat, intendatque. Die sequenti sanguinis tantundem detrahi jusseram; mox tertio dein, ac ultimo, uno alterove die interjecto. Plerisque memini quarto, ut plurimum, venæ sectionem hujusmodi affectu ægrotantibus nunquam infelici exitu adhibitam; Raro tamen obtrigit ultra quartam vicem venam incidisse, nisi vel regimen iusto calidius præcesserit, vel medicamina calidiora ægro præter necessitatem fuerint exhibita. Paregorica, sive *anodyna* quæque valere omnino iussi, ut sæviret dolor. Noveram enim illorum usu morbum magis figi, neque tam facile dein venæ sectioni cedere, quæ ideo ob hæc ipsa medicamenta officiose nimis exhibita sæpius quam par erat opus, celebranda fuerat aliquandiu. Neque enim arbitror eam illa, quam titulo pollicentur, *analgesiam* præstare. Mirum equidem, ut his rite peractis, mox potione cathartica è lenitivis exhibita ægri dolores imminuti fuere, quo tandem resarcita, quam fecerat sanguinis detractio, jactura virium, Veris beneficio quod opportune occurrerat, omnino evanuerunt.

XXXIX. Arthriticos alios quamplures novi per ea tempora diris cruciatibus divexatos, quibus ortum, ac incrementum prægressa febris contrario modo, ac postulabat, tractata, hoc ipso more feliciter sanatos. Nec atrociter minus sæviebant Hemicrania, quæ modo una cum febre, comite modo etiam absque febre subludere videbantur. Harum magna pars copiosa effusione sanguini-

(1) *Metb. Med. cap. 4.*

guinis, sponte è naribus oborta ludere desit extemplo. Huic prope erupturæ, aut pleno erumpenti alveo prælusit sæpe hærens diu, qua Sagittalis Sutura per capitis longitudinem recta pergens supra coronalem ad angulos æquales incidit, ferus dolor, profiliante sanguine paulatim desinens. Pluries hinc mihi animo subit, num eligenda forte in hoc affectu curando peculiaris vena tum origine, tum vicinitate præclara, quæ opus feliciter magis absolveret; Occurrebant ejusmodi plures ad Tempora potissimum, media in fronte, secus Aures, ad Nasum, ac Jugulares præsertim, quæ iis omnibus ortum præbent. Atque ab hisce quidem tuto fuit auspicia desumere, sive quod pleniore fluento, quod unum expectabatur magis, exitus concedebatur cruori, sive quod ab Jugulari, tum externa, cum interna, citior aderat expectanda *Derivatio*, quam tum Revulsio, ab reliquis memoratis venis, quæ illius propagines sunt. Evicit inquam præceteris Jugularium sectio, ac magnum fuit periclitantibus subsidium. Visus namque illico mitescere capitis dolor, ac fere penitus desinere; Nonnullis, quibus id præsidii experiri, horroris erat, etsi nihil omnino fuerit extimescendum, affixæ Temporibus hircines haud imparem attulere opem, etsi modico velociter minus, ac in ipso præsentis discriminis articulo opus aderat, quod unice sperari poterat ab apertis Jugularibus. Consultius erat huic sanguinis missionem præmittere è Brachii vena, aut si urgeret opus, è longinquiore altera in Pede. Hæcque methodo haud paucis quos atroces hujusmodi Hemicranie dire vexaverant diu, pene extemplo subventum est.

XXXX. Cæterum ne ultra supraque quam sit æquum in his moram faciam, meminisse lubet peculiaris cujusdam mirum in modum ludentis Hemicranie hisce artibus feliciter curatæ. Jurisconsultus, qui in ea Urbis parte habitabat, qua supremum Arcus Propugnaculum eminet ab *Emanuelæ Philiberto* olim ad Regni tutelam, defensionemque excitatæ, ac novis subinde munitionibus, cuniculis, aggeribus, operibusque tum à Successoribus Ducibus, tum ab Invisissimo Rege VICTORIO AMEDEO instructæ, quibus obsidentium Gallorum superioribus annis impetum elusit ac vim. Is inquam cum summo quodam mane ad forensis Palestræ negotia obeunda è lecto surgeret, gravi admodum capitis dolore vexari cæpit in sinistra parte ad Tempora usque:

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

Quem quidem haudquam magni fore momenti gratus ad plures dies æquo animo adversam valetudinem invictè sustulit. Quousque tandem cum mihi quadam die forte fortuna haud longe à foro occurrerit, auxilii à me quidquam rogavit lubens omnem mihi referens mali historiam oppido raram. Narraverat enim se hora circiter octava matutina alternis diebus hujusmodi dolore perquam acuto corripi, qui ad quartam usque Pomeridianam perdurabant, quo tempore collecto animo, ac re omni composita sese paulatim recipiebat, adque consueta sibi munera redibat, ceu nihil hujusmodi obtigerit unquam. In ipso autem aditu Paroxysmi, ut ita loquar, magna Capitis gravitas proludebat futuri prænuncia doloris, exeunte vero paroxysmo, quod præcipue etiam adnotandum subit, modico sudore persusa Tempora aderant, quo doloris Sæna terminabatur. Addiderat sibi ab Amico propositum Occipiti admovendum vesicatorium, tum ano Hirudines, quod utrumque præsidii genus experire ait sibi vetitum hætenus à gravi, quo premebatur, rerum onere; Se tamen jam modo negotiis omnibus valedicturum prorsus, nec amplius perpeti diutius posse Mali acerbiteratem. Quamobrem omni cunctatione abjecta sanguinem detrahi jubeo è Brachio, mox altera vice intermissionis die lato vulnere è Jugulari sinistra, quibus ac balnei usu, sorsus, diluentium, quiete, ac æquiore victus ratione, brevi convaluit. Idem Pistoris uxori contigit, juxta Sacram *Divi Dominici* Edem, Bibliopolæ filio septenni, propter *Turrim publicam* excelso vertice præclaram. Mercatori ditissimo prope Templum *Divi Rochi*; Adolescenti Juris studioso in vico *Divi Thomæ*; ac plerisque aliis quibus recensendis haud immoror. Neque enim huic persolvendo numeri tempus suppetit.

XXXXI. Sanguinis ex Jugularibus mittendi mos est satis antiquus, utcumque inter paucos obtinuerit, de quo si perbrevis historia præmissa sit, haud illam puto legentibus fore injucunda omnino. Sunt, qui *Galenum* secuisse Jugulares tradunt; Ille tamen, ni fallor, non sectionem ipsam imperare videtur, sed si casu aliquo secetur, curationis modum præscribere. In *vivorum Anatome*, qui sane perridiculus liber est, & ab Arabo quodam, ut videtur, confectus, atque adeo perperam *Galeno* adscriptus, Jugulares aperiri jubentur in principio *Lepre*, & *Angina*, angustique anhelitus, in *Asthma*.

Bbbb

te acuto, in raucedine vocis, in abscessu Pulmonis, in spirandi difficultate, & in Splenis, & laterum morbis. Eadem prope memorat Sorani Ephesti introductio: Sed cum hoc itidem opusculum plane commentitium sit, tumque Caelius Aurelianus, qui se in omnibus fere Soranum sequi proficitur, de hac re omnino fileat; nihil hinc quod ejusmodi Medicinæ antiquitatem probat colligendum est. Sufficiet itaque has venas secandi origine (1) ab Alexandri Tralliani temporibus repetere, qui Jugulares à se sectas esse scribit, maximeque profuisse. Hanc ut quibusdam familiarem ævo suo curationem refert (2) Actuarius, quam itaque in Catoche, & Phrenitide deprædicat. Eam in omnibus morbis capitis adhiberi jubent Arabes, neque in iis solum, sed in Lepra, acutisque Thoracis affectibus: Unde forte consuetudo illa ad Ægyptios manavit, quem apud eos etiam tum, cum Alexandriæ esset, viguisse perhibet, oculatus Testis Alpinus: Post Arabum tempora nisi in Bertruccio, & Arnoldo Villanovano, qui hoc ex iis ad verbum exprimunt, (uri fere ex Græcis Arabes) vix ulla est de hujusmodi venæ sectione mentio, donec anno circiter 1500. Anatonies studium pene intermortuum revocavit Jacobus Carpentis, modumque incidendi Jugulares fuscè descripsit. Quo quidem sæculo à pluribus pleno ore laudatur hoc curandi genus; Sed longe absuit, ut in consuetudine venerit; Quippe Botallus, qui circa annum 1570. scripsit, diserte dicit, se neque hoc unquam à Medico præscriptum, neque Chirurgo tentatum vidisse, adeoque aut nunquam in usu fuisse, aut esse tum penitus exoletum: & quanquam ipse primus venæ sectionis usum in Galliam induxerit, venamque quamlibet in quocumque ferè morbo secuerit, fatetur quod in jugularibus id experiri minime ausus sit, reformidans (3) ne propter illius magnitudinem, & magni trunci vicinitatem non satis cito, neque tuto sanguis cohiberi possit. Imo Riolanus Pater, qui recens à Botalli ætate fuit, de Apoplexia locutus in hæc verba prorumpit, Jugulares ausi sunt quidam secare pro extremo remedio. Etiam Fabricius Hildanus, qui Ophthalmiis, Hemicraniis, cerebrique

inflammationibus hanc à se Medicinam cum efficacissimo subsidio sæpius adhibitam esse prædicat in Epistola, quam (4) ad Dorinium 1614. exaravit, perpaucos tamen Medicos, qui sectionem harum venarum approbarent, sibi innotuisse scribit, eamque periculosam agnoscit, nisi expertus a fuerit Chirurgus. Quinimo in scriptis eodem anno editis Julius Gualtavinus Professor Pisanus, has venas non sine periculo secari posse pronuntiavit. Ita plerosque ab hoc auxilii genere deterritos fuisse constat, sive quod Jugularium vulnera aliquando lethalia observaverint, perperamque sibi persuaserint idem ex earum sectione eventurum; Sive potius, quod ut sæpe fit, facta hæc à manu imperita sectio, parum feliciter cesserit, notamque infamix experimento inusserit. Hoc nimirum usu frequenter venit, ut quod remedium genus ignorantia semel notaverit unius inscitia, dignitati suæ vix restituere queat scientium universa consensus. Utcumque vero ea res se habuerit olim, nullum est in Historia Medica exemplum, ubi rite peracta sectio aliquid attulerit mali: Imo sæpissime usus ostendit morbis compluribus, atque iis præsertim, qui caput attingunt, nullo modo melius succurri.

XXXXII. Quod quidem, cui scilicet fundamento innitatur facta in capitis, ac cerebri potissimum morbis Jugularium sectio, tum hujusmodi venarum, tum arteriarum, quarum ope sanguis per cerebrum, ac caput ultro citroque com meat structuram, ex distributione penitus ex Anatomicis delibanti cuique facili Marte elucescit. Enimvero Jugularis vena vel externa est, vel interna: Quarum hæc multo grandior uti eam post Nicolaum Massam (5) accuratissime descripsit Fallopius (6) licet in Brutis, à quibus harum venarum figuras apud Vesallium (7) expressas habemus, contrarium prorsus reperiatur. Externa ramusculi extremi ab ore, à faucibus, à facie, ab oculorum tunicis, ab universa denique capitis cute atque musculis nascuntur. Interna, quæ multo altius delitescit, quanquam aliquando partibus jam memoratis furculos aliquos impertiat, ad imum cranii recta assurgit; inque duræ matris sinus laterales immergitur.

(1) Lib. 4.

(2) Lib. 3. cap. 1.

(3) Curat. per V. S. cap. 40.

(4) Censur. 4. 14.

(5) Introd. Anat. 63.

(6) Observ. Anat.

(7) Lib. 3. 7.

tur. Ita ut jugularis externæ propagines extremæ, arteriæ Carotidis externæ ramis inferantur; Interna itidem Jugularis, ac Carotis interna vasculis duræ matris intervenientibus jungantur, ac confluant. Sepæ etiam vidi utriusque venæ ramos aliquot opposito tramite, externæ scilicet ad ima cranii, internæ ad maxillæ glandulas, ad fances, atque externas quasque partes deduci; Quod à nemine usque adhuc, præterquam à prælaudato *Fallopio* visum, compertumque ego quidem superioribus annis coram Chirurgis Taurinensibus in Theatro Anatomico, cum ibi jubente, ac annuente Rege Prælectiones Anatomicas, altera vice haberem, attentius hujusmodi venarum distributionem inquirens apertissime ostendi. Jam tum scilicet alte infederat animo hujusmodi auxilii genus ad praxim utiliter revocandum aliquando.

XXXXIII. Equidem Artis cum sit Naturæ ductum sequi; cumque sanguinis è naribus eruptio (ne extra oleas digredi videar) uti maxime naturale, ita præsentissimum nuper visum fuerit vitæ præsidium: Conspicuum erat in hujusmodi rerum angustiis nihil præsentaneum magis fore quam easdemmet venas, aut ex eodem derivatas alveo aperire. Quænam autem scalpello tam opportune aderant, quam ipsæ (unde cæteræ omnes per caput dispositæ exoriuntur) *Jugulares*? Sive revellendi, sive derivandi gratia incidi illas opus sit. Utrumque enim horum assequi earundem sectione fas est. Quod sane etsi Paradoxum videri queat nonnullis, docte tamen, ac scite admodum recens perfolvit Vir doctissimus (1) in *aureis de Febris commentariis ad lib. 1. & 3. Epidem. Hippocratis*. Est namque ubi derivationis loco, ut ubi Revulsionis causa hæc aliquando obtingit secare venas. Quæ quidem vocabula, licet satis antiqua sint, tamen nemo unquam intelligere poterit, nec proinde secandi leges in alterutro genere recte statuere, nisi accesserit accurata de vasorum structura, motuque sanguinis cognitio. Hocque verissimum esse facile agnosceret, qui Scriptorem qualemcumque ante offensam sanguinis circulationem, atque adeo *Harucii* ætate superiorem perlegerit. Neque alia, ratione Saphenæ sectio modo *Menses* deducit, modo eadem inconsultius

facta eosdem potenter supprimit: æque ac medicamenta discutientia, quæ tempestivius ahibita tumorem prorsus dissipant, serius admota excitant, atque attollunt, & in Pus demum resolvunt.

XXXXIV. Derivando equidem magis quam revellendo præstitam nuper ab hisce opem novimus; Usus nanque, & ratio ostenderat, prius tundendam fuisse in brachio, aut in alia quapiam parte venam quamlibet, quam *Jugulares*; Sic enim humorum impetu, atque ardore jam elanguescente enata ad extrema vasorum obstructio revellentibus labefactata levior tandem negotio derivantibus funditus tolli poterat; Eadem plane ratione ac tumoribus cum inflammatione subortis occurrere Practicis mos est, præmissis scilicet ex alia parte longinquiore revellentibus, antequam derivantia adhibeantur. Hinc in illustri illa historia quam de gravi Oculi dextri inflammatione ad hunc modum sanata narrat memoratus *Hildanus*, primo die vena in brachio dextro secta dicitur, proximo exhibitum Catharticum, tertio demum Jugularis aperta. Eodem fundamento nititur consuetudo illa, qua ingravescente Angina post revellentia felicissimo successu Jugularem internam circa inferioris maxillæ angulum incidimus; Neque enim irrisione tam dignum est, quam *Calio Aureliano* (2) videtur, quod de venis mammariis in eodem morbo secandi scribit *Hippocrates*; (3) Nam & istæ quemadmodum primus docuit *Fallopius* (4) originem aliquando a Jugularibus ducunt.

XXXXV. Sive autem Jugularis interna sive externa sit, sive temporales, sive aliæ quæpiam hisce affines venæ perinde est. Usus quidem edocuit citius, securiusque rem absolvi apertis Jugularibus, in quas tanquam in communem alveum omnes illæ venulæ exonerantur. Tutius forte etiam, ac citius temporalium arteriarum sectio idem perolveret, propter eum, quo sanguis effunditur, impetum, si modo pleno flumine exiliat. Atqui hæc sectio, ut feliciter cedat, non nihil difficultatis habet; Etiam aliquando cum periculo sit; Quare vix auserim eam in medium asserre, nisi hujus olim *Galenum* meminisse noverim, ejusque absolvendæ modum tradere. Secuisse olim arterias, idque satis frequenter Veteres con-

Bbbb 2

sue-

(1) Jo Freind. pag. 23. comment. 2.
(2) L. 3. 4.

(3) De Morbis 3. 11.
(4) Observ. Anat.

suevere; consuetudinemque eam ita apud Aegyptios invaluisse scribit *Alpinus*, ut has illi haud rarius, quam venas scinderent. Nuperrime memini Præclaram Vestalem, cui diuturna Ophthalmia laboranti pleraque passim adhibita fuerant præsidia, nullo aut vix exiguo prorsus levamine, affixis tandem me iubente *Temporibus* hirundinibus mira celeritate restitutam. Harum quippe altera cum se se ita arteriæ Temporum forte fortuna agglutinauerit, ut vix inde auferri posset, plurimum effudit cruoris magno impetu profluentis, quive agre admodum cohiberi, nec absque magno labore potuit. Huic revellentia quæquæ, tum cætera Artis subsidia, quorum prolixam seriem ferunt Prædici, diu ante usurpata postremo huic præsidio adhibendo illuxere. Nec longe quidem ab huiusmodi auxilii genere abluunt institutæ aliquando in vetustis huiusmodi affectibus scarificationes juxta ima, atque ad eorundemmet oculorum latera, tum prope summitatem Nasi, qua ejusdem vena ignoto plerisque tramite pergit. Antiquissimum id erat præsidii genus, cujus ratio & modus unam habent universalem causam, nempe ut pars, cui infliguntur, exoneretur. Venulæ quippe plures vix conspicuæ sub universa cute feruntur, quæ hoc more sectæ celerem aliquando opem præstiterent, quam vix sperare erat ab alia quapiam majoris venæ sectione; Sive quod illæ arteriarum finibus propiores sint, sive quod arteriolæ pariter, quibus summa instructa refertaque cutis est, una invicem scindantur, incidanturque; sive quod ibidem, in exilibus nempe vasorum meatibus, ac prope eorundem fines lentescere, primo incipit cruor, dirarum hinc sæpe aggritudinum ortus, ac incunabula. Quoad administrandi modum, duplex is est apud *Oribasium*; vel enim *Catà Pblighin* fit, idest verberatim, & punctim, vel *Catà Sirmon* h. e. pertractum, & cæsim, qui postremus modus magis in usu *Italæ* est. Atque hæc quidem ad Aequinoctiumque gesta.

XXXXVI. Haud lætiora minus extiterant initio Veris. Orientales nanque, ac Boreales invicem diu ludentes venti ad aliquot dies adhuc dire perflarunt, silente tum temporis, suaque in claustra recepto Austro. Erupit is tandem leviter, perque totum deinde quod superat Veris reliquum, ac Aestatem mitissimo flamine perspiravit, ruente vicissim per intervalla Borea, cujus gelido afflatu sæpe repente visa recurrere me-

dia Aestate hyems. Consuetudo hinc nivalli vellere defraudata tellus, inopes aquis fontes, infesta præmature rubiginis vestigia; magna ubique siccitas, ac perturbatio rerum. Rupicapras ipsas, quæ silvestris, & montana Fera est summa Alpium fastigia perpetuo inhabitans specie ac mole vulgaris Capræ, sed paulo celsior cruribus, quam esse solet caprinum genus, per subjectam planitiem excurrere assertum propter inopiam lympharum. In animalis hujus ventriculo reperiuntur sæpenumero globuli quidam adeo cardiaci, & alexicaci, ut lapides Bezoardicos virtutibus longe antecellant, si credimus *Veschio*, qui peculiarem de iis scripsit tractatum titulo de *Ægagropilis*. Sæpe quidem Aprili mense exigua visa pluvia, at quæ vix Colonorum votis sufficeret; Quo usque tandem Majo uberius pluit, novaque, ac lætiora rebus affulsit spes. Kalendis Junii hora quarta circiter pomeridiana, nitido existente Cælo, Sol visus exemplo coloris fere cuprei, quo usque occiderit penitus; Sequenti die ater idem præluxit ad octavam usque horam circiter; Mox fragores auditi protinus, ac horrendis tonitribus circumstremere, ceu disruptis nubibus Cælum. Aestas hinc temperata successit, ac lætissima prorsus si procellis commota minus extitisset, aut furentium ventorum immodicis flatibus. Nunquam enim majoribus grumis grandinare perspectum, frequenterque adeo ab omni parte Cæli emicare repente fulgura, nunc intermittente luce, nunc condita. Sæpe etiam fulmina cecidisse visa, hucque ac illuc ludendo prorumpere. Appetente Autumno Grues ingenti exercitu aëra ad plures dies obumbrarunt. Ferri autem hæc videbantur magnis itineribus ab Oriente ad Occidentem, sublime editeque admodum, ac cum silentio volantes, quod serenitatem prælagire ajunt, secus ac si obstreperis vocibus frequentiores susurros excitent. Pulchrum erat integras cohortes cernere modo in cornua divisas, modo in unum collectas triangulum efficere circumeunte Duce, ceu exercitus præside, ac Rectore. Visa & Avis quædam Subalpinis ignota, subnigra rostro, subrubra pectore, subflava alis, subviridis pede, mole Turturis instar, *Garrulus Bohemicus* dicta *Gesnero*, de quo mira scribunt, tam quoad internam viscerum constitutionem, quam quoad ingenium; Rectius forte *Rubicella*, seu *Pyrehula*, aut *Ampelides Aldrovandi*. Serius quam olim adve-

advenerant Hirundines, tum serius etiam descessere. Insecta quod attinet, horum numerosam adeo extitisse progeniem haud meminimus, unquam, ac eorum praesertim, quae *Coleoptera*, seu *vaginapennia* nuncupantur, quod alas suas velut in vagina recondant; Hæc inter novum quoddam spectatum animalculum albis nigrisque maculis tam pulchre variegatum, ut Vestem Damascenam Phrygia acu intertextam jures. Medio Vere, cum florescere primum coepit frumentum secundarium, (*Secale vocant Nostrates*;) summo illud mane exoriri perque aëra vehi denso examine visum; Vespere dein sese super spicea ferta colligere, ac mori infesto prorsus aculeo; Hæc nanque cernere sequenti mane exusta prorsus, ac fere absumpta. Odore terretimum aderat; Forte *Scarabæus minimus*, seu *Fullo Charletoni*, si molem, ac vestem vario artificio fulgentem spectamus: *Ephemeri* vero species potius, si vitæ illius brevitatem respicimus. Erucarum ac Bruchorum magna soboles; velox interitus, ut & animalculi cujusdam viribus summe infensi, *Italis Taliadizzo*, Græcis *Ips*, ab *Ipto*, i. e. *Blapto*, *Noceo*; Quia proprium ejus est in vitibus versari easque erodere; Hinc vini proventus modicus, cui tamen tum aëris forte, tum ventorum sævities, ac inclementia haud parum tulit. Vox paucæ per Æstatem obstrepere auditæ Cicadæ. Subdulce mel, & subaquosum. Fœni exigua perceptio; Serici haud ingens; Copiosior Tritici. Hocce in horreis collecto sobolescere visa insecta quædam non alata illius summitates diro spiculo depascentia instar Teredinis. Toto deliquit anno Mercurius, nec unquam visus ultra 20. lineam ascendere, ceu constitutam sibi metam, ultra quam peragere vetitum.

XXXXVII. Ad Morbos venio, qui reliquo hocce anni decursu subluferant. Hos inter Variolæ visæ extemplo, adque primos Ventorum Meridionalium afflatus proludere, perque universum agrum errantis in morem hucilluc divagari, haud exiguo percussis timore. Civibus, eam nempe, quam hæc superioribus annis ediderant cladem, adhuc dum animo expendentibus. Vix auferant illæ tamen Suburbia ipsa, nedum Urbem attingere. Citius etiam quam credebatur, se se subduxerant; Nec diræ adeo, atrocesque, cujusmodi extiterant olim. Insolentius quidem intra Urbis mœnia debacchabantur recens ortæ ægritudi-

nes, quæ sane etsi diversæ ab iis primo intuitu viderentur non nullis, quæ exacta hyeme, ac Autumno sævierunt, haud absumile tamen ingenium, irascendique morem præbuere; Quod rem attentius consideranti facile erat decernere. Enim vero vix mitior arriserat Veris Constitutio; Vix leniores perflaverant Ventî, ut illico erumpere visæ foras pleno velut agmine Pleuritides, rectius forte *Peripneumoniæ*, atque una simul ruere iis comites assiduæ febres, ardentisque. Sæpe etiam caput attollere videbantur Erysipelata, hosque ac illos indiscriminatim laceßere, at ludentis instar potius: Aut enim præludere hæc exaratis affectibus, aut iis obsequi magis, quam sibi quidquam addicere, perspicuum erat. Lulus illa revera aderant, quibus morbifica huc illuc pergens materies, aut jam forte vitalia claustra obsidens, etiamnum incautiores fefellerat. Præcipue enim hosce inter rerum fluctus metuendum erat de virali Theatro, ubi dein ceu ablato Sipario postremus plerumque ludebatur Tragediæ Actus. Id unum solerti prudentique Viro prævidendum erat, ac totis viribus enitendum maxime, ne fracto aggere ad pectus illaberetur errabunda materies, vel illabens illa, aut jam fortasse elapsa, quam citissime illinc revocaretur. Hæ Medico erant artes, quæ vindicanda, ac servanda erat res.

XXXXVIII. Et sane de iis tuendis potissimum partibus agebatur, a quibus prima vitæ stamina profiscuntur. Huc tota Belli moles incubuerat; Huc pugnae locus, huc prælii campus, huc denique rerum summa gerebatur, heu funesto plerumque exitu. Nunquam frequentiores obviæ vomicae, ac dira pectoris mala. Quodve mirere magis, cernere erat haud paucis vomicam pene ex abrupto sese prodere nulla proludente febris, aut alio quopiam signo, quod sæpe latens intra præcordia quidpiam prænunciare solet. Non nullis vis una, ac altera febris accessio præcessit Plerisque anxietas maxima, febris acuta, Tussis, sæpæ etiam dolor lateris punctorius, pulsus mollis, velox, ac inæqualis, præcalidus spiritus, seu ingens inspirando fervor, sputa per initia liquidiora, cruenta, foetida, lingua urens, turbata alvus, sanguinis stillæ e naribus extremorum frigus. Hæc prior mali Scena, cui nisi initio statim occurrebatur, inevitabile erat inducso velociter Sphacelo satum; Sæpe hinc congesto in parte aliqua pectoris pure, Vomica tandem in apertum suo tempore

pore prodibat felici plerumque omine. Quamplures hac via per ætatem læta suppuratione evaserunt.

XXXIX. Atque hinc luce meridiana clarius patet, quam falso Pleuritidi nomine id mali genus tum temporis indigitaretur. Siquidem nec *Tussis* nec *sputorum excreatio* inter signa, quibus secernitur Pleuritis, recensenda minime veniant, quæ potius ad alium morbum huicque in multis dissimilem *Peripneumoniam* nimirum pettinent. Mirabar ego Celebriores Viros in hunc errorem incidisse, hancque pectoris ægritudinem, quæ nihil commune habebat cum Pleuritico affectu, Pleuritidem nullo discrimine appellitari. Hinc tot audite per Urbem sævire Pleuritides, quæ æquiore jure Peripneumoniarum dici debuerunt. Aderat & perennis altera, ac constans harum nota, quæ nullo modo Pleuritidi unquam competit: *Magnus scilicet in spirando æstus*, ob turbatiorem ac magis festinatam respirationem, oppressis magno onere Pulmonibus. Scio inventa Præclicis vocabula quædam, quibus id ipsum explicant; Ast si fas est, quid ipse sentiam, aperte dicere, asyla hæc potius sunt ignorantie Medicorum, atque eorum quidem; qui ut recte olim agebat *Verulamius*, *fingunt simul, creduntque*; *Neque unquam nobiliores animos erexere*. Quantum vero conferat in re Medica præsertim rem unam ab alia secernere; Quantum inde Artis laudis, ægris emolumentum accedat, nemo non videt? Legitur apud *Dodoneum* historia Peripneumoniarum popularis, quæ tunc temporis, annis nempe 1557, & 1565. grassata est, huic nostræ haud absimilis: Atque is quidem ad extremum narratiunculam suam sic claudi, quod scilicet *morbum hunc non Pleuritidem, sed Peripneumoniam fuisse mortuorum corporum dissectiones coram ostenderant*; & hoc utique innuere modeste videtur Vir Doct. Medicorum sui temporis errorem, qui forte eo tanquam de Pleuritico affectu iudicium fecerant.

L. Nec difficile quidem erat conjicere, vel ab ipso unice pulsus nihil hujusmodi ægritudinem affine habere prorsus cum ea, quæ a Pleuræ inflammatione oritur etsi *Tussis* adfuerit, ac dolor lateris punctorius. Nunquam enim aut saltem compertam paucis memini pulsuum duritiem, quod quidem ultimum inter proprietatis notas malum reponere, quæ Pleuritidi conveniunt, quam cum *Galeno* Tussim. Cujus sane sententiam uti sapius data opera aspernari, & respue-

re hominis esset valde arrogantis, ita in omnibus sequi velle, superstitiosus est. Neque enim Authores in Medicina facienda, sed rationis momenta querenda sunt. Confusa hinc ac implicata, & a veteribus, & a recentioribus tradita huc usque est utriusque hujus morbi descriptio. Etenim si veterum scripta perlegimus, hi quidem eos inter se distingui scribunt, sed easdem utique notas affigant; Idque facile animadvertere licet, quod quæ apud illos de Pleuritidis caractere habentur, ad Peripneumoniam meliore jure referenda sunt. Recentiorum vero plerique vix ullum inter hos morbos discrimen ponunt, gradu tantum dissimiles esse volunt. Nonnulli etiam Pleuritidem dari haud contendunt, quæ Peripneumoniam non habuerit conjunctam, ac vicissim inflammari haud posse pulmones, in fonte Pleura; Quod tamen & ratio & historia Medica falsum ostendunt. Multa namque Pleuriticorum cadavera secta sunt, in quibus Pleura corrupta integro Pulmone repperita est; Secus quidem si una cum inflammatione Pleuræ vitium quoque in Pulmonibus, sive quod idem redit, Peripneumonia adfuerit, cujus utique, ut quæ toties dicta sunt, iterum repetam, cujus inquam propria, minime eminentia signa sunt una cum acuta febri *Pulmonum gravitas*, *Tussis*, *sputorum excreatio*, atque *ingens in spirando fervor*; Illius vero, Pleuritidis nempe, *anbelitus difficilis*, *pulsuum durities* (Quod caput est maximum,) *Febris*, *pungensque ac vehemens lateris assiduus dolor*. Equidem nedum magna, sed omnis, ut ita loquar, Medicis lux ab Arte Anatomica petenda est, qua morborum plurimorum, & proprias Sedes eruere, & signa legitima secernere queant. Eam ob causam factum arbitror, ut *Celsus* elegantissimam illam humani corporis descriptionem curandi præceptis inferuerit: Utque eadem vestigia persecutus breve quoddam de partium structura commentariolum morborum Historiis præmiserit *Aretæus*.

LI. Et sane tota hinc, ausim dicere, pendet curandi Ars: Ut enim in Pleuritide liberior sanguinis detractio sola sæpe absque alio quoquam subsidio morbum absolvit; & hæc quidem, at majori circumspeditione instituenda & inflammatione Pulmonum est, cui oleosa omnia, quæve ad sputa elicienda idonea habentur suum & quoque calculum ferunt; potiore, quam in Pleuritide vera. Exemplo est *Anaxion*, cui haud

haud vetus est *Hippocrates* magna sui laude octavo die sanguinem mittere, de remediis, quæ sputa extruderent parum sollicitus. Quamquam enim nomen morbi in hac memorabili Historia reticeatur, haud difficile tamen est illum pro germana Pleuritide agnoscere. Est quid utique *Divinum* in Peripneumonia, quod nunquam, ut raro in Pleuritide occurrit. Etenim intra parietes Pleuræ arteriolæ multæ a ramo intercostali deductæ effunduntur; quæ levi sæpe de causa nimium distentæ obstrui solent, inflammationemque pariunt; At Peripneumoniæ quod attinet, hujus sæpe numero parens exitit, qui idem.

graves morbos mortalibus affert multumode.

LII. *Nec vana loquor*: Eadem nanque, quæ superiore Autumno, ac exacta nuper hyeme eas induxit ægritudines, quas superius, retuli, ipsa eadem adhuc dum vigens causa hujusmodi Peripneumonias Vere ortas, perque Æstatem dein late sævientes intulit, quæ plerisque in Vomicae haud inauspicato desierit. Is nanque unicus aderat mali exitus, in quo nonnulla saltem posita spes erat adhuc. Curiosum erat processum omnem morbi in suppurationem abeuntis adnotare, cum scilicet inflammatoria materies ab ipsamet Natura resolvi non potens, nec Arte emendari, blandior tamen, stagnans eadem, calens, pulsque, coercentia latera extendendo, vel rodendo abscessum vomicaeve formabat. Futurum id clarissimo argumento declarabat ipsa morbi indoles satis quidem acris, nec tamen acerrimi, tum minime superata adhuc sera symptomata, quodve potissimum aderat, sputa liquidiora, nec criticis diebus evacuata per ordinem, qui sanationem doceret. Fieri autem jam prope abscessum ostendebant leves, vagæ, sæpe repetentes, sine manifesta causa horripilationes, stillæ sanguinis e naso, genarum rubor, sitis, pulsus debilis, ac mollis, febricula; Quibus, formato dein tumore, seu abscessu, Tussis una aderat comes pertinax, sicca, ad passum, motumve aucta; respiratio difficilis, parva, anhelosa, strepens; decubitus in affectum latus tolerabilis; sudor, nocturnus, maxime circa jugulum, & frontem; urina spumosa; pallor, macies, debilitas summa. Proxime hinc impendebat tumoris disruptio, cui aut imminente prope, aut sæpe etiam sub ipso disruptionis, puncto, ac temporis articulo, præludebant deliquia,

turbationes alvi, stertor, hæmorrhagia nasarium, suppressa penitus sputa, moxque uberiore eadem copia educta sanie commixta, sœda teterrima. Sæpe purulenta jam facta materies repente intra pulmonales venulas resorpta, ac sanguini permixta alio ferebatur, ceu Præclaro Juveni contigit decubenti ad *Portam Eridani*, quem ortus inopinato ad sinistram aurem abscessus extremo, quod prope aderat, eripuit fato. Quotquot in cava Thoracis, inque Mediastini dilatata vacua abiisse illam, aut ad hepar verti novimus; omnes periere.

LIII. Una scilicet spes salutis erat, si disrupto abscessu sputa bonis avibus ejiciebantur, suasque illa Phases, ac mutationes obibant *Præcicis* notas. Haud paucos hac via servatos memini, quorum exempla aliquot hoc in loco præscribere haud puto alienum.

Æger Primus.

Comes juxta Templum *Divi Francisci de Paula*, temperamenti atro-sanguinei, habitus strigosi, adque bilem generandam, ut aiebat *Hippocr.*, idoneus, medio Vere acuta febris corripitur cum dolore lateris punctorio, Tussi, *gravitate Pulmonum*, pulsu celeri, elato, valido. Idem superiore hyeme diro in facie Erysipelate laboraverat. Sæpe etiam olim Pleuritide vexari consueverat, initio Veris. Postridie exacerbata sunt omnia; serus magis doloris sensus, intensior febris, sitis magna, pulsus duriusculus. Quarto stillæ sanguinis e naso; turbata leviter alvus; Urinæ subrubræ, atque suspensum in iis quidpiam; Somnus nullus; Sputa liquida, pauca; Summa corporis per intervalla frigida. Hactenus ad quatuor vires sexta in cubito vena. Quinto Clarissimorum Virorum sententia nova imperatur Sanguinis missio, ac dein lenis exhibita portio ex Manna. Vespere calor vehementius excanduit; Parum adhuc Sanguinis e naso profluxit. Spiratio magis difficilis, pulsus velocior. Iterum ex brachio missus est Sanguis ad uncias decem. Sexto lateris quidem dolor cessavit, ac sere ex toto evanuit, ac sævior adfuit Tussis, magisque corporis jactatio; Multa per alvum demisit biliosa. Septimo moleste magis habuit, nam & intendi magis febris, & infestare Tussis, & spiratio ingravescere visa. Conclamata prope res erat gravi præludente stertore; Tum quidem novus repente obortus horror, com-

mo-

motaque sponte alvus, ac pene sub idem tempus copiosus ex utraque nare effusus sanguis spem fecit latius quidpiam hosce inter tumultus rerum elucescere. Exhibita sunt e vestigio cardiaca, oleosa, sputum moventia, inter quæ ego floribus Belzoin palmam defero; Paulo post multa cæpit, & concocta expuere. Allevatus est. Undecimo sputa faciliore conatu eliciebantur; lenior febris; Turbata adhuc dum alvus ter, quaterque per diem concreta pauca demittebat probæ indolis. Sæpe etiam pervices a disrupto abscessu Sanguis visus e naribus proflire ad aliquot uncias. Victu tenui utebatur, potu melleo, *hydromeli* vocant Græci, quod liquoris genus est ex purissima aqua, & melle temperatum. Decimo quarto remissa penitus omnia; In urinis alba multa subsidebant; Sine siti erat. Bene spirans. Trigesimo quarto absoluta prorsus suppuratio est felicissime. Sæpe per id temporis accendi iterum visa febris, ac excandescere magis Tussis, at cito id, aut uberiore urinae profluvio, aut commota alvo, aut sputo liberius elicitom omnino evanescebat. Forte id etiam exigui alterius formati tumoris, aut alterius exiguae vomicae exemplo disruptæ preludium aderat. Vix paucis obigit septimo die læto omine prodixisse vomicam, perque totum morbi decursum assiduo lusu Sanguinem e naribus profluxisse, ac una simul turbari repente alvum; quæ quidem omnia amplissimam præbent contemplationum segetem, quo nihil Arti majoris compendii extitit unquam, ac præstantius idem.

Æger Secundus.

Sacerdos *Congregationis Oratorii Divi Phil. Nerii*, cui flaccidi diu pulmones, ac sæpe morbis conflictati, tum prope imminens senectus, ex febris tertiana duplici appetente Æstate decubuit. Comes huic aderant sputa improba, pulmonum gravitas, pulsus intermittens, ac leves animi per intervalla defectiones. Opem illi initio tulerat Pater meus; Atqui cum ipse paucis post diebus ab Urbe abesse coactus foret, gravioribus curis distractus; Ægri tutela mihi relicta est. Cumque omnia sedulo, ac diligenter expenderim, erupturam prope diem vomicam agrotanti, ac adstantibus detuli. Die sequenti cum summo mane agrotantem inviserem; disrupti noctu abcessus notam prætulit sputum sanie permixtum, te-

trum olens, copiosum. Ipse media circiter nocte quid insolens persenserat sub imo pectore, ac pene animam agere visus; Diu ante incerti doloris vestigia in utroque Thoracis latere occurrerant, quibus una sicca, ac sera admodum Tussis proluserat. Selectioribus balsamicis, Traumaticis, Rhypticis in usum adhibitis rictu peracta res est, ac omnis rescissa penitus mali origo.

Æger Tertius.

Reverendissimus Abbas *Congregationis Reformate Divi Bernardi*, gravi olim Orthopnea diu detentus ex aliquot dierum itinere, cum sævius quam unquam perflaret Boreas, in febrim acutam incidit una cum magna spirandi difficultate, Tussi, dolore lateris punctorio, pulsu languido, ac inæquali. Mox intensius adaucta febris; Spiratio ingravescens magis; Facies, oculique, emortui hominis instar; Mens emota; Sputa liquidiora, viscida modo, ac cruentis linteis interstincta; Urinae per initia tenues, nihil subsidentes, copiosæ. Brevi ad extremum redacta erat res. Decimo quarto subitæ defectiones animi, vacillans pulsus, frigida repente extrema, prope erupturæ Vomica præluserant; Prodire mox visa puris instar, graveolentia exiguo conatu, foeda. Septimo & vigesimo obstricta dudum alvus biliosis multis perturbata est, nec paucis tempore talia multa percessere; In totum autem tum febris reliquerat, tum sputorum excreatio lætissime desit. Cruentum quidpiam ab hæmorrhoidalibus venis sub morbi decursum effluxit. Secta bis initio in cubito vena, mox altera vice in pede; Hirudines quoque ano affixæ semel; Disrupto tandem apostemate appropriatis remediis opitulatum.

Æger Quartus.

Pistorem propter *Portam Urbis Victoriam*, an potius *Victoriam*? Per illam namque INVICTISSIMUS REX, una cum EUGENIO PRINCIPE, ac cæteris federati Exercitus Ducibus Urbem memoranda illa die ingressus est, qua fractis, & profligatis Hostibus obsessam trium mensium obsidione Civitatem solvit, Italix libertatem asseruit, Europæ securitatem restituit; Pistorem inquam febris acuta prehendit cum dolore lateris punctorio ad dextrum usque Hypochondrium, ac Regionem umbilicalem pro-

propagato. Magna abdominis tensio, ac totius corporis lassitudo; Facies mox ab initio subfusca fere, pulsus humilis, morescentes oculi, respiratio gravis, anhelosa, difficilis. Quarto mitior dolor, pulsus intermittens; commota alvus; Urinae flagrant; Sputa pauca, subflava, improba; Nox laboriosa. Septimo deliquens per intervalla e vestigio pulsus, vacillans idem, vix elatus; Paucos sudor circa caput prodit; Nihil ab alvo deiecit. Nono sudore per totum corpus diffusio lata sputorum excreatio obtigit, quae ad vigesimum usque diem proba expurgatione perdurarunt. Huic ob virium iacturam, cujus certissimus index erat pulsus humilis prope, deficiensque, semel tantum parca dosi missus fuit sanguis e brachio. Utramque tutius paginam implere Cardiacam, Balsamicam, Traumaticam. Magnam praestitit opem in principio Morbi Theriaca cum vino exhibita, tum quandoque etiam una cum aqua Scabiosa, ac Syrupo de Papavere erratico; Hoc enim more cocta magis sputa liberiore via ex pulmone prodierant; Valentior itidem pulsus, ac validiores vires rediere. Vesicantia quoque bina admota humeris, foras, moxque ab effracto apostemate Rhyptica, abluentia, consolidantia feliciter usurpata, inter quae Terebinthinata quaeque, ac balsamica caetera Principem locum obtinent.

Ager Quintus.

Olitoris Uxor juxta Hortos Regios decumbens foeda per hyemem scabie longo intervallo vexata, medio Vere febris acuta ex levi occasione corripitur cum rigore, ac Dolore Capitis, anhelitu difficili, cui postridie sese una comitem addidit Tussis, sitis, ac dextro Pectoris latere per vices repetens. Tertio die febris rediit, mox dirior Tussis, abjectus omnino pulsus, sputa atro colore praedita, pauca eadem, ac summe viscida. Vespere sincerus ex dextera nare exigua copia sanguis effluxit; Alvus autem stercorea probe demisit. Quarto rigor repetiit, sopore aliquantulum detinebatur; Biliosa, flava, multa vomitione rejecit, paulumque intermittens, virulenta; Pulsus debiliior, ac inaequalis; Facies ab ipso morbi exordio vultuosa; Sputa liquida; Vires abjectae prorsus. Resci hae visae sensim, ac recreari, atque una simul erigi pulsus, sputaque uberius ac probe elici, exhilarari vultus ab exhibita per vices Theriaca in aqua

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

e toto Citro, aut Scabiosa una cum modica dosi hircini sanguinis. Gemina quoque admota Tibiis vesicantia. Undecimo febris reliquit penitus. Trigesimo quarto exigua iterum proludente febris, ingenti oris salivatione correpta est, magna diu nocturne exundante feri copia, tenuis foetidi, acescentis. Quod quidem postremum repurgato tempore, tum sero lactis distillato ad aliquot dies praescripto in totum desit. Huic Genitrix septuagenario major, ac Soror aderat natu minor, occulto utraque cancro pectoris dudum vexata.

Ager Sextus.

Alteram ex abortivo foetu circiter quintum mensem febris acuta corripuit cum exiguo horroris sensu, lumborum dolore, & gravitate capitis. Tertio inaugebantur magis dolores; Respiratio difficilis aderat, pulsus debilis, extremitates frigidae; intus exstans, iactabunda, urens. Quinto sudor paucus circa caput, ac sumum pectus dimanavit: Per vices visa delirare confestimque rursus ad intelligentiam redire; Sputa sublivida; Urinae paucae, tenues, nigrescentes. Septimo sub tempus matutinum e vis vis migravit. Alvus huic per totum morbum recrementis multis, crudis, ac tenuibus fluxit.

Ager Septimus.

Faber Ferrarius Athletici habitus prope *Xenodochium Charitatis* ex febris assidua decubuit cum dolore lateris gravativo, Tussi, pulsu vix elato inaequali. Sputa per initia liquida, cruenta pauca; Respiratio laboriosa; Oculi micantes; Facies atro colore suffusa; Siticulosus; Insomnis. Tertio extrema livida fere, & frigida; Praecordiorum contentio submolli utrinque; Pulsus prope deficiens. Quarto mens perturbata fuit, aliquantulum insudavit. Multa per alvum deiecit improba. Quinto obiit. Aperto cadavere praeduros pulmones Hepati substantia, ac colore conformes interstincto, e quibus purulentus, atque humor prodibat graveolens. Plures insuper intra cordis delubra exigui Polypi occurrerant, atque horum alter prolixus admodum in pulmonali arteria, perque illius ramificationes, ac majores truncos eleganter dispositus. Mirum sane, (quodque idem maxime lentescens liquidi, tum solidi haud amplius in proprios

Cccc

prios

ptos systalticos nifus confurgere potentis argumentum extitit;) Ut tam exiguo tempore tanta pulmonibus labes accesserit, tam cito hi suppurari, atque hinc intra horum finum, ac profundiores recessus tanta congeri poterit, sœda, ac purulenta materies? Huiusmodi exempla præter multa, quæ a nobis afferri possent, sexto videlicet, septimo, nono die denatorum, in quorum cadaveribus pulmones sanie undique scatentes reperti sunt, legere est apud Bonetum Anat. Pract. l. 2. c. 4. Bullonium, Riolanum, Hollerium, Zacutum, &c. Idem quoque in cadavere Illustris Viri Ludovici Gonzagæ sexto morbi die defuncti observasse refert Cardanus (1), cui nempe omnia vasa pulmonis ex triplici genere magis tamen aspectu arterie rami erant pleni sanie simili lacti; adeo ut nullus adesset prorsus sanguis. Plerique horum, qui celeri adeo fato sublati sunt, nigroris una simul vestigia conspiciantur, imminenti illa, aut forte jam facti Sphaceli prologia. Conjicere autem erat prope adesse id a doloris carentia, aut minus exquisito illius sensu, quod quidem utrumque Sapientes nunquam fefellit.

LIV. Neque id sane arduum conceptum est, ut una simul suppurationis, ac Sphaceli indicia accurrerint. Nec illa iis profusus habenda fides, qui, ut id ipsum concipi queat, minime edocui, huiusmodi nigroris, seu Sphaceli notas in pulmonibus obvias, cadaveris corruptelæ adscribendas malunt. Cur nanque ejusmodi nigroris vestigia in omnibus passim haud reperiuntur? Cur in pulmonibus illa potius, quam in intestinis, quæ ob sæcum colluvient citius quam ulla alia pars corrumpi, ac in Sphacelum abire debuerit; Cur denique in uno tantum, aut altero pulmonis lobo, reliqua illius parte insorte penitus, ac integra? Equidem mali hinc potius culpanda sævities, & suppurationem, & Sphacelum inducet celeriter apti, ut præclare idem explicat laudatus Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. p. 165. Inclitæ Reginæ Joannæ exemplum afferens, quæ sexto die defuncta est; inque illius cadavere pulmones una simul multa sanie plenos, ac Sphacelo obfidosprehendit.

LV. Isque aderat omnis sævienti morbi processus quem quidem dum mihi adhuc ob oculos pono, ac mecum tacita cogitatione

perpendo, præclare video, tum luce meridianâ perspicuum magis elucet quam opportunum fuerit labentem hæc inter discrimina Naturam erigere, tueri, vindicare. Quam ex adverso periculose plenum opus alio diverfam ab hoc tramite viam insistere. Nullus hic enim sudorificis locus, aut catharticis, cum maxime in præcipiti rem erat; Quinimo ipsamet caute adhibenda remedia, quæ recreandis, confirmandisque viribus dirigebantur. Quot quidem recensere ego possem e medio sublatis, quos hisce artibus, atque adminiculis servati posse evidens erat ac plane conspicuum; Si modo in doctum ac prudentem Medicum incidissent? Quot Orco dedit præceptis unius hominis audacia; qui eo temeritatis evasit, ut indiscriminatim singulis decantatum quoddam sudorificum in ejusmodi pectoris agitudinibus exhiberet, cum Polychrestum, ac Divinum prope auxilium? Oh quam perutile foret Reipublicæ huiusmodi pestiferam hominum sobolem de umano Corio impune ludeantium proscribere! Oh quam miseris ægrotantibus proficuum in solertis ac probi Viri manus devenire! Quantum vero expediat Medico, quæ exhibenda sunt remedia, mature expendere, eaque pro morborum indole, atque ingenio. Exploratoris instar secernere; Ipse Peruvianus Cortex, ut de hoc uno loquar, ostendit. Is nanque, qui superiore anno voto feliciter respondit, Cane modo pejor, & Angue, fugiendus nedum in exaratis sævientibus pectoris affectibus erat, sed & in cæteris fere, tum potissimum in ipsis, quæ mox Autumno proluerant, quæve dein toto decursu anni sævierant passim, febribus; Evidenti quidem indicio; stimulo magis, quam fræno opus esse, secus ac præterito anno, quo tota humoralis massa ad orgasmum heu prompta nimis, ac nescia stare loco, coercenda erat potius, ac ceu injecto compede sua intra fines, ac limites, ne diffugeret illa prorsus, compescenda, quod quidem mite utique præstare potens est memoratus Cortex, ut Doct. Viri adnotarunt. Eandem ob causam pariter vesicantia, quæ superiore Anno noxia valde extiterant, ac nefasta prorsus, haud exiguum hoc labente anno ægrotantibus opem attulere; Ut & sanguinis missio, quam prope dixerim Princeps potissimumque extitisse in hac Constitutione præsidium,

dium, ut superius ostendit. Equidem ut apud Geometras *curvum* norma saepe est ac regula recti; fas est exinde decernere, quibus in morbis proficua sit, quibus econtra noxia venae sectio, tum vellicantia, ac caetera quaeque consueta Artis praesidia. Profecto si ab *Hippocratis* aevo ad haec usque tempora hisce vestigiis institissent Medici, optatae perfectionis apicem jam dudum attigisset Ars, quae conjecturis & adhuc jure merito sortita illis videtur, qui haud sciunt errores non Artis esse, sed Artificum.

LVI. Omne scilicet, ut ad exaratas pectoris aegritudines me conferam, intra Thoracis claustra intime latebat malum; Quod quidem, si Erysipelatis morem incrementa, exitum, quibus id ipsum sese perspicuum praebet aliquando, ac recens praebuit, attentius expendimus, ac utrumque horum invicem comparamus, nihil omnino diversum, ac discrepans reperimus; Quinimo fieri opus est ejusmodi exaratas pectoris aegritudines nil aliud revera esse, quam *Erysipelata Pulmonum*, quae in gangraenam dein, aut suppurationem, aut in utramque tendebant. Febrim quod attinet, ejusdem haec ipsa erat indolis, ingenique ac illa, quam jam tum comitem sibi adsciverant *Erysipelata* superiore Autumno orta. *Crymodem* vocabat *Aerius*, ut eam ab *Thyphode*, ac *Lypiria* secerneret, quae obfesso Erysipelate hepate, aut ventriculo oritur. Ut autem ad pectus potius, quam ad aliam quamlibet partem praecipiti gradu rueret morbifica materies, ibidemque phlegmonis modo Sytrophes, aut abscesso more sublederet, totque diras adeo aegritudines gigneret, haud absurda res est intellectu. Quandoquidem huc, qui per universum corpus perenni lege fertur cruor, totus pleno alveo pertransit: Huc multiplicatis generis vasorum textura praeclearo invicem ordine lucentium conspicitur; Huc denique aeris alterationes quotquot effingere, aut cogitare animo quispiam potest, vestigia sui reliquunt. Hinc solidis, ac liquidis propagata lates: hinc Phlegmona, hinc Sytrophes, hinc enati ad pectus abscessus, quarum aegritudinum parentem causam lubet ab aere ipso deducere.

LVII. Et sane ut is *atrioribus* *moleculis* *adives* superioribus annis, cum assidue adeo

perflarent Austri, ad fluorem liquida coegit, ac dire admodum si quis unquam, adversus solida se se praebuit, eadem crispando, vellicando, erodendo, ut tot palam fecere spasmodicae affectiones, quae tum temporis immaniter populabantur: Ut idem *subacidis*, ac *nitrosis* *Salibus* onustus, quas Boreas vehit, eadem saepe liquida ad fixitatem deducit; nec solidis parcens ea a proprio sui elatere cogit recedere, inque sistalticas reflexiones abripi haud sinit amplius; Num vicissim ruentibus Austro, ac Borea, cujusmodi haec ipsa exitit labentis anni Constitutio, *neutrum* quidpiam corrumpere aptum, ac figere abs re foret excogitare *fulinum principium*; quo in aere ludens haece intulerit aegritudines, tum à fixitate, ac *stasi* liquidorum; tum à putrefactiva eorundem, ac solidorum una invicem conspirantium labe pendentes? Quod enim ludere in mores salia novimus? Quot illa formas induere? In quot se se larvas effingere? Quis omnes horum Species recensuit unquam, quot nec *Proteus* quidem lussit, nec coloratus spectatur *Camaleon*? Quis intimiora hujusmodi Naturae abdita penetravit? Ut acidum, austerum, acre, & sexcenta alia in Sanguine latent inconspicua, ita in aere innumera ludunt, quae homines *multimode* afficiunt, ac tot diversa inserunt mala. Equidem in ejusmodi rerum trepidatione, totque inter ventorum oppositos flatus aequum erat inter noscere insolitum aliquid *per aethera inane ferri*, quo semel affecta liquida, ac solida fixitatem illa, haec labem, utraque necrosin, ac gangraenam susciperent.

LVIII. Ejusmodi itaque exoticis salibus imbutus aer obvium quidquid, ac suscipiendae labi aptum magis inficit, ac laedit. Quae quidem salia cum diversae adessent naturae, diversas quoque affectiones induxerant *Phlegmona*, nempe, *Sytrophes*, *Sphacelos*, *Apo-stemata*, prout figendo, & erodendo apta, aut horum alterum, aut utrumque saepe pepererant, Nunquam autem Sphacelo obsita ulla visa pars, quin huic inducta in liquidis stasis proluserit, ortumque dederit, ac incrementum. Num vero exitiales ejusmodi moleculae ab spirantium adverso invicem flamine ventorum concursu, num ab alia quapiam sorte causa repetendae sint, decernere nemo ausus unquam, ac revelare? An Terrae motibus quidquam tribuendum, jure dubitat (1)

Cccc 2

Clar.

(1) *Relazione de' mali di petto dell'anno 1720. p. 33.*

Clar. Gagliardus quod idem observationibus longa annorum, locorumque intercapedine dissidentibus institutis, ac collatis invicem comprobare nititur. Ast & id ipsum gravibus adhuc laborat difficultatibus, quas quidem prævidit laudatus Author, haud tamen pro rei dignitate persolvit.

LIX. Hæc inter lethiferas particulas liquida; ac solidis æque infensas, exitiosæ, ac perniciosæ magis erant, quæ gangrenosam labem inducendo pellebant magis. Hinc enim enato celeriter Sphacelo velox discrimen, ut ægroto sexto, ac septimo obtigit, aliisque nonnullis, qui quarto plerumque, quinto, ac sexto die defuncti sunt. Nosse erat hujusmodi figentis veneni vim, (sit verbo venia, (vel ab ipso ore, vultu, oculisque ægrorantium, perturbati instar hominis, attonitique, fero heu, trucique obtutu; Lingua iis urens, ingensque in spirando fervor aderat, ac præcordiorum æstus, sitis Tantalea, dejectiones alvi nigrescentes, extrema frigida, pulsus per totum morbi cursum vix elatus, ac pene delinquens idem deficientisque. Atque iis quidem magni subsidii extitit Theriaca recens una cum cardiacis assumpta, cujus beneficio haud pauci evasere. Nec exiguam quoque opem attulere vesicantia initio admota, horum quippe auxilio ad loca remotiora protrusis lethiferis, exoticisque salibus, seu, ut Practici ajunt, morbifica materie producta, atque ibidem exonerata, non omnes passim encabantur plurimi etiam superstites fiebant.

LX. Ne vero quis nre forte putet inconsiderate adeo Theriacam in hujusmodi Phlogisticis, ac mali moris pectoris affectibus adhibuisse. Ecquid enim ex ingenti remedium segete usu præclarior, ubicumque internæ viscerum corruptionis, ac Sphaceli metus est, quam Theriaca, quæ lethifera spicula eludat, putredinem arceat, cruorem affræctis vinculis in fluorem totus abeat, coerceat, ac mobilissimas illius partes retineat? Num in Pestibus, quarum Natura in tenuissima, celerrimaque putredine maxime versari, vel ex eo clarum sit, quoniam nullus morbus illis æque est contragiosus, præsentissimum hæc ipsa auxilium est, cæteris longe præstantius? Narrat (1) Favestus plerisque Hæc comitum anno 1580. cum ejusmodi ægri tudines dire ibi crudeliter quo lavissent, se ipsos tum alios absque

Medici præsentia curasse assumpta Theriaca. Quod tamen auxilii genus, utpote vulgare, ac comparatu facile haud ipse omnino probare videtur; ait nanque idem, præstare magis ea omnia adhibere, quæ vera methodus curandi docet, quam uno calipodio, ut calecarii, aut uno medicamento omnes currere. Nunquam enim forte noverat adhuc Vir eximius specificorum usum in Medicina, aut quod illius ævi mos erat, crediderat ipse sanari haud posse tuto ægri tudines, nisi peregrina, ac pretiosa remedia comparerentur, quæ Lucis in ortu.

Indus, Arabs, Syrus, divesque Sabæus Vicino sub sole legit, quæ præbet Orontes, Eximia ignoto mittit quæ Nilus ab ortu, vanam scilicet ac futilem Medicinam esse, quæ remedia proponit, ut Plinius loquitur, parata vulgo, inventu facilia. Heu quam miserabilis aderat illis temporibus Reipublicæ nostræ facies, quotve nobilissimam Artem erroribus implicarunt ingenia Arabum?

LXI. Ubi vero inflammatoria materies in suppurationem abierat, perque illa sputum expurgari cœperat, summa eriat nitendum ope, ut rite id leniterque prodiret, atque dein, ac subita ulcerosi loci depuratio contingeret. Subit hic loci, atque in memoriam redit miræ in præclara Vestali curationis exemplum, cui hujusmodi abscessus in Pulmone diu latens erupit, tandem, ipsaque una cum sputo folliculum ipsum (mirabile dictu) quo purulenta materies includebatur, ejecit. Erat is cystidis instar efformatus inque ejus fundo purulentus humor conspiciebatur ejusdem coloris, ac substantiæ, cujusmodi aderant sputa, quæ jam diu ante prodierant. Vesiculam adfuisse crediderim in hunc morem protensam ex iis, quibus totus undique Pulmo eleganti artificio componitur, in qua seu in folliculo, aut cystide pus continebatur, atque earum quidem, quæ majoribus Tracheæ ramis proximiores sunt, quo facilius assiduus tussendi conatibus omni, quo adnectebatur, soluta compede aëreos tubulos, quorum ad fines exiguae ejusmodi vesiculæ appenduntur, subire potuerit, perque os dein prodire. Equidem folliculatas, ut ajunt Vomicas seu hujusmodi Pulmonum abscessus, qui propriam sibi Cystim comparant, nil aliud esse arbitror, nisi vesiculam quandam hoc

(2) Obser. 3. de febr. cum morbo Epid. grassant. p. 152.

hoc pacto extensam, purulenta in illam materie è finitimis vasis secedente, atque ibidem collecta, quousque tandem ob sui copiam, aut nimiam acrimoniam effracto clauistro in alperam arteriam, aut in cava Thoracis effundatur, Anatomica Pulmonum administratio perspicuiorem rem efficit: Quippe sanguifera vasa, quae per totum Pulmonem innumeris propaginibus disseminantur, quaeve admirabilem ibidem contextum explicant, ad universas vesiculas pergunt, juxta quas illa variis amplexibus, ac gyris una invicem ludunt, ac desinunt. Ecquid autem conceptu obvium magis, quam tenellis desinentibus arteriarum, aut venarum orientibus ramulis disruptis, in vesicularum sinus sanguinem sensim effundi, ibidem colligi, ac dein in pus verum abire? Hinc enormes aliquando ejusmodi Vomicae, aut plures una simul eodem tempore, aut successive erumpentes. Videmus in statu praeternaturali aneurismata passim, ac varices, à dilatatis arteriis, aut venis efformari, ac diversas passim glandulas laxiores evadere, intumescere, inque magnam molem confurgere. Num aequa ratione vesiculares pulmonum cellulae extendi magis, ampliores effici, ac dilatari haud poterunt, subque folliculi imagine minus in Anatomicis peritis eludere? Num & eadem forte hæmoptiseos incrementa, ac incunabula, torque dirarum pectoris ægritudinum?

LXII. Altera Vomicae species recensetur, quam tamen vix ego Vomicam dixerim: Quando scilicet in pulmonibus foveam unicam, aut forte binas efformari quandoque contingit, easque circum circa parietes callosos obtinere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotidie tota, copia licet ingenti, expectoretur; Hi satis sani degunt, bene respirant, comedunt, & dormiunt, incolumes, aut saltem in modico corporis habitu perstant, & non raro perferesunt. Hinc nonnulli dicuntur Phrysin per 30. aut 40. annos habuisse. Vivit apud nos Mercatoris Uxor quinquaginta quinque annos prætergressa, plurium liberorum mater, è quibus unus ante biennium Phrysicus obiit: Illa habitu phryfico ab annis plusquam viginti mere purulenta expuit, skeleton referens, & quanquam a catharris in pulmones crebro decumbentibus, præter frequentes ex liene ægritudines, satis saepe fuerit proxima; nostraque cura liberata, periculo tamen semper defungitur, ut in illam qua-

drare queat, quod eam mulierem, de qua *Hippocrates: Quinquies mortua est.* Quaedam olim secui tabe extinctum, cujus dum pulmones inspicerem binas utrinque caver-nulas avellanæ capaces, non tamen exacte rotundas, aut æqualiter cavas reperi, sed quasi laceras, ac si à muscæla, vel à glire frustulatim portioneula avulsa pulmones ex-si fuissent. In harum altera ulceris callo recens obducti vestigia adhuc supererant. Sæpe iis sanguinem tussiendo expuerat, tum paucis ante obitum diebus magna copia ejecit atri, spumofique.

LXIII. Utque rem in pauca contraham:

Ut nullam absque folliculo, seu cystide vomicam concipio; Ita harum quotquot occurrunt, sedem, ac locum in vesicularibus pulmonum cellulis statuendum autumo. Hinc purulenti, ac puris discrimen; Quæ namque ab effracto apostemate expuitur materies, verum illa ac genuinum pus est. Quæ vero purulenti instar se habet magis, hæc nullam prægressam, aut præsentem vomicam, aut aut flaccidos natura pulmones, aut eosdem nimio onere oppressos significat. Quod sane rite est discernendum, ne sæpe quamlibet aliam pectoris ægritudinem pro vomica accipiamus. Utriusque, purulenti videlicet ac puris distinctionem præclare assignant *Divinus Senex lib. de alim.*; Enim vero ut haud concipi unquam potest ullum fieri posse pus absque suppuratione, quidquam sane inter hoc, & purulentum intercedere opus est, quod nempe ad purulentum tantummodo sufficiat sanguinis vitium, focus ac in pure generando, cui & solida suum quoque calculum præbent, Adversus *Hippocratem* stare videtur *Galenus* ex sanguine pus fieri ratus, quod in phlegmone in abscessum abeunte sanguis extra vasa effusus in pus vertatur. Atqui haud advertit ipse suppurationem haud fieri unquam posse absque carnis erosione, quod sane indicat sinus post puri evacuationem sæpe relictus; Sanguis enim fusus, & calefactus, ut antiquissima Verba usurpem in hac parte, humidam, & calidam carnem, quam attingit, corrumpit, ex qua carne, si Natura robusta fuerit, verum pus nascitur, cui non raro admiscetur aliquid puriformis ex sanguine, & humoribus extra vasa effusis. Ego quidem totum, quod adest inter pus, ac purulentum discriminis ab ipsis humoribus petendum existimo: Vel enim sanguis est, vel lymphæ quæ in pus abire. Utrumque enim horum per proprios sibi

demandatos ductus uberi gurgite excurrit. Utque ab illius vitio verum pus, sic à lymphæ pituitam illam putrem, seu purulentum illud, quod à vero pure secepnitur, generari puto: Ad utriusque vero generationem solida æque concurrunt; Discindi hæc namque, erodi, aut quocumque alio modo ladi opus est, ut inde à receptaculis suis, per quæ vehitur sanguis, aut lymphæ secedat, inque pus abeat, aut purulentum. Atque hinc è folliculatis vomicis verum pus, secus vero ab iis, quod foveas duntaxat, aut cavernulas in pulmonibus obtinet, exire cernimus; Quod illæ à sanguine per ima quotquot Delubra pulmonum discurrente, atque in vesiculas exundante enascantur. Hæc vero ut plurimum in extrema pulmonum parte conspiciuntur. Lymphatica namque vasa superficiem tantum pulmonis attingunt, perque illam assiduolusu feruntur.

LXIV. Cæterum quodcumque illud sit discrimen, quod inter purulentum, ac verum pus intercedit; Idem illud facere videtur, quod & alterum. Utrumque enim sæpe inevitabili fato prolusit. Rursus in hoc etiam differunt, quod pus malum sit ut signum, & ut causa; Ut signum, quoniam abscessum, & inflammationem systrophicam præcessisse declarat; Unde consumptio partis pulmonis sequitur: Ut causa, quia nisi exeat, febrem lentam fovet, rigores inæquales affert, & corrumpit partem, & in qua manet, & contagio vicinam. Pituita vero putris, seu purulentum, malum est ut causa tantum, quoniam afficit Pulmonem ipsum mora, nisi exitum habeat. Sic in tussibus aliquando cum pituita excernitur, & sputum album, & semiputre, atque ut aiebat *Hippocrates*, simile puri. Quæ huic succedit Phthisis diuturnior, ac propagari aptior altera est, quæ à vomica provenit.

LXV. Verum illuc, unde capi; Ejusmodi pectoris aggritudines prope comitabantur anhelationes, quas Græci Asthmata vocant, Tusses, raucedines, capitis dolores, ventris tormina; atque è chronicorum classe Hydropes, eaque pectoris potissimum, Tympanitides, Tabes, Arthritis, Scabies, postremaque hæc pueris præsertim, ac foeminis. Quadam etiam per æstatem gliscere visæ febres mali ingenti, eoque illæ peiores, truculentioresque, quo Canis instat rabidi hos, atque illos absque latratu lacecebant; Hisce se se addiderant verminosa

alix, hæcque inter nonnullæ, quæ incerto plerumque circuitu, miti, placidoque vultu ludebant, quæve diriores, inclementioresque evadebant, si qui illas consueto more expugnare tentaverat. Obesiores in universum, quibus

Pinguis aqualiculus propenso sesqui pede extat,

savius, crudeliterque magis vexati; Tum qui antiqua in Cruribus, aut Tibiis ulcera, aut peculiarem quampiam aggritudinem diu fovebant. His namque inopinato arcescente ulcere, aut vetere sanato malo, peccus illico afficiebatur insausito successu. Hoc pacto sublatum initio veris Romanum Pontificem CLEMENTEM XI. audivimus, delatis mox Ecclesiæ clavibus Generis nobilitate, ac moribus Spectatissimo Viro *Michaeli Angelo Cardinali de Comitibus*, qui nomen sibi assumpsit INNOCENTII XIII. maximo totius Christiani Orbis gaudio, ac plausu.

LXVI. Invalescente Æstate frequentiores adhuc, quam unquam vomica extitere, quæ quidem, etsi pari felicitate absolverentur, non eadem tamen initia, ac incrementa observabant, ac quæ antea factio Vere proluserant. Plurimis namque levissima de causa vomica erupit, nullo sæpe prævio vestigio doloris, aut horum quopiam, quæ sive futurum, sive jam factum abscessum, sive prope impendentem illius disruptionem prænunciare consueverant. Sæpe hos inter fluctus ventorum Variolæ, ac Erysipelata sese prodere conabantur, vix tam quidquam memoratu dignum edidere. Quidam etiam media Æstate subito fato tum in Urbe, tum in Agro erepti sunt. Desinere tandem, saltem haud ita frequentiores occurrere appetente Autumno coeperant memoratae vomicae, ac tum rursus quidem, direque magis foris prodire exaratae febres, quarum tamen vix ullam cernere erat absque comite Pectoris labe, sive hæc illis præcurret; sive in hanc illac exierint sæpe. Vix pauci per Æstatem Dysenteria laborarunt.

LXVII. Primis Augusti diebus magna caloris vis exitit, mox triduum tonitruosum, pluviosum, ac quandoque grandinosum successit. Immotus per id temporis Mercurius constitit diu; Visus hic ima repente petere, ac veluti in Perigæo degere, cum prope impenderent tonitrus, Calique fragores. Saeva hinc exarata alvi Tormina accessere, quæ etsi primo intuitu leniter lacebere viderentur, in contumacissimas

mas dein, periculosas, ac plerisque lethales aegritudines accedente Aequinoctio degenerarunt. Ingens quoque hic loci commemoranda subit Puerperarum clades, quarum plurimae abortivos foetus edidere. Forte id nedum liquido ad lentorem toties memoratum proclivi, quin, & solido quoque nimis debili, ac laxo maxime tribuendum; Utrumque ab arcana, ac inexplicabili aëris constitutione, unde & caeteri effectus prodierant, repetendum.

LXVIII. Equidem, ut verbo me expediam; Vereor nanque ne in magnam nimium molem excreseat Pagina; Si quotquot hoc anno regnarunt, ac longe lateque saevire, malorum indolem, ingeniumque, atque originis principium attente perspicimus, nedum video lentoris crimine redarguenda liquiditas, quin & forte maximam vitii partem solidis tribuam nimia laxitate peccantibus. Ecquid enim tot vomicae, ut unam instar omnium aegritudinem in exemplum afferam, ecquid inquam tot hoc anno vomicae, quot nunquam auditaе olim? nisi à solido in crispaturas suas, ac proprios nîsus deduci haud potente amplius, ac pene dixerim, deficiente? Anne forte quis adhuc, frustra declamante *Petronio* (1) in eo est, ut totum liquido opus, nihil in œconomia animali solido velit adscribere, ignorance potius pertinaci, atque inani sectae amore, quam ratione aut consilio? Juvenem nuper secui ex febri acuta vigesimo morbi die defunctum, cui omnes Peripneumoniae notae aderant; Huic universa Pulmonis substantia in strumas veluti composita conspiciebatur, quibus apertis ingens puris copia profulgebat. Quidam quoque diurno affectu catarrhali vexatus, qui mox in ascitem degeneravit, cum vesci amplius haud potuerit, inedia necatus periit; Aperto Cadavere summe flaccidos Pulmones, ac multa sanie repletos, tum viscera quaeque imi ventris laxa admodum, ac ventriculum praesertim, comperi occluso penitus Pyloro, ut nec Stylum quidem admitteret. Num id fluidis potius, an solidis adscribendum? Num & ultro toti erimus in expendenda *liquidorum intemperie*, Principis illius intemperiei, quae in solidis est, immemores prorsus, earum ignati rerum, per quas vivimus?

Constitutio Epidemica Taurinensis

Anni 1722.

ANni Historiam perscribere aggredior. Superioribus duobus, qui hunc praefere, annis parum, ac vix, toto sui decursu, dissimilis, sive adspirantium ventorum indolem, ac morem spectamas, sive ingruentium morborum sobolem, ingeniumque. Venti nanque, ut ab iis ordiar, qui, ut verissime ait *Argolus*, in animantibus *salubritatem unte ingenerant, suscitantque*? totius anni curriculo, assiduo, nec unquam interrupto flamine diu perspirarunt ab Hyperboreis modo plagis, modo ab Australibus oris erumpentes. Varia hinc, ac incerta omnino tempora; Praematura modo hyems, immitisque; lenis eadem modo, ac Veris potius imaginem referens, ac vicem: Prout nempe aut ruens ab alto Boreas, saevusque Aquilo, aut turbidus Auster perflabat. Recurrere saepe visa media hyeme aestas; Floraque ubique in agris ludere, lateque prodere initia veris. Labet autem altius ab autumnali aequinoctio, ubi superiore anno desii, initium ducere, antequam ad hymem ac anni reliquum festinante calamo properet Oratio mea.

II. Autumnus itaque, quæ quidem anni tempestas Medico maxime diligenterque expendenda est, utpote quod sub id ferme temporis nova plerumque soleat morborum cohors in scenam prodire, toto deinde anno longe lateque regnatura; Autumnus, inquam, statim ab initio horridiusculus ad plures dies praeluxit, praecipiti ruente Borea. Atqui redire protinus auctusque velut viribus perspirare iterum, ac saevire magis visus Octobri Auster, quousque dein validiore impetu erumpere denuo abeunte libra coeperunt ab Orientalibus primo, mox vero ab Aquilonaribus terris horrentes gelidique status obscurato aethere, effusisque super Alpium cacumina, perque subjectam Plantiæ, finitimosque agros, vix tertio ab Urbe lapide, uberrim nivibus praecocem heu, asperamque hyemem portendentibus. Unius adeo mensis spatio urens modo aestas, modo rigida hyems saevit, extremosque utraque conatus edidit, pugnantis invicem, ac velut de summa rerum, quis nempe horum prior terga daret victori, palmamque alteri

vii

(1) Satyr. pag. 78.

viſtus cederet, certantibus inter ſe ventis. Vicit utique, vicit, diuque ludentium auſtraliū iram, ſevitiemque tandem omnino fregit iis oppoſitus Aquilo; Novaque extemplo, eſſi miſitione quidem imperio, morborum legio ſe ſe palma oſtendit, inque apertum prodiit, quorum veſtigia ac pene dixerim, proſudia noſſe erat appetente æquinoctio; cum primum ſcilicet horridiuſcula aura, ſilentibus ad aliquot dies, ſuaque in clauſtra illico receptis Auſtris, dire perſſavit.

III. Cernere quidem erat recens ortas novæ indolis febres per id temporis ſubludere ab iis, quæ anteaſta æſtate, ac ſuperioribus annis ultro citroque debacchabantur, primo aſpectu omnino diſcrepantes, intermittentes videlicet, aut intermittentibus analogas, iſſique comites, ac pediffequas veluti, ſtatim ac ruere Boreus cœpit, pleſaſque paſſim ægri tudines, Aſthmata, Lip-pitudines, Hemoptoes, Paralyſes, Dolores vagos abdominis, Pancreatis, Meſenterii, aliarumque per ima ventris latentium utriusque generis glandularum Obſtructiones, contumaces quantum, ac conſueta hætenus Practicis Methodo invictas prorfus! Utque omnem morborum Iliadem, qui, ceu a *Trojano Equo* denſo agmine Milites, ab uno omnes fonte progerminarunt, brevi ſermone complectar; Dolores acerbiffimos artuum, Nephritides, Apoplexias, quibus diurnæ Hemicraniae, aut ſuppreſſa conſueta quæpiam de more evacuatio praeluſerat. Ad-dere hiſce ſas eſt lugendam, ac deplorandam adhuc *Puerperarum cladem*, earumque præſertim, quæ abortivos fœtus pepere-rant. Senes in univerſum, diurnis que malis conſecti poſtremum ſubiere fatum, quamve diu eluſerant mortis vim, hanc tandem obire, ac commune omnibus aleam experiri coacti ſunt. Phryſici quoque omnes brevi tempore ſublati, ii ſcilicet, quibus aut hæreditaria labes pulmōnes obſederat dudum, aut adventitia eadem recens obtigerat poſt prægreſſam vomicam, aut aliud quidpiam in imo pectore latens, abditumque. Equidem invaleſcente hyeme, redeuntibus demum in ſcēnam Auſtris, ſe ſe condere hæc viſa prope; Ac tum quidem Variolæ, morbilli, acutæque febres, quæ ſub intermittentium larva primo, aut altero accēſſu deliſcebant, moxque dein in ſubcontinuas mali moris celeri pede migrabant, torrentis in modum hos atque illos nullo diſcrimine aggre diebantur. Id tamen minime

quidquam officiit, quin totius anni imperium, poteſtatemque morborum exaratis intermittētibz febribz, aliſſique præſatis ægri tudinibus, quæ ſub illis militare videbantur, dominatum inquam, præcipuamque iis ſedem tribuamus.

IV. Totius hinc decurſu anni præter modo dictas febres intermittētes, dolores poſſimum abdominis, immanes iidem, ſæviere; quodve peculiare aderat, ac notatu dignum, videre erat ſtatis plerumque horis exiguo præludere rigore, aut nullo quandoque etiam prævio horro- ris veſtigio ejusmodi dolores recurrere, ſtatique pariter horis evaneſcere. Nonnullos quidem ſine ulla intermiſſione iis vexatos memini, atqui ceu in febribz ſubcontinuis obſervare eſt, quædam aderant novæ exacerbationis indicia, ac certa veluti proſudia novi, ac dolorifici, ut ita loquar, repetentis paroxyſmi. Sed de hiſce in præſentiarum ſatis. Præſtat modo, quam exorſus ſum, tandem abſolvere, rectoque dein tramite, quo unusquiſque memoratorum affectuum ſeſe prodiderit, vultum, quem ſervaverit, typum, quamve præ ſe tulerit, indolem ac genium explicare.

V. Medio circiter Octobris Orientalis aura uno alterove die lato flamine adſpiravit. Miſcere hinc non nihil æſtus cœperat, quem reviviſcentes iterum Australes ſtatus atulere, inſuetumque paulo poſt frigus erupit, gelido Aquilonis aſſatu, cujus vim, ſeritatemque, nedum Incolis, Arboribusque, ac plantis, ſed & iſſis etiam inſontibus aquis præmaturo gelu concretis, ceu ſub rigidiffima hyeme, vix orto Autumno, inſenſam adnotavimus. Quod quidem nulla hætenus hominum memoria Subalpinis unquam obtigerat. Obſcurum hinc ſæpe cœlum, varium idem, incertumque; mox ſerenum, atque præclarum, prout Orientales modo, modo Aquilonares venti perſſabant. Sæpe etenim viſum, ac diutina experientia compertum, obſcurum nubilumque autumno cœlum reddi Orientalibus ventis ſpirantibus, ſerenum vero, nitidumque idem evadere inſtante Borea. Poſtremum Octobris diem impetuoſus is maxime, præcepsque ruens obſignavit.

VI. Felicioribus auſpiciis ſeſe prodidit ſubſequens Mensis. Læti- or nanque ab Occaſu adſpirans Africus ſin minime ſævi Aquilonis iram omnino retudit, illi ſaltem morem impoſuit, vimque, ac ſævitiem ejus maximam, magnam in partem coercuit. Saluberrimos utique, lætiſſimoſque Subalpi-
nis

nis occidentales ventos jam dudum novimus; quod quidem ego adnotare operæ pretium duxi; cum primum morborum quotannis apud Subalpinos sævientium historiam, quotannis & illam, quandiu vitam mihi, ac vires huic oneri ferendo pares dederit Deus, persolvendam conficiendamque daturus; Augustæ Urbis, quæ totius Regni caput est, Regumque inclita sedes, agrique ejus, ac universi Subalpini tractus, qui ad Alpium radices insidet, conspectum ac positionem, tum cæteras aeris & alimentorum qualitates, quæ Urbium cælum constituunt, descripseram. Furere hinc denuo Boreas visus ad aliquot dies, novo tum rigente gelu tellure, concretisque suis in alveis indomito frigore aquis. Quod supererat mensis reliquum, tum Decembris initia Auster iterum funestavit. Observatumque nunquam, sive is, sive alter quispiam ventorum perflaret, perspirare illos cœpisse, quin obscurari è vestigio cælum videretur, ac inopinato prope tempestas impenderet. Ad Solstitium hæc usque gesta.

VII. Exordia hyemis tum modicus effusus imber, tum uberi dein copia delapsæ cælo nives sædarunt. Veris illa potius, quam hyemis primordia dixisses. Magna hinc temporum subsecuta tranquillitas, lætaque rerum conditio. Mite prorsus, placidumque cælum, lenibus per intervalla obsecundantibus ventis ab occasu modo, modo à meridionali plaga proficiscentibus. Haud minus læto omine Januarius illuxit, qui & idem ad postremum usque diem permansit, hujusce felicitatis, lætitiæ, ac serenitatis Authoribus unice Occidentalibus flatibus assiduo, lenique flamine è propinquis, atque excelsis Alpium fastigiis perspirantibus, quæ illorum, si quid insensum iis manebat adhuc, coercabant. Mirum utique nos iis plerumque ventis serenitatem debere, cum ex adverso impetuosus hi maxime ac insalubres Galliarum occidentalis regionibus sint. Atqui si vastissimum illum tractum mare inter Atlanticum, ac Alpes, quæ nobis ad occasum imminet, animo metimur, si suprema Alpium fastigia, ac præcelsos harum vertices intuemur, ita quidem compositos comparatosque, ut insensum quidpiam, magnoque impetu ruens compescere queant, ac inhibere; mirum haud videbitur amplius, ut lenes si ac temperati dein Subalpinas hæc regiones benigno afflatu pervadant. Uberrimam nanque vaporum aquosorum copiam, quam hi secum ex Oceano adferunt,

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

magna ex parte suo in itinere dimittunt, tum si quid adhuc retinent, antequam Alpes attingant, omnino deponunt. Norunt id quidem Allobroges, ac finitimi iis incolæ, qui trans Alpes degunt, quibus secus ac Subalpinis, nubilum ac pluviosum aerem ejusmodi venti adferre solent. Id scilicet beneficii Alpibus debemus acceptum, sic una dispositis, ac collocatis, ut non nisi placidos pacatosque ventos ad nos appellere ab ea parte sinant, perque patentes campos discurrere. Secunda Januarii die cum advesperasceret, prope primoribus nempe noctis tenebris, obscurus quidam auditus cæli fragor, & passim cadentium fulminum species visa, violentissimo è Boreali claustro ruente turbine meridiem versus, contremiscente veluti, ac commoto Solo: Citissime tamen id desit, nec ultra horæ quadrantem perduravit. Mane sequenti serenum iterum, ac sedatum cælum, idemque totius fere mensis spatio præluxit.

VIII. Priores Februarii dies sædi admodum mœstique exitere, obducto nubibus sole, densoque velut sipario, ac caligine obvelato; Lætiores hisce successerunt ad æquinoctium usque, occidentalibus iterum per intervalla hiscentibus ventis, qui itidem ad austrum modo, modo ad Boream accedentes pulcherrimam modo, modo lætam minus rerum scenam effecere. Ediscere erat, ac veluti prænoscere ejusmodi ventorum aerisque vicissitudines inspecto Barometro; quandiu enim perspirabat ab occasu lenis aura, videbatur in media veluti statione Mercurius detineri, unoque tantum alterove gradu ab illa discedere, humilis ille, aut elatus, prout ad Austrum modo, aut ad Boream venti declinabant. Prope appetente Æquinoctio varium iterum, incertumque cælum exitit furentibus Austris; Pluviosum mox idem, nubilumque; quo usque tandem nitidus ac lucens Sol in ipso veris limine, è tenebris velut, quibus obvolutus aderat diu, emerfit lætus, beatissimosque dies incolis tulit. Beatissimi utique, lætissimi que dies, quos præclariores inter, aureoque signandos lapillo, jure merito recensere fas est, quippe qui Regiæ Cælitudinis CAROLI EMMANUELIS Pedemontium Principis Augustam Sponsam ANNAM CHRISTINAM LUDOVICAM, e Regio atque Imperatorio Comitum Palatinorum Rhæni Sanguine ortam nobis dedere, magno civium, ac subditorum omnium, exterrorumque plausu, lætitiæque. Insonant etiam-

Dddd

num

num auribus meis publicæ voces hilaritatis obstreptentium passim bombardarum tonitru exaggeratæ. Versatur ob oculos festorum ignium splendor. Occurrit animo triumphalis ingressus Majestas, ingens omnium ordinum alacritas, confertissima populi multitudo: dubium ut esset, an hæc una in Pedemontio Civitas, an totum in hac Civitate Pedemontium contineretur. Proh Superi quam festa, quam augusta pompa gaudiorum! Nec exigua quidem laus est Medicos hosce fastos tam bene auspicato, fortunatissimoque connubio, ceu præclara quædam, felicissimaque Epochæ obsignare. Annuat Deus populorum votis, ac precibus, Patrique, Avo, Proavisque simillima concessa Prole, omnigena hoc uno collata nobis, quod idem maximum est, præcipuumque, beneficia compleat, aternetque.

IX. Mirem adeo placidamque hyemem, ut è diverticulis in viam redeam, secus ac portendere videbantur autumnii initia; transegitur, vix una aut altera vice spirante Borea, sæpe quidem Occidentalibus ventis, quibus australes etiam aliquando, reciprocantibus invicem Imperiis, obsequebantur. Die Martii vigesimæ sextæ, cum Sol ad occasum vergeret, horrendis tonitribus æther circumfremente audirum, abque omni cœli parte emicare visa fulgura, nunc intermittente luce, nunc condita, effusa mox torrentis instar pluvia grandine commixta. Sævisissimus hinc, qui diu siluerat, furens Boreas, adque plures dies perdurans luctuosissimam rerum faciem, media inter gaudia, ac jucundissimi veris præludia, quæ amœniora haud extitere diu, reddiderat. Languere enim omnia illico vidimus, prataque, agros, ac nemora sidereo veluti afflatu ustulata, quæ paulo ante virentia undique, lætisque decorata floribus cernebantur. Luctuosum utique ac deplorandum spectaculum omnium oculis erat canentia circumquaque arva intueri, glacialibus usta pruinis, rigidoque horrida gelu.

X. Aprilis mense iidem assiduo, ac diro flamine perspirant Boreales venti, obscuro plerumque ac procelloso aere, sparsa quoque sæpè pluvia nivibus mixta nimboris, cum potissimum mitius rueret heu tot parens malorum Aquilo. Eadem Majo ac Junio scena si quosdam tantum dies excipias verna serenitate, ac spirantibus quandoque etefiis, quasi æstiva temperie, commendabiles. Sic veris speciem hyems tota Austrina exhibuit, cui postmodum ver suc-

cessit hyemis naturam veluti mutatis vicibus referens. Eodem modo subsecuta æstas est usque ad caniculares dies, quo tempore satis curiosum fuit lusciniæ audire pro cicadis arbuta rumpentes.

XI. Nefastum sane, & insalubrem annum nemo non præviderat, tum ob apparentia in mororum foliis signa putredinis, quæ sterilitatis Prodrroma est, tum ob pertinacissimam siccitatem telluris, arescentibus ob inopiam humidi plantis, oleribusque. Illarum pleræque media fere æstate honore frondium orbatæ, ceu appetente hyeme, videbantur. Etsi enim ver pluviosum potius signare obtigerit, quam siccum; detrimenti id tamen magis agris fuit, quam utilitatis; Nocturno nanque gelu madens adhuc tellus gelido velut rore inspersa mane conspiciebatur. Intemperatum adeo, ac ex legem omnino annum experti sumus, nulla ex illius partibus legitimam ac propriam temperiem servante, sed una alterius subeunte vices, funesto prorsus discrimine. Æstatis reliquum nunc lenes, placidique anniversarii venti, nunc spirans ex alto Boreas lætum modo, placidumque; perfrigidum modo, ac procellosum, tonitribus intermixtis, cœlique fragoribus tulit.

XII. Antequam vero ad morborum historiam me conferam, lubet pauca delibare leviter, breviterque percurrere, quæ quidem explicandæ illustrandæque morborum indoli, comparandoque eorundem genio accommodata esse videntur. Sic enim recto velut tramite una properamus ad metam, quæve inferius dicenda manent, conspicua eadem magis evadunt, ac præclariora.

XIII. Quæ altera emiserat folia Morus, (ut à Principe arborum exordiar, quæ haud exiguas incolis opes præbet,) exusta, ac veluti absumpta cernere erat, rubigine illa ne, an flavedine potius anceps hæreo; Flavedinis enim vestigia ubique aderant, seu rubiginis minus intensæ, atque ad flavum colorem vergentis. Cæteræ fere arbores, tum frugifera, ut Armeniaca Malus, Cerasus, Ficus, Nux, Olea, Pirus; tum steriles, ac infelices, ceu Cornus, Fagus, Oleaster, Salix, Tilia, Pinus, Abies; ipsa dein virgulta, arbutaque, fruges, ac hortensis universa familia haud obscura Epidemicæ huiusce (sit venia verbo) rubiginis indicia præbuere; Uvarum quoque provenus, qui veris initio aureus sperabatur, ob eandem causam nonnisi parvissimus extitit.

XIV. Quoad insecta, nunquam adeo exiguus

gens spectatus horum numerus, tum eorum, quæ primo vere, tum quæ invalescente æstate ludere quotannis cernimus, perque æra denso agmine circumferri; *Noctilucas* præsertim, quæ vespertinis horis quasi tot Phosphori æstate potissimum erumpere solent, vix paucas omnino præluce observatum. Nec dubium Borealibus id ventis tribuendum maxime, à quibus nitrosas particulas magna copia advehi compertum est. Et sane quo in loco hujusmodi insecta advolant, hæc ipsa sulphuris ibidem, quod aptissimum eorundem pabulum videtur, præsentiam comprobant, quod & insuper foetidi odores, quales ex sulphure & sale unitis percipiuntur, tum endemii iis in locis, aut per ea tempora morbi ultro confirmant, ac docent. Atque hinc quidem fit, quod in Russia, & novæ Angliæ quibusdam partibus, ubi tum hujusmodi animalcula, tum Cantharides, Scarabæi, Locustæ, Formicæ, Scorpiones, ac Pediculi alati; tum alia pleraque hujusce modi insecta raro, aut nunquam visuntur, ex vix agritudines sæviant, quæ apud nos solent adulta per sæpe æstate caput attollere, ac debacchari magis. Locustas inter nulla frequentior Subalpinis *Gryllo* -- *Talpa*, horrendo visu Insecto quaduplo maximam superante cantharidem, præcipue ætate si fuerit provectioni. *Gryllum* hanc appellari puro, quia eundem sorte cum *Gryllo* stridorem nocte appetente facit; *Talpam* vero, quia terram continuo fodit. Est & altera species Locustæ, cujus præ cæteris magna visa hoc anno soboles, *Italica*, seu *Mantis* dicta, vel quia suo adventu ver præfagit, ut *Anacreon* cecinit: vel famem prædicit, ut *Cælius* annotavit: vel quia anteriores pedes, veluti manus, supplices semper tenet, atque elatos, vatum more, qui eo gestu orationes ad Deum fundere solebant, Tam Divina censetur bestiola, inquit *Rondeletius*, ut puero interroganti de via, altero pede extenso rectam monstret, atque raro vel nunquam fallat. Pulcherrimæ aliæ locustarum species in Apulia, ac Sicilia reperiuntur, quarum altera Italicæ magnitudine, & forma similis, alium tamen ex naturæ locive dono colorem accepit: Habet enim cornicula saturate lutea, hyacinthinum ocellum, alas, ex luteo fatiscences, corpus reliquum amethystinum. Gracilis altera quinque uncias longa, cucullata, capite pyramidalis, e cujus pene vertice duo cornicula latiuscula unciam fere longa sese erigunt, galerumque

illum Turcicum biplumen, quali Janissarii utuntur, superbientem repræsentat.

XV. Prolixa esset res ea omnia recensere insecta, quæ hisce in horis sobolescere quot annis solent, quorum quidem alia perisse brevi, alia vero ne in scenam quidem prodiisse hoc anno visa; Hæc inter Erucæ potissimum enumerandæ occurrunt, quæ ceu nocendi artis oblitæ prorsus, ac veluti immemores, inertes passim per agros, ac fere emortuæ ludebant intactis frugibus. Exigua mole animalcula infesto plurimum aculeo, *Erucæ* sic dictæ, vel ab erodendo quod erodant olera, & pampinos: vel ab hærendo, ut *Apulejo* placet, quod pertinaciter adhærescant; vel a rugis quibus se se vicissim corrugant, erugantque. Distinguntur a *Moufeto* in Eterogeneas, sive affines a Papilionibus, & aureliis satas, Antogeneas sua ex tribus profectas; Utriusque innumera sunt species, ut innumera extant herbarum genera, quibus vescuntur; quolibet nanque herba peculiarem alit erucam sui vastatricem.

XVI. Ab Erucis ad Bombyces, ac Apes progredior. Præclarum utraque insecti genus, nec exigui incolis emolumenti. Aliquot illud hebdomadarum spatio albæ Mori frondea sagina sartum, idoneaque ad lanificium materia instructum edere deinceps desinit, ramulumque sibi objectum inscendit, ubi ovata figura membranaceum effingat folliculum, circumque eum bombycia stamina ordiatur, factus *Bombilius*. Neque hic prodigiorum finis. Post exhaustam lanificii materiam ejusdem folliculi cavo se abdit, occlusa omni ad exitum via; pauloque post factus *Necydalus*, hoc est, cornutus, & alius *Papilio*, nisi mature præfocatus fuerit, perfossa membrana, conscissaque stamine sibi exitum molitur. Haud minus exquisito artificio alterum *dulci distendit noctare celas*, *Alpis* sic dictum, vel quod se pedibus invicem alligent apes: vel quod sine pedibus nasci primo videatur! Pro priori ratione facere illud videtur *Virgilii*, 4. Georgicon.

Aut ille pudibus connexæ ad limina pendens.
Pro posteriori militat illud ejusdem,

*Trunca pedum primo, mox & stridentia
pennis
Missentur.*

Deplorandum utique utriusque fatum! E bombycibus enim vix pauci nitidum de pe-

Dddd 2

store

Floris filum, pretiosaque stamina edidere. Haud modica etiam pars imperfectum opus reliquit. Apes vero cernere erat incertis huc illuc erroribus ludere, favos veluti suos despiciere, & frigida testa relinquere, seram increpitantes æstatem, *Zephyrosque morantes*.

XVII. Haud minus aquaticis quoque, ac terrestribus insectis infestus annus fuit; (sua etenim aquis animalcula adsunt, ut terebraria Solo) sive id ab eadem universali, ac prope inexplicabili aeris constitutione repetendum sit, sive potius ab aquarum inopia, amnibus, fluminibusque, ipsoque etiam Pado fluviorum Rege, exhausto fere aquis, vixque ea superflue quantitate lympharum, quæ ferendis navibus sufficeret. Magna hinc piscium egestas quorum penuriam lacustres æstatim compensarunt, tum e vicino advehi littore. Fluviales inter frequentiores extans Subalpinis Trotta, Mullus, Timalus, Lucius, Anguilla, Mustella vulgo *Borza*, seu quod utri similis sit, seu quod capite ranas referat ut *Cardanus* deduxit; Lampetra a lambendis petris sic dicta: Nobilissimus semper tum a veteribus, tum a modernis habitus Piscis, & Apiciis esui mire expetitus. E lacustribus principem sibi vindicat locum *Umbla Allobrogum*, quasi umbra, seu quod haud exiguum cum umbra pisce fluviali similitudinem habeat, seu quod tergus præ multo livore opacum, & veluti umbrosam appareat: *Rondeletio* Salmo lacus lemani, quod corporis specie, pinnarum numero, situque, & partibus internis Salmonem referat *Umble Chevaliere* communiter dicitur, forte ob magnitudinem, præstantiam, & robur.

XVIII. Fabulosa non minus quam ridicula de Anguillarum ortu, ac propagatione nobis tradidere tum vetetes, cum recentiores. Incertum diu, saltem nec exploratum satis, an viviparæ forent viperarum ad instar, an revera, ut cæteri pisces, oviparæ: quod postremum haud ita pridem felicissimo conatu detexit Doctissimus ac Præclarissimus *Antonius Valliserrius*. Comparatum id, ac proprium veluti est magnorum Virorum, cum verum retegere se haud posse norunt, fictitium aliquod in scenam promere ac fabulosum. Sic Jovis hæc filias nonnulli olim credidere referente *Asbæneo*, ut Deorum munera fungos alii, & subera pronuntiarunt; Haud aliter quidem ac Magnates, aut Reges, quibus vel brevi terminata ævo, vel incerta origo est, consecrare illam, adque Deos auctores, aut

Heroum quempiam remotissimæ ætatis referre consuevere. Abjecta ex adverso quidam iis incunabula dedere, limoque ac ceno ortas putarunt; *Quid enim fecundius illo?* Sed hæc, & his similia, ut & ea quoque quæ hac in re ridicula prorsus apposuit *Aristoteles*, ut ut antiquitatis laude præclara, haud in magno equidem ponam discrimine. Mirari id magis subit, ut eruditi alias, ac percelebres fama viri, vel nuperimis hisce temporibus viviparas illas adhuc decernere auferint, suæque Posteris figmenta commendare. Quodve mireris maxime, exiguum nobis vesicam in abdominis cavo locatam, in qua sæpe vermes latent, quamve in omnibus fere piscibus, avibusque, imo & in canibus aliquando, ac plerisque brutis videre est vermiculis confectam, hanc inquam vesicam pro utero Anguillarum, vermesque ibidem latentes pro anguillarum foetibus imposuere. Atque hæc libenter etiam concedam; Nec etenim refutandis hisce fabulis tempus suppetit. Danda hæc viro venia, quod præjudiciis occupatas quorundam mentes, *Leeuwenhoekio* Duce, ac antecessore, densioribus potuit tenebris obsolvere, vel dum clarius, ac dilucide magis perspicui ab illis credebatur. Quod vero quidam asseruerint se in prægnantis anguillæ utero undecim anguillas exsecuisse singulas suis secundinis inclusas, ut *Charletonus* affirmat, sive ut *Elfnerus* ait, in diversis membranis involutas; id ego haud patiar unquam Posteris impune tradi. Aut enim, quod sibi affinxere animo, ceu visum, ac perspectum oculis nobis dederunt; aut si ejusmodi revera anguillulas in abdominis cavo intueri est aliquando, vermiculos eas quidem fore crediderim, minime vero unquam veros foetus anguillarum. Quod vel ipse quidem *Aristoteles* adnotavit, nec tamen unquam in mentem subit Viro, si illius avi caliginem, barbariemque maximam perpendimus, vere doctissimo, præfatos vermes pro anguillis agnoscere, quinimo adversus illos, qui hosce veros ac genuinos esse anguillarum foetus contendebant, acriter admodum insurrexerat; in quo sane haud exiguum promeruisse laudem videtur. Id ipsum quoque eleganter non minus, quam docte adverterat Præclarissimus *Redi* Hetruriz suæ sidus fulgentissimum in aureo tractatu: *Delle osservazioni intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi*.

XIX. Adverterat sane præfatus Author, atque

atque e viviparorum classe rejiciendas anguillas contendit. Earum tamen ovaria nemo ante prælaudatum *Vallisnerium* vidit unquam, aut revelavit. Manebat enim Sapientissimum Virum, ac naturæ arcanorum perscrutatorem solertissimum, Philosophos inter ac Medicos hujusce sæculi celeberrimum, ac jure merito Principem, honos ac laus, quæ ad hæc usque tempora latuerant ovaria Anguillarum, in lucem vindicandi. Manebat inquam doctissimum Virum inventi gloria, eo præclarior illa, quo obscuriora, ac cznosiora, ut ita loquar, adsunt earundem anguillarum primordia, ac incrementa, Cernere est hæc ipsa ovaria secus Spinam porrecta adiposis ubique striis circumtexta, tenuissimaque membrana obvelata, qua detracta ovula occurrunt, ceu totidem exiguissimi, ac lucidissimi Uniones, suo singula annexa pediculo, per quem nutritii roris vestigial suppeditatur. Præclarior id, ac illustriori modo spectatur prægnanti anguilla. Quæ cum rarissime occurrat, quod tum temporis, ut Cl. Vir observavit, ima petat aquarum; haud mirum hinc quod tot hæcenus magnorum eluserit ingenia virorum, obscurumque id, additumque magis obscuritas ipsa originis fecerit. Laudato utique *Vallisnerio* nostro, *Paulinus* præluxit, huic in eadem arena *Severinus*. Is genuinum anguillarum uterum primus vidit. Ille etsi ova haud inspexerit unquam, ex iis tamen illas nasci, naturæ legibus doctus, contendit: Nos, sic ille ait, ut omnia animalia ex ovis, seu seminis suis, sic etiam anguilla, ex iis nasci dicimus, licet *Plinius*, *Aristoteles*, *Jo. Vossius*, *Scottus*, cum aliis pluribus ova, semenque denegent, clamantes ullam nunquam captam esse, quæ aut semen genitale habuerit, aut ova. Hæcenus de Anguillis.

XX. Exacta vix hyeme advenerant Hirundines; citius quoque, quam olim confueverant, eadem discessere. Cæteræ fere aves, tum quæ statis temporibus redire solent, tum quæ totius anni decursu hæc inhabitant, oras, rarè admodum extitere. Rarior præ reliquis visa *Ficedula*, exigua avis, sicubus, ac uvis victicans, ut pulchre his versibus testatur *Martialis*;

Cum me ficus alat, & pascat dulcibus uvis;

Cur potius nomen non dedit Uva mihi;
Idem pariter canoris satum avibus, iisque præsertim, quas vocant *insectivoras*. Secus coturnicibus obigit, turturibusque, quarum

ingens omnino copia conspiciebatur, ut & reliquarum fere avium, quæ plantis vescuntur; Has inter postremas, si colorem, pulchritudinem ac elegantiam spectamus, merito superbit *Pavo*; Si *Apicii* credimus, Principem sibi comparat locum, ac dignitatem *Urogallus*, seu *Phasidis ales*, sumpto forte a *Cholchidis* amne nomine, ad cujus ostia illos frequentes convenire a *Græcis* proditum est; unde mox citatus *Martialis* in *Xenis*:

*Argiva primum tum transportata carina,
Ante mihi notum nil nisi Phasis erat.*

Horum duas habemus species; quarum altera major vulgo dicitur, ac toto fere corpore nigricat; Minor altera nuncupatur, ac cinereis maximam partem plumis vestitur. Majo mense spectata huc illuc obvolare *Avis*, ignota prorsus incolis, mole *Turturis* majoris ad instar, fulgentibus plumis, ac prope subflavis. Vifa, & altera invisa hæcenus properante æstate, rostro contra omnium avium morem ab utraque parte recurvo: colore juxta collum subviridi, reliquo corpore, subobscurato, brevi pede, aliisque, ac cauda exigua: *Loxiam* crediderim *Gesneri*, seu, ut alii vocant, *Curvirostram*. Ignotas ejusmodi aves unusquisque fere annus, ut morbos, producere solet, quæ statim ac se se circumvolando prodant, citissime effugiunt, adque diffitas longe oras emigrant.

XXI. Neve intactum quidquam præteream, quod ad illustrandam, exornandamque morborum historiam quoquomodo facere videtur; numerosa hic subit haud reticenda Leporum, ac Cuniculorum spectata hoc anno progenies, *Glirium* itidem, *Alpinorumque Murium*, *Talparumque*; Ne scilicet defuisse forte videretur in omnibus Natura; aut quod, idque ego putarim magis, toto existente anno magna sui parte inpluvio, dehiscente præ ingenti siccitate solo, ejusmodi animalibus, quæ alias cuniculos sibi fodere in agris, ubi lateant tum æstate, tum hyeme, solent, haud ita facile fuerit cubilia sibi condere; proindeque excurrere illis pro lubitu necessum extiterit, perque arva, camposque parentes e propriis velut expulsa sedibus ludere, ac oberare. 5. Ventriculi janitor liena quadam transversa veluti ligatus atque distinctus. 6. Larynx qualis in testitudine terrestri; Mutum enim animal. 8. Panniculus carnosus

sus totus, & mire commissus cuti. 9. Pro Optico nervo fibrilla, quæ secta guttam unam, atque alteram aquei humoris, ceu roris effudit; eaque insuper, non e consueto loco, quo exire solet Opticus nervus, sed a perreptantibus per cerebri meatus vasis, egrediebatur. Atque hæc quidem in *Talpa*. In *Marmota* vero, seu mure alpino sequentia cernere est; Cæcum peramplum, interne asperum, & reticulatum, in quo valvula insignis introrsum externe; Hepar septenis lobis distinctum; Testes aliquantulum superiores; Splenem longum hirundinis majoris modo; Ureteres non recto ductu descendentes a renibus, sed dorso adherentes, & exiguos. Verum de hisce satis.

XXII. Neve diutius in iis, quam par est, recensendis, immorer, utque omnia in unum recolligam, *velaque*, ut ajunt, *traham*, & *terris festinem advertere proram*; Lætissima, ut adnotavimus, exordia Autumnii exitere; lætissimus hinc quoque futurus annus, si quem, *rupto cœu aggere torrens*, ruens immitis, ac sævus Aquilo vix orto Autumnio haud funestasset. Præmatura hyems, ac extemporanea prorsus; Mitior eadem, ac Veris temperiem redolens, cum magis sævire debuerat. Ver illi successit imbriferum, perfrigidum, luctuosum, qua dein furentibus præter morem, appetentem solstitio æstivo, nunc ab Austro, nunc ab Arcto ventis reliquum anni ad æquinoctium usque, ingens, ac pertinacissima diu vicens siccitas memorando ac pene infausto eventu persolvit. Obsignare hinc licet, *nigroque cortice* adnotare annum præ nimia siccitate reluris, ventorumque ludentium indole exlegem penitus, præbente natura, quod exiguum nobis dedit, indignabunda veluti, ac tanquam dira noverca, quæ rerum olim sedula Parens dici gaudebat. Quæ sane haud arduum erit conjicere, si quæ allata hætenus sunt, tum quæ adjiciam deinceps, scite diligenterque expendamus.

XXIII. Ad morbos me conféro, quo vulgares appellare lubet, non equidem, quod in vulgus sæviant, ac infimæ tantum fortis, ac notæ homines laceessant magis; Sed quia vicissitudines temporum, ac discrepantes invicem annorum tempestates referant potius, ab iisque procedant. Ac primo febres occurrunt, quæ omni deposita ineunte Autumnio larva, intermittentium revera typum, ac morem præ se ferebant. Luserant tanque illæ diu superiore anno sub inter-

mittentium personato vultu, quo tandem omni abjecto fucose sese tales jam modo ostenderant, quarum ingenium olim simulaverunt. Quinimo plerosque horum, quibus acutæ ægritudines in chronicas sensim fatiscente æstate desierant, orta repente Autumno febris e tertianarum genere brevi restituit. Lætam hinc augulari fas erat Taurinensibus rerum scenam, si hanc extemporaneis flatibus erumpens Boreas, aut huic per intervalla succedens, ac sevissimo ludens Auster haud immutassent.

XXIV. Et quidem vix hos, ac illos indiscriminatum benignis intermittentibus exaratis febribus correptos adnotaveram, vix novam rebus faciem illucescere adverteram; Ut mutatam hanc iterum extemplo vidi, ac veteres primo aspectu reviviscere morbos, qui recens elapso anno longe lateque regnarunt. Atque id sane probe expendendum Medico est, antequam quid statuatur decernatque ad curationem morborum conducens; Num scilicet reviviscens morbus, aut eandem fere cum iis, qui superiore tempestate luserant, referens imaginem, iisdem vinendus sit artibus, eodem ac qui præcessere, subigendus mare; Num vero quidam potius habendus respectus sit ad id ægreditum genus, quæ novissime in apertum prodierunt; quibusve jure ac merito vulgari totius anni morborum imperium debetur, ac dominatus. Sæpe ego in hac incertus arena extiti; ac tandem rationem habendam esse mecum ipse decrevi ad novam, quæ in scenam emergit, morborum sobolem, etsi hæc non omnino adhuc sese revelaverit, suumque omni relicto simulationis artificio vultum haud explicaverit prorsus. Eo quidem consilio, quod nempe nova orta tempestate, quam inter, ac superiorem magnum inest discrimen, novus hinc quoque fluentibus per additas corporis scaturigines, ac profundissimos recessus liquidis, solidisque una ludentibus, ac conspirantibus invicem, novus inquam vigor accesserit *totus mutatus ab illo*. Ut proinde etsi redire quandoque, ac remeare gradum iidem videantur adolescente Autumno morbi, qui exacta æstate sævire, quid tamen latere intus æquum suspicari sit, quod doctiores sæpiissime fallit, ni ea omnia, quæ mutatis invicem tempestatibus emergunt, attente expendantur. Quod quidem, quantum intersit Medico nosse, & observare, jam suo tempore agnovit, graviterque inculcavit *Hippocrates*: dum ita librum suum de

de aëre, aquis, & locis auspicatur: *Quicumque artem Medicam integre assequi velit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat. Non enim simile quidquam in illis existit, verum differunt invicem propter varias, quæ in illis fiunt, mutationes.*

XXV. Sane si recta mentis lance ingruentium Autumno ægritudinum indolem perpendimus, facile erit conjicere, quænam harum toto vertente anno regnatura sit, ad quam scilicet cæteræ omnes, quæ subinde vagantur, sese referunt, ac sub illa quodammodo militare videntur, ceu stipendio conducti milites. Ejusmodi aderant affectus ii omnes, qui tum per Autumnum, hyememque, tum vere, ac æstate subluferant, agmen ducentibus, ceu Epidemicis primi ordinis, quasque ob id Epidemicarum hoc anno ægritudinum Principes merito salutare lubet, intermittentibus febribus jam explicatis, tum fuscæ modo, diligenterque explicandis. Ut enim eas cæteræ omnes, ceu initio inter se invicem pacto referebantur, fecemque hæ tulerant reliquis; Sic hæc primo describere æquum est, ac sub oculos ponere, quo præclarius deinde reliquarum ingenium elucescat.

XXVI. Vix itaque Libram æquis itineribus subierat Sol; ut illico tum qui per ante æstam æstatem agrotaverant diu tum qui agrotabant adhuc, infertisque passim ac diuturnis morbis confictebantur, quales superiora tempora attulere, tum qui ægrota- rum cœperant primum, inque morbos incidere; hi omnes fere ejusmodi indolis, ac familiaris febribus decubere. Visi nanque tum plures quidem inopinato e diuturnis malis, hujusmodi oborta auspiciato febris, convalescere, ceu eum Thaumantis, & Electræ filia pulcherrima Itis post diuturnos imbres, nimbosque perennes, præfulgere tandem nubes inter, atrumque cælum videtur, futuræ serenitatis prænuncia.

Mille trabens varios adverso sole colores.

XXVII. Sperare fas erat Itidis instar ejusmodi febres post tot exaratas, quæ superiore anno dire admodum, insolenterque debacchabantur, ægritudines lato omine elucere tandem, pacemque ac tranquillitatem rebus, sedato malorum turbine, allaturas. Nec sane vota omnino sefellit exitus. Etsi enim sese abscondere quandoque viderentur, ac prope extinguere; Haud difficile tamen erat, cernere lusum id esse, jocumque, quo sæpe solent vulgares hujusmodi affectus,

quibus inconvulsa præbet Autumnus, ac potissimum horum Princeps, Medicorum artes eludere, ut doctè advertit Sydenhamius Anglorum Hippocrates. Videbantur siquidem modo Asthmatis larvam præ se ferre modo Arthritida simulare vultu, nunc etiam sapissime quæ sub ficta doloris Colici imagine dirum in modum agrotantes divexare; Ut infinitas nocendi artes præteream, quibus hos atque illos nullo discrimine aggrediebantur, Ars hinc erat Medico occultum hostem, insidiasque struentem, vel ima inter delubra, sanctioresque lates appetere, oppugnare, subigere, iis quidem telis, quibus præfatæ febres subigi consueverunt. Quos nanque simulata illa, ac dolorosa mali facies plerosque sefellerat, ægro- tantes hi suos aut inevitabili fato dederunt, aut graviora iis discrimina attulerunt, celerissimamque jacturam, Adeo sæpe *Delirant Reges, plebuntur Achivi.*

XXVIII. Si qua tamen sua larva sublu- dere hæc febres frequentius advertitur, diroremque in morem miseros agrotantes exercere, vagus ea quidam, ac incertus dolor abdominis aderat, sævaque tormina, quæ stasis sæpe etiam horis, ceu ludere periodicas febres videmus, recurrebant, eundem prope typum servantia, ingeniumque, ac eadem fere tempora, quibus præfatæ febres circumscribuntur. Ac quidem meminisse obiter juvat exarata ventris tormina, quæ dire modo, crudeliterque sæviebant, jam tum *Julio, & Augusto* (ann. 1721.) mense per æstatem prodixisse in lucem, quibus, tonitruosus cæli status, procellosus idem, ac sæpe etiam grandinosus, subfrigidusque ad plures dies proluserat, qualem deinde appetente *libra*, ac toto passim Autumno experti sumus. Cudebantur scilicet jam tum illa, quæ postmodum sese ostenderant, mala, cœperantque foras erumpere, ceu impatiens moræ hostis præceps ruit ad pugnam, aut nulla vi coercitus torrens oppositas extemplo moles, tum obvia quæque repagula disiecit, atque disturbat. Pagina mihi deficeret, si quotquot ejusmodi ventris cruciatibus divexatos stemini, recensere velim, quos tamen facile erat, ac prodigii instar, ab imminente exitio vindicare, ea adhibendo præsidia, quæ comitem, aut latentem febrim respicerent, Practicis usitata. Hujusmodi ventris dolores hujusce indolis febribus succedentes, aut iisdem complicatos jam pridem adnotaverat Vir Doctissimus *Carolus Pifo* pro Coicis habitos, quo-

quorum causam aeris constitutioni *calide* impenſe, & *siccæ*, qualis revera hæc ipsa nostra, Autumno præſertim, ac hyeme, toto proinde anno, si modo ver excipimus, extitit, idem adſcribit.

XXIX. Equidem si prægreſſam tot annorum ſiccitatem adhuc dum vigentem, conſtantemque hætenus, tum certantium invicem ventorum, qui tum ante acta æſtate, tum Autumno, ac toto deinceps anno aſpirarunt, vim feritatemque animo metimur; Conſpicimus utrique, ac dilucide nobis innoſcit, quænam extiterit ejuſmodi febrium, ac ægritudinum, tum harum præſertim, quæ abdita imi ventris loca obſidebant, origo, ac incrementum; atque, ut rectius loquar, quodve ſedulo inquirendam, adnotandumque Medicis præcipit Magnus ſenex, *occaſionis initium*, a qua omnes hæ ægritudines profluxere; Ecquid enim ab inertibus liquidis, ſero utpote ſere omni defraudatis, nec libere amplius in orbem agi potentibus, ſolidisque hinc quoque pari modo labentibus expectandum erat, quam *internæ viſcerum Syſtrophes*, atque in iis locis, per quæ aut inertioſa ſuæ indolis liquida excurrere ſolent, aut eadem magis ſeri præſtantiam eſſagitant, quo facilius circulum ſuum, ac munus abſolvant? Genuina hæc, ac poſſiſſima febrium intermittentium, quæ toto hoc anno ultro citroque progrediebantur, cauſa, quæ & eadem quoque cæterorum morborum fuit, qui memoratis febribus præluxere, aut hæ illis lampada tradidere.

XXX. Et ſane uno omnes ore quotquot hætenus in hæc arena inſudarunt, febrium periodicarum incunabula in Ventriculo, ac primis viis, Pancreate, Meſenterio, finitimisque, ac per imos quoſque recessus diſcurrentibus vasis poſuerunt: Uno verbo mineram febrium intermittentium, ſedem, ac *Principem*, pene dixerim, *aram*, ut *Sylvio*, ut *Villifio*, ut *Sacbo*, ut univerſo ſere Medicorum cœtui placitum eſt, ipſa eadem organa ſuppeditant, comparant, præbent, quæ conſciendo, ac diſtribuendo Chylo ſamulantur. Quandiu enim Ventriculus, Intestina, Hepar, Lien, Meſenterium, Pancreas conſtitutum ſibi quæque munus rite perſolvunt, ſive excoquendis illa, retinendisque alimentis quo uſque; in maſſam chymaceam abeant, & qua data porta ſecedant, exprimanturque, dicata ſint; ſive perſciendo ulterius perque revolutos anfractus, ac *itinerâ nulle* ſerendo, devehendoque chylo; ſive quosdam peculiareſ ſuccos

elaborando inſerviant, quorum effectus varii, ut varia horum indoles eſt, ac ingenium; Quandiu hæc omnia inquam rite peraguntur in corpore, *ſarta tæctaque* res eſt, ac incolumis. Ubi vero, aut exarata organa idonea minus evadunt comparato ſibi abſolvendo muneri, aut emanantia, perennique alveo influentia in cavum Duodeni liquida, tum quæ ipſa intima ſuperficies inteſtinorum minutiffimis undequaque glandulis obſita jugi fluore extillat, inertiora manet, ſpiſſiora eadem, aptaque minus ſeſe uda cum præterlabente Chylo commiſcere, vias expedire, menſtrui adeo, ac vehiculæ munere fungi, fibraſque motrices ſtimulare, acria ſalina obtundere, coagulata dividere, *fermenti*, ſit verbo venia, vicem gerere, cruda coctis aſſimilare; Quis quæſo erit aditus Chylo lactearum oſcula ſubeunti: quis illius per *galaxiam* iter: quæ ejuſdem ad *receptaculum Pecqueti*; adque Thoracicum ductum, ac ſubclaviam tot inter oppoſitos aggeres, atque obvia paſſim molimina proſectio, excuſus, meta? *Chyli* inquam, *Chyli*, ſi enormem illam temporum ſiccitatem expendimus a nativâ ſui qualitate degeneris proſus, ea nempe orbatî portione ſerj, qua ſine nec miſcibilis ipſe cruori, nec ire, ac remeare vias par eſt, per quas excurrere debet, ac pergere.

XXXII. Effingat ſibi quique magnum ante oculos amnem, e quo innumerabiles rivuli exoriantur, qui in alios ſubinde exiguos amnes, mox in unum tandem una omnes, ac majorem alveum coeant, exonerenturque. Ut pulchrum, ut jucundum viſu eſt, puriſſimos modo, ac limpidiſſimos latices cernere ingenti flumine præterfluere, ſuborientes hinc rivos circumjectam planitiem amœno ſpectaculo irrigare, variisque flexibus, nullo interpoſito obice, illabi, quo in unum deinde amnem una omnes evadant, ubique fontibus ſuis ſimiles. Fac cœnoſum quidpiam leniter labentibus aquis commiſceatur, aut aliud quodpiam ſolidioris naturæ, puta, trabes, ligna, ſaxa, quod placide manantium lympharum alveum turbet; Ut illico aut exundare aquas in oppoſitam ripam, aut eaſdem ad diverſa amnium divortia ſiſtere veluti gradum, ac ſtagnare videbis, exurgente lacu, ubi antea tellus erat, ac viride Solum. Idem prope obtingit Chylo, ubi craſſioribus moleculis reſertus, deficiente utpote ſero, quod craſſa diluat, eumque ſanguini miſcibilem reddat, ineptus, ac impurus idem obvia ſubit oſtendit,

la, ac degener omnino Thoracico ductui sese insinuat. Quot enim concipere est futuras tot inter vasorum plexus, ac angusta viarum præterlabentis liquidi stases; quot res tam prolixo itineri remoras, obicesque.

XXXII. Hæc una quidem, ac præcipua febrium intermittentium causa; Una hæc, ac genuina crudelium adeo ventris cruciatuum, totque passim ægritudinum, quarum sub larva, ac simulato vultu ejusmodi febres ludebant, incunabula, ac incrementa: Uno proinde iis omnibus eodem ense, ac more subigendis, ac edomandis. Ut a probo, ingenuoque Chylo probus, ac ingenuus sanguis efficitur; Sic ab improbo eodem improbus quoque cruor emergit, ineptus scilicet, cum perennando circulo, tum nutritioni partium, quæ summa sane res est, ac reliqua inter œconomix animalis munera præclarum magis, & majoris momenti. Tanta adeo molis erat tam ingentem instrumentorum apparatus effingere, quæ tanti ponderis opus absolverent! Non hic quippe advocandum ullum in scenam acidum, non pituita præter modum viscida, non fermentum aliquod, aut duumviratu humorum, non *Archæus Helmontii*, aut *Lemures* indigñati *Dolai*; Quæ quidem pituita, seu materies in venas effusa, & partibus spirituosæ sanguinis permixta potis sit tot excitare turbas, ac febrilem tempestatem inducere? Hæc & similia aberrantis ingenii somnia *Etmullero*, *Sylvio*, *Villifio*, *Dolæo*, eorumque assæclis sibi pro lubitu affingenda, ac excogitanda facile concedam, utpote qui ea tantum mihi retinenda dudum constitui, quæ in magno Naturæ libro ediscere est; quæ rationi, & experientix rerum magistræ consentanea video, minime vero ea, quæ vanæ hominum mentes somniarunt. Veram utique intermittentium febrium, multarumque hinc ægritudinum, quæ aut illis præcludere, aut iis obsequi advertimus aliquando, causam, ac genuinum fomitem in ventriculo, ac intestinis tenuibus colloco; tum cæteris, quæ iis prope adjacent, partibus magno Chylificationis negotio inservientibus; Quin acidum, aut fermentum quoddam mihi effingam ibidem hærens abditumque decantatum adeo, invisum hætenus. Tantum nimis sectæ amor, condendorumque systematum inanis ambitio posuit suadere malarum!

XXXIII. Profecto si liquida expendimus in maxima illa siccitate temporum sero orbara, æstuantemque adhuc intra præcordia

cruorem animo cogitamus; si memoria recolimus ante ætas superiorum annorum ægritudines a præservido sanguine ortas, si luctuosam illam rerum faciem calidam impense, ac siccam nobis iterum ante oculos ponimus. Si alimenta denique, quæis vescebantur incolæ a terræ sinu deprompta, olera, ac fruges, tum ipsas animalium carnes præ ariditate Soli exsuccas veluti, ac pene aridas in mentem revocamus: Liquido constat magnam jam tum impendere liquidis jacturam, majorem longe illam futuram ad primos inclementis Boreæ flatus, statim ac obstipata penetrabili Aquilonio frigore cute captiva intus fluida, adque *concretionem*, ac *flasin* heu prona nimis, hyemis acerbitatem sensissent. Ni forte, quod secus evenit, adproperans Autumnus, madefacto latis imbribus Solo, mitioreque reddita aeris temperie temperamentum quoddam periclitantibus rebus præbuisset; quominus occurrerent, quas timebamus, seri jam prope inertis, ac visceri congestiones in vasis lymphaticis, venarumque extremitatibus; Nacta hinc libertatem liquida, ac soluta vinculis, cumque illis vicissim consentientia solida datas æquilibrii leges ad amussim obtinerent, ac observarent.

XXXIV. Secus tamen, ut dicebam, evenit prorsus; Autumnus nanque successit, nunc ingenti inopinato æstu, qualis ne superiore quidem æstate sævierat, præservidus maxime, nunc repentino extemporaneo frigore pergelidus admodum, quanto heu fluentium per corporis abdita, *cecosque meatus* dispendio liquidorum! Quanto iridem solidorum conspirantium detrimento! Vestros revocate animos Subalpini Medici ad præteriti nuper anni, tum præcedentium duorum annorum memoriam, quorum ego historiam sin minus eleganter, ac docte, summa saltem fide, ac diligentia, quod in historica potissimum narratione expetitur, conscripsi. Expendite cujusnam indolis aderant tunc temporis liquida, quæve eadem more ad Hyperboreas præmaturo flamine erumpentes auras sese habitura forent: Conspiciet hinc nempe vestrum quispiam, quæ aut tum eudebantur erupturæ brevi, aut sævire jam tum cœperant per universum Subalpinorum tractum, ægritudines; Atque hinc etiam præsidia facile adinvenire erit, quæ proficua extitisse deî temporis eventu adnotavimus. *Sapientis est* asserere malis remedia; Futura prænoscere, ac velut e specula prævidere, *Divinum*.

Eccc

XXXV.

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

XXXV. Equum est modo ejusmodi februm expensa intime, ac perlustrata generis, earundem ulterius genium, ac typum delineare paucis, tum quibus usi sumus, auxiliorum genera ad illas profligandas, abigendasque enarrare; Antequam ad ceterorum affectuum historiam progrediar, quorum ut idem cum exaratis febribus ortus, eadem quoque aderant, saltem vix discrepantia, phaenomena, quibus manifestabantur. Statim hæ igitur, ac prima fere accessione, intermittentium morem, ac vultum præ se ferebant, si postremum tantummodo stadium excipias, quo eadem solent, qualibet vice, ingenti oborto sudore, judicari. Nonnullis de tertio in tertium diem; Plerisque ad singulos dies febris recurrebat, plena tamen inter duos quosque paroxysmos intercedente apyrexia. Quandoque etiam continuas æmulari videbantur ob longiores, & duplicatos paroxysmos; Vix paucis per autumnum in acutas periculosas desisse visæ. Per hyemem vero, & reliquum anni multis, ac potissimum æstate, Lingua omnibus fere alba; Urina turbida, & impenso rubens; Dolor capitis ingens, atque assiduus cum inquietudine quadam totius corporis; Pulsus lenis ac obsequens, nec inchoante febris citatus nimis, nec properante ad statum illa elatus magis; Vix exiguus sub finem accessionis sudor; Tormina quibusdam abdominis sæva admodum, dirioresque, ac ipsamet febris, tragædiam ludentia, nec facile desinentia eadem, quinimo exhibitis anodynis, oleosis, purgantibus invicta magis, atque iracundiora. Nullus initio vomendi conatus, nullum vel levissimum nauseæ vestigium, nulla prorsus oris amarities, consueta olim febrium prologia, earumque comites. Nonnunquam commutabantur invicem quotidiana intermittens, ac tertiana simplex sic dicta, subludebantque vicissim. Atque tum quidem cum hoc illæ pacto errassent dudum, in acutas demum Vere plerumque, ac æstate degenerabant, celeri ægrorum fato, nisi in doctum, prudentemque Medicum bona forte patiens inciderit.

XXXVI. Sæpe hinc memini hæc, ut malignas, statim, ac omnimodam continuitatem simulare videbantur, a plerisque tractatas fuisse, cujus imaginariæ, & commentitiæ malignitatis de causa, innumera hi præscribentes alexipharmaca, calida, volatilia, & mille id genus inter se pugnantia remedia, quod præcavere crediderant, periculum advocabant. Quos heu simul hæc

malignitatis, ut verbis utar Clarissimi Baglivii, jugulavit, quos facile erat ab interitu vindicare inspecta mali origine, ad quam, tanquam ad Polum, ac Cæli verticem dirigi omnis debuerat Medentis cura! Naturæ scilicet oraculis, & Magni senis præceptis auscultandam, quæ si attentius excolerent Medicorum filii, haud equidem eveniret unquam illos adeo turpiter hallucinari, naturæ morbi tribuendo tot gravia passim symptomata, quæ rectius soboles sunt depravatæ methodi, tracto nimirum in consortium necis, qui idem insons etiamnum erat, sanguine præpostero usu remediorum.

XXXVII. Sane si earundem febrium tum maxime, cum intermittentes esse desierant, inque acutas migrabant, indolem propius spectabamus, & morem; quidquam adhuc observare erat, quod etsi intime latens, occultumque prorsus, prioris morbi ingenium referebat, ut fere idem adhuc ooulatoribus videretur alterius larva ludens, cujus ille personam induebat. Videre erat sin minus in oculis, ore, ac vultu ægrotantium, in ipso saltem febris circuitu quidpiam, quod præsentem adhuc veterem febrem significabat, eodem illam confodiendam gladio, quo hætenus subigi ejusmodi febres solent. Quodve mirere magis; nedum exarata febres, tum quæ typum intermittentium toto sui decursu observarunt, tum in acutas abiere, aut ejusmodi ab initio extiterant aliqualem adhuc tamen præfatis intermittentibus morem gerentes, iisque quodammodo obsequentes, hac methodo felicissime tractabantur: Sed & ipsæ quoque, in quibus nulla fere intermissionis vestigia unquam, præluxere, hoc eodem more citissime, ac tuto jugulabantur. Citissime quidem, quævis nanque hac in re mora, aut dilatio periculosa, quæ perniciosos sæpe effectus protulit.

XXXVIII. Postremæ hujusce indolis aderant, quæ Januario, ac Februario mense prodierant, deletis tum pene, saltem delitescentibus hætenus memoratis febribus, quæ ante actō Autumno subluferant. Hisce primo tantum, aut secundo accessu levissimus horror præcesserat. Sæpe etiam nullo, ac exiguo quidem præludente horrore irascebantur, atque ita decurrentes quasdam tantummodo diebus imparibus exacerbationes sustinebant, ut revera quid in iis tertianarum circuitum redolens suspicari fas esset, etsi primo aspectu nihil omnino hujusmodi apparet. Nec difficile quidem erat harum ori-

originem explicare memoria recolenti, foret liquidorum per Autumnum conditio; quis una invicem oscillantium solidorum status? Nil inde mirum, si quæ vigente frigore intermissionis tantum signa protulerant; silente mox Borea, ac præmaturo æstu excandescantibus, intus cohibitis diu obque ingentem resolutionem propriæ humiditatis, ut antiquissimo verbo utar in hac parte, exustis succis, ac bile præsertim, quæ sane in naturalis Oeconomix Theatro Principem vicem obtinet; eadem ipsæmet febres in acutas dein abierint, aut tales sese ab initio ostenderint, ceu fieri passim videmus media æstate.

Arida cum sitiens excoquit arua Leo.

Observare erat subcontinuas hæc febres, (sic illas vocare lubet ob continuitatem paroxysmorum) etsi nullo plerumque horrore præunte vestigio subluderent, quidquam tamen præ se ferre molestum ægris, quod quidem citissime evanescerebat, ingenti succedente æstu, qui idem & sese celerrime expandere videbatur, & intimiores quotquot recessus, atque ipsa adeo præcordia momento temporis pervadere; ceu pici, & resinæ evenire novimus, dum succeduntur, quæ licet crassam habeant compagem ocysime inflammantur.

XXXIX. Idem erat tum harum, tum quæ iis proluferant, febrium ortus idemque apparatus, etsi pro varia æris temperatione intermittentium modo indolem æmulerentur; modo intermissione paulatim perditæ ad acutas tenderent; modo omni relicta intermissionis effigie subcontinuarum morem præ se ferrent. Utque brevi me expediam; Exaratas succorum crassities, ut focum, ac incunabula intermittentibus febribus, quæ primo in scenam prodierant, præbuit, eadem cæteris incrementa dedit, cum primum remitti frigus hyeme cæpit, verisque hæc potius, quam hyemis speciem referre. Totum adeo quod metuendum erat maxime a crassitie, ac inertia succorum, ac bilis potissimum, ut hanc unam pro cunctis asseram, vitelline ut ajunt, præssine, eruginosæ pendebat, cujus haud obscura vestigia petere erat ab ipsis excretis jam tum quidem, cum coercita hæc adhuc ab ambientis frigore, nec irasci potens, ac suoapte ingenio excandescere, febres tantummodo intermittente attulerat. Quantum vero ejusmodi humorum excretio, sive sincera, sive variegata sit, Medicis facessat negotii, norunt Practici; Quotiescunque enim

apparuerit illa, dat semper ansam suspicandi aliquam pravitatem subesse, quæ morbum reddit non contemptibilem, etsi aliqui mitem, quod & Hippocrates docuit.

XL. Mites utique aderant, quandiu intra intermittentium limites consistere, etsi minime contemptibiles memoratæ febres facili tum Marte superandæ; Ubi vero sævientibus inopinato Austris in subcontinuas eadem degenerabant, aut ab ipso statim sui exortu toto penitus cælo ab intermittentibus distare videbantur: Quibus hic quæso artibus enitendum, quibus occurrendum præsidis, vi quorum ægri ab imminente exitio tuto possent evadere? Nullus hic induciis locus; Nulla hic Fabio spes; quæ cunctando possit restituere rem. Talis siquidem adest ejusmodi succorum natura, & conditio, ut nullam ferant, advertente Mercato celeberrimo suorum temporum Viro, & duorum Hispaniæ Regum Philippi Secundi & Tertii Protomedico, in exhibendis auxiliis moram, cum certum sit nullum posse beneficium, gratiam, aut collisionem a natura recipere, imo, ut inquit Averroes 3. collect. corrumpant formam specificam illius. Magna cæterum remedia ex mente laudati Authoris, qui perniciosarum hujusmodi febrem a crassis, adustisque succis originem ducentium descriptionem æque, ac curationem distinctam pro viribus illius sæculi incomparabili sedulitate complexus est, hic nullum fere locum habent; Etenim si de purgatione sit sermo: caute id facies, inquit Vir doctissimus, sive enim purges, sive seces, periculo res non caret; Quippe scimus vel levissimis pharmacis gravissimas accersiri dysenterias, quod si has efugias, contabescet laborans. Quod utrumque nos in diversis passim ægorantibus nuper adnotavimus, ac speciatim in nobilissimo Fratrum pari ejusmodi ingenii febribus eodem tempore laborantium juxta templum Divæ Mariæ Consolatricis Patrum Reformatorium Sancti Bernardi, quorum alter natu major exhibitio pharmaco purgante, quod idem horrendas paucis ab illius exhibitione horis secum catastrophes tulit, in habituales febrem incidit nullo deinceps auxiliorum genere exorabilem; decennis alter gravi ac diuturno alvi fluxu conflictatus est, una cum magnis, sævissimisque ventris cruciatibus, a quibus tandem variis adhibitis remediis, ac præsertim acidularum poru Juveni haud procul ab Alpibus limpidissimo fonte emanantium, summæ in hujusmodi

dysentericis, cæterisque alvi affectibus ægrotantibus utilitatis, ad quod etiam ipsa mutatio soli haud parum tulit, incolumis evasit. *In his febribus* (ab hypochondriis ortis, ac Mesenterio) *Barbari etiam, qui cætereque facile purgantibus utuntur, a purgationibus abstinent.* Matth. Giorgi Ration. Med. pag. 141. Idem prælaudatus Pifo, Ballonius, Duretus, alique plures advertebant. Si vero de Sanguinis missione loquamur, *ægrotantes hujusmodi subdit supra memoratus Mercatus, tale præsidium non innoxie ferunt, & plerumque a sanguinis missione continua evadit febris.* Ego quidem hanc adeo noxiam minime expertus sum in iis præsertim febribus, quæ continuatarum morem magis æmulabantur; quinimo larga dosi, plenoque fluente emissus sæpe initio sanguis auspiciatissime cessit, nec quempiam novi hoc remedii genere, opportune, cumque illud natura exposceret, celebrato, sublatum. Sæpe etenim parandus hac methodo erat aditus auxiliis cæteris, ac horum Principi, quod mox proferam, si qua anni constitutione, quoque in morbo expertum magis, in hac sane opportunum maxime, ejusque indolis febribus accomodatum.

XLi. Equidem uno *Peruviano corsice* (is scilicet erat præstantius auxilii genus) tum quæ primo illuxerant, intermittentes febres, tum ab iis ortas, aut iis analogas cæteras, quæ caput passim extulerant, subigi penitus, nec reviviscere amplius meminimus, congrua quidem dosi, tum debito more, administrato. Vere *autem arbore ramus*, qui furente sparsis quaquaversum flustibus torrente procellæ impetum sisteret, excandescentes succos compesceret, vimque morbi retunderet, ac cohiberet. Vere *Polycræstum*, ac prope dixerim, *Divinum* remedium, cui utinam simile quidpiam ad alios morbos possideremus. Sed paucis demptis, ut ait Vir. Clarissimus, ac toto orbe celeberrimus *Franciscus Torti*, Serenissimi Ducis Mutinæ Archiater meritissimus, quorum virtus certa est, & utilitas evidens, ars nostra medicamentis superfluis alioqui ditissima, bonis, certisque, quæ innotuerint, caret, imo forsitan ob hoc ipsum est inops, quia inutilibus superfluit.

XLII. Magnam sane hisce Paginis laudem, ac lucem Præclarissimi Viri nomen impertit, cui & ego, quod peramanter modiligat, measque ab illo primitias studiorum, quæ in lucem edidi, commendari plurimum sciam, ac summa humanitate exci-

pi; & omnis una mecum universa litteratorum Respublica multum debet. Atque eo quidem magis me illi obstrictum profiteor, quod me minus olim docte sententem de hoc admirabili febrifugo, imo forsitan & injuriose nimis de illo locutum, utpote qui *in verba Magistri* omnino jurabam, benignissimis litteris, tum muneribus ignotum ac immeritum hominem prosequi dignatus est, atque omnibus benevolentiz officiiis complecti; Quo tandem, tum propriis observationibus edoctus ipse, tum ingenti rationum pondere convictus, quibus laudatus Vir Corticis innocentiam adversus quosdam meticulosos, vel præjudiciis imbutos, quibus, pauci sint licet, suspectus etiamnum redditur chinæ chinæ usus, tuetur; errorem ipse meum agooverim, ac ultro fatear modo: Incertus, cujus in laudem potiore jure effundi debeam, corticis ne, an illius Patroni, strenuique propugnatoris. Quædam scilicet laudis pars est, errasse aliquando, confiteri errorem, inque viam reduci magnorum virorum consilio, ac doctrina.

XLIII. Ne vero quis nie putet vana loqui, lubet methodum, qua cum ego, tum alii plures præstantissimi hujusce Civitatis Medici in hujusmodi naturæ febribus curandis usi sumus, fusius exponere, eamque nonnullis curationum historiis, ac practiciis animadversionibus illustrare. Utque ab iis ordiar, quæ ingruente hyeme perniciosum characterem induerant, utpote quæ nedum securitatem præsidii, sed celeritatem exposcere videbantur magis, quam cæteræ, quæ superiore Autumno proluserant: Consultum iis erat, Corticem ab initio protinus exhibere; febrile hoc more fermentum, ut cum vulgo loquar, quodcumque illud sit, vel exiguum prorsus, ac inconspicuum, vix editum illud edomando statim, ac subigendo penitus, ne elatum magis, evectumque nimis, ac furens ingentes deinde tumultus induceret, quibus compescendis nulla postmodum artis præsidia sufficerent. *Quodcumque ajo fermentum illud sit, tum quoque in angulo latens, occultumque.* Non enim hic tot inanes conjecturas repetere subit, quas hac in re innumeras excogitatas scio, ac quotidie adhuc excogitari ab iis, qui artem suapte ingenio a vulgi studiis abhorrentem incertis & plerumque falsis opinionibus sedarunt. An *stagnans* aliquid, quod egeat moveri; Num *fixum* quidpiam, quod expectat exaltari: An quidquam *exaltatum*, quod exigat deprimi? Num quid intempellive *infla-*

fluens, quod debeat inhiberi; An denique *obstructum* quid, quod indicet referari; An *intra* sanguinem rursus constituendum illud sit, vel *citra* sanguinem, vel *ultra*? Nos hæc linquimus agitando iis, qui lites amant, nubemque hinc sæpe (Dispereat hic quidem obtreclator ille, cui ea displicent, quæ politioris litteraturæ cultoribus arident magis) *pro Junone amplectuntur*.

XLIV. Illusit mihi aliquando, cum Icario ausu febrium intermittentium causas exquirerem, illusit inquam mihi Phantasma quoddam (sic ego voco ludentis ingenii aëreos incertosque volatus medio sæpe in itinere collabefcentes) quod quidem, ut eunque somnium fortasse videbitur nonnullis, referre haud piget hic loci. Num scilicet in toto potius *Mesenterii* ambitu, aut illius centro constituenda foret hujusmodi minera febrium, ubi tanquam in emporio quodam, proprioque delubro delitescant, statim subinde horis erupturæ, magnas secum una afferentes turbas, *catervamque malorum*? Si Cartesio Immortali Viro, ejusque affectis placuit incorporeum, ac immateriale principium nobis Divino munere concessum, vere *Divina auram particula*, nullis illud obstructum corporum legibus carceri mancipare suo, captivum ducere, inque vincula conjicere; Equiore ne jure haud licebit principium materiale illud, febrium authorem, atque parentem, uno verbo, *focus*, ac materiam febrilem eo in loco constituit, ac collocare, per quem omnis generis vasa discurrunt, perreptantque, milleque effingunt gyros, *itinerum mille*, viarumque flexus innumeros? Num aptior hæc febribus scena, quam alia quæpiam hæcenus excogitata? aptior utique illa cæteris, ac convenientior, sive intra sanguinem cum *Villifio*, sive extra illum cum *Sylvio*, sive denique in nervoso latice cum *Guil. Cele* earundem fodina contineatur? Huc venæ, huc arteriæ, huc lymphæ ductus, huc lactea, huc inspersæ ubique glandule, huc nervi funiculi, aut si mavis dicere, nervorum rivuli eleganti ludunt spectaculo. Num quod de *Pancreate* suo commentus olim est *Sylvius*, idem nobis comparatum de *Mesenterio* effari, longe profecto faciliore, & clariore hic, quam ibi, tum symptomatum omnium, etiam infrequentiorum, tum ipsorum quoque circuitum explicandorum ratione! Haud exiguam sane hisce lucem, si quid ego hic judico, præbere videntur memorata illa ventris tormina, quæ toto fere

anno una cum exaratis febribus, quandoque etiam nulla comite febris, quodve mirandum magis, periodicarum febrium instar recurrentia, longe lateque sævierunt, cunctis invicta telorum ictibus, præterquam uno cortice *Peruviano*.

XLV. Videmus ab ulcere, & abscessu *glandularum Mesenterii* febres lentas & continuas fieri, quæ prius glandulis iisdem tumens tantum, & obstructis intermittentes extiterant. Videmus suborto in pede tuberculo, & tumefacta subinde glandula in inguine diariam febrem exoriri, quæ dubio procul periodica fieret, si periodice recurreret ejusdem glandulæ tumor: Quidni igitur per analogiū quandam haud licitum erit eruere, aliqua ex glandulis mesentericis insignioribus ita viscido infarctæ glutine, ut omnem, vel fere omnem chylo, & lymphæ illac fluentibus ultra se cisternam versus progressum inhibeat, totum vas illud lacteum, quod ab intestinis ad glandulam illam protrahitur, chylo stagnante intumescere, pariterque lymphaticum inferens integrum, quod in eandem inferitur, ab exortu suo usque ad eundem terminum, lymphæ sic similiter stagnante, utpote exitum non inveniēte, repleti; Exoriri hinc febrem, ac statas quasque periodos, ceu ad regulam quandam, emetiri, prout nempe glutinosæ hujusmodi obstructionis alterna reclusio, atque occlusio contingit, cujus mechanica ratio non est hic loci. Quantum vero visciditatis, glutinis quantum perreptans, cum ubique per abdita corporis, tum in hac potissimum parte lymphæ, atque hinc cætera quæque fluida humani corporis hac tempestate contraxerint, obvium est animadvertere recogitantem cuipiam, ac recolenti animo, tum superiorum annorum, tum labentis indolem, ingeniumque. Quam facile hinc per diffusa locorum, viasque varios in gyros convolutas contendens, influens quicumque humor, si aliquo lentore peccet, iisdem in locis obstructionem producere potest, lentoremque, ac stagnationem mutuat cæteris per eosdem tramites decurrentibus liquidis impertiri? Quot quæso nascentibus morbis hujusmodi glandularum mesentericarum infarctus prolusit, aut eosdem diu latentes, occultosque, idem fovit, condiditque sinu, quo usque, ceu disiecto aggeri, foras eruperint, eo vividius conatu, quo diutius iisdem delituere? Num præcipua hæc ipsa sedes hysterico-rum insultuum, affectionum hypochondriacarum, Phthiseos chy-

chylosæ, cujus exemplum unum atque alterum observare mihi hoc ipso anno contigit; Rachitidis, Scorbuti, Atrophiz, ac sexcentorum fere morborum; quorum sera Symptomata novimus, incunabula vero nos omnimode laterent adhuc, nisi hæc illustriora, ac præclariora in dies efficeret magister in morborum causis eruendis optimus culter Anatomicus? Nec Indorum morbus a Jac. Bontio descriptus, hicque familiaris omnino reticendus, eos ad atrophiam deducens, in quibus post sectionem aliquando totum mesenterium occurrit absumptum. Referenda & huc quoque fortassis est *sabes Anglorum* a calidiorum, ac spirituosorum nimio abusu, quibus summopere rebus Natio illa tot divisa orbe oblectatur, proficiscens.

XLVI. Equidem, si harum febrium tum intermittentium, tum subcontinuarum minera, ut ajunt in primis viis, ceu plerisque videbatur, extitisset, haud video, cur repetitis illa catharticis haud obsequabatur, educta hinc purgante medicamento materia omni exotica, quæ febrim pepererat. Atque a purgantium usu contumaces hæc magis evasisse compertum, quandoque etiam ex intermittentibus in acutas periculosas migrasse, quas dein aut diuturnus alvi fluxus cruentus, aut diarrhœa sæpe chylosa una cum totius corporis emaciatione subsequabatur, proludentibus passim diris ventris cruciatibus; Qui iidem si diutius perseverabant, *Phthisin* brevi inducebant, de qua superiore paragrapho verba fecimus, præfata diarrhœæ, aut alvi fluxus filiam, quo in limine conclamatum erat: ut nos in duobus ægris adnotavimus, quorum alter juxta *novas ades Fratrum Carmelitarum*, alter prope *forum olitorium* decumbebat, qua fornix viæ antiquissimus spectabatur, cui *rubri coloris* nomen, nuper in triumphali Nuptiarum Regiorum Pedemontii Principum apparatu, ne inter nocturnos festivos ignes Aulæ prospectum Fori, Foro prospectum aulæ invideret, ut in præclaro monumento legitur Posteritati commendato, a Providentissimis Patriæ curatoribus dirutus, ac solo æquatus. *Phthisin* illam voco, quod si ægrotantium habitum, ac faciem inspexeris, vix illos ab iis, qui vere *Phthisici* existunt, aut ne vix quidem distinguas: vera autem morbi causa, ac præcipua sedes in *Mesenterio* potissimum delitescit, infarctis universis lentore glandulis, ac prope jam in strumoso statu degentibus.

XLVII. Elucet hinc Sole meridiano præclarior ejusmodi febrium tum præcipui illarum, quod idem sæpe etiam iis absentibus subludebat, symptomatis, dirorum nempe abdominis cruciatuum fomes primarius, ac prope dixerim, natalis locus. Harum olim meminerat *Ballonius* Vir doctissimus in morborum notis explicandis, eorumque origine, ac *ocasionis initio* revelando nulli secundus, quæ in diros ventris cruciatu collicos dolores mentientes plerumque desinebant; Nec diffitetur idem procul a mesenterio quærendam haud esse illarum sedem, ac fomitem. Sæpe adeo nosse est prioris morbi indolem a symptomatis natura ac ingenio, quod aut illi præludit, aut una cum illo sævire videmus diviso velut inter utrumque imperio, ac potestate irascendi. Neque inficior sæpe etiam ab aliorum quoque viscerum, Jecoris v. g. Pancreatis, Lignis, glandularumque omnium per inum ventrem, ac universum tractum intestinorum denso agmine delitescentium infarctu intermittentes febres ortum ducere, haud tamen insonte unquam *Mesenterio*, in quo scilicet tanquam in ampliore Theatro ludere suo Marte queunt ejusmodi febres, ac quam hæc cumque velint larvam induere. Conspicuum id magis fiet, si quem illi usum, ac munus tribuit præclarissimus, ac amicissimus *Morgagnius*, mente recolimus; videlicet, ut sanguini per mesentericas venas ab intestinis ad hepar ascendenti multas in transitu ex iis, quibus copiose ornatur, adiposis cellulis particulas oleosas pro separatione bilis admisceat. Confirmant assertum cadaverum lustrationes, in quibus plerumque bile atro flava turgida vesicula fellis occurrerat, defectu nempe illius olei, quod in statu naturali una cum sanguine per mesentericas, quæ sese in portam exonerant, venas hepatis suppeditatur; Nonnullis totam lapillis repletam invenimus intus forisque ita nigricantibus, potius ut carbones, quam calculi esse viderentur. Hosce quidam ex iis, qui præsentibus aderant, aderant autem quam plures rerum Medicarum, ac Anatomicarum studiosi, observationis confirmanda percupidi, num hi scilicet igni admoti flammam conciperent, adque extremum usque alerent, lucernæ admovent, sed leves quidem crepitus edidere, flammam autem non servavere, quod peculiari vitio ejus, in qua concreverant, bilis accidisse arbitror. Nos equidem id ipsum olim aliquoties experti sumus, ac pene totos combu-

buri advertimus, quorum plures etiamnum in Musæo inter rariora mea conservo, qui & flammam alunt, & omnia ac olim observanda adhuc post multos annos præbent. Subit hic historia satis curiosa viri cujusdam Religiosi, qui præcedentibus acerbissimis ventris cruciatibus quatuor demum exiguos ejusmodi calculos per alvum dejecit, qua de re, cum varii varia proferrent, quidve essent, & unde essent, haud facile intelligerent, ego illos e choledochi ductu in duodenum delapsos, atque hinc per alvum favente motu peristaltico exturbatos contendere, quod igni admotos comburi illos adnotaverim, teste *Bidloo*, tum aquis immergi lisdem innatarent, docente *Fernelio*, secus ac iis, qui de vesica urinaria extrahuntur, cæterisque, qui passim variis in locis generantur, lapillis contingit. An autem Jecur primo affectum fuerit, an Mesenterium, ipsa morbi indoles, ac ingenium manifestabit; Qui nanque morbus a Mesenterii vitio proficiscitur, raro Catharticis cedit, sæpe etiam, ut adnotavimus, exacerbatur magis, tum tormina secum una adfert, ac cruciatus ventris immanes, inque atrophiam tandem, ni caveatur, degenerat; Qui vero a Jecore procedit, non nisi catharticis frequenter usurpatis expugnatur, nullo fere, aut vix exiguo ventris cruciatu stipatur, inque colluviam plerumque ferofam, si diuturnior extiterit, desinit. Sed tamen fortasse de hac re fusius loqui contingeret aliquando. Nunc vero ad aliud caput transeat oratio, quæ perquam satis in hisce immorata est.

XXXXVIII. Hos inter rerum fluctus præstantius, ut retulimus supra, subsidii genus, ac sacra, pene dixerim, anchora cortex erat, siue intermittentis toto suo decursu typum febris retulerit, siue in acutam migraverit illa, siue eadem subcontinua ab ortu extiterit, sæpeque hinc obscura inter simulati velut circuitus vestigia Medentes eluserit; siue denique nulla præsentis febris toties exarata alvi tormina tantummodo, deservierint. Nulla hic advocanda sui generis materia, quæ catharticum suaderet, aut expectanda Medicorum scriptis celebrata adeo humorum coctio; ne forte, dum hisce totus incumberet Medicus vota ferens *Nature*, evacuato purgantibus, quod adhuc reliquum aderat, fero, aut datis inani cunctatione morbo induciis, altioribus actis radicibus malum ingravesceret, ac, ut plerisque obigit, in lentam febrem, ac in maciem deni-

que infausito exitu transitum faceret; præcluso nempe omni itinere chylo, aut si quis adhuc aditum sibi per oppositos aggeres aperiret, viscido eodem, lento, ac inertis prope sanguini occurrente, nullo prorsus pacto misceri apto cruori, inque nutritium rorem secedere. Duas scilicet ob causas extenuari sensim corpora videmus respectu succi nutritii, cum is nempe aut liquidus minus, quam par est, alendæ parti occurrat, aut exoticis moleculis refertus, quo fit, ut ineptus nutritioni, seu minime assimilabilis idem evadat; defraudata hinc æquo alimento partes emacientur sensim, ac contabescant. Etsi enim idem ipse nutritivus humor in rorem, gluten, ac cambium, ut veteres ajebant, facessat, opus sit, totque adeo subeat metamorphoses, antequam nutritivæ parti assimilietur: glutinosus proinde evadat necesse sit, ut firmiter magis adhærescat, ac solidi vim, ac robur obtineat; Si vero is minus jam natura fluxilis ad partem, cui comparatus est, accedat, conjicere est, non eum amplius acquisiturum glutinositatis gradum, qui necessarius est ad hoc, ut parti similis fiat.

XLIX. Quod si impar idem obvios superare obices, perque infarctas lentore glandulas, obstructasque vias excurrere, regurgitare hinc, ac mutato itinere, revocare gradum coactus erit, perque eadem, quæ jam subierat ostiola, se se in intestinorum cavo recipere, & qua data porta una cum alvinis fecibus exire, unde diarrhœa plerisque chylosa, mox phthisis inevitabili facto successit. Huc scilicet tandem casura morbi alea, ni periclitantibus rebus opportune cortex subveniret. Ut latens venenosior in herba anguis, ita & majus in mora periculum.

Ægrotus Primus.

EXimius Jurisconsultus initio Autumni corripiebatur tertiana simplici, cum panco tamen rigore invadente; declinante febris conatus mox ventris acerbissimi subledebant, toto demum Apyrexie intervallo perseverantes. Exhibito medicamento purgante tertianæ duplicis typum febris obtinuit, visaque ventris tormina exasperari magis, ac diriora eadem evadere. Foras adhibiti ex lacte, clysteres emollientes addita theriacha mitiora, & his similia. Monebam ipse, ut statim cortex præscribere-tur, quo sine magnam impendere ægrotanti

virgo

viro iaculuram praevidebam. Difficilem tamen assensum praebebat Medicorum alter, qui agrotationi praeerat; Cum vero omnia in pejus ruere cerneret, sponte tandem, cum forte illum sub vesperam inviseret, corticem semel, atque iterum exhibuit modica dosi. Mane eadem, qua consueverat, hora febris repetiit, lenior tamen, tum mitius saevire coeperant alvi tormina, quo dein corticis usu aeger perfecte convaleuit.

Aegrotus Secundus.

Iudaeus post febrem primo validam, mox lentiore, atque diuturnam, insuper diarrhoeam contraxit, quae postmodum in dysenteriam migravit, eadem durante febricula. Demum dysenteria rursus in diarrhoeam conversa, coepit simul febris typum manifestum acquirere tertianae duplicis intensioris. Hac autem febris in invasione sua soporem simul adscivit admodum profundum, quo circa declinationem accessio- nis evanescente stupidus, attonitus, & immemor ad plures horas aeger remanebat. Quae cum ego sedulo animadvertissem, iussi Medico curante annuente admoventi occipiti vesicatorium, ac mox corticem Peruvianum larga dosi exhiberi. Et ecce statim imminuto paroxysmo, oblationem validiusculam corticis subsequente, alteroque prorsus inhibito, symptoma ipsum soporis simul evanuit, quare brevi a febre, a lethargo, & a diarrhoea liberatus est Aeger.

Aegrotus Tertius.

Sacerdos jam proxime octogenarius febrem tertianam patiebatur adeo absconditam, adeoque latentem, ut ea potius ex acerbissimo ventris cruciatu cum obscura quadam extremorum frigiditate, quam ex ullo charactere magis proprio distingueretur. Diu ipse incertus haesi, an symptoma istud pro vero morbo haberem, eique occurrerem appropriatis remediis, nondum scilicet probe conscius periodi tertianarii. Atqui suspicans simul quicquam aliud latere ob insignem pulsus inaequalitatem, insuperque observans huiusmodi cruciatus nihil habere commune cum colicis ita dictis doloribus praeter doloris sensum, facile deprehendi doloris originem aliam esse ab illa, quam mihi effinxeram. Qua de re ad corticem Peruvianum protinus confugiendum esse existimaui, pro inhibendo dolorifico, ut ita

loquar, prope imminente paroxysmo, eo metuendo magis, quo debilis aeger, ac senio velut confectus, par haud erat amplius mali saevitiem ferre; Libentissime annuit, qui una mecum aderat Medicus; ac statim propinato Cortice per ebullitionem in aqua Card. Bened. parato, brevi integram agrotans valetudinem recuperavit. Huic quoddam surditatis, cum jam e morbo convalesceret, vestigium supervenit, quod idem una cum febre evanuit omnino.

Aegrotus Quartus.

Primarii Regis Architecti famulus ejusmodi ventris doloribus laborare coepit, una cum febris subcontinua, diarrhoea, siti magna, urinis subrubris, ac velut igneis, pulsu celeri, aestu, ac vigiliis intensis. Contractum manu abdomen percipiebatur, quidve in profundo latens aegri relatu, quod sedem ipse mali vocabat, ac centrum doloris. Ad septimum usque subcontinuae morae febris obtinuit, quae nec repetitis sanguinis missionibus cedens, nec diluentibus, tomentis, nec cortici ipsi postremo administrato, quinimo ad omnimodam continuitatem malignanter tendens delirium secum una attulerat, ferocesque artuum convulsionones, quarum haud obscura quidem indicia in carpis observare erat post quartam accessionem, cum adhuc scilicet subcontinuae genium febris servaret. Adstricta post septimam sponte alvus, irritata eadem vix demisit, variegata, sincera, improba; Urinae pallidae, turbatae, pulsus intermittens. Dimisso Cortice Vesicantia humeris, ac Tibiis admota, diluentia iterum adhibita, camphorata, alexipharmaca, sotos, sectaque iterum vena. Quibus nihil proficientibus medios inter acerbissimos ventris cruciatus, membrorumque subsultus, lecti simbras diducens, & floccos vellicans, saepe etiam per vices singultus correptus e vita decessit.

L. Plerosque huiusmodi casus recensere possem, quibus denegatus cortex, aut dimissus idem, cum adhuc largiore illum dosi exhibere opus erat, rem permisit in deterius abire. Ut ut enim vesicantia, ac sanguinis missio, quae duo haud diffiteor tutiora extitisse hac constitutione post corticem praesidia, in iis potissimum febribus quae acutarum indolem amulabantur; viderentur recta adversus morbi genium pugnare, ut & repetita diluentia, ac sotos, quorum

ca-

eandem ferme ratio . Ea tamen nihil , aut vix parum quidem nisi una cortex administraretur , adversus morbi causam profecerant , quæ id nanque præsidii efflagitabat , quo vegetior Chylus , vegetiore hinc quoque facto solido , impervia viarum facili Marte pervadere , inosque recessus adire posset , uno verbo , properantia ad statin , seu ad concretionem liquida , deficientia hinc pariter solida , fluorem illa , hæc vim , ac robur amissum reciperent , ad statas utraque æquilibrii leges redigerentur , vindicaretur ab infarctu glandulæ , expedirentur ab obstructionibus viæ , præcaveretur suprema , quæ imminebat , iactura ; quod unum sperandum erat à *Cortice* . Equus indomitus , & effrænis , liceat mihi allatum hic loci a præclarissimo , nec unquam satis laudato Viro exemplum , tum ipsamet illius verba usurpare ; Equus indomitus , inquit , quandoque est febris . Ab eo hominis vitra trahitur , velut currus , quo fata sinunt . Medicus moderator est , Aurigæ instar , lora tenens . Si vulgari utatur hic methodo in curatione febris , id agat tantum , vel studebit agere , ut medium furens Equus teneat iter , ne in foveas hinc inde paratas obliquus feratur . Currumque , vel Hominem perdat ; non vero impediet , quincursum suum Equus expleat , usque quo illi suppetunt vires , & furor , non sine gravi metu , quod dum

Fertur equis Auriga , nec audit currus habenas .

Offendat ille tandem ad obicem aliquem , ad quem allisa , male consistens facile frangatur machina . Quod si china utatur Medicus , id agat , ac si retracto magistra manu convenienter fræno , Equum vi sistat , aut retrogradum faciat , & hoc pacto totius incerti cursus declinet pericula .

LI. Plerosque utique casus recensere possem ægrotantium , quibus male cessit res , sive ludens adhuc tertianario circuitu febris derepente in acutam transierit , sive haud deleto morbi fomite in lentam abierit , diuturniore quidem , at æque infelici exitu , quod utrumque discrimen eludere erat exhibitum opportune Cortice . Dixi *haud deleto morbi fomite* ; Quotquot enim hoc more lenta ægritudine occubuerunt , secto Cadavere , Mesenterium compertum est summe putridum , plerisque etiam pene totum assumptum ; nonnullis sordido ulcere , aut exiguis adhuc abcessibus scatens , ceu toridem latentibus Vomicis , quæ procul dubio

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

diuturnam febrim , ac mortem tandem attulerant . Horum unum , atque alterum exemplum lubet commemorare .

Ægrotus Quintus .

Mercator quidam in *Vico D. Thomæ* florenti adhuc ætate , alvi torminibus exeunte hyeme vexari cœperat ; inque dies magis , magisque dolor vim capiebat : tantumque aberat , ut hujuscemodi doloris abditæ causæ comprehendi possent , ut nunquam ullis remediis tolli , aut saltem levare hoc malum potuerit . Comes aderat febris , quæ intermittentis diu vultum retulerat , atque tandem amplius circuitus legem observabat , modo etiam crudelior reviviscere videbatur ; Quo urgente magis adhuc , quam ut tolerari posset , dolore , extenuato prope , ac macie confecto corpore e vita discessit . Cadavere secto sana omnia reperta viscera , præterquam Mesenterium , quo præciso , materia multa nigra , foetensque profluxit , encausto sutorio similis .

Ægrotus Sextus .

Honestæ Virgo hospitalis Puellarum domus , vulgo *dell' albergo* , in dolores Colicis similes , ac pro talibus habitos suprema hyeme incidit , contra quos cum nullum remedii genus valeret , misella , febris quotidie cum rigore insigni repente doloribus jam dictis associata , paucos post menses marasmo consumpta est . Dissecto ventre ingens copia puris , quo totum mesenterium refertum , ac quasi turgidum erat , erupit . Hoc Natura per renes evacuare frustra tentaverat , urinis valde purulentis profluentibus : Cum renes interim integri , omnique labe carentes conspicerentur , quos nonnulli ulceratos suspicabantur , idque non immerito , cum *urinis* mistus diuturnus , teste *Galeno* 4. Aph. 75. renum , aut vesicæ exulcerationem significet . Verum doloris circa renum regionem absentia suspicioni huic non attestabatur .

LII. Cæterum nec in Mesenterio tantum , etsi præcipua ibi extiterit morbi scena , sed & in finitimis huic quandoque partibus , hujuscemodi infarctus occurrerant , quorum exempla recensere haud vacat . Tentabat siquidem Natura per ejusmodi abscessus in hac , aut illa parte erumpentes morbum solvere ; At cum hi in abdito adeo loco , imoque delubro contingerent , seque-

F f f f

batur

batur hinc ab eorundem disruptione totam una partem putrescere, ac velut absumi. Febris hinc intermittens incunabula rependa, nedum facta, aut tentato abscessu; Eiusdem in acutam migrantis prologia, inchoato prope, ac confecto ipso; lentæ itidem, ac una simul sævissimorum alvi cruciatuum incrementa, disrupto tandem, ac finitima quæque loca exundante. Primo in stadio facile erat propinato Cortice ulterio-rem morbo progressum inhibere; Haud ita facile in altero, in exiguos forer abscessus, aut glandulosa pars, in qua is delitescbat, haud ita distita ab intestinorum tramite, ut in eorundem cavo facili negotio posset exundans materies valorum famularum exonerari. Difficile omnino, ac pene impossibile in tertio, ac supremo morbi statu; siue huiusmodi concretiones in Mesenterio, ut plerumque obigit, siue in Pancreate, aut Hepate, siue quod in *Ægroto Sexto* suspicari fas erat, in renibus occurrerint. Renes hoc pacto exulceratos, ac fere absumptos omnino mihi in Viri Cadavere diuturna ægritudine confecti haud ita pridem offenderat solertissimus, ac ingeniosissimus adolescens *Ostavius Calastrus* in majori Urbis Nosocomio assistentis. Medici munus diligentissime persolvens.

LIII. Morbos abscessu solvi satis vulgare est, qui frequentissime quidem febribus, & variolis supervenit, maxime circa aures, atque inguina; non nunquam & toto corpore diffusa excrescunt tubercula, quæ in pus aliquando resolventur. Idem ubique Naturæ laborantis conatus; cæsi impar illa sæpe haud queat, quod tentaverat opus, absolvere, sæpe etiam ob partis longinquitatem, per quam nempe partem, seu emunctorium haud ita facile est congestam materiam evacuare, foras protudi. De abscessibus Hepatis feliciter peractis innumera monumenta habemus apud Scriptores, quod quidem per Choledochum ductum, amplum satis, ac per mille illum rivulos collectam in jecore materiam in Duodeni cavum deferre aptum, si præsertim congruo in loco abscessus fiat, facile is erumpere queat, ac totus exonerari. Præclarum Hepatici huiusmodi abscessus hoc pacto felicissime curati exemplum Parenti olim meo obigit in Serenissimo Principe N. N. a Sabaudia, cum illius ægrotationi præfesset. Eiusmodi ego alterum in Pancreate in nobilissima Muliere hoc more sanatum vidi, diuturnis, diutisque hystericiis insultibus diversata, cujus

adhuc vestigia, eadem decem ferme post menses defuncta, cum filiam peperisset, inspexi, ac Medicis, qui una mecum curationi aderant, ostendi. Nolle erat abscessus sedem, ac locum a doloris vestigio, absque visibili tumoris in eo situ, quo prope Pancreas latet, præsentia, qui dein evacuato sensim per alvum pure imminuebatur.

LIV. At vero nullum adhuc curationis in Mesenterio abscessus, vix unum aut alterum latentis ejusdem in renibus, aut vesica, perque urinæ meatus suppurati; cuiusmodi historia illa *Pithionis* ab *Hippocrate* in principio *tertiæ Epidemicorum* descripta. Mirum sane, quantum in hujus explanatione hallucinentur interpretes, qui uno omnes ore, ac unanimi consensu morbi liberationem urinæ copiosius effusæ tribuerunt; Neque enim ad urinæ quantitatem, sed ad qualitatem potius, utpote quæ fuerit purulenta, referri sanitas debet. Neque leve est, quod *Hippocrates* his in libris sæpius observat, urinam quoties materia illa purulenta per vesicam abducta est, cum difficultate dolore reddi consuevisse, ita ut stranguria laboraverit ægrotus. Proferam hic, quod mihi olim adnotare contigit curiosum satis, huic *Hippocratis* exemplo plane respondens ita tamen, ut hoc intersit, quod utcumque factus abscessus suppurationem obierit, æger tamen sanitati minime restitutus sit. Atque eo lubentius id proferam, quod sub hac plerumque imagines juniores non modo, sed senes aliquando decipiantur, ac si calculus revera adesset, qui tamen nullus postmodum reperitur.

LV. Sacerdos e Capuccinorum familia, & ingenio peracri, & studio flagranti, & doctrina eximia, & memoria singulari excellens, anno ætatis sexagesimo sexto, circa Veris initium valetudinem amisit. Urgebant viscerum dolor, status, & quasi quidam convulsio languescebat admodum stomachus. Post autem aliquanto desidendi aderat, mingendique cupiditas, stranguria, dolor juxta inguen, & glandem permolestus, præcipue post extremam mictionem gravissimus; In Perinzo ad vesicæ cervicem pondus; atque hæc omnia, & nova, & repentina. Urina primum difficilis atque intercisa, deinde magno cum impetu, & sonitu quodam, quasi ventus aliquis erumperet, excreta: In qua quidem, color inerat naturalis, nihil tamen subsedit. Dolor aut resupinato, aut inclinato, aut etiam cum distenderetur vesica levior. Atque hæc inter

inter mingendum molestiae ad vitae usque finem perdurabant. Accessit interdum sitis. Hoc fere modo ad medium Majum traxit: quo tempore dolores statim exacerbescere sensit, siquid paulo calidius hauserat. Per biduum omnia rejecit vomitu; Cruciarum sibi intestina, & abdomen vehementius tendi querebatur. Dolor hinc inter mendum acerrimus; febris cum siti satis acuta: quae tamen, die tertio elapso, aliquantulum remiserunt. Arenulae aliquot asperae, quae magnitudine caput aciculae aequabant ejectae. Color urinae saturior: in qua subsedit plurimum mucis glutinosi, & subflavi, sanguine hinc inde, aliquando etiam carunculis, ramentisque respersi. Paucis exinde diebus recruduit dolor; Obortus hinc quoque rigor, totumque horrore corpus intremuit. Pulsus celer & depressus; Lingua arida; Urina sanguine plurimum tincta; quam quidem non nisi in lecto cubans excernere potuit. Postremo tandem dolorum requies, seu potius sensus obtusior. Caput quippe tentari coepit. Febris, singulis diebus vesperi ingravescere sueta, tandem fere prorsus elanguit. Spiritus paulo difficilior: Urina mordax planeque mali odoris: pus ea largitate profluens, ut urinae copiam prope excesserit. Huic malorum mole paulatim accessit sensuum stupor. Ita in hoc piissimo Viro ille animi motus, quo nihil celerius, aut acutius esse poterat, veterino tandem obtorpuit. Quis autem non jure beatum illum dixerit, vel quod vitam doloris expers tandiu produxit, vel quod, cum diutius haud sine dolore vivendum esset, vivere desuit? Aperto cadavere urinae iter accuratius pervestigatum est. Nam ad sectionem ita animo parati accessimus, quasi calculum effemus inventuri. Sed neque in vesica, neque in renibus ipsis, ullum omnino sabuli, nedum calculi apparuit vestigium. Dum ulterius viscera scrutamur, Colon ita pertinaciter vesicae adhirescere animadversum est, ut ne cultro quidem facili dividi posset. Quaque in parte adherescebat: in conspectum venit diametri quasi sesquiuncialis ulcus rotundum, quod non modo Coli ipsius tunicas penitus absumpserat, sed etiam vesicae membranam extimam perederat. Hinc via per tunicam vesicae mediam, sive musculosam perforata est, quae pennam anserinam reciperet: Unde continuo pus ab ulcere intra vesicam defluxit, aditusque patuit, quo in urinae ductum ab intestinis commigrarent flatus; de

quibus quidem, dum viveret, agrotam somniasse perperam credidimus.

LVI. Sed ut ad *Mesenterium* revertar, quod *scenam* constituo savientium hoc anno malorum; atque ut uno omnia claudam paraghro: Ars medentis erat, praesidium, quod cedebatur praestantius, cito adhibere, antequam enatae hic loci passim concretiones serosae phlogosin inducendo febrem efficerent intensiorem, aut erumpente abscessu febris inde habitualis emergeret. Sive autem in substantia ad instar electuarii, sive levi ebullitione in aqua appropriata paratus, atque una cum balsamicis commixtus Cortex exhiberetur, perinde erat; Quanquam, & hic maxime quaedam sit Medico cura, ac vere dixerim praeventia, quae definiri non potest, multo minus edoceri. Equidem cum praecedentium annorum, tum quae hoc anno fiebant, agnitudines, mihi ante oculos pono; lympham ubique in motu peccantem video; Ut nihil inde mirum videri debeat, quod pulmones modo, lentescens haec passim, ac sistrophes ubique inducere apta, pectusque, ut superiore anno adnotavimus, modo imi ventris viscera, ac *mesenterium* praecipue occupavit. Quotiescunque vero, in hac siccitate temporum, tot emortuas huc illuc plantas circumspicio, defectu humidi terrae centralis, quod iis pabulum praebet; dilutide mihi occurrit febrium, ac caeterorum affectuum, qui una eruperant, ratio; curve hi potius in *Mesenterio*, quod ager est, campusque patens, insignibus glandulis, rivulisque majoribus refertus, per quem vitalis succus identidem percurrit, ac remeat, cruori aliquando miscendus, quam in alia quacumque parte tentoria castra posuerint.

LVII. Exacta hyeme, eadem visae febres proludere, novo tamen symptomatis genere distinctae, ut in *Aegrotis* 2. attulimus; sopore scilicet gravi, ac profundo, imbrifero tum, ac summe perfrigido existente caelo, nocturno etiam saepe gelu concretis ubique per circumjectam planitiem fluentibus aquis. Cernere novum hoc symptomata easdem, ac febris, phases obire; cum eadem scilicet crescere, statum attingere, ac demum illa declinante, declinare sensim, resitante; ut plurimum, aliqua in soporem propensione, etiam tempore intermissionis, quae affectum paulatim radicari, & ad Idiopathicum tendere praemonebat. Nonnullis quidem intermedia apyrexia nullum aderat

soporis vestigium, ejusque loco cruciatus ventris prodierant, eo more recrudescentes, ac in intermittentibus autumnalibus, apyrexiae tempore, iidem irasci consuevere, evanescentes hi dein, repente febris, quae soporofam affectionem secum una comitem afferebat. Saepè coëvus febris sopor, interdum illi posterior, diarrhoea passim, dysenteria, aut memoratis alvi cruciatibus proludentibus. Enim vero etsi in capite agi videbatur Tragedia, morbi tamen fomes, ac incunabula adhuc in imo ventre delitescabant. Atque hinc quidem, cum accesserat sopor, ex intermittenti tum saepe in acutam degenerabat febris, eadem protinus & ipsa methodo profliganda, antequam *Palladis Templum*, sacramque aram intus magis morbus pervaderet. Ominosum erat, propinato Cortice febrim intensiorem adhuc evadere; Ut victoriae signum certissimum eandem denuo in intermittentem desinere, quousque tandem continuato corticis usu omnino profligaretur. Plerisque memini loco soporis cardialgiam in principio accessionis supervenisse, pauca ut plurimum, vel inani vomitione. Lethale heu proflus symptoma, atque eo funestum magis, cum febris intermittens adhuc persisteret, ac vim illa eluserit praesidii, serius forte etiam, quam par foret, administrati. Quae cum ego memoria recolo, ac versicolore hujusce imaginem febris Vere potissimum, ac aestate ludentis adverto, animo subit Proteiformis illa, cujus ingenium, ac morem accurato penicillo adumbravit *Mortonius*, vim una simul eximiam Peruviani Corticis pro tanto debellando hoste summe commendans.

LVIII. Nunc ad intercurrentes affectus me conféro, quibus curandis, sanandisque, etsi nihil proflus cum vulgaribus morbis habere viderentur affinitatis, haud exiguam tamen lucem iidem praebere. Adeo scilicet nedum, quae sub Epidemicarum Principe ludunt, ægritudines, haud impari, ac illam, methodo vincere rutum est, sed & quae ab ea toto penitus cœlo discrepare videntur, nullumque omnino cum illis sœdus habent, atque consortium. Has inter recensenda primo loco *Asthmata* veniunt, quae si olim unquam, hoc potissimum anno, ac sum quidem, cum saeviret ab alto Boreas, frequentissime profluerunt, atque ejus praeserium generis, indolisque, quae *convulsiva* vocat *Willisius*, seu *sicca*. Plerosque horum memini solo Cortice Peruviano sanatos,

anodynis una commixto, quae aliter per se sola usurpare, perniciofa res erat. Proflua quampluribus venæ sectio, ac quidem *Jugularis*, cujus beneficio haud pauci inopinato evasere. Miræ curationis exemplum hujusce ingenii Asthmatis enarrare juvat, quod lucem fortasse Practicis hac in re ferret, quo citius tutiusque idem, sive recens illud extiterit, sive diuturnum, compescatur, evellaturque radicitus. Sartoris cujusdam *Galli* (*de la Rue*) Filius, decennis circiter, in *vico novo*, qui recta ab ædibus Regiis ad Portam, quae vulgo *nova* dicitur, ducit, diuturno hujusmodi Asthmate flatulento, ut ajunt, seu periodico laborabat. Rogatus ego, ut opem illi praerem, haud libenter, quod ingenue fateor, curam suscepi; Nihil enim sperabam mihi ex ea laudis accessurum, aut agro emolumentum. Tentaverant siquidem id ipsum plerique alii, sed frustra. Invitus denique, ac precibus Parentum indulgens, jubeo venam in cubito mane sequenti secari, altero die potionem ex Manna obtuli, nullo, vel exiguo fere levamine. Saepè mihi in mentem venit Corticem exhibere, vel ex eo maxime, quod unum inter, ac alterum Paroxysmum plenissima saepe intermissio succederet. Quem tamen praescribere distuli, mali diuturnitate perterritus, ne scilicet insons alioqui remedium eventus ambiguitati, ac prope dixerim, forti subjicerem. Oxymel itaque Asthmaticum *Floyeri*, Viri Doctissimi, ac qui multum gloriae in hac Provincia sibi comparavit, aureo tractatu de Asthmate, in quo nihil fere desiderandum reliquit. Oxymel inquam Asthmaticum *Floyeri* praescripsi, mane, & vespere sumendum. Leniti hinc malum visum, saltem paroxysmos haud adeo frequenter occurrere, ac repetere antea consueverunt. Prope-rante hyeme ingravescere illud, ac irasci magis iterum coëpit. Jubeo sanguinem e Jugulari lato vulnere emitti, ipseque locum sectioni aptum Chirurgus designavi; Totum nanque recentibus scrophularum vestigiis oblitum undequaque collum aderat, quibus vel ab incunabulis correptus æger fuerat. Eadem mox die, ac sequenti bene se habuit Puer; Proxima huic nocte, cum Parentes somno placidissime tenerentur, ingenti exaudito strepitu expergescens Mater filium reperit humi prostratum, ac pene animam efflantem. Me diris increpat, quod inauditam rem, sic nanque vocabat illa recens factam in Jugulari sectionem, in fi-

lio-

liolo tentarim, Atqui vanas hujusmodi Muliercularum querelas parvipendit vir Prudens, Parochum extemplo advocat, qui morienti Puero suprema munera administraret. Dum hæc agerentur, sedari visæ sensim convulsiones, altusque sopor ingruere, qui perennem rebus securitatem attulit; Ex eo nanque tempore pacata sunt omnia, nec ullum vel leve mali vestigium superfuit. Incolumis brevi post Puer una cum Parente, domi pares mihi pro munere grates latissime egit.

LIX. Sæpe ego ejusmodi asthmata in pueris ab obesitate nimia, seu intumescencia Thymi ortum ducere haud inani conjectura suspicatus sum; Sive ejusdemmet Thymi situm, munus, ac habitudinem vivida mentis acie perpenderim, sive enata inde symptomata quæque diligenter ad trutinam revocarim. Pondus addiderat conjecturæ meæ demortuorum Puerorum sectio, quibus frequens id mali genus extiterat. Cum enim quaedam olim mecum ipse meditabundus cogitarem noxa prope, ad Thymi usum hætenus ignotum prorsus, conducencia, inque lucem edenda aliquando; Quotquot hinc fœtus, tenellique infantes mihi occurrerant quopiam morbo denari, hosce omnes curiose perlustrabam, ac Thymum potissimum, quem obesum, ac inflatum magis, ac ætas postulaverat, in iis omnibus deprehendi, quibus quædam aderat ab ortu anhelitus angustia: Ad fœtus vero quod attinet, cum aër nondum bronchia repleverit, prægrandis utique Thymus in iis conspicitur, qui demum in adultis sensim decrevit, ut in Senibus fere idem vix invenitur. Suspiciabat autem quod cum Thymus nutritium succum, qui a sanguine e magnis, ac proximis vasis affluente, magna copia ibidem derivat in fœtu, non equidem, ut sibi effinxit *Cl. Bellingerus* per excretorios ductus ad oris confinia juxta linguae radicem deponat; At, ut ego propria observatione edidici, rorem illum nutritium in ipsius œsophagi cavo, exiguis osculis, breviori itinere conferat, unde in ventriculum, ac intestina delabatur, vasaque lactea percurrit, quin fœtus ore assumere alimentum cogatur, quod improprium, ac miuime conveniens vel ipse olim *Hippocrates* censuit: Suspiciabat, inquam, quod idem Thymus edito jam in lucem fœtu, nimia oppletus seri quantitate, nec exonerare hanc potens in proximo infundibulo, obstru-ctis ab ampliato post nativitatem œsopha-

Supplem. ad Sydenham Tom. II.

go hiantibus in illum ostiolis, eam tandiu in sinu suo detineat, quandiu a proprioribus vasis absorbeatur; absorpta dein eadem, cum maxime delituerit diu, aut forte hereditaria labe acorem contraxerit, tot una excitet turbas, totque illa parens sit agitudinum, quas pueris sæpe contingere videmus, difficili Marte sanandas. Atque ob id sane plerisque usitatum est fenticulum in occipite puerulis utiliter inurere aut setaceum, derivationis gratia, cum maxime ætate pueri gravi soleant stertore premi, qui nullimode ab ullo pulmonum infarctu, at potius a nimia Thymi obesitate profiscitur.

LX. Ab eodem, ac memorata Asthmata, fonte ortum una, ac incrementa susceperant Paralytes, Apoplexiæ, Hemoptoes, improba Scabies, Podagra, Nephritis, Phthisis, ac universi prope affectus, quos præsens constitutio anni in Scenam tulit, quibus & merito accensendi occurrunt fluores albi Mulierum, tum pallidi Virginum colores, affectus Hysterici, infandaque Puerperarum Clades; a liquidis scilicet; aut æqua seri portione defraudatis, quo egent, ut sibi comparata munera obire queant, ac constitutas sibi leges servare. Qui hæc omnia serio mente revolverit præterita, aut tum quidem revolvit, expenditque diligenter, cum impenderent prope; Is vates esto, ac *Magnus Apollo*. Hæc inter peculiare nonnullas historias seligam, quæ Medicinam facientibus haud inutiles omnino erunt, aut injucundæ legentibus. 1. Præclara Vestalis Octobri mense, cum intenso præter morem æstui rigida hyems e vestigio successit; Paralyti dextri lateris una cum insultibus hysterici perculsa, dirum in modum ludentibus, laboriosam vitam tota hyeme duxit: Vere appropriatis remediis pristinum valetudinis statum integre recuperavit, quadam tantummodo superstitie tarditate linguae, per novilunium maxime. Autumno dein sequenti eadem die, ac momento fere temporis, quo superiore anno in Paralytin incidit, pleuritico dolore correpta intra biduum decessit. 2. Vestalis altera, cum, fluentibus menstruis, in aquæ frigida balneo diu morata fuerat, internarum partium omnium paralyti extemplo obruta & adhuc luget infelix amissum membrorum usum; Atque hinc sane explicari posset phenomenon illud gravitatis, seu spatmi, quo in aqua diutius morantes plerique corripuntur, ac se se velut a Spectro quodam ad fundum

trahi existimant. 3. Mercatoris filia; cui prægrandis diu in abdomine enatus tumor, qua cæcum intestinum ad dextri renis confinia delitescit, Colicos sæpe dolores, ac sævos admodum inducere consuevit, in paralyfin subinde ejusdem lateris desinentes, quæ citissime solvebatur; ab utroque jam modo affectu Thermarum beneficio immunis, atque incolumis degit, remanente antiqui tumoris in eadem parte vestigio, qui malorum author extiterat. 4. Quidam ex hepatis, & vesicæ bilis obstructione in tertianam notam, deinde in colicam passionem incidit; paulo post paralyticus redditus, sex fere menses inermis vixit, ad extremum delirio, ac epilepsia correptus occubuit. Paralyfis a principio occupavit brachiorum superiores partes, sensim ad extremitates manuum, ultimo ad crura descendit: Ager atrophia contabescebat, deque ventriculi ardore, siti, appetitus edendi prostratione, alvi difficultate, & dolore Ilii sinistri tensivo, gravique (sentire enim sese aiebat in illo loco pondus aliquod grave, tanquam plumbi massam) conquerebatur. Aperto cadavere Jecur reperimus pro corporis ratione nimis magnum, obstructioneque minime vacans; Vesicam bilis crassa, ac nigra bile turgidam; Ventriculum humore viridi plenum, atque extensum; Colon intestinum male, ac præter naturam conformatum. Siquidem ubi Cæcum situm est, & ubi Colon ventriculo annexum erat, valde laxum, aderat, flatibusque expansum, reliquis in locis ad rectum usque, angustum, sævis crassis, durisque in globulos concretis infarctum: Eodem modo conformatum vidi Colon in multis. Reliqua viscera tam naturalia, quam spiritualia erant illæsa, ac integra. Ex cerebri substantia inter disseccandum effluxit aqua tenuis, & colore subrubicundo, quod vasorum sanguin-

neorum incisioni adscribendum est; nam aqua, qua omnes ventriculi scatebant, fuit tum tenuissima; tum limpidissima, ac pura, nihil vero pituitæ in ventriculis cerebri vidi. Totum spatium, quod in Sacra fistula inter tenuem, & duram membranam est, ubi nervorum funiculi nervos constricturni a spinali medulla recedunt, simili aqua plenum extitit. Ex qua quidem historia, & symptomatibus, quæ præcurrebant, conjicere fas est omnium malorum scaturiginem ab Hepatis novi resolutionem ex mœrore, multa sollicitudine, & inedia expertum: deinde sumpto Cathartico, adeo lasum, ut totus ipse immobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus, tum potionibus, tum cibis, & aliis hujusmodi usus fuisset, maxime vero balneis, unctionibus, mutatione aëris temperati, & omni hilaritate. Etenim tristis erat, & ad iram proclivis. 6. Miles ætatis 30. annorum, exeunte Januario, derepente inter prandendum cum suis Commilitonibus, mortem subit. Consuevit longo antea tempore de dolore pressorio in radice frontis, & de perpetua narium, ac faucium siccitate conqueri. In aperto post obitum corpore observata sunt sequentia: Pulmones utrinque coherentes cum Pleura expansi, & turgidi sanguine, dexter tamen lobus minus sinistro, abique ulla substantiæ labe; Cor flaccidum, Hepar præmagnum. In capite autem propior hærebat hujus inopinati eventus causa; Processui nempe falciformi, ubi intra radicem frontis cum osse Ethmoides firmitus connectitur; accreverat conspicua magna portio instar induratae, scirrhusæ, & conglomeratae glandulae, quæ fronti in isto, quo hanc respicit, latere firmiter cohaerebat, ut digito violenter separari opus habuerit. Proxima Cerebri substantia erat siderata, putida, & eliquata; Reliqua illæsa. (*) Optandum

(*) *Rariores sunt hi casus, ubi officina Mentis, & Rationis turbatur per talem prægrandem excrescentiam. Placuit Carolo Fracastoro in Diss. Epistol. Alphonsum Borellum tales excrescentias, etiam hic locorum Polypos medullares appellare, quam appellationem etiam secutus est Lancisius Tract. de mortibus subitaneis; ubi comparem ferme casum recenset lib. 1. cap. 2. §. 6. Quemadmodum enim Polyphi cordis sanguinis progressuum motum, & omne inde pendens vitæ interesse confundere, imo sufflammare solent. Ita Cere-*

rebrini medullares isti polyphi, quatenus liberum illud ventriculorum spatium, ac vacuum præternaturalem explent, confundunt motus in hoc vacuo existentes, representativos, reflexivos, collectivos, & discretivos, ut maxima inde anomalia redundet quoque in motus vitales. Ita Lancisius paralyticae, & apoplexie mulieris repente mortue caput aperuit, & invenit sub cerebello ad internum principium Spinalis medullæ, Glandulam scirrhusam, de Mort. subit. l. 1. cap. 11. §. 11.

dum sane, ut exquisitiorem historiam praegressi morbi, aut adversae saltem valetudinis hujus Viri habere potuissemus, ast nemo aderat, qui talem subministrare potuerit. Analogum huic casum olim a Cl. *Terraneo*, nunc Beato, adnotatum memini in Viri cujusdam capite subita morte intercepti, in quo magna occurrerat fungoso glandulosa, ac fibris distincta portio, anteriora versus usque ad os frontis, a dextris ad os temporum, a sinistris vero ad duplicaturam Menyngis usque protensa, tres libræ quartas pendens. 7. Jurisconsulti Uxor, prope Collegium Clericorum Regularium Divi Pauli, diro, ac diuturno capiti dolore vexata, appetente solitio æstivo, oborta febris acuta, e vivis inter copiosissimos capitis sudores excessit. In hujus capite ingenti feri copia subflavi, viscidique, utrumque ventriculorum anteriorem refertum comperimus, ac glandulam juxta pituitariam disrupti recens abscessus vestigia, pure adhuc exundante teterrimo, foetentique. Tota Cerebri substantia corrupta veluti videbatur, ac coloris subnigri; Nihil econtra in Cerebello a naturali alienum. Biduo ante obitum facies, atque oculi intumescere; Ipsa vero vaporibus sæpe sub somno, obliviositate. lancinationibus per aures, plerumque etiam molesta oculorum caligine, spasmo cynico, ac involuntario salivæ effluxu per intervalla diu ante mortem corripiebatur. 8. Vidua quædam conquerebatur de Cephalalgia singulis auroris tanta cum atrocitate invadente, ut sutura capitis quasi dehiscerent. Haecenus præsidii illuît omnibus. Mutato demum consilio suasi pediluvium; Unde factum est, ut aura frigidissima, sic illa ajebat, cum horrore totius corporis a capite ad pedes descenderet, ægraque bis vel ter idem administrando, plane convalesceret. 9. Illustri Mulier recens connubio juncta ex Mensum suppressione, fastidio ciborum, nauseis crebris, & vomitibus, ventris elevatione, aliisque simililibus indicibus cum se gravidam crederet, plaudebat sibi ob felicem hanc conditionem. Quarto circiter mense dolores invadunt parturientium doloribus similes, ac paulo post corpus edidit informe prorsus, duorum pugnorum circiter magnitudinem adæquans, ac vesiculis constatum, quarum maximæ ovum columbinum mole, ac figura exacte emulabantur; minimæ vero vix pisi magnitudine superabant. Aderant autem centum fere humore limido, & seroso repletæ, ac inter

se invicem colligatæ, membranosi cujusdam involucri ope, ceu altero quodam peritonæo, involutæ.

LXI. Plerasque alias recensere subit, quæ aut abortivos foetus, aut molares hujusmodi conceptus edidere; Plerasque etiam, quæ maturo edito feliciter partu, paucis post diebus, latenter occubuerunt. Cautum iis erat, appropriatis cardiacis laborantem naturam tueri, tum diluentia pleno exhibere, quibus tum sanguinis fervor quodammodo compesceretur, tum fluxilis idem magis reditus per consuetas inde vias faciliiori negotio educeretur, obsequentibus a repetito diluentium usu factis fibris, quarum nimia sæpe tensio funestos plerisque exitus tulit. Tota scilicet malorum ilias ab una, ac eadem universali causa pendebat, ab ea nempe siccitate temporum, ut quæ, toties dicta sunt, iterum repetam, qua & fervidior intus cruor, & caetera quæque liquida, ad statim heu prona nimis; Crispata hinc, ac tensa præter modum solida, sæpe una Matrem, ac Foetum inopinato sustulerunt. Huc quoque enumerandi hysterici insultus, huc caetera quotquot referendæ ægritudines, quæ hoc potissimum anno sequiorem sexum dirum in morem exercuere.

LXII. Dum hæc intra Urbis mœnia agebantur, haud dissimiles passim affectus Colones infestabant. Variolæ præsertim, ac morbilli tota hyeme inclementer saevire, adultosque hæc maxime adoriebantur, ac edita magis loca, quam pueros, ac humilia oppida. Comites iis aderant crurum, ac pedum erysipelata, sæpe etiam internæ viscerum Phlogoses, Pleuræ, Pulmonum, Hepatis, Intestinorum, Menyngum, Oculorum, ac Faucium, Salafios, Canapiciensem Agrum, Vercellas, Lumellinam, Comitatum Alexandriæ, Universam pene Liguriam, ac Montisferratensem ditionem pertinax alvi fluxus occupavit. Idem Nicensem tractum, Provinciam, ac superatis Alpibus, Delphinatum, Sabaudiam, Lugdunum usque obtinuit, perque æstatem potissimum saeviit. Febres hinc visæ e Phlogisticarum censu memoratos affectus comitari, ac ulro citroque ire, suoque Marte, ac ingenio. E Chronicis morbi Hydropses in universum, ac Tympanitis maxime, Arthritides, Phryses, tetraque ulcera Pagos, ac rura sœdarunt. *Alladii*, quod præclarum oppidum est Comitum *Sannmartinarum*, Febres Januario vagatæ sunt mali moris, quarum historiam a Cl. Viro exaratam hic sub-

subnectere aequum duxi, in spem veniens, incitamento id futurum subinde aliis, ut sedulo hinc, diligenterque morborum, quotquot huc illuc per annum saeviunt, seu popularium, sive intercurrentium observationes describant.

Illustrissimo, Doctissimoque Viro

C A R O L O R I C H A,

Joannes Thomas Guidetus S. P.

Quod annales Morborum Vulgarium processus eruditissimis animadversionibus contextos, & graphico stylo feliciter exaratos, publico juri elargiris, Vir Amplissime, tibi plurimum debet Medicina nostra Subalpina. Hæc enim in te suum videt restauratorem, quæ a Majoribus tuis Archiatris meritissimis decus habet, & gloriam. Ad perutilia isthæc indigenæ praxeos monumenta locupletanda uno corde, unoque pede contendere deberent omnes Medicinam facientes in nostra hac Pedementana ditione, suas quisque appendens observationum schedas, ut olim tabulas Æsculapii templo appendi usitatum. Hujus ego instituti, cuique consilii optime conscius silentio ulterius præteriri non patiar historiam ægritudinum nonnullarum Epidemicarum, quas ineunte Januario proxime elapso datum est observare in Alladiensi oppido una cum præclarissimis Viris D. D. *Bardejoso* Patre, ejusque Filio doctissimo, illic in Patria gloriose Medicinam profitentibus, ac in tota Salassiorum Provincia de re Medica optime meritis. Esto itaque,

Cum Divini Verbi Præcones in præfato oppido prædicationi suæ optimum finem imploraturi sacram instituissent liturgiam, ea fuit hominum accurrentium turba, ut horum conventu inter Ecclesiæ Majoris angustias nedum exæstuvaverint corpora, sese arcte foventia, sed & ipsi exudarint parietes præ halituum emanantium affluentia. Complures viros, atque mulieres sudore manantes frigidus aer excepit, hinc popularis morbus, haud multo dato intervallo, grassari visus est cum agrotantium languore, febris, raucedine, nausea, lingua viscida, & amurcota, pulsu tenui, mentis hebetatione, vaniloquiis &c. Mox accessere deliria, surditates, aphoniæ, gravesque sopores

ad lethargum ducentes. Erucebant in aliquibus stillæ sanguinis, seu levis hæmorrhagia e naribus; in quampluribus petechiæ exiguæ brevi evanescentes, in omnibus borborygmi, & lumbricorum excretiones per superiora, & inferiora cum sæcibus graveolentibus. Febriles exacerbationes, nocturnis horis catarrhalium more, absque intermissione, clanculum repetebant. Nullus succedebat æstus ingens, exigua sitis. Urinæ a naturalibus vix abludebant. Sanguis extractus in principio morbi coccineum servabat colorem, aptamque consistentiam, nullo agrotantium levamine. Sæpe diarrhœa superveniens commodum tulit, ut & in aliquibus sudores. Interea plerique quinto vel septimo morbi die non sine magno populi terrore migrabat ad plures.

Harum ægritudinum indole, causis, symptomatibus, atque inde eventibus serio consideratis, deduximus unanimes has esse in sua origine febres de genere lymphaticarum cum vermibus, acutas tamen, & male moratas ex coagulatione lymphæ primum. exinde sanguinis. Primariam coagulationem exhibebant raucedines, linguæ visciditates, membrorum torpor, nocturnæ periodi, aphoniæ, alvus pigra, intestinorum murmura, & inde excreti lumbrici. Posteriores siderationem elucidabant, reliqua enarrata symptomata perniciem accusantia. Totam denique complebat æthiologiam notitia morbosorum in lymphæ apparatus a prægressis tempestatibus, quas tu nobis scite admodum diligenterque comparasti, repetenda; Ob id maxime, quod æstas antea, atque Autumnus mites fuerint, ac Borealibus ventis perflati, unde nulla, vel modica facta est sudorum effusio, alioqui nostro sub Cælo consentanea quot annis. Quod si iis addas pravam alimentorum conditionem, fructuum præcipue corruptelam, nec non aquarum putealium saculentiam ab inclementia cæli contractas, erues profecto genuinam lymphatici lentoris, & cachochiliæ causam simul, ac genesin lumbricorum.

Cur autem a violenta adeo procatharsi febres hujusmodi, non vero pleuritides, peripneumonia angina, erysipelata interna, aliæve hujus farinae ægritudines emerferint? ex hoc factum puto, quod scilicet hujus Brumæ Constitutio non satis rigida, catarrhales concretiones, stasesque in glandulari systemate, rivulisque lymphaticis congregare apta nata sit potius, quam systrophicas collectiones, ac phlogoses in intimioribus

vi.

viscerum flexibus. Veruntamen sufflaminata hoc pacto lymphæ lubricantis irrigatione, & intercepto illius ad sanguinem commercio, reliquum est, ut & cætera torpeant fluida in suo circulari motu, unde secretionum, excretionumque suppressio, progeniesque malorum. Et siquidem levioribus alias de causis inter hybernas vicissitudines visa sunt pectoris rheumata in acutas peripneumonias degenerare, ita nec mirum, si in datis præ dispositionibus, & momentis, expositæ febres a catarrhali exordio in exitiales abierint. Ignoratum haud est Medicis praxin excolentibus perniciosas sæpe emergere febres, velut inopinato, a lymphæ lentore pederentim collecto, ut prope advertit Doctissimus *Baglivius lib. 1. de febribus malis & mesentericis, §. 1.*

Porro ex centenis aegrotis, quos bidui spatio invisimus, vix paucos evasuros fore sperandum erat, nisi opportunis extemplo adhibitis præsidiiis fuisset opitulatum; Utque singulis indicationibus successive satisfaceret: Statuimus primum alvinas vias solemni-ter expiare, emeticis, clysteribus, aut catharticiis, servato aegrorum delectu. Secundo lymphæ fluorem promovere, ductusque obstructos referare diluentibus calide pitissatis, non omitendo anthelmintica cardiacis mixta, & vesicantia artubus applicita. Tertio viam sudoribus sternere, vel saltem adiapuensian delere frictionibus, & cucurbitulis, ut impofterum exhibitis diaphoreticis curanei pori obsequerentur magis. Phlebotomias raro, nec nisi in Plethoricis celebrandas duximus, potius de saphena, quam de superioribus venis. Reliqua sub finem morbi adhibenda problematice sunt proposita, juxta opportunitatem, & exigentiam.

Nec nostra nos fefellit opinio, quandoquidem tali observato regimine vix unum, aut alterum ex præfato aegrotantium numero deinceps interiisse rerulit per litteras ultimo datas laudatus Doctor, cognatione, & amore mihi devinctissimus *Bandesonus Junior.*

Accipe itaque, Vir Praeclarissime, breve hoc observantiae meae argurmentum; Interea Spartam, quam suscepisti, exornare iterum, iterumque ne desinas; Meque tibi multis de nominibus obstrictum pergas amare. Non enim me præterit, quam multa jam tibi debeam ob munera, dulcemque consuetudinem, quam me humaniter excipere toties dignatus fuisti: Nec ulla unquam ætas conticescet, quæ a Majoribus tuis

accepi, honores, ac beneficia. Taurini pridie Nonas Febr. 1722.

LXIII. Sed ut aliquid de Chirurgia dicamus, in qua Magnos olim, ac percelebres Viros, & nunc adhuc Pedemontium, obinet; Neve quidquam intactum hac quoque in parte relinquatur, aut imperfectum; Pauca manent de *tumoribus* potissimum explicanda, qui auxiliatricem Chirurgi dexteram efflagitabant; Hos inter Atheromata præ cæteris, & Melicerides eminebant, quæ duo quidem tumorum genera vel in eo maxime conveniunt, quod in folliculo fluctuet humor. Descripsit ea omnium optime *Aetius*, atque e recentioribus *Severinus*: Atheroma tumor est figura oblongus, & sublatius, qui ad compressionem digitorum ob humoris crassitudinem tarde cedit, tardeque iis ablatis revertitur, a quo Meliceris differt, quod & rotundior sit, & humoris essentia tenuior, & hinc ad digitorum compressionem celerius cedat, & celerius etiam revertatur. Non autem hæc ita discerni posse videntur, ut certo omnia affirmare liceat, quin potius, quid intus habeant, ut conjectura prælagiri possit, sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta sunt, non posse, *Celsus* monet, quod tamen non propter humorem, sed alia quaedam simul ibi contenta ita fieri apparet: ait enim, in his, quæ renituntur, aut lapillis quaedam similia, aut concretos confertosque pilos reperiri: Officulorum recens exemplum est legere in *Ephemeridibus*. Nec minus notabile, quod *Petrus Marchettus* in Meliceride se vidisse, ipse testis est: in ejus nempe folliculo alium ejusdem generis tumorem, sed minorem delituisse, sua & iptum membrana inclusum. Ubi quis cum ranis *Æsopi* apud *Phædrum* exclamandum putaverit:

Quid futurum est, si creavis libero?

Hujusmodi tumores articulos præcipue occupant, ac inferiores potissimum, eo ditiores, quo impliciti magis, ac tendinibus musculorum, quorum ibi magna segetes, intricati. Nobilissimi Equitis jacturam universa Civitas deflet adhuc, qui, dum inter Chirurgos de secando cruce lis ageretur, obhaerentem in rotula ejusmodi tumorem, omnem curationem, ac artis præsidia renuentem, febri, lenta in dies ingravescente, macie confectus obiit: æte sepulta, adque tota liquidorum massam propagata labe.

LXIV. Multis etiam *Ganglia* hos, ac illos artus obsidebant: Durissimum tumorum genus, Nucis avellanae magnitudinem haud supe-

superans, doloris expertus, manuum juncturas, & tales frequentius occupans, rarius cubitum, & caput. Quo pacto oriatur, non liquet: ex succo nutritio nervosarum partium fieri, *Klopton Havers*, nuperus Scriptor coniecit. Videri posset lymphaticus humor, qui partes nervosas alluit, nescio quo spiritu Gorgonico afflatus, congelari, nisi sensim excreveret; ex quo apparet per appositionem novi liquoris quotidie augeri, ubi sensim coepit, & subtilioribus evaporatis, indurari. An vasculum lymphaticum supra modum expansum, ubi vel ictu, vel alia violentia illata urgetur humor, qui intus vehitur, non patet. Haud magni ceterum momenti tumor: hoc enim habet beneficium, quod rupta membrana evanescat. Ad hoc expedire *Helvetius* inter Batavos celebris, utebatur malleo ligneo, corio obducto, quo percutiebat tumorem. Hinc etiam forti manus allusione, ut oritur, sic & tollitur. Sive autem ab externa oriatur, potest emolliiri primum, deinde vi dissipari externa, a Chirurgo compressus, quam elegantem rationem apud *Actium* videre licet. In eo resolvendo quod Hydrargyrum valeat, *Jo. Lossius* mirabili eventu expertus est, ut libro de podagra perhibet, ubi emplastrum addit a *Zacuto Lusitano* sibi communicatum, quod nodos podagricos quoque dissolvat, de quibus, si quis sit sollicitus (constant autem ex quibus Ganglia, & quasi rasae cartilagini, ut cum *Celso* loquar, simile obtinent) is vel solus optime satisfecerit. Vidi quendam, cui uno, ac altero horum dissipato, unum, ac alterum e vestigio alio loco oriebatur, quo dein improba progenies, meo consilio, Mercurii ope omnino deleteretur.

LXV. Ruricolæ, atque ex iis potissimum qui ad Alpium radices degebant, strumis in universum laborarunt. Mulieres præsertim, ac pueri, eo curatu difficilioribus, quo non in collo, ubi hæc prodibant, sed altius forte in ipso Mesenterio earum fomes latebat. Neque novum est tam alte strumas exoriri, quod equidem post alios nuper *Cl. Bartolinus* nepos advertit, ex *Riolano* Sapiens, qui Scrophulas in corpore nunquam erumpere asserit, nisi Mesenterium strumofum fuerit: Hic vere ex *Guidone*, & *Ingrassia* id potest didicisse, qui idem tradidere. Quodve obstupescas; utque anni, ac morborum ingenium ediscas una, adnotare erat, vix paucos Bronchocele hoc anno obsignatos, familiari ceterum Subalpinis morbo, ut Polonis Plica, Britannis tabes. Tumor est Thyroidis glandulæ,

mollis, ac pendulus, nec molestus modo, & aspectu fœdus, sed etiam si magnus, suffocationis periculum asserens, Vidi ego musculos sternothyroidæos plane emaciatos, membranaceos. Curatio illius haud facilis, nec tuta semper. Ut enim Endemius hic Incolis morbus, ita causas illius remove, a quibus originem habet, difficile prorsus. Laudantur plerisque tabellæ quædam ex alumine, ac spongia marina confectæ una cum radicibus pororum; aliis emplastrum de Galbano crocatum *Mynsichri*. Nonnullis cataplasma ex foliis, & radice cucumeris asinini cum stercore caprillo, quibus & interna jungi possunt, & quidem pulvis ex ossibus Sæpiæ, Mandibulis Lucii piscis, Lapidibus cancerorum, Pipere, Zingibere, Piretro, Testis ovorum, quorum alia exsiccando, alia dissipando agere credi possunt. Potior sane salutis spes, ac tum quidem, cum in scirrhum abiit, in sectione consistit, etsi metuenda hinc sit quædam colli deformitas, nec exiguum negotium præbeant vasa, quæ ex Carotidibus occurrunt: tum nervi etiam recurrentis viæ, ne accadat, quod narrat *Galenus* de imperito Chirurgo, qui cum eos una evelleret, mutum reddidit ægrum; Ob quod maxime hanc operationem omnium difficillimam puto. Multi Scrophulas, ac Bronchocele idem esse putant; Alii, quos inter *Fabritius*, nescio, quod attulit virium asperæ arteriæ peculiare quod eo nomine appellat, ut Bronchocele, exponat nemini Mortalium unquam visam. *Celsus* inter cutem, & asperam arteriam eam ponit. *Actius* tumorem simpliciter hanc vocat in gutture enatum; Tumoris tamen genus, ac sedem illius principem designare fas erat, quam nec ipse *Severinus*, qui de omnis generis tumoribus disertissime scripsit, attigerat; Unus, quem reperiam, *Schelhammerus* agnovit, recteque in Thyroidea glandula collocavit, visam hanc utique, sed non agnitam *Severino* ostendens, adnotato ab eodem exemplo hominis cujusdam, qui Bronchocele prævastam multos annos cum angore passus, tandem ab ea strangulatus oppetiit; Quo dissecto grumos ingentes sanguinis undique circumfusus cum adnatis quibusdam carunculis offendit. Equidem sine dubio hæc carunculæ partes erant Thyroidis glandulæ præ sanguinis copia distentæ, ac divulsæ in partes, aliis sensim & corruptis, & coliquatis in sanguinem. Et hoc ipsum est, quod Doct. *Vubartenus* dicit & Si scrophulæ (sic nanque vocatis Bron-

Bronchacelen, quod notandum est) *rubescant*, *colorem floridiorem esse*, *minusque lividum*, quam *strumarum*.

LXVI. Inter glandularum aegritudines refero, verrucas, ac nodos venereos, quibus, si acerbius unquam, hoc potissimum anno, foedum in morem correpti sunt improbae Veneris milites, quosve vix ipse quidem magnae famae *Mercurius* solvere poris erat, aut decocta quaeque lignorum. Vidi Militem universo corpore verrucosum, avellanae magnitudinem exuperantibus verrucis. Ficosos hosce proprie vocat *Levinus Lemnius* in opère de *naturae miraculis*: syphiliis alii, aut puride gallicos appellant. Aderant hi utique sagacis Naturae teterrimum huiusmodi, ac virosum fomitem abigentis ac profligantis laudandi conatus, si quae per vasa corporis, caecosque meatus effluebat lymphæ, crassior illa, ac glutinosa, quam par foret, magis, illi haud obstitisset, verrucas hinc, tubera, ac fungos universo corpore excitans, horrendum visu spectaculum! Ea nanque mira est Naturae providentia, ac summum ejusdem, ut in omni fere, ita, & in hoc praesertim morbo studium, ut per quamprimum loca virium venit, genitales, inquam & his attrituas partes, per has easdem vias, quasi facto recurso, pellat; Ubi vero altius irasci malum incepit, & se funditus abdens corpora depascit misero; tota conetur adhuc infestum virus, seu exulcerantem intro putrilaginem, per has, ac illas partes, quas in emissaria torquet, expromere; Rem quidem, quam serio advertere debent hi, qui Syphiliorum haec symptomata curant. Ita suis opificiis satagit Natura parens; ita in adversis prospicit; ita nullam viam intentatem relinquit, ut aegrorantes adjuvet.

LXVII. Locus esset huiusmodi eruptiones, tum in morbi inchoantis sive interminati statu, tum in absoluti jam, & late grassati altero fusius describendi; ejusque varios, quos passim inducit, characteres,

Qui casus rerum varii, quæ semina morbum Insuetum, nec longa ulli per secula visum Attulerint,

Enarrandi una, ac explicandi; Si haec omnia possent brevi oratione complecti. Satiùs igitur lepidissimi Poetae *Fracastorii* sit audire rapsodiam,

Ipse ego Genomanum memini, quæ pinguis dives

Pascua Sebina præterfluit Ollius unda:

Vidisse insignem juvenem, quo clarior alter

Non fuit, Ausonia nec fortunatior omni. Vix pubescentis florebat vere juvenæ, Divitiis, proavisque potens, & corpore pulchro.

Cui studia, aut pernicious equi compefcere cursum,

Aut galeam induere, & pictis splendere in armis,

Aut juvenile gravi corpus durare palestra; Venatuque feras agere, & pravertere cervos. Illum omnes Ollique Deæ, Eridanique puellæ Optarunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ: Omnes optatos suspiravere Hymeneos.

Forfan & ultores superos neglecta vocavit Nonne quidquam aliqua, & votis pia numina movit.

Nam nimium fidentem animis nec tanta timentem

Invasit miserum labe, quæ sevirior usquam Nulla fuit; nulla unquam aliis spectabitur annis.

Paulatim vet id nitidum, flos ille juvenæ Disperit, vis illo animi: tum squallida tabes Artus (horrendum) miseros obduxit, & alte Grandia turgebant scdis abscessibus ossa. Ulcera (probo Divum pietatem) informis pulchras

Pascebant oculos, & diæ lucis amorem, Pascebantque acri corrosas vulnere naves; Quo tandem infelix fato post tempore parva Ætheris invisas auras, lucemque reliquit. Illum Alpes vicina, illum vaga flumina sterunt;

Illum omnes Ollique Deæ, Eridanique puellæ Fleverunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ;

Sebinusque alto gemitum lacus edidit amno,

Hi blandæ scilicet voluptatis, hi tenerorum complexuum sunt fructus; heu tragici tantum, & miserabiles, quantum inter multiplices cruciatus amisisse vitæ dulcedinem, & quantum ex humana specie transmigraße in brutam.

LXVIII. Locus hic etiam esset pauca de altera tumorum specie, qui ad Chirurgiam quoque spectant, proferendi, nempe de Aneurismatibus, occulti morbi genere, quo plures hoc anno misere interemptos adnotavimus; Sed hæc & pleraque alia prætermittere intacta lubet, ne ingentem in molem pagina turgescat, alibi forte prolixius de hisce acturis, novaque in dies meditantibus, quoad eorum originem, ac incrementa, revelanda aliquando. Exemplâ pariter, ac Schemata exhibebimus magnorum Aneurismatum, quæ nobis occurrerunt, aut

ab

ab Amicis communicata. Quæ quidem alio tempore reservamur. Unum tantummodo, atque alterum superest commemorandum, quod nobis terminus hac vice, & extrema erit linea laboris. Primum est Castrationis historia in puero decenni, pro meliori vocis claritate, atque modulatione ab experientissimo Chirurgo *Andrea Verna* felicissime absolutæ. Febris huic supervenit cum vomitu inani, abdominis inflatione, ac præcipue in regione tota hypogastrica. Alvus ad quartam usque occlusa penitus; Urinæ etiam parca copia effundebantur. Post quartam referari sponte alvus cœpit, tum urinæ pleno gurgite copiosius effluere, evanescente paulatim, ac omnino tandem desinente febris, adeo ut undecimo die æger incolumis, adque omnia munera obeunda aptus videretur, uno relicto vulneris inflicti vestigio, quod quidem, cicatrice obducta, brevissimo tempore consolidatum apparuit. Alterum est Mammæ, quam fœdus microbus Cancer occuparat diu, extirpatio a memorato *Andrea Verna* in Virgine quadam quadragenaria prope, feliciter peracta. Cœperat hæc de tumore in mamma dextra a viginti & ultro annis conqueri, cui cum varia passim Muliercularum, Agyrtarumque consilio Medicamenta adhibuisset, incrementa præbuit majora. Augescens is nanque sensim, ac totam pene mammam obsidens, venisque in orbem nigro sanguine turgentibus circumfusus, in ulcerosam demum pravitatem degeneraverat, ultimum postulans in sectione præsidium. Mirum ut generosa Virgo invicto animo, nova velut Amazon, pertulit excisionis acerbiter. Consolidato vulnere, ruri abiit, confirman-

da valetudinis gratia, ubi brevi post tempore acuta febris prehensa decessit. Tertio denique ac postremo recensendus subit diuturnus Oculorum affectus scarificationibus ad una Palpebræ inferioris confinia institutis curatus, autoritate, & consilio Cl. *Viri Petri Robaultii* Chirurgi, & Antecessoris Regni. Affectui isti initia, ac faciem præbuit exterioris Oculorum membranz inflammationi, cui cum imperitus quidam topica diu admovisset, nedum ingravescere hinc malum cœpit, sed & una simul intumescente Palpebras visum, ac sensim in scirrhosam velut duritiem inferioris potissimum desinere, quæ repetitis scarificationibus, ac topicis appropriatis, lato omine, cessit.

LXIX. Atque hæc sunt, quæ brevi sermone accurata tamen Morborum temporumque indagatione exarata, pro tertia hacce Constitutione sufficiunt. Haud diffiteor quidem multa iis deesse, saltem hæc ipsa politiore calamo delineari potuisse; Quod a me exigi omnino vetant, tum quibus obstrictus, ac occupatus sum praxeos negotia, tum exigua prorsus ingenii acies, ac curra admodum *suppellex*. Juvat autem aliquid adhuc sperare tum laudis, tum adjumenti: illius, quod primus Ego in Patria glaciem fregerim, omnesque in hoc animi nervos intenderim, ut si quo modo fieri possit, Morborum medela, post cineres meos, majori cum certitudine administretur: hujus vero, quod nullus dubitem futuros aliquando, ut nonnullos jam enumerare possem, quamplures, qui auxiliatricem mihi dexteram ferent; aut me defuncto satis, tentatum a me opus feliciore *Ævo* perficient.

FINIS SUPPLEMENTI.



